



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>















HANDBOK  
I  
SKANDINAVIENS FLORA,

INNEFATTANDE  
SVERIGES OCH NORGES VÄXTER,

TILL OCH MED  
MOSSORNA;

AF  
C. J. HARTMAN.

---

*Tionde upplagan,*  
utgifven med  
RÄTTELSE OCH TILLÄGG  
AF  
CARL HARTMAN.

---

FÖRRA DELEN:  
Phanerogamer och Ormbunkar.

---

STOCKHOLM  
ZACHARIAS HEGGSTRÖMS FÖRLAG  
—  
IWAR HEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI  
1870.

## **BIOLOGY**

***Omnis vera cognitio cognitione specifica innitatur.***

**Linné Sp. Plant.**

QK 324

H3

1870

BIOLOGY  
LIBRARY

## Förord.

Ett halft århundrade har nu gått till ända, sedan denna boks första upplaga utgafs. Naturligt är, att en så lång tid måste hafva medfört många viktiga upptäckter och framsteg, många väsendtligt förändrade åsikter och uppfattningssätt inom Botaniken lika väl som inom de öfriga naturvetenskaperna. Illa vore då, om närvarande bok, som under tiden blifvit många gånger reviderad och utgifven på nytt, skulle mer än andra hafva förblifvit oberörd af dessa förändrade förhållanden. Det har den icke heller; ty knappt en enda rad ur första upplagan, och säkerligen inga många ens ur den 5:te — den sista, som redigerades af den ursprunglige författaren — torde finnas oförändrade qvar i den närvarande. Och likväl tror sig utg., i och för den plan, som blifvit följd vid närvarande upplagas utarbetande, kunna fortfarande hänvisa till de Förord, som åtföljt de föregående upplagorna. Planen har nämligen i hufvudsak varit densamma nu, som tillföre, och, korteligen sagdt, gått ut på att låta boken någorlunda följa med sin tid.

De förändringar, som för detta ändamåls vinnande denna gång vidtagits, äro följaktligen till stor del af samma beskaffenhet, som vid de föreg. upplagorna. Men åtskilliga andra hafva dessutom synts utg. behöfliga och dessa äro förnämligast följande:

Alla artdiagnoser hafva underkastats en ny granskning och omarbetning, i följd hvaraf dels karaktererna i alla diagnoser, hela boken igenom, numera följa hvarandra i en och samma bestämda ordning, den hvari värtens delar utveckla sig, hvilket förut icke alltid var händelsen, dels en eller flere karakterer i en stor del af diagnoserna blifvit utbytta mot eller tillökade med nya. I släktdiagnoserna hafva de enligt utg:s tanke viktigaste eller för åtskiljandet användbaraste karaktererna blifvit kursiverade, såsom det redan i förra upplagan skedde med artdiagnosernas. Ett betydligt antal arter, som hos oss antingen på en mansålder icke återfunnits eller så småningom utdödt, eller hvilkas förekomst efterhand

befunnits högst tvifvelaktig eller alltför tillfällig, deribland i synnerhet en mängd förvildade annuella kulturväxter, hafva uteslutits ur den egentliga Floran och fått sin plats i Bihaget. Att utg. vid verkställandet af denna flyttning, särdeles de sist nämnda växternas, i åtskilliga fall torde finnas hafva gått inkonsequent till väga, inser han mer än väl, men vågar ock tro, att, hvarhelst man ville uppdraga gränsen mellan vårt lands verkligt inhemska, acklimatiserade och blott tillfälligt förvildade arter, det för närvarande skulle vara absolut omöjligt, att helt och hållet undvika inkonsequenser, särdeles om man icke vill alltför mycket skilja sig från hvad som är brukligt i andra länders floristiska arbeten.

Vidare hafva i denna uppl. en mängd, såsom minst behöfliga ansedda synonymier, jemte ganska många ännu i föreg. uppl. qvarstående kritiska eller andra anmärkningar vid åtskilliga arter dels blifvit uteslagna, dels ersatta af andra. Likaledes hafva en mängd obetydligare varieteter, företrädesvis sådana som befunnits endast bero af lokalförhållanden, blifvit borttagna eller endast helt flygtigt omnämnda, utom i den händelse, att deras namn kunde anses ega ett slags historiskt intresse på den grund att de af äldre svenska — särdeles af Linné — eller mer framstående utländska författare varit ansedda för egna arter. I ganska många släkten hafva arterna fått en annan anordning än förut, hvarigenom, såsom utg. hoppas, deras undersökning och jämförelse sinsemellan bör kunna underlättas. Af samma skäl hafva ock för släktens och arters uppställning dels flere, dels andra indelningsgrunder än förut mångenstädes blifvit följda, hvadan det i denna uppl. endast undantagsvis inträffar, att flere än 2 å 3 släkten eller arter förekomma sammanställda inom en och samma afdelning. De svenska genusnamnen hafva, såsom i sednaste upplagan af Exkursionsfloran utlofvades, nu blifvit äfven här ändrade, med ytterst få undantag, till likhet med dem, som Prof. Fries i Bot. Utf. 3:dje bandet föreslagit till antagande; och de Lappska ortnamnens stafningssätt har blifvit rättadt till öfverensstämmelse med Norrbottens sedan några år under arbete varande ekonomiska karteverk. Möjlighet till sistnämnda förändring har blifvit utg. beredd genom Löjtnanten vid K. Hels. Reg. Herr H. A. WIDMARKS välvilliga meddelanden.

Slutligen hafva tvenne af vår Floras mest omtvistade »kritiska» genera, *Hieracium* och *Lepigonum*, denna gång bearbetats af män, som egt vida rikare tillfällen än utg. att studera deras former i naturen, nämligen det förra af Lektor C. J. LINDEBERG, det sednare af Herr J. A. LEFFLER, hvilka haft den stora välviljan att i detta fall erbjuda sitt biträde.

Förutom dessa Herrar hafva många, i föreg. upplagor omnämnda, den skandinaviska Florans älskare, och deribland i främsta rummet de

nordiska botanisternas vördnadsvärde Nestor, ELIAS FRIES, nu likasom tillförene bistått utg. med råd och upplysningar af många slag; men äfven följande yngre botanister hafva med värderika uppgifter och meddelanden riktat närvarande upplaga: Stud. Herr H. W. ARNELL i Uppsala, Docenten Herr S. BERGGREN i Lund, Konservatorn Herr AX. BLYTT i Christiania, Studd. Herr G. EISEN och A. STUXBERG i Uppsala, Herr EUGENE HEMBERG å Smedstorp vid Ystad, Ph. Drn Herr JOH. HULTING i Uppsala, Prov.-Läkaren Herr Dr C. HÅKANSSON i Piteå, Pharm. Kand. Herr CONR. INDEBETOU i Stockholm, Med. Drn Herr FRANZ KLÆR i Christiania, Herr J. A. LEFFLER i Göteborg, Stud. Herr N. S. LINNARSSON i Uppsala, Lär.-Adj. Herr Dr A. A. W. LUND i Vester-vik, Stud. Herr R. OLDBERG i Uppsala, Docenten Herr Dr P. OLSSON i Lund, Lär.-Adj. Herr Dr JOH. SAMZELIUS i Nyköping, Ph. Drn Herr G. R. A. THEORIN i Halmstad, Stud. Herr G. THORSTENSON i Carlstad, Löjtn. Herr H. A. WIDMARK i Luleå. Slutligen hafva Ph. Drn Herr S. ALMQVIST och Docenten Herr Dr V. B. WITTRÖCK i Uppsala haft godheten tillsända utg. ett par nyligen af dem utgifna växtgeografiska afhandlingar, ehuru dessa tyvärr kommo utg. tillhanda först sedan Handbokens tryckning så långt avancerat, att några tillägg eller rättelser ur dem icke kunde införas.

Alla dem, som sålunda på ett eller annat sätt behagat understödja utg. med råd och dåd, hembär han härmed sin upprigtiga tacksägelse.

Mången, särdeles bland vår Floras äldre vänner, torde emellertid icke utan missnöje finna, och måhända känna sig hugad att klandra utg. därför, att denne stundom alldeles icke, mången gång blott till en ringa del ställt sig välvilligt gifna råd till efterrättelse. Till sin ursäkt och såsom ett litet prof på svårigheten, eller snarare omöjligheten, att i en bok af detta slag motsvara allas förväntningar och dymedelst vinna allas bifall, tager sig utg. friheten att här exempelvis ur sin brevsamling anföra några af de olikartade, icke sällan fullkomligt motsatta råd och önskningar, som af olika korrespondenter blifvit honom meddelade rörande de åtgärder, som vore skäl att vidtaga till den nya upplagans förbättrande.

Så hafva någre tillstyrkt indragandet af åtskilliga smärre genera, som i nyare tid utbrutits ur de större Linneanska, samt af en mängd s. k. kritiska arter, såsom allt för svagt begränsade, under det att andre tvertom uppmanat utg. att öka åtminstone arternas antal genom att såsom sådana upptaga icke så få af de i förra uppl. såsom subspecies och varieteter anförda formerna. Då en och annan önskat, att flertalet varieteter skulle uteslutas på den grund, att det ändå vore omöjligt anföra »alla möjliga» sådana, hafva andre åter ansett, att de gamla varieteterna borde tillökas med åtskilliga nya, mer och mindre utmärkta. En har velat hafva bort



de svenska genusnamnen såsom »ovetenskapliga» och omöjliga att få allmänt antagna; en annan deremot, att äfven hvarje art skulle förses med särskildt svenskt namn, i förmodan att botaniken derigenom kunde blifva mera »populär». En har ansett citater af figurer ur botaniska planchverk och exsiccatsamlingar icke vara på sin plats i detta arbete, en annan att alltför få dylika deri förekomma. Önskan har blifvit uttalad, att en *utför-ligare* redogörelse måtte lemnas för arternas utbredning inom hvarje landskap, än den förut i Handboken gifna; men från annat håll har utg. blifvit tillrädd, att göra denna samma redogörelse *mer summarisk*, än den varit förut, och att genom indragningar i densamma bereda bättre utrymme för korta beskrifningar af hvarje art, o. s. v.

När härtill kommer, att flere af dessa och andra desiderata skulle hafva tagit ett icke obetydligt utrymme i anspråk, men Förläggaren deremot mångfaldiga gånger såsom en hufvudsak yrkat, på hushållning med utrymmet, på det att arktalet och i följd deraf bokhandelspriset för nya upplagor ej måtte behöfva ökas, torde det för hvaroch en ligga i öppen dag, att utg., äfven med bästa vilja och om han fränsagt sig själf alla slags åsikter i dessa fall, omöjligen kunnat förena alla sins emellan så stridiga önskingar och gå dem alla till mötes. Men, då han är öfvertygad, att de alla varit förestäfvade af sann välvilja och rent intresse för bokens fullkomnande, om ock åsikterna om sättet för detta syftes vinnande äro snart sagdt lika många som botanisterna själfva, och då mången af dessa önskingar väckt utg:s uppmärksamhet på brister, som kunde och borde afhjelpas, förringas ingalunda genom deras olikartade beskaffenhet hans tack-samhet till alla dem, som velat skänka honom ett oegennyttigt biträde.

Några för Skandinavien under sista året nyfunna växter af större intresse, om hvilkas upptäckande underrättelse icke hunnit utg. förrän på nya året, då redan den egentliga floran var färdigtryckt, upptagas under form af tillägg efter registret, der äfven några tryckfel anmärkas.

Emedan bokens sednare del, innefattande Mossorna, först något längre fram utgifves och denna gång blifvit helt och hållet omarbetad, anser sig utg. böra beledsaga densamma med ett särskildt förord, hvori redogörelse skall lemnas för behandlingen af dit hörande växter.

Örebro i Mars 1870.

Carl Hartman.

## Förkortningar af Författarenamn. \*)

*Ach.* — E. Acharius.  
*Adans.* — M. Adanson.  
*Afx.* — Afzelius, Ad. och P. C.  
*Ag.* — C. A. Agardh.  
*Ahlqv.* — A. Ahlqvist.  
*Ahnf.* — N. O. Ahnfelt.  
*Ail.* — V. T. Aiton.  
*Al. Br.* — Alex. v. Braun.  
*All.* — C. Allioni.  
*Almqv.* — S. Almqvist.  
*Anders.* — Georg Anderson.  
*Ands.* — N. J. Andersson.  
*Andrz.* — A. Andrzejowski.  
*Ankarcrr.* — J. Ankarcrona.  
*Ant.* — Franz Antoine.  
*Ard.* — P. Arduino.  
*Aresch.* — Areschoug, J. E. och F. C.  
*Arn.* — Walker-Arnott.  
*Arrh.* — J. P. Arrhenius.  
*Aspegr.* — G. A. Aspegren.  
*Az. Bl.* — Ax. Blytt.

*Bab.* — C. Babington.  
*Backh.* — James Backhouse.  
*Balb.* — J. Balt. Balbis.  
*Barkh.* — Barkhausen.  
*Baumg.* — J. C. G. Baumgarten.  
*Bechst.* — J. M. Bechstein.  
*Beck.* — J. Becker.  
*Bell.* — L. Bellardi.  
*Ben.* — Beneken.  
*Berggr.* — S. Berggren.  
*Bergstr.* — C. E. Bergstrand.  
*Berk.* — M. Berkeley.  
*Bernh.* — J. J. Bernhardt.  
*Bert.* — Ant. Bertoloni.  
*Bess.* — Bald. Besser.  
*Beurl.* — P. J. Beurling.  
*Bich.* — J. E. Bicheno.  
*Big.* — Jac. Bigelow.

*Billb.* — J. G. Billberg.  
*Biv.* — A. Bivona Bernardi.  
*Björnstr.* — F. J. Björnström.  
*Bland.* — O. C. Blandow.  
*Bl.* — M. N. Blytt.  
*Bl. & Fing.* — Bluff & Fingerhut.  
*Bong.* — H. G. Bongard.  
*Bor.* — A. Boreau.  
*Borkh.* — M. B. Borkhausen.  
*Bouch.* — J. A. G. Boucher.  
*Br.* — Rob. Brown.  
*Br. & Sch.* — Bruch & Schimper.  
*Br. eur.* — Bryologia europæa.  
*Br. germ.* — Bryologia germanica.  
*Brid.* — S. E. Bridel.  
*Buxb.* — J. C. Buxbaum.  
*Bönn.* — C. M. F. v. Bönninghausen.

*Campd.* — F. Campdera.  
*Cass.* — H. Cassini.  
*Cav.* — A. J. Cavanilles.  
*Cederstr.* — E. C. J. Cederstråble.  
*Cham.* — A. v. Chamisso.  
*Clairv.* — De Clairville.  
*Coss. & Germ.* — E. Cosson & E. Germain.  
*Coul.* — Th. Coulter.  
*Curt.* — W. Curtis.  
*Cust.* — Custor.

*DC.* — A. P. De Candolle.  
*Deinb.* — Deinböll.  
*Desf.* — R. L. Desfontaines.  
*Desp.* — N. Desportes.  
*Desv.* — A. N. Desvaux.  
*Deth.* — G. G. Detharding.  
*Dew.* — C. Dewey.  
*Dicks.* — J. Dickson.  
*Dill.* — J. J. Dillenius.  
*Drej.* — S. T. N. Drejer.  
*Drum.* — J. L. Drummond.

\*) Både de, som förekomma i första och andra (moss-)delen, upptagas här i ett sammanhang.

*Dub.* — J. E. Duby.  
*Düb.* — M. W. v. Düben.  
*Dum.* — B. C. Dumortier.  
*Dur.* — Durieu de Maisonneuve.

*E.B.* — English Botany.  
*Ehrh.* — F. Ehrhart.  
*Eis. & Sturb.* — G. Eisen och A. Sturberg.

*Ekstr.* — E. V. Ekstrand.  
*Endl.* — Steph. Endlicher.

*Fisch.* — F. Fischer.  
*Fl.D.* — Flora Danica.  
*Fl.N.* — Flora Norvegica.  
*Fl.Wett.* — Flora der Wetterau.  
*Flod.* — Floderus, Ali och M.  
*Flüg.* — J. Flügge.  
*Forb.* — J. Forbes.  
*Fors.* — J. H. af Forselles.  
*Fr.* — Elias Fries.  
*Frist.* — R. F. Fristedt.  
*Fröl.* — J. A. Frölich.  
*Fürr.* — A. E. Füllroth.

*Gärtn.* — J. Gärtner.  
*Gaud.* — J. Gaudin.  
*Gil. och Gilib.* — J. E. Gilibert.  
*Gm. och Gmel.* — Gmelin, J. G. och C. C.  
*Gochn.* — F. C. Gochnat.  
*Gold.* — Goldie.  
*Goldb.* — K. L. Goldbach.  
*Good.* — S. Goodenough.  
*Gorsk.* — Gorski.  
*Goss.* — C. A. Gosselman.  
*Gren. & Godr.* — M. Grenier & M. Godron.  
*Grev.* — R. K. Greville.  
*Griseb.* — A. Grisebach.  
*Gümb.* — Theod. Gumbel.  
*Günth.* — Chr. Günther.  
*Gunn.* — J. E. Gunner.  
*Guthn.* — Guthnick.  
*G. v. Ced.* — G. v. Cedervald.

*H. och Hedw.* — J. Hedwig.  
*Hall.* — A. v. Haller.  
*Hamm.* — O. Hammar.  
*Haw.* — A. H. Haworth.  
*Hay.* — F. G. Hayne.  
*Hell.* — F. X. Heller.  
*l'Her.* — l'Heritier.  
*Heynh.* — G. Heynhold.  
*Hitchc.* — E. Hitchcock.  
*Hn.* — Hartman, C. J. och C.  
*H.N.* — Herbarium Normale.  
*Hoffm.* — G. F. Hoffman.  
*Holmgr.* — Hj. Holmgren.  
*Hook.* — W. J. Hooker.  
*Hop.* — D. H. Hoppe.  
*Horn.* — J. W. Hornemann.  
*Hornsch.* — F. Hornschuch.

*Hüb.* — J. W. P. Hübener.  
*Huds.* — W. Hudson.

*J. och Juss.* — A. L. de Jussieu  
*Jacq.* — N. J. Jacquin.  
*Jens.* — Th. Jensen.  
*Jord.* — H. Jordan.  
*Jur.* — J. Juratzka.

*K.* — J. Koch.  
*Kaulf.* — G. F. Kaulfuss.  
*Kindb.* — N. C. Kindberg.  
*Kit.* — Waldstein och Kitaibel.  
*Kr.* — T. O. B. N. Krok.  
*Krock.* — A. J. Krock.  
*Kröningsv.* — C. G. Kröningsvärd.  
*Kühl.* — Köhlewien.  
*Kütz.* — F. T. Kützing.  
*Köl.* — G. L. Koeler.  
*Köll.* — J. L. Kölle.

*L. och Lin.* — Carl v. Linné.  
*L. d. y.* — C. Linné d. yngre.  
*Læst.* — Læstadius, L. L. och C. P.  
*Lagg.* — F. Lagger.  
*Lam.* — J. B. Monet de Lamarck.  
*Lap.* — Ph. Pic. Lapeyrouse.  
*Larss.* — L. M. Larsson.  
*Lax.* — E. Laxman.  
*Led.* — C. F. Ledebour.  
*Leffl.* — J. A. Leffler.  
*Lehm.* — J. G. C. Lehmann.  
*Lej.* — A. L. S. Lejeune.  
*Less.* — C. F. Lessing.  
*Leyss.* — F. W. v. Leysser.  
*Lge.* — J. Lange.  
*Lightf.* — J. Lightfoot.  
*Lilj.* — S. Liljeblad.  
*Lindb.* — S. O. Lindberg.  
*Lindbl.* — A. E. Lindblom.  
*Lindeb.* — C. J. Lindeberg.  
*Lindenb.* — J. B. Lindenbergh.  
*Lindgr.* — Sv. J. Lindgren.  
*Lindl.* — J. Lindley.  
*Lk.* — H. F. Link.  
*Loes.* — J. Loeselius.  
*Lois.* — J. L. A. Loiseleur Deslongchamps.  
*Lor.* — P. G. Lorentz.  
*Loud.* — J. C. Loudon.  
*Lundm.* — J. D. Lundmark.  
*Lönnr.* — K. J. Lönnroth.

*Mart.* — C. P. Martius.  
*MB.* — F. Marschall a Biberstein.  
*Med.* — F. C. Medicus.  
*Meisn.* — C. F. Meisner.  
*Menz.* — A. Menzies.  
*Mer.* — F. V. Méral.  
*Mert.* — F. C. Mertens.  
*Mey.* — Meyer, C. A. och E. H.  
*Mich.* — P. Micheli.

- Michx.* — F. A. Michaux.  
*Mielichh.* — Mielichhofer.  
*Mik.* — Mikan.  
*Mill.* — Ph. Miller.  
*Mill.* — W. Mitten.  
*M.K.* — Mertens & Koch.  
*Montag.* — B. Montagne.  
*Moris.* — R. Morison.  
*Mühl.* — H. Mühlenberg.  
*Müll.* — Müller, C. och O. F.  
*Murr.* — J. A. Murray.  
*Myr.* — C. G. Myrin.  
*Möhr.* — P. G. H. Möhring.
- Næg.* — Karl Nægeli.  
*Neck.* — N. J. de Necker.  
*N. v. Es.* — C. G. Nees von Esenbeck.  
*Nestl.* — C. G. Nestler.  
*Nordst.* — C. F. O. Nordstedt.  
*Norm.* — J. M. Norman.  
*Not.* — J. de Notaris.  
*Nutt.* — Th. Nuttall.  
*Nyl.* — F. Nylander.  
*Nym.* — C. F. Nyman.
- Ols.* — P. Olsson.  
*Osb.* — P. Osbeck.
- Pall.* — P. S. Pallas.  
*Panz.* — G. W. Panzer.  
*Parl.* — Fil. Parlatore.  
*Parn.* — R. Parnell.  
*P.B.* — Paliset de Beauvois.  
*P. Br.* — Patr. Browne.  
*Pers.* — C. H. Persoon.  
*Peterm.* — W. L. Petermann.  
*Pfeif.* — L. Pfeiffer.  
*Poir.* — J. L. M. Poirét.  
*Poll.* — J. A. Pollick.  
*Pourr.* — P. A. Pourret.
- Rabenh.* — L. Rabenhorst.  
*Reb.* — J. F. Rebentisch.  
*Reich.* — Reichenbach, H. G. L. och Gust.  
*Relh.* — R. Relhan.  
*Ren.* — F. Renealm.  
*Retz.* — A. J. Retzius.  
*R. Hn.* — R. Hartman.  
*Rich.* — L. C. Richard.  
*Rostk.* — F. G. Rostkov.  
*Rollb.* — Chr. Fr. Rottböll.  
*Roz.* — F. Rozier.  
*RS.* — Roemer & Schultes.  
*Rudb.* — O. Rudb.  
*Rupr.* — F. J. Ruprecht.  
*Röhl.* — J. C. Röhring.
- Salisb.* — R. A. Salisbury.  
*Saut.* — A. Sauter.  
*Schag.* — J. A. Schagerström.  
*Scheuchz.* — J. Scheuchzer.
- Sch. och Schimp.* — W. P. Schimper.  
*Sch. & Spenn.* — Schimper och F. K. L. Spenner.  
*Schied.* — C. J. W. Schiede.  
*Schk.* — Chr. Schkuhr.  
*Schlecht.* — D. v. Schlechtendal.  
*Schleich.* — J. G. Schleicher.  
*Schleid.* — M. J. Schleiden.  
*Schmid.* — C. C. Schmidt.  
*Schnitzl.* — Ad. Schnitzlein.  
*Schrad.* — H. A. Schrader.  
*Schreb.* — J. C. D. v. Schreber.  
*Schult.* — J. A. Schultes.  
*Schum.* — C. F. Schumacher.  
*Schwægr.* — F. Schwægrichen.  
*Schweig. & Körte.* — Schweiger & Körte.  
*Schwein.* — L. D. v. Schweinitz.  
*Scop.* — J. Scopoli.  
*Seid.* — T. Seidel.  
*Ser.* — N. C. Seringer.  
*Sibth.* — J. Sibthorp.  
*Sieb.* — F. W. Sieber.  
*Sill.* — O. L. Sillén.  
*Sjöstr.* — M. G. Sjöstrand.  
*SM.* — Sebastiani & Mauri.  
*Sm.* — Smith, Christ. och J. E.  
*Somst.* — S. C. Sommerfelt.  
*Sond.* — W. Sonder.  
*Spreng.* — Curt Sprengel.  
*Sternb.* — C. v. Sternberg.  
*Stev.* — C. Steven.  
*St. Hil.* — A. de St. Hilaire.  
*Sull. och Sulliv.* — W. S. Sullivant.  
*Sutt.* — C. Sutton.  
*Sw.* — O. Swartz.  
*Sv.B.* — Svensk Botanik.
- Tayl.* — Th. Taylor.  
*Ten.* — M. Tenore.  
*Thed.* — K. F. Thedenius.  
*Theor.* — G. R. A. Theorin.  
*Th. Fr.* — Th. M. Fries.  
*Thom.* — E. Thomas.  
*Thor.* — J. Thore.  
*Thuill.* — J. L. Thuillier.  
*Thunb.* — C. P. Thunberg.  
*Tourn.* — J. P. de Tournefort.  
*Tratt.* — L. Trattinick.  
*Trin.* — C. B. Trinius.  
*Turcz.* — N. Turczaninow.  
*Turn.* — Daws Turner.  
*Turr.* — A. Turra.
- Ust.* — P. Usteri.
- Vaill.* — Seb. Vaillant.  
*Vent.* — Etienne P. Ventenat.  
*Vill.* — D. Villars.  
*Viv.* — D. Viviani.
- Wahlb.* — P. F. Wahlberg.

*Wahlst.* — L. J. Wahlstedt.  
*Waldst.* — se *Kit*.  
*Wallm.* — J. H. Wallman.  
*Wallr.* — F. G. Wallroth.  
*Web.* — G. H. Weber.  
*Weig.* — C. E. Weigel.  
*Weih.* — A. Weihe.  
*Weis.* — F. W. Weiss.  
*Wend.* — G. F. W. Wenderoth.  
*Wendl.* — J. C. Wendland.  
*Wess.* — C. J. Wessén.  
*Westerl.* — C. A. Westerlund.  
*Wg.* — G. Wahlenberg.  
*Wib.* — Chr. Wibel.

*Wich.* — M. Wichura.  
*Wikstr.* — J. E. Wikström.  
*Willd.* — C. L. Willdenow.  
*Wils.* — W. Wilson.  
*Wimm.* — Fr. Wimmer.  
*Wistr.* — J. A. Wiström.  
*With.* — W. Withering.  
*Wm.* — se *Wikstr.*  
*WM.* — Weber & Mohr.  
*Wulf.* — Xav. v. Wulfen.  
*Zett.* — Zetterstedt, J. W. och J. E.  
*Ångstr.* — Joh. Ångström.

## Öfriga förkortningar och tecken. \*)

*a.* — allmän.  
*afd.* — afdelning.  
*auth.* — autentika exemplar.

*b. blr* — blå blommor.  
*Back.* — Backar.  
*Bergsr.* — Bergsrötter.  
*Betesm.* — Betesmarker.  
*bl.* — blad.  
*blomk.* — blomkorg.  
*blr* — blommor.  
*Blek.* — Blekinge.  
*Boh.* — Bohuslän.  
*br. blr* — bruna blommor.

*Dal.* — Dalarne.  
*Dik.* — Diken.

*enl.* — enligt.  
*ex.* — exemplar.

*f.* — figur. Då Herbarium normale (H.N.)  
 åberopas: fascikeln.

*f.* — såsom mått: fot.

*Fig.* — Figur.

*Finnm.* — Finnmarken.

*Fjv. eller Fjellv.* — Fjellväxt.

*Fukt.* — Fuktiga ställen.

*följ.* — följande.

*föreg.* — föregående. } (Art eller slägte.)

*förf.* — författaren.

*g. blr* — gula blommor.  
*Gestr.* — Gestrikland.  
*g.g.* — Gästgifvaregård.

*Gottl.* — Gotland.  
*gr. blr* — gröna blommor.  
*Gård.* — Gårdar och Byar.

*h.* — häfte.  
*Hafsstr.* — Hafsstränder.  
*Hall.* — Halland.  
*Hed.* — Hedar.  
*Helsl.* — Helsingland.  
*Herb.* — Herbarium.  
*Herjed.* — Herjedalen.  
*hv. blr* — hvita blommor.

*Jl. eller Jemtl.* — Jemtland.

*K:a* — Kyrka.  
*Källdr.* — Källdrag.

*Lerj.* — Lerjord.  
*lin.* — linier (längdmått).  
*Lpl.* — Lappland.  
*Lpm.* — Lappmark.  
*Lul.* — Luleå.

*Medelp.* — Medelpad.  
*mell.* — mellan, mellersta.  
*meränd.* — merändels.

*N.* — Norge.  
*n.* — norra.  
*n.* — nästan.  
*N. F.* — Naturliga familjen.  
*Ner.* — Nerike.  
*Nordl.* — Norska Nordlanden.  
*Norrl.* — Sv. Norrland.

\*) De förkortningar, som icke här upptagas, upplysas lätt af texten och sammanhanget.

odl. — odlad.  
omkr. — omkring.  
omv. — omvändt.  
Ost-Finnm. — Ost-Finnmarken.

qv. — kvarter (längdmått).

r. — rar.  
r. blr — röda blommor.  
Romsd. — Romsdalen.  
Rosl. — Roslagen.  
rödl. — rödlätta nära hvita blommor.

Sk. — Skåne.  
Skand. — Skandinavien.  
Smål. — Småland.  
sn — socken.  
st. — ställen.  
st. bland Norska växtställen — stift; t. ex.

Bergens stift.  
storl. — storlek.  
stränd. — stränder.  
Stånd. — Ståndare.  
Sv. — Svensk; Sverige.  
Södm. — Södermanland.

t. — (efter Fig.) tabell.  
t. — tum.  
Tellem. — Tellemarken.  
Trondhj. — Trondhjem.

Um. — Umeå.  
Uppl. — Uppland.  
utg. — utgifvaren.  
Ud. — Utländsk.

v. — vestra.  
vanl. — vanligtvis.  
Var. — Variation eller Varierar.  
Vatt. — Vatten.  
VB. — Vesterbotten (landskapet, icke länet).  
Verml. — Vermland.  
Vest-Finnm. — Vest-Finnmarken.  
Vestml. — Vestmanland.  
VG. — Vestergötland.  
viol. blr — violetta blommor.  
Våt. — Våta ställen.  
Väg. — vid vägar.

Åkerr. — Åkerrenar.  
Åkr. — Åkrar.  
Ångml. — Ångermanland.

Äng. — Ängar.

ö. — östra.  
öfr. — öfriga, öfrigt.  
ÖG. — Östergötland.  
Öl. — Öland.

⊙ — enårig rot.  
⋈ — tvåårig rot.  
24 — flerårig rot.  
t — träd eller buske.  
t 24 — småbuske, eller buskväxt närmande sig till ört.  
♂ — hanblomma eller hanväxt.  
♀ — honblomma eller honväxt.  
0 (noll) — utmärker, att delen saknas.

\* — i marginalen, framför artnamnet, att arten är funnen endast i Norge.

† — i marginalen, att växten ej är egentl. Skandinavisk, utan i nyare tider förvildad.

× — i marginalen, att växten är en hybriditet.

1, 2, 3 etc. efter varaktighetstecknet utmärker de månader, i hvilka växterna blomma; hos Kryptogamerna, när frukten mognar.

— (minus) — i diagnosen betecknar, att delens form varierar mellan de båda utmärkta extremerne; t. ex. äggrundt—aflånga; att delen stundom är äggrund, stundom aflång eller närmande sig den ena eller andra formen.

— vid växtställen, att örten blifvit funnen i och mellan de uppgifna orterna, hvarvid dessas ordning tillkännager den förmodade riktningen af växtens utbredning.\*) — Der detta tecken saknas, äro blott strödda ställen, der den träffas, bekanta.

\*) T. ex. *TILIA parvifolia* Ehrh. (Sk.—Ångml. Dal. Verml. Boh. etc.) d. v. s. Linden, såsom ett sydligt träd, upphör vid östra kusten i Ångermanland, inuti landet i Dalarna och Vermland att växa vild, samt går vid vestkusten upp i Bohuslän.

— *FAGUS sylvatica* L. (Sk.—ÖG. VG. Boh.) Boken sprider sig från Skåne, på östra sidan till ÖG., på vestra sidan till Bohus; längre nordligt saknas den.

— *CAREX globularis* L. (Lpl.—Gestr. Vestml. Nerike. Verml. Dalsl. VG. Smål.) Från sitt nordliga stamhåll sprider sig denna starr icke längre ned än till nämnda provinser.

# ÖFVERSIGT AF SLÄGTEN

ENLIGT DET LINNEISKA SEXUALSYSTEMET.

## 1 KLASSEN

### MONANDRIA.

#### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

- 1 **SALICORNIA.** Blommor *utan kalk*, hvarje inom ett grönt, köttigt skärmsfjäll, tillsammans bildande *en trind blomkolf*. Ståndare 1—2. Märke 2—*flerklufvet*. Frukt: fröblåsa. *Köttig, ledad, bladlös hafstrandväxt*. — Pag. 185.
- 2 **HIPPURIS.** Blomhülle bildande *en omärklig kant* på fruktämnets topp. Ståndare fästade på fruktämnets. Märke *enkelt*. Frukt: enfröig nöt. *Vallenväxt med kransvisa blad*. — Pag. 143.
- 3 **ZOSTERA.** Ståndare och pistiller fästade skiftevis bredvid hvarandra på en fri, platt och jemnbred *blomkolf*, inom *ett slidlikt hölster*, täckta af 2 klaffar längs öfre bladytan. Märke *2deladt*. Frukt *nöttlik*. *Gräslika hafsväxter*. — Pag. 229.  
(*Alchemilla Aphanes* 4, 1.)

#### 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

(*Blitum virgat.* och *capit.* 5, 2. *Callitriche* 21, 1.)

## 2 KLASSEN

# DIANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1. \*)

† Blommor utan hylle, inom en öppning i den bladlika stammens [stambladets] kant.

- 4 LEMNA. Stånd. 2, stund. 1. Frukt enfröig nöt ell. enrummigt, fåfröigt fröhus. *Små rundade ell. lancettlika, platta och bladlika, vanl. flytande växter med trådlika rötter hängande i vattnet.* — Pag. 223.

†† Hylle dubbelt, af foder och sambladig krona. Fruktämne 1.

\* Buskar, med regelbunden krona.

- 5 SYRINGA. Blomsfoder otydligt, 4tandadt. Krona trattlik, likformigt 4klufven. Ståndknappar *inneslutna* i kronpipen. Fr. 2rummigt, 2fröigt fröhus. *Buske med motsatta blad.* — Pag. 56.

- 6 LIGUSTRUM. Foder och krona som hos föreg. Ståndknappar *utskjutande*. Frukt: 2rummigt, fåfröigt bär. *Buske som föreg.* — Pag. 56.

\*\* Örter, med oregelbunden krona.

- 7 VERONICA. Foder 4deladt. Krona *hjul-* ell. *något trattformig*, med 4, olikformigaflikar. Fr. 2rummigt fröhus. *Örter med mest motsatta blad.* — Pag. 62.

- 8 PINGUICULA. Foder 5deladt. Krona *läppformig gapande*, med sporre. Stift *omärkligt*. Fröih. enrummigt, öppnande sig i toppen. *Blad endast vid roten, och ensamma skaftade blr.* — Pag. 70.

- 9 UTRICULARIA. Fod. 2bladigt. Krona *läppformig maskerad*, nedre läppen huflik, med sporre. Stift *utdraget*. Fröih. enrummigt, omkringskuret. *Vallenväxter med findelade blad; blr i klase.* — Pag. 69.

††† Hylle som i föreg. afd. Fruktämnen, slutl. smånötter, 4.

- 10 LYCOPUS. Foder 5flikigt. Krona *trattlik*, 4klufven, med en större, urnupen flik. *Strandväxt med motsatta, n. parklufna blad, kransvisa blr.* — Pag. 49.

\*) Till andra klasser hörande växter med 2 ståndare äro: *Salicornia* 1, 1; *Cladium* och *Rhynchospora alba* 3, 1; *Senebiera didyma* och *Lepidium rud.* 16, 1; *Cypripedium* 20, 2; *Fragaria* 23, 2.



- ✓ 11 **SALVIA**. Fod. 2läppigt. Krons 2läppig; öfre läppen hvalflik, hoptryckt. *Blad motsatta, blr kransvisa i toppen.* — Pag. 49.
- ++++ Hylle dubb., af foder och fribladig krona.
- 12 **CIRCÆA**. Foder och krona 2bladiga; kronbl. 2delade. Frukt 2rumm. fröhus. *Lundvaxter med motsatta blad, blr i klase.* — Pag. 142.

2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

(*Coleanthus* och *Anthoxanthum* 3, 2.)

---

### 3 KLASSEN

## TRIANDRIA.

#### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Örter.

\* Hylle dubbelt, af foder och sambladig krona.

13 VALERIANA. Blomfoder bildande ett ringformigt bräm ofvanpå fruktämnet. Blomkrona trattlik, *olikformigt* 5klufven. Fr. nötluk, beklädd med det slutl. i *fjunlika strålar* upplösta blomfodret. *Växter med motsatta, mest parbladigt delade blad.* — Pag. 36.

14 VALERIANELLA. Foder med intet eller tandlikt bräm. Krona trattlik, *likformigt* 5klufven. Frukt: nötluk, *utan fjun. Blad motsatta hela.* — Pag. 37.

\*\* Hylle en enkel kronlik kalk.

15 IRIS. Blomkalk 6delad, med kort pip; *de yttre flikarne stora, tillbakaböjda, de inre uppräta. Stift kort. Märken kronbladslika. Fröhus 3rummigt. Växter med svärdlika omslidande blad, stora liljelika blr.* — Pag. 208.

16 CROCUS. Kalk 6klufven, med *mycket lång* pip och *likformiga* flikar. Stift *utdraget*. Märken uppåt vidgade tandade eller flikiga. Fröh. 3rumm. *Lökväxter.* — Pag. 209.

(*Montia och Koenigia* 3, 3. *Asperula tinct. Galium trifid. o. Alchem. Aphanes* 4, 1. *Empetrum* 22, 3.)

†† Halfgräs med ax ell. småax af tegellagda skärmfjäll.

\* Småax plattade, af 2radigt tegellagda skärmfjäll.

17 CYPERUS. Skärmfjäll *talrika* (16—24), i 2 *tydligt skiljda* rader, de 2—3 nedersta tomma. — Pag. 231.

18 SCHOENUS. Skärmfjäll *färre* (8—10), *de motsittande omslutande hvarandra* med kanterna, de 3—6 nedre tomma. — Pag. 231.

\*\* Ax eller småax trinda af rundtom tegel-lagda fjäll.

a — Kalkborst slutl. långa, släta.

19 ERIOPHORUM. Skärmfjäll *likformiga*. Kalkborst vid hvarje nöt *talrika*, slutligen utväxande till *mycket långa, ull-lika* hår. *Axen snart hvita af de ofta tumslånga håren.* — Pag. 234.

20 TRICHOPHORUM. Det *nedersta* skärmfjället *förlängdt med en grof och trubbig udd af axels längd*. Kalkborst vid hvarje nöt 4—6, *längre än nöten ell. axen. Strån tall tufvade, nedtill fjälliga, öfversta fjället med ett syl-lik bladämne.* — Pag. 234.

b — Kalkborst korta, sträfvä ell. 0.

- 21 CLADIUM. De nedre 3—4 skärmfjällen *smärre* och *tomma*. Kalkborst 0. Ståndare 2. Nöten inom ett yttre, bräckligt skal. *Blad taggsågade*. — Pag. 231.
- 22 RHYNCHOSPORA. Skärmfjäll *som hos föreg.* Nöt *omgifven af* korta, sträfvä borst och upptill med *bihang af* stiftets qvarsittande bas. *Spensligt bladigt strå*. — Pag. 231.
- 23 HELEOCHARIS. Könlösa skärmfjäll 0, ell. 1—2, *större* än de öfr. Nöt och borst *som hos föreg.* Strån *bladlösa med ett ensamt ax i toppen*. — Pag. 233.
- 24 SCIRPUS. Skärmfjäll *som hos föreg.* Borst 0, eller korta och sträfvä. Nöt *utan* bihang. *Strå dels bladlöst, dels bladigt, dels en-, dels fleraxigt*. — Pag. 232.  
(*Juncus conglom., effusus och supinus* 6, 1.)

+++ Gräs, med blr utan skärmfjäll.

- 25 NARDUS. Småax af 2 blomfjäll, ordnade till ett smalt, ensidigt ax. *Gräs med borstlika blad och bladlöst strå från rotstocken*. — Pag. 277.

## 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

† Småax i öppen eller axlikt hopdragen vippa, enblommiga.

\* Småax utan skärmfjäll.

- 26 COLEANTHUS. Blomfjäll 2, det yttre med borst i spetsen, det inre 2köladt och urnupet mellan de 2 utlöpande sträfvä nerverna. Ståndare 2. Hinnfrukt fri, längre än blomfjällen. — Pag. 275.

\*\* Småax med 2 skärmfjäll; pist:s märken utskjutande vid blomfj:s spets.

- 27 PHLEUM. Skärmfjäll *fria*, liklånga, båda med borstlikt utdragen ryggnerf; blomfjäll 2, *utan* borst. *Något styfva gräs med cylindrisk, axlikt hopdragen vippa*. — Pag. 276.
- 28 ALOPECURUS. Skärmfjäll *nedtill hopväxta, utan* borst; blomfjäll ett enda, försedt med ryggborst. *Mjukare gräs än föregående, med likadan vippa*. — Pag. 276.
- 29 BALDINGERA. Skärmfjäll *fria*, kölade, *utan* borst; blomfjäll 2, *utan* borst, med små pensel-lika bifjäll [felslagna blr] vid basen. *Strandgräs med tätblommig vippa*. — Pag. 277.

\*\*\* Småax med 2, n. lika långa skärmfj.; pist:s märken utböjda vid blomfj:s bas.

a — Blomfjällen vid basen omgifna af långa hår.

- 30 PSAMMA. Både skärm- och blomfjäll *fasta*; det yttre blomfj. med en omärklig styf borst i spetsen. *Sandgräs med ax- eller lancettlik tät vippa*. — Pag. 270.
- 31 CALAMAGROSTIS. Blomfjäll *hinnaktiga*, det yttre med hårfin borst. *Blomn. mer och mindre utbredd vippa*. — Pag. 271.

b — Blomfj. utan omgifvande hår.

- 32 MILIUM. Skärmfj. med *rundad* rygg; det yttre blomfj. *konvext*, uppblåst, af fast [icke hinnaktig] beskaffenhet, *utan* borst. *Lundgräs med mycket gles vippa*. — Pag. 274.

- ✓ 33 CINNA. Skärm- och blomfjäll *örtartade* [gröna], med *hväss* rygg; de förra något längre; yttre blomfjället med kort, rak borst. *Stort och bredbladigt lundgräs med gröna småax*. — Pag. 274;

- 34 AGROSTIS. Skärmfjäll *köladt rännformiga*; blomfjäll 1, eller 2, olikstora, *hinnaktiga* [n. hvita]. *Småax än med, än utan borst*. — Pag. 273.

\*\*\*\* Skärmfjäll betydligt oliklånga; märken som i föreg. afd.

- 35 APERA. Småax med ett borstlikt ämne till en andra blomma. Skärmfj. utan borst. Blomfjäll *örtartade* [gröna], det yttre med lång *hårlik* borst tätt under spetsen. *Skärm- och blomfjäll af lika beskaffenhet*. — Pag. 273.

- 36 STIPA. Småax utan ämne till en andra blomma. Skärmfjäll borstuddiga; yttre blomfjället stult. styft, med styf, ledad och vriden borst. *Borstén n. quarterslång.* — Pag. 274.

(*Melica unifl.*, *Anthoxanthum*, *Catabrosa*, *Colpodium*.)

†† Småax i öppen eller axlik vippa, flerblommiga.

\* Småax med antingen könlösa eller enkönade blr jemte de 2-könade.

a — Pist:s märken utskjut. vid blomfj:s spets; småax 2blommiga.

- 37 SETARIA. Småax omgifna af hårlika svepeborst och förenade i en enda, tät trind axlik vippa. Skärmfj. oliklånga. Nedre blomman könlös, af hinnaktiga fjäll; den öfre af 2 läderaktiga fjäll. 2könad. — Pag. 275.

- 38 PANICUM. Småax utan svepeborst, bildande flere smala ax förenade i vippa. Skärmfjäll 2, olikstora, det inre af småaxets längd, 5nervigt med en kort borst ell. udd; yttre blomfj. nervigt, med krökt borst; för öfr. som föreg. — Pag. 275.

- 39 DIGITARIA. Småax utan svepeborst, bildande flere smala ensidiga ax, samlade n. i sock ell. qvast. Skärmfj. olikstora, det yttre litet ell. felsläende, det inre kortare än småaxet, 3nervigt, borstlöst; alla blomfj. borstlösa; för öfr. som föreg. — Pag. 275.

b — Pist:s märken som i afd. a —; småax 3blommiga.

- 40 ANTHOXANTHUM. Det inre skärmfjället dubbelt längre än det yttre. Mellersta blomman liten 2könad, utan borst; sidoblarna af ett fjäll, könlösa, borstbärande. *Vippan smal, n. axlik.* — Pag. 277.

- 41 HIEROCHLOA. Skärmfj. liklånga. Den mellersta blomman 2könad, sidoblarna hanbl. Skärm- och blomfjäll hinnspletsade. — Pag. 277.

c — Pist:s märken utböjda vid blomfj:s bas.

- 42 PHRAGMITES. Småax mångblommiga. Skärmfjäll olikstora, kölade. De öfre blarna omgifna af hår, 2könade, den nedersta tom ell. med blott ståndare, hårlös. Blomfj. utan borst. *Mycket högt och bredbladigt vattengräs med brun vippa.* — Pag. 270.

- 43 MELICA. Småax 1—2blommiga, med ett klubblikt ämne, i förra fallet till en andra — i sednare till en 3:dje blomma. Skärmfj. olikstora, trindryggade. Blomfj. utan borst. — Pag. 270.

- 44 HOLCUS. Småax 2blomm. Skärmfj. olikstora, kölade. Den öfre blomman med endast ståndare, och yttre fjället borstbärande; den nedre 2könad, utan borst. *Mjuka gräs.* — Pag. 270.

(*Avena elatior*, *Molinia*.)

\*\* Alla blr 2könade med tydlig borst [undant. *Avena elat.*, som vanl. har en hanblomma; ett par *Festucæ* utan borst].

a — Skärmfj. af nedersta blommans längd ell. längre; yttre blomfj. i spetsen 2klufvet.

- 45 AVENA. Skärmfj. trindryggade. Yttre blomfjället mer än 5nervigt, med krökt ryggborst. *Vippan ubredd, stund. smal ell. axlik, af stora småax.* — Pag. 267.

- 46 TRisetum. Skärmfj. kölade. Yttre blomfj. högst 5nervigt, med ryggborst vid ell. ofvan midten. — Pag. 268.

- 47 AIROPSIS. Skärmfj. trindryggade. Yttre blomfj. som hos föreg., med ryggborst nedom midten. Småax knappt linjelånga. — Pag. 268.

b — Skärmfj. som i afd. a —; yttre blomfj. icke 2klufvet.

- 48 CORYNEPHORUS. Småax 2blommiga. Skärmfjäll n. liklånga, längre än blarna; yttre blomfj. med en på midten liksom skarvad, mot spetsen tjockare, trubbig ryggborst. *Tufsadt sandgräs med vid basen håriga blr.* — Pag. 268.

- 49 VAHLODEA. Småax och skärmfj. som hos föreg. Yttre blomfjället styft brosk-

*artadt*, med *grof, fänspsad* ryggborst. Blrna vid basen omgifna af hår. *Plattbladigt fjellgräs med slak, brun vippa*. — Pag. 269.

- 50 AIRA. Småax 2—3blommiga. Skärmsf. som hos föreg. Blomsf. *tunna hinnaktiga*, det yttre med hel ell. fintandad spets, *hårfin* ryggborst. *Mest smalbladiga gräs*. — Pag. 269.

c — Skärmsf. alltid kortare än den närmaste blomman; yttre blomsf. hvassköladt.

- 51 DACTYLIS. Småax 3—7blommiga. Skärmsf. *mycket* olikstora; yttre blomsf. *5nervigt*, med kort borst i *spetsen*, inre fjället 2uddigt. *Fruktämne glatt*. — Pag. 258.

- 52 SCHEDONORUS. Småax 5—12blommiga. Skärmsf. *föga* olikstora; yttre blomsf. *mångnervigt*, med borst tätt *nedom* spetsen. *Främne hårigt. Vanligen med lufande eller slak vippa*. — Pag. 260.

d — Skärmsf. som i afd. c —; yttre blomsf. trindryggadt.

- 53 FESTUCA. Skärmsf. *1—3nerviga*, det yttre *åtm. hälften* så långt som det inre. Yttre blomsf. med borst i *spetsen* [sällan utan]; det inre 2flikigt. [Blr 3—15.] *Vanl. med upprät vippa*. — Pag. 259.

- ✓ 54 VULPIA. Skärmsf. *som hos föreg.*, det yttre 2 *ell. flere* gånger kortare än det inre. Yttre blomsf. med lång borst i *spetsen*. [Blr omkr. 6.] *Vippan smal*. — Pag. 260.

- 55 BROMUS. Skärmsf. *3—mångnerviga*; yttre blomsf. med borst *nedom* spetsen. [Blr 5—15.] *Småax teml. stora*. — Pag. 261.

(*Triodia, Koeleria* i nästa afd.)

\*\*\* Alla blr 2könade [undant. *Molinia*, som har en könlös blomma], med ingen ell. omärklig borst.

a — Skärmsf. längre än de nedre blrna i småaxet.

- 56 TRIODIA. Skärmsfjäll af småaxets längd, *trindryggadt*; yttre blomsfjället *urnupet*, med en trubbig tand i urskärningen, utan borst, samt med 2 hårpenslar vid basen. *Nedliggande med smal klaselik vippa af 5—8 korta och tjocka småax*. — Pag. 267.

- 57 FLUMINIA. Skärmsf. olikstora, något kortare än småaxet, *kölade*; yttre blomsf. i spetsen *sargtandadt*, utan borst, med 2 hårpenslar vid basen. *Stort rörligt vatten-gräs*. — Pag. 267.

- ✓ 58 KOELERIA. Skärmsf. *som hos föreg.*; yttre blomsf. i spetsen *helt*, med omärklig borst; det inre 2flikigt, med 2, stråva nerver. [Blr 2—4.] *Sandgräs, med smal, före och efter blomn. sammandragen axlik vippa*. — Pag. 267.

b — Skärmsf. kortare än de nedre blrna, olika stora.

- 59 MOLINIA. Skärmsf. *spetsiga hela*, med vanl. 3 kägellikå åtskiljda blr, den öfversta meränd. smalare, könlös och lätt affallande; yttre blomsf. trindryggadt, *otydligt 3nervigt*, med trubbad, *icke* hinnaktig spets. — Pag. 266.

- 60 COLPODIUM. Skärmsf. *som hos föreg.*, med 1—2, något skiljda aflånga blr; yttre blomsf. trindryggadt, *otyd.* *3nervigt*, med trubbig *hinnaktig* spets. *Styft, bredbladigt fjellgräs, med smal, vanl. brun vippa*. — Pag. 266.

- 61 CATABROSA. Skärmsf. med trubbad ell. *sargad* spets; blr 1—2 [säll. 3] åtskiljda, aflånga; yttre blomsf. trindryggadt, *3nervigt*, med sargad ell. snedt afskuren *hinnaktig* spets. *Mjuka, rent gröna, i förh. till storleken bredbladiga gräs*. — Pag. 266.

- 62 GLYCERIA. Skärmsf. *som hos föreg.*, det yttre 1-, det inre 3nervigt; blr 2—13, utan hår vid basen åtskiljda, aflånga, alla fruktsamma; yttre blomsf. trindryggadt, *5—mångnervigt*, för öfr. *som föreg.* *Vatten- och strandgräs med vippa af glerblommiga småax*. — Pag. 265.

c — Skärmsf. som i afd. b —, men n. lika stora [undant. *Poa annua*].

- 63 ARCTOPHILA. Skärmsf. *trindryggadt*, med trubbad spets, det yttre 3-, det inre

5nervigt; blr 3—6, vid basen omgifna af styfva hår, åtskiljda; yttre blomfj. *trindryggadt*, n. 1nervigt, med *afrundad* spets. *Stort strandgräs*, med *långa slaka*, *hårfin* vippgrenar. — Pag. 264.

64 BRIZA. Skärmsf. *trindryggade*, hvällda, bredare mot den rundade spetsen, mångblommiga; yttre blomfj. *trindryggadt*, hvälldt, otydligt nervigt, *trubbigt* med hjertlik bas. *Småaxen gles* sittande, vanl. hängande, n. hjertlika. — Pag. 262.

65 POA. Skärmsf. *kölade spetsiga*, med 2—många tätt sittande äggrunda blr; yttre blomfj. *köldadt, spetsigt*. — Pag. 262.

(*Schedonorus, Festuca, Bromus secal.*)

+++ Småax med svepe, gytttrade i axlik vippa, flerblommiga.

66 SESLERIA. Småax i *rund* ell. *oval*, tät vippa, med *svepe* af *tomma odelade fjäll* vid basen. Skärmsf. sylspetsade, 2—3blommiga; yttre blomfj. i spetsen försedt med *flere* korta borst, af hvilka ryggnervens är störst. — Pag. 275.

67 CYNOSURUS. Vippa tät, *ensidig*, af småax parvis förenade inom ett *pardeladt svepe*. Skärmsf. sylspetsade, 2—5blomm. Yttre blomfj. sylspetsadt. — Pag. 258.

(*Setaria.*)

++++ Ledadt ax.

\* Småax en-, högst 2blommiga.

68 LEPTURUS. Ax smalt, n. syl-~~h~~kt, med *ensamma* enblommiga småax, insänkta i hålor på axfästet. Skärmsf. 2, *sittande i bredd* och betäckande det *borslösa* blomfj. — Pag. 257.

69 HORDEUM. Småax 3 *tillsamman* i hvarje ax-led, enblommiga; det mellersta 2-könadt, de 2 på sidorna vanl. hanbl. Skärmsf. 2, långspetsade; yttre blomfj. *långt borspjetsadt*. — Pag. 257.

70 ELYMUS. Småax 2—4 i hvarje axled, 2blomm., ell. *enblommiga med ett qvar-sittande skaf*t till andra blomman. Skärmsf. 2, spetsade eller borstbärande, sittande båda på *yttre sidan* af småaxen. Yttre blomfj. med ell. utan borst. — Pag. 257.

\*\* Småax minst 3blommiga.

71 LOLIUM. Ax platt, 2sidigt, af 3—mångblomm. småax utan skaf, ett i hvarje axled, *vändande kanten* [ej sidan] till det gemensamma *fästet*. Skärmsfjäll *ett enda*, vid *småaxens yttre kant*. — Pag. 257.

72 BRACHYPODIUM. Småax mångblomm., ett i hvarje axled, *med kort skaf*t. Skärmsf. 2, *olikstora*; yttre blomfj. borstspetsadt. *Spenstiga gräs med smalt gles* ax. — Pag. 258.

73 TRITICUM. Småax som hos föreg., utan skaf. Skärmsf. 2, *olikstora*, likformiga med yttre blomfjället [neml. i toppen kort borstbärande eller ej, efter som detta har borst eller icke]. *Temligen höga gräs med mer och mindre gles, 2sidigt ax af plattade småax*. — Pag. 255.

(*Alchemilla Aphanes* 4, 1. *Chenopod. polysperm.* 5, 2.)

### 3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

74 KOENIGIA. Blomkalk *enkel kronlik*, djupt 3delad. Frukt: en af kalken innesluten nöt. — Pag. 178.

75 MONTIA. Blomfoder *2bladigt*. Krona *sambladig* trätlik, på en sida delad till basen med 5flikigt bräm. Fröhus 3skaligt, 3fröigt. — Pag. 173.

76 HOLOSTEUM. Foder *5deladt*. Kronbl. 5, *fria*, tandade. Stånd. 3—5. Fröh. i toppen 6tandadt, mångfröigt. *Blåaktig värt med motsatta blad*. — Pag. 128.

(*Elatine* 8, 4. *Stellaria media* 10, 3.)

## 4 KLASSEN

## TETRANDRIA.

## 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Blomkorg af talrika små blr gyttrade på ett gemensamt fäste inom en flerbladig holk.

\* Frukstens topp naken [utan fruktkrona].

77 GLOBULARIA. Holkfjäll tegel-lagda. Blomfäste fjälligt. Blomfoder bågarlikt, inneslutande nöten. Blomkrona 2läppig flerklufven. *Blad hela skiftevisa*. — Pag. 73.

\*\* Frukstens topp med borstlik ell. hinnaktig fruktkrona.

78 TRICHERA. Holkfj. i en n. dubbel krans. Blomfäste konvext, hårigt. Krona 4-klufven. Skalfr. omkring toppen omärkligt hinnkantade samt derinom med en *mångstrålig* fruktkrona. *Stjelkblad motsatta; blomk. plattad*. — Pag. 35.

79 SUCCISA. Holk tegel-lagd. Fäste *kägellikt, fjälligt*. Krona 4klufven. Skalfr. med *5flikig* toppkant, *5strålig* fruktkrona. *Bladen motsatta hela, blomk. klotrund*. — Pag. 35.

80 SCABIOSA. Holk n. enkel. Fäste *kägel-likt*, beklädt med *borslika fjäll*. Krona 5klufven. Skalfr. med *odelad* hinnkant omkring toppen, fruktkrona *5strålig*. — Pag. 36.

81 DIPSACUS. Holk tegel-lagd. Fäste *kägel-likt*, med *smala styfva stickande fjäll*. Krona 4klufven. Skalfr. 4hörniga, med *omärkl.* hinnkant på toppen samt en *hinnaktig*, affallande fruktkrona. *Blomkorg vid mognaden taggig*. — Pag. 35.

†† Blr utan holk; fruktämne inom det sambladiga, mer och mindre djuptflikade blomhylllet.

\* Blomhylle dubbelt, af foder och krona.

82 PLANTAGO. Blr i *ax*. Foder 4deladt. Blomkrona trattlik 4klufven, *mycket kortare* än de långa ståndarne. Fukt: omkringskuret fröhus. *Örter med enkla blad [hos oss] endast vid roten*. — Pag. 73.

83 CENTUNCULUS. Blr *enstaka*. Foder 4—5klufvet. Krona klocklik 4—5klufven, *längre* än de inneslutna ståndarne. Fukt som hos föreg. *Mycket liten ört, med enkla blad*. — Pag. 71.

(*Gentianæ* 5, 1. *Mentha* 14, 1. *Limosella* 14, 2. *Litorella* 21, 4.)

\*\* Blomhylle enkel kalk.

84 SANGUISORBA. Blr i *rundadt ax*. Blomkalk *kronlik* med 4deladt bräm, pipen slutl. tillhårdnande och inneslutande en *karpell*. *Ört med skiftevisa parbladiga blad*. — Pag. 148.

- 85 **ALCHEMILLA.** Blr i knippe. Kalk foderlik 8klufven, hvarannan slik mindre, stund. omärkl. Stift utgående n. från fruktämnets bas. Frukt: 1—2 karpeller. Örter med rundade stikiga ell. delade blad, små gytttrade blr. — Pag. 148.
- 86 **MAJANTHEMUM.** Blr i klase. Kalk kronlik, hjulformig 4delad, med tillbakaböjda sikar. Frukt 2rummigt bär. Enkel ört med hjertlika blad. — Pag. 215.  
(*Thesium* 5, 1. *Ulmus* 5, 2.)

+++ Blomkrona sambladig 4- säll. 3klufven ell. delad, fästad ofvanpå fruktämnet. Örter med 4—10 blad i krans.

- 87 **SHERARDIA.** Blomkrona trattlik, med tydlig pip, 4deladt bräm. Frukt: 2 sammanhängande småfrukter, hvarje med 3tandad topp. Blr utan skaft, inom samväxta svepeblad. — Pag. 37.
- 88 **ASPERULA.** Krona som hos föreg. 3—4flikig. Småfr. som hos föreg. med otandad topp. Blr kort skaftade, utan svepe. — Pag. 37.
- 89 **GALIAM.** Krona hjulformig, utan märklig pip, 3—4klufven ell. delad. Småfr. som hos föreg. — Pag. 38.

++++ Blomkrona fribladig.

- 90 **CORNUS.** Blomfoder 4tandadt, ofvanpå fruktämnet. Kronblad 4. Frukt: 2rummig stenfrukt. Blad motsatta hela. — Pag. 76.  
(*Rhamnus* och *Evonymus* 5, 1. *Senebiera didyma* och *Draba muralis* 15, 1. *Cardamine hirsuta* 15, 2.)

## 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

(*Alchemilla Aphanes* och *Galium* 4, 1. *Gentiana* 5, 1. *Ulmus* och *Cuscuta* 5, 2. *Chrysosplen. tetrandr.* 8, 2.)

## 3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3 eller flere.

+ Blomhülle dubbelt.

- 91 **ILEX.** Blomfoder 4tandadt. Krona hjulformig, 4delad. Pist. med 3—4 märken utan stift. Bärlik stenfrukt med 3—4 nötliska frön. Buske ell. litet träd med läderaktiga, i kanten tornlaggiga blad. — Pag. 76.
- 92 **RADIOLA.** Foder n. 4deladt, hvarje del 2—3flikig. Krona 4bladig. Fruktämne ensamt, med 4 stift, slutl. 8rummigt fröhus. Mycket liten klynnedelad ört. — Pag. 116.
- 93 **BULLIARDA.** Fod. 4klufvet. Krona 4bladig. Fruktämnen 4, utan stift, slutligen lika många, flerfröiga småfrukter. Liten strandört med motsatta blad. — Pag. 140.
- ++ Blomhülle enkel foderlik kalk ell. 0.
- 94 **POTAMOGETON.** Blomkalk 4bladig. Fruktämnen 4, utan stift, slutl. 4 med en läderaktig hud beklädda, oskaftade nötter. Vattenväxter med enkla blad. — Pag. 224.
- 95 **RUPPIA.** Blomkalk 0. Ståndarknappar utan strängar, fästade 2 och 2 på ett litet fjäll omkring axfästet. Pist. 3—7, slutl. lika många vanl. långt skaftade nötter. Sallsjöväxter med trådmala blad. — Pag. 228.  
(*Cerastium tetrandr.* och *semidecandr.* *Saginæ* 10, 5.)



## 5 KLASSEN

# PENTANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Blomhülle enkel kalk.

96 GLAUX. Blomkalk *klocklik* 5klufven färgad. Frukt inom kalken, enrummigt, 5-väggigt *fröhus*. *Liten strandört med motsatta hela blad*. — Pag. 71.

97 THESIUM. Kalk *trattlik* 4—5klufven. Frukt ett enda frö inom kalkens *tjnnhårdnade*, *nötlila* bas. *Ört med skiftevisa smala blad*. — *Den Svenska arten med 4-klufven kalk och 4 ståndare*. — Pag. 179.

(*Ulmus* 5, 2.)

†† Hülle dubbelt, af foder och sambladig krona.

\* Fruktämnen, sedan smånötter, 4 i kronans botten. *Örter med strödda hela blad*.

a — Kronans svalg bart [utan knölar ell. fjäll]; smånötter släta.

98 ECHIUM. Blomfoder *5deladt*. Krona n. *klocklik*, med *olikformigt* 5klufvet bräm. Smånötter *benhårda*. *Blr i sammansatt ax*. — Pag. 46.

99 LITHOSPERMUM. Blomfoder n. *5deladt*. Krona *trattlik*, *likformigt* 5klufven. Smånött. *benhårda*. *Något stråfva växter med lancellika blad*. — Pag. 46.

✓ 100 STENHAMMARIA. Foder och krona *som hos föreg.* Smånött, med *tunnt hinnaktigt* skal. *Glatt strandväxt med breda blad*. — Pag. 46.

101 PULMONARIA. Foder n. *cyindriskt*, 5kantigt, *5flikigt*. Krona *som hos föreg.*, med konkavt bräm. Smånött. *glatta*. *Något stråfhåriga lundväxter*. — Pag. 46.

b — Kronans svalg tillslutet af knölar ell. fjäll; smånött. taggiga.

102 CYNOGLOSSUM. Foder n. *likformigt* 5klufvet. Krona *trattlik*; svalget slutet af *hvalfika knölar*. Smånött. *nedplättade*, *öfverallt taggiga*. *Uppå till gråaktigt sammetshårig ört*. — Pag. 47.

103 ECHINOSPERMUM. Foder och krona *som hos föreg.*; pipen n. *tillsluten* med *fjäll*. Smånött. *3kantiga*, *i kanterna taggiga*. *Något styfva och stråfhåriga växter*. — Pag. 47.

c — Kronans svalg *som i afd. b* —; smånött. släta.

104 SYMPHYTUM. Foder *likformigt* 5deladt. Krona *bägarlik*, med svalget slutet af *långa fjäll*. Smånött. *fästade medelst ett hål vid basen*. *Stråfva bredbladiga växter*. — Pag. 44.

105 ANCHUSA. Foder *som hos föreg.* Krona *trattlik*, med konkavt bräm och rak

pip; svalg. tillslutet med hvalfika *knölar*. Smånött. *kantiga*, fästade medelst ett hål vid basen. *Något stor och sträf ört.* — Pag. 44.

106 LYCOPSIS. Kronpipen *krökt*; för öfr. som föreg. *Mycket sträfhårig åkervväxt.* — Pag. 45.

107 MYOSOTIS. Foder *som hos föreg.* Krons *hjulformig* ell. trätlik; svalget *som hos föreg.* Smånött. *plattade*, fästade med basen vid ett *platt* fäste. — Pag. 45.

108 ASPERUGO. Foder slut. *olikformigt* klufvet och *platt hoptryckt*. Krons *trätlik*; svalget *som hos föreg.* Smånött. *plattade*, fästade med sin öfre del vid ett *pelartlik* fäste. *Slak snärjande ört, med fodret plattadt likt en gåsot omkr. smånöterna.* — Pag. 47.

\*\* Fruktämne ett enda, inom kronan, enrummigt.

a — Pistillens märke enkelt. Fröhus med centralt fröfäste.

α — Med bladig stjelk.

109 ANAGALLIS. Blomkrons *platt, hjulformigt 5delad*. Märke klotrundt. Fröhus *kringskuret*. *Grenig ört med hela blad.* — Pag. 71.

110 LYSIMACHIA. Krons *klock-* ell. *hjulformig*, djupt *5klufven*. Ståndarsträngar vid basen *samväxta*. Märke söga vidgad, tvärhugget. Fröh. *5- ell. 10väggigt*. *Örter med motsatta eller kransvisa blad.* — Pag. 70.

111 NAUMBURGIA. Foder och krons meränd, djupt *6delade*, *bägarlika*. Stånd. vanl. *6, fria*, fästade på kronans bas. Märke och fröhus *som hos föreg.* *Vallenväxt med motsatta blad.* — Pag. 71.

β — Med bladen i rosett nedtill, och bladlös stängel.

112 HOTTONIA. Foder *5deladt*. Krons *fallik*, med *5deladt* bräm. Stånd. fästade i svalget. Märke klotrundt. Fröh. *afallande öppnad*. *Vallenväxt med kammflikade blad.* — Pag. 72.

113 ANDROSACE. Fod. *5standadt*. Krons *trätlik*, med n. *äggformig*, *upptill sammandragen* pip, inneslutande ståndarne. Märke klotr. Fröh. *5väggigt*. *Ört med blr i flock.* — Pag. 72.

114 PRIMULA. Fod. *som hos föreg.* Kr. *tratt-* eller *fallik*, med *smal*, *öppen* pip, inneslut. ståndarne. Märke klotr. Fröh. *5- ell. 10väggigt*. *Örter med blr i flock.* — Pag. 71.

b — Märke 2klufvet. Fröhus med fröfasten på väggarna.

115 MENYANTHES. Fod. *5deladt*. Krons *trätlik*, med *kort* pip och vidgad, *invändigt hårigt* bräm. Stift *utdraget*. *Vallenväxt med blr i klase.* — Pag. 54.

116 GENTIANA. Foder 2—5klufvet. Krons *bägar-* ell. *trätlik*, 4—5flikig. Stånd. fästade ned i kronpipen, med *alltid raka* knappar. Stift *0*. *Örter med motsatta hela blad. Då hyllet är 4klufvet, äro ståndarne 4.* — Pag. 57.

117 ERYTHRÆA. Foder 5klufvet. Kr. *trätlik*, med *lång* pip, *5deladt*, n. *platt* bräm. Stånd. fästade nära svalget, med slut. *spiralvridna* knappar. Stift *något utdraget*. *Örter som i föreg. slägte.* — Pag. 58.

\*\*\* Fruktämne ett, inom kronan, tvårummigt.

a — Frukten fröhus.

118 CONVULVULUS. Fod. *5deladt*. Krons *klocklik*, grundt *likformigt* 5flikad, *veckig*. Märke 2—3klufvet. *Slingerväxter med stora blr i bladvecken.* — Pag. 43.

119 DATURA. Fod. omvänt *bägarlikt*, *5standadt*. Krons *trätlik* med stort *likformigt* och *klocklikt*, *veckigt* bräm. Fröh. *4väggigt*. *Bredbladig ört.* — Pag. 59.

120 VERBASCUM. Fod. djupt *5klufvet*. Krons n. *hjulformig*, med *kort* pip och *olikformigt* 5deladt bräm. Fröh. *öppnande sig i toppen*. *Höga enkla växter, med blr i ax.* — Pag. 60.

- 121 **HYOSCYAMUS**. *Fod. bågarklikt, med vidgad djupt 5standadt bräm. Krona trattlik, med klocklikt olikformigt bräm. Fröh. öppnande sig med lock. Klubbhårig ört.* — Pag. 59.

(*Erythraea* i föreg., *Azalea* i nästa afd.)

b — Frukten bär.

- 122 **LYCIUM**. *Fod. bågarklikt, 2läppiqt. Krona trattlik, med 5klufvet bräm. Ståndarknappar fria. Något tornig buskväxt.* — Pag. 58.

- 123 **SOLANUM**. *Fod. likformigt 5klufvet. Krona hjulformig 5klufven. Ståndarknappar längsefter tätt förenade. Slingrande buskväxt, eller örter, med blr i knippen eller flockvisa från sidan af stjelen.* — Pag. 59.

\*\*\*\* Fruktämne inom kronan, flerrummigt.

- ✓ 124 **POLEMONIUM**. *Foder djupt 5klufvet, utan foderholk. Krona med kort pip. klocklikt, 5deladt bräm. Ståndarnes fjäll-lik bas fastad i kronpipen. Fröh. 3-rummigt. Örter med parbladiga blad, talrika blr.* — Pag. 54.

- ✓ 125 **DIAPENSIA**. *Foder 5deladt, inom en foderholk af 2—3 skärmbblad. Krona fallik, 5klufven. Ståndarne fastade mellan kronflikarne. Fröh. 3rummigt. Låg, tuftvad fjellväxt med enblommiga stänglar.* — Pag. 55.

- ✓ 126 **AZALEA**. *Foder 5deladt, utan foderholk. Krona klocklik, 5klufven. Ståndarne fastade i blommans botten. Fröh. 2—3rummigt. Låg fjellbuske.* — Pag. 169. (*Rhododendrum* 10, 1.)

\*\*\*\*\* Fruktämne under blomman.

a — Krona likformigt 5flikig.

- 127 **SAMOLUS**. *Blomfoder n. 5deladt. Blomkrona fallik, med kort och vid pip, 5deladt bräm. Ståndare fria, fastade midt emot kronflikarne. Märke odeladt. Fröh. enrummigt, öppnande sig i toppen. Strandväxt med skiftevisa blad.* — Pag. 71.

- 128 **CAMPANULA**. *Fod. 5deladt. Kr. klocklik 5flikig. Stånd. fria, fastade på fjäll i kronans botten. Märke 3klufvet. Fröh. 3rummigt [vanl. öppnande sig med hål på sidorna]. Örter med fullkomligt klocklika, vanl. blå blr.* — Pag. 41.

- 129 **PHYTEUMA**. *Fod. 5deladt. Kr. 5deladt, med i början sammanhängande, stult. stjernlikt ubredda flikar. Stånd. fria. Märke 2—3deladt. Fröh. 3rummigt.* — Pag. 43.

- 130 **JASIONE**. *Blr samlade i blomkorg med mångbladig holk. Fod. och krona 5delade. Ståndarknappar med basen hopväxta. Märke 2klufvet. Fröh. 2rummigt. Ört med skiftevisa blad.* — Pag. 43.

b — Krona olikformigt 5flikig.

- 131 **LOBELIA**. *Foder 5deladt. Kr. med snedt 2läppiqt, 5flikigt bräm. Ståndarknappar hopväxta. Frukt fröh. Vallenväxt, med enkel stängel.* — Pag. 43.

- 132 **LONICERA**. *Fod. mycket litet, 5standadt. Kr. n. trattlik, med olikformigt 5klufvet bräm. Stånd. fria. Frukt: bär. Buskar med motsatta blad.* — Pag. 40. (*Viburnum* och *Sambucus* 5, 3.)

+++ Krona af fria blad.

\* Örter, med oregelbunden krona.

- 133 **VIOLA**. *Blomfoder 5deladt, med korta bihang nedåt. Blomkrona 5bladig, med sporre. Ståndarknappar tätt förenade. Fröh. enrummigt 3väggiqt. Örter med stipler och ofast hjerlika blad.* — Pag. 118.

- 134 **IMPATIENS**. *Fod. af 2, mycket små, och ett stort färgadt blad med sporre. Krona 5bladig. Knappar sammanhängande. Fröh. med 5, från basen elastiskt uppspringande väggar. Ört med ledad saftig stielk, skiftevisa blad.* — Pag. 111.

\*\* Buskar, med regelbunden krona.

- 135 **EVONYMUS**. *Fod. 4—5deladt. Kr. af 4—5 blad, fastade på ståndarfästet. Märke*

otyd. 4flikigt. Fröh. 4—5rummigt [rödt]. *Buske med motsatta hela blad, 4-kantiga grenar.* — Pag. 76.

136 **HEDERA.** Foder 5deladt. Krona af 5 blad, fastade på ståndarfastet. Märke odeladt. Fr. 5rummigt, 5fröigt bär. *Klångande buske med skiftevisa, flikiga blad.* — Pag. 77.

137 **RHAMNUS.** Fod. kort bägerlikt, 4—5flikigt. Krona af 4—5 små fjäll-likä blad, fastade på fodret. Stånd. 4, 5. Märke urnupet eller fjerdeladt. Frukt: 2—4 rummig bärlik stenfrukt, med 2—4 frön. *Buskar med hela blad, trinda grenar.* — Pag. 135.

138 **RIBES.** Fod. bägerlikt ell. skålförmigt, 5flikigt. Krona som hos föreg., 5bladig. Stift 2deladt ell. 2klufvet. Fr. enrummigt, mångfröigt bär. *Buskar med skiftevisa flikiga blad.* — Pag. 134.

(*Parnassia* 5, 4. *Erodium* 16, 1. *Geranium* 16, 2.)

## 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

† Blomhylla enkel kalk.

\* Örter. Fruktämne med korta trådlika stift; frukt: rundadt frö inom en tunn hinna [fröblåsa].

a — Med 5 trådlika fjäll mell. ståndarne.

139 **HERNIARIA.** Blomkalk foderlik 5delad. Kronbl. förkrympta till 5 trådlika fjäll. Fröblåsa löst inneslutande fröet. *Liten nedtryckt ört med strödda blad.* — Pag. 173.

b — Utan de trådlika fjällen; blomkalk foderlik, utan bihang.

140 **CHENOPODIUM.** Blomkalk 5delad. Frön inom en ganska tunn vidhängande fröblåsa, cirkelrunda, *alla plattliggande* [fastade med sidan, icke kanten] i botten af den 5kantiga kalken. *Bredbladiga örter, med små gytttrade blr.* — Pag. 184.

141 **BLITUM.** Lik föreg., men fröen antingen *alla, eller en del fastade på kant* i kalken [de öfriga i detta fall, med sidan, som hos *Chenop.*]. — Pag. 183.

142 **SCHOBERIA.** Kalk 5delad. Frön *plattliggande*, cirkelrunda *med en framskjutande baklik knöl i kanten* [af den spiralvridna brodden]. *Strandört med köttiga blad.* — Pag. 185.

c — Som föreg. afd.; blomkalk färgad, med ett bihang på stilkarnes rygg.

143 **KOCHIA.** Kalk 5klufven, slutl. med ett hornlikt bihang på stilkarnes rygg. Brodden dubbelviken. *Hårig strandört.* — Pag. 184.

144 **SALSOLA.** Kalk 5bladig, slutl. med ett vinglikt bihang på bladens rygg. Brodden spiralvriden. *Strandört med köttiga blad.* — Pag. 185.

(*Polygonum* 8, 3.)

\*\* Träd. Fruktämne platt, i spetsen klufvet i 2, på insidan ludna märken; frukt: vingfrukt.

145 **ULMUS.** Blomkalk trattlik flikig färgad [rödsaktig]. Vingfrukt platt, enfröig. *Träd med ostikade blad, små gytttrade blr.* — Pag. 180.

†† Hylle dubbelt, af foder och sambladig krona; fruktämne inom hyllet.

146 **CYNANCHUM.** Blomfoder 5klufvet. Krona *hjulformig*, n. 5delad. Ståndarne hopväxta likt en pelare omkring pistillen. Frukt: 2 fröhölsor, med fröfjun. *Ört med motsatta blad.* — Pag. 57.

147 **CUSCUTA.** Foder 4—5klufvet. Krona *tratt- ell. klocklik*, 4—5klufven. Stånd. 4—5, fria. Frukt ett vid basen omkringskuret fröhus. *Trådlika bladlösa oäkta parasiter, med blr gytttrade i hufvud inom skärm.* — Pag. 43.

(*Gentiana* 5, 1.)

+++ Hylle dubb., af foder [ofta otydligt] och fribladig krona, fastad ofvanpå fruktämnet. Frukt dubbel skalfrukt [af 2, slutl. från hvarandra lossnande delfrukter.] [*Umbellater.*]

\* Blir i hufvud ell. gytttrade med korta ell. inga skaft i enkla flockar.

- ✓ 148 ERYNGIUM. Blir tätt gytttrade på ett kägel-liket fäste i *ensamma hufvud*. Foder *5bladigt*. Kronbl. dubbelvikna inåt. Frukt *fjällig*. *Strandväxt med breda veckiga och tornstikiga blad.* — Pag. 84.
- 149 SANICULA. *Blomhufvud i flock*. Fod. *5bladigt*. Kronbl. med inböjd spets. Fr. *kroktaggig*. *Lundväxt med handdelade blad.* — Pag. 83.
- 150 HYDROCOTYLE. Blomflock *enkel* [af n. oskaftade blir]. Foder *omärkligt*. Kronbl. hela. Frukt platt, af med kanten sammanhängande, *glatta* delfrukter. *Trådläk, krypande vattenväxt med sköldlika blad.* — Pag. 84.
- ✓ 151 BUPLEURUM. Flock n. *enkel*, af blir dels med, dels utan skaft. Fod. *omärkligt*. Kronbl. hela inböjda. Fr. n. trind *småtaggig*. *Kustväxt med odelade smala blad.* — Pag. 83.

\*\* Blir skaftade i sammansatt flock. Delfrukter plattade från ryggen mot fogen.

a — Foder tydligare, 5standadt. [Kronbl. genom spetsens inböjning omv. hjertlika.]

- 152 LASERPITIUM. Delfr. konvexa, med 4, *bredt vingkantade* åsar samt under dessa liggande oljekanal. *Med allmänna och enskilda svepen.* — Pag. 79.
- 153 HERACLEUM. Delfr. platta ovala, med *tydliga korta klubblika* oljeränder mellan de 3, *ganska låga* åsarne. *Utan allm. svepe.* — Pag. 79.
- 154 PEUCEDANUM. Delfr. plattade elliptiska, med inre, *utanpå icke synliga*, oljekanal. *och låga trubbiga* åsar. *Med allm. svepe.* — Pag. 80.

b — Fodertänder otydliga; kronbl. gula ell. blekgula.

- 155 PASTINACA. Kronblad äggrundt aflånga, kölade inrullade. Delfr. *platta* ovala, med *tydliga* n. till basen nående *oljeränder* mellan de *ganska låga* åsarne. *Allm. och enskilda svepen* O. — Pag. 79.
- 156 ANETHUM. Kronbl. rundade, med inböjd spets. Delfr. *plattade* ovala, med breda platta kanter och till basen nående *oljeränder* mellan de *något upphöjda och hvassa* åsarne. *Svepe* O. — Pag. 79.
- 157 LEVISTICUM. Kronbl. rundade med en liten inböjd udd. Delfr. *ovala konvexa*, med *høga och tunna* åsar samt oljekanal. *Med allm. svepe.* — Pag. 69.
- ✓ 158 SILAUS. Kronbl. omv. äggrunda, med inböjd spets. Delfr. *aflånga, lågt konvexa* med upphöjda *hvassa* åsar, *utan* oljeränder. *Allm. svepe* O. — Pag. 81.

c — Fodertänder otydliga; kronbl. hvita.

- 159 IMPERATORIA. Kronbl. omv. *hjerlika*, med inböjd udd. Delfr. *plattade*, vid basen och i spetsen *intryckta*, med upphöjda åsar samt oljekanal. *Glatt växt, utan allm. svepe.* — Pag. 80.
- 160 CONIOSELINUM. Kronbl. omv. *hjerlika*. Delfr. *högt konvexa* [n. halfttrinda], med *høga hvassa* åsar och 3 *fina* oljeränder i åsdälderna. *Stift icke utvecklade under blomningstiden. Flock mångstrålig; allm. svepe* O. — Pag. 81.
- 161 SELINUM. Kronbl. *som hos föreg.* Delfr. med *en oljerand* i hvarje åsdäld, för öfr. *som hos föreg.* *Stift fullt utvecklade vid blomningen. Flock och svepe som hos föreg.* — Pag. 80.
- 162 ANGELICA. Kronbl. *aflångt lancettl., spetsade*. Delfr. *plattade* ovala, med upphöjda *hvassa* åsar och oljekanal. *Allm. svepe* O, ell. *affallande.* — Pag. 80.

\*\*\* Blomflock sammansatt. Delfrukter med hög rygg [frukten lika bred eller bredare mellan delfr:s rygg än vid fogen].

a — Frukt klotrund—af lång, glatt. Allm. och enskilda svepen 0.

163 **APIUM.** Foder omärkligt. Kronblad äggrunda med inrullad spets. Frukt. n. *klotrund*, med upphöjda åsar *samt* oljekanal. — Pag. 82.

164 **EGOPODIUM.** Fod. omärkligt. Kronblad omv. hjertlika. Fr. *äggformig*, med upphöjda släta åsar, *utan* oljekanal. — Pag. 82.

165 **CARUM.** Fod. och kronbl. som hos föreg. Fr. *af lång*, med upphöjda trubbiga åsar *samt ensamma* oljekanal. — Pag. 82.

166 **PIMPINELLA.** Fod. och kr. som hos föreg. Fr. *rundadt äggformig*, med platta randlika åsar *samt flere* oljekanal. bredvid hvarandra. *Ört med en gång parbladigt delade blad.* — Pag. 82.

b — Frukt klotrund—af lång, glatt. Allm. svepe 0, ell. snart affallande.

167 **CICUTA.** Fod. *tydligt*, 5standadt. Kronbl. omv. *hjertlika*. Frukt *klotrund*, med breda släta åsar och mellanliggande oljeränder. *Stor vattenväxt.* — Pag. 82.

168 **CORIANDRUM.** Fod. och kr. *som hos föreg.* Frukt *fullkomligt klotrund*, ihållig, med 10 låga, något hvassa åsar, *utan* oljeränder. *Stora kantbl.* — Pag. 77.

169 **OENANTHE.** Fod. och kr. *som hos föreg.* Fr. *af lång* remlad, med oljekanal. — *Vattenväxter.* — Pag. 81.

170 **HELOSCIADIUM.** Fod. *otydligt*, 5standadt. Kronbl. *ägggrunda* raka. Frukt *elliptisk tvärhuggen*, plattad från sidorna, med upphöjda åsar. *samt* oljekanal. *Krypande ell. flytande vattenväxt.* — Pag. 83.

171 **ETHUSA.** Fod. omärkligt. Kronbl. omv. *hjertlika*. Fr. *äggformig*, med höga kölformiga åsar *samt* oljekanal. *Glänsande glatt ört.* — Pag. 81.  
(*Selinum*, se ofvan.)

c — Frukt rundad—af lång, glatt. Med både allm. och enskildt svepe.

172 **CONIUM.** Fod. omärkl. Kronbl. omv. *hjertlika*. Fr. *rundadt äggformig*, med upphöjda *rynliga* åsar, *utan* oljekanal. *Svepen mångbladiga.* — Pag. 77.

173 **PLEUOSPERMUM.** Fod. *tydligt*, 5standadt. Kronbl. omv. äggrunda, *platta*. Fr. *äggformig*, med 5 *upplåsta* kölade yttre åsar utanpå 5 smärre inre, *samt* mellanliggande oljekanal. *Hög växt med mångbladiga svepen och oledad stjerk.* — Pag. 77.

174 **HALOSCIAS.** Fod. *som hos föreg.* Kronbl. omv. äggrunda *med inböjd* spets. Fr. *af lång*, med höga *hvassa* åsar *samt* oljekanal. *Glatt kustväxt.* — Pag. 81.

175 **SIUM.** Fod. *som hos föreg.* Kronbl. omv. *hjertlika*. Fr. elliptiskt *oval*, med *trubbiga* åsar *samt* oljekanal. *Vattenväxter.* — Pag. 83.

176 **FALCARIA.** Fod. och kr. *som hos föreg.* Fr. uppåt bredare, n. *klubblik*, med *trubbiga* åsar, och oljekanal. *Grenig ört.* — Pag. 83.

177 **BUNium.** Fod. omärkligt. Kr. som hos föreg. Fr. äggformig, *uppåt spetsad* mot de 2, kägellika stiftötterna, med *upphöjda randlika* åsar, *samt* oljekanal. *Enkel stjerk med allm. svepe af 1—3 blad.* — Pag. 82.

d — Frukt n. äggformig, härig ell. taggig.

178 **DAUCUS.** Fod. 5standadt. Kronblad omv. *hjertlika*. oliformiga. Frukt oval, *utan* spröt, med oljekanal och *borsttaggiga* åsar, *nästan släta åsdalder.* Ört *med lit blomflock, pardelade svepeblad.* — Pag. 79.

179 **LIBANOTIS.** Fod. af 5, *utdragna* tänder. Kronbl. omv. *hjertlika*. Fr. n. äggformig, *utan* spröt, *öfverallt luden*, med *trubbiga* åsar *samt* oljekanal. Ört *med lit blomflockar, hela svepeblad.* — Pag. 81.

- 180 **TORILIS.** Fod. och kronbl. som hos föreg. Fr. n. äggformig, utan spröt, med borslaggiga åsdålder, nästan släta randlika åsar. Sträff ört, med hela svepeblad. — Pag. 78.
- 181 **ANTHRISCUS.** Fod. omärkl. Kronbl. omv. äggrunda. Fr. äggformig, kroktaggig, med kort, glatt spröt, utan åsar och oljekanal. Utan allm. svepe. — Pag. 78. (Sanicula, se ofvan.)

e — Frukt smal, lancettlik—jemnbred; allm. svepe 0.

- 182 **CEREFOLIUM.** Fod. omärkl. Kronbl. omv. äggrunda ell. något hjertlika. Frukt lancettlik glatt, med kort, kantigt spröt, utan åsar och oljekanal. Glatta ell. mjukhåriga örter. — Pag. 78.
- 183 **CHEROPHYLLUM.** Fod. och kr. som hos föreg. Fr. lancettlikt jemnbred, glatt, utan tydl. spröt och åsar, med oljekanal. Något stråfhåriga örter. — Pag. 78.
- ✓ 184 **SCANDIX.** Fod. och kr. som hos föreg. Fr. jemnbred, kortare än det mycket långa styfhåriga sprötet. Åsar platta, åtskiljda af fåror, bysande oljekanal. Något spåd, n. glatt ört, med slul. 2 tum långa frukter. — Pag. 78.
- 185 **MYRRHIS.** Fod. otydl. 5standadt. Kronbl. omv. hjertlika. Fr. lancettlik glatt, utan spröt, med högt kölade, ihåliga åsar, utan oljekanal. Ört med tumslånga frukter. — Pag. 77.

(Oenanthe och Falcaria, se ofvan.)

### 3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

- 186 **VIBURNUM.** Blomfoder 5standadt. Kronsambladig 5klufven klocklik [de könlösa kantbladen i blomknippet större och plattade]. Frukt: bär med ett enda frö. Buske med motsattaflikiga blad. — Pag. 36.
- 187 **SAMBUCUS.** Fod. som hos föreg. Kr. sambladig skål-lik 5flikig. Fr. bär med 3 frön. Ört ell. buske med motsatta parbladigt delade blad. — Pag. 36. (Holosteum 3, 3. Polygonum avicul. 8, 3. Stellaria media 10, 3.)

### 4 Ordn. TETRAGYNIA. Pist. 4.

- 188 **PARNASSIA.** Blomfod. 5deladt. Kronsambladig. Stift. 0. Honingsfjäll 5, kantade med knoppbärande strålar [falska ståndare]. Frukt enrummigt fröhus. — Pag. 121.

### 5 Ordn. PENTA—DECAGYNIA. Pist. 5—10.

- 189 **ARMERIA.** Blomkorg med små blr inom holk. Foder bägerlikt, hinnaktigt, 5-standadt. Kronsambladig 5deladt. Frukt enfröig fröblåsa, affallande oöppnad. Tuffvade örter med trådmala blad, enblomstrig stängel. — Pag. 74.
- ✓ 190 **STATICE.** Blomax i grenigt knippe; för öfr. som föreg. Kustväxter med breda rotblad, bladlös stängel. — Pag. 74.
- 191 **DROSERA.** Fod. 5deladt. Kr. 5bladig. Frukt: enrummigt, mångfröigt fröhus. Kärnväxter med glandelhåriga blad, bar stängel. — Pag. 121.
- ✓ 192 **SIBBALDIA.** Fod. 10klufvet, hvarannan slik mindre. Kronblad 5. Frukt: talrika karpeller på ett plattadt fäste. Liten fjellört. — Pag. 155. (Linum 16, 1.)

### 6 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många.

- 193 **MYOSURUS.** Blomfoder 5bladigt, förlängdt nedom fästpunkten. Kronblad 5, med en honungshåla på klon. Frukt: talrika karpeller på ett utdraget fäste. Liten enblommig ört med trådlika rotblad. — Pag. 92.

## 6 KLASSEN

# HEXANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Liljor med kronlik blomkalk och 3rummigt fruktämne under kalken.  
[Enblommiga lökväxter.]

- 194 **GALANTHUS.** Kalk *fribladig*, af 3 yttre *större*, och 3 inre *hälften kortare* tvärhuggna blad. Blomning med hölster. — Pag. 209.
- 195 **LEUCOJUM.** Kalk *fribladig*, klocklik, af 6, *likformiga* blad, *utan* bikrona. Blomn. med hölster. — Pag. 209.
- 196 **NARCISSUS.** Kalk *sambladig* fatlik, med 6deladt bräm och en klocklik *bikrona* i pipens svalg. Blomn. med hölster. — Pag. 209.

†† Liljor som föreg., med fruktämne inom kalken.

\* Lökväxter; ståndarknapparne fästade med sidan vid strängen.

- 197 **ALLIUM.** Blr i flock, *inom* hölster af hinnaktiga blad. Kalk af 6, stundom vid basen något sammanhängande blad. Märke enkelt. *Blomflocken hos en del arter fullsatt med knopplökar.* — Pag. 212.
- 198 **MUSCARI.** Blr i klase, *utan* hölster. Kalk *sambladig*, klotformig, 6tandad. Märke enkelt. *Bladlös stängel.* — Pag. 214.
- 199 **LILIUM.** Blr *utan* hölster. Kalkblad 6, *fria*, med en *honungsfäll* nära basen. Märke *3kantigt*. *Bladig stjeln, stora blr i flock ell. klase.* — Pag. 211.
- 200 **FRITILLARIA.** Blr *utan* hölster. Kalk klocklik, af 6 *fria* blad, med en *af lång honungshåla* nära basen. Pist. med 2—3deladt märke. *Bladig stjeln och en enda stor blomma.* — Pag. 211.
- 201 **ORNITHOGALUM.** Blr *utan* hölster. Kalk 6bladig ell. 6delad, *utan* honungshåla. Märke tvärhugget ell. något klubblikt. *Blr i flock eller klase på bladlös stängel.* — Pag. 213.

\*\* Lökväxter; knappar fästade med basen, uppräta.

- 202 **TULIPA.** Kalk klocklik 6bladig. Pistill *utan* stift, med 3klufvet märke. Frön platta. Öri med *föga bladig stjeln, en enda stor blomma.* — Pag. 211.
- 203 **GAGEA.** Kalk 6bladig. Pist. med stift och n. *hell* märke. Frön trinda. *Blr n. i flock med skärmblad, eljest bladlös stängel.* — Pag. 213.

\*\*\* Växter med rotstock; frukt: bär.

- 204 **CONVALLARIA.** Kalk *sambladig*, klock- eller rörformig, 6tandad. Stift *utdraget*. *Bladlös stängel med klase, ell. bladig stjeln med blr i bladveckan.* — Pag. 214.



205 SMILACINA. Kalk n. platt, af 6, fria blad. Stift kort, syl-lik. Blad breda stjelk-omfatt., blr i klase. — Pag. 215.

206 ASPARAGUS. Kalk klocklik, djupt 6delad. Stift kort, med 3deladt märke. Grenig, bladig växt, med små borstlika blad. En del blr enkönade. — Pag. 214.

\*\*\*\* Växter med rotstock; frukt: fröhus.

✓ 207 ANTHERICUM. Kalk n. platt, 6bladig. Stånd. glatta. Stift utdraget trådlikt. Frön kantiga. Örter med stängel. — Pag. 213.

✓ 208 NARTHECIUM. Kalk som hos föreg. Ständersträng. ludna. Stift kort, syl-lik. Frön med borstlikt bibang. Blad smala, svärdlika; blr i klase. — Pag. 217.

+++ Blr med ingen ell. enkel kalk, tätt gyttrade på en tjock blomkolf.

209 CALLA. Blomhölster enbladigt, på insidan färgadt [hvit]. Kalk 0. [Ståndare af obestämdt antal fästade omkring fruktämnena]. Frukt: saftiga bär, gyttrade på kolfven. Vattenväxt med hjerlika blad. — Pag. 223.

210 ACORUS. Hölster 0. Blomkalk enkel foderlik 6bladig. Frukt: torra, slutl. enrummiga bär. Vattenväxt, med svärdlika blad, och blomkolfven på stängels sida. — Pag. 223.

++++ Gräslika släkten; kalken 6bladig foderlik [grön ell. brun].

211 JUNCUS. Pistill med stift och 3:ne trådlika märken. Fröhus 3rummigt, mångfröigt. Inga ell. trådmala blad och på ena sidan klufna bladslidor. — Pag. 217.

212 LUZULA. Fröh. enrummigt, 3fröigt; för öfr. som föreg. Plattbladiga växter, med hela bladslidor. — Pag. 221.

++++ Släkten med blomfoder och vanl. med krona.

213 BERBERIS. Foder och krona 6bladiga, fästade under fruktämnena. Frukt 1—2fröigt bär. Buske med knippvisa blad. — Pag. 96.

214 PEPLIS. Foder klocklikt, veckigt, 12tandadt, hvarannan tand mindre, ofta otydlig. Kr. ingen ell. 6bladig. Frukt mångfröigt fröhus. Vattenväxt. — Pag. 140.  
(Naumburgia 5, 1. Trientalis 7, 1.)

## 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

✓ 215 OXYRIA. Blomkalk enkel foderlik 4bladig; 2:ne blad utväxande med och betäckande den plattade vingfrukten. Märken 2, pensel-lika. — Pag. 178.  
(Ulmus 5, 2. Polygona 8, 3.)

## 3 Ordn. TRI—HEXAGYNIA. Pist. 3—6.

† Frukt en ensam enfröig nöt.

216 RUMEX. Blomkalk enkel foderlik 6bladig; 3:ne blad utväxande med och betäckande den trekantiga nöten. Märken 3, pensel-lika. Örter med spridda blad och vid lederna stipladslidor. — En del arter dro tvåbyggare. — Pag. 175.

†† Frukt af 3—6. mer ell. mindre hopväxta småfrukter.

\* Kalk sambladig.

217 COLCHICUM. Kalk kronlik, med klocklikt 6deladt bräm, och lång pip. Småfr. 3, vid basen hopväxta. Lökväxt med en stor blomma framkommande om hösten före bladen. — Pag. 215.

\*\* Kalk fribladig.

218 TRIGLOCHIN. Kalk foderlik, af 3 yttre och 3 inre blad, hvarje inneslutande en n. stränglös ståndarknapp. Pist. 3 eller 6, utan stift. Småfr. 3 ell. 6, enfröiga, ända upp hopväxta. Trådlika rotblad, blr i axlik klase. — Pag. 217.

219 SCHEUCHZERIA. Kalk n. kronlik 6bladig. Ståndare med tyd. sträng. Pist. 3—6,

utan stift. Småfr. 3—6, uppblåsta, 1—2fröiga, blott nedtill hopväxta. Vattenväxt med halftrinda blad, blr i klase. — Pag. 216.

220 TOFIELDIA. Blr med 3klufvet svepe. Kalk kronlik 6bladig. Strängar och stift tydliga. Småfr. 3, nedtill hopväxta, mångfröiga. Små svärdlika rotblad, blr i ax. — Pag. 217.

221 VERATRUM. En del blr genom felslagning enkönade. Svepe 0. Småfr. 3, nedtill något sammanhängande; för öfrigt som föreg. Stor fjellväxt med breda blad och stora blr i klasar. — Pag. 215.  
(Elatine 8, 4.)

#### 4 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många.

222 ALISMA. Blomkalk af 6 blad, de 3 yttre foderlika, de 3 inre kronlika. Fr.: talrika, enfröiga karpeller. Vattenväxter med stängel, hela blad. — Pag. 216.  
(Sempervivum 11, 4.)

## 7 KLASSEN

# HEPTANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

- 223 **TRIENTALIS.** Blomfoder 7—6—5deladt. Krons till basen 7—6—5deladt, *regelbunden*, plattadt. Fröbus enrummigt, *mångfröigt*, af 7—8, snart affallande skal. Frön på centralfäste, hvita, spetslikt punkterade. *Ört.* — Pag. 70.
- 224 **ÆSCULUS.** Fod. 5standadt. Krons 5bladig, *oregelbund.* Ståndare nedböjda. Fröb. läderartadt, *taggigt*, som fruktämne 2—4rummigt, men moget vanl. enrummigt, med ett stort nötlikt frö, sällan flere. *Träd.* — Pag. 84.

### 2 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många. (*Sempervivum* II, 4.)

---

## 8 KLASSEN

# OCTANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Fruktämne inom blomman.

225 DAPHNE. Blomkalk enkel kronlik, trattformig, 4klufven. Fr. bärlik stenfrukt. *Låg buske med blr på bar qvist.* — Pag. 180.

226 ERICA. Blomfoder 4deladt, kortare än den äggformiga, 4standade kronan. Fröhus med skiljeväggar hängande fast vid sidoväggarne. *Låga buskar med barrlika blad i krans.* — Pag. 169.

227 CALLUNA. Fod. 4deladt, färgadt, längre än den klocklika, djupt 4klufna kronan. Fröh. med skiljeväggar häng. fast vid centralfästet. *Låg buske med barrlika blad.* — Pag. 169.

(*Ulmus* 5, 2. *Polygonum* 8, 3. *Elatine* 8, 4. *Monotropa* 10, 1. *Acer* 23, 2.)

†† Fruktämne under blomman, slutl. bär; kronan sambladig.

228 VACCINIUM. Blomfoder 4klufvet. Krona klocklik 4flikig. Stånd.-knappar med otydliga sporrar. *Nedligg. buske med läderaktiga, alltid grönskande blad.* — Pag. 168.

229 OXYCOCCUS. Fod. 4klufvet. Krona hjulformig 4delad, med tillbakaböjda flikar. Knappar 2hornade, utan sporrar. *Nedligg. buskväxt, med qvarsittande blad; blr på långa skaft.* — Pag. 168.

230 MYRTILLUS. Fod. helt, ell. 4flikigt. Kr. klot- ell. äggformig, 4—5standad. Knappar 2hornade, med 2 sporrar på ryggen. *Låga småbuskar, som falla bladen.* — Pag. 168.

††† Fruktämne under blomman, slutl. fröhus; kronan fribladig.

231 EPILOBIUM. Fod. djupt 4klufvet, med kort bärlik bas. Kr. 4bladig, regelbund. Stånd. och pist. upprätta. Fröh. långt skidformigt, 4väggigt, med fröfjun. *Örter med motsatta, hela blad, röda, säll. hvita blr.* — Pag. 140.

232 CHAMÆNERION. Krona 4bladig, oregelbund. Stånd. och pist. nedböjda. För öfr. som föreg. *Blad strödda.* — Pag. 140.

233 OENOTHERA. Foder trattlikt, med lång pip, 4deladt bräm. Krona 4bladig, regelb. Stånd. och pist. upprätta. Fröh. som föreg., men utan fjun. *Skiflevisa blad, stora gula blr.* — Pag. 140.

(*Ulmus* 5, 2. *Polygonum* 8, 3. *Monotropa* 10, 1. *Acer* 23, 2.)

### 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

234 CHRYSOSPLENIUM. Blomhylla enkelt, 4klufvet, invändigt [gul-]färgadt. Frukt: 2-skalligt, mångfröigt fröhus. — Pag. 138.

(*Ulmus* 5, 2. *Polygona* 8, 3. *Acer* 23, 2.)

## 3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

- 235 FAGOPYRUM. Blomkalk enkel kronlik, djupt 5delad. Ståndare 8. Fruktämne 1, med 3 trådlika stift och klubblika märken. Frukt: 3kantig nöt med brodd i *midten* och *invikna* hjertblad. *Endriga örter, med stipelsidor.* — Pag. 173.
- 236 POLYGONUM. Blomkalk som hos föreg. Stånd. 5—8. Fruktämne 1, med 1—3, fria ell. hopväxta stift. Fr. 3kantig nöt, med brodd *på sidan* och *platta* hjertblad. *Stipelsidor.* — Pag. 174.

(Elatine 8, 4.)

## 4 Ordn. TETRA—PENTAGYNIA. Pist. 4, 5.

- 237 PARIS. Kalk *enkel foderlik*, af 4 stora och 4 inre, n. trådsmla blad. Ståndarsträngar *förlängda uppom knappen*. Frukt: 4rummigt *bär*. — Pag. 215.
- 238 ADOXA. Blomfoder 2—3*klufvet*, omkransande fruktämnet. Krona 4—5*klufven*. Fr. 3—5rummig *bärlik*. *Blr i ett n. 4sidigt hufvud.* — Pag. 84.
- 239 ELATINE. Foder 3—4*klufvet*. Krona 3—4*bladig*. Stånd. 3, 6 ell. 8. Märken 3, 4. Fr. 3—4rummigt *fröhus*. *Små strandväxter med motsatta blad. Under vatten felas vanl. kronbl.* — Pag. 133.

## 5 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många.

(Sempervivum 11, 4.)

## 9 KLASSEN

# ENNEANDRIA.

1 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

(*Polygonum Bistorta* 8, 3)

2 Ordn. HEXAGYNIA. Pist. 6.

240 BUTOMUS. Blomkalk kronlik 6bladig. Frukttännen och småfrukter 6, mångfröiga.  
*Hög vattenväxt, med smala 3kantiga blad; blomstock i stängelns spets.* — Pag.  
 216.

(*Sempervivum* 11, 4.)

---

## 10 KLASSEN

## DECANDRIA.

## 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

† Blomkrona sambladig.

241 ARCTOSTAPHYLOS. Blomsfoder 5klufvet. Krona äggformig, inneslutande frukt-  
ämnet. Ståndarknappar 2sporrade. Frukt 5rummigt, 5fröigt bär. *Nedligg. ris-*  
*aktiga buskväxter.* — Pag. 168.

242 ANDROMEDA. Foder 5deladt. Krona äggformig ell. klocklik. Knappar rundade  
ell. elliptiska, 2sporrade. Frukt 5rummigt fröhus, med på midten bristande skal.  
*Blr på utdragna skaft.* — Pag. 169.

✓ 243 PHYLLODOCE. Fod. 5deladt. Krona äggformig. Knappar n. cylindriska, utan  
sporrar. Frukt 5rumm. fröhus, öppnande sig i skalens kant. — Pag. 169.

✓ 244 RHODODENDRUM. Fod. 5klufvet. Krona tralllik. Ståndarne utan sporrar. Frukt  
som hos föreg. — Pag. 169.

(Vaccinium 8, 1.)

†† Krona fribladig.

245 LEDUM. Blomsfoder ganska litet, 5standadt [brunludet]. Krona 5bladig. Stånd-  
knappar i spetsen smedt 2poriga. Fröhus af 5, från basen lossnande rum. *Ända*  
*upp bladig stielk; blr i flock.* — Pag. 170.

246 PYROLA. Fod. hjulformigt, 5deladt. Krona och stånd. som hos föreg. Fröh.  
5rummigt, uppbristande i kanterna. *Ned till bladig stielk; blr vanl. i klase, säll.*  
*i flock ell. en enda.* — Pag. 170.

247 MONOTROPA. Fod. och kr. bägarlika, båda färgade [gula]. Sidoblirna af 4  
foder- och kronblad samt 8 ståndare; toppblomman af 5, med 10 stånd. Stånd-  
knapp. med en halfmånluk tvärspringa. Fröh. 4—5rumm. *Bladlös parasit, med*  
*blr i klase.* — Pag. 171.

(Geranium 16, 2.)

## 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

† Blomhylla enkelt, foderlikt.

248 SCLERANTHUS. Hylle sambladigt 5standadt. Fr. enfröig, nötluk, inom hyllets till-  
hårdnande bas. *Små greniga växter, med motsatta n. syl-lika blad.* — Pag. 173.

†† Blomhylla dubbelt, af foder och fribladig krona.

249 SAXIFRAGA. Foder klocklikt, 5klufvet. Krona 5bladig, fästad på fodret. Fröhus

*Drummit*, öppnande sig mellan de 2 hornlika stiften, med fröen på skiljeväggen. Örtor med skiftevisa, hela ell. flåkiga blad. — Pag. 135.

- 250 TUNICA. Blirna gytttrade inom ett gemensamt svepe af stora broskaktiga fjäll. Blomfod. rörformigt. Kronblad 5, med lång, smal klo. Fröh. enrumm., 4skaligt, med centralfäste. Bladen smala motsatta. — Pag. 124.
- 251 DIANTHUS. Svepe O. Fod. cylindriskt, 5standadt, med foderholk vid basen. Kronbl. och frukt som hos föreg. Blad som hos föreg. — Pag. 124.
- 252 SAPONARIA. Svepe och foderholk O. Kr. och fr. som hos föreg. — Pag. 124.
- 253 GYPSOPHILA. Svepe och foderholk O. Foder klocklikt, 5flikigt. Kronbl. 5, nedåt afsmalnande, utan tydlig klo. Fröh. som hos föreg. — Pag. 124.

### 3 Ordn. TRIGYNIA. Pist. 3.

† Blomfoder sambladigt.

- 254 SILENE. Blomfod. bägar- ell. äggformigt, 5standadt. Kronblad 5, med lång klo. Fröh. enrummigt, 6skaligt. Örtor med motsatta hela blad, bägarlika bl. — Pag. 122.

†† Blomfoder fribladigt.

- 255 STELLARIA. Kronblad 5, djupt 2klufna ell. 2delade. Fröh. enrumm., 6skaligt, med talrika, små frön. Örtor med motsatta, hela blad, stjernlika bl. — Pag. 125.
- 256 HALIANTHUS. Kronbl. 5, odelade, med utdragen bred klo. Honungsglandler utmärkt stora, skiftevisa med ståndarne. Fröhus 3skaligt, med få (omkr. 6), stora frön. — Pag. 129.
- 257 ARENARIA. Kronbl. som hos föreg., utan märklig klo och glandler. Fröh. 6skaligt; frön talrika. Smärre örtor med något breda blad. — Pag. 129.
- 258 LEPIGONUM. Kronbl. som hos föreg. Fröh. 3skaligt; frön oftast med en ringformig kant. Örtor med trådsnala blad samt stipler. — Pag. 132.
- 259 ALSINE. Blir och fröh. som hos föreg. Frön utan ringkant. Små örtor, med blad som föreg., men utan stipler. — Pag. 129.  
(*Cerastium trigynum* 10, 4. *Myricaria* 16, 2.)

### 4 Ordn. PENTAGYNIA. Pist. 5.

† Blir med ett ensamt fruktämne. [Blad motsatta.]

\* Blomfoder sambladigt.

- 260 AGROSTEMMA. Foder laderaktigt, med 5, långa, n. bladlika sikar. Kronblad 5. Märken öfverallt stråfhåriga. Fröh. enrummigt, mångfröigt. — Pag. 123.
- 261 VISCARIA. Foder hinnaktigt, 5standadt. Kronbl. 5. Fröh. nedtill flerrummigt, mångfröigt. — Pag. 123.
- 262 MELANDRIUM. Fod. som hos föreg. Kronbl. 5, 2klufna. Tvåbyggare. Fröh. enrummigt, öppnande sig med 10 tänder, mångfröigt. Frön utan hinnkant. — Pag. 123.
- 263 VAHLBERGELLA. Fod. och kronbl. som hos föreg. Blir samkönade. Fröh. som hos föreg. Frön med hinnkant. — Pag. 123.
- 264 LYCHNIS. Fod. 5standadt. Kronbl. 5, 4klufna. Blir samkönade. Fröh. enrumm., öppnande sig med 5 tänder, mångfröigt. — Pag. 123.

\*\* Blomfoder fribladigt.

- 265 MALACHIUM. Kronbl. 5, djupt 2klufna. Fröhus af 5, i spetsen 2flikiga skal. Slak och bräcklig ört. — Pag. 125.
- 266 CERASTIUM. Kronbl. som hos föreg. [sällan hela]. Fröh. i spetsen likformigt 10-standadt. Örtor med ovala—jämnbreda blad, n. stjernlika bl. — Pag. 127.



- 267 SPERGULA. Kronbl. 5, *hela*. Fröh. öppnande sig *med 5 skal*. Frön plattade. *med en ringformig kant. Träddlika, skenbart kransvisa blad.* — Pag. 131.
- 268 SAGINA. Fod. 4—5bladigt. Kronbl. 4—5, *hela* [stundom 0]. Fröh. öppn. sig *med 4—5 skal. Frön utan ringkant. Mest syl-lika blad.* — Pag. 130.  
(*Adoxa* 8, 4. *Arenaria ciliata* 10, 3. *Oxalis* 16, 2.)
- †† Blr med flere fruktämnen. [Blad skiftevisa.]
- 269 SEDUM. Blomfoder och krona af 5 blad. Småfrukter 5, mångfröiga. *Örter med tjocka och köttiga, oflast trinda blad.* — Pag. 138.  
(*Geranium* 16, 2.)

5 Ordn. POLYGYNIA. Pist. 6—12.

(*Sempervivum* 11, 4.)

## 11 KLASSEN

### DODECANDRIA.

#### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

- 270 **ASARUM.** Blomhylla en *enkel*, båglik, 3klufven, invändigt färgad kalk. Fröhus under kalken, 6rummigt. *Låg enblommig ört.* — Pag. 179.
- 271 **LYTHRUM.** Blomhylla *dubbelt*. Blomfoder båglik, 12tandadt. Kronbl. 6. Fröh. inom blomman, 2rummigt. *Blr i ax.* — Pag. 140.  
(*Reseda* 11, 3.)

#### 2 Ordn. DIGYNIA. Pist. 2.

- 272 **AGRIMONIA.** Blomfod. 5klufvet. Kronblad 5. Ståndare 12—20. Fodrets pip slutl. inneslutande 1—2 karpeller, ofvanpå betäckt med borst. *Örter med skiftevisa parbladigt delade blad, blr i klasar.* — Pag. 148.

#### 3 Ordn. TRI—TETRAGYNIA. Pist. 3—4.

- 273 **RESEDA.** Blomhylla *dubbelt*. Blomfod. 4—6deladt. Kronbl. 4—6, olikstora, smalslikiga. Ståndare 12—24, fästade på ett skifligt fäste, äfven bärande det 3—6kantiga fruktämnet. *Stift 0. Fröhus öppet i toppen, enrummigt. Örter med skiftevisa blad, blr i ax ell. klase.* — Pag. 85.
- 274 **EUPHORBIA.** Blomhylla *enkelt* klocklikt, 8—10likigt, med hvarannan slik kronbladlik, platt utböjd. Stånd. 12—20 oliktidiga, med ledad sträng. *Stift 3, med klufna märken. Fruktämne 3knöligt, 3rumm., slutl. skiljande sig i 3 karpeller. Örter med skiftevisa hela blad, blr i flock.* — Pag. 171.

#### 4 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många (6—12).

- 275 **SEMPERVIVUM.** Blomfoder 6—12deladt. Kronblad, ståndare och fruktämnena 6—12. *Ört med tjocka platta blad i rosett vid roten, blr i flocklikt närmade klasar.* — Pag. 138.

## 12 KLASSEN

## ICOSANDRIA.

## 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

- 276 PRUNUS. Blomfoder 5klufvet. Kronblad 5. Fruktämne inom blomman. Stenfrukt saftig. *Buskar ell. träd med hela sågade blad.* — Pag 156.  
(*Cratægus* 12, 2.)

## 2 Ordn. DI—PENTAGYNIA. Pist. 2—5. \*)

- 277 COTONEASTER. Blomfoder 5klufvet, med slutl. *köttiga* slikar. Kronbl. 5. Stift 2—3. Frukt af det slutl. bärlika blomfodret, inneslutande 2—3 *nölika*, *upptill* *öf-*  
*skiljda* rum, fästade vid insidan af det i *toppen* *öppna* båret. *Buske med hel-*  
*bräddade* blad, 1—3blomm. *klasar.* — Pag. 145.
- 278 CRATÆGUS. Fod. med 5 *tunna* slikar. Kronbl. 5. Stift 1—3. Fr. som hos föreg. med 1—3, *nölika* rum, *fast sammanhängande* med hvarandra och med det slutna båret. *Buskar med stikiga blad, blr i flocklik qvast.* — Pag. 145.
- 279 SORBUS. Fod. och kr. som hos föreg. Stift 2—4. Fr. bärlik, mjölig, med 2—4, *hinneväggiga*, 2fröiga rum. *Träd med sågade, stikiga ell. parbladiga blad, till blomqvast.* — Pag. 144.
- 280 PYRUS. Fod. och kr. som hos föreg. Stift 5. Fr. *äpple ell. päron*, saftig, med 5, *hinneväggiga* 2fröiga rum. *Träd med hela ell. sågade blad, blr i flock.* — Pag. 144.

## 3 Ordn. POLYGYNIA. Pist. många. \*\*)

† Blomfoder 5-, sällan 6—7klufvet.

- 281 SPIRÆA. Foder 5—7klufvet. Kronblad 5—7. Fruktämnerna 5—12, inom blomman, slutl. lika många, 2—4fröiga fröer. *Örtier ell. buskar, med hela ell. parbladigt delade blad, blr i knippe ell. spira.* — Pag. 155.
- 282 ROSA. Fod. 5klufvet. Kronbl. 5. Fruktämnerna *talrika*, slutl. lika många, *enfröiga karpeller*, inom fodrets äggr. ell. klotformiga, slutl. färgade, bärlika pip [nypon]. *Buskar med parblad. blad och vid skaflet fästade stipler.* — Pag. 146.
- 283 RUBUS. Fod. 5klufvet. Kronbl. 5. Fruktämnerna *talrika*, utanpå ett torrt fäste, slutl. bildande en *hallonfrukt*, sammansatt af *enfröiga små stenfrukter*. *Örtier ell. buskar, med 3—7fingrade, säll. enkla ell. parbladiga blad, n. fria stipler.* — Pag. 149.

\*) Hela Ordn. utgör Fam. *Pomaceæ*.

\*\*) Hela Ordn. tillhör Fam. *Senticosæ*.

++ Foder 10-, säll. 8klufvet, hvarannan flik mindre.

284 FRAGARIA. Kronbl. 5, omv. *aggrunda*. Fukt bärlik [smultron], af många små karpeller utan spröt, insänkta i ytan af det *svamplikt uppsvållda saftiga, frånskiljbara fästet*. *Örter med 3fingrade blad, krypande örtrefvor*. — Pag. 152.

285 POTENTILLA. Kronbl. 5, säll. 4, omv. *hjerlik* ell. *rundade*. Fruktfäste torrt, konvext, med många karpeller utan spröt. *Örter, sällan buskar, med parblad. ell. fingerdelade blad*. — Pag. 152.

286 COMARUM. Kronbl. 5, *lancettlika, spetsiga*. Fruktfäste torrt, svamplikt uppsvåldt, med många karpeller utan spröt. — Pag. 152.

287 GEUM. Kronblad 5, *rundade* ell. omv. *aggrunda*. Fruktfäste torrt, med många, *långt och krokuddigt sprötspetsade* karpeller. — Pag. 155.

+++ Foder likformigt 8—10klufvet.

288 DRYAS. Kronblad 8—10, omv. *aggrunda*, vanl. grundt intryckta i spetsen. Fruktar med mycket långt, mjukhårigt spröt. *Fjellört med enkla blad, ensam blomma på stängel*. — Pag. 155.

## 13 KLASSEN

# POLYANDRIA.

### 1 Ordn. MONOGYNIA. Pist. 1.

+ Kronblad 4.

289 PAPAVER. Blomfoder 2bladigt, snart affallande. Fruktämne klubblikt—klotrundt, med sköldlikt märke, utan stift. Fröh. likt fruktämnet, enrummigt, med ämnen till skiljeväggar och öppnande sig med flere hål under märkets kant. Örter med hvit mjölksaft, flikiga blad, stora blr. — Pag. 96.

✓ 290 GLAUCIUM. Fod. som hos föreg. Fruktämne hornlikt med slikt märke, omärkl. stift. Fröh. mycket långt skidformigt, 2rummigt, med svampaktigt tjock skiljevagg. Kustört med stora blad och blr. gul mjölksaft. — Pag. 97.

291 CHELIDONIUM. Foder och fruktämne som hos föreg. Fröh. skidformigt, enrummigt, med ämnen till skiljevagg. Ört med gul mjölksaft, smärre blr. — Pag. 97.

292 ACTÆA. Fod. 4bladigt, affall. Fruktämne äggformigt, med ovalt märke, utan stift. Frukt enrummigt bär med 2sidigt fästade frön. — Pag. 96.

++ Kronblad 5.

293 HELIANTHEMUM. Blomfoder af 3 inre och 2 yttre, smärre blad. Kronblad 5. Fröhus 3skaligt, med 1—3, flerfröiga rum. Örter ell. småbuskar, med motsatta blad. — Pag. 118.

294 TILIA. Foder likformigt 5bladigt, affallande. Kronbl. 5. Stift trådlikt, med 4—5 klufvet märke. Frukt affallande oöppnad, [hos de Sv. arterna] enrummig, enfröig. Träd med hjertl. blad. — Pag. 112.

+++ Kronblad många.

295 NYMPHÆA. Foder 4bladigt, grönt. Kronbl. i flere rader. Ståndare med kronbladlika strängar, fästade på fruktämnet. Märke sköldlikt, utan stift. Frukt affall. oöppnad. Frön inom en nätt hinna. Vattenväxter med stora ensamma hvita, säll. röda blr. — Pag. 86.

296 NUPHAR. Fod. 5bladigt, färgadt [gult]. Kronbl., märke och frukt som hos föreg. Stånd. fästade under fruktämnet. Frön utan näthinna. Vattenväxter som föreg., med gula blr. — Pag. 86.

(Parnassia 5, 4. Delphinium 13, 2.)

### 2 Ordn. DI—PENTAGYNIA. Pist. 2—5. \*)

297 DELPHINIUM. Blomfoder stort, kronlikt, färgadt, 5bladigt, öfversta bladet med ho-

\*) Denna och följ. Ordn. omfattar Fam. Ranunculaceæ.

*nungssporre*. Krona 1bladigt, med sporre innesluten i öfre foderbladets. Karpeller 1—3. — Pag. 95.

298 **ACONITUM**. Foder som hos föreg.; öfr. bladet *hjelmlikt*, inneslutande 2:ne, skaf-tade horn- ell. *strullika kronblad* [honungsgömmel]. Karp. 3—5. Örter med *hand- likt klufna* ell. *delade blad*, blr i *klasar*. — Pag. 95.

299 **AQUILEGIA**. Foder som hos föreg. af *likformiga* blad. Kronbl. 5, utdragna nedåt i *lika många sporrar*. Karp. 5. — Pag. 95.  
(*Reseda* 11, 3. *Hypericum* 18, 1. *Stratiotes* 22. 7.)

### 3 Ord. POLYGYNIA. Pist. många.

† Hylle enkelt kronlikt.

300 **THALICTRUM**. Blomhyll 4bladigt, *smart affallande*. Karp. flere, kantiga, *en- fröiga*, utan spröt. Örter med parbl. *delade blad* på korta *slidor*, små blr i *klasar*. — Pag. 92.

301 **PULSATILLA**. Hylle 5bladigt. Karp. *talrika*, i hufvud, *enfröiga*, med *långt, sjun- hårigt spröt*. Örter med parbl. *delade rotblad*, *stängel* med en *stor blomma* och *ändeladt svepe*. — Pag. 94.

302 **ANEMONE**. Hylle 5—10blad., med 3bladigt svepe ned på stängeln, ell. foderlikt under blomman. Karp. som hos föreg., utan spröt. Örter med *3flikiga* ell. 3-, *säll. flerfingradt delade blad*. — Pag. 93.

303 **CALTHA**. Hylle 5—6bladigt. Svepe 0. Karp. flere, förenade i *kransform*, *mång- fröiga*. *Vallenört* med *hela blad*. — Pag. 95.  
(*Trollius* i nästa afd.)

†† Blr med foder och krona.

\* Blomfoder stort, färgadt, 10—16bladigt; karp. *flerfröiga*.

304 **TROLLIUS**. Kronbl. små, knappt längre än ståndarne, *tunglika*, med *honungshåla* ned mot basen. Karp. *talrika*. — Pag. 95.

\*\* Blomfod. 3—5bladigt; karp. *enfröiga*.

305 **FICARIA**. Fod. 3bladigt. Kronbl. 7—10, med en *själlbetäckt* *honungshåla* på klon. Karp. flere *enfröiga*, *nölika*, utan stift. — Pag. 91.

306 **RANUNCULUS**. Foder 5—*säll. 3-*bladigt. Kronbl. 5, *säll. flere*, med *honungshåla*, *omgifven* ell. *läckt* med *håll*, på klon. Karp. med *kort stift*, för öfr. som föreg. Örter med *hela* och *småla*, ell. *mer* och *mindre delade stjelklad*. — Pag. 87.

307 **BATRACHIUM**. Fod. 5bladigt. Kronbl. 5, *säll. flere*, med *naken* *honungshåla* på klon. Karp. med *kort* ell. *intet stift*, *smårynliga* på ytan. *Vallenörter*, *oftast* med *ändelade blad nedtill*. — Pag. 90.

308 **ADONIS**. Fod. 5bladigt. Kronbl. 10—20, utan *honungshåla*. Karp. *talrika* *en- fröiga*. *Stora ensamma* blr i *grenarnes topp*. — Pag. 94.

## 14 KLASSEN

# DIDYNAMIA.

### 1 Ordn. GYMNOSPERMIA. \*)

Frukt af 4 smånötter.

† Pist. med odeladt märke.

- ✓ 309 VERBENA. Foder n. likformigt 5klufvet. Kronan olikformigt 5flikad, med ståndarne dolda i pipen. Pist. med klubblikt märke. Nötter i början inneslutna i en snart bristande fröblåsa. — Pag. 56.

†† Pist. med 2deladt märke.

\* Foderflik. 5, n. likformiga; kronans öfre läpp lägre än den nedre.

- 310 MENTHA. Kr. n. likformigt 4flikad med en urnupen flik. Ståndare åtskiljda, med parallela knapprum. Blr kransvisa, stundom i bladvecken, stundom i ax ell. hufvud. — Pag. 47.
- ✓ 311 ELSHOLTZIA. Kr. som hos föreg. Stånd. åtskiljda, med nedtill fränstående knapprum. Blr i låta ax, med rundade blomskärm. — Pag. 47.
- 312 TEUCRIUM. Kr:s öfre läpp 0, ell. egentl. 2delad, med flikarne lagda till den nedre, derigenom 5flikiga läppen; dennes mellersta flik mycket större och rundad. Blr i krans eller klasar, utan andra skärm än bladen. — T. Scorod. har 2-läppigt foder. — Pag. 53.
- 313 AJUGA. Kr:s öfre läpp liten, 2standad, den nedre 3flikig, mellanfliken störst, urnupen. Upprätta örter, med kransvisa blr i bladvecken, utan skärm. — Pag. 53.

\*\* Foderflik som i föreg. afd.; kronans öfre läpp högre än den nedre.

a — Kronans öfre läpp n. platt.

- 314 GLECHOMA. Fod. 15nervigt. Kr:s öfre läpp omv. hjertlik, 2flikig; den nedre 3-klufven, mellanfliken platt, urnupen. Ståndarknappar parvis hopstående. Krypande ört. — Pag. 50.
- 315 NEPETA. Fod. upphöjdt 15nervigt. Kronans öfre läpp urnupen, den nedre 3-klufven, sidoflikarne utböjda, mellanfliken vidgad konkav naggad. Stånd.knapp. åtskiljda. Blr gylltrade på de motsatta grenarne, med lancetl. skärm. — Pag. 50.
- 316 ORIGANUM. Foder 10nervigt, tillslutet med hår. Kronans öfre läpp 2flikig; den

\*) Hela Ordn., med undantag af Verbena, utgör Familjen Labiata.

nedre n. *likformigt* klufven i 3, *hela* slikar. Stånd.knapp. åtskiljda. *Blr i små knippen förenade till qvast, med ovala skärm.* — Pag. 49.

b — Kronans öfre läpp hvalflik, den nedres sidoflikar trubbiga.

a — Smånötternas toppyta afrundad, glatt.

317 **BALLOTA.** Fod. *upphöjdt* 10nervigt, *tralllikt*. Kronpipen *rak*; öfre läppen *nagad*; den nedre 3flikig, med bred och urnupen mellanflik. Stånd. *raka*. *Blr på korta kransvisa skast i bladvecken och toppen; skärm n. borslika.* — Pag. 51.

318 **BETONICA.** Fod. *otydligt nervigt, klocklikt*. Kronpipen *krökt* framåt; öfre läppen *hel*; den nedre med 3, n. lika långa slikar, den mellersta bredare, *hel*. Stånd. *raka*. *Blomkransar gyltrade till ett ax; skärm äggrunda.* — Pag. 51.

319 **STACHYS.** Fod. *som hos föreg.* Kr:s pip *n. rak*; öfre läppen *hel*, den nedre 3-flikig, mellanfliken omv. hjertlik ell. äggrund. Knapp. *glatta*, slutl. *böjda åt sidorna*, öppnande sig med en *längdremna*. *Blomkransar närmade i ett något småbladigt ax.* — Pag. 51.

320 **GALEOPSIS.** Fod. med 5 *gröfre, upphöjda* nerver, *rörformigt*. Kr:s öfre läpp *hel*; den nedre med en *ihålig knöl* mellan sidoflikarne och den breda, n. tvärhuggna mellanfliken. Knappar *håriga*, rummen öppnande sig med en *tvärremna*. *Blr i åtskiljda ell. närsittande kransar, med lancettl. skärm.* — Pag. 53.

β — Smånötternas toppyta platt, småluden.

321 **LEONURUS.** Fod. 5kantigt. Krona *hårig*; öfre läppen *smal*, odelad; den nedre 3-klufven, med *smala* slikar, sidoflik. nedböjda. Stånd. *långt utskjutande*. *Blomkrans. i bladvecken.* — Pag. 51.

c — Kronans öfre läpp hvalflik; den nedres sidoflikar spetsiga ell. mycket små tandlika.

322 **GALEOBDOLO.** Fod. med 5 *gröfre* nerver. Kr:s öfre läpp *lång*, framböjd, *hel*; den nedre med 3, *hela spetsiga* slikar, mellanflik. *föga större och n. likformig* med sidoflik. Nötternas toppyta plattad och glatt. *Blr kransvisa med borslika skärm.* — Pag. 52.

323 **LAMIUM.** Fod. *som hos föreg.* Kr:s öfre läpp *hel*; den nedres sidoflik. *mycket små tandlika*, mellanflik. *stor*, omv. hjertlik ell. äggrund, vid basen *mycket smal*. Nöt. *som hos föreg.* *Blr i hufvud ell. kransvisa, med inga ell. borslika skärm.* — Pag. 52.

\*\*\* Foderflikar 10, hvarannan mindre.

324 **MARRUBIUM.** Kronans öfre läpp *smal* 2klufven, den nedre 3klufven. Befruktndelarna inneslutna i kronpipen. Nötter tvärhuggna. *Styf växt med mycket låda blomkransar.* — Pag. 53.

\*\*\*\* Foder 2läppigt [d. v. s. klufvet i 2 större, hela ell. slika delar].

a — Ståndarne parallela.

325 **SCUTELLARIA.** Fodrets läppar *hela tvärhuggna*, den öfre med en platt, *ihålig knöl* på ryggen. Kronans öfre läpp hvalflik *3flikig*; den nedre odelad. *Strandväxter med parvisa blr, lång plattad krona.* — Pag. 50.

326 **PRUNELLA.** Fod:s öfre läpp *bred, likformigt 3tandad*; den nedre *smalare*, 2-flikig. Kr:s öfre läpp hvalflik *hel*; den nedre 3klufven. Ståndarsträngar i spetsen 2flikiga med knapp på ena fliken. *Blomkransar i tåll hufvud, med njurlika skärm.* — Pag. 50.

327 **DRACOCEPHALUM.** Fod:s öfre läpp 3klufven med *mycket bredare mellanflik*; den nedre 2delad. Kr:s öfre läpp *urnupen*, den nedre 3flikig; mellanfliken *längre*. *Blomkrans. närmade, stundom i axform; skärm äggrunda.* — Pag. 51.

b — Ståndarne icke parallela.

328 **THYMUS.** Fod:s öfre läpp *likform. 3flikig*; den nedre 2delad. Kr:s öfre läpp *kort*,



rak och urnupen; den nedre 3klufven med *hela* slikar. Ståndarknappar *åtskiljda*. *Nedligg. risaktiga växter med blr i hufvud.* — Pag. 41.

329 CALAMINTHA. *Fod. krökt. Ståndarknapparne samstötande*, under kronans öfre läpp; för öfr. som föreg. *Blr i krans, med på undre sidan bukigt foder.* — Pag. 49

330 CLINOPODIUM. *Foder krökt; öfre läppen likformigt buddig; den nedre delad i 2 borstlika slikar. Krs öfre läpp 2flik.; den nedre 3flikig, med urnupen mellanflik. Knapp. som hos föreg. Blomkransar i hufvud med svepen af talrika borst.* — Pag. 50.

(*Teucrium Scorodonia* se ofvan.)

## 2 Ordn. ANGIOSPERMIA. \*)

Frukt ett fröhus.

† Blomfoder 4klufvet; krona inneslutande fruktämnet.

\* Fjälliga parasitväxter, utan blad. Fröhus enrummigt.

✓ 331 OROBANCHE. Blomfod. *olikformigt* 4klufvet, på ryggsidan eller både på rygg- och framsidan deladt till basen. Krona hägarlik med 2läppigt, veckigt bräm; öfre läppen meränd. *urnupen*; den nedre 3flikig. Märken 2, skifflika. *Parasiter på rötter af andra växter, hinnsfjälliga ända till roten.* — Pag. 68.

332 LATHRÆA. *Fod. likformigt* 4klufvet, färgadt. Krs öfre läpp n. hvalflik *hel*; den nedre grundt 3flikig. Märke enkelt. *Parasit på rötterna af Hassel, Asp m. fl. trädslag.* — Pag. 68.

\*\* Bladiga örter. Fröhus 2rummigt. [Blad motsatta.]

333 EUPHRASIA. Kronans öfre läpp *hvalfd, 2flikig*, kortare än den nedre; denna 3-klufven, slikarne *urnupna*. Ståndarknappar *inneslutna* i öfre kronläppen, med i kanten *hvitludna* rum. Frön *många*, strimmiga. — Pag. 66.

334 ODONTITES. Krs öfre läpp *tvärhuggen* och öppen; nedre läppen med 3 *hela* slikar. Ståndarknapp. *utskjutande, glatta*. Frön *många*, strimmiga. *Blr i ensidiga klarar.* — Pag. 65.

335 BARTSIA. Krona *som hos föreg. Knappar öfverallt hvitludna*. Frön *många*, med flere breda vingkanter. *Fjell- eller kärrodax med enkla stjelkar.* — Pag. 65.

336 RHINANTHUS. *Fod. samt krs öfre hjelmlika, framtill 2standade läpp plattade från sidorna. Knapp. hvitludna*. Frön *många*, platta, vingkantade. *Örter med gula blr i ax.* — Pag. 66.

337 MELAMPYRUM. Krs öfre läpp *hvalflik hel*, med uppviken kant; den nedre 3-flikig. Knapp. *löst sammanhängande*. Frön 1—2 i hvarje rum, kupiga och släta. *Blr i ax med stora skärm, ell. parvisa i bladvecken.* — Pag. 67.

†† Blomfod. 5flikigt [hos *Sceptrum* och *Pedicul.* stundom 6flikigt]; krona inneslutande fruktämnet.

\* Ståndarknapparnes rum vid basen spetsiga.

338 SCEPTRUM. *Fod. 5flikigt. Krona djupt 2läppig, tillsluten af de hopböjda läpparne; öfre läppen hjelmlik, den nedre 3flikig. Fröhus n. klotrundt, öppnande sig tvärsigenom båda kanterna. Frön med en vid, veckig, genomskinlig och nälikt punkterad hinna.* — Pag. 66.

339 PEDICULARIS. *Fod. 5klufvet ell. 5standadt. Krona öppen, med läppar i öfr. som hos föreg. Fröh. aflångt ell. aggrundt, snedspetsadt, öppnande sig i den konveza kanten. Frön låta med ojemnt ell. punkteradt skal. Kär- ell. fjellörter med skiffliga parklufna blad.* — Pag. 67.

\*\* Knapprummen vid basen afrundade.

✓ 340 DIGITALIS. Krona *bägarlik öppen*, på undre sidan bukig, med *olikformigt*, grundt

\*) Med undantag af sista släktet *Linnaea* tillhöra alla Familjen *Personatae* L.

4flikigt bräm. Ståndare nedböjda. Märke 2deladt. Ört med skiflevisa blad, stora blr i klase. — Pag. 61.

341 LIMOSELLA. Kr. klocklik, n. likformigt 5klufven. Märke enkelt. Fröh. enrummigt. Liten vattenört med blomskafi från roten. — Pag. 65.

342 LINARIA. Kr. 2läppig, tillsluten af nedre läppens hvalfika bas; öfre läppen upprät, 2klufven, den nedre med honungssporre. Fröh. 2rumm., oordentligt bristande i toppen. — Pag. 61.

343 ANTIRRHINUM. Kr. som hos föreg. med ett knölformigt honungsgömmе i stället för sporre. Fröh. 2rumm., öppnande sig med 3 hål i toppen. Ört med motsatta blad, stort, 5deladt blomfoder. — Pag. 61.

344 SCROPHULARIA. Kr. med klotrund pip och ett kort olikformigt 5klufvet bräm, utan särskildt honungsgömmе. Fröh. 2rummigt. Större örter med motsatta blad, små blr. — Pag. 61.

(Verbena 14, 1.)

+++ Krona ofvanpå fruktämnet.

345 LINNÆA. Pod. 5deladt. Krona klocklik, n. likformigt 5flikig. Frukt: yngre 3-, slutl. enrummigt, enfröigt fröhus. Krypande skogsväxt. — Pag. 40.

## 15 KLASSEN

## TETRADYNAMIA. \*)

## 1 Ord. SILICULOSÆ.

Skidor korta.

† Frukt [nöt-skida] affallande oöppnad, näml. hela skidan ell. hvar rum för sig.

\* Skida affallande odelad.

346 NESLIA. Skida *klotrund*, ung 2rummig, med hinnaktig försvinnande skiljevägg, *stult. enfröig*. Frön med ryggliggande rotämne. *Upprät ört med små gula blr och skidor i långa klasar*. — Pag. 105.

347 BUNIAS. Skida *äggformig, sned och ojemn*, spetsig, snedt 2rummig, *2fröig*. Frön med inrullade hjertblad och ryggligg. rotämne. *Styf och sträf ört med gula blr*. — Pag. 105.

348 ISATIS. Skida *af lång ell. något vigglik, platt*, slutl. enrumm. och *enfröig*. Frön med ryggligg. rotämne. *Hängande skidor*. — Pag. 105.

349 SENEBIERA. Skida *bred, af 2, i bredd satta, enfröiga* rum, affallande tillhopa eller hvar för sig oöppnade. Frön som hos föreg. *Nedligg. greniga örter med parodelade blad, mycket små hvita blr, som hos en art sakna kronblad och knappar på de längre ståndarne*. — Pag. 107.

\*\* Skida delande sig på tvären i 2, hvar för sig affall. rum.

✓ 350 CRAMBE. Skidans öfre rum *stort klotrundt* köttigt, enfröigt; det nedre *smalt, ofruktamt*. Frön med veckliggande rotämne. *Kustväxt med stora blad, hvita blr*. — Pag. 105.

351 CAKILE. Skidans öfre rum *utdraget, 4kantigt, spetsigt*, enfröigt; det nedre *enfröigt*. Frön med kantliggande rotämne. *Nedliggande kustväxt med rödaktiga blr*. — Pag. 105.

(Senebiera i föreg. afd., Raphanus i nästa Ord.

†† Skida öppnande sig med 2 skal och smal skiljevägg [utgörande skidans minsta diameter].

\* Skidans rum 1- ell. 2fröiga.

352 TEESDALIA. Kronbl. *olikstora*. Skida *omv. hjertlik*, med kölade 2fröiga rum, utan vingkant. Frön med kantliggande rotämne. — Pag. 107.

353 HUTCHINSIA. Kronbl. *likstora*. Skida *oval*; för öfr. *som föreg.* — Pag. 107.

354 LEPIDIUM. Kronbl. som hos föreg. Skida *ovall ägggrund, ell. bredare* och något

\*) Hela klassen utgör Familjen Crucifera DC.

hjärtlik, med *enfröiga* rum. Frön med ryggliggande rotämne. *En art har inga kronbl. och blott 2 ståndare.* — Pag. 106.

\*\* Skidans rum mångfröiga.

355 CAPSELLA. Skida *omv. hjert- ell. vigglik*, tvärhuggen *plattad*, utan vingkant. Frön med ryggligg. rotämne. — Pag. 106.

356 THLASPI. Skida *rund ell. omv. hjertlik, plattad*, med vingkantade rum. Frön med kantligg. rotämne. — Pag. 106.

357 SUBULARIA. Skida *oval* med hel spets och *bållika ovingade* rum. Frön med veckliggande rotämne. *Strand- ell. vattenväxt.* — Pag. 107.

+++ Skida som i föreg. afd., med bred skiljevägg.

\* Skidan uppblåst [ungef. lika tjock som bred].

358 COCHLEARIA. Skida *oval ell. klotrund*, med kort, på skiljeväggen *qvarsillande stift*, 2—mångfröiga rum. Frön med kantliggande rotämne. *Glatta kustörter med hvita blr.* — Pag. 108.

359 CAMELINA. Skida *omv. ägg- ell. päronformig*, med spröt af det *med skalen af fallande* stiftet, mångfröiga rum. Frön med ryggligg. rotämne. *Åkerväxter med gula blr.* — Pag. 108.

\*\* Skidan plattad.

360 ALYSSUM. Ståndarsträngarne med ett *tand- ell. borstlikt bihang*. Skida *rundad*, med utdraget stift, 2fröiga rum. Frön med kantliggande rotämne. — Pag. 108.

361 FARSETIA. Sträng. med ett *tandlikt bihang*. Skida *elliptisk*, med utdraget stift, mångfröiga rum. Frön som hos föreg. *Större, bladig, gråbladen ört.* — Pag. 108.

362 DRABA. Ståndare [stund. 4] *utan bih.* Skida *oval—afslång*, hel i spetsen, med *ganska kort*, stund. omärkligt stift, mångfröiga rum. Frön som hos föreg. *Mest smärre örter, de flesta fjellväxter med hvita, sällan gula blr.* — Pag. 108.

363 LUNARIA. Stånd. *utan bih.* Skida *oval*, hel i spetsen, med något *utdraget* stift och *fästad med en fot* vid skaftet. Frön *platta* med kantligg. rotämne. *Lundört med stora blad, violetteröda blr.* — Pag. 107.

(*Nasturtium* och *Braya* i nästa Ordn.)

## 2 Ordn. SILIQUOSÆ.

Skidor långa.

† Skida af 2, längsefter uppbristande skal.

\* Skida 4kantig af kölade skal.

364 HESPERIS. Blomfoder tillslutet. Pistillens märke af 2 *upprätta skiftika fikar*. Skida jemnbred, *rundadt* 4kantig. Frön enradiga, med ryggliggande rotämne. — Pag. 100.

365 ERYSIMUM. Fod. tillslutet. Märke *urnupet*, med *omärkligt stift*. Skida jemnbred, *quadratisk* 4kantig. Frön släta afslånga, i öfr. som föreg. *Örter med teml. smala blad.* — Pag. 100.

366 ALLIARIA. Fod. tillslutet. Märke *odeladt, tvärhugget*, med *ganska kort* stift. Skida *som hos föreg.* Frön vågigt remlade, cylindriska; i öfrigt som föreg. *Skuggört med breda, odelade blad.* — Pag. 101.

367 BARBAREA. Fod. tillslutet. Märke n. helt, med något *utdraget* stift. Skida jemnbred *utdragen, plattadt* 4kantig. Frön enradiga, med kantliggande rotämne. *Örter med fikiga blad.* — Pag. 103.

368 MELANOSINAPIS. Fod. *öppet*. Märke n. helt, med *utdraget* stift. Skida *kort, n. quadr.* 4kantig, med *sprölikt* stift. Frön enradiga, med veckliggande rotämne. — Pag. 99.

\*\* Skida trind ell. plattad af konvexa skal.

a — Skidans skal utan tydlig ryggner.

- 369 DENTARIA. Foder *tätt tillslutet*. Skidan jemnbredt lancettlik, med elastiskt uppspring. skal, *tjock* skiljevåg, kort stift. Frön *enradiga*, med kantliggande rotämne. *Lundört med parbladigt delade blad, knopplökar i öfre bladvecken*. — Pag. 101.
- 370 CARDAMINE. Fod. n. *öppet*. Skida *utdragen* jemnbred, med elastiskt uppspringande eller tillbakarullade skal, *hinnaktig* skiljevåg. Frön *som hos föreg. Ört*er med mest parbladigt delade [*en art med hela*] blad. — Pag. 101.
- 371 NASTURTUM. Fod. n. *öppet*. Skida *kort* [rund, ell. 2—5 gånger längre än bred], mer och mindre plattad. Frön n. *2radiga*, med kantligg. rotämne. *Ört*er med mer och mindre delade blad. — Pag. 104.

b — Skida med tydligt ennerviga skal och utdraget sprötlikt stift [flere gånger längre än skidans bredd].

- 372 BRASSICA. Foder meränd. tillslutet. Skidan med grofådriga skal. Frön *enradiga klotrunda*, med veckliggande rotämne. *Stjelkomfatt. blad*. — Pag. 99.
- 373 ERUCASTRUM. Foder n. tillslutet. Frön *aflånga ell. ägggrunda*, något *plattade*, för öfr. som hos föreg. *Paradelade blad*. — Pag. 99.

c — Skida med skal som afd. b —, och kort stift [icke längre än skidans bredd].

- 374 DIPLTAXIS. Foder *öppet*. Skida n. jemnbred, något plattad. Frön något plattade, *2radiga*, med veckliggande rotämne. *Nästan paradelade blad*. — Pag. 99.
- 375 TURRITIS. Fod. *slutet*. Skida lång plattad *2eggad*. Frön *2radiga*, med kantligg. rotämne. *Stjelkomfattande, hela blad*. — Pag. 103.
- 376 ARABIS. Fod. *slutet*. Skida *utdragen* plattad med n. helt märke och omärkligt stift. Frön *enradiga*, med kantligg. rotämne. *Hela ell. något flikiga blad*. — Pag. 102.

- ✓ 377 BRAYA. Fod. *slutet*. Skida *kort, n. trind* med urnupet märke och kort stift. Frön *2radiga*, med ryggligg. rotämne. *Lägre fjellört, med smala hela blad*. — Pag. 101.

d — Skida med minst 3nerviga skal.

- 378 SINAPIS. Foder *öppet*. Skida trind, med 3—5nerviga skal, *utdraget sprötlikt* stift, helt märke. Frön *enradiga*, med veckliggande rotämne. *Flikiga blad*. — Pag. 99.
- 379 SISYMBRIUM. Fod. n. *öppet*. Skida *utdragen*, n. trind, med 3nerviga skal, *kort* stift, helt ell. urnupet märke. Frön *enradiga*, med ryggligg. rotämne. *Delade ell. flikiga blad*. — Pag. 100.

†† Skida icke uppbristande på längden, utan affallande ledvis:

- 380 RAPHANUS. Foder tillslutet. Skida *anång* eller jemnbred, trind [slutl. hopdraget ledad mellan fröen]. Frön med veckliggande rotämne. — Pag. 105.

## 16 KLASSEN

# MONADELPHIA.

1 Ordn. PENTANDRIA. Ståndare 5 (näml. med knappar).

- 381 LINUM. Blomfoder och krona 5bladiga. Stånd. 5. *Stift* och märken 5, *fria*. Fröh. *utan spröt*, af 5. 2klufna skal, 10rummigt, med ett frö i hvarje rum. *Smala strödda ell. motsatta blad*. — Pag. 116.
- 382 ERODIUM. Fod. och kr. som hos föreg. Ståndarsträngar föga hopväxta, 5 med knappar, 5 utan. Stift *hopväxta* med det *spröllika* fruktfästet, med 5 märken. Karpeller 5 i *krans*, enfröiga. med vid mognaden *korkskruflikt vridna* stift, fästade vid spetsen af sprötet. *Delade ell. flikiga blad, blommor i flock*. — Pag. 116.  
(*Lysimachia* 5, 1. *Geranium pusill.* i n. Ordn.)

2 Ordn. DECANDRIA. Stånd. 10.

- 383 GERANIUM. Blomfod. och krona 5bladiga. Ståndarsträngar föga samväxta. Pist. *hopväxta* med det *spröllika* fruktfästet, med 5 märken. Karp. 5 i *krans*, enfröiga. med vid mognaden *urfsjäderlikt* tillbakarullade strängar, fästade vid spetsen af sprötet. *Flikiga ell. delade blad, vanl. parvisa blr*. — Pag. 114.
- 384 OXALIS. Fod. 5deladt. Kronbl. 5, vid basen något förenade. Ståndarsträngar vid basen mer och mindre samväxta. Pist. med 5, *fria* stift. Fröh. *5rummigt, mångfröigt*. Frön med fröhylla. *Örter med 3fingrade blad*. — Pag. 116.
- 385 MYRICARIA. Fod. 5deladt. Kronbl. 5. Ståndarstr. samväxta till öfver midten. Pist. *utan spröt och stift*. Fröh. 3kantigt, *enrumm.*, 3skaligt. Frön med fröfjün. *Buske med mycket små, enkla blad, blr i ax*. — Pag. 172.  
(*Sarothamnus*, *Genista*, *Ononis* och *Anthyllis* 17, 3.)

3 Ordn. POLYANDRIA. Stånd. många.

- 386 LAVATERA. Blomfoder 5klufvet, omgifvet af en 3klufven foderholk. Kronbl. 5. Stift *talrika*. Karpell. enfröiga, tätt förenade i en nedplattad kaklik krans. *Stor ört, med flikiga blad*. — Pag. 112.
- 387 MALVA. Foderholk 3bladig; för öfr. som föreg. *Örter med flikiga eller delade blad*. — Pag. 113.
- 388 ALTHÆA. Foderholk 6—9klufven; för öfr. som föreg. *Mjukt hvitluden ört, med flikiga blad*. — Pag. 113.

## 17 KLASSEN

# DIADELPHIA.

### 1 Ordn. HEXANDRIA. Stånd. 6.

- 389 FUMARIA. Blomsfoder 2bladigt, affallande. Krons af 4, olikformiga, i spetsen hopslutna blad; det ena med kort, punglik sporre. Ståndarsträngar samväxta i 2 stammar, hvarje med 3 knappar. Frukter n. klotrund, nötk, enfröig. Greniga örter med enkel trådsml rot. — Pag. 98.
- 390 CORYDALIS. Fod. 2bladigt, snart affallande. Krons och stånd. som hos föreg. Frukter flerfröig, 2skalig baljlik. Enkla örter, med lökformig knölstam och sammansatt rot. — Pag. 97.

### 2 Ordn. OCTANDRIA. Stånd. 8.

- 391 POLYGALA. Blomsfoder af 3:ne smärre ofärgade och 2 stora vinglika färgade blad. Krons af 5, sinsemellan och med ståndarne samväxta [i spetsen franskantade] blad. Fröhus platt, i spetsen urnupet, 2rummigt. — Pag. 110.

### 3 Ordn. DECANDRIA. Stånd. 10. \*)

† Alla ståndarsträngarne nedtill hopväxta [ingen fri].

- ✓ 392 SAROTHAMNUS. Blomsfoder 2läppigt af en öfre, omärkligt 2standad och en nedre 3standad läpp. Kronans köl trubbig. Stift långt, ringformigt omböjdt, på ryggen hårigt. Buskväxt, med 3fingrade blad. — Pag. 166.
- ✓ 393 GENISTA. Fod. 2läppigt, djupt 5standadt. Kronköl n. rak, trubbig. Stift uppstigande, syl-lik glatt. Låga busklika växter med enkla blad. — Pag. 166.
- 394 ONONIS. Fod. likformigt 5klufvet. Kronköl sprötspetsig. Stift glatt. Blad 3fingrade. — Pag. 167.
- 395 ANTHYLLIS. Fod. upplåst, 5standadt, slutl. inneslutande baljan. Kronköl böjd spetsig. Blad parbladiga. — Pag. 167.

†† De 9 nedre strängarne hopväxta, den öfversta fri.

\* Blad parbladiga med uddblad.

a — Baljan enfröig, affall. öppnad, ell. ledad flerfröig, affall. ledvis.

- 396 ONOBRYCHIS. Blomsfoder djupt och n. likformigt 5klufvet. Kronans köl trubbig, mycket längre än de små vingarne. Balja enfröig, plattad och nätligt rynkig. — Pag. 160.

\*) Hela Ordn. omfattar Linnés familj *Papilionaceæ*.

- 397 **CORONILLA**. Fod. n. klocklikt, *Standadt*, kortare än kronbladens åtskilda klor. Kronkölen *sprötspetsig*. Balja utdragen *ledad flerfröig*, slutl. bristande tvärt af i lederna. *Låg buske*. — Pag. 160.
- 398 **ORNITHOPUS**. Fod. cylindriskt, *Standadt*, längre än kronbladens klor. Kronköl rundadt *trubbig*. Balja som hos föreg. — Pag. 160.
- b — Baljan öppnande sig på längden med 2 skal.
- 399 **ASTRAGALUS**. Fod. 5stand. Kronköl *trubbig*. Baljans undre, fröfästet motsatta, fog invändigt bärande en smalare ell. bredare, *ofullkomlig* skiljevägg. *Hufvudlika blomklasar*. — Pag. 161.
- 400 **PHACA**. Fod. och kr. som hos föreg. Baljans undre fog utan spår till skiljevägg. *Fåpariga blad*. — Pag. 161.
- 401 **OXYTROPIS**. Kronköl med en klotlik udd i spetsen; för öfr. som föreg. *Mångpariga blad*. — Pag. 162.
- \*\* Blad parbladiga, utan uddblad.
- a — Utan klänge.
- 402 **OROBUS**. Blomfodrets 2 öfre tänder olikformiga och korta i jemförelse med de 3 nedre. Märket jemnbredt, konvext, på öfre sidan inludat, på den undre glatt. *Bladen med endast ämne till klänge*. — Pag. 158.
- b — Med långt klänge; 1—2- säll. 3pariga blad [undant. *Lath. marit.*].
- 403 **LATHYRUS**. Fodrets 2 öfre tänder kortare. Märke n. jemnbredt, *oköladt*, *ofvanpå platt* och hårigt, under glatt. *Blomskäft mångblommiga*. — Pag. 157.
- 404 **PISUM**. Fod. med n. lika långa tänder. Stift på framsidan *högt köladt*, med från sidorna *plattadt* märke. *Ört med få blr.* — Pag. 157.
- c — Med långt klänge; minst 3-, oftast flerpariga blad.
- 405 **VICIA**. Fods 2 öfre tänder kortare. Märke n. jemnbredt, *platt*, på undre sidan eller på båda ludet. Baljan *sprötspetsad*. *Bladen med klänge undant. V. Orobus*. — Pag. 158.
- 406 **ERVUM**. Fod. 5flikigt, med de öfre tänderna något mindre. Märke *trindt*, med *klotrund* luden spets. Baljan *trubbig*. *Späda örter med små blr.* — Pag. 160.
- \*\*\* Blad 3fingrade.
- a — Kronans köl trubbig.
- 407 **MELILOTUS**. Blomf. 5standadt. Blomkrona med kölen slutande tätt till seglet, *snart bortfallande*. Balja äggformig rak 1—2fröig, längre än fodret, slutl. *uppbristande*. *Blr i klasar.* — Pag. 163.
- 408 **TRIFOLIUM**. Fod. 5standadt. Kr. som hos föreg., *qvarsittande*. Balja 1—4fröig, *affallande oöppnad*, *täckt af* fodret ell. den visnade kronan. *Blr i vanl. tåla hufvud*. — Pag. 164.
- 409 **MEDICAGO**. Fod. 5flikigt. Krona *bortfallande*. Balja *krökt*, mån- ell. snäckformig, *mång-*, säll. *1fröig*, längre än fodret. *Blr i klase ell. hufvud*. — Pag. 163.
- b — Kronans köl sprötspetsig.
- 410 **LOTUS**. Fod. 5flikigt. Strängar uppåt vidgade. Balja jemnbred, *trind* och n. rak, mångfröig, längre än fodret. *Blr ensamma ell. i hufvud*. — Pag. 162.
- 411 **TETRAGONOLOBUS**. Baljan med 4, *small vingade kanter*; för öfr. som föreg. — Pag. 162.



18 KLASSEN  
POLYADELPHIA.

1 Ordn. POLYANDRIA.

Ståndare många.

412 **HYPERICUM.** Blomsfoder 5deladt. Krona 5bladig. Ståndarsträngar vid basen för-  
enade i 3 eller 5 knippen. Frukt: 3rummigt, mångfröigt fröhus. *Örter med hela*  
*motsatta blad, 3:ne stift.* — Pag. 117.

---

## 19 KLASSEN

### SYNGENESIA.\*)

#### 1 Ordn. MONOCLINIA.

Alla med befruktningsdelar försedda blommor 2könade. (*Polygamia aequalis* L. undant. *Echinops* och *Centaurea*.)

† Alla blommor i blomkorgen tunglika, 2könade.

\* Skalkfrukter med fjäderlikt fjun.

a — Alla ell. diskblrnas skalkfr. med skaftadt fjun.

413 **TRAGOPOGON.** Blomholk enkel, af 8—12 jemnhöga blad. Alla skalkfrukter med skaftadt fjun. Blomfäste bart. *Holkfjäll liklånga, bladlika.* — Pag. 16.

414 **HYPOCHÆRIS.** Holk tegellagd. Diskblrnas skalkfr. med skaftadt fjun. Fäste fjälligt. Nästan bladlös stjerk. — Pag. 34.

b — Skalkfr:s fjun oskaftadt.

415 **SCORZONERA.** Holk tegellagd. De yttre fj. kortare och bredare än de inre hinnekantade, utan foderholk. Fäste bart. *De flesta bladen samlade vid stjerkens bas.* — Pag. 16.

416 **LEONTODON.** Holk tegellagd. De yttre fjällen smalare än de inre, utan foderholk. Fäste bart. *Stjerk blidlös, 1—fäblomstrig.* — Pag. 34.

417 **PICRIS.** Holk enkel, af jemnhöga fjäll, med slaka foderholkfjäll vid basen. Fäste bart. *Bladig ört.* — Pag. 17.

\*\* Skalkfrukter med hårlikt fjun.

a — Fruktsjunet skaftadt.

418 **TARAXACUM.** Blomholk af jemnhöga, något hopväxta fjäll, med foderholkfjäll vid basen, mångblommig. Skalkfr. n. trinda, med långt skaftadt fjun. Fäste bart. — Pag. 34.

419 **LACTUCA.** Holk n. cylindrisk, med tegellagda fjäll vid basen, fäblommig. Skalkfr. plattade, med kort fjun. Fruktsj. skaftadt. Fäste bart. — Pag. 16.

b — Fruktsjunet oskaftadt.

420 **SONCHUS.** Holk vidgad vid basen, öfverallt tegellagd. Skalkfr. plattade, med fjun af mjuka ull-lika, lätt affallande hår. Fäste bart. — Pag. 15.

421 **MULGEDIUM.** Holk n. cylindrisk, med tegellagda fjäll vid basen. Skalkfr. plattade. Fjun af raka, något styfva, tydligt sträfvå hår. Fäste bart. *Blå bl.* — Pag. 15.

\*) Hela denna klass tillhör Richards Familj *Synantheres* ell. Linnés *Compositæ*.

Hartman, *Skandinavians Flora* (10:de uppl.).

422 **HIERACIUM.** Holk *tegellagd.* Skalf. *trinda* ell. *flerkantiga*, *jemntjocka* med fjun af hår som hos föreg. Fäste bart. *Dels flerblomstrig stjelk, dels bladlös ell. enblomstrig stängel.* — Pag. 18.

423 **CREPIS.** Holk *enkel*, vid *basen* omgifven af något frånstående foderholkfjäll. Skalf. *trinda*, *uppåt smälare*, med mjukhårigt fjun. Fäste bart. — Pag. 17.

\*\*\* Skalfruktur utan fjun.

✓ 424 **ARNOSERIS.** Holk *enkel* af *talrika* jemnhöga kölade fjäll, med *omärklig* foderholk. Skalf. med *hinnaktig* fruktkrona på toppen. Fäste bart. — Pag. 35.

425 **LAPSANA.** Holk som hos föreg. af 8—10 fjäll. Skalf. *utan* fruktkrona. Fäste bart. — Pag. 16.

426 **CICHORIUM.** Holk som hos föreg., med *utdragen* foderholk. Skalf. med *tandad* fruktkrona. Fäste *fjälligt*. *Stora blomkorgar med blå blr.* — Pag. 15.

†† Alla blommorna rörformiga, 2kånade.

\* Blomkorg klotrund utan holk. (*Polyg. segregata* L.)

427 **ECHINOPS.** Hvarje blomma försedd med ett af fjäll sammansatt foder. Skalf. med en hårbräddad hinnkant på toppen. Blomfäste fjälligt. *Tistel-lik, utan annan holk än några nedböjda fjäll vid blomkorgens bas.* — Pag. 11.

\*\* Blomkorg med holk af hvassa, meränd. stickande fjäll.

a — Fruktfjunet härlikt, stråft.

428 **LAPPA.** Holk n. klotrund, af *krokuddiga* fjäll. Fruktfj. borstlikt. Fäste *fjälligt*. *Storbladiga växter med blomkorg., hvilkas holk hakar sig fast vid mjuka föremål.* — Pag. 14.

429 **ONOPORDON.** Holk n. klotrund, af *rakt tornuddiga* fjäll. Fäste bart, ojemnt af hinnkantade gropar. *Stjelken bredt vingad.* — Pag. 12.

430 **CARDUUS.** Holk klotrund ell. rundadt äggformig, af uddhvassa fjäll med *rak*, vanl. stickande udd. Fäste beklädt med *hårlika* fjäll. *Tistlar med röda ell. viol. blr.* — Pag. 12.

b — Fruktfjunet fjäderlikt.

431 **CIRSIUM.** Holk *klot-* eller *äggformig*, af uddhvassa, meränd. stickande fjäll, med *rak* udd. Fäste beklädt med *hårlika* fjäll. *Tistlar med röda, violetta, sallan gula blr.* — Pag. 13.

432 **CARLINA.** Holk *skål-lik* *vidgad*; dess *yttre* fjäll med *raka* taggar i spetsen och kanterna; de *inre* färgade oväpnade. Fäste besatt med *syl-lik* *enkla* ell. *flerkufna* fjäll. *Tistel med blekgula blr.* — Pag. 12.

\*\*\* Blomk. med holk af mjukare fjäll.

a — Skalf. med fjun i spetsen.

433 **SERRATULA.** Holk n. cylindrisk, af *tegel-lagda* fjäll. Fjun af *likformiga* sträva borstlika hår. Fäste *borstfjälligt*. — Pag. 12.

✓ 434 **SAUSSUREA.** Holk som hos föreg. Fjun af *olikformiga* hår, de *inre* mjuka fjäderlika, omgifna af kortare, borstlika. Fäste *borstfjälligt*. *Ståndarknappar med långa hår vid basen.* — Pag. 12.

435 **EUPATORIUM.** Holk af små tegel-lagda fjäll. Blomkronans bräm *mycket grundt* *flikadt*; märken *långt* *utskjutande*, trådlika. Skalf. n. *trinda* ell. *kantiga*, med stråft härlikt fjun. Fäste bart. — Pag. 10.

✓ 436 **LINOSYRIS.** Holk, fruktfjun och *fäste* som hos föreg. Kronans bräm *kufset till midten*, med *föga* *utskjutande* lancettlika märken. Skalf. *plattade*. — Pag. 10.

b — Skalf. med 2—4, styfva och fintaggiga borst kring spetsen.

437 **BIDENS.** Holk af jemnhöga fjäll, vid basen omgifven af en stor foderholk. Skalf.

stora plattade, tvårbuggna. Fäste platt, fjälligt. Fukt- ell. vattenörter med motsatta blad, enstaka blomkorgar. — Pag. 1.  
(*Centaurea nigra*; *Senecio vulg.*, *Inula Conyza*, *Matr. discoidea*, varr. af *Senec. Jacobæa*, *Aster* och *Matricaria*.)

+++ Kantblommor könlösa. (*Polyg. frustranea* L.)

438 **CENTAUREA.** Blomholk tegel-lagd. Kantblir större, med snedt flerklufvet bräm. Fäste borstfjälligt. Örtor med n. klotrund holk af sargade fjäll. *C. nigra* saknar vanl. de könlösa blrna. — Pag. 11.

## 2 Ord. POLYCLINIA.

Diskblommorna 2könade; kantblirna endast med pistill. \*)

(*Polygamia superflua* L. undant. *Filago*.)

† Alla blrna rörformiga.

\* Alla skalfr. utan fjun.

439 **TANACETUM.** Blomholk halft klofrund, af tegel-lagda fjäll. De få honblirna satta i kanten, 5flikiga, de 2könade 5flikiga. Skalfr. 5kantiga, med hinnaktig fruktkrona. Blomfäste bart. Blomkorg. i qvastlik samling. — Pag. 3.

440 **ARTEMISIA.** Holc skål- ell. bägarlik, af tegel-lagda fjäll. Honblir med ganska liten oflikad krona, blandade med de 2könade 5flikiga. Skalfr. plattadt 3kantiga, utan fruktkrona. Fäste bart ell. hårigt. Örtor med ferdelade blad, små blomkorg. vanl. i klasar. — Pag. 3.

\*\* Alla skalfr. med fjun; blomfäste bart.

441 **HELICHRYSUM.** Holc af tegel-lagda torra hinnaktiga fjäll. Honblirna få, i en enkel rad i kanten. Skalfr. med fjun af jemnfina hår. Hvitullig ört, med glänsande gula eternellblir. — Pag. 6.

442 **GNAPHALIUM.** Holc af tegel-lagda fjäll, utan foderholc. Honblir i kanten, fler-radiga. Skalfr. som hos föreg. Smalbladiga örtor med små gytttrade blomkorgar. — Pag. 6.

443 **ANTENNARIA.** Han- och honblommor på olika stånd (2byggare). Hanblirnas korgar med fjun af i spetsen tjockare hår. Blomk. i qvast. — Pag. 7.

\*\*\* Diskblirnas skalfr. med, honblirnas utan fjun; fäste fjälligt.

444 **FILAGO.** Holc konisk af jemnhöga fjäll med en vanl. 5bladig foderholc. Honblir trådliska, utan frukt-fjun. Diskblirnas skalfr. med hårligt fjun. Hvit- eller gråbludna örtor med små, gytttrade blomkorgar. — Pag. 7.  
(*Petasites* i nästa afd.)

++ Diskblommor rörformiga, kant- ell. stråblir tuuglika.

\* Skalkfrukter med hårligt fjun; holc n. enkel af fjäklånga fjäll.

a — Pistis märken jemnbreda, med en hårtofs i spetsen.

445 **ARNICA.** Blomholk af 2 rader jemnhöga fjäll. Stråblir i spetsen djupt 3—4-tandade, med ståndarsträngar utan knappar i svalget. Blomfäste utan fjäll, stråft af korta hår. — Pag. 4.

446 **CINERARIA.** Holc af talrika jemnhöga fjäll i enkel rad, utan foderholc. Stråblir 3—4-tandade utan ståndarämnen. Fäste bart, glatt. — Pag. 5.

447 **SENECIO.** Holc af jemnhöga fjäll i enkel rad, med foderholc vid basen. Stråblir som hos föreg. Fäste bart. Örtor med parflikiga, säll. odelade blad. Stråblirna felfå icke sällan. — Pag. 5.

\*) De 2könade blrna felfå stundom till ena könet, hvarigenom 2- och mångbyggare uppkomma.

b — Pistis märken n. klubblika, till vårtprickiga, med glatt spets.

448 TUSSILAGO. Blomkorg ensam af flerradiga, utdraget tunglika honblir i kanten. 2kånade rörformiga på disken. Fäste bart. Vårdat med fjällig stängel, sednare utdräande stora rotblad. — Pag. 11.

449 PETASITES. Blomkorgar flere, i en del på olika stånd mest honblir, i andra mest 2kånade; strålblir korta ell. inga. Fäste bart. Örtier med fjällig stängel, stora rotblad. — Pag. 10.

\*\* Skalkfrukter med hårligt fjun; holk tegel-lagd af oliklånga fjäll.

a — Strålblirna af samma färg som diskblirna.

✓ 450 PULICARIA. Strålblirna söga längre än diskblirna. Ståndarknapper med 2 borst vid basen. Fruktsjunet vid basen omgivet af en krans korta fjäll. Fäste bart. — Pag. 8.

451 INULA. Strålblir utdragna talrika. Knapp. och fäste som hos föreg. Skalkfr. med likformigt fjun (utan fjäll). Upprätta örtier med gula blir. — Pag. 8.

452 SOLIDAGO. Strålblir utdragna, få [6—9]. Knapp. utan borst. Skalkfr. med fjun som hos föreg. Fäste bart, punkteradt. — Pag. 10.

b — Strålblirna af annan färg än diskblirna.

453 ASTER. Strålblir talrika, i en enkel rad [blå ell. hvita]. Knapp. utan borst. Skalkfr. plattade. Fäste bart, gropigt. — Pag. 9.

454 ERIGERON. Strålblir i flere rader inom hvarandra, med trådsakt tunglikt bräm [rödletta ell. hv.]. Knapp. utan borst. Skalkfr. plattade. Fäste punkteradt. Örtier med smala blad, blomk. ensamma ell. i klass. — Pag. 9.

\*\*\* Skalkfrukter utan fjun; fäste täckt med långa fjäll.

455 ACHILLEA. Holk äggformig. Strålblommor med kort bräm [söga längre än bredt]. Blomk. i n. jemnhög qvart. — Pag. 3.

456 ANTHEMIS. Holk platt ell. skål-lik. Strålblir utdragna. Grenar enblomstriga. — Pag. 2.

\*\*\*\* Skalkfrukter utan fjun; fäste bart.

457 BELLIS. Holk af en dubbel krans liklånga, helt och hållet gröna fjäll. Skalkfr. utan åsar. Fäste slutt. koniskt. Bladen hela. — Pag. 8.

458 MATRICARIA. Holk af oliklånga, tegel-lagda, hinnkantade fjäll. Skalkfr. med 3 ell. 5 åsar. Fäste som hos föreg. Bladen parbladigt ändelade. — Pag. 2.

459 CHRYSANTHEMUM. Holk som hos föreg. Skalkfr. med 5 ell. flere åsar. Fäste slutt. konvext. Blad hela ell. bredflikiga. — Pag. 2.

## 20 KLASSEN

### GYNANDRIA. \*)

#### 1 Ordn. MONANDRIA. Ståndarknapp 1.

† Knapp upprätt, med hela basen sammanflytande och orörligt fästad på pistillen.

\* Läpp med utdraget och smalt, sporrlikt honungsgömma [undant. *Gymnad. albida*].

440 ORCHIS. Läpp mer och mindre *flikig*. Knappens rum nedtill förenade i en *gemensam glandel-lik pung* ofvanför märket, inneslutande de 2 pollenmassornas *åtskiljda fötter*, som hvar för sig kan utdragas. — Pag. 201.

441 ANACAMPTIS. De 2 pollenmassorna sammanhängande med en *gemensam fot*, innesluten i en *glandel-lik pung* ofvanför märket; för öfr. som *föreg. Axel halft klotrundt, idt.* — Pag. 203.

442 GYMNADENIA. Läpp bred *3klufven*. Knapp *utan pung* för pollenmassornas *idt sittande fötter. Axel utdraget.* — Pag. 203.

443 PLATANThERA. Läpp *odelad, jemnbred.* Pollenmassornas fötter fästade vid hvar sin af 2:ne *glandler, åtskiljda* af det mellanliggande märket. *Blad 2, ell. 1.* — Pag. 204.

\*\* Läpp med kort och vidgadt, punglikt honungsgömma.

444 COELOGLOSSUM. Läpp *jemnbred*, i spetsen *3standad*. Pollenmassornas fötter *utan pung.* — Pag. 204.

445 NIGRITELLA. Läpp vänd uppåt, *odelad aggrund*; för öfrigt som *Orchis.* — Pag. 204.

\*\*\* Läpp utan sporr- ell. punglikt honungsgömma.

446 OPHRYS. Kalk *öppen*. Läpp *4flikig*. Pollenmassornas fötter *åtskiljda* i hvar sin *pung.* — Pag. 204.

447 CHAMÆORCHIS. Kalk *hjelmlikt sluten*. Läpp n. *odelad*. Pollenmassor som hos *föreg.* — Pag. 205.

448 HERMINIUM. Kalk *klocklikt sluten*. Läpp *3klufven*, vid basen *skål-lik* fördjupad. Pollenmassornas fötter *åtskiljda.* — Pag. 205.

\*) Hela Klassen, med undantag af 3:dje Ordn., tillhör Linnés och Jussieu's familj *Orchidea*.

†† Knapp fri och mer ell. mindre rörlig.

\* Läpp med djupt sporr- ell. punglikt honungsgömmе.

- ✓ 469 CALYPSO. Läpp *stor, skolik*, med bräm och *dubbel sporre framtill*. Könpelaren lång, med bladlika vingkanter. Pollenmassorna 4, klubblika, *oskaftade*. *Enbladig och enblommig*. — Pag. 207.

- 470 EPIPOGIUM. Läpp *3flikig*, med *punglikt* honungsgömmе, *vänd uppåt*. Pollenmassorna *lågt skaftade*, sammanhängande, inneslutna i den snart affallande lockformiga knappen. *Bladlös, fjällig och flerblommig*. — Pag. 207.

\*\* Läpp med grundt eller otydligt honungsgömmе.

a — Läppen genom en inskränning från sidorna *afdelad* i en fördjupad bas och en odelad skifva.

- 471 CEPHALANTHERA. Könpelaren rak, *uldraget jemnbred* [minst 4 gr längre än diam.]. Pollenmassorna n. jemntjocka, *föga klubblika*. Frukttämne *oskaftadt*, vridet. *Bladiga med upprätta blr.* — Pag. 206.

- 472 EPIPACTIS. Könpel. *kort*. Pollenm. *klubblika*. Frukttämne *med vridet skaft*. *Flerbladiga med n. hängande blr.* — Pag. 206.

b — Läppen icke afdelad, i spetsen djupt 2klufven.

- 473 LISTERA. Läpp vid basen n. *platt*. Könpel. *kort*, förlängd till ett fjäll-liket stöd bakom knappen. *Med 2, n. motsatta blad.* — Pag. 206.

- 474 NEOTTIA. Läpp vid basen *skål-liket* fördjupad. Könpel. *uldragen*, slutande vid knappen. *Bladlös, fjällig*. — Pag. 206.

c — Läppen icke afdelad, i spetsen hel.

- 475 GOODYERA. Läpp *odelad*, vid basen skål-liket fördjupad, *vänd nedåt*. Ståndarknapp fästad *med skaft* vid könpelarens rygg. Pollenmass. *kort klubblika*. *Flerbladig, med small ax.* — Pag. 205.

- 476 MALAXIS. Läpp *odelad*, *vänd uppåt*. Könpel. *ganska kort*, med lockformig knapp på toppen. Pollenmass. sammanhängande, *klubblika* 2delade. *Ned till 1—3bladiga med rikblommigt ax.* — Pag. 207.

- 477 STURMIA. Läpp *som hos föreg.* Könpel. *uldragen*, något framkrökt, upptill vingkantad, med knapp *som hos föreg.* Pollenmassor *klotrunda*, 2 i hvarje rum. *Fåblommigt ax.* — Pag. 207.

- 478 CORALLORHIZA. Läpp *grundt 3flikig*, mellanflik. stor odelad. Könpel. *som hos föreg.*, långsefter konkav. Knappens rum delade tvärsöfver i 2 smärre rum, hvarje med en *klotrund* pollenmassa. *Bladlös.* — Pag. 208.

2 Ordn. DIANDRIA. Ståndarknappar 2.

- 479 CYPRIPEIDIUM. Blomkalk 5bladig [de 2 nedre bladen hopväxta]. Läpp skoformig uppblåst. Knappar fästade å ömse sidor om det sköldlika märket. *Bredbladig ört.* — Pag. 208.

3 Ordn. HEXANDRIA. Ståndarknapp. 6.

- 480 ARISTOLOCHIA. Blomhylla enkelt kronlikt, sambladigt rörformigt [med snedt, enläppigt bräm] ofvanpå frukttämnet. Stånd.-knappar insänkta i det öflikade märkets sidor. Fröhus 6rummigt, mångfröigt. — Pag. 179.

## 21 KLASSEN

# MONOECIA.

### 1 Ordn. MONANDRIA. Ståndare 1.

- 481 ZANNICHELLIA. ♂: Blomkalk 0. — ♀: Fruktämnen 4—7, hvarje med stift. Frukt: 4—7, halfmånlika smånötter. *Vattenväxter med skiftevisa blad.* — Pag. 228.
- 482 CALLITRICHE. Kalk 0, eller i dess ställe 2 hvita skärmbblad. — ♀: Fruktämne åknöligt, med 2 trådlika stift. Frukt: 4, sammanhängande, slutligen åtskilda smånötter. *Vattenväxter med motsatta blad.* — Pag. 199.  
(*Zostera* 1, 1. *Typha* 21, 3. *Pinus* 21, 6.)

### 2 Ordn. DIANDRIA. Stånd. 2.

(*Lemna* 2, 1. *Typha* 21, 3.)

### 3 Ordn. TRIANDRIA. Stånd. 3.

- 483 KOBRESIA. Småax i ett ensamt, eller flere gytttrade, sammansatta ax; hvarje småax i förra fallet af 1 ♂ och 1 ♀blomma. — i det sednare honblommiga småax nedtill och hanblommiga i axets topp. ♂blr af 1, ♀blr af 2 fjäll. Frukt: 3kantig nöt. *Fjellgräs med trådmala blad och strån, liknande följ. slägte.* — Pag. 254.
- 484 CAREX. Blr i ax. ♂: Axsfjäll 1. Kalksfjäll 0. — ♀: Axsfjäll 1. Kalksfjäll 1, flasklikt, genom mynningen i toppen framsläppande den inneslutna pistillens 2—3 märken; slutl. bildande ett fruktgömmen omkring nöten. *Gräslika växter.* — Obs. *Kalksfjället kallas i arbetsbeskrifningarne fruktgömmen.* — Pag. 235.
- 485 TYPHA. ♂ och ♀blr skiljda i 2 särskilda cylindriska ax rundt omkring strået, hanaxet ofvan honaxet. Blomkalk af hårlika borst. Frukt en långskaftad nöt. *Vattenörter med svärdlika blad.* — Pag. 229.
- 486 SPARGANIUM. ♂ och ♀blr skiljda i flere, klotrunda ax. ♂blr af ett obestämdt antal fjäll. — ♀ af 3—4, vigglika fjäll. Frukt nötlik, vaol. utan skaft. *Vattenväxter med flere ax.* — Pag. 229.  
(*Eriophorum* 3, 1. *Amarantus* 21, 5.)

### 4 Ordn. TETRANDRIA. Stånd. 4.

† Örter.

- 487 URTICA. ♂: Blomhylla enkelt, foderlikt 4deladt. — ♀hylla enkelt, af 2 stora och 2 små blad, slutl. omgifvande nöten. *Brännborstiga örter.* — Pag. 181.



488 LITORELLA. ♂: Blomhylla *dubbelt*. Foder 4deladt. Krons trattlik med 4deladt bräm. — ♀ [oskaftade i bladvecken vid roten]: foder 0, i dess ställe ett 2—3-bladigt svepe. Krons sambladig hinnaktig 2flikig. Frukt nötluk. *Liten stråddört med syl-rika blad och en långskaftad hanblomma.* — Pag. 74.

†† Träd ell. buskar.

489 ALNUS. ♂: Hänge af sammansatta sköldlika, på undre sidan 3blommiga fjäll. Hylle 4deladt. — ♀: Kort hänge af tegel-lagda 2blommiga fjäll, slutligen tillhårdnande och bildande en liten kotte. *Träd ell. buskar, blommande på bar qvist.* — Pag. 196.

### 5 Ordn. PENTANDRIA. Stånd. 5.

✓ 490 AMARANTUS. Blomhylla enkelt 3deladt, hinnaktigt. Stånd. 3. Stift 2—3. Frukt: enfröig fröblåsa. — Pag. 181.

(*Bryonia* 21, 7. *Atriplex* 23, 1.)

### 6 Ordn. POLYANDRIA. Stånd. flere än 5.

† Örtor, med dubbelt blomhylla.

491 SAGITTARIA. Foder och krona 3bladiga. Stånd. och pistiller *latrika*. Fr. af *latrika*, blås-rika enfröiga småfrukter, gytturade på ett rundadt fäste. — Pag. 216.

492 MYRIOPHYLLUM. Foder och krona 4taliga; det förra hos ♂ 4deladt, hos ♀ 4-tandadt; den sednare 4bladig, snart affallande. Stånd. 4—8. Fruktämne 4knöligt, med 4 ludna märken, slutl. delbart i 4 smånötter. — Pag. 142.

†† Örtor, med enkelt ell. intet blomhylla.

493 CERATOPHYLLUM. Blomhylla foderlikt, *mångbladigt*. Ståndare 12—20, n. utan strängar. Pist. 1, med syl-lik stift. Frukt: enfröig nöt. — Pag. 200.

✓ 494 POTERIUM. Blr gytturade i *hufvud*. Hylle foderlikt, med 4deladt bräm. Stånd. 20—40, med *långa* strängar. Stift pensel-rika. Frukt af 3—4 karpeller inom hyllets tillhårdnande bas. — Pag. 148.

✓ 495 ARUM. Blr i *kolf*, inom ett stort enbladigt, strutlikt hölster, hanblorna ofvan honblorna; *hylle 0*. Stånd. utan strängar. Pist. utan stift. Frukt enrummigt *bär*. — Pag. 223.

††† Löfträd och buskar. [♂blr i hänge.]

\* Frukt: 1—2 nötter inom ett svepe [bägarfoder].

496 QUERCUS. ♂hänge *cylindriskt*. Hylle af 5—12 fjäll med lika många ståndare. — ♀hylle af tegel-lagda fjäll, slutl. sammanväxande till *en skål under* nöten. Frukt: nöt [ållon]. — Pag. 186.

497 FAGUS. ♂hänge n. *klotrundt*; hylle *klocklikt*, 4—6klufvet, med 8—12 ståndare. — ♀svepe 4klufvet, 2blommigt, slutl. *låderaktigt* och *alldeles omslutande* de 2 nötterna. — Pag. 186.

498 CORYLUS. ♂hänge *cylindriskt* af 3flikiga fjäll, mellersta fliken störst, betäckande sidoflikarne. *Hylle 0*. Stånd. omkring 8, fästade under hängfjällen. — ♀fjäll 2blommiga. Stift 2. Frukt: nöt, *omgifven af stora flikiga svepeblad*. — Pag. 186.

✓ 499 CARPINUS. ♂hänge n. *cylindr.*, af enkla fjäll. *Hylle 0*. Stånd. 8—24, fästade vid fjällets bas. — ♀fjäll 2blomm. Stift 2. Frukt en ensam nöt, omfattad af de *slutl. vinglika* fjällen. — Pag. 186.

\*\* Frukt: plattad, fri vingfrukt.

500 BETULA. ♂hänge cylindr., af sammansatta sköldlika, på undre sidan enblommiga fjäll, med 3bladigt hylle. Stånd. 4—6, upptill 2klufna, med ett knapprum på hver fluk. — ♀hänge af tegel-lagda platta, slutl. affallande fjäll, hvarje med 3 fruktämnena, slutl. vingfrukter. *Blr och bl. samtidiga*. — Pag. 195.

++++ Barrträd.

- 501 PINUS.  $\sigma$  hänge af talrika ståndarknappar, fästade hvarje vid ett fjäll, utan hyls. —  $\phi$  kotis af tegel-lagda fjäll, slutl. utväxande och tillhårdnande, hysande hvar och ett 2 nakna frön. — Pag. 197.

### 7 Ordn. SYNGENESIA.

En del ståndare sammanväxta.

- 502 BRYONIA. Blomfoder 5flikigt, ofvanpå fruktämnet. Krona 5delad. Ståndare 5, hopväxta i 3 stammar [en fri]. — Stift 3deladt. Frukt: bär med 5—6 plattade frön. *Blångående ört.* — Pag. 134.

## 22 KLASSEN

## DIOECIA.

## 1 Ordn. MONANDRIA. Stånd. 1.

- 503 NAJAS. Blomkalk enkel flasklik, inneslutande befruktn.delarne och upptill samman-  
dragen till en 2—3flikig hals. ♂knapp 4rummig, slutl. söndersprängande kalken i  
3—4 flikar. — ♀frukttämne utan stift och märke, slutl. bildande en nöt, innesluten  
i och affallande med kalken. *Blr i stjelkleterna.* — Pag. 210.  
(*Salix purpurea* 22, 2.)

## 2 Ordn. DIANDRIA. Stånd. 2.

- 504 SALIX. Blr i hängen af enkla tegel-lagda fjäll, hysande befruktn.-delarne samt 1—2  
honungsglandler i st. för kalk. Fröhus 2skaligt, enrummigt; frön med fjun. *Träd  
ell. buskar med odelade blad.* — Stånd. stundom 1 ell. 3, hos en art 4—8. —  
Pag. 188.

(*Frazinus* 23, 2.)

## 3 Ordn. TRIANDRIA. Stånd. 3.

- 505 EMPETRUM. Fod. och krona 3bladiga. ♀märke sköldlikt och omkring 9stråligt.  
Frukt: bär med omkr. 5 frön. *Var. med 2könade blr.* — Pag. 171.  
(*Eriophorum* 3, 1. *Salix triandra* och *undulata* 22, 2. *Juniperus* 22, 8.)

## 4 Ordn. TETRANDRIA. Stånd. 4.

- ✓ 506 VISCUM. Blomhylle enkelt kronlikt 4deladt. ♂knappar fästade på hyllebladen. —  
Märke knopplikt, n. utan stift. Frukt ett enfröigt bär, under blomman. *Klynne-  
grenig parasilbuske på Ask, Ek m. m.* — Pag. 39.
- ✓ 507 HIPPOPHAE. ♂hylle enkelt foderlikt 2deladt. — ♀hylle klubblikt urnupet, med  
hornlikt, utskjutande märke. Fr. falsk stenfrukt. *Hafstrandbuske med torniga  
qvistar.* — Pag. 180.  
(*Rhamnus cathart.* 5, 1. *Urtica dioica* 21, 4. *Salix pentand.* 22, 2.  
*Myrica* 22, 6.)

## 5 Ordn. PENTANDRIA. Stånd. 5.

- 508 HUMULUS. ♂: Blr i greniga, glesa klasar; blomhylle enkelt foderlikt 5deladt. —  
♀blr i ax af omkring pistillen strutlikt hopvridda fjäll Stift 2. Frukt: en skrynk-  
lig fröblåsa, affallande med det nölika fröet. — Pag. 181.  
(*Ribes alp.* 5, 1. *Salix pentand.* 22, 2. *Myrica* 22, 6.)

## 6 Ordn. HEXANDRIA. Stånd. omkr. 6.

- 509 MYRICA. ♂- och ♀hängen af platta tegel-lagda enblommiga fjäll. Stånd. 4—6.

säll. flere. Märken 2. Frukt: kotte af små enfröiga, falska stenfrukter. *Starkt luktande blad.* — Pag. 197.

(*Rumex scutal.*, *thyrsoid.*, *Acet.* och *Acetosella* 6, 3.)

## 7 Ordn. OCTANDRIA—POLYANDRIA.

. Stånd. 8 och deröfver.

† Träd.

510 **POPULUS.** Blr i hängen af tegel-lagda fjäll, hvar et hysande ett enkelt strut-ell. skål-lik hyllefjäll, hvari befruktn.delarne äro fästade. ♀märken 2, 2—4klufna. Fröhus enrummigt, 2skaltigt; frön med fjun. *Träd med blr på bar qvist.* — Pag. 187.

†† Örter.

511 **RHODIOLA.** Blomhyll *dubbelt.* Foder 4deladt. Krona 4bladig. Stånd. 8. Pist. 4. Karpeller 4, uppbristande på inre sidan. — Pag. 138.

512 **MERCURIALIS.** Hyll *enkelt foderlikt* 3deladt. Stånd. 9—12. Stift kort. 2deladt, med 2 märken. Fröh. 2knöligt, 2rummigt, 2fröigt. *Örter med motsatta blad.* — Pag. 172.

513 **STRATIOTES.** Hyll *dubbelt.* Foder 3deladt. Krona 3bladig. Stånd. *många*, en del utan knappar. Honblirna med 6, 2delade stift, 6kantigt fruktämne under blomman och *många* ofruktsamma ståndare. Frukt bärlik 6rumm. *mångfröig. Aloe-lik vattenväxt med långa taggsågade blad.* — Pag. 209.

514 **HYDROCHARIS.** Hyll *dubbelt.* Foder och krona 3bladiga. Stånd. 9 med, och 3 utan knappar. ♀blirna med 6 stift och 2klufna märken, samt 3—6 trådlika ståndare-ämnen. Fruktämne under blomman, slutl. bärlik, 6rummig, *mångfröig. Vattenört med hjerlikt rundade flytande blad.* — Pag. 209.

(*Silene acaulis* 10, 3. *Melandrium* 10, 4. *Rubus Chamæmoris* 12, 3. *Salix pentland.* 22, 2. *Myrica* 22, 6. *Acer* 23, 2.)

## 8 Ordn. MONADELPHIA.

Ständersträngar hopväxta.

515 **JUNIPERUS.** ♂: Kottelik gyttning af sköldlika fjäll, hvarje med 3—6 knappar på bakre kanten utan hyll. — ♀kotte af tegel-lagda fjäll, slutl. hopväxande till en torr bärlik 3fröig kotte [bärkotte]. — *Buske ell. litet träd med syl-lika barr, blå bärlika frukter.* — Pag. 198.

516 **TAXUS.** ♂: Ståndarknappar omkr. 8, *kransvis fästade* på undre sidan af sköldlika skåfada fjäll. — ♀blr *ensamma* med ett otydligt ringformigt hyll, slutl. *enfröig*, nödlik frukt, innesluten i det strål-lik utvidgade bärlika hyllet. *Litet träd ell. buske med 2sidigt fästade, platta barr.* — Pag. 198.

## 23 KLASSEN

# POLYGAMIA.

### 1 Ordn. MONOECIA.

Enkönade blr på samma stånd som de 2könade.

- ✓ 517 **PARIETARIA.** Blomkalk enkel klocklik 4klufven. Stånd. 4. Pist. med *enkelt* stift och sköldlikt, hårkantadt märke. Fukt en i kalken innesluten nöt. *Ört med helbräddade blad, små gröna blomsamlingar.* — Pag. 181.
- 518 **ATRIPLEX.** 2könade blr med enkel foderlik 5delad kalk, 5 stånd. och 2deladt stift. — ♀kalk 2deladt ell. *djupt 2klufven, platt-tryckt*, inneslutande det fria, på kant stående, plattade fröet, omgifvet af en tunn skorplik fröblåsa. *Örter med små, oskaftade, gröna blomsamlingar.* — Pag. 181.
- ✓ 519 **HALIMUS.** 2könade blr som hos föreg. — ♀kalk *platt-tryckt, omv. hjertlik, grundt 2flikig*, med frö som hos föreg. omgifvet af en hinnaktig fröblåsa. *Kust-örter med spadlika helbräddade blad; gylltrade blr.* — Pag. 183.  
(*Holcus, Hierochloa, Avena elat. och Hordeum 3, 2. Poterium 21, 6. Empetrum 22, 3. Fraxinus och Acer 23, 2.*)

### 2 Ordn. DIOECIA.

Enkönade blr på olika stånd med de 2könade.

- 520 **FRAXINUS.** *Blomhylla 0.* 2könade blr af 2 stånd. med korta strängar; 1 pistill med 2klufvet märke. — ♂blr af 2 stånd. *utan* strängar. Fukt plattadt vingfrukt, med ett bihang *i spelsen.* *Träd med parbladiga blad.* — Pag. 56.
- 521 **ACER.** Blomhylla dubbelt. Foder 5deladt. Kronblad 4—5. Stånd. 8—10. Pist. med 2 märken. — ♂blr: ståndare *med långa* strängar, omärklig felsläende pistill. ♀blr med utdragen pistill, felsläende knappar med korta strängar. Fukt 2frög vingfrukt, med bihang *åt begge sidor.* *Träd med handlikt flikade blad.* — Pag. 84.  
(*Empetrum 22, 3.*)

## 24 KLASSEN

# CRYPTOGAMIA.

### 1 Ordn. FILICES. Ormbunkväxter.\*)

† *Equisetaceæ*. Bladlösa växter med ledad stam och slidor vid lederna; i toppen ett ex af sköldlika fjäll med sporgömmen på undre sidan.

522 **EQUISETUM**. Groddkorn [sporer] försedda med 2, klubblika elastiska springtrådar. *Stjelkar trinda refflade, enkla ell. kransgreniga*. — 285.

†† *Marsileaceæ*. Växter utan annan stam, än en trådlik rotstock, som bär enstaka sittande blad och vid dessas bas kortskaftade fruktgömmen.

523 **PILULARIA**. Fruktgömmen klotrunda 4rummiga, 4skaliga, innehållande sporgömmen af 2 slag. *Blad trådlika*. — Pag. 287.

+++ *Isoetes*. Växter med mycket kort och hoptryckt, n. skiflik rotstock, som bär ett enda bladknippe, och sporgömmen inom bladens bas.

524 **ISOËTES**. Sporg. inom själva bladens bas, en del innehåll. stora, en del ytterst fina sporer. *Blad syl-lika, inv. 4pipiga, vid basen lökformigt vidgade*. — Pag. 287.

++++ *Lycopodiaceæ*. Växter med mångbladig stam och sporgömmen antingen i bladvecken eller i ex af tegel-lagda fjäll.

525 **LYCOPodium**. Sporgömmen likformiga njurlika, alla med fina pulverlika sporer. *Blad styfva, barrlika*. — Pag. 288.

526 **SELAGINELLA**. En del sporgömmen njurlika med fina sporer; andra 3—4knöliga med 3—4, stora sporer. *Mjuk, nedtill grenig ört*. — Pag. 289.

+++++ *Polypodiaceæ*. [Jemte följ. afdelning *Filices verae*]. Växter med rotstock och ett ell. flere, ofta talrika stamblad, med sporgömmen på bladens baksida ell. kant, hos *Osmunda* gytttrade i skiljd vipplik samling.\*\*)

\* Sporgömm. med tydlig ring, samlade i plättar ell. linier på bladens baksida.

a — Fruktplättar runda, utan svepefjäll.

527 **POLYPODIUM**. Plättar vanl. åtskiljda ell. slutl. något sammanflytande. *Stambladet enkelt och paradeladt, ell. flere gånger sammansatt*. — Pag. 278.

\*) Linnés Filices bestå af så olikbildade familjer, att de hafva högst få karakterer gemensamma, hvarför vid examingeringen alla afdelningarnas eller familjernas karakterer måste jämföras.

\*\*) Sporgömmet omgifves af en ledad, elastisk ring, som vid mogningen brister och klyfver det i 2 delar; hos *Osmunda* finnes blott ämne till denna ring. Hela växten ofvan jord liknar vanligen ett blad [stamblad], med underjordisk stam ell. rotstock; ofta bär detta blad fröredningen, samlad i runda ell. linieformiga fruktplättar på baksidan, mer eller i kanten. Dessa plättar äro antingen bara, eller täckta med ett hinnaktigt svepefjäll, som hos äldre plättar, hvilka stundom sammanflyta, ofta hopkrymper och blir otidligt.

b — Fruktplätt. rundade, med svepefjäll.

- 528 **ASPIDIUM**. Plätt. *åtskiljda*. Svepefjället fästadt *midt i plätten*, sköldlikt, med rundtom fri kant. *Stambl. en gång ell. dubbell parbladigt*. — Pag. 279.
- 529 **POLYSTICHUM**. Plätt. *åtskiljda*. Svepe fästadt *med ett veck i plättens kant*, njurlikt rundadt. *Stambl. som hos föreg.* — Pag. 279.
- 530 **CYSTOPTERIS**. Plätt. *åtskiljda*. Svepe n. skål-likt, fästadt *under plätten* och i början betäckande densamma med sin fria hinnaktiga kant. *Svepe snart förkrympt och otydligt*. — Pag. 280.
- 531 **WOODSIA**. Plätt. *snart sammanflytande, omgifna af skålformiga, hårligt fransiga svepen*. *Bladen meränd. slutt. bruna, och budna på baksidan*. — Pag. 280.

c — Fruktplätt. aflånga—jemnbreda, med svepefjäll.

- ✓ 532 **ASPLENIUM**. Plätt. aflånga—jemnbreda; svepe af samma form, fästadt *med långsidan vid plättens yttre kant* och öppnande sig från bladnerven. *Stambladet mer och mindre sammansatt*. — Pag. 281.
- ✓ 533 **SCOLOPENDRIUM**. Plätt. jemnbreda, med 2 *svepen* fästade *å ömse sidor om plätten* och öppnande sig från dennes medel-linie. *Stambladet enkelt och odeladt*. — Pag. 282.

d — Fruktplätt. sammanhäng. i en ofafbruten linie längs bladkanten, utan svepefjäll.

- 534 **PTERIS**. Plätt. täckta af den tillbakavikna hinnaktiga bladkanten. — Pag. 282.

\*\* Sporgömm. med tydlig ring på baksidan af egna, med de öfriga något olika, fruktbärande blad.

- 535 **BLECHNUM**. Fruktblad *en gång pardelade*, med 2:ne, jemnbreda parallela, snart sammanflytande plättar på hvarje slik, *täckta med ett jemnbredt svepe*. — Pag. 283.

- ✓ 536 **ALLOSORUS**. Fruktblad *flere gånger sammansatta*; plätt. som hos föreg. täckta af bladflikarnes omvikna kanter, *utan särskildt svepe*. — Pag. 283.

- 537 **STRUTHIOPTERIS**. Fruktbl. *en gång pardelade*. Plättar under bladflikarnes omvikna och inskurna kant, *slutt. betäckande flikarnes hela baksida*, med ett snart afvallande svepe. — Pag. 282.

\*\*\* Sporgömm. med tydlig ring; plättar knopplika, fästade i bladens kant.

- 538 **HYMENOPHYLLUM**. Plättar inneslutna af 2 svepefjäll. — Pag. 283.

\*\*\*\* Sporgömm. med otydlig ring, gytttrade i axgrenig vippa [bildad af de öfversta, smärre bladparen, hvilkas baksida täckes af frukt-plättarne].

- ✓ 539 **OSMUNDA**. Sporgömm. kortskäftade, nädlikt strimmiga, med ämne till ring, och öppnande sig med en längdremna. — Pag. 283.

+++++ *Ophioglossæ*. Växter med 1—2 ofruktsamma blad, nedom det till ett enkelt ell. sammansatt ax omvandlade fruktbär. bladet; sporgömm. utan ring.

- 540 **BOTRYCHIUM**. Sporgömm. oskäftade, *icke sammanhängande*, i ett *grenigt ax* och öppnande sig till midten med en tvärremna. *Det gemensamma skafet bärande 1—2, mer och mindre delade ofruktsamma blad*. — Pag. 284.

- 541 **OPHIOGLOSSUM**. Sporgömmen oskäftade, *sammanhängande*, i ett *enkelt, 2sidigt ax* och öppnande sig med en tvärremna. *Skaftet med ett odeladt ofrukts. blad på sidan och ett ensamt ax i toppen*. — Pag. 285.

# FRIES' NATURLIGA SYSTEM.

## A. COTYLEDONEÆ.

Växter, med frön, som innehålla eller vid groningen utveckla hjertblad och brodd. —  
Hafva blommor med 2 bestämda kön, häraf kallade *Phanerogamæ* L., och i sin byggnad tydliga kärl: *Vasculares* DC. \*) samt blad med klyföppningar.

### I. DICOTYLEDONEÆ.

Växter med 2:ne hjertblad. — *Exogenæ* DC. ell. utampå tillväxande, emedan de, som hafva flerårig stam [träd och buskar], föröka denna efter hela sin längd genom nya tydliga vedlager eller årsringar, de yngre lagda utanpå de äldre.

#### Ser. I. COROLLIFLOREÆ.

Blomkrona sambladig, med ståndarne fästade på sin insida.

I Kl. SEMINIFLOREÆ: kronan fästad ofvanpå fruktämnet.

I Ordn. Med samgömmig frukt. \*\*)

1 Fam. *Synantheræ* [*Compositæ* L.]. Ands. N. F. t. 1, f. 1—5.

2 — *Dipsacæ*. — Ands. t. 1.

3 — [*Ambrosiaceæ*]. — t. 1.

4 — *Valerianeæ*. — Ands. t. 2, f. 1, 2.

\*) Så väl i dessa bestämningar, som i all klassifikation af växterna finnas undantag; således sakna några få *Phanerogamer* hjertblad, t. o. m. ett par släkten bestämda ståndare; några sakna kärl, hvilka åter träffas hos de till *Cryptogamerna* räknade *Ormbunkarne*; Mossorna hafva 2:ne kön o. s. v.

\*\*) Ordningarne i den af Fries gifna klaven utmärkta med a, — b, — c — äro i alla Hjerbladsväxternas klasser de samma, ehuru en eller två kunna saknas i Skandinaviska flora; de äro byggda på fruktens beskaffenhet och 3 till antalet.

a: Samgömmig frukt: flere kransvisa småfrukter, samväxta sinsemellan till en odelbar frukt.

b: Skiljdgömmig: småfrukter flere, åtskiljda, hvarje af ett skal [ett kring fröfästet hopväxt fruktblad].

c: Enkelgömmig: frukt af flere med kanterna sammanväxta skal ell. fruktblad och med fröfästen längs skalens insida eller ett centralt.



- 2 Ordn. Skiljdgömm. frukt.  
 5 Fam. *Rubiaceæ*. — And. t. 2.
- 3 Ordn. Enkelgömm. frukt.  
 6 Fam. *Loranthaceæ*. — And. t. 2.  
 7 — *Caprifoliaceæ*. — And. t. 2.
- 2 Kl. ANNULIFLORÆ: kronan fästad rundtomkring [ej under] fruktämnet, öppen i botten.
- 1 Ordn. Samg. frukt.  
 8 Fam. *Campanulaceæ*. — And. t. 3.  
 9 — *Lobeliaceæ*. — t. 3.  
 10 — *Convolvulaceæ*. — And. t. 3.
- 2 Ordn. Skiljdg. frukt.  
 11 Fam. *Boraginææ*. — And. t. 3.  
 12 — *Labiataæ*. — t. 4, f. 1—8.
- 3 Ordn. Enkelg. frukt.  
 13 Fam. *Menyantheæ*. — And. t. 4.  
 14 — *Polemoniaceæ*. — And. t. 4, f. 1, 2.
- 3 Kl. TUBIFLORÆ: kronan fästad under fruktämnet, sluten i botten.
- 1 Ordn. Samg. frukt.  
 15 Fam. *Oleineæ*. — And. t. 5.  
 16 — *Verbenaceæ*. — t. 5.
- 2 Ordn. Skiljdg. frukt.  
 17 Fam. *Asclepiadeæ*. — And. t. 5.
- 3 Ordn. Enkelg. frukt.  
 18 Fam. *Gentianeæ*. — And. t. 5.  
 19 — *Solanaceæ*. — And. t. 6.  
 20 — *Personateæ*. — t. 5, f. 1—4.  
 21 — *Lentibularieæ*. — t. 6, f. 1, 2.  
 22 — *Primulaceæ*. — t. 6.  
 23 — *Globularieæ*. — t. 6.  
 24 — *Plantagineæ*. — t. 6, f. 1, 2.  
 25 — *Plumbagineæ*. — t. 6.

## Ser. 2. THALAMIFLORÆ.

Blomkrona af flere fria blad; ståndare fästade jemte kronbladen på ett eget fäste.

- 4 Kl. DISCIFLORÆ: ståndare och kronblad fästade på kanten af en, öfver eller omkring fruktämnet befintlig disk.
- 1 Ordn. Samg. frukt.  
 26 Fam. *Cornææ*. — And. t. 7.  
 27 — *Celastrineæ*. — t. 7.
- 2 Ordn. Skiljdg. frukt.  
 28 Fam. *Araliaceæ*. — t. 7.  
 29 — *Umbellifereæ*. — t. 8.  
 30 — *Adoxææ*. — t. 7.
- 3 Ordn. Enkelg. frukt.  
 31 Fam. *Acerineæ*. — And. t. 8.  
 32 — *Resedaceæ*. — t. 8.
- 5 Kl. SERTIFLORÆ: stånd. och kronblad fästade rundtomkring ell. på fruktämnet bss.
- 1 Ordn. Samg. frukt.  
 33 Fam. *Nymphaeaceæ*. — And. t. 9.
- 2 Ordn. Skiljdg. frukt.  
 34 Fam. *Ranunculaceæ*. — And. t. 9, f. 1—4.
- 3 Ordn. Enkelg. frukt.  
 35 Fam. *Berberideæ*. — And. t. 9.  
 36 — *Papaveraceæ*. — t. 9.  
 37 — *Fumariaceæ*. — t. 10.  
 38 — *Crucifereæ*. — t. 10, f. 1—7.

39 Fam. *Polygaleæ* — Ands. t. 10.

40 — *Balsamineæ* — t. 10.

6 KL. COLUMNIFLORÆ: stånd. fästade under fruktämnet på ett punkt- ell. pelar-  
likt fäste.

1 Ord.. Samg. frukt.

41 Fam. *Tiliaceæ*. — Ands. t. 11.

2 Ord. Skiljdg. frukt.

42 Fam. *Malvaceæ*. — Ands. t. 11.

43 — *Gruinales*. — t. 11, f. 1—3.

3 Ord. Enkelg. frukt.

44 Fam. *Hypericineæ*. — Ands. t. 11.

45 — *Cistineæ*. — t. 11.

46 — *Violariææ*. — t. 12.

47 — *Droseraceæ*. — t. 12.

48 — *Silenaceæ*. — t. 12, f. 1, 2.

49 — *Alsineææ*. — t. 12, f. 1—3.

50 — *Elatineæ*. — t. 12.

### Ser. 3. CALYCIFLORÆ.

Blomkrona af fria blad, jemte ståndarne fästade på blomfodret.

KL. FAUCIFLORÆ: ståndarne fästade i fodrets svalg vid öfre kanten af den tunna  
torus.

1 Ord. Samg. frukt.

51 Fam. *Cucurbitaceæ*. — Ands. t. 13.

52 — *Ribesiaceæ*. — t. 13.

53 — *Rhamneæ*. — t. 7.

2 Ord. Skiljdg. frukt.

54 Fam. *Saxifrageæ*. — Ands. t. 13.

55 — *Crassulaceæ*. — t. 13.

3 Ord. Enkelg. frukt.

56 Fam. *Lythrarieæ*. — Ands. t. 13.

57 — *Onagrarieæ*. — t. 14.

58 — *Halorageæ*. — t. 14.

8 KL. ROSIFLORÆ: stånd. fästade vid den ringformigt uppsvällda öfre kanten af  
torus.

1 Ord. Samg. frukt.

59 Fam. *Pomaceæ*. — Ands. t. 14.

2 Ord. Skiljdg. frukt.

60 Fam. *Senticosæ*. [*Rosaceæ* Juss.] — Ands. t. 15, f. 1—4.

3 Ord. Enkelg. frukt.

61 Fam. *Drupaceæ*. — Ands. t. 14.

62 — *Papilionaceæ*. — t. 15, f. 1—6.

9 KL. CENTRIFLORÆ: ståndarne fästade i fodrets botten vid en punktlik ell. omärklig  
torus.

1 Ord. Samg. frukt.

63 Fam. *Ericineæ*. — Ands. t. 16, f. 1—3.

64 — *Empetreeæ*. — t. 16.

2 Ord. Skiljdg. frukt.

65 Fam. *Euphorbiaceæ*. — Ands. t. 16.

3 Ord. Enkelg. frukt.

66 Fam. *Tamariscineæ*. — Ands. t. 17.

67 — *Portulacaceæ*. — t. 17.

68 — *Paronychieæ*. — t. 17.

69 — *Polygonææ*. — t. 17.

## Ser. 4. INCOMPLETÆ.

Blommor ofullständiga, utan egentliga kronblad, endast med enkel kalk, af fjäll o. s. v.

## 10 Kl. BRACTEIFLORÆ: blomkalk enkel, bildad af flere i krans samväxta skärblad.

## 1 Ordn. Samg. frukt.

70 Fam. *Aristolochiaceæ*. — Ands. t. 18.

71 — *Santalaceæ*. — t. 18.

72 — *Thymeleæ*. — t. 18.

73 — *Elæagneæ*. — t. 18.

## 3 Ordn. Enkelg. frukt.

74 Fam. *Ulmaceæ*. — Ands. t. 19.

75 — *Urticaceæ*. — t. 19, f. 1, 2.

76 — *Amarantaceæ*. — t. 19.

77 — *Chenopodiaceæ*. — t. 19.

## 11 Kl. JULIFLORÆ: blommor skiljddkönade, förenade i ett hänge, utan annan kalk än fjäll och dyl.

## 1 Ordn. Samg. frukt.

78 Fam. *Cupuliferæ*. — Ands. t. 20.

## 3 Ordn. Enkelg. frukt.

79 Fam. *Salicineæ*. — Ands. t. 20.

80 — *Betulineæ*. — t. 20.

81 — *Myriceæ*. — t. 20.

82 — *Coniferæ*. — t. 20, f. 1—3.

---

83 — *Equisetaceæ* \*) — t. 21.

## 12 Kl. NUDIFLORÆ: blommor utan hylle, sittande utan skaft i bladveckan.

## 2 Ordn. Skiljdg. frukt.

84 Fam. *Callitrichineæ*. — Ands. t. 21.

## 3 Ordn. Enkelg. frukt.

85 Fam. *Ceratophylleæ*. — Ands. t. 21.

---

86 — *Characeæ* \*\*) — t. 21.

## II. MONOCOTYLEDONEÆ.

Växter med 1 hjertblad. — *Endogeneæ* DC. inuti tillväxande genom lagrens rigning inåt, ehuru de sedan tränga utåt och förlora sig, utan tydl. ringar, i de yttre lagren.

## 13 Kl. FRUCTIFLORÆ: blomkalcken med ståndarne fästade ofvanpå fruktämnet.

## 1 Ordn. Samg. frukt.

87 Fam. *Orchideæ*. — Ands. t. 22, f. 1—5.

88 — *Irideæ*. — t. 22.

89 — *Narcissineæ*. — t. 22.

---

\*) Upptages i detta verk bland *Filices*.

\*\*) Afhandlas ej i detta verk, såsom närmast hörande till *Algæ*.

- 2 Ord. Skiljdg. frukt.  
90 Fam. *Hydrocharideæ*. — Ands. t. 22.
- 3 Ord. Enkelg. frukt.  
91 Fam. *Najadeæ*. — Ands. t. 22.
- 14 Kl. LILJIFLORÆ: kalk af 3 ell. 6 [fria eller hopväxta] blad, jemte ständerne fästade under frukttämnet.
- 1 Ord. Samg. frukt.  
92 Fam. *Liliaceæ*. — Ands. t. 23, f. 1—4.  
93 — *Colchitaceæ*. — t. 23.
- 2 Ord. Skiljdg. frukt.  
94 Fam. *Alismaceæ*. — Ands. t. 23, f. 1—3.
- 3 Ord. Enkelg. frukt.  
95 Fam. *Nartheciaceæ*. — Ands. t. 23.  
96 — *Juncaceæ*. — Ands. t. 23.
- 15 Kl. SPADICIFLORÆ: kalk 0, 4bladig, ell. af fjäll, hår ell. dyl. Blommor uta skaff.
- 1 Ord. Samg. frukt.  
97 Fam. *Aroideæ*. — Ands. t. 24, f. 1, 2.
- 2 Ord. Skiljdg. frukt.  
98 Fam. *Potamogetoneæ*. — Ands. t. 24.
- 3 Ord. Enkelg. frukt.  
99 Fam. *Typhaceæ*. — Ands. t. 24.  
100 — *Cyperaceæ*. — t. 24, f. 1—3.
- 16 Kl. GLUMIFLORÆ: Gräs. Blommor bildande småax af skiftevisa yttre och inre fjäll.
- 3 Ord. Enkelg. frukt.  
101 Fam. *Gramineæ*. — Ands. t. 25, f. 1—10.

## B. NEMEÆ.

Växter utan verkliga frön, blott med enkla groddkorn, som utväxa till en groddtråd, utan hjertblad och verklig brodd: *Acotyledoneæ* Juss. — Hafva inga ell. mikroskopiska, stånd. och pist. motsvarande befruktningsdelar; häraf kallade *Cryptogamæ* L. Såsom bestående af blott cellväf utan spiralkärl [undant. *Filices*], höra de till *Cellulares* DC.

### III. HETERONEMEÆ.

Växter med rot och stam, den sednare försedd med tydliga, gröna blad. Groddtråden utvecklar en plattad del, kallad *proembryo* (förgrodd).

- 17 Kl. FILICES: försedda med tydliga kärl; befruktningsorganer på förgrodden.
- 102 Fam. *Polypodiaceæ*. — Ands. t. 26.  
103 — *Ophioglosseæ*. — t. 26.  
104 — *Marsileaceæ*. — t. 26.  
105 — *Isoeteæ*. — t. 26.  
106 — *Lycopodiaceæ*. — t. 26.
- 18 Kl. MUSCI: växter af blott celluler, endast med spår till kärl; befruktningsorganer på den utvecklade växten.
- 107 Fam. *Bryaceæ*. — Ands. t. 27, f. 1—7.  
108 — *Sphagnaceæ*. — t. 27, f. 5, c.  
109 — *Hepaticæ*. — t. 27, f. 1—4.

## IV. HOMONEMEA.\*)

Rot, stam och blad icke skiljda [sällan gröna]. Groddtråd utan förrodd.

19 Kl. ALGÆ: det vegetativa systemet [örten] öfvervägande, utgörande på en gång rot, stam och blad. Lefva af det omgifvande medium, vattnet, omedelbart ell. luften.

110 Fam. *Lichenes*. — Ands. t. 28.

111 — *Byssaceæ*. — t. 28.

112 — *Fucaceæ*. — t. 28.

113 — *Ulvaceæ*. — t. 28.

114 — *Diatomaceæ*. — t. 28.

20 Kl. FUNGI: fröedningen öfvervägande; det vegetativa insäinkt i det ämne, hvarpå växten förekommer, och hvaraf den lefver.

115 Fam. *Hymenomyceles*. — Ands. t. 29.

116 — *Discomyceles*. — t. 29.

117 — *Pyrenomyceles*. — t. 29.

118 — *Gasteromyceles*. — t. 29.

119 — *Hyphomyceles*. — t. 29.

120 — *Coniomyceles*. — t. 29.

Till detta system har Prof. Fries sjelf endast lemnat en Klav, som blifvit utvecklad af sednare författare, hvilkas arbeten ligga till grund för ofvanstående förkortade framställning. Sjelfva Klaven, hvori de 3 ordningarne\*\*) äro utmärkta med bokstäfverna a — b — c —, är vigtig äfven därför, att den åskädligare än hvarje annan framställning visar familjernas så väl närmare som aflägsnare frändskaper [affinitet och analogi]. Den förra råder mellan de familjer, som i samma klass föregå och efterfölja hvarandra, — den sednare, eller analogien, eger rum mellan ordningarne [a — c] så väl i de bredvid hvarandra stående, som i de föregående och efterföljande klasserna i samma longitudinela serie. Sålunda äro 29 *Umbellifera* närmast beslägtade eller affina till *Araliaceæ* och *Adoxæ*; — analoga till *Ranunculaceæ*, *Rubiaceæ* och *Saxifrageæ*. 87 *Orchideæ* affina, till *Irideæ* och *Narcissineæ*; — analoga till *Liliaceæ*, som stå i samma ordning, men olika klass.

## A. COTYLEDONEÆ.

## I. DICOTYLEDONEÆ.

## Ser. 1. COROLLIFLORÆ.

1 Kl. *Seminifloræ*.

- a. 1 *Synantherææ*.
- 2 *Dipsacææ*.
- (3 *Ambrosiaceææ*.)
- 4 *Valerianææ*.
- b. 5 *Rubiaceææ*.
- c. 6 *Loranthaceææ*.
- 7 *Caprifoliaceææ*.

2 Kl. *Annulifloræ*.

- a. 8 *Campanulaceææ*.
- 9 *Lobeliaceææ*.
- 10 *Convolvulaceææ*.
- b. 11 *Boraginææ*.
- 12 *Labiataææ*.
- c. 13 *Menyantheææ*.
- 14 *Polemoniaceææ*.

3 Kl. *Tubifloræ*.

- a. 15 *Oleineææ*.
- 16 *Verbenaceææ*.
- b. 17 *Asclepiadææ*.
- c. 18 *Gentianeææ*.
- 19 *Solanaceææ*.
- 20 *Personateææ*.
- 21 *Lentibulariæææ*.
- 22 *Primulaceææ*.
- 23 *Globulariæææ*.
- 24 *Plantaginæææ*.
- 25 *Plumbaginæææ*.

\*) Till denna Afdelning hörande familjer afhandlas icke i detta verk.

\*\*) Prof. Fries har i den ursprungliga klaven i *Flora Scanica* äfvensom i v. Dübens Handb. i *Växtrikets Nat. Familjer* (Stockh. 1841) endast 3 Ordningar, neml. Familjer med *fructu holocarpio*, *fr. schizocarpio* och *fr. syncarpio*; till dessa hafva i Schagcs och Arrhenii framställning ännu 2ne Ordningar tillkommit.

## Ser. 2. THALAMIFLORÆ.

4 Kl. *Discifloræ*.

- a. 26 *Cornææ*.
- 27 *Celastrinææ*.
- b. 28 *Araliaceæ*.
- 29 *Umbelliferææ*.
- 30 *Adotææ*.
- c. 31 *Acerinææ*.
- 32 *Resedaceææ*.

5 Kl. *Sertifloræ*.

- a. 33 *Nymphæaceææ*.
- b. 34 *Ranunculaceææ*.
- c. 35 *Berberideææ*.
- 36 *Papaveraceææ*.
- 37 *Fumariaceææ*.
- 38 *Cruciferaææ*.
- 39 *Polygalæææ*.
- 40 *Balsamineææ*.

6 Kl. *Columnifloræ*.

- a. 41 *Tiliaceææ*.
- b. 42 *Malvaceææ*.
- 43 *Gruinalesææ*.
- c. 44 *Hypericineææ*.
- 45 *Cistineææ*.
- 46 *Violarieææ*.
- 47 *Droseraceææ*.
- 48 *Silenaceææ*.
- 49 *Alsinaceææ*.
- 50 *Elatineææ*.

## Ser. 3. CALYCIFLORÆ.

7 Kl. *Faucifloræ*.

- a. 51 *Cucurbitaceææ*.
- 52 *Ribesiacææ*.
- 53 *Rhamneææ*.
- b. 54 *Saxifragææ*.
- 55 *Crassulaceææ*.
- c. 56 *Lythrarieææ*.
- 57 *Onagrarieææ*.
- 58 *Haloragæææ*.

8 Kl. *Rosifloræ*.

- a. 59 *Pomaceææ*.
- b. 60 *Senticosææ*.
- c. 61 *Drupaceææ*.
- 62 *Papilionaceææ*.

9 Kl. *Centrifloræ*.

- a. 63 *Ericineææ*.
- 64 *Empetreææ*.
- b. 65 *Euphorbiaceææ*.
- c. 66 *Tamariscineææ*.
- 67 *Portulacaceææ*.
- 68 *Paronychieææ*.
- 69 *Polygonæææ*.

## Ser. 4. INCOMPLETEÆ.

10 Kl. *Bracteifloræ*.

- a. 70 *Aristolochiaceææ*.
- 71 *Santalaceææ*.
- 72 *Thymeleææ*.
- 73 *Elæagneææ*.
- c. 74 *Ulmaceææ*.
- 75 *Urticaceææ*.
- 76 *Amarantaceææ*.
- 77 *Chenopodiaceææ*.

11 Kl. *Julifloræ*.

- a. 78 *Cupuliferaææ*.
- b. 79 *Salicineææ*.
- 80 *Betulineææ*.
- 81 *Myricæææ*.
- 82 *Coniferaææ*.

12 Kl. *Nudifloræ*.

- b. 84 *Callitrichineææ*.
- c. 85 *Ceratophylleææ*.

(86 *Characeææ*.)(83 *Equisetaceææ*.)

## II. MONOCOTYLEDONEÆ.

13 Kl. *Fructifloræ*.

- a. 87 *Orchideææ*.
- 88 *Irideææ*.
- 89 *Narcissineææ*.
- b. 90 *Hydrocharideææ*.
- c. 91 *Najadeææ*.

14 Kl. *Liliifloræ*.

- a. 92 *Liliaceææ*.
- 93 *Colchicaceææ*.
- b. 94 *Alismaceææ*.
- c. 95 *Nartheciaceææ*.
- 96 *Juncaceææ*.

15 Kl. *Spadicifloræ*.

- a. 97 *Aroideææ*.
- b. 98 *Potamogetoneææ*.
- c. 99 *Typhaceææ*.
- 100 *Cyperaceææ*.

16 Kl. *Glumifloræ*.

- c. 101 *Gramineææ*.

## B. NEMEÆ.

## III. HETERONEMEÆ.

17 Kl. *Filices*.

- 102 *Polypodiaceææ*.
- 103 *Ophioglossæææ*.
- 104 *Marsileaceææ*.
- 105 *Isoetæææ*.
- 106 *Lycopodiaceææ*.

18 Kl. *Musci*.

- 107 *Bryaceææ*.
- 108 *Sphagnaceææ*.
- 109 *Hepaticæææ*.

## IV. HOMONEMEÆ.

19 Kl. *Algæ*.

- 110 Lichenes.
- 111 Byssacææ.
- 112 Fucacææ.
- 113 Ulvacææ.
- 114 Diatomacææ.

20 Kl. *Fungi*.

- 115 Hymenomycetes.
  - 116 Discomycetes.
  - 117 Pyrenomycetes.
  - 118 Gasteromycetes.
  - 119 Hyphomycetes.
  - 120 Coniomycetes.
-

# SVERIGES OCH NORGES VÄXTER

EFTER FRIES' SYSTEM.

## I. DICOTYLEDONEÆ.

### 1 Serien: COROLLIFLORÆ.

#### 1 KLASSEN

#### SEMINIFLORÆ.

1 Fam. **SYNANTHEREÆ** Rich. Blommor gytttrade inom en gemensam holk, bildande en blomkorg. Ståndare fästade i den sambladiga kronans pip, med knapparne hopväxta omkring stiftet. Frukt sittande under kronan, enfröig, samt oskiljbart omsluten af fodret [skalfrukt]. Fröhvite 0\*).

1 Flocken **Corymbifereæ** Juss. Blrna antingen rörformiga i blomkorgens midt och tunglika i dess kant [strålblr], ell. stundom alla rörformiga. Stiftet cylindriskt, icke uppsväldt ell. ledadt.

a) **Senecionidæ.** Stiftets 2 likar [märkena] jemnbreda, med en hårpensel i spetsen.

#### 1. BIDENS Lin. Brunskära.

1 **B. tripartita** L. bladen *skafade*, meränd. 3klufna ell. 3delade med inskurna och tandade likar; blomkorg. utan strålblommor, *uppräda*; skalfrukter med 2—3 borst. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.2178. H.N.f.16, n:o 1.

\**frondosa* Retz. bl. vanl. 3-5delade; blomkorg. mer utbredda med mycket stora yttre holkblad. Fig. H.N.f.16, n:o 2.

Våta st. a. (Sk.—Um. Lpm.—N. — \* Sk. och Hall. enl. Retz. Obs.; trol. mångenstād. med hufvudformen.) *Folshög, stund. ett par tum hög med odelade bl. \**, ell. *B. platycephala* Oerst., är en medelform till följ. art, som den, då bl. äro odelade, rätt mycket liknar, ehuru till hufvudsakt. karakterer knappt skiljbar från föreg.

2 **B. cernua** L. bladen odelade halstomfattande, lancettlika—jemnbreda sågade; blomk. lutande; frukthorster vanl. 4. ☉ 7, 8, g. blr. — *β radiata*: med utdragna strålblr. Fig. Fl.D.481.

\*) I de familjer, der fröhviten icke nämnes, finnes den alltid.



Våta st. (Sk.—Helsl. Medelp. Sundsvall enl. J. A. Lem. Ångml. Thorsåker sn. Verm. Boh. Hall. Öl. Götll. — N. — β Sk. — Södml. Stockh. Helsl. Mo sn: J. A. Wistr. Vestml. Ner. Verm. Boh. Hall. — N. söd. del.) Var. stund. enblomstrig och ett par tum hög: *B. minima* L. — β är *Coreopsis* *Bidens* L.

## 2. CHRYSANTHEMUM Lin. Prestkrage.

† Skalkfrukt naken [utan fruktkrona].

- 1 *C. segetum* L. bladen halftomfattande, vid basen sågade, mot spetsen flåkiga och tandade; holkfjällen bredt aggrunda. ☉ 7, 8, g. strålbl. Fig. Sv.B.496. Fl.D.995.  
Åkr. odl. st. (Sk.—Ångml. VB. Neder-Kalix. Vestml. Verm. Dalsl. Boh. Götll. Sparsam ell. sällsynt ofvan Skåne. — N.) Blåaktigt grön, till alla delar glatt, med stora guldgula blomkorgar.
- 2 *C. Leucanthemum* L. de nedre bladen skaftade spadlika, de öfre halftomfattande, lancetlika sågade, vid basen fliktandade — n. parklufna; holksf. lancetlika. 2 7, hv. strålbl. Fig. Sv.B.346. Fl.D.994.  
Torra st. a. (Sk.—VB. och Pit. Lpm. — N. till Nordl.) Var. någongång i Sk. och Blek. utan strålbl.: β *fosciculosum* Aspegr., samt mer och mindre hårig. — *Leucanthem. vulgare* Lam.

†† Skalkfrukt med krona: *Pyrethrum* Sm.

- 3 *C. Parthenium* Pers. bladen parbladigt delade;flikarne inskurna, de öfre sammanflytande; blomkorg. i kvastlik samling. 2 7, 8, hv. strålbl. Fig. Sv.B.285. Fl.D.674.  
Byar etc. r. (Sk.—Uppl. Nerike och Verm. Boh. Troligen öfverallt förvildad. — N. Tellemarken.) Saknar stundom strålbl. — *Matricaria* L. *Leucanthemum* Godr. & Gren.

## 3. MATRICARIA Lin. Sötblomster. Baldursbrå.

† Blomfästet inuti tätt; skalkfr. med 3 åsar: Baldursbrå.

- 1 *M. inodora* L. bladen dubb. parbladigt delade med smalt jemnbreda, n. trådsmla flikar; skalkfrs topp hinnkantad. ☉ 6—8, hv. strålbl. — β *borealis*: holksfjällen dubb. större, aflånga, med bred svart hinnkant. Fig. Fl.D.696. Reich. Corymbif. i D.Fl.1.985, f. 1.  
\**maritima* L. bladflik. kortare, trinda och köttiga. Fig. Reich.1.985, f. 2. H.N.f.12, no 2.
- Odl. st. a., hafsstr. (Sk.—Lpl.—N. — β N. Trondhjem. — Sk.—Boh. Smål. Örb: Scheutz; Kalmar. Stockh. yttre skärg. — N. till Finnsm.) Bladflik. hos hufvudformen platta på undre sidan. Varierar utan strålbl. — *Tripleurospermum* C. H. Schultze och ed. 9. *Pyrethrum* Sm. är vanl. lågväxt ell. nedligg. med smärre blomkorgar, och synes vara var. *salina* Wallr. ell. ämstone derifrån knappt skiljbar.

†† Blomfästet ihåligt; skalkfr. med 5 åsar: Sötblomster.

- 2 *M. Chamomilla* L. bladen dubb. parbl. delade med trådsmla flikar; blomkorg. långt skaftade, med strålbl.; diskbl. 5tandade; skalkfrs topp utan hinnkant [krona]. ☉ 6, 7, hv. strålbl. Fig. Sv.B.50. Fl.D.1764.  
Torra, odl. st. (Sk.—nor. Ångml. Själevad. Jeml. Pit. Lpm. Kuorokveik. Sällsynt norr om Dalelven. — N. till Hedemarken och efter kusten till Trondhj.) Har en stark söttaktig lukt. En var. med färre och nedböjda strålbl. är *M. suaveolens* L.Fl.Su. och Herb.
- 3 *M. discoidea* DC. bl. som föreg.; blomkorg. kort skaftade, utan strålbl.; blr 4tandade; skalkfr. med omärklig krona. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Reich.1.997, f. 2. H.N.f.14, no 5.  
Gator, odl. st. r. (Uppl. Uppsala, på gator och gårdar i Fjerdings samt i Bot. trädg.; vid Simtuna prestg. — N. Christiania, vid Meilemtöjen.) Vanligen mer grenig än föreg., som den liknar till lukten. Blomfästet spetsigt kägellikt. — *Cotula matricarioides* Bong.

## 4. ANTHEMIS Lin. Åkerkullor.

- 1 *A. tinctoria* L. bladen parbladigt delade, småbladen parklufna ell. djupt sågade, under tilltryckt håriga; blomfästet slutl. kullrigt med lancetl. fjäll; skalkfr. med hinnaktig,

odelad fruktikrona. 2. 6. 7. —  $\beta$  *discolor*: bladen n. glatta; strålblirna hvita. Fig. Sv.B.62. Fl.D.741. H.N.f.6, n:o 1.

Torra st. ökr. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Öl. Gottl. — N.) « har i vackra höggula strålblir, hvilka någonsång saknas. — *Cota tinet. Gay.*  $\beta$  *A. maritima Reiz.*

- 2 *A. ardensis* L. bladen parbladigt delade; småbladen enkelt ell. dubbelt parklufna, med inskurnaflikar; blomfästet slutl. n. kägellikt, med lancetlika fjäll; skalfr. med plattad topp, på längden förade af släta åsar.  $\odot$  5—7, hv. strålblir. —  $\beta$  *agrestis*: skalfr. med trubbig toppkant; bladen merindelade. —  $\gamma$  *salina*: bladflikarne köttiga; stjelken nedligg. Fig. Fl.D.1178. H.N.f.15, n:o 1.

Åkerren. a.  $\gamma$  hafsstr. (Sk.—VB.—N.— $\gamma$  Hall. Varberg. Sk. Ystad. Köpingsnäs gamla utlopp.) Bladflikarne hos « bredare, mer blåaktiga, skalfr:s topp omgifven af en hvassare kant;  $\beta$  har gröna, smalare bladflikar: *A. agrestis* Wallr.

- 3 *A. Cotula* L. blomfästets fjäll jemnbreda; skalfr. med rundad naken topp, småknaggligt strimmade; för öfr. som föreg.  $\odot$  5—9, hv. strålblir. —  $\beta$  *salina* Lindeb. nedliggande med köttiga bladflikar. Fig. Sv.B.429. Fl.D.1179.

Byar, gat. (Sk.—Uppsala. Dal. Smedjebacken. Vestm. Verml. nära Carlstad. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. —  $\beta$  Boh. Mollö.) Bladflikarne n. syl-lika. Hela växten illaluktande. — *Morula fetida* Cass.

## 5. ACHILLEA Lin. Nysört (1), Rölleka.

- 1 *A. Ptarmica* L. bladen hela, n. jemnbreda, hvass-sågade, glatta; blomkorgar i qvastlik samling. 2. 7. 8, hv. strålblir. Fig. Sv.B.207. Fl.D.643.

Fukt. st. (Sk.—Hels. Ångml. Hernön: Stud. H. W. Arnell. Dal. söd. delen. Verml. Boh. Gottl. Storungs i Lärbro, samt i Väskinde sn enl. G. v. Cederv. — N. till Trondhj. stift.) Blomkorg. mindre talrika, men mycket större än hos följ.

- 2 *A. Millefolium* L. bladen parbladigt delade, med pardelade och inskurnaflikar; blomkorg. i tät, qvastlik samling. 2. 7—9, hv. ell. rödl. strålblir. —  $\beta$  *lanata*: stjelk, blad och holk ullhåriga. —  $\gamma$  *sordida*: stj. ullhårig; blad och blomsaml. småludna; strålblirna något gulaktiga. —  $\delta$  *setacea*: spenslig, med dubb. smärre blomk., horstlika bladflikar. —  $\varepsilon$  *alpestris*: bladen mer sammansatt delade; blomk. större med bredt svarikantade holkfjäll. Fig. Sv.B.74. Fl.D.737.  $\beta$  Reich.t.1028,f.2;  $\delta$  f.1 och H.N.f.12, n:o 3.

Torra st. a.,  $\beta$  hafsstr. (Sk. — Lpl. — N. till Ost-Finm. —  $\beta$  Smål. Öro: Scheutz; Kalmar. ÖG. Gräsmarö m. fl. st. i skärg.: Kindb. Boh. Koön vid Marstrand. Öl. Gottl. —  $\gamma$  Skåne. Hall. Hasslöv: Theor. —  $\delta$  Sk. Stockh. på Adelsön och Björkö. —  $\varepsilon$  N. Finm. Trondhj. st. Molde.) Var. i hög grad, öfven med röda strålblir.

## 6. TANACETUM Lin. Rensana.

- 1 *T. vulgare* L. bladen parbladigt delade; småbladen parklufvet inskurna och sågade. 2. 8, 9, g. blr. Fig. Sv.B.81. Fl.D.871.

Torra st. (Sk.—Um. Lpm. och VB. — N. till Finm.) Alnshög och derutöfver; bladen ofta krusiga, lukt starkt. — *T. boreale* Fisch., som af Fr. i S.V.Sc. upptages såsom varietet, skiljer sig enl. Ledeb. Fl.Ross. med skalfr. utan fruktikrona.

## 7. ARTEMISIA Lin. Malört, Gråbo.

÷ Blomfästet härigt: *Absinthium Gärttn.*

- 1 *A. Absinthium* L. stjelken upprätt; rothladen 3dubbelt pardelade, stjelkbladen mindre delade med lancetlika flikar, alla bl. tät gråludna; blomkorg. i ensidiga klasar, kort skaftade, nedböjda, n. klotrunda. 2. 8, g. blr. Fig. Sv.B.106. Fl.D.1654.

Byar etc. a. (Sk.—Hels. Ångml. Bjertrå och Långsele. Dal. Verml. Öl. Gottl. — N.) Omkring olnshög; skärmladen hela. — *Absinth. vulgare* Lam.

- 2 *A. rupestris* L. stjelken uppstigande; alla bladen parbladigt delade med smalt jemnbreda flikar; rothladens hela eller 3delade, gleshåriga; blomkorg. som hos föreg. stora. 2. 7, 8, g. blr. Fig. Lin. Gottl. resa. Sv.B.317. Fl.D. suppl.1,t.25. H.N.f.4, n:o 2.

Kalkberg r. (Öl. Gottl.) 1—2 qv. hög; hufvudklasen antingen enkel med blomkorgar på 1—3 liniers skaft, eller delad i smärre klasar med ganska korta bl.skaft; stjelkbladen knappt en half tum långa kammligt flikade.

†† Blomfästet glatt: *Abrolanum* Fr.

\* Blomkorg. rundade, med glatt ell. gleshårig holk.

- \*3 *A. norvegica* Fr. stjelen uppböjd, n. enkel; bladen parbladigt delade i hela eller åter delade, under håriga flikar; blomkorg. *halfrunda*, nedböjda, på *långa enblomstriga* hvitulliga skaft i stjeltens spets och bladvecken. 24 8, g. blr. Fig. Fl.D.801. H.N.f.4, n:o 1.

Fjellv. r. (*N. Dovre*. öfver allt på fjellen vid Kongsvold och Drivdalen. Romsdalen. i Eikisdalen.) *Har sällan mer än 4—6 blomkorg., upplattade n. en half tum vida och således de största i släktet, med bredt hinnkantade mörka holkfjäll.* — *A. rupestris* Fl.D.

- 4 *A. laciniata* W. stj. n. upprätt; bladen parbladigt delade; rotbladens flikar pardelade, stjeltbladens djupt parklufna. med smala spetsade gleshåriga flikar; blomkorg. *klotrunda*, lutande, kort skaftade, i upprätta *mångblomstriga* klasar. 24 8, g. blr. Fig. Fl.D. suppl.1, t.26. H.N.f.4, n:o 3.

Torra st. r. (*Öl. Borgholm*; Skogsby-bet i Thorslunda; Albrunna i söd. Möckleby; Gösclunda i Hulterstad m. fl. st.) — *A. lanacetifolia* Retz.

- 5 *A. campestris* L. stj. uppböjd ell. uppstigande; bladen parbladigt delade, med flerdelade, vanl. glatta, n. trådsmla flikar; blomkorg. *rundadt äggformiga*, lutande, *ganska kort* skaftade, i ensidiga klasar. 24 7—9. — *β sericea*: bladen silkesludna. Fig. Fl.D.1175.

Torra back. (*Sk.—Gestr. och Vestml. VG. Boh.* på Nordkoster; Tanum sn. — *N. Tönsberg, Christiania—Ringerige.* — *β Sk. ÖG. Omberg; Kindb. Uppsala, Slottsbacken. Boh. n. Grebbestad enl. Lem. Öl. Gottl.*) *Blomkorg. mycket små brunaktiga, glatta.*

\*\* Blomkorg. aflånga, med tät hvitluden holk.

- 6 *A. vulgaris* L. stj. upprätt; bladen dubbelt pardelade, med lancettlika inskurna *spetsade* flikar, *under hviludna*: blomkorg. något lutande, n. oskaftade i *mångblomstr. klasar.* 24 8. — *β coarctata*: bladen med smalare, under snöhvitt ulliga flikar; *klasarne sammandragna, täta upprätta.* Fig. Sv.B.417. Fl.D.1176. *β* Lin. Inst. Skrift.t.1. Reich.t.1038.f.2.

Åkerren, etc. a. (*Sk.—VB. och Pit. Lpm. Lul. Lpm.* Storbacken: C. Indeb. — *N. till Finn.* — *β Hafsstr. Blek.—Hels. VB. Neder-Kalix. Öl.*) *1—2 alnar hög; än med mörkbrun stjelt och bruna blr, än med ljus stjelt och gulare blr.*

- 7 *A. maritima* L. stj. uppstigande; bladen parbladigt delade, på *begge sidor hviludna* med hela eller 3delade *jernbreda trubbiga* flikar; blomkorg. som föreg., än upprätta, än nedböjda. 24 8, g. blr. — *β suffruticosa*: stj. tråktig, högre och n. upprätt, med utböjda klasar och nedböjda blomkorg. Fig. Sv.B.323. Fl.D.1655. *β* H.N.f.4, n:o 4. Hafsstr. r. (*Sk. vest. kusten. Öl. Gottl.* — *β Sk. vest. kusten. Hall. Varberg. Boh. Vinga och kringligg. öar; Tanum sn. Sör Edsvik. Blek.* på öar utanför Thorshamns udde. *Smål. Kalmar: Vestervik på Grånsö.*) *β är ofta 2—3 quart. hög grenig: A. salina Liljeb.*

## 8. ARNICA Lin. Håstfibla.

- 1 *A. montana* L. stj. 1—3blomstrig jemte blomholken *glandelhårig*; bladen motsatta, *äggrundt aflånga*, glest tandade. 24 7, 8. Fig. Sv.B.185. Fl.D.63. Skogsäng. (*Sk.—Uppl. Hels. Kråkfåck i Jettendal: C. O. Berg; Letsberg i Ljusdal: J. A. Wistr. Dal. Hedemora. Vestml. Lillhärad. Ner. Verm. Boh. Sällsynt i norra och östra prov. — N. söd. delen upp till Bergen och Ringebøe. Molde.*) *Nära alnshög växt, med stora blomkorg., brandgula blr.*

- 2 *A. alpina* Murr. stj. alltid *enblomstrig*, upptill jemte blomholken *tät hvitullig*; bladen motsatta *lancettlika*, smalspetsade, n. helbräddade. 24 7, 8. Fig. Sv.B.699. Fl.D.1524. H.N.f.12, n:o 5.

Fjellv. r. (*Torn. Lpm. Kåbdåvanka. Lul. Lpm. Qvikkjokk, Sähkok, Ruonas, Tjågnernes, Welkespuolda, samt öst. om Rissajokk; Njuonjes vid Tarrajokk: H. Widm., och Tjakkeli vid Laidaure: C. Ind. Pit. Lpm. Kåbrenoiwe, vid Laiselven.* — *N. Finn.* fjellet Sakkabani vid Kaafjorden: Th. Fr. och E. Henschen; Flöjssellet

vid Tromsøe.) *Quartershög med ljusgula blr.* — *A. montana*  $\beta$  *L.* *A. angustifolia* *Fl.D.*

9. *CINERARIA* *Lin.* Nocka.

- 1 *C. palustris* *L.* stjelen *tätbladig*; *alla bl. likformiga*, lancettlika, bugtigt tandade — n. helbräddade, jemte stjelen *smäludna*, endast de nedre skaftade; blomkorg. i qvast af *flerblomstriga* skaft; skalfr. *glatta*. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.737. Fl.D.573. H.N.f.1, n:o 5.

Kärrång. torfgrafvar. (*Sk. Blek.* vest. delen: Gosselm. *Smål.* vid Röja sjö i Gamleby sn; *Skir* nära Vexlö; *Wide* i Ljuder m. fl. ställen: Scheutz. *Hall.* Vindrap och Renneslöf snr: Theor.; *Halmstad*; Söndrum. *VG.* Vartofta i Åsaka sn vid Barnesjön. *Öl.* vid Beteby i Mörbylånga etc.) *Othonna* *L.Fl.Su.* *Senecio* *DC.*

- 2 *C. campestris* *Retz.* stj. *glesbladig*; rotbladen kort skaftade *aggrunda* otydl. tandade; stjelen oskaftade, de öfre *jernnbreda*, alla jemte stjelen *vitulliga*; blomk. i qvast af enblomstr. skaft; skalfr. *styfhåriga*. 2 7, g. blr. Fig. Fl.D.1177. H.N.f.1, n:o 6.

Torra st. r. (*Sk.* vid Löddeström från Lackalänge till hafvet; Landskrona vallar; Axelvold nära Dufek; Ignaberga kyrkogård och kalkbrott; Dysjöbro i Annelöf sn etc.) *Cin. alpina* *L. Herb. alp.* 7 *L.Sp.Pl.* och *Fr.S.V.Sc.* *C. integrifolia* *E.B.* *Senecio* *DC.*

10. *SENECIO* *Lin.* Kors-ört, Stånds.

† Strålblr utdragna, horisontalt utstående: Stånds.

\* Bladen odelade.

- 1 *S. paludosus* *L.* bladen smalt lancettlika spetsade, hvass-sågade, under smäludna ell. flockulliga, säll. glatta; blomkorg. i utbredd qvast; skalfr. smäludna. 2 8, 9, g. blr. Fig. Sv.B.736. Fl.D.385. H.N.f.2, n:o 2.

Våta st. stränd. r. (*Sk.* Christianstad flerst. enl. F. Aresch.; Lillö- och Råbelöfs-sjön; mell. Rönneholm och Brännestan på holmar i Rönneån; mell. Gullarp och Bosarp; Ramstorp i Torlösa sn etc.) *Stjelen enkel upprätt, 3—6 fot hög.*

\*\* Bladen pardelade; alla skalfr. glatta.

- 2 *S. aquaticus* *Murr.* rotbl. och de nedre stjelenbl. hela ell. lyrförmigt pardelade med stor, aflångt äggrund, säll. något hjertlik, tandad ändflik och aflånga sidoflikar; blomkorg. i qvast af upprätta grenar. 2 8, g. blr. Fig. Sv.B.681. Fl.D.784. H.N.f.3, n:o 2.

Fukt. st. r. (*Hall.* nor. del. *Boh.* i söd. skärg. *VG.* Gräfsnäs; Göteborg. *Dalsl.* Baldersnäs: Stud. G. Thorstenson. *Smål.* Vestervik? *Gottl.* Halvede i Högån, och Koparfve i Ruthe enl. G. v. Cederv. — *N.* Drammen; Aalesund: Doc. P. Olsson.) *Liknar följ., men har större blomkorg., samt rotbl. med stor odelad ändflik, små, stundom inga sidoflikar. Var. med ända till spetsenflikade blad. — S. erraticus Bert., skild med vidt utstående grenar i blomkvasten och hjertlik ändflik på rotbl., växte förr i Sk. vid Yngsjö, men är enl. F. Aresch. ej i sednare tider återfunnen.*

\*\*\* Bladen pardelade; alla ell. en del skalfr. håriga.

- 3 *S. Jacobæa* *L.* bladen lyrförmigt pardelade, med *mot spetsen vidgad*, inskurna och tandade likar; blomkorg. i *tät mångblomstrig* qvast; diskblanas skalfr. *stråfhåriga*, kanthblanas *glatta*. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.606. Fl.D.944. H.N.f.14, n:o 3 [var.].

Tor. st. (*Sk.—Uppl. Gefle*, vid Nyberg. Holmsund etc. *Medelp.* Sundsvall, på ballast: *C. Ind.* *Ängml.* Hernön; Säbrå sn: H. W. Arnell. *Dalsl.* *Boh.* *Öl.* *Gottl.* — *N.* Drammen; Holmestrand till Bergen.) *Var. med ända till spetsen pardelade blad och med stor odelad, tandad ändflik; rotbl. vanl. af sednare formen. Saknar stundom strålblr, såsom ex. i H.N.*

- 4 *S. erucifolius* *L.* bladen pardelade ända till spetsen, med *jernnbreda* inskurna spetsade likar; blomkorg. *som hos föreg.*; foderholken näende till blomholken *midt*; alla skalfr. stråfhåriga. 2 8, 9, g. blr. Fig. Sv.B.607. Fl.D.1883. H.N.f.1, n:o 4.
- Jordvallar etc. r. (*Sk.* Malmö; mell. Lund och Dalby; Trolleberg; Skifarp; Getinge etc.) *Bladflikarne ofta tumslånga, omkr. 1 linie breda, med 2—3, spetsade småflikar, mest i undre kanten. — S. tenuifolius Retz. och Jacq. Linnés ursprungliga, i Sk. Resan omnämnda erucif. är, enl. hans Herbar., en form af S. silvaticus.*

- 5 *S. vernalis* W.K. rotbladen små omv. äggrunda, inskurna och tandade; stjelkl. aflånga, parklufna ända till spetsen, med äggrunda, trubbiga och krusigt tandadeflikar; blomkorg. i fåblomstrig qvast; foderholk. flere gånger kortare än blomholken; alla skalfr. stråfhåriga. ☉ 5, 6, g. blr. Fig. Reich.t.959.f.2.

Odl. st. r. (Sk. vid Fogelsång 1864 enl. F. Aresch.) Ull. ex., de enda uig. sett. 1—2 qv. höga, dels enkla, dels långt ned greniga. Liknar till bladen arter i följ. afd.

†† Strålblr korta och tillbakarullade ell. inga: Korsört.

- 6 *S. viscosus* L. bladen djupt parklufna klubbhåriga; blomkorg. upprätta, med tillbakarullade strålblr; foderholken nående öfver den klubbhåriga blomholkens midt; skalfr. glatta. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1230.

Gat. etc. r. (Sk.—Uppsala. Helsl. Segersta sn enl. Lemm. Ångml. Ytter-Lännäs sn, tillfällig. Södra Dal. VG. kring Göteborg. Boh. Tryggön: Doc. Olsson. Hall. Öl. Böda. Gottl. — N. Christiansand—Christiania.) Hela växten klubbhårig.

- 7 *S. silvaticus* L. bladen parklufna glandelbräddade; blomk. upprätta, med mycket korta tillbakarullade strålblr; foderholken 3—5bladig, knappt nående öfver den glatta blomholkens botten; skalfr. finhåriga. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.869, 791.

Svedjel. berg. etc. (Sk.—Helsl. Ångml. Säbrå och Ulånger; Ytterlännäs enl. Lemm. Dal. Verm. Boh. Öl. Gottl. — N. till Söndmör.) Strålblrna ganska korta, stundom inga.

- 8 *S. vulgaris* L. bladen stjelkomf. parklufna; blomkorg. lutande, meränd. utan strålblr; foderholkens fjäll omkr. 10, svartspetsade, nående öfver blomholkens bas; skalfr. finhåriga. ☉ 6—10, g. blr. Fig. Sv.B.353. Fl.D.513.

Odl. st. a. (Sk.—Um. Lpm. VB. nor. del. — N. till Finnm.) Har någongång korta strålblr.

## 11. HELICHRYSUM Gærtn. Hedblomster.

- 1 *H. arenarium* DC. bladen gråulliga, de nedre spådlika, de öfre smalt lancettlika; blomkorg. i tät rundad qvast. 2½—9. Fig. Sv.B.658. Fl.D.641. H.N.f.2, n:o 1.

Sandhed. (Sk. Hall. Blek. särd. i vest. delen. Smål. Visseferda söd. om Emmeboda. Öl. mellan Färjestaden och Thorslunda, samt vid Glömminge m. fl. st. Gottl. Hemse sn.) Blomkorg. af en skinande citrongul, stund. pomeransgul färg [β aurantiacum Pers.]. — Gnaphalium L.

## 12. GNAPHALIUM Lin. Noppa.

† Blomkorg. gytttrade i hufvudlika (rundade) samlingar.

- 1 *G. luteoalbum* L. stjelen slak, oftast enkel; rothl. n. tunglika, stjelkl. omfattande, lancettlika, alla hvitulliga; blomkorg. gytttrade till ett ell. flere hufvuden i stjelen spets; skalfr. glatta, grynprickiga. ☉ 8. Fig. Fl.D.1763. H.N.f.1, n:o 1.

Fukt. st., vägkant. r. (Sk. Skauör: Falsterbo; Lilla Hammar. Blek. Hörby. Smål. vid Hosmo och söd. Hagby. Öl. mångenst. på vest. sid.; på den östra vid Långöre kapell enl. Sjöstr.) Blrna gula; holksj. glänsande hvitgula.

- 2 *G. uliginosum* L. stjelen uppstigande, meränd. grenig, ullig [hos 'nud. glatt]; bladen smalt lancettlika, spetsiga mjukludna; blomkorg. gytttrade i stjelen spets och bladvecken; skalfr. glatta [ell. finhåriga], släta. ☉ 7, 8. Fig. Fl.D.859. H.N.f.10, n:o 2.

'nudum Hoffm. hela växten späd och fullkomligt glatt. Fig. Reich.t.948.f.3. H.N.f.12, n:o 6.

'pilulare Wg. skalfr. stråfva af korta hår. Fig. Wg.Fl.L.19.

Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N. — 'nud. Hafsstr. Sk. Kullaberg nära Mölle. Hall. Falkenberg. Blek. Ronneby nära Djupafors. Smål. Kalmar. Öl. — 'pil. VB.) Var. från tumshög och enkel ['pygmæum Wess.] till quarterslång och mycket grenig; blomk. små och bruna.

- 3 *G. supinum* L. stj. slak, trådläk, med grenskott vid roten; bladen jemnbreda spetsiga ulliga; blomkorg. i stjelen spets och stund. i öfre bladvecken; skalfr. glatt stråfhåriga. 2½ 7, 8, br. blr. — β fuscum: blomkorg. klaselikt gytttrade, de nedre skaftade. Fig. Sv.B.716. Fl.D.332. H.N.f.6, n:o 2.

Fjellv. (*Lpl.—Herjed. — N.*) *Vanl. fingerhög, 1—8blomstrig. — G. procumbens L. Herb. G. alpinum Fl.D. β G. fuscum W.*

†† Blomkorg. samlade mot stielkens spets i ett bladigt ax.

- 4 *G. silvaticum L.* stielken uppstigande, styf enkel och mångbladig; bladen jemnbreda, under mjukludna; skalfr. något sträfv. 2 8, br. blr. Fig. Fl.D.1229.  
Torra st. (*Sk.—Lpl. — N. till Nordl.: Norm.*) *Stielken fothög, något nedligg. vid basen, sedan upprät, utan grenskott. Har enl. Läst. vissa år i VB. en höstform, som ganska mycket närmar sig till föreg.*
- 5 *G. norvegicum Gunn.* stielken som föreg. mer upprät; bladen smalare ell. bredare lancetlika, på båda sidor flockulliga, de mellersta störst; skalfr. som föreg. 2 7, 8, br. blr. Fig. Fl.D.254. H.N.f.14, n:o 7.  
Fjelltr. (*Lpl.—Dal. Angml. Täsjö. — N.*) *Skiltjd från föreg. med mer sammanhängande och tjockare ax, bredare blad; grenskott 0.*

### 13. ANTENNARIA Gärtn. Kattfotsört.

- 1 *A. dioica Gärtn.* grenskottens blad spadlika, nervlösa ell. 1-nerviga, und. hvitl., ofvanspd meränd. glatta; stielkbl. jemnbreda spetsiga; blomkorg. i qvast; holkfjällen i spetsen rundade, på utsidan något convexa. 2 5, 6, hv. ell. r. blr. Fig. Sv.B.148. Fl.D.1228.  
Tor. back. a. (*Sk.—Lpl. — N.*) *Vanl. blott några få tum hög, men stund., säd. i fjelltrakter, fothög med mer än tumslånga blomkorgeskaf. En dylik form med ofven öfre bladytan småluden är Gnaph. hyperboreum Don. — Gnaphalium L.*
- 2 *A. alpina [L.]* grenskottens bl. tunglika, i öfr. som hos föreg.; stielkbl. lancetlika; blomk. i qvast; holkfj. spetsiga [hos ♂ trubbiga] platta, med utstående spets. 2 6, 7, grågr. blr. Fig. H.N.f.3, n:o 1.  
Fjellv. (*Lpl.—Herjed. — N.*) *Vanl. något mindre än föreg., men var. som denna. Hanväxten ytterst sällsynt, funnen 1842 af L. L. Läst., liknar i allt annat hanväxten, men har bredare, trubbiga och i spetsen något färgade holkfjäll. — Gnaph. L.*
- 3a *A. carpatica Bl. & Fing.* alla bl. smalt lancetlika spetsade, 3nerviga, på begge sidor småulliga; blomk. gytttrade i tät qvast; holkfj. platta, hos ♂ trubbiga, hos ♀ spetsiga. 2 6, 7. Fig. Wg.Fl.Carp.t.3. Fl.D.suppl.98. H.N.f.11, n:o 2.  
Fjellv. r. (*Torn. Lpm. Kåbdåvanka; fjellet Moskana: C. P. Läst. Lul. Lpm. vid nor. sidan af Kerkeware; Puolaure; Wassja Walleware; Welkespuolda etc. Pil. Lpm. Wuopmekets-tjokko vid Pjeskejaure; Staika och Sartajokk, samt Metjirpekte på Sulitälma; Kasak etc.: H. Widm. — N. Finn. Tsatsa; Kautokeino; Maals-elven, på fj. Mauken, samt Sör-Reisen, på Middagsfjeld: Norm. Nordl. Salten.*) *Honväxten blomkorg. slutt. i mera utbredd qvast, hvita af det långa och fina frukt-sjunet, hvilket deremot i hanväxten blomk. är kort, mot spetsen klubblikt. — A. alp. Gärtn. Gnaph. Wg.*

### 14. FILAGO Lin. Musört.

- 1 *F. germanica L.* stj. slutt. upptill klynnedelad; bladen lancetl. — jemnbreda, ulliga; blomkorg. i klotrunda oskafade gyttningar i toppen och grenveckan; holkfj. sylspetsade; skalfr. hvitprickiga. ☉ 7. — β *apiculata*: bl. bredare, mer gröna; holkfj. i speisen röda. Fig. Sv.B.661. H.N.f.6, n:o 3. β Fl.D.997.  
Åkr. salt, r. (*Sk. Ystad, Dalköpinge; Trelleborg; Skanör; Roslätt; Skabersjö etc. Hall. Hasslöf.*) *Blrna brunaktiga; holkfj. långa gulglänsande, hos hufvudf. med gul spets. — F. pyramidalis L. Fl. Su. Gnaphalium, tillika med de följ., Willd. Gifola Cass. β F. apiculata Sm.*
- 2 *F. montana L.* stj. enkel ell. skiftevis grenig, med upprätta grenar; bladen som hos föreg.; blomkorg. ulliga, gytttrade på grenarnes sidor och spets; holkfj. trubbad; skalfr. prickiga. ☉ 6, 7. — β *arvensis*: gren. utdragna, endast mot speisen bärande blomkorgar. Fig. Sv.B.659. H.N.f.1, n:o 2; f.7, n:o 2. β Fl.D.1275.  
Sandback. a. (*Sk.—VB. Dal. — N. — β Sk. Blek. Smål. i Kalm. län; i Alfvestad i Västlän enl. Scheutz. Dal. Husby sn. Boh. Skafth. Strömstad; Foss sn och vid sjön Bullaren. Leml. Öl. — N. Christiania.*) *Blrna föga synbara, gulaktiga. — Oglifa Cass. β F. arvensis L. Fl. Su. och Herb.*

- 3 *F. minima* Fr. stj. enkel ell. vid basen och i spetsen grenig; bl. n. jemnbreda grå-ludna, tilltryckta; blomk. gytttrade i toppen, *kägellika*, slutl. föga ludna; holksf. *trub-bade*; skalfr. *slåta*. ☉ 7, 8, gulakt. blr. Fig. Sv.B.660. Fl.D.1276. H.N.f.1, n:o 3.  
Back. sandfält, r. (Sk.—ÖG. VG. och Boh. Dalsl. Färglanda sn. Öl. Götll. — N. Arendal; Lillesand; Mandal.) 2—6 tum hög, mycket spåhare än de föreg.; bladen 3—4 lin. långa, n. tegellagda. — *F. arvensis* Wg. *Gnaph. montanum* Fl.D.

b) *Asteraceæ*. Stiftets 2 flskar jemnbreda, upptill flnludna.

### 15. INULA Lin. Alant, Krislogräs.

† Strålblr. 0.

- 1 *I. Conyza* DC. stjelen upprät, grenig, med vanl. talrika blomkorg. i qvastlik samling; bladen äggr. lancettlika, glesl tandade, under grålludna, de nedre skäftade; holksf:s spets utsperrad. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.622. H.N.f.16, n:o 6.  
Tor. st. r. (Sk. på en pilvall nära Trolleberg vid Lund enl. F. Aresch.) *Inemot alns-hög växt med rödbrun stjeln och holk.* — *Conyza squarrosa* L.

†† Strålblr utdraget tunglika.

Skalfr. 4kantiga.

- 2 *I. Helenium* L. bladen stjelnkomf., äggrunda, ofjemna, under ludna; holksf. äggrunda; skalfr. glatta. 2 8, 9, g. blr. Fig. Sv.B.55. Fl.D.728.  
Fukt st. vid byar, r. (Sk.—Uppl. Vestml. och Ner. VG. Dalsl. Hall. Öl. Götll. söd, om Visby: Lem. Troligen öfverallt förvildad. — N. söd. delen: Ax. Blytt.) 2 alnar hög, med mycket stora blomkorgar, grön holk. — *Corvisartia* Mer.

Skalfr. trinda.

- 3 *I. Britannica* L. stjelen upprät luden; bladen stjelnkomf., lancettlika spetsade nagg-sågade, under ullhåriga, stund. n. glatta; holksf. lancettlika; skalfr. håriga. 2 8, 9, g. blr. Fig. Fl.D.413. H.N.f.4, n:o 5.  
Fukt st. r. (Sk. Christianstad, mångenst. enl. F. Aresch.; Krageholm, vid sjön; Hö-köping, s. om Gessie m. fl. st. Smål. Jönköping. Hall. Skottorp och Dömmestorp: Theor. Öl. särd, nor. del. Götll. När, Hemse, Roma, Färön etc.) *En mer luden form är γ stricta* Wg. Var. stundom med enblomstrig stjeln och smala, föga håriga blad.

- 4 *I. salicina* L. stj. upprät glatt; bl. stjelnkomf., lancettlika, spetsade glatta, upphöjdt ådriga, i kanten fintaggiga, utböjda; blomkorg. 1 ell. flere, de ytre slutl. längre skäftade; holksf. aflånga; skalfr. glatta. 2 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.786. H.N.f.14, n:o 2.  
Ängsback. (Sk.—Uppl. Dal. Husby sn, en holme i Amungen. Ner. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Götll. — N.) Var. låg och enblomstrig på Öl. Bladen stundom glesl småsågade.

- 5 *I. ensifolia* L. stj. uppstigande; bl. föga omfattande, n. jemnbreda, spetsade, sträf-ell. hårbräddade, glatta, utstående, n. parallellt nerviga; blomk. meränd. en enda; holksf. äggrundt lancettl.; skalfr. glatta. 2 8, g. blr. Fig. Fl.D.suppl.1.24. H.N.f.14, n:o 1.

Kalkberg, r. (Götll. Bunge sn, på skarpa kalksteusslätter, kallade Träskhedarne, bland enbuskar; Fleringe sn, vid Hessle. Fordom äfven  $\frac{1}{2}$  mil öst, om St. Ihre i Hangvar enl. uppgift af Rosén, men der aldrig återfunnen.) Götll. ex. dro mindre ofta, än ulländska, flerblomstriga.

### 16. PULICARIA Gertn. Loppört.

- 1 *P. vulgaris* Gertn. stjelen nedligg. ell. upprät, upptill flnluden; bladen stjelnkomf. aflånga vågbräddade, flnludna; strålblrna ganska korta. ☉ 7—9, g. blr. Fig. Sv.B.738. Fl.D.613. H.N.f.15, n:o 2.  
Fukt. st. (Sk. allm. Hall. Blek. Smål. från Blekingsgränsen upp till Kalmar: Scheutz. Öl.) *Inula Pulicaria* L.

### 17. BELLIS Lin. Tusenskön, Vettelius.

- 1 *B. perennis* L. stängeln enblomstrig; bladen omv. äggrunda, glesl naggsågade. 2 6—10, hv. ell. rödl. strålblr. Fig. Sv.B.238. Fl.D.503.

Fått och sukt. äng. (*Sk.* allm. *Blek.* vest. delen. *Smål.* Kalmar; Stensö etc. *Hall.* Hasslöv och Karup; *Theor.* *Öl.* *Gottl.* Förvildad flerest. i mell. Sv. — *N.* Christianssands st.) *Tvårig med fingerhöga stänglar, och bladen i rosett.*

18. *ASTER* *Lin.* Strandkil.

1 *A. Tripolium* *L.* bladen n. jemnbredt lancettlika, helbräddade, glatta och köttiga; blomkorg. i qvast med äggr. holkfjäll.  $\gg 7, 8$ , b. strålbl. —  $\beta$  *arcticum* *Th. Fr.* stj. lågväxt och stadig, delad n. ända från basen i jemnhöga grenar. *Fig. Sv. B. 470. Fl. D. 615. H. N. f. 16, n: 5.*

Hafsstr. (*Sk.* — *Helsl.* *VB.* Nordmaling. *Boh.* *Hall.* *Öl.* *Gottl.* — *N.* Till Trondhj. —  $\beta$  *N.* Ost-Finm. vid Järfjorden; *E. Hensch. enl. Th. Fr.*) *Har stund. hvita strålbl.; någongång saknas de alldeles.*

19. *ERIGERON* *Lin.* Binka.

† Stjelken mångblomstrig, öfverallt tydligt hårig.

1 *E. acris* *L.* mjukhårig; rotbladen tunglika, stjelkbl. lancettlika, helbräddade; blomkorg. n. i enkel klase; holken gråluden; strålbl. knappt längre än diskbl.  $\gg 4, 7$ , gred. ell. rödl. strålbl. i klase;  $\beta$  *glomeratus*: blomkorg. mer kortskäftade och gytttrade, den i stjelkens spets, dubb. större. —  $\gamma$  *ruber*: blomk. små, med längre röda strålbl. —  $\delta$  *grandis*: blomk. stora på långa skaft; strålbl. som  $\gamma$ . *Fig. Reich. t. 917, f. 2.* Tor. äng., back. a. (*Sk.* — *Lpl.* — *N.* —  $\gamma$  *Lpl.* — *N.* Nordl. Finm.) *Var. från fot-hög till några få tum hög, enkel ell. grenad till basen, med större och mindre blomkorgar o. s. v.*

2 *E. rigidus* *Fr.* hårig och sträf; stjelken enkel, djupt färad och kantig; rotbladen små, omv. äggrunda, afsmaln. till skaft; stjelkbl. oskaftade, n. 3nerviga, något styfva, helbräddade; blomkorg. i klase; blomholken svart, mycket gleshårig; strålbl. utstående, längre än diskbl.; de inre af dessa trådlika.  $\gg$  r. ell. hv. strålbl. *Fig. Fl. D. 2595.*

Fjelltr. r. (*N.* Från Filefjeld, Nystuen till Nordl.) 1—2 fot hög, enkel och utan rot-skott; rotbl. föga större än *E. uniflora*; blomkorgen i stj. spets mycket stor, de på sidan smärre på enkla och utdragna, n. liklånga skaft; holken endast med ett ell. annat hår. — Allt enl. *Fr.*; osedd af utg.

†† Stj. mångblomstrig, glatt ell. n. glatt.

3 *E. Mülleri* *Lund.* stj. glatt och slät; bladen jemnbredt lancettlika, glatta, stundom härbräddade; blomkorg. i enkel ell. grenig klase, med kortare sidogrenar och gles småhårig holk.  $\gg 7$ , rödl. strålbl. *Fig. Fl. D. 874. Reich. t. 916, f. 1. H. N. f. 8, n: 1, högra ex.*

Back., fjelltr. r. (*Torn.* *Lpm.* Jukkasjärvi och vid Tornio träsk. *Lul.* *Lpm.* Snjårah och Nammats vid Quikkjokk; Tjårris vid Njåtnosädn: *H. Widm. Um. Lpm.* Kat-tisavan. Berglunda. *Ängml.* Tåsjö m. n. snr. *VG.* Bastungen nära Venersborg. *Boh.* Uddevalla. — *N.* Christiania, Dröbak; Gudbrandsdalen, mell. Laurgaard och Rundene; Bergens st.) *Noraka och Boh. ex. föga skilda från E. acris, dock utmärkta af sin glatthet, från följ. med mera kleselik blomställning af kortare, ofta flerblomstriga skaft, tydligare hårig holk. Norrlandska ex. närma sig deremot mera följ. art, från hvilken de af Ands., troligen med rätta, anses ej skiljbara. — E. dröbachensis Fr. och trol. Fl. D. E. elongatus Fr. S. V. Sc. p. 3.*

4 *E. elongatus* *Led.* stj. n. glatt; bladen aflångt jemnbreda, 3nerviga; blomkorg. på enkla utdragna skaft, med längre strålbl. n. glatt, glandelprickad holk.  $\gg 7, 8$ , r. ell. hv. strålbl. *Fig. Fl. D. Suppl. t. 23. H. N. f. 8, n: 1, venst. ex.; f. 15, n: 3 [var.].*

Fjelltr. (*Torn.* *Lpm.* Nuljalaki. *Rect. For. Lul.* och *Pit. Lpm.* Jeml. Herjed. *VB.* nor. del t. ex. Huuki gästgg.; Kengis. *Medelp.* Viksjö sn enl. Leml. *Helsl.* Loos sn, nedom Carlsberget och vid Tenskog; *J. A. Wistr.* — *N.* Finm. — Dovre. Österdalen, på Tvårfjeld i Trysilld s:n etc.) 2—3 qv. hög; skild från föreg. med föga annat än holken, som synes beströdd med prickar, hvilka vid stark för-storing visa sig vara korta glandelhår, några få stund. utväxande till vanliga hår. — *E. politus* *Fr. S. V. Sc.*

††† Stjelken 1—3blomstrig.

5 *E. alpinus* *L.* rotbladen tunglika, något spetsiga; blomkorg. 1—3; holken af jemn-



- bredt lancettlika* fjäll, ludna af *tydligt* ledade hår; strålblrna utdragna. 2 7, 8, r. säll. hv. strålblr Fig. Fl.D.292. H.N.f.8, n:o 2.
- Fjelltr. (*Lul. Lpm.* Njuonjes; Sähkok: Äbrl. enl. Ands. *Jeml.* i gränssjellen samt kring Åreskutan: Frösön, på Kungsgårdens södra äng. *Herjed.* Midtåklappen, Axhögen etc. — *N. Finnm.* — Vang i Valders.) 5—10 tum hög med brun stjelk, stora vackra blomkorg., af hvilka de nedre, då flere finnas, hafva långa, n. upprätta skaft. Då blomk. är ensam, är den n. dubbelt större: var. *macrocephalus*
- 6 *E. uniflorus* L. rotbl. spadlika trubbiga; blomk. ensam; holken af *bredt lancettlika* fjäll, ullhåriga af *tydligt* ledade hår; strålblrna utdragna. 2 7, 8. —  $\beta$  *pulchellus*: holken violett- ell. svartbrunt luden. Fig. Fl.D.1397. H.N.f.8, n:o 3.
- Fjellv. (*Lpl.—Herjed.* — *N.*) 2—5 tum hög, vanl. med grön stjelk, högst säll. 2 blomkorgar. Strålblrna hvita, någonsång rödlätta.

## 20. SOLIDAGO Lin. Guldris.

- 1 *S. Virgaurea* L. stj. något kantig, med tätsitt. uppräta blomkorgsklasar i grenarnes spets; bladen lancettlika, de nedre sågade. 2 7—9, g. blr. —  $\beta$  *litoralis*: rotbl. qvarsittande, bredt lancettl. spetsiga; blomsamlingen aflång tät, med större blomkorgar. —  $\gamma$  *arctica*: stj. låg (5—7 t.), med utdragna enblomstriga fjälliga skaft; rotbl. qvarsitt. n. tunglika, omärkligt naggade. Fig. Fl.D.663.
- Back. a. (*Sk.—Lpl.* — *N.* —  $\beta$  *Smål.* i skären, t. ex. Örö. — *Stockh.* skärg., på Muskön. *Hall.* Särö; samt *Boh.* Vinga, Tjörn enl. Lem. —  $\gamma$  *Herjed.* Skarffjellet: Stud. S. Axell enl. G. v. Ced. — *N. Finnm.*).

## 21. LINOSYRIS Cass. Guldborste.

- 1 *L. vulgaris* Cass. bladen tårika, smalt jemnbreda glatta; holksfjällen tilltryckta, med utstående spets. 2 8, 9, g. blr. Fig. Fl.D.Suppl.1,t.22. H.N.f.4, n:o 6.
- Tor. st. r. (*Öl.* på många st. från Föra sn ned till öns söd. udde enl. Sjöstr. Fordom äfven på Lilla Carlson vid Gottl.) Var. till storleken, fr. 4—8 tum; bladen fint prickiga; blomkorgssamlingen tät qvaslik. — *Chrysocoma Linosyris* L.

## c) Eupatoriaceæ. Stiftets slika klubblika, på utsidan vårtprickiga.

## 22. EUPATORIUM Lin. Floksblomster.

- 1 *E. cannabinum* L. bladen motsatta, kort skaftade, 3—5fingradt delade i lancettlika sågade slika, den mellersta längst; blomkorg. få-[5—6]-blommiga. 2 7, rödl. strålblr. Fig. Fl.D.745. H.N.f.16, n:o 4.
- Stränd. bland buskar etc. r. (*Sk.—Gestr.* Vestml. Ner. Verm. Boh. Hall. Öl. — *N. Brevig*; Langesund.) Örtan lik hampa, 3—4 fot hög, med stor tät qvas af små blomkorgar. På grenar, som framskjula om hösten, äro bladen stundom odelade, ågrundt lancettlika.

## 23. PETASITES Neck. Skräp.

+ Blomkorg. utan tunglika strålblr; bladbasens slika afrundade.

- 1 *P. officinalis* Mönch: bladen hjertlika, något bugtiga, med större och mindre tänder, under gråludna; blomkorg. i äggformig ell. udragen klase. 2 4, 5, rödl. blr. Fig. Sv.B.224. Fl.D.842. H.N.f.1, n:o 7.
- Gård. stränd. etc. (*Sk.—Uppl.* Vestml. Ner. Verm. Sunne sn; Sund. på Näset. Hall. Trol. fordom odlad, särdeles i de öfre prov. — *N. Skien*; Christianssand; Flekkerø; Bergen etc.) Den allmänaste formen har blrna till större delen 2könade: *P. hermaphrodita*; sällsyntare är henväxten, hvars blomk. äro smärre, i utdragen klase och med få ell. inga 2könade blr: *P. hybrida*. — *P. vulgaris* Desf. *Tussilago Petasites* L. — Aum. Stängeln hos alla arterna fjällig; rotbladen framskjula först efter blomningen och blifva ofta mycket stora.
- 2 *P. alba* Gärtn. bladen hjurtlikt rundade bugtiga, med större och mindre uddhvarsa tänder, under hvitludna; blomkorg. i tät qvaslik samling. 2 4, 5, hvitakt. blr. Fig. Fl.D.524. H.N.f.2, n:o 3.
- Skugg. stränd. r. (*Sk.* flerst. vid Ringsjön; Fogelsång; Köpingsådal; Gunnaröd m. fl. st. i söd. och vest. delen enl. F. Aresch. — *N. Christianssand* vid Tjos.) Var. som föreg. — *Tussilago* L.

†† Blomkorg. med korta strålblr; bladen n. triangelformiga: *Nardosmia* Cass.

- 3 *P. spuria* Reich. bladen *triangelformigt* *njurlika*, olikformigt *smålandade*, under täckta af *snöhvitt ull*, bliskarne vid basen utsperrade. 2klufna; blomk. i n. enkel qvast, med mycket korta strålblr. 2 4, 5, blekg. blr. Fig. Retz.Obs.1,t.2. Fl.D.1828. H.N.f.2, n:o 4.

Sandstränd. r. (Sk. vid Köpingsåns utlopp; Kåseberga och Sandhammar; Ringsjön m. fl. st.) *Kantblrna något bredare än diskblrna, n. tunglika. Var. som de föreg. — Tussilago* Retz.

- 4 *P. frigida* Fr. bladen *triangelformigt hjertlika*, bugtigt *inskurva* ell. *flikigt groftandade*, under *gråaktigt hvitludna*; blomk. i enkel qvast, meränd. med korta strålblr. 2 4 5, 6, hvitg. och rödl. blr. Fig. Sv.B.680. Fl.D.61. H.N.f.14, n:o 8.

Fjelltr. (Lpl.—Dal. Idre, trakten kring Löfåsen. Ångml. Tåsjö m. fl. snr. Medelp. Torp sn: Reuterm. Helsl. Loos sn, n. om Kyrktjärn. — N.) 2—3 *qv. hög. Saknar stund. strålblr, då diskblrna variera från rörformiga 5klufna till snedt uppspruckna, n. tunglika, i sednare fallet alstrande frukt. — Tussilago* L.

## 24. TUSSILAGO Lin. Hästhofsört.

- 1 *T. Farfara* L. stängeln bladlös fjällig; bladen rundadt hjertlika, bugtiga och tandade; blomkorgen ensam, med utdragna strålblr. 2 3—5, g. blr. Fig. Sv.B.2. Fl.D.595. Leråkr. och stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Bladen visa sig först efter blomningen och blifva slutt. kvartersbreda.*

- 2 Flocken *Cynarocephalæ* Juss. Blrna rörformiga. Stifet upp emot märkena uppsväldt, omgifvet med en krans af hår.

## 25. ECHINOPS Lin. Bolltistel.

- 1 *E. sphærocephalus* L. bladen *pardelade*, under hvitludna, med bugtigt tandade och taggiga bliskar; blomfodret vid basen omgifvet af borst. 2 4 7, 8. Fig. Fl.D.2179. Stenbundna st. vid gårdar etc. r. (Smål. Bjursund i Loflahammar: Stud. C. Willd enl. Scheutz. ÖG. mångenst. såväl i nor. skogshygden och öst. slätthygden, som i Åtvedatrakten, Stångådalén och vest. om denna: Kindb. Södm. Öst. Vingåker, Forssanåset: C. Indeb. Uppl. Uppsala slottsbacke. Troligen öfverallt förvildad.) *Liknar en vanlig tistel; blrna lätt fallande isär vid pressning, hvita med blågrå ståndarknappar.*

## 26. CENTAURÉA Lin. Knoppört, Klint.

† Fruktfjuset af skalfruktens längd.

- 1 *C. Scabiosa* L. bladen *djupt pardelade*, stråfva, bliskarne lancettl. ell. jemnbreda, inskurva och tandade; yttre holkfjällen äggrunda, afsmalnande till ett svart, kammligt borstbräddadt bihang; de inre smalare, med ett dylikt, något vidgadt bihang. 2 4 7, 8, rödviol. blr. Fig. Sv.B.324. Fl.D.1231.

Åkerren. back. (Sk.—Helsl. Vestml. Skinnskatteberg. Ner. Verml. Boh. Öl. Gottl. — N. till Nordl. Stegen enl. Norm.) *Alnshög och mera, med stor klotrund holk; blrna säll. hvita.*

- 2 *C. Cyanus* L. bladen *jemnbreda*, något *hvitulliga*, de nedre stund. pardelade; holkfjällen äggrunda, i kanten och spetsen *hvita* ell. *bruna hinnaktiga borstågade*; de inre mer utdragna, endast i spetsen sågade. ☉ 6, 7, blå, säll. hv. blr. Fig. Sv.B.52. Fl.D.993. Åkr. bland säden, a. (Sk.—VB. och Jemtl. — N.) *Alnshög, spenslig. Holkfjällen med mindre utvecklade bihang än de öfr. arterna.*

†† Fruktfjuset kortare än halfva skalfr.

- 3 *C. phrygia* L. bladen *äggrundi* lancettlika, småtandade, stråfva; yttre holkf. med ett utböjdt, n. *sylformigt* bihang, kammlikt kantadt med *svarta borst, längre* än bihans bredd; de inre holkf. med ett bredt, hårkantadt bih. i spetsen. 2 4 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.520. Reich.Cynaroc.t.764,f.2. H.N.f.13, n:o 3, 4.

Ång. i bergstr. r. (N. Christiansand, Hjelmeland i Ryefylke vid hafvet. Mandal.) *Har stora blomkorg, breda blad. — C. austriaca* W. enl. Fr.

- 4 *C. nigra* L. bladen *lancettlika*, de nedre tandade; yttre holkf. med ett lancettlikt bihang, kantadt som hos föreg. med borst *dubbelt längre* än bihangets bredd; inre

Gjällens bihang som hos föreg.; *alla blrna* meränd. *likformiga och 2kånade*. 2 7, 8. r. blr. Fig. Fl.D.996. Reich.t.761.f.2. H.N.f.13, n:o 5.

Back. etc. r. (N. Christiansand vid Farsund. Bergen på Storöen och efter kusten upp- till Snaasen.) *Liknar till örten följ., men saknar n. alltid de större kantblirna; de yttre holksfjällens bihang smala, de inres bredare än fjället, n. Jangulära.*

+++ Skalfr. utan fruktsfun.

- 5 C. *Jacea* L. bladen *lancettlika* helbräddade ell. tandade, stund. smala och flikiga; holksfj:s bihang *kupigt, bredt och rundadt*, i kanten ojemnt sargadt. 2 7, 8. r. blr. — *β elata*: stjelen med utstående grenar; bladen smala fliktandade. Fig. Fl.D.519. *β* Reich.t.759,f.1.

Torra ängsgrenar, back. a. (Sk.—VB. och Jeml. — N.) *Holken tegelfärgad, stund. svartbrun med mer kammsflikade fjäll och då tagen i Sv. för C. nigra. β är var. decipiens Fr.S.V.Sc. och Thuill.*

## 27. SERRATULA Lin. Ängsskära.

- 1 S. *tinctoria* L. de nedre bladen meränd. lyrförmigt parklufna, med tätt hvass-sågade flikar; blomkorg. i qvast; holken n. glatt. 2 7, 8, viol. stund. hv. blr. Fig. Sv.B.170. Fl.D.281.

Skogsäng. (Sk.—Uppl. och Vestml. Dal. Boh. Hisingen, vid Nodre elf. Öt. Gottl.) *Var. med odelade blad.*

## 28. SAUSSUREA DC. Fjellskära.

- 1 S. *alpina* DC. bladen lancettlika—äggrunda, odelade, glest småtandade mjukludna; blomkorg. meränd. i tät qvast, med mjukluden holk. 2 7, viol. blr. Fig. Fl.D.37. H.N.f.15, n:o 4.

Fjelltrakt. (Lpl.—Dal. uti Idre. VB. Skellefteå. Ängml. Tåsjö och Långsele. Medelp. Torp sn; Söråker enl. Lem. Helsl. Loos sn flerstäd. — N.) *Hela växten oftast betäckt af ett ovanligt mjukt lud.* — *Serratula L. Heterotrichum Link.*

## 29. CARLINA Lin. Stjerntistel.

- 1 C. *vulgaris* L. bladen lancettlika, hela ell. inskuret tandade och taggiga, på undre sidan flinulliga; sidoblokkorg. högre än den mellersta. 2 7, 8, blekg. blr. Fig. Sv.B.434. Fl.D.1174.

Back. (Sk.—Gefle och Vestml. Ner. Dalsl. Boh. Tanum sn. — N.) *Var. med en enda blomkorg.*

## 30. ONOPORDON Lin. Tistelborre.

- 1 O. *Acanthium* L. stjelen bredt vingkantad; bladen buktigt tandade taggbräddade, under hvitulliga; holksfjällen utsperrade, styft tornuddiga. 2 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.227. Fl.D.909.

Byar. (Sk.—Gefle. Boh. Koön. Öt. Gottl. — N.) *Ofta manshög, bredbladig, taggig växt.*

## 31. CARDUUS Lin. Tomt-tistel, Stingsel.

- 1 C. *nulans* L. bladen pärlflikiga och taggiga, med på stjelen afbrutet nedlöpande kantar; blomkorg. *lutande* åt sidan, *ensamma på utdragna oväpnade skaft*; yttre holksfjällen utsperrade, alla tornuddiga. 2 7, r. blr. Fig. Fl.D.675. H.N.f.7, n:o 5.

Torra st. r. (Smål. Kalmar. Uppl. Uppsala; Öfverhoda i Elfskarleby sn. Gefle. Söderhamn. Medelp. Viksta varf enl. Lem. Ängml. Nyland i Ytter-Lännäs sn. Boh. Marstrand; Näsinga sn; Oroust, vid Möllösund; Lem. Öt. Horns Ladugård; Repplinge. Gottl. Visby, Roma etc. — N. Brevig. Trondhj. Knappt ursprunglig i Skandinavien.) *Stor, ganska taggig; blomkorgsskaften endast vid basen småbladiga.*

- 2 C. *acanthoides* L. bladen nedlöpande, djupt parklufna, med 2—3klufna, groftorniga flikar, under gröna, på nerverna hvithåriga; sidoblokkorg. med änga ell. ganska korta, småbladiga och taggiga skaft; holken rundadt äggformig, af tornuddiga, nägot utstående fjäll. 2 7—9, r. blr. Fig. H.N.f.11, n:r 3.

Byar. (Sk. Blek. Ronneby. Smål. Kalmar. ÖG. Löfstads park och Brunneby i Vreta etc. enl. Kindb. Hall. Öt. Långlöt sn enl. Lem. Gottl. — N. Christiania.) *Liknar Cirs. arvense β, men skiljes lätt af sin ljusgröna färg och röda blr. De öfversta*

*blomkorg. mer närmade än de på sidan; holken gleshårig, n. glatt. — C. polyacanthos Schreb.*

- 3 *C. crispus* L. bladen nedlöpande, bredt lancettlika, inskuret tandade och mjukt taggiga, under meränd. *hvitulliga*; blomkorgskaften upprätta 1—3 blomstriga, n. bara, *småtaggiga*; holken n. klotrund, af lancettlikt syllika, *mjukspetsiga* fjäll.  $\gamma$  7, 8, viol. blr. Fig. Fl.D.621. H.N.f.11, n:o 4.

Åkerrenar etc. (Sk.—Lpl. — N. till söd. Finn.: Norm.) *Bladens undre sida stund. n. glatt.*

### 32. *CIRSIIUM* Hall. Tistel.

† Stjelken vingkantad af de nedlöpande bladen.

- 1 *C. lanceolatum* Scop. bladen parklufna, med 2klufna sperriga, tornuddigaflikar, på öfre ytan horstaggiga, *under hvitludna*; blomholk. *klotrund*, af *stift tornuddiga*, *utstående*, ulliga fjäll.  $\gamma$  7, 8, r. blr. — *§ nemorale*: bladen under *hvitulliga*; holken n. klotrund med finare, borstlika tornar. Fig. Sv.B.416. Fl.D.1173.  $\beta$  Reich. t.826, f.2.

Väg. a. (Sk.—VB. Skellefteå. Jemtl. till Hammerdal. — N.) *Carduus* L. *Cnicus* Willd.  $\beta$  *C. nemorale* Reich.

- \*2 *C. canum* MB. bladen aflånga — lancettlika, taggbräddade, *under gles* *ulliga*, de nedre parflikiga, de öfre tandade; gemensamma blomkorgskaften *utdragna*, 1-säll. *3blomstriga*, de enskilda *korta*; holken äggformig, af lancettlika *tilltryckta* fjäll.  $\gamma$  7, 8, r. blr. Fig. Jacq.A.t.42, 43. Reich. t.828, 829, f.1.

Skogsäng. r. (N. Romsdalen, Sætnæssellet, på slutningen midt emot Gröttens prestgård.) 2 alnar hög, med blr till storlek och utseende af *C. heteroph.* Mest utmärkt af roten, som består af ett knippe rotknölar af ett tillfingers storlek och form. — *Carduus* L. och Jacq.

- 3 *C. palustre* Scop. de nedre bladen n. pardelade med 2klufna ell. groftandade och taggigaflikar, ofvanpå håriga, *under gröna*; blomkorg. *gyttrade*; holken *äggformig*, af ägg-rundt lancettlika, *kortuddiga*, *tilltryckta* fjäll.  $\gamma$  7, 8, viol. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.428. Fl.D.1341.

Våta äng. a. (Sk.—Lpl. — N.) Stjelken upprät, 1—3 alnar hög. — *Carduus* L. *Cnicus* Roth.

(*C. arvensis*  $\beta$  *ferox*.)

†† Stjelken utan vingkanter; bladen icke nedlöpande.

\* Fruktsfun alltid kortare än blomkronan.

a — Bladig stjelk; röda blr.

- 4 *C. heterophyllum* All. bladen *stjelkomsfattande*, bredt lancettlika, sågtandade ell. parflikiga, *under hvitludna*; blomkorg. 1—5, på *långa enkla skaft*, utan skärm; holken äggformig, af lancettlika *tilltryckta* fjäll med utstående något hvass udd.  $\gamma$  7, 8. Fig. Fl.D.109.

Fukt. äng. (Lpl.—Sk. Öl. Sällsyntare i de södra prov. — N.) Vanl. ett par aln. hög med mycket stora blomk. — *Carduus* L. *Cnicus* Willd.

- × *C. heterophyllo-acaule* Näg. stj. något utdragen, nedtill hvitluden; bladen icke omsfattande, parklufna, med aflånga 2klufna och tandadeflikar, *under* mer och mindre *grå* ell. *hvitaktigt fluludna*; blomk. 1—3, på *långa*, meränd. *något bladiga* skaft; holkfj. ägggrundt lancettlika, med *omärklig udd*.  $\gamma$  8, 9. Fig. Reich. t.854, f.1.

Äng. r. (Sk. Bjersjö ladugård: Stud. L. Schlegel enl. Leml. VG. på Mösseberg bland *C. acaule* och *heteroph.*) Något lik *C. acaule*  $\beta$ , men 2—3 qv. hög, med talrikare, mindre djupt delade blad och större blomkorg., som likna *C. heterophylli*.

b — Bladig stjelk; gula blr.

- × *C. oleraceo-heterophyllum* Näg. stj. ända upp bladig; bladen *omsfattande*, de nedre skaftade, hela ell. parklufna, med lancettlika helaflikar, *under hvita* af ett fint och tätt ludd; blomk. 1—3, *kortskaftade*, med n. lancettlika skärm af blomk.: längd; holkfj. lancettlika med kort, böjlig tagg i spetsen.  $\gamma$  7, 8. Fig. Reich. t.857.

Äng. r. (VG. Mösseberg i Jätteneds hagar, bland *C. olerac.* och *heteroph.*) 3—4 fot

*hög, liknande C. heterophyll. med blomk. af C. olerac. Närmast sig än mera till den förra, än till den sednare.*

- 5 *C. oleraceum* Scop. bladen med den hjertlika basen stjelkomfallande, pardelade ell. parklufna, med hela sågtandade och taggbräddadeflikar, under gröna; blomkorg. flere, inom äggrunda, något färgade skärmbblad; holkfj. lancettlika, sylspetsade. 24 7, 8. Fig. Sv.B.698. Fl.D.860.

Fukt. äng. r. (Sk. allm. Hall. Hallandsås; Hasslöf; Theor.; Halmstad. VG. Sköfde; Mösseberg. Blek. Sölvisborg sn. Små. Kalmar, Skällby; Tofteryd enl. Lem. — N. till Moe i Ringsager på Hedemarken; Hugelien i Land.) 1—3 fot hög. — *Cnicus* L.

- × *C. acauli-oleraceum* Näg. bladen knappt omfattande, parflikiga med aflånga grundt 2—3klufna taggbräddadeflikar; blomkorg. flere, meränd. med lancettlika skärm vid basen; holkfj. lancettlika, uddspetsiga. 24 8, 9, hvit. blr. Fig. Reich.t.858.f.2.

Skogsäng. r. (Sk. Öfvedskloster; Lund, Resten och Fogelsång; Malmö; Rå etc.) Storlek och utseende af föreg., men till bladen mer lik följ.; blomkorg. stund. utan skärm. — *C. rigens* Wallr. *C. decoloratum* K. *Cnicus* Schiede.

c — Vanl. utan stjelk; röda blr.

- 6 *C. acaule* All. bladen kort skaftade, parflikiga, taggbräddade, med rundade, meränd. 3klufna tornuddigaflikar; blomkorgarnes skaft från rotstocken, korta och meränd. enblomstriga [β med bladig stjelk]; holkfjällen lancettlika uddspetsiga tilltryckta. 24 7, violettröda blr. — β *caulescens*: stjelen utdragen bladig, 1—flerblomstrig. Fig. Fl.D.1114. Reich.t.840.f.1; β f.2.

Betesmark. r. (Sk. allm. — Södm. vest. Vingåker, nära Morganå; Nyköping, vid vägen till Arnö; C. Ind. Uppl. Enköping. Ner. Hökerkulla; Elgholmen i Kumla. VG. Boh. Wägga i Fossene; Doc. P. Olsson. Hall. Öl. Götll.) Blomkorgens skaft 1—3 tum högt; stjelen hos β 1—2 qv. hög, vanl. 1—2blomstrig. — *Carduus* L. *Cnicus* Roth.

\*\* Fruktsjun slutl. längre än blomkronan: *Breca* Less.

- 7 *C. arvensis* Scop. stjelen bladig; bladen lancettlika, parflikiga ell. tandade, taggbräddade, vågiga; blomkorg. i ojeffn och gles kvast; holkfjällen tilltryckta med utstående, föga styf udd. 24 7, 8, gred. blr. — β *ferox*: bladen nedlöpande, nästan pardelade, med 2—3klufna sperrigaflikar. Fig. Fl.D.644. H.N.f.14, n:o 9 [var.].

Odl. st. a. (Sk.—Um. Lpm. och VB. Björkfors. — N. till Nordl.) Bladen ofast lancettlika tandade, icke nedlöpande, hvadan stjelen är trind och ovdpnad, hvaremot den hos β är ganska taggig af de nedlöpande bladkanterna. — *Serratula* L. *Cnicus* Sm.

### 33. LAPPA Adans. Kardborre.

- 1 *L. tomentosa* Lam. bladen hjertlikt äggrunda, under småulliga; blomkorg. i flocklik kvast; den klotrunda till spindelväfshåriga holkens inre fjäll lancettlikt aflånga, trubbiga med udd, rödbruna. 24 7, 8, viol. blr. Fig. Sv.B.63. Fl.D.642 och 2423.

Byar. (Sk.—Ängml. Sälls. norr om Uppl. och Vestml. — N.) *Arctium Bardana* Willd. A. Lappa β L. — Som denna art och de följande ofta växa blandade, uppkomma talrika mellanliggande artförändringar. I alla fall nog närbeslägtade, såsom äfven Gartner Moe i Christiania bot. trädg. funnit allför väl bekräftadt (se Bot.Not.1867,p.133).

- 2 *L. major* Gärtn. bladen hjertlika, under sinludna, ell. nästan glatta; blomkorg. i kvast, utdraget skaftade; holkens glatt, fjällen n. platta, i kanten hinnaktiga, de yttersta vid basen sammanväxta, de innersta lancettlika, syl-lik spetsade, i kanten släta, eller något sargade, af samma färg som de yttre. 24 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.2424. Reich.t.812.f.2.

Byar. (Sk.—Uppl. Dal. Smedjebacken. Vestml. Strömsholm. Ner. Brohammar. VG. Klnekulle. Boh. mest på ärne. Hall. Vargagården i Tölö sn; Lem. Götll. Klinte sn.) Har mycket större och vidare blomholk än de öfriga, glatt och vanligen grön. De yttre holkfjällens bas merändels uppsvällad köttig och sammanhängande. — *Arctium Lappa* L. jemte följ. *Lappa officinalis* Wallr.

- 3 *L. minor* DC. bladen hjertlikt äggrunda, under småulliga; blomkorg. klaslikt gyttrade ell. kortskaftade; holkens glatt ell. något spindelväfshårig, af n. trinda, syllika fjäll. de inre färgade, i kanten fint tagghåriga. 24 7, 8, ljusr. ell. gred. blr. Fig. Fl.D.2662. Reich.t.811.f.1. H.N.f.13, n:o 6.

\**intermedia* Lge. högväxt och spenslig; blomkorg. stora, med slutligen äggformig holk. Fig. Fl.D.2663. Reich.t.812,f.1.

Byar. a., skugg. st. (Sk.—VB. — N. — \*Sk. flerst. enl. F. Aresch. och A. Falck. Smål. Korsberga: Scheutz; Kalm. län flerst. enl. Sjöstr. ÖG. Linköping; Alvastra etc.: Kindb.) *Dels lågdaxt, med små, yngre n. cylindriska, slutl. nedplattade blomk.; dels till alla delar större och närmande sig föreg., med mer klotrunda blomk.: β majuscula* Ed. 9. \*torde snarast vara en af lokalen beroende skuggform.

- 3 **Flocken Cichoriaceæ Juss.** Alle blommorna 2könade och tunglika. Stifftet icke uppsväldt eller ledadt.

### 34. CICHORIUM Lin. Vågvårda.

- 1 *C. Intybus* L. bladen nedåt parflikiga; blomkorg. parvisa, nästan utan skaft, i bladvecken. 2 7, 8, blå blr. Fig. Sv.B.56. Fl.D.907.

Åkerren. väg. r. (Sk. allmän på slätten. Smål. Kalmr, nära slottet; Vestervik och Törneshall. Boh. Oroust, Röd i Morlanda; samt Hall. Särö: Leml.; Frölinge: Theor. Öl. Goll. I de öfre prov. här och der förvildad. — N. Christiansand; Tellemarken: Eger; Christiania.) 1—2 alnar hög, med stora platta blomkorgar.

### 35. MULGEDIUM Less. Tolta.

- 1 *M. alpinum* Less. bladen lyrförmiga, med pil-lik, omfattande bas, ganska stor triangel-förmig ändflik; blomkorgsskaften glandelhåriga fjälliga, i nästan enkel klase. 2 8, blå blr. Fig. Sv.B.657. Fl.D.182.

Subalpin fjellv. a. (Lpl. och VB. — nor. Verm. Dal. och Helsl. — N.) Var. enl. C. Ind. i Lul. Lpm. med hv. blr. — *Sonchus* L. *S. cæruleus* Sm.

- 2 *M. sibiricum* Less. bladen oskaftade eller något omfattande, lancellika tandade eller nedåt parflikiga; blskaften fjälliga; jemte holken glatta, i qvast. 2 8, blå blr. Fig. Fl.D.suppl.1,t.21. H.N.f.3, n:o 5.

Fukt. st. r. (Torn. Lpm. Karesuando; Junkasjärvi etc. Um. Lpm. Lycksele, på öar i elfven. VB. Haparanda. Ängml. Nordmaling vid Öhre elf nära Häknäs sågverk; Viksjö vid Mjellån. Medelp. vid Indalselfven och Sättnaån, nära kyrkan. — N. Finn. Tana-elf; Karasjok: Norm.; Alten-elf. Nordl. i Molselv-dalen.) De öfre bladen n. helbräddade, de nedre ofta groftandade. — *Sonchus* L.

### 36. SONCHUS Lin. Mjölktistel.

- 1 *S. palustris* L. bladen nedåt parflikiga med pil-lik bas, spetsade stjelkomfattandeflikar; blomkorg. i flocklik qvast, med skaft och holk svart glandelhåriga; skalkfruktens längsgående åsar på tvären rynkiga. 2 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1109. H.N.f.16, n:o 8. Hafsstr. bländ buskar, r. (Saxaviken mellan Skåne och Blekinge, på en liten halfv midt emot Valjö gård.) *Manshög, med talrikare, men något smärre blomkorgar och blekare blr än följ., långa, tillbakaböjda bladflikar. Skalkfr. med 4 högre och flere mellanliggande smärre åsar.*

- 2 *S. arvensis* L. bladen nedåt parflikiga, med hjertlik omfattande bas, stundom odelade, uddtandade; blomkorg. som hos föreg., med skaft och holk gult glandelhåriga; skalkfr. som hos föreg. 2 7, 8, g. blr. — *β litoralis*: 1—3blomstrig, med glattare holk och blomkorgsskaft — *γ laevipes* K. holk och blomkorgsskaft fullkomligt glatta. Fig. Fl.D.606. *β* H.N.f.16, n:o 7.

Odl. st. *β* hafsstr. a. (Sk.—VB. Boh. — N. till Nordl. Finn. Hammerfest. Ost.-Finn. — *γ* ÖG. Rejmyra: H. v. Post. Södm. Brännkyrke sn: G. v. Ced.) *β*, som växer på hafsstr., har smala, hela ell. kortflikiga, blad.

- 3 *S. oleraceus* L. bladen lyrförmigt nedåt parflikiga och mjuktandade, matt blågröna; de stjelkomfattandeflikarne framslående; blomkorgarnes skaft och holkens has yngre ullmjöliga, slutl. glatta, säll. med några strödda glandelhår; skalkfrs åsar på tvären rynkiga. 2 7—9, blekg. blr. Fig. Fl.D.682.

Odl. st. a. (Sk.—VB. och Um. Lpm. — N.) Bladen stund. n. hela.

- 4 *S. asper* Vill. bladen äggrundt aflånga, hela eller flikade, styft uddtandade, glänsande. basens flikar stjelkomfattande, tillbakaböjda; blomk: skaft och holk som hos föreg.: skalkfrs åsar och yta släta. 2 7, 8, blekgula blr. Fig. Fl.D.843.

Odl. st. a. (Sk.—VB. och Jemtl. — N.) *Bladen ofvanpå mörkgröna, kantens änd-  
der stickande; skalfr. släta, med 3 upphöjda åsar på hvarje sida. — S. oleraceus*  
7 och 8 L.Fl.Su. *S. fallax* Wallr.

### 37. LACTUCA Lin. Laktuk.

- 1 *L. Scariola* L. bladen fasta, vända n. på kant, nedåt parflikiga och tandade, med tag-  
gig ryggnerf; blomkorg. mångblommiga. 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.715. Fl.D.1227.  
H.N.f.8, n:o 4, 5.

Murar, åkerren. r. (Sk. Lund. Smål. Kalmar. ÖG. Nyqvarn vid Liuköping: Kindb.)  
*L. virosa* Liljebl. ed. 2.

- 2 *L. muralis* Don: bladen tunna, lyrformigt nedåt parflikiga med stor, 3—5vinklig änd-  
flik, utan taggar; blomkorg. omkring 5blommiga, i mycket gles samling. 2, 7, 8, g.  
blr. Fig. Fl.D.509.

Klipp. och steniga lundar. (Sk.—Ångml. VB. Björkfors. Dal. Verml. Boh. Öl.  
Gottl. — N. till Trondhj. och Stördalen.) Hög, men späd växt, med små blom-  
korgar. — *Prenanthes* L.

### 38. LAPSANA Lin. Harkål.

- 1 *L. communis* L. de nedre bladen lyrformiga, med stor äggrund vinkeltandad ändflik.  
de öfre n. äggrunda; blomkorg. talrika i qvastlik samling. 7—9. Fig. Fl.D.500.  
Odl. st. a. (Sk.—Ångml. Verml. — N. till Finnm.) 3—6 kvarter hög, med små  
blomk., blekgula blr. Var. glatt och hårig: var. *pubescens*.

### 39. TRAGOPOGON Lin. Hafrerot.

+ Blr mer och mindre röda.

- +1 *T. porrifolius* L. bladen vid basen vidgade, jemnbreda platta, något styft raka; blrna  
kortare än den 8bladiga holken; blomkorgskaften uppåt vidgade, uppblåsta. 6.  
7. Fig. Fl.D.797. Reich.Cichoriac.t.1387,f.2 och 3.

Vid gårdar, jordvall. r. (Sk. på Christianstads vallar; Malmö, vid och på vallen mell.  
slottet och Ribersborg; Kullaberg etc. Blek. Carlskrona, ymn. vid nya Dockan på  
kronovarvet. Smål. Öfverum och Oskarshamn: Scheutz. ÖG. Opphem i Tjärstad  
enl. Kindb. Hall. Varbergs fästn. Gottl. Storugns i Lärbro: G. v. Cederv.) Blrna  
violetteröda, bildande en platt blomkorg. Hybridiserar vid Carlskrona med *T.*  
*pratensis* enl. Gosselm.

- 2 *T. crocifolius* L. bladen ända från basen smalt jemnbreda, platta, n. upprätta; blom-  
korgskaften n. jemntjocka; blrna kortare än den vanl. 5bladiga holken. 7. Fig.  
Reich.t.1388,f.1.

Betesm. r. (Gottl. Visby, på Snäckgården enl. ex. af Stud. R. Oldberg.) Alnshög, men  
spenslig, med mycket smala (en linie breda) blad och små blomk.; blrna mörkt  
purpurroda med brämets spets gul.

++ Blr gula.

- 3 *T. pratensis* L. bladen fr. vidgad bas jemnbreda, kölade; blomkorgskaften nästan jemn-  
tjocka, de yttre blommorna i blomkorgen större, af holkens längd. 2, 6, 7. Fig.  
Sv.B.146. Fl.D.906. H.N. f.15, n:o 5 [var. ochroleuc.].

Ängar, trädgårdspark. (Sk.—Medelp. Sundsvall. Södra Dal. Verml. Boh. Öl. Gottl.  
— N.) Holtbladen omkr. 8. Var. med korta kanibl: *brachyglossus*, och stora  
blekgula: *ochroleucus* Fr.S.V.Sc., samt med vågräddade blad.

- 4 *T. minor* Fr. bladen från en kort, vidgad bas smalt jemnbreda utdragna platta och  
slaka; blomkorgskaften n. jemntjocka; alla blrna n. dubb. kortare än holken. 2,  
6, 7, g. blr. Fig. Reich.t.1390,f.2. H.N.f.15, n:o 6.

Lerjord, r. (Sk. i vest. delen. ÖG. kanalbank. mell. Berg och Brunneby, samt i Krigs-  
berg enl. Kindb. Södm. Gripsholm. VG. Göteborg, i Slottsskogen och nya Alléen, samt  
på Öarne. — N. Christiania: Ax. Blytt.) Blomk. mindre, blad. smala, qv.långt utdragna.

### 40. SCORZONERA Lin. Kornfibla.

- 1 *S. humilis* L. stjelen 1—3bladig, i närheten af bladen ullig; rotbladen ovala — smalt  
lancettlika, med ulliga skaft; stjelbl. smärre och n. jemnbreda; blomkorg. 1—3;

yttre holkfjällen *smalt aggrunda* — *lancettlika*. 2/6, 7, g. blr. —  $\beta$  *angustifolia*: rotbladen *smalt lancettlika*, åt båda ändar långspetsade. Fig. Sv.B.212. Fl.D.816;  $\beta$  1653. H.N.f.7, n:o 3.

Fukt. äng. (Sk.—Uppl. Södra Dal. och Verml. Boh. Öl. Gottl. — N. nära Fredriksstad på Kragerön vid Fuglevig samt i Skjebergs s:n.) Vanl. *enblomstrig*, men blir på feta ängar stor och *flerblomstrig*.  $\beta$  eller *S. plantaginea Schleich.*, utmärkt af de smala bladen, öfvergår tydl. i  $\alpha$ . Ex. i H.N. visa en medelform.

#### 41. PICRIS Lin. Bittermjölke.

1 *P. hieracioides* L. stjelken upprät, stråfhårig; bladen stjelkomfattande, lancettlika, bugtandade; blomkorg. i qvast, de mellersta på kortare skaft; foderholken fjäll något släta.  $\gamma$  7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1522. H.N.f.1, n:o 8.

Åkerrenar etc. r. (Sk. Skabersjö, Ramlösa, Belteberga, Hvidarp, Ousbyholm, Onslunda m. fl. st.) Liknar ett stort *Hieracium*.

#### 42. CREPIS Lin. Klofblå.

† Stjelmångbladig; fruktsjun gulaktigt hvitt: *Aracium Less.*

1 *C. paludosa* Moench. *glatt*; rotbladen skaftade; stjelkl. hjertlikt omfatt., ovala ell. bredt aflånga, med något tillbakaböjda tänder, de nedre vid basenflikiga; blomkorg. i gles qvast, med svarthårig ell. n. glatt holk. 2/7, g. blr. Fig. Fl.D.928. H.N.f.12, n:o 7.

Fukt. skogsäng. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) Utmärkt af sin glatthet och de stora, tunna bladen. — *Hieracium* L. och ed. 9. *Geracium* Reich. *Soyeria* Godr.

†† Stjelmångbladig; fruktsjun rent hvitt.

\* Bladen stråfhåriga ell. ludna.

2 *C. biennis* L. bladen *nedåt parflikiga* stråfhåriga, de öfversta oskaftade lancettlika tandade; blomholken smått stråfuden, med på insidan håriga fjäll; skalfr. med *lättsittande*, föga stråva åsar.  $\gamma$  6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.735. Fl.D.1997. H.N.f.2, n:o 5. Äng. jordvall. r. (Sk. allm. på slättbygdens åkrar enl. F. Aresch. Hall. Halmstad. Stockh. i Sollentuna. Uppl. Enköping; Sigtuna vid Vallby; Sollentuna; Borg i Frötuna sn enl. Leffl.) Har dubbelt större blomkorgar än de 3 följ., med svartgrön holk och gula märken; bladflikarne ofta *flerklusna*.

3 *C. nicænsis* Balb. bladen *nedåt parflikiga*, kort stråfuden, de öfre med pil-lik bas, jemnbreda helbräddade; holk glandelhårig, med på insidan glatta fjäll; skalfr. som föreg.  $\gamma$  7, g. blr. Fig. Fl.D.suppl.91. H.N.f.3, n:r 3.

Äng. r. (Stockh. Gröndal, nära Ormsjön; Solna; vid Agnesberg och Myrbaddet. Gottl. vid Klintehamn; Thed.) Till örten lik föregående, men mindre, holken konisk. n. lika tjock som hög; bladen i blomsaml. små ell. inga; blomk. till storlek lika följ.; märken gula, torra bruna.

\*\* Bladen glatta ell. n. glatta.

4 *C. tectorum* L. bladen lancettlika *hela*, tandade, eller *parflikiga*; de öfversta jemnbreda, merändels med den pil-lik basen stjelkomfattande; holken småluden, med på insidan håriga fjäll; skalfr. med *gles*, mycket stråva åsar.  $\odot$  6—9, g. blr. —  $\beta$  *segetalis*: spåd, fåblomstrig med långa enblomstriga blomk.skaft; bladens bas smal, knappt pil-lik. Fig. Fl.D.501.  $\beta$  H.N.f.2, n:o 6.

Åkerren. tak etc. a. (Sk.—VB. och Pit. Lpm. — N. till Finnm. —  $\beta$  *Blek. Smål. Rosl. Boh. Gottl.*) Vanl. *alnshög*, bladen *stundom* n. jemnbreda och *hela*, *stundom* djupt parklusna, med rakt utstående eller framåt riktade flikar; blomsaml. bladig. Var. på Öland fingerhög och nedtill grenig. — *Leonrod. autumnale* Fl.D.

5 *C. virens* L. bladen lancettlika, tandade ell. *parflikiga*, säll. n. hela, blågröna, de öfre med pil-lik bas, vanl. hvasst tandade vid basen; holken gleshårig, med på insidan glatta fjäll; skalfr. med *gles*, dels släta, dels stråva åsar.  $\odot$  6, 7, g. blr. Fig. Fl.D. 2544. Reich.t.1441.

Odl. st. åkerren. r. (Öl. mellan Färjestaden och Thorslunda, upptäckt 1866 af Prof. Ands. Gottl. vid Visby i sedn. åren inkommen med gräsfrö enl. G. v. Cederv.) Blomkorg. små med blekgula blr.

Hartman, Skandinavien Flora (10:de uppl.).



+++ Blidlös stängel: *Intybus* Fr.

\*6 *C. multicaulis* Ledeb. bladen aflångt spadlika, hela och glest tandade ell. n. lyrformiga, glatta; blomkorg. i qvast, med smalt cylindrisk holk; holkfjällen längs midten gländelhåriga och glest hvitulliga. ☉? 7, g. blr. Fig. Fl.D.suppl.90. Bot.Not.1857, n:o 11. H.N.f.15, n:o 13.

Fjelltr. r. (N. Ost-Finnm. på förvittrade lerskiffer vid Meskelfvens utlopp i Varangerfjorden.) Mindre och mycket spåddare än följ. med långt skaftade rotblad och ofta flere stänglar från samma rot.

7 *C. præmorsa* Tausch: bladen aflånga, mot spetsen vidgade, helbräddade ell. glest småtandade, småludna; blomkorg. i kleselik, tät samling; holkfj. glatta ell. med några få hvita hår, utan glandler. 2, 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.942. H.N.f.13, n:o 28.

Ang. (Sk.—Gestr. och Dal. Öl. Gottl. — N.) *Hierac. præmorsum* L. *Geracium* Reich.

#### 43. HIERACIUM Lin.) Hökblomster.

† *Piloselloidea*: Stjeln stängelformig med helbräddade ell. föga naggtandade, oskaftade ell. till ett kort vingadt skaft afsmaln. blad, mest samlade kring basen. Skalfruktar i toppen djupt refflade, med fina jemnhöga fruktstj. i enkel rad. Årssjtelkarne bildas ofta ur grenskott eller rosett bärande rotrefvor.

A) St. 0—3bladig m. krypande bladiga grenskott ofvan marken och ofta m. bladlösa refvor under jordytan, hvilka i spetsen utveckla bladrosetter. De yttre rotbl. korta, omv. åggrunda—spadlika, oftast qvarsitt. vid blomningen (utom hos n:o 8—9). de inre o. stbl. tungl.-aft.-lancettl., breda i förhåll. till längden, alla på öfre sidan nakna. Rotstock lång, horisontellt krypande.

a) — *Pilosellina* Fr. St. låg, 0—1blad., enblomstr. ell. 1—2 ggr klynnegr. m. långa upprätta enblomstr. skaft. Fj. alltid stjernludna, de inre spetsiga.

1 *H. Pilosella* L. st. meränd. bladlös o. enblomstr. med grenskott; bl. ofvan gröna, under tät stjernh., hvit- ell. gråludna, på båda sidor o. i kant. långh.; fj. breda m. bred blek kant, de yttre något trubbl. 2, 6, 7. Bland dess talrika former äro följ. de utmärktaste:  $\alpha$  *ulvare Monn.* bl. gh., grskott långa, bl. hvitludna. —  $\beta$  *grandiflorum* DC. bl. stora gh., grskott korta o. tjocka, bl. hvitludna. —  $\gamma$  *Peleterianum* Monn. lik föreg. men bl., bl. o. stund. st. tät långh. —  $\delta$  *nigrescens* Blytt högväxt m. stora långh. o. svart gh. bl., utdragna grskott. —  $\epsilon$  *flagellare* (W.) bl. stora, v. långh.; grskott utdragna v. blomhår; bl. tunna, under glest stjernh., o. grönakt.; st. långh., 2—3blomstr., vid basen stund. enbladig. —  $\zeta$  *virescens* Gaud. bl. små; grskott utdragna; bl. som föreg.; st. v. klynnegr. —  $\alpha$  Fr.H.N.f.6, n:o 4. H.Eur.exs.1; Lindeb. H.Scand.exs.1. —  $\gamma$  H.Scand.exs.2. —  $\epsilon$  H.N.f.9, n:o 8.

Back. a. (Sk.—VB. o. Um. Lpm. till 2000'. — N. till Ost-Finnm. —  $\beta$  Gottl. —  $\gamma$  särdeles vid kusten af Kattegat o. Nordsjön. —  $\delta$  N. i fjelltr.: Gräfsensåsen vid Christiania, Opdal. —  $\epsilon$  Sk. Fogelsång. Smål. Femsjö, Grenna. Södm. Strengnäs.

\*) Detta släkte är redigeradt af C. J. Lindeberg.

För utrymmets besparande hafva följ. förkortningar blifvit använda: *blk.* = blomkorg, *blkak.* = blomkorgaskaft, *fj.* = fjäll, *holkfjäll*, *frfj.* = fruktstj., *gl.* = glandler, *h.* = hår eller hårig, *t. ex. gh.* = glandelhårig, *krbr.* = kronbräm, *st.* = stängel, *stj.* = stjeln, *nakem* = utan stjernhår, *m. l. m.* = mer eller mindre, *v.* = vanligen m. fl. hvilkas betydelse lätt fattas af sammanhanget. Blomkorgarnes form är antecknad efter de icke fullt utelagnas, och holkfjällens efter de jemnhöga mellanfjällens hos yngre blomkorgar, då icke de »yttre» eller »inre» fj. särskildt nämnas. — Artbeskrifningarna äro till största delen tagna efter *levande vilda exempl.*, några få eft. säkra herbarii-exempl., en (H. argent.) är afskrifven efter Prof. Fries. Det inakränkta utrymmet har dock nödgat förf. att göra beskrifningarna knapphändigare, än behöfvat af fullständighet inom detta slägte måhända fordrat. Af samma skäl har dels en mängd mer tillfälliga, dels flere utmärkta, men sällsyntare former måst utelämnas. Blott sådana nya arter hafva blifvit tillagda, som antingen ega en vidsträcktare och allmännare utbredning, eller sådana, som för vinnandet af en säkrare artdiagnostik måst afseöndras från andra, med hvilka de varit sammanblandade. Vid artbenämningarna har nu rådande nomenklatur blifvit följd, der icke förf. med full visshet funnit den vara oriktig. — Bland förkortningar må ytterl. nämnas: *H. Eur. exs.* = Fries' *Hierac. Europæa exsiccata* Upps. 1866, — *H. Sc. exs.* = Lindeb. *Hierac. Scand. exsiccata* 1 fasc. Göteborg. 1868.

*Helsl. Söderhamn. Ner. vid Kärr i Wiby sn; Aspa bruk. VG. Kinnekulle. Boh. — N. Mallö vid Grimstad: Bl. — Ner. Örebro. Uppl. Tible, o. Sk. Helsingborg: Almqv. — N. Christiania.) Var. mycket i afs. på storlek o. beklådnad. Kantblmnas br. under rödrand., säll. ss. hos  $\gamma$ , rent gult. De flesta formerna få stund. blomb. grskott.  $\approx$  har hos oss hitills förväxlas med den Sydosteurop. H. stoloniflorum Kit., som ej finnes i Skand.*

- \*2 *H. cernuum* Fr. st. vid basen enblad. m. korta grskott, långh., vid midten delad i 2—3, säll. flere långa enblomstr. skaft; bl. under blekgörna m. glest l. intet stjernludd. på båda sidor o. i kant. långh.; blk. stora m. smalare, n. mörkare o. smalkant. fj. 2, 7.  $\alpha$  *collinum*: mindre m. under rödrand. kantbl. o. stjernh. bl. —  $\beta$  *umbrosum*: större m. under gula kantbl. o. nakna bl. —  $\alpha$  H.N.f.15, n:o 12. H.Eur.exs.4. H.Sc.exs.3. Fjelltr. r. (N. vid Hugelien i Torpen, Langedalen, Stensåtsbygden, Eikjebakken m. fl. st. i Valders. Lesjekougen vid Qvam o. Stuaflotten. Opdal vid Stensem: Ambr. Jönsson.) 2—3 qv. hög, öfverallt långh. Blomkorg. ej mer lufande (*cernua*) än hos de öfriga inom afdeln. Var. 1blomstr., utan grskott, säll. m. blomb. grskott o. bladroseller. Liknar mycket *H. Pilos.*  $\approx$  flagellare, från hvilken den lättast skiljes genom kortare grskott, mer utspärr. blksk., mörkare, spetsigare och mer smalkantade fj. — *H. furcatum* Hn Ed. 4. — Står närmast den Sydeurop. *H. bifurcum* MB., till hvilken den fördes i H.N.

- 3 *H. auriculiforme* Fr. st. vid basen enbl. m. korta grskott, ofvan midten gr. i 2—3 långa (säll. flere klaslikt ställda o. kortare) blksk.; bl. blågröna ofvan nakna, under tunnt men tätt stjernludna, v. på båda sid. o. i kant. glest.; blk. små m. fj. o. beklådn. ss. hos *H. Pilosella*. 2, 6, 7. —  $\beta$  *denigratum* Fr. st. glest långh.; blk. långh. m. täta mörka gl. — H.N.f.6, n:o 5. H.Eur.exs.9. H.Sc.exs.4 (båda formerna).

Tor. fält, back. r. (Smål. Femsjö. Södm. Uppl. i Mälaretrakten. Göteborg. enl. Lemm. — N. Tönsberg på en bergås v. om staden. —  $\beta$  Uppl. vid Uppsala o. Utjorden vid Almarestak.) Spenslig fingerhög—quartershög, v. m. ett blksk. nära basen. Bl. stund. n. glatta. Kantbl. v. rödrandade. — Habituellt likt *magrare* form. af följ. men endast besläglad med *H. Pilos.*  $\gamma$  *virescens*, med hvilken den ofta förväxlas. Skiljd med mindre o. smalare blk., mindre, fastare o. blågröna bl.

b — *Auriculina* Fr. st.  $\frac{1}{2}$ —4 qv. hög, 0—3blad., få—flerblomstr. m. v. sammansatt qvast ell. oregebl. knippe, blksk. korta, uppstig. Fj. nakna l. glest stjernh. m. tyd. glatt kant, de inre trubbiga.

\* *pratensis*: stift alltid gula; krbr. å båda sid. gult; fj. med hinnakt., glatt o. blek topp.

- 4 *H. Auricula* L. st. 1blad. m. långa grskott, 1—8blomstr. m. n. enkel flock; bl. blågröna, tunglika, mest trubbiga, på båda sid. nakna o. glatta. mot basen glest hårbrädd.; fj. n. nakna m. bred ljus kant. 2, 6, 7. —  $\beta$  *majus* Wg: 2—3 qv. hög, till alla delar gröfre, m. 4—8 blk. —  $\alpha$  H.N.f.6, n:o 6. H.Eur.exs.13. H.Sc.exs.5.  $\beta$  H.N.f.9, n:o 7. Ängsback. a. (Sk.—Pit. Lpm. — N. till 4000'). Vanl. quartershög med små blk. St. spädd, gh. o. stund. glest korth., upptill stjernh. Var. på torra st. o. i fjelltr. fingerhög o. enblomstr. (H.N.f.11, n:o 14); på fukt. äng öfvergår den tyd. i  $\beta$ , som i Fr. Symb. fördes till *H. suecicum* Fr. Holkfj. bli i fjelltr. n. så mörka som hos *H. floribundum*.

- 5 *H. pratense* Tausch. st. 1—2blad. m. grskott o. stund. långskaft. bladros., mångblomstr. sammansatt qvast; bl. gröna, tunna, rotbl. spadl.—tungl. trubb., stj. lancettl. spetsiga, alla på båda sid. nakna (endast stj. bl. under svagt stjernh.) o. oftast glest långh., tätt hbrädd.; fj. stjernh., långh. särdel. mot spetsen, ljust gh., bredt ljuskant. 2, 6, 7. H.N.f.6, n:o 10. H.Eur.exs.18. H.Sc.exs.15.

Odl. st. r. (Förvildad h. o. d. från Sk.—Gestr. t. ex. Lund, Uppsala, Gefle. — N. Christiania.) St. 2—4 qv. hög, särdel. mot toppen o. basen lät mjukh., h. föga längre än stj.diametern, upptill äfven gh. o. stjernh.

\*\* *aurantiaca*: stift rödbruna, kantblmnas br. åtm. på undre sidan brandgult ell. rödrand., fj. m. hinnakt. glatt o. violett topp. St. åtm. i toppen ell. mot basen rödakt.

a) *glaucescentia*: st. 1—2 qv. hög, 1—2blad., med fasta, blek. ell. blågröna bl.

- 6 *H. floribundum* Wimm. st. 1—2blad., glest långh., uppåt gh. o. stjernh. m. utdragua

spensliga grskott o. stund. långskäft. bladros., fåblomstr. m. v. enkel öppen qvast; bl. bredt tungl.—lancettl., de inre v. i toppen veckade, blekt blågröna, på båda sid. nakna o. glatta, på undre sidans medelnerv o. i kant., särd. mot basen, långh.; fj. bredt blek- de yttre n. hvit-kantade, endast mot basen glest stjernh., på den mörkgröna o. kölade ryggen glh. o. långh.; diskbl. gula, kantbl. br. under rödrand. 24 7, 8.

— *β alpestræ*: spådare m. smärre bl., bl. kölade ofta vågbrädd. o. snedspetsade, st. stund. ända från basen röd. — *α* H.N.f.15, n:o 11. H.Eur.exs.14 o. 17. H.Sc.exs.6. — *β* H.N.f.13, n:o 8. H.Eur.exs.13, b. (und. H. Auric.), 14\*. H.Sc.exs.7. — \**stellatum* Lindeb.: med högre korth. o. öfverallt stjernh. st.; gråblå, n. platta o. rätspets., under stjernh., kort hårbrädd. bl.; ljusare (röd)gula o. gula kantbl. H.Sc.exs.8.

Fukt. äng. o. fjellider. (VB.—ÖG. Gottl.: bufvudformen i läglandet i mellersta Sverige o. sälls. i N. — *β* allm. i fjelltr. 1500'—2500'. — \* i fjelltr. r. N. Langedalen, Tonsaasen m. fl. st. i Valders. Drivstuen på Dovre. 1500'—3000'.) 1—2 qv. hög, få- o. stor-blomstr. Var. sällan med rent gula kantbl. o. gula, blott i kant. mörkhåriga stift, hvilket enl. Wimm. lär vara det vanl. förhållandet i Schlesien. Anses ss. hybrid af *H. Auricula* o. *H. pratense*, hvilken senare dock hos oss nästan aldrig förekommer på samma lokaler. I fjelltr. förekomma flere ännu outhärdade former, som närma sig än *H. decolorans*, än *H. dubium* och synas vara hybrider af dessa. *H. suecicum* Fr. o. Hn. ed. 9; *β* *H. floribundum* Fr. o. Hn p. p. — \**stellat.* dr 2—3 qv. hög med korta, stund. felande grenskott o. blott upptill rödakt. st.

\*7 *H. Blyttianum* Fr. st. mot basen enblad., teml. tätt långh., upptä gih. o. stjernh., m. grskott, fåblomstr. m. små kortskäft. bl. i enkel sammandragen qvast; bl. tungl.—lancettl., blågröna, nakna, vanl. på båda sid. glesh.; diskbl. rödtoppade. kantbl. invändigt rödgula, utvändigt rödrand. ell. rödvioletta. 24 7. H.N.f.13, n:o 7. H.Eur. exs.16. H.Sc.exs.14.

Fjelltr. r. (N. Hugelien, Stensætsbygden, Tonsaasen, Högnesæter m. fl. st. i Valders.) St. spenslig, föga mer än quartershög, stund. mot midten med ett mindre fjällformigt, under stjernh. bl., 3—5blomstr. Grenskotten saknas aldrig, stund. utvecklas afven långskäft. bladrosetter. Bl. vanl. små, blågröna o. ofta violett-fläckiga. Var. föga; på fukt. st. högre, med tunnare och grönnare bl., större o. flere bl. i något sammansatt qvast. — *H. fuscum* Fr. Symb. o. Hn. ed. 8, icke Vill. enl. Fr.

*β* *viridia*: st. 2—4 qv. hög, tätth., 1—3blad., med stora, tunna, på båda sid. håriga o. v. lifligt gröna blad.

8 *H. decolorans* Fr. p. p. st. 1—2blad., stråfh., säll. m. grskott, men alltid m. långsk. rosetter, flerblomstr. m. långt hvith., sammansatt, v. tät, n. flocklik qvast; bl. styfva o. v. gläns., n. omv. äggr.—af. lancettl., hårbrädd. o. på båda sid. glesh., nakna (utom det öfversta, under glest stjernh. stjladet); fj. lika med *H. florib.* men mer stjernh.; alla bl. inv. gula, kantbl. utv. rödrand. 24 7, 8. — *β serratum*: st. 1½—2½ qv. hög m. fåblomstr., n. enkel utspärrad qvast, bl. mycket breda, kölade o. ojemnt grofsågade. — *β* H.Sc.exs.9. *H. suecicum* v. *alpigenum* Fr. H.Eur.exs.14 b.

Fjelltr. r. (*Herjed.* mell. Funnesdalen o. Skarffjellet samt i öfre Ljusnedalen. — N. Nystuen i fjellierna vid björkgränsen på Fillefjeld. Dovre vid Drivstuen: Ambr. Jönsson enl. Fr. H. Eur. exs. — *β Herjed.*: J. Hulting. — N. vid Stensem i Opdal. 2000'—3000'.) 3—4 qv. hög, m. grof, tätt men kort stråfh., upptä tillika stjernh., glh. o. rödakt. st., samt stora, breda o. lifl. gröna bl. De yttre rotbl. vid blomningstiden bortvissnade. — Ofta förvecklad med följ. o. med former af *H. aurantiacum*.

\*9 *H. flammeum* Fr. st. 2—3blad., kort stråfh. oftast utan grskott, men med långskäft. ros., fåblomstr. med korth., n. enkel klaslik qvast, de nedre bl. utdragna, v. enkla o. aflägsnade; bl. mjuka, v. gläns., tungl.—lancettl., hårbrädd. o. på båda sid. korth., rotbl. nakna, stjbl. under stjernh.; fj. breda mörkgröna m. föga blekare kanter, glh., stjernh. o. glest långh.; diskbl. gula o. blott rödtoppade, kantbl. inv. gula, utv. mörkt röd- ell. violett-randade. 24 7, 8. H.Sc.exs.10. *H. decol. var.* Fr. H.N.f.16, n:o 11. *H. decol. flammeum* Fr. H.Eur.exs.19\*.

Fjelltr. r. (N. Tonsaasen, Fillefjeld m. fl. st. i Valders. Dovre vid Drivstuen. Opdal f. nerest. 2000'—3000'.) St. 3—4 qv. hög men spenslig, beklädd ss. föregående. Bl. mjuka, tunna, långa, men föga breda, de yttre vid blomn. bortvissnade. Bl. små, smala, af n. samma storlek o. form som *H. cymosi*. Var. föga: på torra

*st. mindre, mer stjernh. m. mindre och fastare bl. samt blekare blr. Lätt skiljd från föreg. genom n. dubbell smalare, mer korth. o. stjernh. st., mjukare o. smalare, mer stjernh. bl., smärre, smalare o. längre skaft. bl., smalkant. fj. o. mörkare kantbl.* Stund. förväxlad med följande: »*H. aurantiacum v. bicolor*». *Auct. Scand.*

- 10 *H. aurantiacum* L. st. 2—3blad., tätt långh., v. m. korta grskott o. bladros., mångblomstr., långt mörkh., sammansatt tät n. flocklik qvast, stund. m. de nedre blksk. aflägsnade, flerblostr.; bl. mjuka, omv. äggr.—afl. lancettl., hårbrädd. på båda sid. glest långh., nakna, de öfre stjbl. under glest stjernh.: fj. breda, mörkgröna, v. m. tyd. blekare kant., tätt och mörkt glh. och långh. samt, särd. mot basen, glest stjernh.; alla blr inv. mer ell. mindre rödakt., kantblr utv. mörkröda—violett-röda. 24 7. — *β glaucescens* Lindeb.: stor, robust, långh. o. mörkblomstr. ss. hufvudformen, men m. mindre blk. i mångblomstr., hvithårig, vanligen vipplik qvast; bl. mindre o. fastare, under något blå- ell. grågröna, liksom hela st. med täta stjernh.; fj. m. tydligare gröngrå kanter, smalspetsade. Saknar vanl. både grenskott o. rosett. — *γ bicolor* All. till alla delar mer korth. och mjukh. o. ofta spädare än hufvudformen, m. v. mer fåblomstr. qvast; diskblr gula, blott rödtoppade, kantblr ofta något ljusare än hufvudformens. Har vanl. långskaft. rosetter. — *α* H.N.f.10, n:o 9. H.Eur.exs.20. H.Sc.exs.11. — *β* H.Sc.exs.13. — *γ* H.Sc.exs.12.

Äng. i bergstrakter. (Hufvudf. förvild. h. o. d. i parker o. trädgårdar fr. Sk.—Uppl. o. i S. Norge. — *β* N. Hugelisetern, Stensåtsbygden m. fl. st. i Valders. 2000'. — *γ* Eksjö, Smedstorp m. fl. st. i norra Smålands högländ. — N. Land vid Lie.) *Hufvudf. stor, grof, öfverallt tätt långh. m. mörka hår i blst. o. m. stora tunna bl. — γ har n. hårlösa blstgren.*

B) St. 1—flerblad., utan ell. säll. m. korta, bladiga grskott (hos n:ris 12—15) o. n. oskaft. bladros. vid basen. De yttre rotbladen vid blomn. oftast bortvissnade, de inre och stjbl. lancettl.—jemnbreda, smala i förhåll. till längden. Rotstock kort, v. snedt nedstigande.

*a — præalta:* st. 1—4 qv. hög, spenslig, 1—3blad., flerblostr. m. vipplik, sällan n. flocklik qvast. Småblomstriga, blek- ell. blågröna arter med nakna (n:ris 11 o. 12) ell. glest stjernh. blad (n:o 13).

- 11 *H. hyperboreum* Fr. st. 1—2blad., sträf af glesa styfva hår längre än stängels diameter; de inre rotbl. o. stjbl. smala, tungl.-lancettl.-jemnbreda, spetsiga långspetsade, på båda sid. nakna o. glatta, i kant. o. på medelnerven glest styfh.; blk. cylindriska i fåblomstr., gles o. öppen vipplik qvast, med en ell. annan undre gren långt aflägsnad; fj. smala, trubbiga, violett- ell. svartgröna, smalkant., liksom de fina böjda blstgr. o. blksk. nakna, m. glesa, långa hår o. korta glh. med rödgula knappar. 24 6, 7. H.N.f.13, n:o 9. H.Sc.exs.19.

Bergstrakt. r. (*Gottl.* på kalkklippor enl. Fr. — N. Langoe o. Brevig i Bradbergs amt. — Lom—Nordl. o. Finnm. flerst.) St. 1—2 qv. hög, spenslig o. flerböjd med de minsta blk. i sågdet. Bl. styfva, intensivt blågröna, stund. violettakt. Saknar alldeles stjernh. o. grenskott. — Var. blott i afseende på storlek o. blomrikhet: *qvasten hos magrare ex. fåblomstr., kortgrenig. Mycket närbesläktad med H. florentinum* All., från hvilken den skiljes n. blott genom stängels beklädnad. — *H. præaltum* var. *piloselloides* Hn ed. 4 och Fr. Mant. 3.

- \*12 *H. præaltum* Vill. st. 2—3blad., glatt ell. glest styfh. (hos *β* tillika stjernh.); bl. lancettl. spetsiga, v. på båda sid. nakna o. glatta, i kant. o. på medeln. glest styfh.; blk. cylindr. i tät, vipplik qvast, de undre gren. stund. långt aflägsnade o. räta; fj. smala, trubbiga, svartgröna m. tyd. blek kant., tillika med blstgr. o. blksk. v. stjernh., glest långh. o. glh. 24 6, 7. H.N.f.6, n:o 7. — *β decipiens* Gren. st. o. bl. mer mjukh., de senare under äfven stjernh. H.N.f.6, n:o 9.

Bergstrakt. r. (N. *α* osäker i Skand. Ex. i H.N. uppgifvas vara odlade af frö från Dovre, der växten likväl på de senare decennierna icke blifvit funnen. — *β* N. Reien i Slidne, Froen i Gudbrandsdalen: Blytt. Öfre Romsdalen. Ex. från öfriga angifna lokaler tillhöra följ. — Skall äfven finnas vid Uppsala, der ex. i H.N. sägas blifvit insamlade.) *β* är snarlik *H. cymosum α*, hvarifrån den lätt skiljes genom blomställn. o. beklädnad.

- \*13 *H. subpræaltum* Lindeb. st. 2—3blad., glest o. kort finh. o. stjernh., stund. m. korta, sterila ell. blombär. småblad. grskott; stjbl. smala, jemnbr.-lancettl. spetsiga, under tydl. ofvan n. omärkligt stjernh., v. på båda sid. o. i kant. glest småh.; blk. aflångt cylindr. i såblomstr., än vipplik än n. flocklik qvast; fj. breda, trubbb., svartgröna, n. kantlösa, liksom blistr. o. blksk. stjernh. o. glh. 24 7. H.Sc.exs.20. — *H. præaltum* \*stoloniferum Fr. H.N.f.14, n:o 12.

Bergstr. r. (*N. Tömté*, Kamphaug m. fl. st. i Nordmarken. Mistberget vid Eidsvold: Bl. Elstad i Gudbrandsdalen. Opdal på ångarna ofvan Stensemgårdarna. — 1000'—2000'). St. 3—4 qv. hög, v. spåd o. flerböjd. Bl. teml. tunna, svagt blågröna, under stund. rodnande, v. uppstig. till stjelkens midt. Var. med såblomstr. n. enkel qvast o. glesh. blk. (vid Stensem). Förväxlad med föreg: β, från hvilken den lätt skiljes genom stjelkens o. bladens korta o. mjuka hårbeklädnad, de mjukare på öfra sid. stjernh. bl., den såblomstr. o. mer sammanträngda blst., samt de bredare o. kortare fj. — Hos båda är ett ell. annat af de inre fj. spetsigt.

β — *cymosa*: st. v. 2—4 qv. hög, oftast grof, 1—flerbladig, v. mångblomstr. med sammansatt, m. l. m. flocklikt ell. qvastlikt knippe. Gräsgröna ell. gulgröna arter med på båda sid. stjernludna blad.

- 14 *H. dubium* L. st. 1—3blad., öfverallt stjernluden o. n. till basen glh., oftast med kryp. grskott o. stund. m. skaft. rosetter; bl. ofvan rent gröna, under svagt blågröna, n. likform., smala, lancettl.-jemnbreda, ofta i kant. vågbräddade o. snedspetsade, v. på båda sid. h. o. stjernh.; blk. i flerblostr. vipplik ell. stund. n. flocklik qvast, tillika m. blksk. stjernludna, tät glh. o. ofta äfven enkelh.; fj. breda, trubbb., med mörkgrön rygg o. v. breda, bleka kanter. 24 6, 7. — α *pubescens*: de utdragna, v. blekgröna bl. o. ofta äfven st. o. blk. kort mjukh., de senare stora, aflånga m. bred bas; grskott v. utdragna. — β *hirsutum* Hn: de v. jemna, gräsgröna bl., st. o. ofta äfven blk. långt stråfh., de senare som hos α, grskott v. korta, stund. felande. — γ *anceps* Lindeb. finh. m. små, cylindr., vid basen smala blk., grskott utdragna, spåda.

Torra äng o. back. (*Lpl.—Smål. Blek.* Lyckeby: Ankercrona. Boh. Öl. Gottl. — *N.* till Finnm. — 1500'. — α allmänare i låglandet, β mer i fjelltr., γ på Grenna-platden.) St. från quartershög, spenslig o. såblomstr till alnshög, grof o. mångblstr. v. med vipplik qvast o. en ell. annan aflågsnad blstr. Var. betyd. sår. i fjelltr. mer många ännu söga kända former förekomma, än närm. sig till *H. florib.* \* *stellatum*, än *H. cymosum* α. — Låglandsform. af α dro ofta svårskiljda från *H. glomerat.*, men igenkännas lättast genom kortare, fjäbladigare st. m. mer utdragna grskott, ofta vågbrädd. bl., större o. mörkare blk. m. bredare, mindre utdragna o. mer trubbb. (äfven de innersta), samt tydligare kantade fj. — γ närmast sig mycket *H. cymosum*.

- 15 *H. glomeratum* Froel. p. p. st. 2—5blad., kort mjukh., stjernh. o. n. till basen glh., säll. m. korta, sterila ell. blombär. grskott; bl. ofvan gröna, under blek- ell. svagt blågröna, v. långt utdragna, de inre rotbl. o. stjbl. n. likform., lancettl.-jemnbreda, spetsiga, v. på båda sid. korth. o. stjernh.; blk. aflånga m. något vidgad bas, i mångblstr. vipplik ell. flockl. sammandr. qvast, tillika m. blksk. tät stjernh. o. glh.; fj. smala, mer ell. mindre utdragna till en smal men trubbb. spets. 24 6, 7. H.N. f.13, n:o 11; f.13, n:o 14 (»H. cymosum»). H.Eur.exs.34. H.Sc.exs.21.

Ang. etc. (*Blek. Smål.—Helsl. Ångml. VB.* Boh. Klöfverön. Dalsl. Gottl. Rütbe, Lärbro etc.: Westöb. — *N.* södra delen, sälls. t. ex. Holmestrand, Dröbak, Gräfsen-aasen.) St. 3—4 qv. hög o. grof m. v. till midten uppstig. bl., rotbl. vid blomn. oftast förriasmade, blistalln. i början tät m. kortskäft. blk., de nedre blksk. ofta aflågsnade, fj. stund. otydl. kantade, blott några af de innersta något spetsiga. Är en medelform mellan föreg. o. följandes β, från hvilka vissa former endast med svårighet kunna skiljas.

- 16 *H. cymosum* L. st. 3—6blad. öfverallt hårig, stjernluden o. upptill glest glh.: bl. gröna, utdragna, lancettl.-jemnbreda, på båda sid. h. o. stjernh.; blk. cylindr. m. smal bas, oftast i regelb. flocklikt knippe med utdragna, hvitludna, glest långh. o. glh. grenar o. blksk., tät långh. o. stjernludna m. glh. mest mot fjällens toppar; fj. smala v. m. mörkgrön rygg o. smala kanter, utdragna till en smal, trubbb. spets. 24 6, 7. — α *hispidum* Fr. st., sår. nedre delen, bl. o. blk. tät mjukh., h. af st. diameter, bl. ofvan mycket glest stjernh. — β *pubescens* Lindblom: st. upptill från midten glest

gh., tillika m. bl. kort mjukb., blk. små, smala m. glesa h., bl. ofvan tätt stjernh. — *γ Rothianum* (Wallr.) hela växten tätt långh., blksk. utan fj. med glesa gh., blk. något större o. bredare än hos *α* o. *β*, i mer oregelb. qvastlikt knippe. *α* H.N.f.13, n:o 15; f.13, n:o 16 (»H. Sabin norveg.»). H.Sc.exs.23,24. — *β* H.N.f.13, n:o 12. H.Eur. exs.35. H.Sc.exs.22.

Äng. o. fjelltrakt. (Sk.—VB. — N. — Finn. — *α* mest i de östra prov. t. ex. Blek. Lyckeby: H. G. Lübeck. Smål. flerst. enl. Scheutz o. Zett. ÖG. VG. Ner. Södm. Uppl. etc. — N. Christiania etc. till Finn. — *β* r. i läglandet t. ex. Ner. Hardemo: Zett. Uppl. Signildsberg. — N. teml. allm. i de mellersta fjelltrakt. 1000'—2500' t. ex. Tonsaasen, Dovre, Opdal. — *γ* Öl. Borgholm. Smål. Urshult: Sch. ÖG. Berg i Vreta kloster sn: W. Oséen. VG. vid kanalen: Hn. etc.) 3—4 qv. hög, mycket sällan m. grskott, bl. vanl. samlade mot st:s nedre del, mera sällan (hos formen *aphyllopodæ*) uppstig. öfver dess midt. De breda rotbl. qvarnilla ofta, särdeles hos *α*, vid blomn. — *α* H. Nestleri Vill. o. Ed. 8. — *β* H. glom. \**alpigenum* Fr. Symb. — *γ* H. *setigerum* Tausch o. Ed. 9 p. p.

17 H. *setigerum* Fr. Hknar i hög grad föreg. *γ*, från hvilken den svårigen kan skiljas ss. egen art. Utmärker sig genom högre o. kraftigare, tätt gräluden växt, bl. uppstigande öfver sts midt, breda blk. i tätt sammandr. flocklikt ullh. knippe, samt breda, mycket trubbl. fj. 2/7. H.N.f.13, n:o 13. H.Eur.exs.37. H.Sc.exs.25.

Torra ställ. r. (Förf. har sett säkra ex. endast från Mälartrakten, t. ex. Kungshamn vid Uppsala, Mörbj. holme i Skå sn.) 4—5 qv. hög, v. m. blomb. grskott. Rotbl. vid blomn. vismåde. Blksk. o. fj. med glesa, n. omärkl. gh.

†† **Pulmonarea:** Stjelken vanl. bladig, med mer ell. mindre inskurna, vanl. tydligt skaftade blad och bladrosett från rothalsen; rotblad vid blomningen vanl. fortvarande; skalfrukter i toppen omgifna af en något uppsväld ring (under hvilken fruktens åsar och fåror upphöra) med styfva oliklånga fruktstj. holk-fjäll fåradiga, oregelbundet tegellagda.

A) *Alpina* Fr. yttre fj. utdragna, bild. en n. sammanhäng. spiral med de inre, alla svartgröna o. gh., utan tyd. stjernludd. Stj. till basen mer ell. mindre gh. Bl. åtm. i kant. fint, n. omärkl. gh. Krbr. utv. ell. blott i toppen hårigt.

\* Lågväxta, v. långh. arter, m. stora breda, rundade blk. m. de yttre fj. utstående.

18 H. *alpinum* L. stj. stängelform., stjernluden, mjukb. o. glest gh., 1—fåblomstr., 0—flerblad.; rotbl. smån. öfvergående till vingade, v. utdragna skaft, de yttre qvarsitt., spadl.-ellipt., trubbl., de inre tungl.-lancettl. spetsiga, stjbl. föga utvecklade, uppåt fjällika, v. oskaft., alla på båda sid. glesh. o. meränd. helbrädd.; blk. stora, n. klotform. m. två bas, tätt silkesludna m. små gulakt. gl., yngre lutande; fj. svartgröna, olikform., de yttre breda fränstående m. uppböjda trubbl. spetsar, de inre utdraget smalspetsade; krbr. v. ända till toppen glest långh.; stift mörka l. gula. 2/7—9. Fig. H.N.f.10, n:o 7, 8 (»H. nigrescens»); f.12, n:o 25; f.15, n:o 10. H.Eur.exs.1. — A) långhår., mjukblad. former m. långt silkesludna blk.: *α genuinum* Wimm. stj. 3—6 tum hög, 1—säll. 2blomstr., n. bladlös; rotbl. vågbrädd. veckade, v. rödlupna. — *β foliosum* Wimm. stj. fothög. 1—säll. 2blomstr., 2—4blad. m. jemnbr.-lancettl. stjbl.; bl. v. jemna, helbrädd., gröna. — *γ ramosum* Lindeb. stj. 1—2 qv. hög, ofta från basen delad i 3—5 långa upprätta böjda 1blomstr. skaft, 2—3blad.; bl. bredare, tandade. — B) kortb., styfblad. former m. svartakt. blk.: *δ subnigrescens* Lindeb. v. delad från basen i långa utstående krökta, enblomstr. skaft; bl. breda, mindre nedlöp., v. djupt sliktand.; fj. smalare långspetsade. — *ε melanocephalum* Auct. stj. o. bl. s. *α*, de senare bredare o. mera tandade.

Fjellr. s. (Lpl.—Dal. — N. 2000'—4000'. — *α*, *γ* och *ε* på fjellplatåerna öfvan björkgränsen, *δ* i öfre björkregionen, *β* i gräsrika fjelldalar t. ex. Romsdalen, Opdalen. — *ε* Högsnyta, Nystuehøe m. fl. st. på Dovre.) *Mångformigast inom släktet! Bland dess talrika, från snögränsen till barrträdgränsen förekommer flera o. ofvanstående mest konstanta; de öfriga sammanflyta utan all gräns. — γ H. fuliginosum* Læst. p. p. — *δ* knappt skild från H. *rhaeticum* Fr. H.Eur.exs.5.

\*19 H. *eximium* Backh. stj. stjernluden, långh. o. glest gh., v. blott i toppen grenad i långa, upprätta 1blomstr. skaft. 2—3bladig; yttre rotbl. få, vissnade, de inre o.

stjbl. utdraget lancettl. spets., afsmaln. till korta, bredt vingade skaft, glest groftand. m. utspärrade tänd., på båda sid. glest långh. o. stjernh.; blk. n. klotrunda m. tvär bas, långt ullh. m. små ljusa gl., yngre något lutande; fj. som föreg. men mer smal-spets.; krbr. som föreg.; stift mörka. 2/8. H.Eur.exs.1.b.

Fjelltr. r. (N. Dovre, Drivstuen. Finn. — Norman. — 2000'—3000') 1½—2 qv. hög o. stund. ända från basen grenad i upprätta n. jemnhöga grenar; bl. mjuka, 3—6 tum långa, vågrädd. m. sned veckad spets, v. djupt fluktand. Blk. ofta större än hos föreg.

\*20 *H. personatum* Fr. stj. tätt stjernl. o. långh., 2—flerblomstr., 3—5blad.; rotbl. få, de yttre vissnande, spadl.-tungl. lancettl. m. korta vingade skaft, stjbl. lancettl. oskaft., liksom de inre rotbl. styfva o. mot basen groft bugttandade; blksk. enkla, utstående o. uppböjda, hvitludna, långh. o. glest glh.; blk. bredt afl. med äggr. bas, tätt långh. m. små rödgula gl.; fj. svartgröna, de yttre breda, föga utstående, trubbl., några få inre långspets.; krbr. som föreg.; stift gula. 2/7.

Fjelltr. r. (N. Hugelien i Torpen. 2000') 1—2 qv. hög, långt o. tätt krush., m. enkla utdragna, ofta småblad. blksk. i de öfra bladvecken, stund. fr. basen grenig m. 2—3blomstr. grenar. Bl. v. vågrädd. o. veckade, under grågröna. Står nära *H. sudeticum* Sternb., från hvilken den skiljes genom längre hårighet, mot basen afsmalnande bl. o. gula stift.

\*\* Högvärta, kort finh. arter m. smalare aflånga blk. m. tilltryckta fj.

21 *H. commutatum* Lindb. stj. stängelf., glest stjernl. o. finh., enkel, 1—5blomstr., 0—1blad.; bl. tunna, på båda sid. glest o. kort krok., yttre rotbl. qvarsitt., rundade m. tvär bas, de inre ellipt.-lancettl., nedåt afsmaln., alla med långa n. ovingade, långh. skaft, mot basen v. djupt bugtand. m. breda utstående tänder; stjbl. stund. 1 närmare basen, lancettl., fätand., skaftadt; blksk. enkla, utstående o. båglikt uppböjda, tätt stjernl., hvith. o. glest glh.; blk. afl. m. äggr. bas, tätt långh., m. små rödgula gl.; fj. tilltryckta, svartgröna, smala, långt utdragna, de yttre något trubbl., de inre syllika o. långspets.; krbr. utv. föga glesl. m. korth. tänder; stift mörka. 2/7, 8. H.Sc.exs. 26 (H. nigrescens).

Fjell. (Teml. allm. i mellersta Skand. fjellbygd. 2000'—4000'. Dal.—Herj. Midtå-dalen: S. Almqv. — N. Romsdalen, Dovre, Opdal.) Stj. v. 1½—2 qv. hög, kort fin-luden, bladlös. Bl. tunna, stund. kólade o. vågrädd. Blk. smala, långskaft yngre något lutande, med svartfotade långt hvitloppade hår o. föga märkbara gl. Fj. fåradiga o. mindre regelb. tegellagda än hos de öfriga alpina. Vanl. för-veaxlad med *H. alpinum* och *H. nigrescens*. Skiljes lätt fr. den förra genom mindre o. smalare blk., m. tilltryckta smala o. teml. likform. fj., högre st. m. stora breda bl.; från den senare genom längre gråludna blk. m. utdragna syllika, mer oregelbundet tegellagda fj. samt dessas o. skaftens beklädnad. — *H. nigrescens* Fr. omfattar former såväl af denna som *H. alpinum* o. *nigrescens* W. (Jmf. Symb.o.Epicr., H.N.f.10, n:o 8, Rchb.t.146 o.148!) — Synes okänd i ulandet; Förf. har icke anträffat exsicc. ell. beskrifningar, som motsvara denna.

22 *H. nigrescens* Willd. stj. glest stjernl. o. finh., enkel ell. fr. öfra bladvecken grenig, 2—flerblomstr., 1—3blad.; bl. som föreg. men rotbl. färre m. kortare, mer vingade skaft; blksk. enkla ell. klynnegren., stjernl. m. tåta mörka gl. o. svarta, endast kort hvitspetsade hår; blk. bredt afl. m. äggr. bas, svarta m. hår o. gl. ss. skaften; fj. tilltryckta, bredare o. mindre utdragna än hos föreg.; krbr. utv. n. glatt m. korth. tänder; stift mörka. 2/7, 8. — *a humile*: låg, stängelf., upptill del. i 2—3 långa upprätta, 1blomstr. skaft. — *β submurorum*: reslig, v. grenig o. bladig, flerblomstr. m. de öfre blksk. båglikt uppböjda: *H. atrat. subnigrescens* Fr. H.Eur.exs.91\*.

Fjelltr. (Lpl.—Dal. — N. Finn. — Dovre o. Romsdalen. 2000'—3000'. — *a* är en nordigare, *β* en sydligare form.) Stj. 2—3 qv. hög. Blomkorgarnes o. skaftens glandler transverselt ljusrandade, n. peribandlika. — Stora mångblomstr. ex. för-veaxlas ofta med *H. murorum*, små o. fåblomstr. med *H. alp. melanocephalum*, från hvilken senare den lätt skiljes bl. a. genom alltid upprätta blk. (Af denna o. alla de föreg. alpina förekommer ofta former stylosa med föga utvecklade krbr. kortare än stift.) — Är enl. Koch, Wimm. m. fl. den verkliga *H. nigrescens* Willd., hvarföre Förf. ej har velat utbyta detta i ulandet allmänt antagna namn mot det af Prof. Fries förestagna *H. atratum*, som äfven omfattar mörkblomstr. former

af *H. alpinum* (se beskrifn. i Symb.) o. dessutom blifvit användt för flere andra former.

- 23 *H. lingulatum* Backh. \**depilatum* Almqvist. stj. glest stjernl. o. korth., fåblomstr., 3—5blad.; bl. teml. fasta, på båda sid. glest korth., n. helbrädd., rotbl. få vissnande, omv. äggr., kortskaft., stjbl. lancettl. oskaft.; blksk. enkla, råta o. upprätta, de nedre från bladveckan, stjernl., m. glesa mörka korta h. o. bleka gl.; blk. aflånga m. tvär bas, tätt beklädda med mörka, kort hvitspets. h. o. rödgula gl.; fj. mörkgröna tilltryckta, tegellagda, de yttre trubb., de inre spets.; krbr. o. stift som föreg. 24, 8, 9. H.Sc.exs.27.

Fjellstr. r. (*Herj. Ljusnestöten*: S. Almqv. o. J. Hulting.) 2—3 qv. hög, mycket olik alla öfriga af denna afd. — Afviker från den Skottska formen gm lägre växt, kortare hårbeklädnad o. mer glh. blkfoder.

B) *Oreadea* Fr.: Yttre fj. korta, färadiga; stjbasen o. rotblkskaft. tätt styfthår.; bl. v. läderart. o. styfva, under intensivt grågröna, ofvan i friskt tillstånd gulgröna, torkade blekgröna; kronbrämets tänder ofta på undre sidan småhår.; stift gula, vissnade n. rostbruna.

a — *scapigera*: stj. stängelf., 0—2blad. m. vid blomn. v. qvarsitt. rotbl.

- \*24 *H. rupicolum* Fr. stj. stjernh., klynnegr. m. utstående 1—3blomstr. gr., 0—1blad.; rotbl. kortskaft., de inre äggr. ovala spets., mot den afsmaln. basen groftand., und. o. i kant. stråfh.; blksk. hvitludna m. glesa mörka gl., upptill fjälliga; blk. tätt stjernl. o. hvith. m. små otydl. gl.; fj. gröna smala, jemnbr. lancettl. långspets.; krbr. m. småh. tänder. 24, 7. H.Eur.exs.72 (72 b. synes tillhöra en annan art).

Bergstr. r. (*N. Finnm., Tanen etc.*: Norman.) *Qvartershög, spenslig o. v. grenig m. små smala blk.; stjbas o. bladskäft hvitulliga. I Boh. förekomma flerst. mycket närstående men flerbladigare former. — H. bifidum Koch.*

- 25 *H. pallidum* Biv. (enl. Fr.) stj. mer ell. mindre långh. uppåt stjernh. och glh., i toppen qvasitlik grenad, fåblomstr., 0—2blad.; rotbl. v. kort vingskaft., de inre äggr.-ovalabredt lancettl., mot den nedlöp. basen v. groftand., und. o. i kant. stråfh.; blksk. stjernl., hvith. o. tätt glh., mot toppen fjälliga; blk. hvith., glest stjernh. o. glh.; fj. mörkgröna, v. lek-kant., lancettl., utdraget smalspets., de innersta v. sylspets.; krbr. ofta m. småh. tänder. 24, 6, 7. H.N.f.10, n:o 6; f.13, n:o 17.

Bergstr. (*Blek.—Uppl. Hall. Boh. särdeles vid kusten. — N. till Finnm. Stiger i fjeldal. t. ex. Romsdalen, Drivdalen o. Sundalen till 1500'.*) 1—2 qv. hög, v. grof o. fåblomstr. med stora breda blk. De inre fj. n. nakna, de yttre hvitkant. af stjernludd. Var. mycket till storlek, bladform o. beklädnad: stund. n. glatt, stund. öfverallt tätt långh. (= v. *crinigerum* Fr.). Innefallar flere ännu otillräckligt undersökta former. — *H. Schmidtii* Tausch.

b — *foliosa*: stj. flerblad. med få, vissnande rotbl.

\* Stjbl. smalt lancettl., under stjernhåriga.

- 26 *H. canescens* Schleich.? stj. nedtill långh., upptill stjernl., klynnedelad o. v. grenig, fåblomstr., 2—5blad.; rotbl. få kortsk. de yttre tungl.-lancettl., de inre lancettl., alla nedlöp. o. småtand.; stjbl. utdraget lancettl., snedt långspets., v. oskaft., mot basen ofta flikand. m. utstående tänder, und. o. i kant. glest finh. o. tätt stjernl.; blksk. utdragna, trådsmla, stjernludna o. omärkl. glh., i spetsen 1—2fjälliga; blk. gråludna o. glest glh.; fj. mörkgröna, lancettl. jemnbreda, jemnt utdragna till en smal, n. trubbb. hårtofsad spets; krbr. glatt. 24, 6, 7. H.Sc.exs.28. —  $\beta$  *nudulum* Lindeb. spädare m. småtand. bl. o. glattare blk. H.Sc.exs.29.

Bergstr. r. ( $\alpha$  *Smål. Grenna-åsen. Hall. vid »Insjöarne» i Lindome. —  $\beta$  Hall., Boh. o. angräns. del af VG.) Stj. 2—4 qv., spenslig men styf, slät, enkel o. i toppen klynnedelad ell. från basen förgrenad i långa, vidjelika, bladiga, 2—4 blomstr. gr. — Bl. intensivt grå-ell. blågröna, styfva, läderart., v. kölade, stjbl. hos  $\alpha$  4—6 tum långa, mycket smala, ofta mot basen djupt bugtand. — Blk. v. mindre än hos  $\beta$ , med tvär bas. Magrare former enkla 2—3blomstr. Afviker från den Syd-Europeiska formen (H.Eur.exs.97) genom större glattethet o. mindre tand. bl.*



- 27 *H. saxifragum* Fr. stj. hår., uppåt tillika stjernh. o. glh., qvastlikt förgr., fåblomstr., 3—5blad.; bl. som föreg.; blksk. utdragna, stjernl. o. glh., uppåt fåfälliga; blk. glesst hvith. o. glh., föga stjernh.; fj. mörkgröna, lancettl., långt utdragna till en smal, n. trubbs. hårtofs. spets, de innersta v. sylspets.; krbr. stund. i toppen småb. 24 6, 7. H.N.f.12, n:o 17. H.Eur.exs.80, c. (80 o. 80 b. tillhöra en annan art.) H.Sc.exs.30, 31.

Bergstr. (*Blek.—V.B.* särd. i de mellersta o. östra prov. Boh. Oroust, Koster, Strömstad m. fl. st. — N. till Finnm. t. ex. Christiania, Kragerö, Grimstad, Romsdalen etc.) Stj. 2—3 qv., *spenslig, mot basen långh., enkel ell. från bas. gr. i långa vidjelika, utspärr., bladiga v. Iblomstr. grenar; blk. breda m. tvår bas. Oftast förvexlad m. föreg., från hvilken den skiljes genom hårig, nedåt sträf stj., tunnare o. mer hår. bl., något större o. bredare blk. m. mörkare, bredare o. teml. tvärt afsmalnande, föga stjernh. men mer glh. fj., samt tydl. glh. blksk. — Förveklas ofven ofta med smalblad. former af andra närstående arter ss. *H. pallidum*, *H. onosmoides* och *H. norvegicum*. Var. i afs. på storlek, förgrening o. beklädnad. Fj. stund. tydl. stjernh.*

\*\* Stjbl. bredt ell. äggr. lancettl., under nakna.

- 28 *H. argenteum* Fr. stj. nedtill fåblad., styf o. n. glatt, m. blk. i grenig vippa på långa skaft; rotbl. skaft., stjbl. n. oskaft., lancettl. spets., på midten tand., blott hårbrädd.; blk. nakna m. glesa b. o. gl.; fj. breda, n. trubbs.; krbr. glatt. 24 7.

Fjelttr. r. (Uppgifves för Lul. Lpm. o. Finnm. men utan speciellt växtställe.) Stj. 1—2 fot hög, vanl. m. få förkrumpta bl., m. korgfoder n. ss. hos *H. gothicum*. Allt enl. Fries, osedd af Förf.

- 29 *H. Oreades* Fr. stj. långh. uppåt tillika stjernl., v. från midten vipplikt förgr., mångblomstr., 2—5blad.; rotbl. få, kort vingskaft., de yttre ellipt., trubbs. helbrädd., de inre äggr. ovala spets., småtand.; stjbl. bredt lancettl. spets. v. till midten glesst groftand., de öfre oskaft., de nedre kortskaft., alla tunna, mjuka, und. o. i kant. långh. utan stjernludd; blksk. korta, hvitl. o. glesst glh., upptill fåfäll.; blk. tät hvith. o. fint glh., föga stjernl.; fj. mörkgröna breda, lancettl., utdragna till en något trubbs. hårtofsad spets; krbr. åtm. hos diskblrna m. korth. tänder. 24 6, 7. H.N.f.12, n:o 16. H.Eur.exs.81. H.Sc.exs.33.

Bergstr. r. (Östra Smål. ÖG. Söderköping. Uppl. Mälaretrakten t. ex. Stäket, Gottsundabergen etc. Boh. isynn. norra del. t. ex. Kosteröarne; Hogdal: A. W. Bolander; Näsinga sn. Båxungeröd vid Ideffjorden. Öddö, Domsö. — N. Grimstad, Romsdalen  $\frac{1}{2}$  mil norr om Ormein.) Stj. 2—3 qv., *grof men mjuk, säll. enkel, stund. ända från basen gr. i långa, bladiga, 2—5blomstr. grenar m. stora, vida blk. Fj. liksom hos H. saxifr. v. nakna, de yttre blott i kanten o. de inre i spetsen stjernl. Rotbl. stora o. breda m. nedlöp. bas. Gl. hos denna o. stj. fina, n. omärkl., rödgula. Stund. lågväxt, fåblad. o. stängelf., snarlik (o. ofta förvexlad med) H. pall. crinig.*

- 30 *H. onosmoides* Fr. stj. långh. o. stjernl., i toppen qvastlikt förgr. ell. från midten vippgr., v. mångblomstr. o. mångblad.; bl. styfva, föröfr. s. föreg.; blksk. s. föreg. med 3—5 utböjda fjäll; blk. tät hvith., flpt glh. o. stjernl.; fj. s. föreg. men smälare o. mer stjernh.; krbr. s. föreg. 24 7, 8. H.N.f.13, n:o 20. H.Sc.exs.32.

Bergstr. r. (Boh. Uddevalla, Koster, Strömstad, Hogdal etc. — N. uteser kusten t. ex. Christiania, Tönsberg, Kragerö; säll. in i landet t. ex. Gudbrandsdal, n. Rommen-gaard, aldrig i fjellen.) 2—3 qv. *hög, grof o. styf, särdeles vid basen, bladsk. o. bladens fästpunkter tätth.; bl. und. intensivet grå-ell. blågröna, fasta, vid midten v. groftandade; blk. aflånga m. smal bas o. blekkant. fj.*

C) *Vulgata* Fr.: Yttre fj. korta fåradiga; stjbasen o. rotbiskaft. mjukhår.; bl. v. tunna o. mjuka (utom hos *H. bifid.*) und. v. blekgröna, ofvan rent gröna; kronbrämets tänder glatta; stiften v. från början rostbruna.

a — *Scapigera*: stj. stängelf., 0—2blad. m. vid blomningen quarsittande rotbl.

\* De flesta fjällen trubbiga.

- 31 *H. murorum* L. stj. nedtill mjukh. upptill stjernl., enkel ell. fr. öfre bladveck. gren., 0—2blad.; rotbl. småskaft., de yttre små rundadt nyrlika, de inre ellipt. äggr. trubbs.

vanl. m. afrundad, tvårl. ell. hjertl. bas, mot basen m. ell. m. groftand., m. oftast utstående ell. nedåtvända tänder, stjbl. v. 1 vid midten af stj., skaft., äggr. spets., alla bladen tunna, mjuka, nakna, und. o. i kant. krusb. m. långh. sk.; blist. fåblomstr., qvast- ell. säll. flocklik, m. v. 1 blomstr. utspärr. o. båglik inböjda, hvitl. o. gih. sk.; blk. utdraget cylindr. m. smal bas o. färadiga, knappt tegellagda fj.; fj. smala n. jemnbreda, utdragna till en något trubbd. hårtosad spets, de flesta jemnhöga i n. enkel krans, v. svartgröna o. nakna m. långskaft. mörka gl.; frj. hvitt. 24 6, 7. H.N.f.2, n:o 7. H.Eur.exs.85. — Var. *α silvaticum* L. blksk. o. fj. mycket gih., de senare ätm. på ryggen nakna; blist. v. qvastlik; bl. stora tunna m. tvårl. intryckt bas. — *β umbelliferum*: blksk. o. fj. som föreg.; blist. n. flocklik; bl. n. afsmaln. mot basen. — *γ medium* (Jord.) blksk., fj. o. blist. som *α*; de inre rotbl. afsmaln. mot basen, v. sliktand, m. uppåtvända tänder som stund. nedlöpa på det korta skaftet. — *δ sagittatum*: blksk. o. fj. föga gih., hvitl., de inre rotbl. utdragna n. spets., v. djupt groftand. mot den intryckta, n. spjutlika basen. — *ε nemorense* (Jord.): blksk. utdragna räta, tillika m. fj. tät stjernh. o. glest gih.; bl. små ellipt. långsk., mot den afsmaln. basen hvasstand. m. v. uppåt rigtade tänder.

Skogsäng etc. a. (Sk.—Lpm. — N. till Finnm. — *β* Fjelltr. Herjed.: Almqvist o. Hulting. — N. Dovre, Finnm.: Norman. — *γ Smål. ÖG.* — N. Nördl. o. Finnm.: Norman. — *δ Smål. Boh.* — N. Nordmarken, Tonsaasen. — *ε Smål.* i Vetterbergen.) Stj. 3—4 qv. hög, mjuk, oftast enkel o. 1blad. Utmärkt genom utspärr., vanl. båglik inböjda blksk., smala svartgröna o. gih. blk., samt stora tunna, lifligt gröna, långskaft. blad. Var. mycket i afs. på bladens form o. inskärn.; än helbrädd. (var. *integrifolium*), än pardelade med fristående stikar (var. *dissectum*). Stift stundom gula. Stjbl. sällan glest stjernh.; rotbl. stund. rödfäckiga,

\*32 H. *glauccellum* Lindeb. stj. glatt, uppåt stjernh., enkel ell. från midten gren., 1—3blad.; rotbl. få. afl. lancettl. spets., nedåt afsmaln. o. nedlöp. på det vanl. utdragna n. vingkant. skaftet, grundt naggtandade; stjbl. bredt-jemnbr. lancettl., mot basen småtandade, det nedre kortskaft., alla n. läderart. o. n. glatta, ofvan blekgröna, und. intensivt grågröna; blist. fåblomstr. utspärr. qvastl., m. utdragna smala, n. inböjda, upptill stjernl. o. glest gih. blksk.; blk. äggr. cylindr.; fj. jemnbr. lancettl. utdragna till en n. trubbd. hårtosad spets, svartgröna, tät stjernh. m. glesa mörka gl. o. få, svartfotade hår; frukt fj. hvitt. 24 7, 8.

Fjelltr. r. (N. Opdal på Säterängarne under Bratskarfven o. Thronsfjeldet, t. ex. Bakkesætern, Dörrumssætern, Stensem. Sogndal mell. Stören o. Insæt. Dovre vid Drivstuen.) Utmärkt genom späd, glatt 1½—3 qv. hög, vanl. enkel o. fåblomstr. stj. med stora tunna, men styfva o. nakna blad o. små smala svartgråa blk. m. utdragna kantblommor.

33 H. *cæsius* Fr. stj. glest mjukh. ell. glatt, uppåt stjernl., v. enkel 0—2blad.; rotbl. kortsk., de yttre små ellipt., de inre äggr. ovala spets., mot basen afsmaln. o. groftand. m. spets. uppåt rigtade tänder, v. nedlöp. på det vingade skaftet, stjbl. äggr. lancettl., v. oaskaft., alla bl. n. läderart. o. styfva, und. o. i kant. glesh. o. v. stjernh. m. långh. sk.; blist. v. fåblomstr. i n. enkel qvast m. utstående räta grenar o. blksk., de senare stjernl. glesh. o. föga gih.; blk. bredt afl. m. vidgad tvårl. bas o. flerradiga fj.; fj. v. bredt lancettl. m. föga utdragen n. trubbd. hårtosad spets, mörkgröna, stjernl. m. glesa hår o. få gl.; fruktsfun ljusbrungult. 24 6, 7. H.N.f.12, n:o 19, 20 (var. *nemorum* Fr.). H.Eur.exs.86, 86 b.

Äng. back. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm. Stiger i fjelldal, till 2000') Lätt skiljd från H. *murorum* genom fastare, grå- ell. blågröna bl. samt vida blk. m. flerradiga fj. Förwezlas ofven med H. *bifidum*, från hvilken den skiljes genom högre, icke klunnegr. stj. o. trubbd. fj. Var. på skugg. st. med grönnare, tunnare o. djupflik. bl. (var. *nemorum* Fr.), på berg o. i fjelldalar m. svartgih. blk. o. blksk. (var. *nigroglandulosum*). Var. föröfrigt m. långsk. nakna bl., små blk., hvitt fruktsfun.

34 H. *fasciculare* Fr. stj. småluden o. stjernl., v. från midten utspärr. gren., 1—3blad.; rotbl. jemnbr. tungl.-lancettl. groftand. ell. n. helbrädd., ofvan v. glatta hvitpunkt., und. småh., stjbl. små lancettl., und. hår. o. stjernl.; blomk. i utspärr. v. vipplikt sammansatt qvast m. hvitl., glest gih., styfva skaft; blk. bredt afl. m. n. tvårl. bas; fj. bredt lancettl. trubbd., ljusgröna, tät stjernluden, glest enkelh. o. föga gih.; fruktsfun ljusgult. 24 7. H.N.f.12, n:o 18 (H. *ramosum* var.). H.Sc.exs.38.

Berg r. (Boh. vid Uddevalla, Krokstad. — N. Christiania o. Abbidien.) *Vand. lågväxt o. stångelformig m. talrika rotbl. o. få stjbl., stund. mer utdragen o. stjelfk. m. ört såsom H. anfractum och blomk. såsom H. cæsum.*

\*\* De flesta fj. sylspetsade.

- 35 *H. subcæsum* (Fr.) skiljd från *H. cæsum* genom kortare o. spåhare stj., mindre, smälare o. styfvare bl., som mot den rundade, tvåra ell. hjertl. basen v. äro groftand. m. rätt utstående tänder o. icke nedlöpande på det smala skaftet, mindre blk., smalare syliskt utdragna fj. m. v. glatta spetsar; stift v. i början gula, vissnande rostbruna. 24 7, 8. H.N.f.13, n:o 21 (ej normal!).

Bergstr. (Smål. Hall. Boh. — N. b. o. d. i fjeldal. till 2000' t. ex. Lessjeskougen vid Mölmen, Opdal vid Rise, Sundalen vid Gravaune.) *Låglandsformen, som liknar en medelform mellan H. murorum o. cæsum, har vanligen större o. tunnare bl., liksom hos H. murorum o. ofta håriga fjällspetsar. — Fjällformen står närmare H. bifidum, fr. hvilken den skiljes genom lägre o. spåhare växt, mindre o. smalare blk. samt mindre bl. med två, ej nedlöp. bas.*

- 36 *H. bifidum* Kit. stj. nedåt mjukh., uppåt stjernl., klynnegr. 1—2blad.; de yttre rotbl. små, rundade, snart vissn., de inre o. stjbl. äggr-lancettl. spets., skaft., alla styfva läderart., mot den nedlöp. basen glest bugttand. m. v. n. vinkelrätt utstående tänder, und. stjernh. o. småh.; blist. fåblomstr. i n. sammansatt klynnegr. qvast m. hvitl. n. glandellösa sk.; blk. stora, bredt afl. m. två bas; fj. lancettl. utdraget sylspets. m. oftast mörk o. glatt spets, v. svartgröna o. n. enfärgade, krush. m. glesa stjernh. o. gl.; stift gula ell. slutl. n. rostbruna. 24 7. — *β plumbeum* (Fr.): m. glattare fj., blygråa bl. o. från början mörka stift. α H.Scand.exs.34. *H. pallidum* Fr. H.N.f.13, n:o 17 a. — *β* H.N.f.12, n:o 21. H.Eur.exs.90.

Bergstr. r. (Blek. Bustorp nära Ronneby: A. P. Winslow. Smål. Pustanäs i Malm-bäck, Vettersbergen. ÖG. Håstholmen, Omberg. — N. Christiania. Tönsberg, Molde, Lhadehammer vid Trondhjem, Opdal mellan Rise och Aune 1500'.) *Stj. 14—3 qv. hög, v. i toppen upprepadt klynnegr. med 1—2 utdragna grenar fr. bladvecken; bl. pergamentslika, und. blågröna o. tät stjernh., ofvan gulgröna o. ofta purpurfläckiga, stund. blygrå, m. ell. m. fiktandade. — β öfvergård utan gräns i hufvudformen, med hvilken den växer på Örmöen vid Christiania.*

b — *foliosa*: stj. v. flerbladig m. få, vissnande rotbl.

- 37 *H. diaphanum* Fr. stj. glesh. upptill stjernl. o. ghl., enkel, 2—5blad.; rotbl. få, snart vissn., de inre äggr-ovala kortsk., stjbl. bredt lancettl. spets., de öfre, oskaft., de nedre kortsk., alla tunna, grå- ell. blågröna, glestand., nakna, de nedre på båda sid. glesh.; blist. flerblomstr., utspärr., n. sammansatt qvast m. utdragna, stjernh. o. tät ghl. sk.; blk. stora afl. m. bred bas; fj. flerrad. tegellagda, bredt lancettl. trubbl., svartgröna, enfärgade, v. nakna, m. talrika mörka gl.; frfj. ljust brungult; stift gula, slutl. mörkande. 24 7. — *β stenolepis* Lindb. m. fåblomstr. enkel qvast o. smälare, mindre regelb. tegellagda fj. α H.N.f.2, n:o 19. H.Scand.exs.35. — *β* H.Sc.exs.36.

Bergstr. r. (Smål. Femsjö. — N. Molde. — *β* N. vestkusten från Aalesund till Trondhjem.) *Utmärkt genom stora svartgröna bredfj. o. ghl. blk., samt tunna, hårbrädd. blad.*

- 38 *H. vulgatum* Fr. stj. glatt ell. glesh., stjernl., m. ell. m. grenig, 3—flerblad.; rotbl. få, de yttre ellipt.-afl. trubbl., de inre ovala-lancettl. spets. småtand., nedlöp. på det korta bladsk., stjbl. äggr-ovala-lancettl., m. ell. m. tandade, de öfre oskaft., de nedre kortsk., alla bl. und. grå- ell. blågröna, glest korth. o. v. nakna, ofvan blekgröna o. v. glatta; blist. v. mångblomstr., sammansatt o. vipplik, stund. enkel, fåblomstr. o. qvastlik, öppen m. uppräta grenar samt smala, hvitl. o. ghl. blk.; blk. små, cylindr. m. egg. bas; fj. smala n. jemnbreda, utdragna till en smal n. trubbl. spets, mörkgröna, mörkt ghl. o. enkelh. samt v. glest stjernh.; frfj. v. hvitt. 24 6, 7. Var. α *typicum* Fr. stj. slät, föga hårig, flerblad.; bl. smala, föga tand., nakna; blk. små m. ghl., n. nakna fj. — *β irriguum* Fr. skiljd från föreg. genom svartgröna, mycket ghl. fj. o. mer utspärrad qvast. — *γ latifolium* Fr. stj. sträf nedåt längh., fåblad.; bl. breda, ofta på båda sid. hår. o. und. stjernh.; v. groftand.; blk. större o. vidare m. tät stjernh. o. få gl. α H.N.f.13, n:o 22. — *β* H.Sc.exs.37. — *γ* H.Eur.exs.96 (odlad).

Skog. äng. back. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. Stiger i fjeldal. till 2500'. — *β* Boh. Kynnefjell. — N. Nordmarken, Valdres.) *Var. i hög grad från enkel,*

quartershög till månggrenig, halfannan aln hög; — fåblad. ell. glest sterblad., med normalt tunna o. småtånd. ell. tjocka o. grofstånd. bl.; blk. normalt små, smala, mörka, variera större, vidare o. gråbludna. — Innefallar flera, ännu otillräckligt granskade former, genom hvilka den närmar sig än *H. mur. o. cæsium*, än *Hieracia tridentata*.

- 39 *H. anfractum* Fr. skiljes från föreg. genom v. grenig o. sterhöjd stj. m. utdragna lancettl.-jemnbr.-lancettl., groft bugtånd. bl., enklare o. fåblomstr. qvast m. styfvare, endast upptill n. fjälliga skaft o. mörkare frfj. 24 7, 8. Fig. H.N.f.16, n:o 10. H. Eur. exs. 98 (odlade).

Bergstr. r. (*Smål. vestra* o. norra delen t. ex. Femsjö, Unnaryd, Malmbäck vid Pustnäs, mellan Bellö o. Kråxhult. — N. uppgifves utbredd ända till Ost-Finnm., men aldrig anträffad af Förf.). *Stj. än enkel, än grenig från basen. Bl. 3—5, långt utdragna o. tunna. Fj. v. bredare o. mer stjernh. än hos föreg. — Föga skild!*

+++ *Accipitrina*: Stjelken bladig, utan blädrosetter; rotbl. vid blomningen v. bortvisnade; holkfjällen än fåradiga (hos *Prenanthoidea*), än flerradiga m. ell. m. regelb. tegellagda (hos de öfriga); skalfrukter o. fruktsjun som föreg. afd.

A) *Tridentata* Fr.: stj. fler—mångbladig, med olikformiga fånerviga ej omfattande blad, ett ell. annat rotbl. vid blomningen stund. fortvarande; fj. flerradiga, de inre smalare, v. m. smal utdragen topp; krbr. glätt; skalfrukter svartbruna.

a — några af de inre fjällen sylspetsade:

\* Stiften gula; frfj. brungult.

- 40 *H. norvegicum* Fr. stj. mångblad. v. enkel m. fåblomstr. föga sammansatt bladlös qvast; bl. ovala-lancettl. spets. glest groft., alla oskaft. l. de nedre afsmaln. till korta skaft, under glest stråfh.; blksk. smala hvitl. glest enkelh. o. gih. m. 2—4 utst. fj. mot toppen; blk. medelstora aflänga m. tvårl. vidgad bas o. mångradiga fj.; fj. svartgröna enkelh. o. glest gih., de yttre enfärgade i kanten stjernh., mellanfj. blekantade nakna utdragna till en trubbd. hårtofsad spets. 24 7. H.N.f.13, n:o 25 (var.). — *β rufescens* Fr.: till alla delar glattare än hufvudformen m. större blk. o. bredare fj. samt utdraget lancettl. småtåndade bl. H.N.f.13, n:o 24.

Bergstr. r. (*N. ö. kusten fr. Christiania t. Christiansand. Föröfrigt m. sällsynt: endast i öfre Sundalen o. nedre Opdalen mell. Sliper o. Grausune har Fötf. träffat former, som med säkerhet höra hit. — Boh. Koön i Gunnarsdalen, Oroust vid Svanesund o. i Morlandadalen, Lysekil. — β Stockholm. Hall. vid Björkeris.*) *Stj. 3—5 qv. hög, sällan grenig, nedtill o. vid bladfästena m. l. m. stråfh., v. bladig till basen; bl. bredt ovala-smått lancettl., v. styfva, åt båda ändar tillspetsade m. få grofva utst. tänder, und. grågröna; fj. (på press. exempl.) svartgröna m. bleka kanter, de yttre något utstående. β m. afvikande o. habituellt lik H. Friesii. Hör knappst hit, men ännu mindre till H. saxifr. — I Epicr. kallas fj. hos hufvudf. bleka, men i Symb. mörkgröna, ss. de ock äro på Prof. Fries' original-exempl., efter hvilka ofvanst. beskrifning är tagen.*

- 41 *H. macranthum* Lindeb.: skiljes fr. föreg. (med hvilken den hitills varit förväxlad) gm tätbladig, nedåt ullh. stj., bl. tjocka v. styfva o. und. blågröna knappst hårbrådade m. grofva n. vinkelrätt utst. tänder, n. dubbelt större blk. m. blekare mer gih. o. längre utdragna fj. 24 7, 8.

Bergstr. r. (*Hall. norra delen. Boh. h. o. d. t. ex. Göteb., Kungälf o. Marstrand, Hisingen, Koön o. Kosteröarna.*) *Stj. 1—5 qv. hög robust, nedåt intensivt rödblå, v. enkel m. fåblomstr. enkel bladlös qvast, de nedre bladen n. skaftade m. långh. skaft. Har n. de största blomkorgarna bland de skand. arterna.*

\*\* Stiften rostbruna; frfj. hvitt.

- 42 *H. lapponicum* Fr.: stj. fåbladig enkel m. fåblomstr. v. enkel qvast; bl. smalt-jembr. lancettl. m. få breda utst. tänder, oskaft. l. de nedre utdragna t. korta skaft; blksk. gråbludna o. glest enkelh. n. fjällösa; blk. medelstora bredt aff. m. äggr. vidgad bas o. fåradiga fj.; fj. mörkgröna enfärgade, glest stjernh. o. enkelh. m. få gl., de yttre till-

tryckta trub. 24 7—9. H.N.f.16, n:o 9 (»H. goth. v. pseudolap.» Fr.), en form m. glattare mer utdragna fj.

Fjelltr. r. (Lpl. — N. Nordl. o. Finnm.) Stj. 1—3 qv. hög spenslig 4—6bladig m. tunna, under blågröna o. småh. bl. Blomqvasten gles klaslik m. de nedre utdragna skafte v. fr. bladvecken. Ofta förväxlad m. magrare former af *H. Friesii*, hvarjore dess utbredning är osäker.

b — de inre fj. m. smal jemnbred m. l. m. trub. spets.

43 *H. rigidum* Hn: stj. flerbladig, enkel m. n. enkel bladlös qvast l. mot toppen grenad i qvastlik vipa; bl. glest groft., de öfre eggr. lancettl. långspets. oskaftade, de nedre ovals lancettl.—smalt lancettl. spetsiga, afsmalnande till ett m. l. m. utdraget skaft: blsk. smala n. jemntjocka, hvitl. enkelh. o. v. glh. m. 1—3 smala v. utstående fj.; blk. knappt medelstora cylindr. m. tvär slutl. vidgad bas oregelb. tegellagda fj.: fj. smala mörkgröna, alla enfärgade l. de inre blekare o. blekkantade, enkelh. o. glh., nakna l. föga stjernh., mellanfj. smalt lancettl. utdragna till en n. jemnbred trub. spets, de inre jemnb. utdragna till en smal men n. trub. spets; stift alltid rostbruna l. i början gula; frfj. lj. brungult. 24 7. — *α genuinum*: stj. v. sträf, ofta grenig m. qvastl. vipa, styfva groftand. bl., mörkgröna enfärgade fj. — *H. rigid.* Fr. H.N.f.5, n:o 1. — *β tenuius* Hn: stj. v. slät o. enkel m. fählomstr. qvast, v. tunna o. längre skaftade bl., blekgröna o. ljuskantade fj. — *H. rigid.* Fr. H.N.f.3, n:o 4. *H. tridentat.* Fr. H.N.f.12, n:o 14.

Back. o. lund. a. (Sk.—Lpl. — N. Stiger i fjelldalarna till 2000'). Stj. 5—6 qv. hög. Var. i hög grad: nedåt mjukh. ell. sträfh., bl. bredt äggr.-smalt lancettl. groftand ell. småt., på undre ell. båda sid. glesh., de nedre n. oskaft. ell. m. 1—2 tum långa skaft, fj. enfärgade ell. bredt ljuskantade, mycket håriga o. glh. ell. n. glatta, med utstående ell. tilltryckta spetsar. — *H. rigidum* Hn. enl. original-exempl. i hans herb. o. talrika ex. fr. af honom angifna växtställen vid Stockholm, meddelade af Thed. och G. v. Cederv. — *H. vulg. v. tridentat.* Fr. Nov. 1 1819 (*H. rigid. β Hn?*). — *Förenas i Nov. Ed. 2 1828 med H. Friesii* Hn. — *H. rigid.* Fr. Mant. 2 1839 (*H. rigid. α et β Hn*). *H. tridentat.* Fr. Symb. et S. V. Sc. (*H. rigid. β Hn*). *H. rigid.* Fr. Symb. (omfattar både *H. rigid. α Hn* och *H. Friesii H. pr. p.*). *H. rigid.* Fr. S. V. Sc. (*H. rigid. α Hn*). *H. trident.* Fr. Epicr. (*H. rigid. α et β Hn*).

44 *H. Friesii* Hn. stj. s. föreg., mångbladig; bl. s. föreg. men alla oskaft. l. de nedre afsmaln. t. korta skaft; hlksk. hvitl. glest enkelh. v. glandellösa, tjocka uppåt vidgade med 1—3 v. tilltryckta fj.; blk. stora bredt cylindriska m. slutl. vidgad bas o. mång-radiga m. l. m. regelb. tegellagda fj.; fj. breda alla enfärg. o. trub., n. glatta l. enkelh. o. glh., säll. glest stjernh.; stift s. föreg.; frfj. något mörkare. 24 7, 8. — *α genuinum*: stj. v. slät o. n. glatt tätbladig, bl. n. glatta, de öfre med äggr. stund. något hjertl. bas. blksk. glandellösa. fj. v. n. glatta. glest stjernh. *H. Friesii* Hn. herb. *H. boreale* v. *Friesii* Fr. H.N.f.9, n:o 2. *H. rigid* Fr. H.N.f.12, n:o 13 (det ena exempl.). — *β hirsutum* Hn: stj. sträf, särdeles nedåt täth., glesbladig med bl. åtm. på undre sid. långh., fj. enkelh. o. glandelh. *H. boreale* v. *pumil.* Fr. H.N.f.2, n:o 14. »*H. longifol. Læst.*» Fr. H.N.f.12, n:o 15 (odlad).

Bergstr. (Smål.—Lpl. »Smål. Femsjö, Lidhult: Fr. Hall. Torpa: Fr. Boh. flerst., t. ex. Hisingen, Jonsered: Dr Winslow; Uddev. VG. C. Elgenstj. ÖG. Ner. Askers., Tiveden. Verml. Carlskoga: C. Reuterma. — N. s. delen t. ex. Krokkleven: Bl. — *β Smål. Femsjö*: Fr., Malmback. Boh. VG. »winter Wilen et Sjöstor Hn herb.» ÖG. Motala. Verml. Carlskoga: C. Reuterma. Stockholm: G. v. Cederv. Gefte: Hn. Torn. Lpm. Karesuando: L. Læst. — N. Drivdalen.) Stj. 4—5 qv. hög, robust mångbladig, nedåt m. l. m. sträf o. hårig, med styfva v. oskaft., und. grågröna bl. Utmärkt med stora o. vida blk. (vanl. vidare än längden) m. breda trub. v. föga utdragna fj., hvarigenom den hufvudsakl. skiljes fr. *H. rigid.* *β* torde rållast böra afskiljas såsom egen art. — *α H. boreale* Fr. Nov. Ed. 1 et 2 (omf. afven *H. rigid. Hn*). *H. boreale* et *lævigat.* Fr. Mant. 2. *H. gothicum* et *rigid.* pr. p. Fr. Symb. *H. Friesii* et *gothic.* Fr. S. V. Sc. *H. gothic.* et *rigid.* Fr. Epicr. Obs. *H. Friesii* *α* omfattar 2:ne former: den ena v. stor robust o. grenig med stora breda blkorgar o. breda korta fjäll, — den andra späddare o. enklare med mindre blk. o. smalare, mer utdragna fj. Båda sammanlöpa dock genom

medelformer utan gräns. Den förra är Prof. Fries' senaste *H. rigidum* i *Episc.*, den senare är hans *H. boreale olim*, numera *H. gothicum*.

- \*45 *H. truncatum* Lindeb. stj. enkel m. enkel fåblomstr. qvast ell. stund. grenad fr. midten i flerblomstr. vippa, flerbladig; bl. som föreg., men glattare o. skarpt småtandade; blkskaften enkla hvitl. glandel-lösa, i toppen 1—3fjälliga, de nedre utdragna o. båglik inböjda; blomkorg. som föreg.; fj. s. föreg. men mer stjernh. o. häriga ända till spetsen, alla trubb.; stift o. frfj. s. föreg. 24 7, 8. H.Scand.exs.45.

Fjelltr. r. (*N.* Lessieskougén, Romsdalen, Isfjordsdalen, Opdalen fr. 2500' t. n. hafsytan.) Stj. 3—5 qv. hög, v. slät o. glatt, enkel ell. m. utdragna 1—3blmstr. grenar i öfre blvecken; bl. 5—9 v. korta o. breda, äggr.-bredd lancettl., säll. utdragna o. smalt lancettl., ofvan gulgröna, under grågröna stjernl. o. småh., de mellersta stund. n. omfattande, de nedre v. qvarsitt. oskaft. ell. bredd kortskaft.; blomkorg. vidare än längden, åt båda ändar tvärhuggna; fj. stund. glandel-lösa, stult. n. utstående.

- B) *Prenanthoidea*: stj. få- ell. mångbl. m. olikform. bl.; stjelkl. m. l. m. omfattande, rotbl. v. skaftade stund. fortvarande vid blomningen; fj. fåradiga, de innersta smalare o. spetsiga, ell. bredare o. trubb.; krbräms tänder, åtminstone diskblirnas, under småhåriga; skalfr. ród- ell. ljusbruna, ell. svartbruna (hos 49 o. 52).

a — *alpestris*: bl. glesnerviga, rotbl. vid blomningen ofta qvarsittande; inre holkfj. spetsiga.

- 46 *H. dovrense* Fr. stj. enkel m. fåblomstr. qvast, fåbladig; de öfre bl. äggr.—lancettl. v. glest groftand. stjelkomfattande, de nedre bredd lancettl. ell. aflånga, skaftade; blomkorg. medelstora aflånga m. tvär bas; fj. bredd lancettl., enkelh. gih. o. i kanten stjernh., de yttre mörkgröna enfärgade trubb., mellanfj. blekkantade trubb., några få inre smalare o. spets.; blkskaft v. korta styfva hvitl. enkelh. o. gih.; skalfr. ródbruna; frfj. hvitt. 24 7, 8. H.N.f.11, n:o 12 (det ena exempl., det andra tillhör *H. sparsifol.*). H.Europ.exs.107. H.Scand.exs.39.

Fjelltr. r. (*Jeml. Herjed.*: Almqv. och Hulting. — *N.* fr. Christianiattrakten t. Ost-Finnm. Från björkgräsen t. hafsytan.) Stj. 3—4 qv. hög, stráf o. v. korth., säll. grenad i öfre bladvecken, 3—7bladig; bl. v. styfva, ofvan ljusgröna o. glesh., de nedre med m. l. m. utdragna vingkantade o. slidlikt omfält. skaft, rotbl. stund. qvarsitt. ellipt. trubb. blågröna; fjällens glandler med ródgula knappar, blkskaftens mörka. Skuggformen har flerblomstrig sammansatt qvast o. stora tunna groftandade bl.

- \*47 *H. protractum* Fr. närbeslägtad med föreg., men väl skiljd genom följ.: stj. v. grenad i utspärrad vippa; bl. tunna fint naggtandade, föga omfält., under intensivt grågröna; blk. mindre med äggr. bas o. horisont. utböjda kantbl.; fj. blekare stjernl. o. hårtofsade; korgskaften smala utdragna. 24 7, 8. — *α luteum*: gulblommig. H.Scand.exs.40. — *β ochroleucum*: m. hvitgula blr; blommor på samma lokaler senare än *α*. H. dovr. \* protr. Fr. H.N.f.15, n:o 9. *H. protractum* Fr. H.Europ.exs.130. H.Scand.exs.41.

Bergstr. r. (*N.* mellersta vestkusten fr. Söndmör t. Trondhj.) Stj. 3—5 qv. hög, spenslig o. böjd, stund. enkel o. fåblomstrig, men vanl. vippgrenad m. båglik utböjda grenar (särdeles hos *β*), tillika med grenar o. blksk. klädd med låta mjuka horisont. hår, 5—7bladig m. n. helbröddade ofta ródfläckiga bl. Stiften varierar rostbruna och ródgula.

- \*48 *H. filiforme* Lindeb. stj. v. grenig fler—mångbladig; bl. v. bredd lancettl. spets. gles-tandade, alla oskaft. ell. de nedre utdragna t. korta omfält. skaft; blomställn. i öppen sammansatt qvast ell. vippa m. smala hvitl. glandel-lösa smalfjälliga skaft; blkorgr små smalt cylindriska m. äggr. bas, utblom. äggr. koniska; fj. svartgröna, de inre m. blekare kanter, stjernl. m. glesa enkla hår o. glandler, de yttre smala spetsiga, mellanfj. bredd lancettl. n. trubb., de inre smalare o. sylspetsade; stift svartbruna; skalfr. slutl. ródbruna; frfj. n. hvitt. 24 7, 8.

Bergstr. r. (*N.* kring Moldeviken o. tillstötande dalar. Stiger i Romsdalen till 2000') Stj. 1—4 qv. hög, spenslig, stund. enkel, men v. grenad ofta ända fr. basen, med smala bladiga flerblomstr. grenar; bl. utdragna tunna stjernh., ofvan lifl. gröna,

under blågröna o. småh. Rotbl. o. de nedre stjbl. vid blomningen v. vissnade. Var. med styfva rödfäckiga o. groft. bl. Utmärkt af de små smala blomkorgarne, de smala grenarne o. trådlåka blkskaften. Liknar till örten *H. tridentata*.

b — *genuina*: bl. nåtådriga, rotbl. vid blomn. oftast vissnade, inre holkfj. trubbd.

- \*49 *H. elatum* Fr. stj. enkel, m. fåblomstr. qvast ell. mångblomstr. vippa m. korta utstående flerblomstr. grenar, mångbladig; bl. äggr.—bredt lancettl., de öfre helt 'omfatt. m. hjertl. bas o. uppåtvända örönflikar, de nedre afsmaln. till korta vingade omfatt. skaft; blomk. knappt medelstora, yngre smalt cylindr., utblommade bredt koniska, alla med äggr. bas; de yttre fj. mörkgröna enfärgade n. trubbd., de öfriga blekare mot kanterna m. bred trubbd. spets, alla stjeinh. gih. o. säll. enkelh.; stift mörka; skalfr. slutl. svartbruna; frfj. ljusbrunt. 2 8. H.N.f.12, n:o 8 (odlad).

Fjelltr. r. (*N. Misthjerget* n. EidswoId, Nordmarken flerstädets, Hugelisetern, öfre Romsdalen.) *Stj.* 5—8 *qv. hög, sträf o. långh., bl. stora tunna båglikit utbøjda, i kanterna veckade o. v. groftandade, ofvan glatta, under långh., fj. m. gulröda glandler o. stull. uppsvällda ryggsår.*

- 50 *H. prenanthoides* Vill. stj. o. blmst. s. föreg.; de öfre bl. äggr. lancettl. m. hjertl. halftomfatt. bas, mellanbl. lancettl. v. sammandragna ofvan den vidgade stjelkomfatt. basen, de nedre mer o. mer, utdragna t. vingade något omfatt. skaft; blomkorg., fjäll o. stift s. föreg.; skalfr. slutl. gulbruna; frfj. hvitt. 2 8, 9. — *β rarifolium*: med små smala blomkorg. o. få (6—7) glesa bl., de öfre bredt lancettl. o. örönflikade, de nedre långskaftade. — *γ parviflorum*: med små blomkorgar o. glesa knappt örönflikade bl. H.N.f.12, n:o 9. H.Scand.exs.43.

Fjelltr. (*Jemtl. Herjed. Ångml Helsl. Gestr. Dal.* — *N. fr. Christianiatrakten t. Ost-Finnm.* — *β Herjed.* Rösvalen: J. Hult. — *γ N. Öfra Romsd.*: Högsnyta på Dovre. — Stiger på fjellen till björkgränsen, på vestkusten ner till hafvet, t. ex. i Lilldalen, Romsdals amt.) *Stj.* 3—7 *qv. hög, v. slät, korth. o. tätbladig, m. kort qvastlik vippa. Vippgrenarne utstående flerblomstr. m. jernnhöga smala korgar på smala hvitl. o. gih. skaft. Bladen tunna, n. helbräddade ell. småtandade, ofvan gulgröna o. v. glatta, under intensivt grågröna, korth. o. lått nåtådriga. Var. med fåblomstrig enkel qvast, — med glandel-lösa korgar o. skaft, — med glatt stj. o. n. glatta bl. (H.Scand.exs.44), — med bredt hjertl.—smalt lancettl. bl.*

- \*51 *H. prælongum* Lindb. stj. enkel m. enkel fåblomstr. qvast ell. mångblomstr. vippa m. utstående bladiga grenar, mångbl.; bl. lancettl. långspets. skarptand., de öfre oskaft., mellanbl. n. omfattande, de nedre utdragna till vingade omfatt. skaft; blkorgar små, yngre smalt cylindriska, utblommade koniska, alla m. äggr. bas; fj. fåradiga svartgröna n. enfärgade, gih. föga stjernh. o. enkelh., de yttre smala jernnbreda n. spetsiga, de öfriga lancettl. n. trubbd.; blkskaften smala utdragna hvitl. o. glest gih., m. vidgad fjällig topp; stift rostbruna; skalfr. slutl. ljus rödbruna m. släta åsar; frfj. n. hvitt. 2 8. H.Scand.exs.42.

Fjelltr. r. (*N. Nordmarken, t. ex. Tömte, Liggern, Kamphaug. 1000'—2000'.*) *Stj.* 3—9 *qv. hög, spenslig, v. sträf korth. o. tätbladig; bl. utstående utdraget snedspetsade, under grågröna glesh. o. glest nåtådriga, v. tunna o. grofsågade.*

- 52 *H. strictum* Fr. stj. enkel m. fåblomstr. v. enkel qvast, mångbl.; de öfre bl. äggr. lancettl. oskaft., mellanbl. lancettl. n. omfatt., de nedre lancettl. kortskaft., alla n. styfva, ofvan lif. gröna o. glatta, under grågröna glesh. o. glest näternviga; blkorgar stora, yngre bredt afånga, utblommade halft koniska, alla m. två bas; fj. flerradiga svartgröna enfärgade trubbd., glesh. gih. o. föga stjernh.; blkskaften v. enkla, styf upprätta o. n. räta, hvitl., enkelh. o. glest gih.; stift mörka; skalfr. slutl. glänsande svartbruna; frfj. ljus gulgrått. 2 8, 9.

Fjelltr. r. (*Jemtl.—N. Storli i Merager; öfre Romsdalen o. Dovre i Drivdalen.*) *Stj.* 3—6 *qv. hög, sträf o. korth., tätbladig, med stora blkorgar, föga längre än bredden. — Beskrifningen är lagen eft. exempl. fr. Drivdalen, de enda Förf. träfsat, som med visshet kunna föras hit. Ex. i H.N.f.15, n:o 8 är odladt o. afriker gm rikblomstr. sammansatt qvast, ljusbruna frukter o. mer omfatt. blad.*

C) *Foliosa* (Fr.): stj. mångbl. m. n. likformiga, m. l. m. omfattande o. nåt-  
ådriga bl., de nedre vid blomningen bortvisnade; fj. månggradiga, de inre  
bredare, alla trubbiga; krbrämet glatt; stiftan mörka.

- 53 *H. sabaudum* L. Spec. stj. enkel m. flerblomstrig bladig qvastlik vippa; bl. äggr. lancettl. tillspetsade, hvasst glestandade, de öfre n. omfattande, de nedre utdragna till korta vingade omsatt skaft; blkorgar stora, bredt aflånga m. två bas; blkskaften stjernl. o. långh. m. få tilltryckta fj. mot toppen; fj. mörkgröna enfärgade, bredt lancettl. trubbb., tilltryckta, v. nakna o. glest långh. utan glandler; skalfr. svartbruna; frsj. grågult. 24 8, 9. *H. boreale* Fr. H.N.f.11, n:o 10; f.12, n:o 12 (odlad).  
Torra st. r. (N. i parken vid Bogstad n. Christiania. — Uppgifves äfven från Hörsnöd på Göttr.) Stj. 3—6 qv. hög, sträf o. sträfh., särdeles nedåt o. vid bladfastena, teml. tätbladig; bl. tunna, ofvan lif. gröna o. glatta, under grågröna o. glesh. m. stora glesa nåtmaskor. — *H. boreale* Fr. Nov. Edd. 1 et 2 samt Mantl. och H.N.f.2 o. 9, afsåg uteslutande *H. gothicum* och *Friesii*. Men i Symb. och H.N.f.11 o. 12 öfversfördes namnet *boreale* på närr. art. hvarigenom en fullkomlig ovisshet om dess betydelse uppstått, i det somliga Förf. (t. ex. Koch, Schur) begagna det i dess ursprungliga, andra åter (Grenier, Reichenb.) i dess nyare betydelse. För att undanröja denna tvetydighet, torde det vara nödvändigt bortlägga namnet *boreale* (hvilket dessutom är söga lämpligt för en art, som knappt tillhör Norden) och återtaga artens äldre, af de flesta Förf. ännu begagnade, namn. Beskrifningen på *H. sabaudum* i Spec. Pl. passar föröfrigt, lika väl på denna art, som på *H. sabaud.* Fr.
- 54 *H. corymbosum* Fr. stj. v. mot toppen grenad i en mångblomstrig bladig vippa, tätbladig; bl. lancettl. spetsade hvasst glestandade, n. omsatt., de nedre s. föreg.; blkorgar medelstora afl. m. n. äggr. bas; blkskaften stjernl. o. omärkl. gh., uppåt vidgade m. utstående fjäll; fj. mörkgr., de inre m. n. blekare kanter, lancettl., småh. o. mot basen n. stjernh., de yttre utstående; skalfr. mörkt rödbruna; frsj. s. föreg. 24 H.N.f.11, n:o 9. H.Scand.exs.47 (ej normal).
- Fjelltr. r. (Lpl. Ängml. Held. — N. fr. Nordmarken till Finnm.) Utmärkt gm styfva upphöjdt nåtådriga, under intensivt blågråa blad, mindre blomkorgar med äggr. bas och utstående fjäll, samt fjälliga blkskaft.
- 55 *H. crocatum* Fr. stj. grenad i få, v. enblomstr. styfva o. raka skaft fr. öfre bladvecken; bl. äggr.—jennbr. lancettl. spetsiga, glestandade, omsatt., de nedre s. föreg.; blkorgar stora afl. med två bas; blkskaften s. föreg., m. få tilltryckta fj.; fj. mörkgröna enfärgade, bredt lancettl. nakna, på ryggen enkelh. o. glest gh., tilltryckta; för öfrigt s. föreg. 24 8, 9. H.N.f.15, n:o 7. H.Scand.exs.46.
- Fjelltr. r. (Lpl.—Herjed. o. Dal. — N. till Ost-Finnm.) Vanl. fåblomstrig m. klaslik qvast. Utmärkt af de stora breda, i båda ändar tvåra, blomkorgarne. Var. glatt och hårig, med smalare och bredare blad, som v. äro mjuka och tunna med glest åderndt.
- D) *Umbellata* Fr.: stj. tätbladig (ut. n:o 56) med smala glesnerviga aldrig stjelk-omsatt. blad, de nedre s. föreg.; fj. fler- ell. månggradiga, de innersta n. smälare; krbrämet glatt.
- 56 *H. sparsifolium* Lindb. stj. grenad i få utdragna enblomstriga båglik upprätta skaft; bl. glesa jennbr. lancettl. glest småstandade spetsiga; blkorgar som föreg.; fj. flerradiga, mörkgröna enfärgade, de yttre trubbb. öppna, ett par inre spetsiga. n. nakna, glest hvith. o. vid basen gh.; stift mörkt; skalfr. svartbruna. 24 8, 9. H.Scand.exs.48. *H. gothicum-pseudonorvegicum* Fr. H.Eur.exs.127 c.
- Fjelltr. r. (Lpl.: Prof. N. J. Anders. — N. Opdalen—Guldalen, t. ex. Drivstuen, Rise, Wang. 1600'—3000'.) Stjelen 3—4 qv. hög slät stjernl. o. småh. med 5—9 spridda v. mjuka, utstående stjernh. o. korth. blad. — Har n. de största blomkorgarne i släktet.
- 57 *H. umbellatum* L. stj. v. med flocklik vippa, tätbladig; bl. lancettl.—jennbreda, glestandade spetsiga; blkorgar stora m. två bas; fj. månggradiga mörkgröna enfärgade, alla trubbb., glatta ell. säll. finh. med utböjd spets. 24 7—9. — *β coronopifolium*: bl. tät gytttrade, n. jennbreda m. några få långa tänder i kanten. — *γ pauciflorum*: bl. n. jennbreda helbräddade; blkorgar få, på långa upprätta skaft. — *δ abbreviatum*: kvartershög m. elliptiska—afånga trubbb. blad, 1—4 blomk. — *ε litorale*: söga mer  
Hartman, Skandinaviens Flora, (10:de uppl.)



ån quartershög, nedliggande tätbladig med fåblomstrig flock. —  $\zeta$  *subboreale*: stjelen hög, upptill upplöst i en stor oregebl. vippa; fjällen bredare. H.N.f.9, n:o 1. — s H.Scand.exs.50.

Torra äng. o. back. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\delta$  Sk. — s Vestkusten allm. —  $\zeta$  VB. vid Storkåge.) Var. mycket: fjällen stund. glesh., tilltryckta; stiften, särdeles på höstformer, mörka

58 H. *æstivum* Fr. liknar till stielk och blad alldeles föreg., från hvilken den skiljes genom qvastlik vippa, smalare blkorgar med äggr. bas och smalare tilltryckta håriga fjäll med n. blekare kanter och uppåt vidgade fåfälliga hvith. blkskaft. 24 7. H.N.f.11, n:o 5. H.Scand.exs.49 (en mycket afvikande form).

Äng. r. (Boh. Koön, Foss. ÖG. nära Vadstena. — N. vid Bogstad nära Christiania.) Stj. merändels sträf o. sträfh. \*)

#### 44. TARAXACUM Lin. Syst. N. ed. 1. Smörblomster.

1 T. *officinale* Web. bladen n. i rosett, nedåt parflikiga eller hela; blomkorgen ensam, på ett ihåligt skaft från bladrossettens midt. 24 4—10, g. blr. Fig. Sv.B.4. Fl.D.574.

\* *corniculatum* (Kit.) fingerhög, med tunna nedåt rigtade bladflikar, uppräta, n. ägg-runda foderholkfjäll, de egentl. holkbladen med en kort hornlik tand under spetsen. H.N.f.13, n:o 30, 31; f.15, n:o 14.

\* *palustre* (Sm.) blad. hela ell. djupt och smalt nedåt parflikiga, något köttiga; foderholkfj. äggr., tilltryckta. Fig. Fl.D.1708. H.N.f.13, n:o 29.

Gat. etc. a., *cornic.* på sandback., *pal.* på fukt. st. (Sk.—Lpl. — N.)  $\alpha$  till blomkorg och öfriga delar mycket större än varr. Foderholkfjällen slaka, meränd. nedböjda. — *Leontodon Taraxacum* L.Fl.Su. — T. *cornic.* innefattar T. *lævigatum* och *obliquum* Fr. Nov. 2. T. *palustre* är *Leont. lividus* Kit. och L. *salinus* Poll.

#### 45. LEONTODON Lin. Höstfåbla.

1 L. *hastilis* L. stängeln bar, enblomstrig; bladen lancettlika nedåt parflikiga; blomholkens bas äggrund. 24 6—8, g. blr. —  $\alpha$  *hispidus*: sträfhårig. —  $\beta$  *glabratus*: hela växten n. glatt. Fig. Sv.B.643. Fl.D.862. H.N.f.7, n:o 4.  $\beta$  Jacq.A.164.

Äng. och betesm.,  $\beta$  skugg. st. (Sk.—Södm. Vester-Hanninge. Uppl. Skoklosters skolhus. Ner. Verm. Carlskoga. Dalsl. Örndalen i Ors sn; Edsholmen i Gunnarsnäs epl. Lem. Hall. söd. del.: Theor. Öl. Gottl. Visby enl. Lem. — N. Bergens stift vid Leervig på Storden. —  $\beta$  Sk. mellan Krageholm och Snogeholm, Baldringe, Araslöf etc. Hall. Sperlingsholm. Smål. Kalmaretrakten; Fryeled; Näsbyholm; Stenbrohult; Östra och Vestra härader: Scheutz. ÖG. Öfverbo i Ö. Tollstad enl. Kindb.)  $\alpha$  L. *hispidum* L.  $\beta$  L. *hastile* L. *Apargia* Hoffm.

2 L. *autumnalis* L. stängeln bar, uppstigande, 1—flerblomstrig; bladen odelade ell. parflikiga, meränd. glatta; holkens bas småningom afsmalnande mot det upptill vidgade, fjälliga skaftet. 24 7—9, g. blr. —  $\beta$  *Taraxaci*: mest enblomstrig, med tjockt svartluden blomholk. Fig. Sv.B.642. Fl.D.1996.  $\beta$  Retz. fasc. 4, f.2. Fl.D.1523. H.N.f.12, n:o 26.

Betesmark. a.,  $\beta$  fjelltr. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Lpl. — Herjed. — N.) Har ån nära glatt, ån småluden holk, samt fjälligt, uppåt vidgad blomkskaft. —  $\beta$ , som är 3—6 tum hög och n. upprätt, blommar tidigare än  $\alpha$ . — *Apargia* Hoffm.  $\beta$  *Hieracium Taraxaci* L.Sp.Pl.ed.2 och Herb. *Hierac. Leontodontis* L.Faun.ed.2.

#### 46. HYPOCHÆRIS Lin. Slätterfåbla.

† Stjelen sträf; fruktsjunets alla strålar fjäderlika: *Achyrophorus* Scop.

1 H. *maculata* L. stjelen n. bar, 1—4blomstrig; rotbladen omv. äggrunda, tandade; blomholken sträfstuden; alla skalfr. med skaftadt fjun. 24 7, 8, g. blr. —  $\beta$  *minor*: stjelen enblomstrig, 7—9 tum hög. Fig. Fl.D.149; 901.

\*) Af hittills i Skandinavians flora vanl. upptagna arter hafva följande blifvit uteslutsa: H. *stoloniflorum* Kit. och H. *ramosum* Kit., hvilka inkommit genom oriktig bestämning, samt H. *sabadum* Fr. och H. *auratum* Fr. — främlingar — af hvilka den förre blifvit förvildad vid Uppsala och Christiania, den senare vid Uppsala, men numera utgången.

Angsb. a. (Sk.—Um. Lym. Herjed.—N. —  $\beta$  Smål. Ifla och Ljungby: Scheutz. VG. Kinnekulle. Södm. Vårdinge sn. Uppl. Rosl. Medelp.)  $\beta$  är *Apargia alpina* Swartz Sum.Veg.Sc.

†† Stäng. glatt; frukts: yttre strålar hårliga.

- 2 *H. radicata* L. stäng. bladlös, grenig; bladen *neddt parflikiga* trubbiga *strålföriga*; holkfj. med en rad borst längs midten; *alla* skalfr. med *skafadt* fjun. 24 7, g. blr. Fig. Sv.B.752. Fl.D.150. H.N.f.14, n:o 10.
- Betesmark. r. (Sk. allm. Blek. Smål. Kalmar vid Hosmo och Ljungby; Vestervik; Jönk. vid Dunkahallar; söd. och vest. delen mångenstädes: Scheutz. Hall. Boh. VG. Öl. Götll. Visby; Sanda och Eskelhem snr enl. G. v. Ced. — N. söd. och vest. del, t. ex. Arendal, Christiansand, Mandal, Bergen, Molde etc.)
- 3 *H. glabra* L. stäng. som hos föreg.; bladen bugtigt tandade ell. parflikiga, n. *glatta*; holkfj. *glatt*; skalfr. i blomkorgens kant med *oskafadt* fjun. 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.751. Fl.D.424. H.N.f.2, n:o 16.
- Sand. st. åkr. helst nära hafvet, r. (Sk. Blek. i vest. delen. Hall. Boh. vid Svinesund. VG. Slättås i Larf sn: Joh. Hulting. Smål. Femsjö; sjön Bolmens strand.; Ljunga, Ljungby och Ryssby: Scheutz. Öl. Glömminge, samt mell. Runsbäck och Thorslunda. — N. sydöstra del, t. ex. Fredrikshall, Femsöe, Svinesund etc.) *i åkrar upprät, på stränder kull-liggande.*

#### 47. ARNÖSERIS Gärtn. Klubb-fibla.

- 1 *A. pusilla* Gärtn. stängeln bladlös fåblomstrig, med klubblikt uppblåsta blomkorgskaf. 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.201. H.N.f.2, n:o 17.
- Åkr. väg. etc. r. (Sk. Blek. Hall. VG. Högstorp nära Vårgårda jernv.station: J. Hult. Smål. Fledingsorp i Visseferda sn: Hosmo; Ljungby etc. Öl. Möllstorp i Algutsrum sn. Götll. Visby.) *Alla bladen vid roten, omc. åggrunda ell. tunglika, tandade. — Hyoseris minima* L. *Lapsana* Willd.

- 2 Fam. DIPSACEÆ Juss. Blommor gytttrade på ett gemensamt fäste inom holk [blomkorg]. Stånd 4, fria, fästade i kronans pip. Blomsoder dubbelt för hvar krona, det inre fästadt ofvanpå det enföriga, slutl. nötliska fruktämnet.

#### 48. DIPSACUS Lin. Kardistisel.

- †1 *D. pilosus* L. stjelen taggig; bladen skafade, åggrunda, meränd. med ett par bihanglikaflikar på skafet; holkbladen nedböjda, af den klotrunda blomkorgens längd. 8, 9, hv. blr. Fig. Fl.D.1448. H.N.f.2, n:o 18.
- Fukt. st. vid jordvallar etc. r. (Sk. omkring Lund och Ystad; vid Skreflinge enl. F. Aresch. ÖG. Söderköping enl. Kindb.) *Stundom manshög och deröfver; de öfre bladen sakna ofta bihang och äro då något hjertlikt åggrunda.*

#### 49. TRICHÉRA Schrad. Åkervädd.

- 1 *T. arvensis* Schrad. stjelen stråfluden; stjelenbladen djupt parklufna ell. inskurna, sällan hela; kantblnna oregelbundna, *större* än diskblnna. 24 7, 8. —  $\beta$  *integrifolia*: alla bladen odelade aflånga—lancettlika, sågade. Fig. Sv.B.322. Fl.D.447.
- Ång. åkerrenar, a. (Sk.—Jemll. och VB. — N. till söd. Finn.: Norm. —  $\beta$  Sk. Ramlösa; Trollenäs etc. Smål. Ribblingsnäs i Barkeryd: Scheutz. Södm. Nyköping: C. Ind.; Södertelje enl. Leffl. Ner. vid Råå i Hammar sn. Götll. Lummelunds bruk.) *Blrna blågredelina, stund. röda ell. hvita. — Knautia* Coult. *Scabiosa* L.

#### 50. SUCCISA Mönch. Knappvädd.

- 1 *S. pratensis* Mönch: stj. småfluden; bladen odelade, de nedre bredt aflånga, de öfre lancettlika; *alla* blrna *likformiga* i klotrund korg. 24 8, 9. Fig. Sv.B.422. Fl.D.279.
- Fukt. ång. betesm. a. (Sk.—Jemll. och VB. — N. till Nordl.) *Blrna blå, säll. röda ell. hvita; rotstocken kort, nedtill liksom tvärt afhuggen. — Scabiosa Succisa* L.

## 51. SCABIOSA Lin. Stjernvädd.

- 1 *S. Columbaria* L. stjelken n. glatt; rotbladen lyrförmiga, stund. odelade sågade; stjelkbladen pardelade, med smalt jemnbreda flikar; kantblnna oregelbundna. 2 7—9. Fig. Sv.B.393. Fl.D.314.
- Torra st. r. (Sk. Blek. vid Siretorp i Mjellby sn. Smål. Vexjö och Vedbo härads; Ryhof nära Jönköping enl. Scheutz; Kalm. län, i Hvena och Thorsås snr enl. Ekstr. ÖG. Omberg, Linköping etc. Södm. öarne omkring Dalarön. VG. Falbygden. Öl. Götll.) Blomkorg. likna *Trichera* arv. till storlek och färg. — *Asterocephalus* Wallr.
- 2 *S. suaveolens* Desf. stjelken gråluden; rotbladen lancettlika, mot spetsen bredare, vanl. helbräddade; det öfr. som föreg. 2 7, 8. Fig. Sv.B.705. Fl.D.2282. H.N. f.1, n:o 9.
- Sändfält, r. (Sk. Vidtsköffe, Veberöd, Gualöf, Årup etc.) Mindre än föreg, hvilken den liknar till blnna, och för hvars afart den blifvit ansedd. — *Asteroceph.* Wallr.

- 3 Fam. VALERIANEÆ Fr. Blr i knippe. Stånd. 5 eller 3 fria. Frukttämne 3rummigt, ehuru 2 rum stundom felslå, i hvilket fall blott ett frö bildas. Märken 3 eller 1.

## 52. VIBURNUM Lin. Olvonbuske, Elnaträd.

- 1 *V. Opulus* L. bladen 3klufna hvasstandade, skaften upptill bärande vårtlika körtlar; blomknippets kantblr större, könlösa. 5 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.337. Fl.D.661.
- Skogsäng. (Sk.—Um. Lpm. Boh. Öl. Götll. — N. till Senjen.) *Manshög* buske, med platta blomknippen, röda bär.

## 53. SAMBUCUS Lin. Hyll.

- 1 *S. nigra* L. buske; bladen parbladigt delade med vanl. äggrundt lancettlika, sågade flikar; blomknippen 5stråliga. 5 7, hv. något gulakt. blr. Fig. Sv.B.33. Fl.D.545.
- Byar. (Sk. Blek. Smål. Kalmar; Vesterum. Hall. Boh. Öl. Götll. samt här och der förvildad upp till Uppl. och Verml. — N. södra delen af Christiania- och Christiansands st. upp till Valderhoug.) Var. med flere gånger delade blad och smalt lancettlika flikar. Bären svarta.
- 2 *S. Ebulus* L. ört; blad som hos föreg. med lancettlika spetsade, fint hvas-sågade flikar; blomknippen 3stråliga. 2 7, 8. Fig. Sv.B.271. Fl.D.1156. H.N.f.4, n:o 7.
- Fukt. st. r. (Sk. vid Christinehof nära Andrarum. Blek. Carlshamn. Smål. Eds kapell vid Vindö; vid Fredriksberg i Döderhults sn; Göljshult i Misterhults sn; Vester-vik, Norrlands äng. Södm. Strengnäs; Fogdö kyrkog.; Eskilstuna. Stockh. Uppl. Signildsberg enl. Leml.) *Ell* par alnar hög, med rödakt. blr och svarta bär.

## 54. VALERIANA Lin. Vendelrot.

- 1 *V. officinalis* L. både stjelk- och rotblad parbladigt delade, säll. odelade; blnna 2-könade. 2 6, 7, rödl. ell. hv. blr. —  $\beta$  *angustifolia*: bladflikarne n. jemnbreda och helbrädd. —  $\gamma$  *integrifolia* Led.: alla bl. odelade, äggrunda, sågade. Fig. Sv.B.25. Fl.D.570.  $\beta$  H.N.f.11, n:o 15;  $\gamma$  f.16, n:o 13.
- \* *sambucifolia* Mik. rotstocken oftare med grenskott; bladflik. färre (3—5 par). bredare, aflångt äggrunda, groftandade. —  $\beta$  *simplicifolia* F. Aresch. de öfre stjelkbl. odelade, äggr. lancettlika. H.N.f.11, n:o 16.
- Stränd., kalktrakt., \* fukt. och skugg. st. (Sk.—Lpl. och VB. — N. till Ost-Finnm. —  $\gamma$  Smål. Vester-vik, på Lucernholmen. — \* Sk.—Lpl. och VB. — N. — \*  $\beta$  Sk. Kropps sn, vid Björka enl. Aresch.) *Hufvudformen* har vanl. flere, ända till 9 par, oftast lancettlika, dels n. helbräddade, dels sågade ell. tandade bladflikar, och är oftare utan grenskott; men förenas genom tydliga mellanformer med \*, som är en af lokalen beroende form. — \* *V. sambucifolia* ed. 9.
- 2 *V. dioica* L. rotbladen hela och helbräddade, bredt skaftade, rundade ell. äggrunda; stjelkbladen parbladigt delade med stor ändflik; blnna 2byggare. 2 6, rödl. blr. Fig. Fl.D.687.

Fukt äng. (Sk. Hall. Boh. Blek. mot skånska gränsen. Smål. Tingsås: Scheutz. Öl. — N. södra del; dock osäker.) Växten blommande 5—7 tum hög, med större han- än honbl.

## 55. VALERIANELLA Mönch. Vårsallat.

1 V. *olitoria* Mönch: stjelken klynnedelad, med hufvudlikt gytttrade blr i grenarnes topp; frukterna något plattadt klotrunda, med omärkligt foderbräm på toppen, invändigt med ett tomt, 2deladt rum. ☉ 5—8, ljusbl. blr. —  $\beta$  *lasiocarpa*: frukt. håriga. Fig. Sv.B.232. Krook Mon.Val.t.4, f.40. Fl.D.1681. H.N.f.13, n:o 33.

Grus. Åkr. etc. (Sk.—Uppl. Vestm. Strömsholm. Boh. Öl. Götll. — N. södra del: Christianssand, Arendal etc. —  $\beta$  Sk. Krageholm. Mälaren på Björkö. Götll. Visby, på Snäckgården: Kr.) Stjelken grenad från midten eller längre ned; rotbl. n. omv. aggr., stjelkl. aflånga. — *Valeriana Locusta* L. *Fedia olitoria* Vahl.

2 V. *Morisonii* Koch: stjelken upptill klynnedelad, med blr i toppen och öfre grenvecken; frukt äggformiga spetsade, med plattad framsida, medel, 3—5standadt foderbräm på toppen, invändigt täta. ☉ 6, 7, ljusbl. blr. Fig. Kr.Mon.Val.t.1, f.6. Fl.D.738. H.N.f.4, n:o 8.

Åkrar, r. (Sk. Malmö; Cimbrishamn. VG. Kinnekulle vid Skatolie nära Brattfors; Råbäck; Trollmen etc. Smål. Hosmo, Berga m. fl. st. nära Kalmar; Hvitahult i Linnaryd enl. Scheutz. Öl. Björnhöfda, Repplinge etc. Götll.) Stjelken högre, styfvere, skuru spådare, och vanl. blott mot toppen grenig; bl. som hos föreg., men smalare. Var. med glatta och finhåriga frukter: *Fedia dasycarpa* Stev. — V. *dentata* ed. 9, ett mycket bortblandadt namn, som enl. Krooks Monogr. ursprungl. afser en utländsk art. *Fedia mixta* Wg.

4 Fam. RUBIACEÆ Juss. Blomsfoder vidväxt det 2rummiga fruktämnet, ofta med omärkligt bräm. Stånd. vanl. 4. Frukt 2knölig, affall. öppnad ell. i 2 delar.

## 56. SHERARDIA Lin. Madd.

1 S. *arvensis* L. bladen omkring 6 i kransen, i kanten styfhåriga, uddspetsiga; svepebladen vid basen hopväxta. ☉ 7, 8, b. blr. Fig. Sv.B.609. Fl.D.439.

Åkr. (Sk.—ÖG. Södm. Vannala i vest. Vingåker. Rosl. Furusund; trol. ditförd med ballast. Verml. Långnäs i Ölme härad. Dalsl. i Eds sn. VG. Kinnekulle; Göteborg: Lem. Boh. Hall. Öl. Götll. — N. södra del: Christiania; Kirköe.) Blrna något gytttrade inom ett 6—8bladigt svepe.

## 57. ASPERULA Lin. Madra.

1 A. *tinctoria* L. bladen smalt jemnbreda, 4—6 i kransen \*), under något sträfvä; blomknippena 3stråliga, med mest 3klufna kronor; frukten glatt. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.244. H.N.f.3, n:o 6.

Back. r. (Sk. Christianstad, vid Uddarp [i sedn. tider ej återfunnen: F. Aresch.]. Smål. Ukna sn ej sälls. enl. Ekstr. ÖG. Ombergstrakten; Skenninge; Söderköping etc. Södm. Strenghäls. Stockh. Uppl. Uppsala; Ekolsund enl. Lem. Ner. Snafunda prestg., och Mossby i Kumla. VG. Halleberg: Åsaka i Vartofta härad. Öl. Götll.) Rotstocken röd; örten snartar lätt under torkning.

2 A. *odorata* L. bladen 8 i kransen, lancettlika; blrna i skaftade knippen; frukten sträfhårig. 2 5—7, hv. blr. Fig. Sv.B.218. Fl.D.562.

Skugg. lund. (Sk.—Gestr. Helsl. Borgaberget i Forssa; Lindfallet i Enånger: Wistr. Ängml. Rödåsen i Nora sn: H. W. Arn. Jeml. Kall sn vid sjön Anjen; Frostvikens sn. Vestm. Ner. Verml. Öl. Götll. — N. Holmestrand; Christiania; Bergen etc. till Trondhj. Nordl. Bejeren och Gildeskaal: Norm.) Torr vålluktande.

\*) Då i detta och följ. släkte antalet af blad uppgifves, förstås det vanligast förekommande; ofta kan på samma stånd ett ell. annat blad i hvarje krans saknas eller öfverskjuta det uppgifna medeltalet; vanl. äro de nedersta och öfversta kransarne fåbladigare.

## 58. GALIUM Lin. Måra.

† Bladen 4, högst 6 i krans; frukten stråfbarig.

- 1 *G. boreale* L. stjelken upprätt, finhårig ell. glatt; bladen 4 i kransen, från bredare bas lancettlika, med 3 hufvudnerv, utan udd i spetsen. 2½ 7, hv. blr. Fig. Sv.B. 122. Fl.D.1024. H.N.f.15, n:o 15.

Back. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) 2—3 qv. hög.

- 2 *G. rotundifolium* L. stjelken slak, borsttaggig; bladen 4 i kransen, äggformigt rundade härbräddade, med 3 hufvudnerv och udd i spetsen. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Jacq.A.94. H.N.f.4, n:o 9.

Tallback. r. (Gottl. vid vägskilnaden till Viklou och Vänge; Tjengdarfve i Spröge; Malmhagen vid Lill-Helvigs i Fohle; Hallbros slottsruin i Vesterhejde; ofvan Lummelund, i skogen öst. om vägen. Öl. Högby sn, vid byn Bäck, ymn.; vid Ramsnäs i Boda sn.)

- 3 *G. triflorum* Mich. stj. slak, snärjande; bladen 6 i kransen, aflångt lancettlik, med nedåtvända småtaggar på ryggnerven, framåt rigtade i kanten, en enda hufvudnerv och med udd i spetsen; blomskåften i bladvecken, vanl. 3blommiga. 2½ 7, 8. Fig. Sv.B.669. Fl.D.2045. H.N.f.3, n:o 8.

Bergstrakt. r. (Um. Lpm. Lycksele, vid Almycketjärn. Ängml. Sollesta, i Djupdalen; Ramsele och Liden snr; Nora sn, Storön; Arn. Medelp. Norbyknöl; Borgsjö. i Randklöven; Hässjö sn enl. Leml. Helsl. Gryttjesbergen i Delsbo; Offerberget i Undersvik; Hornslandet i Rogsta; Wistr. Verm. Valserudberget i Nyed; Torskeberget i Ullerud m. fl. st. Ner. vid Klockarhyttan i Kil sn; Stud. A. af Geijerstam. — N. Finnm. Kaafjorden. Nordl. Salten. Trondhj. st. Namse- och Sandöldalen. Ringerrige, Krokkleven. Christiania.) Liknar till ört och lukt *Asperula odorata*; blrna hv. ell. grönaktiga. — *G. suaveolens* Wg.

†† Bladen 4—6 i krans; frukten glatt.

\* Bladen utan udd i spetsen; frukten n. slät.

- 4 *G. trifidum* L. stj. nedliggande, n. snärjande; bladen 4 i kransen, aflångt lancettlika, olikstora, trubbiga; fruktämnet n. af den 3klufna kronans storlek. 2½ 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.48. H.N.f.3, n:o 7.

Sanka sjöstr. och kärr. r. (Lpl.—nor. Smål. Jönköping; Axamo och Barkeryd: Scheutz. Verm. VG. Venersborgstrakten, Kasen. Boh. Gottl. — N. icke sälls.) Spådare och stråfvare än följ., med mycket smärre, säll. 4klufna blr; frukten 2knölig af klotrunda, föga sammanhäng. småfrukter.

- 5 *G. palustre* L. stj. slak, glesl borsttaggig; bladen 4 [säll. 5, 6] i kransen, smalt lancettl. omv. äggrunda, olikstora, trubbiga; fruktämnet mycket mindre än den 4klufna kronan. 2½ 6, 7, hv. blr. — *β decipiens*: större och mera upprätt; bladen 5—6 i kransen. Fig. H.N.f.15, n:o 16. *β* Fl.D.423.

Våta st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) Var. i hög grad till storleken, och från n. glatt till öfverallt smuldren: var. *pubescens*. — *β*, ell. *G. elongatum* Presl., anses af Godr. & Gren. m. fl. för egen art.

\*\* Bladen med udd i spetsen; frukten grynprickig.

- 6 *G. uliginosum* L. stj. vanl. slak och borsttaggig; bladen 6 i kransen, smalt lancettlika, i kanten stråfva; blrna i dubb. 3deladt knippe. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D. 1509. H.N.f.15, n:o 17.

Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) Var. spåd, enkel och upprätt, föga stråf: var. *tenue*, samt utbredd, lång och mycket grenig och då n. snärjande stråf.

- 7 *G. saxatile* L. stjelken slak, glatt; bladen nedtill 4, upptill 6 i kransen, omv. äggrunda, kort uddspetsiga, stråfbräddade; blomknippet tät. 2½ 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D. 1633. H.N.f.2, n:o 19.

Fukt. stenbund. mark, r. (Sk. Hall. Boh. Oroust. VG. Fritsla sn. Smål. vest. del.: Älgutsboda och Stenbrohult; Vexjö. Gimla: Scheutz. Blek. Ebbenäs och Kristianopel: Gosselm.; Gredby. — N. Christiansand; Stavanger; Bergen etc.) 3—8 tum lång, tuffig; svartnar torr. — *G. hercynicum* Weig.

+++ Bladen omkr. 8 i krans; fr. glatt; stjelken aldrig snärjande.

- 8 *G. silvestre* Poll. stj. uppstigande, *glatt*; bladen 6—8, jemnbredt lancettlika, *smal-spetsiga*, meränd. *glatta*, äfven i kanten. 2j 6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *læve*: mindre och nedligg., alldeles glatt. Fig. Fl.D.1866. H.N.f.4, n:o 10.

Fukt. st. r. (Sk. Lund, vid Arendala; Stensbuvud. *Blek.* bergen kring Ronneby; Hokadal i Asarum sn. *Smål.* mell. delen; samt Skillingaryd i Tofteryd sn: Scheutz. ÖG. Omberg och i Kisa enl. Kindb. *Stockh.* Tranholmen i Lilla Värtan. VG. Kinnekulle, Sparrsäter. — N. Christiania. —  $\beta$  Öl. *Gottl.* — N. Christiania.)  $\beta$  är endast 2—5 t. hög;  $\alpha$  större och blomrikare, närmande sig till *G. uligin.*, men skild med sin glatta stjelk. — *G. pusillum* Wg. *G. multicaule* Wallr.  $\beta$  *G. austriacum* Jacq.

- 9 *G. Mollugo* L. stj. upprät ell. slak, tydligt 4kantig, *glatt*; bladen 8 i kransen, lancettlikt jemnbreda ell. mot spetsen bredare, *trubbiga med kort udd*, vanl. *glatta*, med *platta* och *sträffa* kanter. 2j 6, 7, hv. ell. gulakt. blr. —  $\beta$  *ochroleucum*: blrna gulaktiga, i stort, grenigt knippe. —  $\gamma$  *clivale*: nedliggande; bladen små [2—3 lin. långa], n. omv. äggrunda. Fig. Sv.B.357. Fl.D.455. H.N.f.16, n:o 14;  $\beta$  f.2, n:o 20.

Backar etc. (Sk. *Blek.* Hoby; Lyckeby enl. Gosselm. — *Helst.* Ängml. Ytter-Lännäs; Säbrå sn: Arn. *Dal.* *Vestml.* Ner. *Verm.* bergslagen. Boh. Strömmstad. *Hall.* *Gottl.* Visby, samt Rohnemyr enl. G. v. Ced. — N. söd. delen. —  $\gamma$  *Smål.* Grenna: Lindeb. ÖG. Söderköping, vid Ramshäll: Kindb. VG. Venersborg; Trollhättan; Ursand. Boh: *Hall.*) Var. i hög grad. De blombar. grenarne äro vanl. *glatta*, men förekomma äfven *finludna*, då växten synes närma sig följ.:  $\beta$ . —  $\alpha$  *G. erectum* Huds.  $\gamma$  *G. elatum* Thuill. var. *Godr.* & *Gr.*

- 10 *G. verum* L. stj. upprät, *trubbkantig*, *småluden*; bladen 8 i kransen, *smalt* jemnbreda, *småludna* med *tillbakavikna* kanter. 2j 7, g. säll. hv. blr. —  $\beta$  *albidum*: blrna blekgula ell. n. hvita. Fig. Sv.B.165. Fl.D.1146.  $\beta$  H.N.f.2, n:o 21.

Tor. st. a. (Sk.—Ängml. och *Jeml.* — N.) Bladen vanl. *ganska smala*, *stund. bredare*, något närmande sig till föreg., hvarmed den synes kunna hybridisera.

++++ Bladen 6—9 i krans; stjelken snärjande.

- 11 *G. Aparine* L. stj. slak, småtaggig; bladen lancettlikt jemnbreda, med nedåt rigtade småtaggar i kanten; blomskafven 3—6blommiga; fruktskafven raka. ☉ 6—8. —  $\alpha$ : stjelkledderna ullhåriga; blrna teml. stora, *hvita*; frukt. stora, *grynprickiga* och *håriga*. —  $\beta$  *tenerum*: bladen färre, tunna, n. ovala. Fig. Fl.D.495. Reich.t.1197, f.1;  $\beta$  f.4.

\**infestum* Käl. blrna små, *gulaktiga*; fr. smärre, n. *släta*, men *håriga*. Fig. Sv. B.419.

\**spurius* L. bl. oftare 6 i krans; fr. något *grynprickiga*, *glatta*. Fig. Fl.D.2530. H.N. f.2, n:o 22.

Bland busk. och på odl. st. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  *Smål.* Kalmatrakten. Öl. *Gottl.* — \**infest.* allmän. — \**spur.* Sk.—Gestr. *Vestml.* och *Verm.* Öl. — N. till Nordl.: Norm.) *Hufvudarten* är mera sällsynt i norra Sv.

- 5 Fam. LORANTHACEÆ Don. Foder vidväxt det enrummiga fruktämnet. Krona 4delad. Stånd. fästade midt emot kronflikarne. Frukt enfröigt bär. Parasitbuskar.

## 59. VISCUM Lin. Mistel.

- 1 *V. album* L. stjelken klynnegrenig; bladen lancettl. *trubbiga* nervlösa; blrna oskaftade, gytttrade 5 och 5 i grenarnes spets. 5, gulgr. blr. Fig. Fl.D.1657.

Parasitväxt på Ek, Äpel och andra träd, r. (Sk. på en ö vid Christianstad enl. gammal uppgift af Leche. — *Uppl.* och *Vestml.* på Mälarens öar. VG. Kinnekulle och Hunneberg. Boh. vid Öjared i St. Lundby. — N. södra delen.) *Buskväxt.* Bladen tjocka läderaktiga; bären hvita.

6 Fam. **CAPRIFOLIACEÆ** Juss. Foder vidväxt det flerrammiga fruktämnet, som moget blir ett bär ell. bärlikt fröbus. Märke 1, odeladt.

### 60. LONICERA Lin. Try.

1 *L. Xylosteum* L. bladen ovala, mjukhåriga; blomskäften 2blommiga, af blrnas längd; de 2 blrnas fruktämnen fria, endast vid basen sammanhängande, inom 2 syl-lika och 4 bredt äggrunda skärmsfäll.  $\frac{1}{2}$  6, hvitg. blr. Fig. Sv.B.319. Fl.D.808. H.N.f.16, n:o 15.

Skogsäng. back. (Sk.—Ångml. Jemtl. Verml. Boh. — N.) Ett par alnar hög buske, med parvisa, röda bär.

2 *L. cærulea* L. bladen elliptiska, vanl. mer afsmalnande mot basen, äldre n. glatta, med håriga skaft; blomskäften 2blomm., betydligt kortare än blrna; dessas fruktämnen helt och hållet hopväxta, slutl. bildande ett enda bär; blomskärmen 2-ne. syl-lika.  $\frac{1}{2}$  6, hvita blr. Fig. Sv.B.355. H.N.f.3, n:o 9.

Bergstr. r. (Dal. Osmundsberget; Ore socken mell. Ore och Viken, i Vikängen m. fl. st. omkr. Oresjön; Grangårde sn, Saxberget. Vestml. vid Dalkarla-, Skrikare- och Ellshyttan m. fl. st. i Nora sn.) Buske som föreg., med blå bär, hvilas yttre hud bildas af de med fruktämnet hopväxta bredare skärmen. Bloden i yngre tillstånd håriga.

3 *L. Periclymenum* L. bladen ovala ell. äggrunda, glatta; blrna oskaftade, samlade i hufvud.  $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. Sv.B.140. Fl.D.908.

Lund. och klipp. särd. nära hafvet. (Sk. Blek. Smål. i Fernsjö och Lidhult; Färgaryd; Eke i Thorsås sn enl. Ekstr. Hall. Boh. VG. Dald. — N. vid Christianiafjorden; Arendal; Bergen; samt i Romsdalen.) Slingrande buske, med n. 2 tum långa, utvändigt ljusröda, inuti hvita blr; mörkröda bär. Nyskottens blad ofta bugtlandade håriga.

### 61. LINNÆA Lin. Linnæa.

1 *L. borealis* L. stammen vek, n. trådsml, krypande, med motsatta rundade blad, upprätta 2- eller 4blommiga grenar.  $\frac{1}{2}$  7, hv. inv. rödl. blr. Fig. L.Fl.Su. Sv.B.1. Fl.D.3. Wg.Fl.L.t.9. H.N.f.16, n:o 16.

Barrskog. (Lpl.—Sk. nor. del. Hall. Halmstad; m. fl. st. enl. Theor. Ö. Gold. Ymnigast i norra Sv. — N.) Krypande buske, med öfvervintrande blad; grenarne med 2, stund. 4, små, hängande, valluktande blr i spetsen.

## 2 KLASSEN

# ANNULIFLORÆ.

7 Fam. **CAMPANULACEÆ Juss.** Fodrets nedre del vidväxt fruktkämnet. Krona regelbunden. Stånd. 5, fria. Fruktt slerrummigt, mångfröigt fröhus med centrala fröfästen.

### 62. CAMPANULA Lin. Blåklöcka.

† Bladen tydl. håriga ell. sträfvä.

\* Fodret med nedböjda bihang mellanflikarne.

- \*1 *C. barbata* L. hårig; bladen aflångt lancettlika; blrna i klase, skaftade nedböjda; foderflikarne äggrundt lancettlika; kronans flikar i kanten långhåriga. 2 7, 8, bl. blr. Fig. Reich. t. 1594, f. 1, 2. H.N. f. 6, n:o 11.  
 Fjellväxt, r. (N. teml. allm. i de öfre delarne af Torpen och Etnedalen: Ax. Bl.) 6—12 t. hög, med inga ell. små, n. jemnbreda, stjelkl., 4—8, fingerborgslika blr i klasen.

\*\* Fodret utan bihang; blrna samlade i hufvud.

- 2 *C. Cervicaria* L. bladen lancettlika [hos β n. äggrunda], de nedre skaftade, de öfre halstomfatt.; blomhufvudena i stjelkens spets och de öfre bladvecken; fodrets flikar utböjda med inböjd spets, kölade, trubbiga. 2 7, 8, b. blr. — β *platyphylla*: bladen utdraget äggrunda. Fig. Fl.D. 787.

Skogsäng. ängsback. r. (Sk.—Medelp. i Torp sn. Ängml. Gudmundrå sn, Gissjö: Arn. Dal. Verml. Boh. Hall. Öl. Götll. — N. södra delen. — β N. Ringerige vid Gårdshagen.) 2, 3 fot hög, tjock stjelk; blomkronornas veck stråfhåriga. β har bladen 2 tum långa och vid basen tumsbreda.

- 3 *C. glomerata* L. bladen äggrundt lancettlika, de nedre långt skaftade, de öfre halft omfattande; blomh. som hos föreg.; foderflikarne upprätta, platta, spetsiga. 2 7, 8, viol. stund. hv. blr. Fig. Fl.D. 1328.

Ängar. (Sk. Småll. Urshult: Scheutz. ÖG. — Helsl. Medelp. vid Indalselven; Böle nära Sundsvall enl. Lem. Vestml. Dal. Husby och St. Schedvi snr. Verml. i bergslagen. Boh. Östby i Näsinga enl. Lem. Hall. Götll. Mest i östra kustprov.) Blrna glesl fnhåriga; de nedre bladens bas ofta hjertlik.

\*\*\* Fodr. utan bihang; blrna i klase ell. ensamma i blad.

- 4 *C. Trachelium* L. stj. hvasskantig, stråfhårig; de nedre bladen skaftade hjertlika, de öfre oskaft. äggrunda långspetsade, alla djupt dubbelsågade; blrna i bladig klase eller på skaft i bladvecken; foderflikarne äggrundt lancettlika spetsade upprätta, i kanten styfhåriga. 2 7, 8, blå, stund. hv. blr. — β *urticifolia*: blomfodret öfverallt stråfhårigt. Fig. Fl.D. 1026 och 2167.

Skogsäng. (Sk.—Gestr. Kubbo i Vahlbo sn. Medelp. Dal. Sättersdalen. Vestml. Boh. Öl. Götll. — N. södra del. till Ringerige etc.) Var. med mer äggrunda blad. — β *C. urticifolia* Schmidt.



- 5 *C. latifolia* L. stj. föga kantig, mjukhårig; bladen äggrunda spetsade dubbelsågade, de nedre något hjertlika och skaftade; blrna *enstaka* i öfre bladvecken, *upprätta*; foderflik. lancettlika spetsade, *upprätta* och *glatta*. 2 7, 8. —  $\beta$  *macrantha*: blrna mycket stora [n. 3 tum långa, 2 i diam.]. Fig. Sv.B.272. Fl.D.782 och 85.
- Skugg. lund. r. (Sk.—Uppl. Gefle, vid Stenbäcken. Medelp. Norasfors bruk. Jemtl. Vestml. Verml. Boh. Öl. — N. till Nordl. —  $\beta$  *Helsl.* Söderhamn i Bromsäng. Verml. vid Ränneberget i Östmarks sn.) *Stor växt med de största blrna af de bredbladiga arterna. Blrna hvita i fjelltrakter, eljest vanl. blå.*
- 6 *C. rapunculoides* L. stj. trubbkantig, gleshårig; de nedre bladen skaftade, *hjerterlikt äggrunda* spetsade, de öfre oskaftade, n. lancettlika, alla sågade; blrna i *ensidigt klase*, lutande; foderflik. lancettlika, *nedböjda*. 2 7, 8, viol. blr. Fig. Sv.B.369. Fl.D.1327.
- Odl. st. (Sk.—Medelp. vid Sättna prestgård; Torp sn. Ångml. Hernösand; Arn. Dal. Dalsl. Öl. Gottl. — N. södra del, allmän.) *Klasen mest enkel, men blomrik; rotbladen hjertlika.*

(*C. Rapunculus.*)

†† Bladen merändels glatta.

\* Stjelken oftast mångblommig; kronan längre än frukten.

- 7 *C. patula* L. rotbladen omv. äggrunda—afånga skaftade, stjelkbladen lancettlika naggade; blrna i utbredd *qvastlik* samling, med i *spetsen* delade allm. skaft; foderflik. *upprätta*; kronan *vidgad* klocklik, klufven *nedom midten*; fröh. *upprätt*. 2 7, 8, viol. blr. Fig. Fl.D.373. H.N.f.8, n:o 6.
- Ång. r. (Östr. Dal. Gestr. och *Helsl.* högst allmän och ymnig, spridande sig genom Ner. Verml. VG. och ÖG. ned till Smål. östra och mell. delen och Hall. Hasslöf; samt upptät till Medelp. Ångml. och Jemtl.) *Roten spenslig; de nedre stjelkbladen afånga; kronan dubbelt längre än de syl-lika foderflikarne.*
- 8 *C. Rapunculus* L. rotbladen afånga; stjelkbl. smalt lancettlika, naggade; blrna i *klase-lik* saml., med enblommiga ell. *vid basen* delade skaft; foderflik. *som hos föreg.*; kronan *djupa* likad; fröh. *upprätt*. 2 8, 9, b. blr. Fig. Sv.B.629. Fl.D.1326.
- Ång. r. (Sk. vid Belteberga och Torup enl. F. Aresch.; samt här och der förvildad i gamla trädgårdar. Hall. Hasslöf: Theor.) *Roten tappformig; bladnerven stundom stråfhårig.*
- 9 *C. persicifolia* L. rotbladen omv. äggrunda—afånga, skaftade; stjelkbladen jemnbreda, glest smånaggade; blrna i n. enkel klase; foderflik. *utstående*; kronan klocklik, *grundt* likad; märkets likar *längre* än stiftet; fröh. *upprätt*. 2 7, 8, blå, stund. hv. blr. Fig. Fl.D.1087.
- Ångsback. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Högväxt med stora blr. Var. glatt och hårig, särdeles blomfodret.*
- 10 *C. rotundifolia* L. rotbladen njur- ell. *hjerterlika*, skaftade; stjelkbl. smalt jemnbreda; blrna i *klaselik* saml.; foderflik. *utböjda*; kronan klocklik, *grundt* likad; märkets likar *kortare än stiftet*; fröh. *nedböjd*. 2 7, 8, blå, stund. hvita blr. —  $\beta$  *lancifolia*: större, med nedliggande mångblommig stjelk, 2 tum långa lancettlika glessågade blad. —  $\gamma$  *alpicola*: stjelken meränd. enblommig; stjelkbladen afångt jemnbreda, Fig. Sv.B. 297. Fl.D.1086; 855 och 189 [varr.].
- Ång. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Verml. på sandhedarne vid Christinefors bruk och sparsamt på Mälarens öar. —  $\gamma$  i fjellen.)  $\gamma$  är *mindre, med n. runda rotblad, blomman icke större än på den vanl. formen.*

\*\* Stjelken alltid enblommig; kronan kortare än frukten.

- 11 *C. uniflora* L. de nedre bladen afånga, de öfre n. jemnbreda; foderflik. bredt syl-lik, *upprätta*; kronan *bägarlik*; frukten lancettlik, *upprätt*. 2 7, 8, b. blr. Fig. Sv. B.526. Fl.D.1512. H.N.f.10, n:o 11.
- Hög fjellv. r. (Torn. Lpm. Sälls. i nor. del. af Lul. Lpm.; men allm. i dess söd. del, samt i Pst. Lpm. nor. delen, vid 3 à 4000 f. öfver hafvet: H. Widm. — N. Finn. Tromsöe-tind. Dovre.) *Stjelken nys blommande knappt fingerhög; kronan ofta icke längre än foderflikarne, stundom mer utskjutande.*

## 63. PHYTEUMA Lin. Rapunkel.

- \*1 *P. spicatum* L. de nedre bladen hjertlika dubbelsågade, långt skaftade, de öfre äggr. lancettlika—n. jemnbreda; blrna i cylindriskt ax; stiftet hårigt. 24 6, 7. Fig. FL.D. 362. Reich.t.1586.f.2.

Fjelltrakt. r. (N. flerst. vid Möestranden i öfre Tellemarken, L. ex. Lejrbäckstoul på Svenofjell.) *Blrna gulaktigt hvita med grönaktiga flikar.*

## 64. JASIONE Lin. Monke.

- 1 *J. montana* L. stj. och gren. endast nedtill bladiga; bladen jemnbreda. ☉ 7, 8. b. säll. hv. blr. — *β litoralis*: roten bärande flere nedtryckta stjelkar, utan grenskott. — *γ perennans*: roten mest enstjelig med krypande grenskott. Fig. Sv.B.401. FL.D. 319. *β* H.N.f.6, n:o 12.

Torra st. *β* och *γ* i sandjord. (Sk.—Stockh. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. — *β* Hafsstr. Sk. Hall. ÖG. Mem i Täby enl. Kindb. Gottl. — N. Lindesnäs. — *γ* Sk. Ilvetofta; Tullstorp på en ättehög. Hall. söd. del.: Theor. Gottl. på Fårö.) *Bladen vanl. vågiga i kanten samt mer och mindre stråfhåriga; stjelken i bladvecken skottalstrande. — γ J. perennis* Fr. utan dylika skott.

- 8 Fam. LOBELIACEÆ Juss. Krona oregelbunden. Ståndarknappar sammanväxta; i öfr. som föreg. familj.

## 65. LOBELIA Lin. Notblomma.

- 1 *L. Dortmanna* L. stängeln bar; alla bladen samlade vid roten, jemnbreda helbräddade, inuti 2pipiga; blrna i klase, hängande. 24 7, 8, ljusblå blr. Fig. Sv.B.452. FL.D.39. H.N.f.8, n:o 7.
- I vatten. (Sk.—VB. nor. del. Jemtl. Boh. Öl. — N. södra och vestra del.) *Bladen alltid under vattnet, endast blomklasen ofvan ytan.*

- 9 Fam. CONVULVULACEÆ Juss. Foder fritt från fruktämnet. Krona regelbunden. Stånd. 5, säll. 4, fria. Fr. 2—3rummigt fröhus.

## 66. CONVULVULUS Lin. Vinda.

- 1 *C. arvensis* L. bladen spjut- ell. pil-lika, med spetsiga flikar; blomskärm. 2, på blomskafets midt; foderflikarne rundade. 24 7, 8. Fig. Sv.B.341. FL.D.459.
- Åkr. (Sk.—Medelp. Dal. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Blr hvita, utvändigt rödlilla, väl-luktande. Både denna och följ. art hafva enblommiga blomskaf och slingrande stjeln.*
- 2 *C. sepium* L. bladen hjertlika, med snedstympade flikar vid basen; blomskärm. 2, stora, hjertlika, låg under fodret; dettas flik. aflånga. 24 7, 8. Fig. Sv.B.514. FL.D.458.
- Lundar, nära sjöstr. r. (Sk.—Södm. vid kusten. Stockh. flerstädes. Uppl. vid Uppsala och Ekolsund m. fl. st. omkring Mälaren; Ununge sn, vid sjön Nörden; Borg i Frötuna sn enl. Leml. Vestml. Vesterås; Skinnskatteberg etc. Ner. vid Hjelmaren. Boh. och Hall. Öl. st. Rör i Högsrum sn; vid Hornsviken; mell. Vickelby och St. Frö. Gottl. Visby; Martebo myr, Hörsne och Burs sn enl. Leml. och G. v. Ced. — N. södra delen upp till Bergens st.) *Har mycket stora, krithvita blr. — Calystegia* Br.

## 67. CUSCUTA Lin. Snarrefva.

† Pistiller med spetsigt märke.

- 1 *C. europæa* L. stjelken trådlik, grenig; fodret 4—5klufvet, med aflångt äggrunda trubbiga flikar, kortare än kronpipen; denna i början cylindrisk, föga längre än bråmet, invändigt meränd. med hinnaktiga, tilltryckta fjäll. ☉ 7, 8, rödl. ell. hv. blr. Fig.

Sv.B.352. Fl.D.199. H.N.f.11, n:o 17. — \**Schkuhriana Pfeif.* kronpipens fjäll otydliga, hår- ell. syl-lika.

Parasitväxt på Humle, Nässlor etc. (Sk.—VB. Umeå sn. Verml. Öl. Gottl. — N.) De i kronpipen under ståndarne fästade fjällen saknas stundom, ell. blifva otydliga, sylfika o. s. v. Någon gång få blrna ett mycket kort skaft, såsom hos ex. i H.N.: var. *nefrens Fr.* — \**C. europ. γ Epilobii Aresch.*

- 2 *C. halophyta Fr.* stj. enkel; fodret deladt n. till basen i 5, bredt äggrunda fikar; kronpipen från början vidgad klocklik, af brämet längd och med tilltryckta fjäll. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. H.N.f.12, n:o 30 [?].

Parasit på strandväxter vid kusten, r. (Boh. flerst. i skärg. och vid kusten: Leffl. Smål. Öro i Kalmar län; Hjorthed, Solstastrand: Scheutz. Gottl. Lummelund. — N. Laurvig; Dröbak; Christiania.) Stjelken utan alla grenar, fin och röd. — *C. europ. \*halophyta ed. 5. C. halophila Aresch.* — Anm. Enl. Lindeb. och Leffl. lär den af F. Aresch. som art uppställda *C. Ligustri* i Boh. endast högst obetydligt afvika från der förekommande former af *C. halophyta*, hvars egen arträtt torde behöfva bekräftas genom ytterligare granskning i naturen.

- 3 *C. trifolii Bab.* stj. grenig; fodr. 5deladt, med n. lancettlika fikar; kronpipen cylindrisk, af brämet längd, tillsluten af samständer fransade fjäll, hälften så långa som pipen. ☉ 7, 8, hv. ell. ljusr. blr. Fig. Reich.t.1343,f.4. H.N.f.14, n:o 13.

Parasit på klöfverarter. (Sk.—Uppl. i Funbo och Rasbo snr. Ner. VG. Hall. Hasslöf: Theor. Gottl.) Står i alla afs. närmast den hos oss ännu icke med säkerhet funna *C. Epithymum*, hvilken hufvudsakl. skiljer sig med mindre växt och blomgyltr., samt kronpipens fjäll, som hos den äro lika långa som sjelfva pipen.

†† Pist. med klubblikt vidgad märke.

- 4 *C. Epilinum Weih.* stj. n. enkel; fodr. deladt n. till basen i 5, bredt äggr. fikar; kronpipen från början vidgad klocklik, längre än brämet, med tilltryckta fjäll. ☉ 7, 8, gulakt. blr. Fig. Fl.D.1987. H.N.f.12, n:o 29.

Parasit på Lin. (Sk.—Ängml. och Jemtl. Öl. Gottl. — N.) Fin och föga grenig; fodret ungefär af kronpipens längd.

- 10 Fam. BORAGINÆE Juss. Frukt af 4 små-nötter med ett gemensamt stift. Fod. och kron. som föreg. fam. Stånd. 5.

#### 68. SYMPHYTUM Lin. Vallört.

- 1 *S. officinale L.* något sträffhårig; bladen äggrundt lancettlika spetsade, nedlöpande på stjelken, de nedersta skaftade, utdraget äggrunda; stånd.knapp. dubb. längre än strängen. 2 6, 7. — β *calycinum*: foderlik. längre än kronpipen; stiftet af kronans längd. Fig. Sv.B.418. Fl.D.1569. H.N.f.5, n:o 3. β Fl.D.664.

Odl. st. r. (Sk.—Uppl. Stockholm; v. Ryd vid Sundby; Löfsta bruk etc. Vestml. Dal. Grycksbo Bruk. Verml. Stömme; Venerstrakten. Öl. Borgholm; Böda. — N. Söndmör; Romsdalen etc. — β *Stockh.* vid Sabbathsberg. Gottl.) Har vanl. violett-röda blr, och är då, om foderlik. tillika äro utstående, *S. patens* Sibth. enl. Bab. Var med vitgula blr.

- 2 *S. orientale L.* mycket sträffhårig; bladen äggr. lancettlika; de öfversta oskaftade, knappa nedlöpande, de nedre skaftade, n. hjertlika; knapp. af strängens längd. 2 6, 7, r. blr. Fig. Buxb.Cent.5,t.68. H.N.f.5, n:o 4.

Odl. st. r. (Sk. Delperöd i Rörum enl. F. Aresch. Smål. Kalmar; Virbo i Misterbult: Dr Lund; Blekhem i Törnefalla enl. Leffl. ÖG. Norrköping enl. Kindb. Uppl. Uppsala; Enköping; Löfsta i Eds sn. Helsl. Söderhamn. Vestml. Sättrabrunn; Lisjö i Munktorp. VG. Venerborg, Storegården; Gräfsnäs enl. Leffl.) Utmärkt af sin skarpa sträffhårighet och de icke märkligt nedlöpande bladen. — *S. patens* H.N. *S. uplandicum* Nym. Syll.

#### 69. ANCHUSA Lin. Rast.

- 1 *A. officinalis L.* sträffhårig; bladen lancettlika — n. jernbreda; blomklasarne slutl. par-

visa; fodret med utstående hårlighet. 2 6,7. —  $\beta$  *angustior*: mera mjukhårig; bladen n. jemnbreda. Fig. Sv.B.280. Fl.D.572. H.N.f.7, n:o 6.

Åkerren. torra äng. a. (Sk.—Gefle och Dal. Held. Hedvigsfors: Wistr. Öt. Gottl. — N.) Var mycket. Blrna mörkblå, viol. ell. röda; foderflik. vanl. spetsiga, stundom trubbiga. Bladen hos  $\beta$  2—3 lin. breda.

## 70. LYCOPSIS Lin. Tungört.

1 *L. arvensis* L. mycket stråfhårig; bladen aflångt lancettlika, bugtigt småtandade; kronpipen krökt vid midten. ☉ 6,7. Fig. Fl.D.435. Reich.t.1310.f.1.

Åkr. a. (Sk.—VB. Neder-Kalix och Um. Lpm. — N.) Blrna i början röda, sedan ljusblå. — *Anchusa* MB.

71. MYOSOTIS Lin. Förgät-mig-*ej*, Ögonblomma.

† Krona tallricksformig, med teml. stort, platt bräm.

1 *M. palustris* L. stjelen upptill grenig; blomfodret djupt 5tandadt, med tilltryckta, raka hår; kronflikarne meränd. i spetsen intryckta. 2 6—8, b. blr. —  $\alpha$  *scorpioides*: örtens hår utstående. —  $\beta$  *laxiflora*: stjelen hår tilltryckta, grenarnes utstående. —  $\gamma$  *strigulosa*: stjelen och grenarnes hår tilltryckta. Fig. Sv.B.72 ( $\gamma$ ). Reich.t.1320, f.1;  $\beta$  f.4;  $\gamma$  f.3.

Väta st. a. (Sk.—Lpl. — N.) Stjelen utskjuter någon gång långa sidogrenar, afvensom de smärre formerna stundom hafva rundade, *ej* intryckta, kronflikar. — Alla svenska arter i detta släkte innefattades i Linnés *M. scorpioides*. Med stora blr förstås 2—3 linier breda.

2 *M. caespitosa* Schultz: stjelen nedtill delad i långa grenar; blomfod. deladt nedom midten i lancettlika flikar, med hår som föreg.; kronflik. rundade. 2 6—10, b. blr. —  $\beta$  *repens*: nedligg., ofta vid basen rotsläende; blrna mycket små. Fig. Fl.D.2283. Reich.t.1321.f.1. H.N.f.4, n:o 11.

Stränder. (Sk.—Um. Lpm. och VB. Öfver-Kalix. Boh. Öl. — N. allmän till Trondhj. Næro vid Nordk:s söd. gräns: Norm. Ost-Finnm. Sydvaranger: Th. Fr.) Har smärre blomkronor, men större foder än föreg.; stjelen tilltryckt hårig, snart delad i grenar, hvilka slutl. bilda långa, slaka och glesa blomklasar, vanl. med skärblad vid de nedre blrna. — *M. lingulata* Schultz, något äldre, men af namngifvaren sjelf förkastadt namn.

3 *M. silvatica* Hoffm. stjelen mot basen bredare, något omfattande; blomfod. ludet af utsperrade krokuddiga hår, deladt nedom midten i olikformiga flikar. 2 5—9, b. blr. Fig. Fl.D.583, till venst. Reich.t.1322.f.1 och 2. H.N.f.1, n:o 10.

Fjelltrakter och löfskog. (Sk. Hall. Hallandsås: Theor. Smål. Grenna, Klefven; Jönköp. Bondberget: Zett.; Ribbingsnäs i Barkeryd enl. Scheutz. ÖG. Omberg. Dal. vid Gröfvelsjön. Herjed. Funnesdalen etc. Jeml. Ängml. Täsjöberget. Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Blrna n. så stora som hos första arten; rotsl. krypande. — *M. arvensis*  $\beta$  Wg. *M. alpestris* Schmidt.

†† Krona trattlik, med konkavt bräm, föga vidare än det krökbåriga fodret.

\* Blomfodrets flikar vid fruktmognaden hopslutna [slutet fruktoder].

4 *M. arvensis* Hoffm. bladen utdraget aflånga; fruktod. äggformigt, kortare än skafst; stiftet mycket kortare än kronpipen. ☉ 6—9, b. blr. Fig. Reich.t.1323.f.1. H.N. f.10, n:o 13.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn.: Norm.) Större än de följ., som jemte denna hafva mycket mindre, och mer konkavt kronbräm än de föreg.; rotsl. kort, snart öfvergående i trådar. — *M. intermedia* Link.

5 *M. stricta* Link: fruktod. äggformigt lancettlikt, upprätt, n. oskafadt, slutl. i utdragna uppräta klesar; kronans pip kortare än fodret; stift som föreg. ☉ 4,5, b. blr. Fig. Fl.D.2285, a. Reich.t.1324.f.2. H.N.f.1, n:o 13.

Torra back. (Sk.—Ängml. och Jeml. Pit. Lpm. — N.) 2—4 tum hög; grenarne ända ned blombeläckta, ofta med blad vid de nedersta blrna. — *M. arvensis*. Reich. i Sturm.

6 *M. versicolor* Sm. fruktodret aflångt, i öfrigt som föreg.; kronans pip längre än fo-

dret; stiftet längre än kronpipen. ☉ 5—7. Fig. Fl.D.583, högra fig.; 2285, b. Reich.t.1325,f.1. H.N.f.1, n:o 12.

Torra st. sand etc. (Sk.—ÖG. och VG. Boh. Öl. Gottl. Visby enl. Leml. — N. Christiansand?) Liknar föreg., men har blrna mer samlade åt den öfre, mycket inrullade delen af grenarne, hvilka nertill äro bara; blr i början med gult, sedan blåaktigt bräm. — *M. stricta* β Wg.

\*\* Blomfodrets likar vid fruktmogn. åtskiljda [öppet fruktfoder].

- 7 *M. hispida* Schlecht. blomklasarne utstående, glesblommiga; fruktfodr. äggformigt, på uppböjda skaft af omkr. fodrets längd; stift. mycket kortare än kronpipen. ☉ 4, 5, b. blr. Fig. Fl.D.2284. Reich.t.1323,f.2 och 3. H.N.f.1, n:o 11.  
Tor. back. (Sk.—Uppl. Vestml. och Verml. Herjed. i Vämddalen. Öl. — N.) 3—6 tum hög, mycket spenslig, torr bräcklig, särd. blomskäften; blrna mycket små, i början rödaktiga, aldrig gula. — *M. collina* Reich. *M. arvens.* γ Wg.

## 72. LITHOSPERMUM Lin. Sminkrot, Stenfrö.

- 1 *L. officinale* L. bladen lancettlika, tilltryckt håriga, fjädernerviga; blomfodr. af kronpipens längd; smånött. släta, glänsande. 2 6, 7, hvitgul. blr. Fig. Sv.B.177. Fl. D.1084.

Torra st. särdeles nära hafvet, r. (Sk. Blek. Sölvisborg. Smål. Grenna. — Gefles ytre skär. Öar i Mälaren. VG. Kinnekulle. Hall. Boh. Öl. Gottl. — N. Porsgrund; Christiansand etc. uppåt Gudbrandsdalen och Bergen. Nordl. Solö m. fl. st. i Bejeren: Norm.) Smånötlerna benhvit. Roten stark, mörkröd eller brun.

- 2 *L. arvense* L. bladen aflånga med något utstående hår och enkel ryggnerf; blomfodr. längre än kronpipen; smånött. ojemna på ytan. ☉ 5, 6. — β *cæruleum*: blommorna blå. Fig. Sv.B.386. Fl.D.456.

Åkerrenar, a. (Sk.—södr. Lpm. — N. — β ÖG. Kärna sn etc. Stockh. nya Kyrkogården. Öland. Gottl. lilla Carlson.) Blommorna vanl. hvita; nötlerna mörkgrå; roten utanpå röd. — *Rhytispermum* Lk.

## 73. STENHAMMARIA Reich. Fjärva.

- 1 *S. maritima* Reich. bladen elliptiska — omv. äggrunda, köttiga. 2 6, 7, ljusbl. blr. Fig. Fl.D.25. H.N.f.5, n:o 5.

Vestra hafskust. r. (Boh. Halleskär i Askim; Kälön i Quille; Otterön, Pinnö ymn., Musön, Lindön, samt Furaby strand n. om Grebbestad i Tanum; Arholmen och Nordkoster i Kärnö sn. Strömstad m. fl. st. — N. Sierestådes, ända till Ost-Finnm.) Nedliggande, mycket grenig, blåaktig växt. — *Pulmonaria* L. *Lithospermum* Lehm. *Mertensia* Don. *Hippoglossum* Ed.4.

## 74. PULMONARIA Lin. Lungört.

- 1 *P. officinalis* L. rotbladen äggrundt hjertlika, nedlöpande på skaftet; stjelkbladen äggrundt lancettlika, de nedre med bredkantade skaft; de öfre halftomfattande, alla stråfhåriga. 2 5, 6. Fig. Sv.B.135. Fl.D.482.

Skuggiga lund. (Sk.—Hels. Vestml. Hall. Öl. Gottl.?) Rotbladen utvåda efteråt och blifva stora, mer och mindre hjertlika; blrna straxt de utslå röda, äldre blå.

- 2 *P. angustifolia* L. rotbladen lancettlika, afsmalnande till skaft; stjelkbladen lancettlika halftomfattande, alla mjukhåriga. 2 5, 6. — β *oblongata*: rotbladen bredare, aflångt, lancettlika. Fig. Sv.B.544. Fl.D.2344. H.N.f.1, n:o 14. Reich.t.1319,f.1 och 2; β f.3. Fl.D.483.

Lund. backar, r. (Sk. ford. Sierestådes; i sednare tider knappt annorstådes än vid Refsten i Svedala sn: F. Aresch. Smål. Ljungbyholm; Kränklösaholm etc.; Ålsboda. VG. Åsaka och Sandhem sn; på Mösse- och Ålleberg; Gäddeberg nära Gredby gåstg.; Håstena ängar vid Billingen; Skara Djurgård. — β Smål. Bråås nära Nottebäck, bland ljung i en torr björkskog.) Blr som hos föreg. art. — *P. azurea* Bess.

## 75. ECHIUUM Lin. Blåkunt.

- 1 *E. vulgare* L. mycket stråfhårig, håren med vårtlik bas; bladen lancettlika, de öfre smalare; sidoaxen korta närsittande, bildande ett sammansatt ax; ståndarne utskjutande ur kronan. ) 7, 8. Fig. Sv.B.274. Fl.D.445.

Torra st. åkr. (Sk.—VB. *Jemtl.* Refsund och Sundsjö. *Dal.* Öl. *Gottl.* Sällsyntare norr om Mälaren. — N.) *Älnshög enkel, med ett långt ax af himmelsblå, ställ. kv. blr.*

76. *CYNOGLOSSUM* Lin. Munkfnat.

- 1 *C. officinale* L. bladen bredt lancettlika, något vågiga, tilltryckt mjukt gråludna; ståndarne inneslutna i kronpipen.  $\text{D}$  6—8. —  $\beta$  *bicolor*: kronan hvit med röda mynningsknölar. Fig. Sv.B.302. Fl.D.1147.

Vid vägar och byar, a. (Sk.—Gestr. omkring torp vid sjön Trösken. *Helsl.* Bollnäs och vid Hedvigsfors: *Wistr.* *Dal.* *Verm.* sydöst. delen. *Boh.* Qville sn. *Hall.* Öl. *Gottl.* — N. Christiania etc. —  $\beta$  *Smål.* Kalmar. Öl. Glömminge och Borgholm. — N. Christiania.) *Blrna först röda, sedan violetta.*

77. *ECHINOSPERMUM* Swartz. Piggfrö.

- 1 *E. Lappula* Lehm. bladen aflångt lancettlika — n. jemnbreda, hårbräddade; fruktskaften ganska korta *upprätta*; smånött. med *tvenne rader taggar* i kanterna.  $\odot$  7, b. blr. —  $\beta$  *squarrosus*: hög, med stor samling af båglik utböjda blomklasar. Fig. Fl.D.692. Reich.t.1329,f.2. H.N.f.9, n:o 10.

Torra st. vid byar. (Sk.—Uppl. *Helsl.* Söderhamn, vid Långrör. *Vestml.* Ner. VG. *Boh.* *Hall.* Hasslöv. Öl. *Gottl.* — N.) *Stjelken vanl. endast högt upp förgrenad. — Myosotis L. Rochelia Röm.*

- 2 *E. deflexum* Lehm. bladen som hos föreg., men vanl. *spetsigare*; fruktskaften *nedböjda*, de nedre med skärm; smånött. med *en enkel rad taggar*.  $\text{D}$  7, 8, b. blr. Fig. Vet.Ak.H.1810,t.4. Fl.D.1568. Reich.t.1329,f.1. H.N.f.9, n:o 9.

Fjell- och bergstrakt. r. (*Lul. Lpm.* Qvikkjokk; Aktsik vid Laidaure: H. Widm. *Pit. Lpm.* Itstjakk etc. *Jemtl.* vid Portfjellet; Fogel- och Carlberget i Frostviken. *Herjed.* Funnesdalsberget och Ulfsberget. *Medelp.* Randklöfven. *Smål.* Taberg: J. E. Zett. — N. Ost-Finnm. Nordvaranger, vid Flintenæsen: Norm.; samt från Alten ned till Christiansand.) *Liknar Myosotis arvens., men är större. Stj. långt ned, ofta ända från rothalsen förgrenad. — Myosotis Wg.*

78. *ASPERUGO* Lin. Rifva.

- 1 *A. procumbens* L. stjelen slak och snärjande; bl. aflånga, i kanten småtaggiga; blrna oskaftade i bladvecken.  $\odot$  5, 6, b. blr. Fig. Fl.D.552.

Odl. st. vid hus etc. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Ofta älnslång och grenig.*

- 11 Fam. *LABIATE* Juss. Krona oregelbunden [oftast läppformig]. Stånd. 4, säll. 2. Frukt af 4 smånötter, med ett gemensamt, i spetsen 2klufvet stift.

- 1 Flocken *Menthesæ*. Kronan trattlik med 4—5 olikstora, men mindre olikformiga flikar.

79. *ELSHOLTZIA* Willd. Kryddmynta.

- +1 *E. cristata* W. bladen skaftade egggrunda och sågade; axen ensidiga.  $\odot$  7, 8. Fig. Fl.D.2652. H.N.f.5, n:o 8.

Förvild. på odl. st. r. (Sk. vest. del. t. ex. Lyby; Vest. Tveit i Hällesta sn m. fl. st.; samt närgränsande delar af *Smål.* och *Hall.* t. ex. vid Kärups gästg. i gropar vid landsvägen. *Södml. Stockh.* vid Rålambshof, samt på Södermalm. *Verm.* i trädg. i Carlstad. *Gottl.* nära Bro kyrka: G. v. Ced.) *Ört med stark lukt, små rödaktigt hvita blr.*

80. *MENTHA* Lin. Mynta.

+ Blomkransarne närmade i utdragna, bladlösa ax.

- 1 *M. silvestris* L. bladen n. oskaftade, lancettlika—bredt ägggrunda, spetsiga hvass-sågade, *under gråludna*; axen tät, nedtill något gleskransade, småludna; kronan *luden*.  $\text{D}$  8, 9, tjusr. blr. —  $\beta$  *latissima*: bladen hjertlikt ovala, föga ludna. Fig. Fl.D.1932. Reich.t.1283 och 4. H.N.f.9, n:o 11;  $\beta$  f.1, n:o 18.

Fukt. st. r. (Sk. här och der. Smål. i Misterhultaskären. ÖG. Omberg; Hageby nära Skenninge; Odenforss: Kindb. Öl. i bäcken vid öfra Sandby i Bredsåtra sn; Abs sn i Ottenby. Götll. Klinte sn, i Mölnareång; Stenkyrka sn enl. Leff. Skundom förvildad i bondtåppor ända till Uppl. Roslag. Rånäs. — β Sk. Vadmöllan i Hostad.) β *M. nemorosa* W. enligt bladformen; Tyska ex. hafva dock mer ovala och under gråbludna blad.

†2 *M. viridis* L. bladen n. oskaftade, lancettlika, n. glatta; axen mindre tätta, af mer skilda kransar; kronan glatt. 2 8, ljusr. blr. Fig. Fl.D.1876. Reich.t.1284.f.1. H.N.f.7, n:o 9, A.

Fukt st. r. (Sk. Ousbyholm, Skartofta, N. Vram etc. Smål. Misterhult på tomter vid Hökhult; Loftahammar; samt i Madesjö och Urshult enl. Scheutz. ÖG. nära Gusum. och vid Malma qvarn i V. Ryd enl. Kindb. Öl. Glömminge surbrunn. Götll. Visby enl. Leff. Ursprungl. odlad.) Bladen på båda sidor gröna. Anses af flere förf. som var. af föreg.

†† Blomkransarne i bladvecken ell. närmade i hufvud. \*)

3 *M. gentilis* L. alltid med blomlösa toppblad; stjelkbladen något skaftade, äggrunda—lancettl., mer och mindre håriga, sågade; blrna kransvisa i bladvecken, yngre gråbludna; blomskafsten och kronan n. glatta; fodr. n. klocklikt, icke veckigt, kådprickigt och isynnerhet upptill hårigt, med syllika tänder. 2 7, 8, gred. blr. — α *Agardhiana* Fr. bl. äggrunda, med utstående sågtänder; toppbl. större; blomkrans. mer åtskilda. — β *glabrata*: mera glatt; bl. lancettl., med mera framåtriktade sågtänder; toppbl. små; blomkrans. mer tättsittande. Fig. α Fl.D.2655. H.N.f.4, n:o 17; f.6, n:o 13; β f.12, n:o 32.

Fukt. odl. st., bondtåppor, r. (Sk.—Södml. och Ner. Helsl. Skog sn. Jeml. Frösön. Verm. Boh. Öl. Kastlösa prestg.: Sjöstr. Götll. — N. Slidre; Suledal etc. — β Sk. flerest. Smål. söd. del. och Öl. enl. Wg. Fl. Su.) Bladskafsten alltid korta, upptill, särd. hos β, n. inga; de nedre säll. ½ tum; blomkrans. slutt. något skaftade. — *M. sativa* ed. 5. *M. Agardhiana* Fr. H.N.f.4. *M. gentilis* β *verticill. Aresch.*; β *M. pratensis* ed. 9. *M. rubra* Fr. S.V.Sc. *M. gentilis* α *subspicata* Aresch.

4 *M. aquatica* L. bladen skaftade, bredt äggrunda—aflånga, sågade, med vanl. framåtriktade sågtänder; blrna i hufvud i stj:s spets ell. kransvisa i bladvecken, yngre icke gråbludna; blomskafst. och kronan gleshåriga; fodr. n. rörformigt, upptill något vidgad, veckigt, kådprickigt och mest nedtill hårigt, med n. syllika tänder. 2 7, 8, blå blr. — α *capitata* Fr. utan toppblad; blrna i hufvud, med små, af blrna skydda skärmb. — β *subspicata* F. Aresch. med små ell. inga toppbl.; blomkrans. något tättsittande, stödda af vanl. oskaftade, uppåt allt smärre skärmb. — γ *verticillata* Roth: alltid med toppbl.; blomkrans. glest sittande, stödda af större, tydl. skaftade blad. Fig. α Fl.D.638. H.N.f.2, n:o 25; f.4, n:o 16 [glatt form]. γ H.N.f.2, n:o 26.

Stränd., fukt. st. (Sk.—Gestr. Helsl. Enånger. Ångml. Vestml. Baggå i Skinnskatteberg. Ner. Verm. i bergsl. VG. Boh. Hall. Öl. Götll. — N.) Blomfodr. n. alltid färgadt. Varierar i hög grad från n. glatt med köttiga bl. på hafstränder: var. *litoralis* ed. 9 ell. *odorata* Fr., till tätt luden: var. *villosa* ed. 9; samt från 1 till 3 fots höjd; γ, som oftare träffas i det inre af landet vid söll vatten, är vanl. mest storväxt. — *M. hirsuta* E.B. *Origanum vulgare* Fl.D.; γ *M. Agardhiana* ed. 9. *M. sativa* Fr.

5 *M. arvensis* L. alltid med blomlösa toppbl.; stjelkbl. skaftade, äggr.—lancettl.; blrna kransvisa i bladvecken; fodr. klocklikt, icke veckigt, med korta, bredt äggrunda tänder, jemte skafstet meränd. hårigt. 2 7, 8, rödbl. blr. — β *glabrata*: hela växten vanl. rödaktigt anlupen; blomskafsten och de äggrunda bladen n. glatta. — γ *lapponica*: örten grön; blskafsten och de lancettl. bladen som β. Fig. Sv.B.279. Fl.D. 512. β H.N.f.2, n:o 27. γ Wg.Fl.Lt.10.

\*) Vid framställningen af hithörande arter har utg. så mycket mindre tvekat att hufvud sakl. följa F. Aresch. och Lange, som deras forskningar till fulle bekräftat giltigheten af de tvifvelsmål rörande *M. pratensis* och *M. Agardhiana* ed. 9 arträtt, samt de antydningar om dessa formers släktkap (den enas med *M. gentilis*, och den andras med *M. aquatica*), hvilka redan i flere föreg. upplagor (från och med den 5:te) blifvit uttalade.

\**agrestis* Sole: luden: bladen bredt, n. hjertlikt äggrunda, med grofva, mer utstående sågtänder. Fig. E.B.2120.

Stränd. och fukt. st. a. (Sk.—söd. Lpm. — N. — γ Um. Lpm. Jemtl. — \*Blek. Aspö. Sk. Helsingborg etc.) Fodertånd. minst lika breda som långa, då hos begge de föreg. arterna längden är mycket större än bredden. Vanl. mjuk och hårig; β mera glatt, stel och violett anlupen. \*har n. 2 tum breda blad, med föga större längd, små blr i gråludna kransar. — β var. *riparia* Fr. γ *M. lapponica* Wg.

### 81. *LYCOPUS* Lin. Strandklo.

1 *L. europæus* L. bladen aflånga, inskuret sågade ell. parklufna, något håriga, med mest hela flikar. 2½ 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.262. FLD.1081.

Stränd. fukt. st. (Sk.—Helsl. och Dal. Boh. Öl. Götll. — N. till Trondhj.) Blrna små kranvisa. Var. mer och mindre hårig, samt med vid basen pardelade blad: β *subpinnata* Blytt.

2 Flocken *Monardese*. Kronan 2läppig, med 2 ståndare.

### 82. *SALVIA* Lin.

1 *S. pratensis* L. bladen aflångt hjertlika, groft dubbelnaggade, de öfversta stjelkomfåtande; blomkransarne omkring 6blommiga; kronans öfre läpp bågliket böjd, klibbig, längre än den nedre. 2½ 6, 7, b. blr. Fig. Sv.B.667. H.N.f.3, n:o 10.

Äng. läppor vid gårdarne, r. (Uppl. Uppsala bortåt Slafsta; Högstabo i Bålänge; Vendel sn, vid Grytby och Karby, samt Mensta by.) Ofta alnshög med tumslånga blr.

3 Flocken *Saturejinese*. Kronan 2läppig med platta läppar. Stånd. 4, åtskilda och stående från hvarandra.

### 83. *ORIGANUM* Lin. Konig.

1 *O. vulgare* L. bladen äggrunda; blomskärmen ovala, något längre än fodret; blomqvasten upprepadt 3grenig, med gytrade småknippen. 2½ 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.188. FLD.1581.

Lund. ängsback. (Sk.—Gestr. Helsl. Iggesund: Wistr. Jemtl. Fogelberget i Frostviken. Vestml. Verm. Boh. Öl. Götll. — N. till Nordl.) Stjelken 1—1½ fot hög med rik blomsamling, violett af de färgade skärmen; var. i Nyköpingsskären med n. hvita blr och gröna skärm.

### 84. *THYMUS* Lin. Timjan.

1 *T. Serpyllum* L. stjelken nedliggande, öfverallt finluden; bladen ovala—jemnbreda n. oskaftade, hårbräddade; blrna i hufvud. 2½ 6—8, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.320. FLD.1165. H.N.f.5, n:o 7.

Sandback. hedär, a. (Sk.—Gestr. Ockelbostigen. Helsl. Voxna bruk; Hanebo sn: Wistr. Medelp. Sundsvall. Ängml. Nora sn; Nätra och Själevad m. fl. st. VB. Harskär nära Umeå enl. G. v. Ced. Dal. till Furudal. Verm. sydöst. delen. Dalsl. Öl. Götll. — N. mest närmare Sv. gränsen.) Bladen vanl. aflånga, stund. mycket smala, mer upphöjdt nerviga än hos följ. med mindre tydligt skaft. En form med breda ovala blad sammanbinder dock båda arterna.

2 *T. Chamædrys* Fr. stjelken uppstigande, längs kanterna småluden; bladen äggrunda platta, med tydligt skaft, icke ell. blott vid basen hårbräddade; blrna i hufvud. 2½ 7, 8, r. blr. Fig. FLD.2237. H.N.f.5, n:o 6.

Back. skog. r. (Sk. vid Tjörndala i öst. del. [nu trol. utgången: F. Aresch.]. Blek. Smål. vid Blek:s gräns; Weziötrakten: Scheutz; Algutsboda; Kalmar; Vestervik vid Grantorp. ÖG. Skrukarp i Krigsberg enl. Kindb. Södm. Säfstaholm och Åkerö; Tullgarn: C. Ind. Stockh. Vermdön, vid södra Stäket och Bo egor. Ängml. Bondsjö i Säbrå: Arn. Boh. Oroust och Koster enl. Leffl. — N. Christiania upp till Gudbrandsdalen, Helgeland etc.) Till de flesta delar större än föreg.; bladen, särdeles de nedre, med tydligt skaft. Är utomlands, likasom i N., allmänare än föreg.

### 85. *CALAMINTHA* Mönch. Har-timjan.

1 *C. Acinos* Clairv. bladen äggrunda ell. ovala, glest sågade; blr i åtskilda kransar.

Hartman, *Skandinavien Flora* (10:de uppl.).



⊙ 24 ? 6, 8, viol. blr. —  $\beta$  *perennans*: mindre, men mera varaktig, med hv. blr. Fig. Fl.D.814.

Torra st. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Stadsberget i Ragunda sn. Um. Lpm. — N. till Trondhj. Levangernæset och Værdalsören. —  $\beta$  Gøttl. Visby kalkugn; Thorsborgens; Gejrungs i Ruthe.) Vanl. upprät. — *Thymus L. Acinos vulgaris Pers.*

#### 86. CLINOPODIUM Lin. Dosta.

1 C. *vulgare* L. stielken meränd. enkel; bladen äggrunda, glest smånaggade, håriga; blomskärmen borslika. 24 8, r. blr. Fig. Sv.B.441. Fl.D.930.

Ångsback. (Sk.—Helsl. Vestml. och Verml. Boh. Tanum. Hall. Öl. Gøttl. — N.) 2—3 quart. hög.

4 Flocken **Scutellariese**. Kronan 2läppig, med 4 parallela stånd. under den öfre läppen. Frukodret plattadt tillslutet.

#### 87. SCUTELLARIA Lin. Frossört.

1 S. *galericulata* L. bladen från bredare, n. hjertlik bas lancetlika, glest naggsågade; blrna parvisa i bladveckan. 24 7, 8, b. blr. Fig. Sv.B.437. Fl.D.637.

Vid vatten bland sten. a. (Sk.—Päl. Lpm. Torn. Lpm. vid Tornioträsk. — N. till söd. Finnm.: Norm.) Blrna  $\frac{1}{2}$  t. långa, kortare än bladen. Blir stundom på hösten grenig, med blrna mer närmade i likhet med följ., de öfversta då längre än skärmbladen.

2 S. *hastifolia* L. bladen af ett par korta utstående sidoflikar vid basen n. spjullika, helbräddade; blrna närmade i ax i toppen, längre än skärmb. 24 7, viol. blr. Fig. Fl.D.1822. H.N.f.4, n:o 13.

Sten. stränd. i synn. hafsstr. r. (Blek.—Rosl. Hargs skärgård. Södm. Uppl. och Vestml. vid Mälarens stränd. Hall. vid Sperlingsholm: Fr. Fl. Hall. Öl. Gøttl.) Bladen aflånga—äggrunda med tvärhuggen bas.

#### 88. PRUNELLA Lin. Brunört.

1 P. *vulgaris* L. bladen aflångt äggrunda, vid basen meränd. tandade; blomfodrets öfre läpp tvärhuggen med 3, vid basen åtskilda tänder. 24 7, 8, blå, säll. hv. blr. —  $\beta$  parviflora: kronan söga längre än fodret, hvit, med glatt öfre läpp, ljusröda ståndarknappar. Fig. Fl.D.910.

Betesm. a. (Sk.—Lul. Lpm. — N. till Finnm. Tromsøe.) Blrna vanl. 3 lin. långa; öfre foderläppens tänder nå icke hvarandra med basen.

2 P. *grandiflora* L. bladen som hos föreg.; fodrets öfre läpp hvasst inskuren i 3, med basen sammanstötande, syllika, flikar. 24 7. Fig. Fl.D.1933. H.N.f.4, n:o 14.

Betesm. r. (VG. Allebergsända; Åsaka i Variofta b:d; Kinnekulle, Österplana vall enl. Lem. Öl. Gøttl.) Stielken mer upprät, blrna dubbelt större än hos föreg., viol. stundom hv. — P. vulg.  $\beta$  *grandiflora* L.Sp.Pl.

5 Flocken **Nepetese**. Kronan 2läpp. Stånd. som hos föreg. flock, de öfre längre än de nedre. Fodret icke plattadt.

#### 89. NĖPETA Lin. Kattmynta.

1 N. *Cataria* L. bladen skaftade, hjertlika grofsågade, under jemte stielken fint gråudna; blomkransarne i ax, sammansatta af blomknippen på korta skaft. 24 7. Fig. Sv.B. 410. Fl.D.580.

Byar etc. (Sk.—Uppl. Vestml. Verml. Boh. Kuseröd och Lindö i Tanum. Hall. Öl. Gøttl. — Södra Norge.) Stielken alnshög, upprät och grenig. Blrna hvita, inuti rödprickiga, med stark lukt.

#### 90. GLECHOMA Lin. Jordrefva.

1 G. *hederacea* L. bladen rundadt hjertlika, n. glatta; fodertänderna äggrunda uddspetsiga. 24 4, 5, b. blr. —  $\beta$  *grandiflora*: blrna mycket större ( $\frac{1}{2}$  t.), mer mörkblå. Fig.Sv.B.183. Fl.D.789.  $\beta$  H.N.f.11, n:o 19.

Torra,  $\beta$  fukt. st. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. — N. till Finnm.) Krypande med långa grenar från rotslocken. Blrna i 6blomm. kransar; de nedre bladen njurlika.

## 91. DRACOCÉPHALUM Lin. Drakblomma.

1 *D. Ruyschiana* L. bladen jemnbreda ell. smalt lancettlika, något trubbiga, jemte de äggrunda spetsade blomskärmen helbräddade; blrna i kort ax; kronan 2—3 gr längre än fodret. 2 7, viol. blr. Fig. Fl.D.121. H.N.f.4, n:o 15.

Äng. r. (Smål. Hvetlanda i Huleäng [fordom], samt Uplanda: Scheutz; Köpstad i Vrigstad sn; Germunderyd i Alsheda sn. VG. Älle- och Mösseberg; Gisseberg; Åsaka i Vartofta härad; Hällstad sn. ÖG. i Thorstorps äng vid Drothems prestgård, samt Björsätters äng nära Skinnmyran m. fl. st. nära Söderköp. Vestml. i Storängen och vid Hjortsberga nära Vesterås. — N. Christiania; Ringerige vid Gårdsbagen; Hadeland; Slidre i Valdres; omkring Mjösen upp till Toten och Dovre.) Blrna i tum långa.

2 *D. thymiflorum* L. bladen äggrunda—aflånga, sågade; blrna kransvisa i bladvecken, uppåt närmade i ax, med aflånga helbräddade skärm; kronan föga längre än fodret. 3 5, 6, b. blr. Fig. H.N.f.3, n:r 11.

Torrtak, vägrenar etc. r. (Uppl. Uppsala, förvildad i Svartbäcken och vid Rickomberga; Löfsta bruk. Stockh. vid Carolinska Institut., Observatorilbacken etc. Hall. Karup, vid vägen upp åt Hallandsås: Theor.)

6 Flocken *Stachydese*. De öfre ståndarne kortare än de nedre, för öfr. som föreg. flock.

## 92. BALLÖTA Lin. Bonässla.

1 *B. ruderalis* Sw. bladen bredt ell. hjertlikt äggrunda, grofsågade; blomfodrets tänder utdraget äggrunda, långt sylspetsade. 2 7, 8, röd. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.389. Fl.D. 1702. H.N.f.7, n:o 7.

Byar. (Sk.—ÖG. Stockh. VG. Halle- och Hunneberg. Boh. Kongelf. Hall. Öl. och Gottl. allm. — N. Christiania.) Fodertänderna utdragna i en, ofta öfver en linie lång, udd; bladen stundom njurlika. Varierar mer och mindre luden. — *B. nigra* L.Fl.Su. och Herb.

## 93. BETONICA Lin. Humlesuga.

1 *B. officinalis* L. bladen hjertlikt aflånga, groft truhbsågade; blomkrans. närmade till ett ax; fodertänderna uddspetsiga. 2 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.284. Fl.D.726. H.N.f.2, n:o 23.

Skogsmark, r. (Sk. Bosarp och Torrlösa snr flerst.; Stehag; Ramstorp; Trollenäs i Fastorps sn. På öfr. ställen numera utgången enl. F. Aresch.) Blrna alldeles utan skaft, nedersta kransen vanligen fränskild i öfversta bladvecket. Blomkronorna utvändigt hvilludna. — *B. stricta* Ait.

## 94. LEONCRUS Lin. Hjertstilla.

1 *L. Cardiaca* L. de nedre bladen hjertlika, de öfre vigglika, alla handflikiga, något grofsågade; blomkrans. i långa ax. 2 7, 8. Fig. Sv.B.195. Fl.D.727 och 1756.

Byar, väg. a. (Sk.—Gestr. och Dal. Husby sn, Kyrkbyn och Klosters bruk. Verm. Boh. Tanum sn. Grebbestad. Hall. Öl. Gottl. — N.) Blomkron. ludna, hvita, inuti rödprickiga.

## 95. STACHYS Lin. Syska.

† Kron. långt utskjutande ur fodret.

1 *S. silvatica* L. bladen långt skaftade, bredt hjertlika spetsiga; blomkrans. 6blommiga. 2 7, 8, mörkröda blr. Fig. Sv.B.578. Fl.D.1102.

Lund etc. (Sk.—Ängml. och Jeml. Boh. Öl. Gottl. — N. till söd. Finnm.; Norm.) Alnshög och derutöfver; bladen stora och tunna, grofsågade, med rundade, uddspetsiga sågländer.

\*2 *S. ambigua* Sm. bladen kort skaftade, lancettlikt aflånga, med hjertlik bas; skärmb. smalt lancettl.; blomkrans. 6blomm. 2 8, 9, mörkr. blr. Fig. Fl.D.1877. Reich. t.1215.

Od. st. r. (N. Gudbrandsdalen, mell. Stav och Rörvig; mell. Elstad och Lössnæs; 1 mil n. om Lillehammer. Lundervig vid Egelandsfjorden. Bergens st. Skall äfven

vara funnen i Sv.) *Synes vara en hybrid form af föreg. och följ.; närmar sig den förra uti blomningen, den sednare i bladformen.* — *S. palustris-silvatica Schiede.*

- 3 *S. palustris* L. bladen oskaftade ell. ganska kort skaftade, jemnbredt lancettlika, med hjertlik bas; skärmb. *aggrundi* lancettl.; blomkrans. 6blomm. 2 8, r. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.431. Fl.D.1103.

Fukt. st. a. (Sk.—*Ångml.* och *Jeml. Boh.* Ö. G. G. — N. till Salten.) *Alms-hög och mera, med småsågade blad; i åkrar dubbelt lägre, mer gråluden.*

†† Kron. knappt utskjutande.

- 4 *S. arvensis* L. stj. stråfhårig; bladen *skaftade aggrunda* med hjertlik bas, *trubbiga*, trubbsågade; blomkrans. 4—6blommiga. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.674. Fl.D.587. H.N.f.4, n:o 12.

Sandiga åkrar, r. (Sk. temligen allm., särd. i n.ö. delen. *Hall.* söd. del. allm.: Theor.; Varberg; Hvalinge etc. *Boh.* Uddevalla, ofvan Kuröd. *Blek.* Gredby, Stiby; samt på Storkö, Senoren och Tjuskö. *Smål.* Kronob. län, Urshult. Berga nära Kalmar. — N. till Trondhj.) *Kronorna blekt violetta, ell. hvita med rödprickig läpp.*

#### 96. GALEÖBDOLON Huds. Gulsuga.

- 1 *G. luteum* Huds. bladen något hjertligt aggrunda, grofsågade. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1272. H.N.f.2, n:o 24.

Skog. r. (Sk. ymnig. *Blek.* Listerhufvud. *Smål.* Hulta i Höreda sn enl. Scheutz; Risnäs i Ålhem, samt vid Saxtorp och Risinge m. fl. st. i Kristdala sn enl. Ekstr. — N. Bergen.) *Blrna gula med rödfäckig nedre läpp.* — *Galeopsis Galeobd. L. Leonurus Willd.*

#### 97. LAMIUM Lin. Plister.

† Bladen spetsiga.

- 1 *L. album* L. stjelen stråfhårig; bladen skaftade *hjärtlika, grofsågade*; blomkrans. mångblommiga; blomfodrets tänder horstlika. 2 5—9. Fig. Sv.B.55. Fl.D.594.

Byar, a. (Sk.—*Uppl. Gefle*, på Brobänken. *Helsl.* Ålsta sn: Wistr. *Ångml. Dal.* Ner. sälls. *Dalsl.* Ånimskog. *Boh.* Marstrand, på Koön. *Hall.* allm. i söd. delen: Theor. Ö. G. G. — N.) *Blrna stora, hvita.*

†† Bladen trubbiga.

- 2 *L. purpureum* L. alla bladen *skaftade hjertlika*, trubbsågade eller inskurna, de öfre tättsittande; fodertänderna *af foderpipens längd* ell. längre. ☉ 4—9, r. blr. Fig. Fl.D.523. Reich.t.1204,f.3.

\* *incisum* W. skärmb. flikiga, de öfre med vigglik bas. Fig. Reich.t.1204,f.4. H.N. f.10, n:o 16.

Odl. st. a. (Sk.—VB. och *Jeml.* — N. — \*Sk. — *Uppl. Vestml. Ner.* och *Verm.* Carlstad och Christinehamn. Ö. G. G. enl. G. v. Ced.) *L. incisum* W. har ett ganska afvikande utseende och skiljes af alla nya förf., ehuru inga säkra karakterer kunna uppgifvas; dess blad och blomfod. äro vanl. rödaktiga. — *L. confertum* Fr. S.V.Sc.

- 3 *L. intermedium* Fr. bladen njurlika, inskuret naggade, de öfre oskaft.; fodertänderna längre än foderpipen. ☉ 4—9, r. blr. Fig. Fl.D.1701. Reich.t.1204,f.1. H.N.f.1, n:o 15.

Åkrar. (Sk.—*Gefle. Helsl.* Hudiksvall; Norrbo prestg. *Ångml.* Nylands gästg. och Gudmundrå sn. *Vestml. Ner. Verm.* Hall. enl. Theor. G. G. — N. upp till Sognfjorden.) *Har blomning som föreg., blad som följ., men är vanl. mycket gröfre än denna. Fodret något violett. Tänderna vid kronpipens mynning stundom omärkliga.* — *L. purpureum* γ Wg.

- 4 *L. amplexicaule* L. bladen njurlika, inskurna eller djupt tandade, de öfre oskaftade; fodertänderna kortare än foderpipen. ☉ 6—8, r. blr. Fig. Fl.D.752. Reich.t.1204,f.2. Torra st. a. (Sk.—VB. och *Pit. Lpm.* Arfvidsjaur. — N.) *Bladen meränd. ljusgröna; fodret n. hvilaktigt grönt. Blomkronorna utveckla sig icke alltid ur fodren; men, då de utskjuta, blifva de ofta mycket långa, med smal pip.*

98. *GALEOPSIS* Lén. Blindnässla, Dån.

† Stjelken icke uppsvålld under lederna.

- 1 *G. Ladantum* L. stjelken *mjukluden*; bladen äggrunda—lancettlika sågade småhåriga; *alla* blomkransarne *åtskiljda*; blomkronans öfre läpp tandad. ☉ 7, 8, r. blr. — *β angustifolia*: bladen smala lancettlika. Fig. Fl.D.1757. Reich.t.1228.f.2,3; *β* t.1229.f.1. H.N.f.16, n:o 19.

Odl. ställ. (Sk.—Helsl. Norrbo prostgård; Sanna i Jerfsö: Wistr. Jemtl. Östersund. Vestml. Ner. Verml. Öl. Gottl. — N. till Trondhj.) *Blomfodret glandelhårigt; kronans öfre läpp ofta 2flikad*.

- 2 *G. pubescens* Bess. stjelken täckt af mjuka, nedåt tilltryckta hår, endast *vid lederna stråfhårig*; bladen äggrunda; de öfre blomkrans. tätsittande; kronans pip *af fodrets längd* ell. kortare. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. Sturm. 62 häft. Reich.t.1230.f.2.

Berg och odl. st. r. (Smål. Femsjö sn. Bösseherget och vid Hallaböke; Binga i Hosmo enl. Ekstr. Stockh. Lilla Nyckelviken, och Kungshamn. Uppsala, vid vägen till Eklundshof. Vestml. Malmberga i Carl sn. Herjed. Funnesdalsberget. — N. Gudbrandsdalen, vid Elstad, Kringelen och Domaas.) *Skiljd från följ. endast med den mjukludna, jemntjocka stjelken, och är trol. blott en lokalform deraf*.

†† Stjelken tydligt uppsvålld under lederna.

- 3 *G. Tetrahit* L. stjelken *öfverallt stråfhårig*; för öfr. som föreg. ☉ 7, 8. Fig. Fl. D.1271.

\* *bifida* Bönn.: nedre kronläppens mellanflik aflång urnupen. Fig. Reich.t.1230.f.1.

Berg och odl. st. etc. allm. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.: Norm.) *Blrna vanl. röda på bergiga ställen, blekgula på odl.*

- 4 *G. versicolor* Curt. kronans pip *dubbelt längre än fodret*, med bred hvalfisk öfre läpp; för öfr. som föreg. ☉ 7, 8. — *β parviflora*: blrna flere gånger smalare. Fig. Sv.B. 446. Fl.D.929.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) *Blrna stora gula, med purpurfläckig nedre läpp. Denna och föreg. art hybridisera på odl. ställen och sammanflyta; i alla fall föga skiljda. — G. cannabina Roth. G. Tetrahit γ L.*

99. *MARRUBIUM* Lén. Andorn.

- 1 *M. vulgare* L. bladen rundadt äggrunda, skrynkligt ådriga; blomkrans. i bladvecken, mycket tätblommiga; fodertänderna krokuddiga. 2 7. hv. blr. Fig. Fl.D.1036.

Byar, vägar. (Sk.—Uppl. Sigtuna, Tibble, Enköping etc. Vestml. Kärrbo, Barkarö, St. Iljan snr. Ner. öar i Hjelmaren. Boh. Hall Öl. Gottl. — N. Trondhj. på Stördalsutbygden.) *Stjelken och blomkransarne ulliga*.

- 7 Flocken **Buglesee**. Kronans öfre läpp omärklig ell. liten och 2klufven.

100. *TEUCRIUM* Lén. Lösuga.

- 1 *T. Scordium* L. bladen *oskaftade, aflånga*, groft trubbsågade, mot basen helbräddade; blrna parvisa i *bladvecken*, skaftade; fodret *föga olikformigt* 5standadt. 2 7, 8, rödviol. blr. Fig. Sv.B.255. Fl.D.593. H.N.f.1, n:o 17.

Fukt. st. r. (Sk. mångenst. i söd, och sydv. del. t. ex. vid Lomma, Alnarp. Malmö, Hvellinge, Trelleborg, Kåseberga mosse etc. enl. F. Aresch. ÖG. mell. Vadstena och Lankarebron, samt vid V. Staby: Kindb. Öl. allmän. Gottl. s. om Vishy; Slite, Roma, Gothemsån etc.) *Stjelken uppböjd mjukhårig, nedtill med grenskott och b-rötter*.

- \*? *T. Scorodonia* L. bladen *skaftade, hjertlika* trubbiga sågade; blrna parvisa i *ensidiga klasar*, med njurlikt rundade skärmbblad; fodret *2läppigt*. 2 7. Fig. Fl.D.485. H.N.f.10, n:o 15.

Skogshack. r. (N. Christiansand; Mandal; Lindesnäs på Nyrnäs och Tronäs; Fleckefjord och Lene i Lister.) 2—3 quart. *hög, upprätt, med gulakt. ell. grönhvita blr.*

101. *ALUGA* Lén. Blåsuga.

- 1 *A. reptans* L. n. *glatt* ell. upptill småluden, med *långa krypande* grenskott; bl. omv. äggrunda, de nedre större, bugttandade; de öfre *föga längre än* blrna; blomkran-

- sarne närsittande, 6—10blommiga. 2, 5, 6, h. blr. — *β radicans*: grenskotten rot-slående. Fig. Fl.D.925. Reich.t.1234,f.3. H.N.f.9, n:o 13.
- Fukt. st. i skugga. r. (Sk. Fogelsång nära Lund; Tjutehed nära Hässlunda; mell. Billinge och Gunnaröd m. fl. st. enl. F. Aresch. *Blek.* Ronneby, vid Rönninge; Skärfva nära Carlskrona. *Smål.* Gränsö: Scheutz; Kalmar, i parken vid Lindsberg, samt vid Sandås; Vestervik, Grantorpet. *Hall.* Hallandsås: Theor. *Gottl.* vid Visby; Ljugarn enl. G. v. Ced. — *N. Christiania*: Norm. enl. Ax. Bl. — *β Boh.* Styrsö, och Koön flerstädes. *Blek.* Rönninge enl. Gosselm.) *β A. alpina* Fr. S.V.Sc.
- 2 *A. pyramidalis* L. hårig, säll. med små grenskott; bl. som hos föreg., de nedersta störst, de öfre mindre, alla mycket längre än blrna; bl.krans. 6blommiga. 2, 5, 6, b. blr. — *β glabrata*: nära glatt; stjelen stundom med helt korta grenskott. Fig. Sv.B.225. Fl.D.185. H.N.f.12, n:o 34; *β* f.15, n:o 20.
- Skuggiga hagar, a. (Sk.—VB. och Um. Lpm. — *N.* till Finnm. Tromsøe. — *β Blek.* Lyckeby, Wedeby; Ronneby m. fl. st. enl. Gosselm. *Smål.* Säsjö jernv.station och Vrigstad: Scheutz. *VG.* Göteborg, nära Landala enl. Leml. — *N. Christiansand.*) *Quartershög, genom de 4-sidigt fästade, nedtill större och uppåt allt mindre bladen, pyramidlik. Nära utblommade ex. få bladen mer skiljda, och, då rotbladen stull. bortvissna, blir växten något lik föreg., men saknar de långa grenskotten.*
- 3 *A. genevensis* L. hårig, alltid utan grenskott; bladen aflånga—ägggrunda, bugtigt groftandade, de öfre kortare än blrna; blomkrans. 8—10blomm., närmade till axform. 2, 6, 7. Fig. Fl.D.1703. Reich.t.1234,f.1. H.N.f.1, n:o 16.
- Torra st. krithack. r. (Sk. Malmö vid Limhamn och på spridda st. derifrån ned mot Trelleborg enl. F. Aresch.) *Blrna mer i axform än hos de föreg., lifligt blå, med mycket större bräm.* — *A. alpina* Lin. *Herb. samt Fr. Nov.*

- 12 Fam. **MENYANTHEÆ** Mart. Krona regelbunden, 5flikig, med 5 ståndare. Fröhus enrummigt, af 2 skal, med fröfästen längs efter dessas midt.

102. **MENYANTHES** Lin. Vattenklöfver, Bläcken.

- 1 *M. trifoliata* L. bladen 3fingrade, med bredt aflånga—omv. äggr. småbl. 2, 6. — *β paradoxa*: kronan delad till hasen, söga hårig. Fig. Sv.B.22. Fl.D.541.
- Kärr, a. Sk.—Lpl. — *N.* — *β Sk. Lund. Smål.* Kalmar, Tegelbrukskärren; Almås i Femsjö sn. *ÖG.* Vadstena i Ladugårdsängen.) *Blrna i klase, med inuti hvit, utv. röd krona.*

- 13 Fam. **POLEMONIACEÆ** Juss. Krona och stånd. som föreg. fam. Fröhus 3skalligt, 3rummigt, med centrala fröfästen.

103. **POLEMONIUM** Lin. Blågull.

- 1 *P. cæruleum* L. stjelen vanl. mångbladig, nedtill n. glatt, upptill småluden; bladen parbladiga, med lancettlika—ägggrundt lancettl. spetsiga småbl.; blomsaml. mer och mindre tät. 2, 6, 7, h. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.309. Fl.D.255.
- \* *campanulatum* Th. Fr. småbl. färre och glesare; blomsaml. enklare, mer fåblomm.; kronan klocklik, med något spetsadeflikar. Fig. H.N.f.16, n:o 17.
- Äng. särd. i fjelltr. r. (Lpl.—Herjed. Ängml. och Medelp. Helsl. Mällungsstuga i; Alfta sn: Wistr. Nedåt mell. och söd. Sv. ofta odlad och förvildad. — *N. Vest-Finm.* — Dovre. *Christiania.* — \* *Torn. Lpm.* nedanför Kaissepakte; Karesuando. *VB.* nor. del. vid Huukis gästgg.; Muoniovaara i Pajala: C. P. Läst. — *N. Ost-Finm.* Varanger, vid Vesterelfven och Carlebotten; Tanen, ofvan Seida och vid Birkelund. *Vest-Finm.* vid Alten-elv; Karasjok etc.: Norman.) *Älnshög, upprät. Underarten har ullhåriga blomskåft och foder, samt klotrunda ståndknappar.*

\*2 *P. pulchellum* Bunge: stielken n. bladlös, upptill glandelhårig; bladen parbladiga, med aflångt elliptiska—rundade, trubbad småbl.; blomsaml. gles. 24 6, 7, b. blr. Fig.

Strandäng. r. (N. Ost-Finnm. Bugönäs i Syd-Varanger, upptäckt af Norm.) Knappt kvartershög, vanl. med flere stielkar från rotstoecken; fodret klibbludet; kronflik. rundadt trubbiga.

#### 104. DIAPENSIA Ltn. Polört.

1 *D. lapponica* L. tufvig, bladen läderartade, tunglika trubbiga; blrna ensamma på uppräta skaft. 24 6, 7, hv. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.1,f.1. Wg.Fl.L.t.9. Sv.B.517. Fl.D.47. H.N.f.5, n:o 3.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) Låg, alltid grönskande växt, med 1—2 tum höga blomskaft.

### 3 KLASSEN

## TUBIFLORÆ.

- 14 Fam. **OLEINEÆ** *Link.* Krona regelbunden, 4flikig, stundom felande. Stånd. 2.  
Frukt. 2rummig, med 1—2 hängande frön i hvarje rum.

#### 105. SYRINGA *Lin.* Syrén.

- †1 *S. vulgaris* *L.* bladen hjertlika spetsade.  $\frac{1}{2}$  5, 6, gred. ell. hv. blr. Fig. Sturm. 1 h. Reich.t.1073,f.1.  
Odl. st. (Allmän i trädgårdar samt här och der förvildad.) *En par samnar hög buske med väluktande blr i rika spiror.*

#### 106. LIGUSTRUM *Lin.* Liguster.

- 1 *L. vulgare* *L.* bladen bredt lancettlika glatta; blrna i tät, äggformig spira.  $\frac{1}{2}$  6, hv. blr. Fig. Sv.B.415. Fl.D.1141.  
Stenback. r. (*Boh.* på Oroust; Qville sn, på Hvalö och Hjertö; Tanum sn, vid Sör Edsvik, Svinälandet och Öarne Otterö, Lindö, Musö, Väderöarne; Koster; på fastlandet vid Tanumsnäs: Lem. Förvildad i *Hall.* vid Sperlingsholm och vid Hasslöf: Theor. *VG.* på Kinnekulle m. fl. st. — *N.* på Öar i Christianiafjorden, t. ex. Krageröen vid Fredriksstad, Hvalöarne på Spjærland m. fl. Langöen vid Holmestrand.)  
3—4 alnar hög buske med svarta bär.

#### 107. FRAXINUS *Lin.* Ask.

- 1 *F. excelsior* *L.* bladen parbladiga, med lancettlika sågade småblad; blomhylla 0; vingfrukten i spetsen snedt urnupen.  $\frac{1}{2}$  5, viol. blr. Fig. Sv.B.175. Fl.D.969.  
Skog. och hagar. (*Sk.—Helsl.* och *Dal.* *Verm.* *Boh.* *Öl.* *Gottl.* — *N.* till Trondhj.)  
*Högt träd med motsatta qvistar, svarta knoppar och blr på bar qvist.*

- 15 Fam. **VERBENACEÆ** *Juss.* Krona oregelbunden. Stånd. 4, af hvilka 2 längre.  
Frukt i börj. 4rummig, 4fröig; slutl. delande sig i 4 smånötter.

#### 108. VERBENA *Lin.* Jernört.

- 1 *V. officinalis* *L.* stjelken upprät; bladen flikigt sågade med större flikar vid basen; axen mycket smala.  $\frac{1}{2}$  8, 9, r. blr. Fig. Sv.B.182. Fl.D.628. H.N.f.1, n:o 19.  
Vid gård. r. (*Sk.* öst. del. t. ex. Åsum; Raflunda; Köpinge; tillfällig i vest. delen enl. Aresch. *Smål.* Kalmar, vid Jordbron 1848, enl. Vesterl. *Hall.* Skottorp, i åkr.: Theor.)

- 16 Fam. **ASOLEPIADEÆ Juss.** Krona regelbund., med i knoppen vridna slikar. Stånd. 5, med frömjölet hophängande i vaxlika massor. Märken 2. Frukt af 2 fröhylsor.

109. *CYNANCHUM* R. Br. Tulkört.

- 1 *C. Vincetoxicum* Br. stjelken upprät; bladen äggrunda ell. något hjertlika, helbräddade spetsade, med kanterna nedtill och skaften finludna; blomkronan glatt, med äggrunda slikar. 2½ 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.249. Fl.D.849.

Klipp. stenback. (Sk.—Uppl. och Vestml. Målartrakten. Blott i östra prov. Öl. Gottl. — N. södra del.) *Blrna bilda flocklika knippen i de öfre bladvecken. — Asclepias L. Vincetoxicum officinale* Mönch.

- 17 Fam. **GENTIANEÆ Juss.** Krona som föreg. fam. Fröhus af 2 skal, med fröfästen längs efter kanterna, hvilka stundom kunna så invikas, att fröh. blir 2-rummigt.

110. *GENTIANA* Lin. Stållört.

† Kronorna med hart, hårlöst svalg.

\* Ståndarknapparne hopklibbade.

- \*1 *G. purpurea* L. bladen *ovalt* lancettlika; blrna i toppen gytttrade, i bladvecken motsatta; blomfodr. *hölsterlikt*; kronan 5—6klufven, med omv. äggrunda—rundade, *trubbiga* slikar och små *tvärhuggna* mellanligg. tänder. 2½ 7, 8. Fig. Fl.D.50. Reich. t.1054, f.2. H.N.f.13, n:o 35.

Fjellv. (Norges vestliga fjell, mest mellan Hecke-fjell, Tind och Romsdalen.) *Fotshög, med stora bågartlika, utvändigt gulaktiga, inuti purpurroda blommor. — G. lutea L.Fl.Su.*

- 2 *G. Pneumonanthe* L. bladen *jembreda*, trubbiga; en blomma i toppen, de öfr. i bladvecken; kron. vidgad bågartlik, 5klufven, med äggrunda, n. helbräddade, *kortspetsiga* slikar och korta *triangulära* mellanligg. tänder. 2½ 7, 8, b. blr. Fig. Sv.B.651. Fl.D. 269. H.N.f.14, n:o 15.

Ang. och betesm. (Blek. Mörrum; Valje och Siretorp enl. Goss. Sk.—Boh. Smål. mot öst. till Vexjö och Vrigstad; Scheutz. VG. Verml. — Söd. N.) 6—12 tum hög; *blrna 1—1½ tum långa, de flesta skaftade.*

\*\* Ståndarknapparne fria.

- \*3 *G. serrata* Gunn. bladen *jembreda*—smalt lancettlika; blomskäften enblommiga, *flere gånger längre än* blomman; kron. smalt *bågartlik*, 4- stund. 5klufven, med *aflånga* småsågade slikar, *utan* mellanligg. tänder. ☉ 7, 8, b. blr. — β *detonsa*: kronan med 4, naggade slikar. Fig. Fl.D.317. Act.Hafn.10,t.1,f.3. Gunn.Fl.N.2,t.2,f.3—5. H.N. f.8, n:o 9.

Hafsstr. vid fjellen, r. (N. Finnm. och Nordl. ned till Salten, såsom vid Jarfjorden och Berlevaag enl. Th. Fr.; Porsanger, vid Børselvs mynning: Norm.; Hammerfest; Boseskop; Talvig; Tromsøe; Skjærstad etc.) *Blrna ofta öfver en tum långa, 2-ne foderslikar längre och smalare än de öfriga. — G. ciliata Fl. N. β G. detonsa Rottb.*

- \*4 *G. involucrata* Rottb. bladen *äggrunda*; toppblrna meränd. *hufvudlikt* gytttrade inom *bladlika skärm*; kron. *bågartlik*, med n. *lancettlika uddspetsiga* slikar, *utan* mellanligg. tänder. ☉ 7, 8, hv. ell. blåakt. blr. — β *umbellata*: blrna skaftade, jemte skärmbladen blåaktiga. Fig. Fl.D.344. H.N.f.5, n:o 10.

Hafsstr. r. (N. Finnm. och Nordl. Trondhj. st. Otteroe.) *Stjelken 4kantig, 3—6 tum hög, med oftast 5klufna kronor. — G. aurea L. G. quinquesolia Fl.D. β G. umbellata MB.*

- 5 *G. nivalis* L. bladen *äggrunda*; blrna slutl. skaftade; fodret *hvasstkantigt*; kron. *trattlik*, 5klufven, med *äggrunda trubbade* slikar och vanl. *2klufna* mellanligg. små-tänder. ½ 6, 7, b. blr. Fig. Sv.B.725. Fl.D.17. H.N.f.9, n:o 19.



Fjellv. (Lpl.—Herjed. Dal. vid Tenninge masugn. Ångml. Medelp. Helsl. mångenst. i nor. delen. — N.) 2—4 tum hög.

†† Kronorna med hårfransade fjäll i svalget: *Eurythalia* Ren.

- 6 *G. tenella* Rotb. bladen äggrunda; blomskäften *ganska långa*, n. bladlösa; fodret deladt i 4, n. *äggrunda föga olikformiga* flikar; kron. 4klufven. ) 7, 8, b. blr. Fig. Sv.B.726. Fl.D.318. H.N.f.14, n:o 16.

Högre fjellv. r. (Torn. Lpm. vid nordvestra stranden af Torn. Träsk. Lul. Lpm. Kaissats och Jälle vid Wirihåure; Sårjasjaure och Kallovarats nära Rovejaure: H. Widm. Pit. Lpm. Akarisfjell; Sulitälma. Mettispakte: Widm. Herjed. Stora Midtåklappen; Ljusnedals bruk. — N. Dovre; Röråstrakten. Nordl. ofvan Herkvisgsvand vid Ofotenfjord. Finnm. mellan Lyngen och Varangerfjord.) 1—3 tum hög, grenad ned vid roten, stund. enkel och enblommig. — *G. Kænigii* Gunn. *G. glacialis* Vill.

- 7 *G. campestris* L. bladen äggrundt aflånga; fodret *olikformigt* 4deladt, med 2. mycket större, ovala flikar; kron. 4klufven. ) 7, 8, b. sällan hv. blr. Fig. Sv.B.278. Fl.D.367. H.N.f.8, n:o 10; f.9 [var.].

Äng. betesm. (Sk.—Jemtl. och Ångml. — N. till Finnm.: Norm.) Ofta mycket grenig och blomrik, stundom liten och enkel, afven till bladen omväxlande i likhet med *G. Amarella*. De större foderflikarne innesluta de mindre.

- 8 *G. Amarella* L. rotbl. spadlika; stjelklbl. äggrunda—aflånga ell. tunglika; fodret n. *likformigt klufvet i 5 ell. 4, smalt lancettlika* trubbad flikar af kronpipens längd; kron. 5- ell. 4klufven. ) 6—10, b. blr. Fig. Fl.D.328. H.N.f.6, n:r 15.

\* *lingulata* Ag. stjelklbl. aflånga—jemnbredt tunglika trubbiga. Fig. H.N.f.6, n:o 14.

Sidlånda äng. (Sk.—Helsl. Dal. och Verml. Öl. Gottl. — N. till Nordl.: Norm. — \*Sk.—söd. Lpm. — N.) Har mindre blr än föreg. men ofta högre stjelk; foderflikarne något olikstora; bladen hos hufvudformen från bred bas spetsade, hos \* från smalare bas bredare mot midten eller spetsen.

#### 111. ERYTHRÆA Pers. Arun.

- 1 *E. litoralis* Fr. stjelken trubbadt 4kantig; bladen lancettlikt jemnbreda; blrna kort skaftade i klynnedeladt knippe; blomfodr. n. af kronpipens längd, med 2 skärmb. vid basen. ☉ 24 [Fr.] 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.579, f.1. Fl.D.1814. H.N.f.5, n:o 9.

Hafsstr. (Sk.—Gestr. Medelp. Tynderö enl. Leml. Boh. Öl. Gottl. — N. Christiania, Holmestrand etc.) Blrna n. utan enskilda skaft; bladen stund. tunglika. Roten hos denna och följ. 1—flerstjelktig, med enkla 3—8 tum höga stjelkar. — *E. angustifolia* Wg. *E. linariifolia* Pers. — Denna art skiljes icke af Linné från följ.

- 2 *E. Centaurium* Pers. stjelken hvass 4kantig; bladen ovala; blrna kort skaftade i jemnhöga skaftade knippen; blomfodret n. dubbelt kortare än kronpipen, med 2 skärmb. vid basen. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.219. Fl.D.617. H.N.f.2, n:o 31.

Äng. nära kusten, r. (Sk.—ÖG. Södm. Utåcker i Råhy enl. C. Ind. Hall. Öl. Gottl.) 4—12 tum hög, med smalare och spetsigare kronflikar än föreg. Fig. i Sv.B. liknar denna art till örten, men föreg. till blomman. — *Gentiana Centaurium* L.

- 3 *E. pulchella* Fr. stjelken hvasskantig, enkel enblommig, eller till hela längden klynnegrenad, med långt skaftade blr; bladen äggrunda; fodret kortare än kronpipen, utan skärmb. vid basen. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.579, f.2 och 3. Vet.Akad.H.1783, t.3, f.8,9. Fl.D.1637. H.N.f.3, n:o 16.

Hafsstr., afven i åkrar. (Sk.—Gestr. på Orarne. Boh. Öl. Gottl. — N. södra delen.) Ofta knappt en tum hög; åkerformen 5—8 tum hög, grenig. — *E. angustifolia* ? *tenuiflora* Wg. *Gentiana pulchella* Sw.

- 18 Fam. SOLANACEÆ Juss. Krona regelbunden, i knoppen veckad. Stånd 5. Frukt: fröhus ell. bär med 2 rum, många frön, fästade på skiljeväggen.

#### 112. LYCIUM Lin. Røcktørne.

- †1 *L. barbarum* L. stammen buskartad med släka hängande grenar; bladen lancettlika,

dels skiftevisa dels knippevisa; blrna enstaka ell. knippevisa.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. blr. Fig. Reich.t.1635.f.1.

Odll. st. (Sk. allmänt odlad och förvildad i sydv. delen; Kåseberga, i sandbranterna; Christianstad: F. Aresch. Likaledes förvild. vid Norrköping, Nyköping, Stockh. Visby m. fl. st.) Bären aflånga, röda ell. gula, mycket längre än det hos denna art alltid 2lappiga fodret.

### 113. *SOLANUM* Lin. Trollbär.

† Stammen buskartad, slak ell. n. slingrande.

1 *S. Dulcamara* L. bladen hjertlikt äggrunda, de öfre meränd. spjutlika af ett par likar vid basen; blomknippena klynnedelade, fästade på stjelkens sida, midtemot bladen.  $\frac{1}{2}$  7, 8, viol. blr. Fig. Sv.B.20. Fl.D.607.

Stränd. och fukt. st. vid stenrös. (Sk.—Medelp. Dal. Boh. Öl. Goutl. — N. till Trondhj.: Værdalsören.) Bladen sakna stundom spjuflikarne. Bären något aflånga röda. Vanl. glatt, någon gång, i synnerhet på sandiga hafsstr., småluden.

†† Stammen örtartad.

2 *S. nigrum* L. stjelken kantig, med n. släta kanter; bladen äggrunda, mer ell. mindre tandade ell. bugtbräddade. n. glatta; blrna flockvisa, med det gemensamma skaftet fästadt nedom bladen; blomkronan dubb. längre än fodret; bären svarta ell. grön-gula.  $\odot$  7, 8, hv. ell. något viol. blr. —  $\beta$  *melanocerasum*: stjelken tjock med skarpa upphöjda ränder; bären svarta, stora som små kersbär. Fig. Sv.B.61. Fl.D.460.

\* *humile* Bernh. bären grön-gula. Fig. Fl.D.2345. Reich.t.1632.f.2. H.N.f.9, n:o 14.

Odll. st. vid byar etc. (Sk.—Uppl. Dal. och Verml. Boh. Grebbestad. Öl. Goutl. — N. — \* Sk. Smål. Kalmar. Stockh. Uppl. Sänga sn vid Säby.)

3 *S. miniatum* W. stj. jemte blomskäften mycket kantig, med kanterna skarpa af talrika vårtlika knölar; bladen äggrunda—n. rutformiga, groftandade. n. glatta; bären högröda; för öfr. som föreg.  $\odot$  7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1927. Reich.t.1632,f.3,4. H.N.f.15, n:o 21.

Odll. st. stränd. r. (Sk. Helsingborg; Lund; Trolleberg; Bunkeflo sn; Höfudala; Tydinge i Broby; Strömhult i Örkened m. fl. st. Smål. Kalmar och Värnanäs enl. Vesterl. och Ekstr. Fordom äfven i Hall. vid torpet Laxviken i Eldsberga sn, på hafsstranden.) Skild från föreg. hufvudsakl. genom stjelkens beskaffenhet, bärems färg och sin starka moschusluk.

4 *S. villosum* Lam. stj. knappt kantig, jemte blomskäften och de rutformigt äggrunda groftandade bladen ulligt luden; blrna som föreg., med kronan flere gr. längre än fodret; bären gula.  $\odot$  7, 8, hv. blr. Fig. Dill. Hort. Eltham.t.274,f.353. Reich.t.1632,f.1. H.N.f.15, n:o 22.

Odll. st., gator, r. (Sk. Lund; Helsingborg; Edenryd: F. Aresch. Trol. Nerestädes.) Utmärkt från de bägge föreg. genom sin hårlighet, bladens blekare färg, de större blommorna och bärems färg.

### 114. *HYOSCYAMUS* Lin. Bolmört.

1 *H. niger* L. bladen äggrundt aflånga, stjelkomfattande, vinkligt bugtiga ell.flikiga; blrna n. oskaftade.  $\odot$  7, 8. —  $\beta$  *agrestis*: mindre och enårig, med äggrunda tandade, söga omfatt. blad, de öfversta n. hela. Fig. Sv.B.211. Fl.D.1452.  $\beta$  H.N.f.8, n:o 8.

Byar, a. (Sk.—VB. Jemt. Näs och Hamnerdal. — N. till Trondhj.) Stor, klibbluden, illaluktande; blrna smuts-gula med svartblå botten och åderndt, säll. enfärgadt gula ell. hvitaktiga.

### 115. *DATURA* Lin. Spikklubba.

1 *D. Stramonium* L. bladen äggrunda, groft bugtandade, glatta; fröhuset upprätt, grofttaggigt.  $\odot$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.43. Fl.D.436.

Gator, hafstr. r. (Sk. vid vest. kusten t. ex. Trelleborg; Malmö; Höganäs; Lomma; samt i inre del. vid Sölde; Andrarum; Broby m. fl. st. Blek. Carlshamn; Vemmö; Gosselm. — Stockh. Uppl. Tierp: Arn. Vestml. Köping. Ner. Örebro. Hall.

Falkenberg; flerest. i söd. delen: Theor. Gottl. — N. Christiania.) *Har mycket stora blr och fröhus.*

- 19 Fam. **PERSONATÆ** Lin. Krona med olikformigt flikadt bräm, 2 ell. 4, sällan 5 stånd. Frukt 2-, säll. 1-rummigt fröhus, med fröfästen i förra fallet på skiljeväggen, i det sedn. på sidoväggarna.

- 1 Flokken **Verbascæ** Bartl. Ståndarknappar enrummiga. Fruktämne 2rummigt.

116. **VERBASCUM** Lin. Kungsljus.

† Bladen [åtm. de öfre] nedlöpande, ulliga.

\* Tre ståndarsträng. hvitludna, 2 n. glatta.

- 1 *V. phlomoides* L. bladen äggrunda smalspetsade naggade, de nedersta skaftade, med något hjertlik bas, de öfre omfattande, *något nedlöpande* på den trinda stjelken; blomgytt. i *glet* ax; de 2 glatta ståndsträngarna med *mycket större knappar* än de öfriga. » 7, 8, g. blr. Fig. Reich.t.1639—41.

Torra st. r. (Sk. vid Malmö och Lund: Aresch. *Blek.* Carlshamn; Sölvitsborg; L. Boråkra: Gosselm. *Södml.* Hanö i Bälunge sn enl. C. Ind. *Uppl.* vid vägen mell. Hjelmsta och Lindberga gästg.) *Har stora sköna blr, omkring 4 samgyttade. Som bladen äro föga nedlöpande, blir stjelken hos denna art trind.*

- 2 *V. thapsiforme* Schrad. bladen aflånga—lancettlika, naggade, *långt* nedlöpande; blrna i *tätt* ax; kronflik. *omvändt äggrunda*; ståndarknapp. *som hos föreg.* » 7, 8, g. blr. — *β cuspidatum*: mycket ullig; öfversta bladen och blomskärmen tvärt afsmalnande i en lång udd. Fig. Reich.t.1638. H.N.f.4, n:o 19; *β* 20. Fl.D.1810.

Torra st. r. (Sk. Karsholm; Vegholm enl. F. Aresch.; Österlöfs kyrka: Scheutz. *Smål.* Kalmar, vid slottet. *Stockh.* Vermdön. *Öl.* Ottenby, Resmo etc. — N. Christiania. — *β* Sk. Karsholm: Aresch. *Öl.*) *Lägre än följ., som den mest liknar, men med mycket större och plattare blr. — V. cuspid. Fl.D.*

- 3 *V. Thapsus* L. bladen *som hos föreg.*; blrna i *tätt* ax; kronflikarna *aflånga*; ståndarknapparna *n. lika stora*. » 7, 8, g. blr. — *β bracteatum*: mindre tjockt luden; skärmbladen mycket längre än blomgyttringarna. Fig. Sv.B.79. Fl.D.631. H.N. f.16, n:o 20.

Torra st. a. (Sk.—Ångml. och Jeml. — N. — *β* Stockholm vid Ålkistan.) *2—3 alnar hög; stjelken, likasom hos föreg., kantig af de nedlöpande, gulaktigt ulliga bladen. — V. Schraderi Koch. β V. bracteatum Ag.*

\*\* Alla ståndarsträng. violettudna (Hybrida former).

- × *V. nigro-thapsiforme* Fr. bladen *långt nedlöpande*; blomgytt. *låta*; stånd. med likstora knappar. » 8, 9, g. blr. Fig. Fl.D.1811, enl. Fr. H.N.f.9, n:o 13.A.

Torra st. r. (*Öl.* vid Thorslunda k:a.) *Örten af V. thapsiforme; blr af V. nigrum, men större. — V. seminigrum Fr.*

- × *V. thapso-nigrum* Schied. bladen *föga nedlöpande* på den något kantiga stjelken; blomgytt. *glesa*; stånd som hos föreg. » 8, 9, g. blr. Fig. H.N.f.9, n:o 13.B.

Torra st. r. (Sk. *Smål.* Kalmar, vid slottet: Scheutz. — *Uppl.* Nockebybro nära Stockholm. *Vestml.* Malma kyrkogård. *VG.* Kinnekulle, vid Martorp. — N. Christianid.) *Till blomningen lik V. nigrum, till örten V. Thapsus. — V. collinum Schrad. Hn.Ed.4.*

†† Bladen hvarken nedlöpande ell. ulliga.

- 4 *V. nigrum* L. bladen äggrundt aflånga, *under grålundna*, de nedre skaftade med *hjärtlik* bas, de öfre oskaftade; blomgytt. *glesa*; *alla* strängarna *violettudna med likstora knappar*. » 7, 8, g. blr. — *β amplexens*: axet med långa, n. omfattande skärm; alla bladen, utom de nedersta, föga skaftade. — *γ glabrescens*: stjelkbladen tunna, föga ludna, smalspetsade, skaftade. — *δ cuspidatum* Nordst. öfv. bl. och blomskärmen tvärt afsmaln. i en lång udd. Fig. Sv.B.590. Fl.D.1088.

Torra st. (Sk.—Medelp. Dal. Husby sn. Vestm. Ner. Verm. Dalsl. Boh. i Tanum sn. Öl. Gottl. — N. —  $\beta$  Öl. —  $\gamma$  Smål. Vexjö: Scheutz. Dalsl. Vedbyholm i Holm. — N. Hjelmeland. —  $\delta$  VG. Kinnekulle.) *Stjelken trind, med mindre tätt och ludet ax än de föreg. arterna. Funnen af Dr Ax. Lund med hvitludna ståndarsträngar vid Eds gamla kyrka i Smål.*

5 V. *Lychnitis* L. blad. äggrundt aflånga spetsiga rundnaggade, under gråhvita af ett pulverlikt ludd; rotbladen med, stjelkl. utan skaft; blomsaml. gles, af tätblommiga grenar; sträng. hvitludna.  $\gamma$  6—8, g. ell. hv. blr. —  $\beta$  album: med hv. blr. Fig. Reich. t.1648.  $\beta$  Fl.D.586.

Vid byar etc. r. (Den gulblommiga finnes förvildad endast i bot. trädgårdar. —  $\beta$  Sk. Kullaberg, Dufeke; i Christianstadstrakten och i Söfde sn [i sedn. tider ej återfunnen: F. Aresch.]. Smål. Vestervik nära Norrlandsäng. Södm. Tullgarn i parken. Stockholm vid Skarpneck. Gottl. vid Visby hamn.)

### 117. SCROPHULARIA Lin. Flenört.

1 S. *nodosa* L. stjelken 4kantig glatt; bladen aflångt hjertlika spetsiga, olikformigt grofsågade, glatta; foderflik. äggrunda; blomkronan öppen.  $\gamma$  7, 8, br. blr. Fig. Sv.B. 315. Fl.D.1167. H.N.f.2, n:o 4.

Skugg. st. och vid vatt. a. (Sk.—Ängml. Dal. Boh. Öl. Gottl. — N. till Nordl.) *Alshög, med stor, stundom glandelhårig blomsaml.; bladens bas bred, n. tvärhuggen.*

+2 S. *vernalis* L. stjelken trubbigt 4kantig, jemte bladskafen mjukluden; bladen hjertlika, groft dubbelsågade, klubbhåriga; foderflik. aflånga; blomkron. tillsluten.  $\gamma$  5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.411.

Stenmur. och odl. st. r. (Sk. Lund i Paradislyckan; Maltesholm; Malmö. Smål. Råsnäs i Ålhem sn, och Rogberga. Stockh. flerstädes; Ulriksdal i gamla murar.) *Växten klubbhårig; yngre med blomknippen i bladvecken, slutt. äfven i toppen.*

2 Flocken *Antirrhineæ*. Ståndarknapp. 2rummiga, utan bihang vid basen. Fröh. 2rummigt.

### 118. DIGITALIS Lin. Fingerhatt.

1 D. *purpurea* L. bladen aflånga trubbigt naggade, under mjukt gråludna; foderbladen äggrunda spetsiga; kronan utvändigt glatt, med mycket trubbig eller intryckt öfre läpp.  $\gamma$  6, 7, r. blr. Fig. Fl.D.74. H.N.f.10, n:o 18.

Stenbundna st. r. (Boh. Qville sn, ymn. i Utgård, Kindlyckes, Snibes och Rönnängens skogar, spars. i Bodelands; vid berget Fontin nära Kongelf. Hall. på klippor vid Stensjö i Efra sn; Hallandsås. förvildad: Théor. Sk. förvildad enl. F. Aresch. — N. icke sällsynt i Christiansands och Bergens stift upp till Romsdalen, vid stenar, vägar etc.: Trondhj. på Strand vid Storvig.) *Alshög ell. mera, med 1½ tum långa, inuti purpurstänkta, hängande blr.*

### 119. ANTIRRHINUM Lin. Skalleblomma.

1 A. *Orontium* L. stj. nedtill långhårig, upptill glandelhårig; bladen lancettlika; blirna kortskaftade, i öfre bladvecken; fodret djupt deladt, med ryggflikarne längre än kronan, mjukhåriga.  $\odot$  7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.941.

Odl. st. åkr. r. (Sk. mell. Trelleborg och Ystad, t. ex. vid Snårestad; Böringe mell. Vidarp och Fortuna; Vest. Ålstad; Ifö; Oppmanna etc. Blek. Carlskrona, Kungshall. Öl. Gottl. Här och der förvildad upp till Stockholm.) *Quartershög, med omkr. trefjederdels tum långa blr. — Orontium arvense Pers.*

### 120. LINARIA Mill. Sporreblomma.

+ Glatta örter, med korta blomskaft [icke längre än fodret].

1 L. *vulgaris* Mill. stjelken upprätt; alla bladen strödda, n. jemnbreda; blirna i tätt klase; sporrer mycket längre än fodret.  $\gamma$  7, g. blr. —  $\beta$  *Peloria*: blirna mer eller mindre regelbundna med 2—5 sporrar. Fig. Sv.B.196. Fl.D.982.  $\beta$  Linn. Diss. de Peloria. Torra st. (Sk.—Jeml. och Ängml. VB. Björkfors och Sangis. — N. till Nordl.) *Stjelken vanl. enkel; blirna tumslånga. — Antirrhinum Linaria L. —  $\beta$  är en tillfälligt afvikelse, icke egentlig afart, emedan oftast vanliga blr finnas i samma ax som de flersporriga.*

- †2 *L. striata* DC. stj. *uppstigande*; bladen lancettlikt jemnbreda, de nedre *kranssittande*; blrna i *gles* klase; kronans öfre läpp djupt urnupen blåstrimmig; sporren *af fodrets längd ell. kortare*. 24 7. Fig. H.N.f.11, n:o 20.

Torra st. ballastpl. r. (Södml. Bondeby i Stigtomta sn: C. Ind. *Uppsala*, Slottsbackern. *Gefte* på Nya Brobänken. *Medelp.* Sundsvall: Ind. Ner. Kihls kyrkog. etc. *VG.* Göteborg: Leml. Säkertligen öfverallt förvildad. — N. Mandal etc. på ballast.) *Blå-aktig, oftast grenig vdxl, med de öfre bladen strödda; blrna hvita ell. blåaktiga.* — *Antirrh. repens* L.

- †3 *L. supina* Desf. stj. *nedligg. ell. uppstigande*; bl. *small jemnbreda*, de nedre *kranssittande*; blrna i *kort och tät*, glandelhårig klase; sporren *mycket längre* än fodret. 24 7. Fig. Reich.t.1681.f.5. H.N.f.16, n:o 21.

Tor. sand. st., ballastpl. r. (Göteborg, på Lindholmen, sedan 10 år ymnig: Leml. På ballast vid *Gefte* och *Sundsvall*.) *Knappt quartershög, delad vid rothalsen i enkla grenar; de öfre bladen strödda; blrna stora, gula, med violettstrimmig sporre.* — *Antirrh. L.*

†† Håriga örter, med långa blomskaft [dubb.—flere gr längre än fodret].

- 4 *L. minor* Mill. *hela örten klubbhårig*; stj. n. upprät; bladen *small lancettlika*, de nedre motsatta, de öfre skiftevisa; blrna i *bladvecken* ell. i *glesa*, bladiga klasar; sporren *kortare* än foderlikarne. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.502. H.N.f.11, n:o 21.

Åkr. mur. etc. (Sk.—Hels. Iggesund. *Medelp.* Sundsvall. *Ängml.* Hernösand: Arn. *Jeml.* Liths sn. *Vestml.* Ner. Kägelholm. *Dalsl.* Baldersnäs. *Öl. Gottl.* — N. Christiania, Kongsvinger etc.) *Vanl. grenig, med små, blekt rödviol. stund. hvitakt. blr.* — *Antirrh. minus* L.

- 5 *L. Elatine* Desf. stj. *nedliggande, långhårig*; bladen skiftevisa, dels *aggrunda*, dels *spjullika*; blrna i *bladvecken* med glatt skaft; sporren *längre* än foderlik. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.711. Fl.D.426. H.N.f.1, n:o 20.

Åkrar, r. (Sk. vestra delen, från Landskrona till Trelleborg enl. F. Aresch. *Gottl.* vid Göstafs i Frölj och Stenhuse i Sanda sn.) *Blrna långskaftade, små, gula med viol. öfre läpp; bladen hårbräddade.* — *Antirrh. L.*

## 121. VERONICA Lin. Ärenpris.

† Tätblommiga ax i toppen.

- 1 *V. longifolia* L. bladen 3, 4 i *krans*, säll. motsatta, från bredare bas *lancettlika*, spetsade, *ojmnt ell.; dubb. sågade till spetsen*; blomfodrets flikar tydligt *oliklänga spetsiga*. 24 7, 8, b. blr. *Bland denna arts talrika former, hvaraf en del varit ansedda som egna arter, äro följ. de utmärktaste:*

\* *Linnei*: bladen med tvärhuggen ell. hjertlik bred bas, grofsågade spetsade. Fig. Fl. D.374. Schrad. Ver.t.2.f.1.

\* *vulgaris*: bladen med äggrund bas jemnt spetsade grofsågade. Fig. H.N.f.3, n:o 12.

\* *serrulata*: blad. från äggr. ell. tvär bas långspetsade, tät sågade med korta och hvassa tänder.

\* *maritima* L. blad som föreg. med långa spetsade mycket olikstora tänder. Fig. H. N.f.4, n:o 21.

\* *media* Schrad. blad som föreg. kortspetsade, med något grofva och spetsiga, men korta sågtänder. Fig. Sv.B.560. — *V. arguta* Bl.N.Fl.

Fukt st. vid berg, stränd. (Sk.—Upl. *Ängml.* Granninge bruk. *VB.* upp efter Torn., Sangis- och Kalix-elfvar. *Vestml.* Ner. *Verm.* *Dalsl.* *VG.* Boh. Uddevalla; vid Strömsån, och Qvistrumsån: Leml. — N. Aggershus stift. Finnm. — *V. serrul.* Hall. — *V. marit.* på hafsstr. *Nesl.* Tromtö enl. Gosselm. *ÖG.*—*VB.* — *V. media*: Hall. — N. Christiania vid Næsoddtangen.) *Mellan de här anförda formerna finnas många mellanliggande, likasom andra, hvilka öfvergå i följ. art.*

- 2 *V. spicata* L. bladen *motsatta*, mycket säll. i *krans*, lancettlika—n. *aggrunda*, med vanl. korta och *föga olikformiga* sågtänder, *mot spetsen helbräddade*; foderlik. n. *liklänga trubbiga*. 24 6, 7, b. blr. — *β orchidea*: kronans flikar smala och vridna. Fig. Schlecht. D.Fl.4 B. 2 häft. *Följ. former hafva af en del förf. blifvit framställda som egna arter:*

\* *hybrida* L. mycket gröfre; blad. äggrundt aflånga med rundad bas och trubbig helbrädd. spets, groft och trubbigt naggsågade. Fig. Fl.D.52. E.B.673.

- \* *neglecta* Bl. bladen från bredare bas lancettlika spetsiga, sågade n. till spetsen, med låta hvasa sågtänder.
- \* *australis* Schrad. bl. från bred n. tvärhuggen bas utdraget äggrunda spetsiga med grofva spetsiga sågtänder. Fig. Schrad. Ver. 1.2.f.3.
- Torra st. etc. (Sk.—Uppl. Ner. vid Hardemo kyrka. Dalsl. Dalbobergen enl. Larsson. Hall. Öl. Goult. — N. — Underarterna i södra Sv. särdeles Hall. — N. i södra delen af Aggershus st.) Var. i hög grad, från mer och mindre hårig till n. glänsande glatt: var. nitens, samt med m. o. m. trubbiga ända till smalspetsiga blad: var. *acutifolia*. \* *hybr.* öfvergår utan gräns i *hufvudarten*.

†† Blomklase i toppen.

- 3 *V. serpyllifolia* L. bladen äggrunda—aflånga trubbiga, fint naggade glatta; blomskäften kortare än skärmbll.; fodret n. glatt; fröhuset bredt 2knöligt, urnupet, af fodrets och stiftets längd. 2. 5—7, blåstrimm. blr. — *β borealis* [Læst.]: bladen mer rundade; blrna n. rent blå. Fig. Fl.D.492.
- Äng. a. (Sk.—VB. och Lpl. — N. till Ost-Finnm. — *β* i högre fjelltrakter.) Fröhusen i kanten håriga, bredare än längden, slutt. i utdragen klase.
- 4 *V. alpina* L. bladen elliptiska ell. ovala, glest naggade ell. helbrädd.; blomskäften kortare än skärmblladen; foderflikarne hårbräddade; kronan klocklik; fröh. omv. äggrundt, tvärhugget, af fodrets längd, längre än stiftet. 2. 7, 8, blå blr. — *β lasiocarpa*: fröhuset hårigt. Fig. L.Fl.L. 1.9.f.4. Sv.B.721. Fl.D.16. H.N.f.12, n:o 42.
- Fjellv. a. (Lpl.—Herjed. — N. Ost-Finnm. till Gousta fjell i söd. delen.) Fröh.: längd större än bredden. Örten svartnar vid torkning. — *β V. alp. var. australis* Wg.
- 5 *V. saxatilis* L. d. yng. bladen tunglika—omv. äggrunda; klasen fåblommig; blomskäft. längre än skärmbll.; foderfl. glatta; kronan plattad; fröh. äggrundt aflångt, i spetsen afrundadt, betyd. längre än fodret, föga längre än stiftet. 2. 7, b. blr. Fig. Sv.B.347. Fl.D.342. H.N.f.12, n:o 41.
- Fjellklipp. r. (Lpl.—Herjed. — N. Finn. — Christiansands st.) Knappt fingerhög, risaktig växt, med n. läderartade blad, stora och vackra blr. — *V. fruticulosa* Fl.D.

(*V. arvensis, verna.*)

††† Blomklasar från bladvecken.

\* Bladen starkt sågade, jemte stielken håriga.

- 6 *V. officinalis* L. stielken nedliggande, småluden; bladen kort skaftade, omv. äggrunda ell. ovala, lått finsågade; blomklasarne låta axlika upprätta, af n. oskaftade blr; fröh. omv. triangelformigt, föga urnupet. 2. 5, 6, b. blr. — *β glabrata* Frst. stj. hårig på två sidor; bl. glatta, hårbräddade. Fig. Sv.B.159. Fl.D.248.
- Back. a. (Sk.—Lud. Lpm. och VB. Piteå. — N. till Ost-Finnm. — *β Ängml.* i Fjellsjö och Nora m. fl. s.nr.)
- 7 *V. Chamædrys* L. stielken uppstigande, på 2:ne sidor ullhårig; bladen n. oskaftade, äggrunda ell. något hjertlika, grofsågade, ojemna; blrna på utdragna skaft i glesa klassar; foderflikarne lancettlika; fröh. som hos föreg. 2. 5, 6. Fig. Sv.B.239. Fl.D.448.
- Äng. skog. a. (Sk.—VB. Jemt. — N. till Finn.) Stora täcka himmelsblå blr med hvita ståndare; de nedre bladen stund. kort skaftade. Var., ehuru sällsynt, med öfverallt hårig stielk, och 3 till 4 ståndare.
- 8 *V. montana* L. stielken nedliggande, öfverallt likformigt hårig; bladen tunna, utdraget skaftade, äggrunda grofsågade; blr som föreg. med äggrunda foderflikar; fröh. rundadt njurlikt, platt, i kanten tandadt. 2. 5, 6, b. blr. Fig. Fl.D.1201. H.N.f.2, n:o 29.
- Bokskog. r. (Sk. Krageholm; Billinge och Röstänge; Lund i Rosten; vid Ringsjön; Kullaberg etc.) Blrna något mindre och blekare än hos föreg.
- \*\* Bladen vanl. grundt sågade, jemte stj. glatta; fröh. rundt.
- 9 *V. Beccabunga* L. stielken uppstig.; bladen tjocka skaftade äggr.—aflånga trubbiga, grundt naggågade; blrna på utdragna glatta skaft, i glesa klassar. 2. 5—9, b. blr. Fig. Sv.B.127. Fl.D.511.

Källbäck. diken, a. (Sk.—*Jeml.* och *Ångml.* — *N.* till Helgeland.) Var. med n. *runda* och med något *spetsiga*, *stund. helbräddade* blad.

- 10 *V. Anagallis L.* stjelen upprät; bladen något *stjelkomfallande*, *bredt lancettlika-spetsiga*, glest småsågade; blrna på *utstående*, glest *glandelhåriga* skaft, i *mång-*blommiga något *låta* klasar; fröh. cirkelrundt, omärkligt urnupet. ☉ 6, 7, b. ell. rödl. blr. Fig. Fl.D.903. Reich.t.1702,f.1.

Stränd. diken. (Sk. *Smål.* Jönköping enl. Scheutz. ÖG.—*Helsl. Vestml. Ner. Hall. Öl. Goutl.* — *N.* till Rommerige.) Bladen  $\frac{1}{2}$  till 1 tum breda, 2—4 t. långa; *blom-*klasarne mest 2 motsatta, näml. en i hvardera bladvecket. Var. med *spdd stjelk*, små blad och *ensamma* klasar.

\*\*\* Bladen helbrädd. ell. med små glesa, tandlika glandler i kanten.

- 11 *V. scutellata L.* stjelen *slankig*; bladen oskaftade, *jennbredt lancettlika, spetsiga*; blrna på *utsperrade* skaft. i *fåblommiga* och *glesa* klasar; fröh. mera *bredt än långt*, djupt urnupet. 24 5—7, hv. blåstrimm. blr. Fig. Fl.D.209 och 1561.  
Våta st. a. (Sk.—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finnm.: Norm.) Bladen 1—2 tum långa, *stundom mer lancettlika; klasarne mest ensamma, skiftvisa i blad-*vecken. Var. från *glatt till mycket hårig*: var. *villosa*, ell. *glandelhårig*: var. *glandulosa* Nordst.

+++ Blrna ensamma i bladvecken.

\* Blomskäften omärkliga, alltid kortare än fodret.

- 12 *V. arvensis L.* stjelen upprät ell. uppstig.; bladen *äggrunda* med två bas, glest sågade, endast de nedersta med korta skaft; blomskärmen lancettlika. ☉ 4, 5, ljusblå blr. Fig. Fl.D.515.

Torra st. åkr. a. (Sk.—*Ångml.* och *Jeml.* Öl. Goutl. — *N.* till Helgel.) Fröh. *hvasst urnupna*, *hårbräddade*, *slull i azlik samling*.

- 13 *V. verna L.* stjelen och grenar upprätta; bladen 5- ell. *3flikiga*, de nedersta *äggrunda* odelade; blomskärmen smalt lancettlika. ☉ 4, 5, b. blr. Fig. Fl.D.252.

Torra st. a. (Sk.—*Ångml.* och *Jeml.* Öl. Goutl. — *N.* i Aggershus och Bergens st.) I början *tumshög* och *enkel*, sedermera 3—6 tum och *grenig*; blrna *mycket små*; fröh. *mindre hvasst urnupna*, *än hos föreg.*, *håriga*, *slull i azlik samling*.

\*\* Blomskäften af de trubbiga foderflikarnes längd, ell. längre.

- 14 *V. triphylos L.* stjelen med utstående grenar, *glandelhårig*; de nedersta bl. skaftade, hela, äggr. ell. n. hjertlika, sågade, de öfre oskaftade, *handdelade*; foderflik. aflånga. ☉ 5, 6, b. blr. Fig. Fl.D.627. H.N.f.4, n:o 22.

Åkr. r. (Sk. *Hall. Blek.* Lyckeby och Ronneby m. fl. st. *Smål.* Jönköping, Österbrunn; Kalmar allm.; Ryssby och Ålhem s:r; Vestervik. ÖG. Norrköping; Åtved enl. Kindh. Öl. Goutl.) Mörk, torr svartnande; skärmb. *dels handdelade, dels hela*, n. *tunglika*.

- 15 *V. agrestis L.* grön och hårig; bladen hjertlika—äggrunda, sågade; blomsk. *af bladens längd ell. kortare*; foderflik. *aflånga, otydligt nerviga, utvändigt håriga*; fröh. *rundade*, med djup urskärning mell. rummen. ☉ 5—9. —  $\beta$  *calycida*: fodrets flikar inskurva. —  $\gamma$  *carosula*: bladen små, mer aflånga och köttiga, n. glatta; blrna hvita. Fig. Fl.D.2221. H.N.f.4, n:o 24.

Odl. st. a. (Sk.—*Ångml.* och *Jeml.* — *N.* till Trondhj. —  $\gamma$  *Uppl.* Rasbo sn. Näsudden på åkrar.) Blrna *variera blå, ljusröda och hvita*. Stånd. *fästade i kronpipens nedre kant*; fröh. *oftast glest glandelhårigt*;  $\gamma$  *ej oläk V. polita*.

- 16 *V. opaca Fr.* örten och blomsk. *som föreg.*; bladen *bredt äggrunda*, trubbiga, ell. rundade, med något hjertlik bas, sågade; foderflik. n. *spadlika, nerviga*, på *båda* sidor håriga; fröh. mera *bredt än långt*, med djup urskärning mell. de rundade rummen. ☉ 5—9. Fig. Fl.D.2701. H.N.f.2, n:o 28.

Odl. st. (Sk. *Blek. Smål.* Norrviding; Husqvarna, samt Urshult enl. Scheutz. ÖG. flerst.: Kindb. Stockh. VG. Kinnekulle flerst. Hall. Brandsult; Karup: Theor. Öl. Goutl. — *N.* södra del.) Mörkare och med mer *rundade blad än föreg.*; fröh. *bre-*dare, *krusigt-småluadet*; blrna *mörkblå med hvit botten*. Stånd. *fästade i kronpipens mynning*.

\*\*\* Blomskäft flere gånger längre än de spetsiga foderflik.

- 17 *V. polita* Fr. ljusgrön, något dagglå ört; bladen något hjertlika ell. ovala, jemna, glatta ell. omärkl. finhåriga; blomskäft, slutl. *längre än* bladen; foderflik. *äggrunda, upphöjdt nerviga*, n. glänsande *glatta*; fröb. något mera bredt än långt, med omkr. urskärningen rundade rum. ☉ 5—9, b. blr. Fig. Fl.D.449. H.N.f.4, n:o 25.
- Odl. st. (Sk. allm. på slätten i vest. och söd. del. Smål. Kalmar. Uppl. Rosersberg och Runsa enl. G. v. Ced. Boh. Hall. flerst.: Theor. Öl. Gottl.) *Närmast lik följ., men mycket mindre; bladen något köttiga. Stånd. fastade i pipens nedre kant; fröb. till småludet af utstående enkla hår. — V. agrestis Fl.D.*
- 18 *V. persica* Poir. bladen fjädernerviga, rundade ell. något hjertlika, djupt sågade; blomsk. *längre än* bladen, efter blomn. båglik ut- ell. nedböjda; foderflik. *äggrunda lancettlika*; fröhuset *dubbelt så bredt som* långt, *tvärhugget*, upphöjdt nätdrigt. ☉ 4—9, blå blr. Fig. Buxb.Cent.1,t.40,f.2. Fl.D.1982. H.N.f.8, n:o 27.
- Odl. st. r. (Sk. Malmö: F. Aresch.; Lund; Norr-Viddinge; vest. Tvet etc. Smål. Femsjö; Jönköp. Flerstädes, t. ex. vid Stockholm, med andra trädgårdstron förvildad.) *Foderflik. vid blomn. n. lancettlika; kronan stor, utbredd n.  $\frac{1}{2}$  i diam.; fröb. 2 rum så fränstående, att de bilda med öfre kanten en n. rät linea; frön omkr. 8. — V. Buxbaumii Ten.*
- 19 *V. hederifolia* L. bladen handnerviga, hjertligt rundade, *grundt 3—5flikiga*, ändliken stor, helbräddad; blomskäften ungefär *af bladens längd*; foderflikarne *hjertlika*. ☉ 5, 6, hvitblå blr. Fig. Fl.D.428.
- Åkr. r. (Sk.—Gefle och Vestml. Boh. Öl. Gottl. — N. Eger vid Fiskumvand; Trondhj. vid Biskopsgården Berg; förgäves sökt af prof. Blytt.) *Blomkronan liten; frön mycket stora, skålformiga, omkr. 4 i fröhuset.*

## 122. LIMOSELLA Lin. Dy-ört, Äfsebrodd.

- 1 *L. aquatica* L. bladen aflånga—trådsrakt jemnbreda, på utdragna skaft; blrna ensamma, på skaft från rotstocken. 2 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Fl.D.69. H.N.f.15, n:o 23.
- Stränd. vattengrop. (Sk.—VB. Torn. Lym. Wittangi. Herjed. Boh. Öl. Gottl. — N. till Nordl. Solö i Bejeren: Norm.) *Ett par tum hög ört, ofta försedd med blombrände grenskott. — Formen med smalt jemnbreda bl. är L. borealis Less.*

- 3 Flocken **Rhinanthaceae**. Stånd.knappar 2rummiga, med borstlika bhäng vid basen. Fröh. 2rummigt.

## 123. BARTSIA Lin. Svartb.

- 1 *B. alpina* L. bladen äggrunda, trubbigt sågade; blrna i öfversta bladveckan. 2 6, 7, viol. blr. Fig. Sv.B.579. Fl.D.43.
- Kärr, mest i fjellen. (Lpl.—Dal. Ångml. Tåsjö sn. Helsl. Ångerfors i Ljusdal: Wistr.; Färila, vid Laforsen enl. Leffl. ÖG. Omberg, Dagsmossen, samt på en mängd andra st. mell. Stångån och Vettern. VG. Hunneberg. Gottl. Klinte; Eista; Løjsta; Etelhem enl. G. v. Ced. — N.) *Var. enl. Th. Fr. i Finnm. med smutsigula blr och gröna skärmb.; de sedn. äro hos den vanl. formen mörkt violetta.*

## 124. ODONTITES Pers. Rödkulla.

- 1 *O. rubra* Pers. stjelken *grenig*; bladen smalt lancettl. ell. jemnbreda, *spetsade*; de öfre skiftevisa, bildande blomskärm; blrna i ensidiga klasar, *af skärmens längd ell. längre*; fröh. af fodrets längd ell. kortare. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.625. Reich.t.1727,f.1. H.N.f.11, n:o 22.
- Åkrar. (Sk.—Gefle. Vestml. och Verml. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Qflast grenig ända från roten, säll. n. enkel. — Euphrasia Odontites L. Bartsia Odont. Huds. Od. serotina Drej.*
- 2 *O. litoralis* Fr. stj. *enkel*; bladen *köttiga*, äggrundt ell. bredt lancettl., *trubbiga*; de nedre blrna *kortare än* skärmb.; fröh.  $\frac{1}{2}$  längre än fodret; för öfr. som föreg. ☉ 6, 7, mörkr. blr. Fig. Reich.t.1727,f.2. H.N.f.12, n:o 37.
- Hälsstr. (Sk.—Uppl. Ångskär i Hollnäs sn. VB. Neder-Kalix skärg., på Hvitgrundet. Boh. Öl. Fröbygårdar. — N. Christiania?) *Blrna mörre och mörkare än hos föreg. Anses af flere förf. för en lokalform af föreg. — O. verna Drej.*

Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).



## 125. EUPHRASIA Lin. Ögontröst.

- 1 *E. officinalis* L., stjelken enkel, ell. med *utstående* grenar; bladen äggrunda sågade; fröhuset i spetsen *intryckt*. ☉ 6—8. — *a. pratensis*: bladen bredt äggrunda, trubdadt sågade, platta och mjuka; fodret glandelprickigt. — *β nemorosa*: bladen udd-sågade, veckigt nerviga. — *γ curta*: 1—2 tum hög, vanl. mycket grenig, med små blr; blad som *β*. Fig. Fl.D.1037. H.N.f.9, n:o 17. *β* Sv.B.267. H.N.f.9, n:o 18. *γ* H.N.f.4, n:o 26.

Äng. back. a. (Sk.—Lpl. — N.) Blrna mer och mindre blåaktiga med gult svalg. Blir på feta ställen stor, med breda, n. hjerilika blad. — En medelform till följ. och innefallande näro:s *β* och *γ* är *E. parviflora* Fr.

- 2 *E. gracilis* Fr. stjelken spenslig, enkel ell. med upprätta grenar; bladen ovala ell. aflånga, med 2—3 sågtänder i hvardera kanten; fröb. aflångt. *tvärhugget*. ☉ 7.8. Fig. Fl.D.2724. Reich.L.1733,f.4, [*E. micrantha* Reich.], icke 5. H.N.f.2, n:o 20.

Ljungback. (Sk.—Gestr. Helsl. Hudiksvall: Wistr. Ner. Vestml. Vesteråstrakten. Verm. Dalsl. vid Näs i Holm. Boh. kring Strömstad; Oroust och Koön. Hall. flerest. i söd. del.: Theor. Öl. Götll. — N. Christiania; nära Fredrikshall.) Mycket spåddare, ehuru ofta lika hög, ell. högre än föreg. Bladen säll. mer än en god linie breda och dubbelt så långa, de så tänderna åtskiljda af den raka bladkanten. Skiljd från följ. deri, att blrna äro mindre och n. rent hvita, samt bladen kortare.

- 3 *E. salisburgensis* Funk. stj. som föreg., oftast alldeles enkel; bladen lancettlika—n. jemnbreda, med vigglik bas och 2—3, långt skiljda, utböjda syllika, hos de öfre bl. n. borstlika tänder i hvardera kanten; kronans öfre läpp 2klufven; fröb. som föreg. ☉ 7,8. Fig. Reich.L.1730,f.2. H.N.f.14, n:o 20.

Back., tor. st. r. (Götll. nära Westringe i Etelhem sn; vid nordöstra sidan af Tingstade träsk; Stenkyrke sn enl. Leffl.) Spåd som föreg., och knappt quartershög, sällan och då obetydligt grenad. Bladen, som hos föreg. äro föga mera än 1—2 lin. långa, äro hos näro. art omkr. dubbelt längre med samma bredd, och hafva de fluklika tänderna ännu mer åtskiljda. — *E. alpina* DC.

## 126. RHINANTHUS Lin. Höskallra.

- 1 *R. major* Ehrh. blomskärmen bleka gulaktiga, de öfre djupt sågade, med syl-lika tänder; öfre kronläppens främre tänder färgade, äggrunda; kronpipen något bägligt krökt uppåt. ☉ 6,7, g. blr. Fig. Sv.B.348,f.1. Fl.D.981. H.N.f.7, n:o 11.

\* *alectrolophus* Poll. frön med smal, ell. omärklig hinnkant. Fig. H.N.f.10, n:o 19.

Äng. \* i åkr. a. (Sk.—Ängml. och Jeml. Öl. Götll. — N. till Ost-Finnm.) Af ljusare färg och större än följ. i synnerhet \*, som vanl. är korsvis grenad, med foder och blomskäfl något sträfvat af korta hår. Fröets hinnkant hos a n. lika bred som kärnan. Bladen var. hos bägge arterna från aflångt lancettlika till smalt jemnbreda. — *R. Crista Galli* *β* L.Fl.Su. \* *R. hirsutus* Lam.

- 2 *R. minor* Ehrh. skärmen gröna, hvass-sågade; kronläppens tänder äggrunda; pipen rak. ☉ 6,7, g. blr. Fig. Sv.B.348,f.2. Fl.D.2656. H.N.f.7, n:o 12.

Fukt. äng. a. (Sk.—Lpl. — N.) Mindre och oftare enkel; var. i afseende på läpptändernas färg och bladens bredd. Till färgen mörkare än föreg.; fröen bredt hinnkantade. — *R. Cr. Galli* α L.Fl.Su. — Änn. *R. alpinus* Baumg., af Fries i S.V.Sc. uppgifven för mell. Sv. och N., torde vara osäker, såsom sedermera icke af någon angifven för något bestämdt växtställe.

## 127. SCEPTRUM Rudb. Kungsspira.

- 1 *S. Carolinum* Rudb. stjelken enkel, n. bladlös; bladen parklufna med truhbiga inskurna och naggade likar; blrna 3—4 i hvarje krans, tillsamm. bildande ett afbrutet ax. 2, 8. Fig. L.Fl.L.4,f.4,5. Sv.B.505. Fl.D.26.

Kärr, våta äng. r., i fjelltr. a. (Lpl.—Helsl. och Dal. Verm. Vestml. Sala vid Stamperstorp; Kila sn etc. Ner. Sköllersta, Hardemo och Kråklinge sn; r. VG. Österplana-Vall: Härlingstorp vid Axevalla-Hed; Sandhem sn, flerest.; Mösseberg och Gökhem. Dalsl. nära Onsön i Ed sn enl. Leffl. Uppl. i Jumskilskärren etc. Stocka. vid Ensta i Täby sn. Södm. Dunker sn, i kärret Galghult. ÖG. Sjöbacka äng i Ljung, samt vid Öfre Götala enl. Kindb.; Välfersunda storäng. Smål. Vernamo; Åhs sn; Forssarum; Borge i Vexjö län: Scheutz. — N. Ost-Finnm. — Österdalen,

närmare Sv. gränsen; Gudbrandsdalen; öfre Tellemarken.) 2—3 *qv. hög*, med mer än tumslånga blr, till färgen ljusgula med rödt på läpparne. — *Pedicularis Scetrum Carolinum L.*

128. *PEDICULARIS* Lin. Frier.

† Kronans hjälm [öfre läpp] i spetsen 2flikig.

- 1 *P. palustris L.* stjelen enkel ell. *grenad ända upp, utan* bladämnen vid basen; bladen *pardelade*; hjelmen af *nedre läppens längd*, tvärhuggen med spetsigaflikar. 2, 6, 7, r. säll. hv. blr. — *β borealis*: fodr. n. cylindriskt; blr och frön n. dubbelt mindre än hos *α*. Fig. Fl.D.2055.

Väta äng. *α*. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm. — *β Lpl.* ÖG. Öst. Tjotten n. om Rejmyra: H. v. Post enl. Kindb.) *Stjelen och grenar upprätta; 1—2 qv. hög.*

- 2 *P. silvatica L.* stjelen *grenad endast vid rothalsen* i uppstigande grenar, och der omgifven af odelade tandade bladämnen; bladen *pardelade*; hjelmen *betydligt längre* än nedre läppen, fram till tvärhuggen, med en syl-lik udd i fikarnes spets. 2, 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.358. Fl.D.225. H.N.f.12, n:o 38.

Fukt. skogsäng. r. (Sk.—Verm. Ner. och Vestm. ÖG. Rosl. Ortala bruk. Jemtl. vid Hofverberget. Gotl. — N. till Nordmör.) *Hufvudstjelen kort, enkel och upprät, grenarne vid basen nedliga med den blommande toppen uppböjda.*

- 3 *P. lapponica L.* stjelen *enkel*; bladen *parklufna*, med bred skifva, korta flikar; blrna i kort ax, utsperrade; hjelmen af *nedre läppens längd*, fram till *utdragen i en lång* 2flikig spets. 2, 7, 8, g. blr. Fig. L.Fl.L.t.4.f.1. Sv.B.750. Fl.D.2. H.N.f.9, n:o 16. Subalpin fjellv. (Lpl.—Dal. — N.) *Enkel, ehuru stund. med 2—3 stjelen från samma rot.*

†† Hjelmen hel.

- 4 *P. hirsuta L.* bladen *parklufna*, med bred skifva, korta, något *framåt* rigtade flikar; blrna upprätta, i ett tätt ax; fodret *standadt*, tunnt *hvitulligt*; hjelmen *utdragen*, något *framkrökt*, trubbig. 2, 6, 7, r. blr. Fig. L.Fl.L.t.4.f.3. Fl.D.1105. H.N.f.10, n:o 20. Högre fjellv. r. (Torn. Lul. och Pit. Lpm. På de högre fjellplatåerna i Lul. och nor. del. af Pit. Lpm. allmän enl. H. Widm. Dalfjellen enl. Linné. — N. Finm. Alten på Goskevarv; Elbydal och Talvig; Tsatsa; Sör-Reisen, på Middagsfjeld, samt Maalselv på Istinderne, Mauken etc.: Norm.: Nordl. Sulitälma, Kaddåive: H. Widm.; Snaasen; vid Beite mell. Valders och Gudbrandsdalen.) 3—6 *tum hög*, vanl. *fleststjelig*; *bladflik. icke tillbakaböjda som hos de följ.*

- 5 *P. flammea L.* bladen *pardelade* med något *nedåt* rigtade flikar; blrna som föreg.; fodr. *5flikigt, glatt*; hjelmen *rak*, vid mynningen *trubbig*, inneslutande *hela* pistillen. 2, 7. Fig. L.Fl.L.t.4.f.2. Fl.D.1878. H.N.f.11, n:o 23.

Högre fjellv. r. (Torn. Lpm. vid Tornioträsk. Lul. Lpm. Wirihauve, Wassja, Ala, Kerkeware, Toki m. fl. st. enl. ex. af And. Pit. Lpm. Sulitälma, Unna Metjispakti: Widm. — N. Finm. Tsatsa; Langfjeldene vid Beinelv: Norm. Nordl. Kaddeaware: Widm.) *Fingerhög; blrna brandgula, n. hela hjelmen mörkröd.*

- 6 *P. Oederi Vahl*: bladen och fodret *som hos föreg.*; kronhjelen *vidgad*, något *klotligt* *nedböjd* mot mynningen och *mindre trubbig* än hos föreg.; pist. *oftast* något *utskjutande*. 2, 6, 7. — *β foliosa*: axet nedtill försedt med långa skärmbblad. Fig. Fl.D.30. H.N.f.3, n:o 15.

Fjelltr. (Jemtl. Snasahögen; Skurdalsporten, Smällhögarne och Sylfjellen. Herjed. ned till Storsjöns fjell, samt Skarf- och Hamrafjellen. — N. Dovre, allmän; Vangsfj. i Opdal; Örkedalen; Tronfjellet; Ridalen; Heckeß. etc.) 4—7 *tum hög*, *stundom med hvithåriga foder, hos oss oftare glatta*; blrna *guldgula*, *hjelmen blott i toppen rödbrun*. — *P. versicolor Wg.* *P. flammea* Fl.D. — *β*, *en luxurierande form*, är *P. virescens Wg.* och trol. *P. foliosa Gunn.*, *tagen på Vangsfjellet och vid Skurdalsporten.*

129. *MELAMPYRUM* Lin. Kovall.

† Blrna närmade i mer och mindre tätta ax.

- 1 *M. cristatum L.* bladen lancettlika, helbräddade; axen *4kantiga* *täta* pyramidlika, med *hjerflik* hopvikna siktandade skärn. ☉ 7. Fig. Fl.D.1101.

Ängsback. (Sk.—Gestr. och Dal. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N.) Blomskärmen vanl. brunröda, blrna röda med gul mynning, men var. med blekgula skärm och blr.

2 *M. arvense* L. bl. som hos föreg.; axen allsidiga, aflånga, mindre låta; skärmen lancettlika, parklufvetflikiga; blomfodren något stråfva. ☉ 7. Fig. Fl.D.911.

Åkr. (Sk.—Uppl. Rosl. Hargs skärgård på Medholmen. Boh. Oroust och Nordkoster enl. Lemm. Hall. Öl. Gottl.) Skärm och blr, utom en hvit ring på midlen och gul fläck vid den nedre läppens bas, röda.

3 *M. nemorosum* L. bladen äggrundt lancettlika, helbr.; axen n. ensidiga, bladiga och glesa; skärmen hjertlika spetsade hvasstandade; bl.fodren hvitulliga. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.423. Fl.D.305.

Lundar, särd. i östra prov. (Sk.—Gestr. på Limöarne. Vestml. Hall. Öl.) Blomskärmen violetta, sällan hvita; blrna brandgula.

†† Blrna ensamma i bladvecken. ensidiga.

4 *M. pratense* L. bladen lancettlika, helbr.; fodret glatt, flere gånger kortare än den tillslutna kronan. ☉ 7, 8, blekgula blr. — *β purpureum*: kronan mörkröd med invändigt gul läpp. Fig. Sv.B.286. Fl.D.2238.

Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.: Norm. — *β* Sk. Vånga sn; Hjersås sn: F. Aresch. Blek. Berntorp. Smål. Dref och Bergunda; Vexjö flerst.; Solberga i Vestra härad: Scheutz. VG. Skölvened och Vårgårda: J. Hult. Gottl. allmän.) Blrna blekare och dubb. längre än hos följ.

5 *M. silvaticum* L. bladen som hos föreg., stund. äggrunda långspetsade; fodret glatt, föga kortare än den vidöppna kronan. ☉ 7, 8, brandg. blr. Fig. Fl.D.145.

Skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N.) Blrna omkr. 3 lin. långa; bladen vanl. 2—3 lin., men var., särd. i söd. Sv., nära 1 tum breda.

4 Flocken **Orobanchese**. Ståndarknappar 2rummiga, utan tydliga bihang. Fröhus enrummigt.

### 130. OROBANCHE Lin. Snyltrot.

1 *O. major* L. fodret af 2, framtill hopväxta blad, hvardera klufvet i 2, något olikstora flikar; kronans öfre läpp djupt urnupen, den nedres flikar likformiga trubbiga; strängarne fastade nedom kronpipens midt, håriga; pistillen n. glatt. 2 7, 8, ljusbruna blr. Fig. Sv.B.596. Fl.D.1338. H.N.f.12, n:o 35.

På rötterna af *Centaurea Scabiosa* och *Jacea*, r. (Sk. Lund; Malmö; Rå; Esperöd etc. Hall. Hasslöf: Theor. — N. Arendal på Tromsøe?) Stjelken 2—4 qv. hög, bladlös och fjällig, likasom hos alla arter i detta slägte; blrna n. tumslånga, i ax och något båglikt böjda framåt som hos följ. — *O. elatior* Sull.

2 *O. Cirsii* Fr. fod. af 2, alldeles åtskiljda blad, nedom midten klufna i 2:ne olikstora, en-nerviga flikar; kronan som föreg.; sträng. fastade nära kronpipens bas, jemte pist. glatta. 2 7—9. Fig. Fl.D.2725. Reich.t.1832 [för ljus färg]. H.N.f.11, n:o 24.

På rötter af *Cirsium heterophyllum*. r. (VG. på öst. sidan af Mösseberg, mell. Tingshögen och Jättened.) 2—3 qv. hög, men mycket spädare än föreg.; blrna smärre, blekgula med brämnet dragande i violett [enl. torra ex.]; ned. läppens flikar n. tvärhuggna.

### 131. LATHRÆA Lin. Fjällrot, Vetteros.

1 *L. Squamaria* L. stjelen bladlös, fjällig; blrna i ensidig klase, hängande; nedre läppen 3flikig. 2 4, 5, purp. blr. Fig. Sv.B.316. Fl.D.136.

Skugg. bergsrötter. r. (Sk.—Uppl. Gåsskär i Elfkarleby sn. Gefle, vid Stenbäcken. Vestml. och Verm. i bergslagen. Ner. Dalsl. Baldersnäs m. fl. st. Boh. Uddevalla, vid Kasen. Hall. Öl. Gottl. — N. Dröbak, Gjellebåk; Åsker; mellan Eger och Drammen etc.) Hela växten ofvan jord ljusröd, under jorden hvit, delad i grenar, täckta med tjocka skiftliga fjäll.

- 20 Fam. **LENTIBULARIÆ** *Rich.* Krona oregelbunden, 2läppig, med sporre. Ståndare 2. Fröh. frumligt, med fritt centralfäste.

132. *UTRICULARIA* *Lín.* Blåsort.

† Bladen parbladigt delade i hårfinaflikar.

- 1 *U. vulgaris* *L.* bladflikarne blåsbärande; den öfre kronläppen *knappt högre än den nedres huflikt uppsvällda bas*; sporren kägel-lik, *frånstående*; ståndarknapp. *förenade*. 2 7, 8, brandg. blr. Fig. Sv.B.572. Fl.D.138.

Vatten, i diken etc. (Sk.—*VB. Torn. Lpm. Karesuando. Jemt. Dalsl. Boh. Hall. Öst. Gottl.* — *N. till Hitteren i Trondhjs stift. Ost-Finm. Colmijaure vid Svanvik.*) *Blrna n. en tum i längd; stängeln brun, klasen med talrikare blr än hos de följ.*

- 2 *U. neglecta* *Lehm.* bladflik. blåsbärande; öfre kronläppen 2—3 gånger högre än den nedres huflika bas; sporren kägel-lik *tilltryckt*; ståndarkn. *fria*. 2 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1981. Reich.t.1824.f.1—3. H.N.f.8, n:o 11.

Ställast. vatten r. (Smål. Lidhult, i vattengropar vid Fylle-å nära Thorsberg; Jönköping, Ryhof. Verml. Carlstad flerst.; Christinehamn, i Broängarne.) *Något mindre än föreg.*

†† Bladen tredelade med klynnedelade flikar,

\* Bladflik. platta, ennerviga och borstbräddade.

- 3 *U. intermedia* *Hay.* bladflikarne smalt jemnbreda—syllika; luftblåsorna på egna bladlösa grenar; öfre kronläppen n. *dubbelt högre än den nedres bas*; sporren *syll-lik, tilltryckt*. 2 7, 8, g. blr. Fig Sv.B.561. Fl.D.1262.

Vatt. kärr. (Sk.—*Lpl. Boh. Strömstad. Hall. Gottl.* — *N. till Snaasen i Trondhjs st.*) Ört och blr dubb. mindre än hos *U. vulg.*; kronans nedre läpp n. *platt*. — Anm. *U. Grafana Koch* är endast en af torrare lokal beroende form, med ända till den trubbad, borstuddiga spetsen jemnbreda bladflikar.

- 4 *U. ochroleuca* *R. Hn.* bladflik. som hos föreg.; luftblåsorna dels på egna bladlösa grenar, dels på bladflikarne; sporren kägellik, *trubbig, frånstående*; för öfr. som föreg. 2 7, 8. —  $\beta$  *microceras*: sporren n. dubb. kortare; blr brandgula. Fig. H.N.f.16, n:o 23.

Vatt. kärr. r. (Ängml. Multrå sn: Stud. F. Kempe enl. Lemm. *Helsl.* nära Tönshammarssjön i Skog sn. *Uppl.* Film sn. *Ner.* Knista sn, i Farbrorstorps mosse; Hammar sn, vid Aspa. *ÖG.* Herresäter i Värna enl. Kindb. *Smål.* Sund i Jernäs sn; Gårdsrum och Wilstad snr. *Verml.* Carlstad flerst. t. ex. på Örsholmen, vid Jacobsberg etc. —  $\beta$  *Smål.* Wrigstad sn.) *Mycket spådere än föreg., från hvilken den är skild genom de på bladen och egna grenar sittande blåsorna, den rödbruna stängeln och sporren, samt den sednare form. Blrna hos hufvudformen blekt smulsgula.*

\*\* Bladflik. hårlika, nervlösa och glatta.

- 5 *U. minor* *L.* öfre kronläppen af samma längd som den nedres bas; ned. läppen *elliptisk ell. oval, med tillbakaböjd kant*; sporren mycket kort, trubbig. 2 7, blekg. blr. Fig. Sv.B.585. Fl.D.128. Reich.t.1825.f.1. H.N.f.16, n:o 24.

Vatt. diken; (Sk.—*Torn. Lpm. Boh. Strömstad m. fl. st. Hall. Gottl.* — *N. till Nordl. Ost-Finm. ofvan Nyborg.*) *Hela växten mindre än föreg.; foderbl. n. runda, af smalnande till en spets.*

- 6 *U. Bremii* *Heer*: kronans nedre läpp n. *cirkelrund och platt*; för öfr. som föreg. 2 7. Fig. Reich.t.1825.f.2.

Vatt. r. (Smål. Hagshult sn vid sjön Målen: Wrigstad sn, vid Kyrkarp; Skatelöfs sn, i Taglamyren; Jönk., Ryhof. *Verml.* Väsehärad; vid Skallebysatern i Fryksände sn. *Ängml.* Salteå i Nora sn.) *Mycket lik föreg., dock med ännu mindre blr och, som del af torra ex. synes, af renare gul färg, samt n. njurformiga foderblad, med udd.* — *U. pulchella* *Lehm.* och *Fr.S.V.Sc.*

## 133. PINGUICULA Lin. Tätört.

- 1 *P. vulgaris* L. bladen elliptiska; kronansflikar olikstora, hela, rundade; sporren n. jemntjock, *syl-lik rak*, n. af kronans längd. 2 5—7, blå blr. —  $\beta$  *grandiflora*: kronan dubbelt större med 3—5flikig nedre läpp. —  $\gamma$  *bicolor* Nordst. kronan violett med vit läpp. Fig. Sv.B.36. Fl.D.93.  
Fukt. äng. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm. —  $\beta$  Medelp. Hässjö sn enl. Leffl. — N. fjellen; äfven på Norfjellet i Buskeruds fogderi samt vid Christiania. —  $\gamma$  Lul. Lpm. Stenbäcken mell. Jokkmokk och Pajarim: L.Fl.Lapp. VG. Sandhem sn flerst.: O. Nordst. — N. Dovre.) Var. mycket i ans. till sporrens dimensioner och blomskaflets hårlighet; blrna någon gång ljus gredelina.
- 2 *P. alpina* L. bladen som hos föreg.; blomskaflet glatt; sporren kagellik, framböjd, kortare än kronan. 2 6, 7. Fig. L.Fl.L. 12, f. 3. Sv.B.685. Gunn. Fl.N. 2, t. 4. Fl. D.453. H.N.f.14, n:o 22.  
Fukt. st. egentl. i fjelltr. (Lpl. Goull. vid Gothenmsån; Storugns i Lärbro; Visby; Rista etc. — N. Ost-Finm. — Nordl.; Röråstrakten.) Blrna hvita, med en ell. två gula fläckar [ $\beta$  *bimaculata*] inpå nedre läppen. — *P. flavescens* Flörke.
- 3 *P. villosa* L. bladen rundade; blomskaflet hårligt; sporren rak *syl-lik*, genom blomskaflets böjning vid blomman, vänd bakut. 2 7, blå blr. Fig. L.Fl.L. 12, f. 2. Sv.B. 686. Fl.D.1021. H.N.f.3, n:o 17.  
Fjellv. (Lpl.—Dal. i Idre på Långfjellet samt mell. Idre och Gördalen. Ängml. Tåsjö sn, nära Stortjärn. Medelp. Hafverö sn, nära prestg. — N. Finm. — Dovre och Tronfjellet i Österdalen.) Mycket spädare än de föreg.; kronan nedplattad strimmig; fröh. n. kubiskt.

---

21 Fam. PRIMULACEÆ Lin. Krons regelbunden. Ståndarne motsatta kronflikarne. Fröh. som i föreg. familj.

1 Flocken Rotaceæ L. Örten med bladig stjolk.

## 134. TRIENTALIS Lin. Duskulla.

- 1 *T. europæa* L. bladen ovalt lancettlika, finsågade. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.591. Fl.D.84. H.N.f.16, n:o 25.  
Skog. a. (Sk.—Lpl. — N.) Stjolk 1—2blommig; bladen på stjolkens nedre del inga ell. skiftevisa; de öfversta n. kransvisa.

## 135. LYSIMACHIA Lin. Videört.

- 1 *L. vulgaris* L. stjolk upprät, småluden, med blomknippe ell. klase i toppen; bladen 2—4 i krans, lancettlika. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.345. Fl.D.689.  
Stränd. a. (Sk.—Lpl. — N.) Alnshög; vand. med flerblomm., stund. enblomm. blomskaf i toppen och de öfre bladvecken.
- 2 *L. numularia* L. stjolk krypande, glatt, med ensamma blr i bladvecken; bladen motsatta, rundade; foderflikarne n. hjertlika. 2 7, g. blr. Fig. Fl.D.493.  
Gräsväxta ställ. nära vatt. (Sk. Blek. Nätraby sn; Carlshamn enl. Scheutz. Smål. Vestervik, Marnäs; Änganäs i Nöbbelod; Vestrum sn, Helgerum. — Geste, vid Kastet. VG. Göteborg flerst. enl. Lemm. Boh. Hall. Hasslöf. Öl. Goull. — N. söd. del. mellan Skien och Follestad.) Har stora, något plattade blr. Var. med rundadt trubbiga och omärkligt spetsiga blad.
- 3 *L. nemorum* L. stj. nedligg., glatt, med blr i bladvecken; bladen motsatta, äggrunda spetsiga; foderflik. lancettlikt *syl-lika*. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.174. H.N.f.1, n:o 21.  
Skugg. och fukt. st. r. (Sk. Öfvedskloster; Bjärsjö Ladugård; Romeleklint, ej långt från Husabusen vid bäckrännilar; Andrarum m. fl. st. Smål. Vestervik, vid Marnäs, enl.

Ekstr. — N. Bergen på Ulriken; på Storöen i Bergs st. vid Kårevigen; Molde.)  
*Blrna* 2—3 lin. i diam..

## 136. NAUMBURGIA Mönch. Topplösa.

- 1 *N. thyrsiflora* Reich. stjelk. upprät; bladen motsatta, lancettlika; blomklasarne täta, långskaftade i de mellersta bladvecken. 2½ 7, g. blr. Fig. Fl.D.517.  
 Vatten. (Sk.—Lpl. Boh. Uddevalla; Strömstad. Öl. Eriksöre. — N. till söd. Finn.: Norm.) *De öfversta bladen mest tillsluttande.* — *Lysimachia* L.

## 137. ANAGALLIS Lin. Rödärv.

- 1 *A. arvensis* L. bladen äggrunda—aflånga oskaftade, 2 [säll. 3] motsatta; kronflikarne i kanten fint glandelhåriga, ☉ 6, 7. — *β cærulea*: blrna blå. Fig. Sv.B.123. Fl.D. 88. *β* Fl.D.1570.  
 Torra st. åkr. och hafstr. (Sk.—Södm. Stockh. Verml. Molkom i Nyeds sn. VG. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. Mandal; Arendal; Kirkøe, en af Hvalöarne etc. — *β* Sk. vid Lund, Fjällige, Lyngsjö m. fl. st. enl. F. Aresch. Smål. Jönköping: J. E. Zett. Södm. Floda prestg. enl. C. Ind.) *Blrna hos α vanl. mönjeröda, stundom mer och mindre hvita; hos β rent blå, men lika glandelbräddade som hos α; skiljes dock af Koch och Fries som egen art.*

## 138. CENTUNCULUS Lin. Knutarv.

- 1 *C. minimus* L. stj. vanl. grenig, stund. enkel; bladen skiftevisa, äggrunda—n. lancettl.; blrna n. oskaftade i bladvecken. ☉ 5—7, rödl. blr. Fig. Sv.B.610. Fl.D.177 och 1567. H.N.f.1, n:o 22.  
 Fukt. sandjord, r. (Sk.—Boh. VG. Dalsl. nära Venersborg. Verml. i Fryksdalen. Blek. Smål. Hjortheds prestg.; Påskallavik och Tuna vid Piptorpssjön; i Kronob. län. Ljunga och Algutsboda. Öl. Böda. Gottl. södra del. — N. till Trondhj.) *Omkr. 1 tum hög, äldre ett par tum. Den enkla, mer smalbladiga formen är C. simplex Fl.D.1567.*

## 139. GLAUX Lin. Strandling.

- 1 *G. maritima* L. bladen motsatta, äggrunda—aflånga; blrna oskaft. i bladvecken. 2½ 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.443. Fl.D.548.  
 Hafsstr. a. (Sk.—VB. Neder-Kalix. Boh. Öl. Gottl. — N. till Finn.) *Fingerhög med något köttiga blad, klocklika blr.*

## 140. SAMOLUS Lin. Punge.

- 1 *S. Valerandi* L. stjelken upprät; alla bladen bredt spadlika; blrna i klase; blomskäften med skärm nära midten. 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.198. H.N.f.15, n:o 24.  
 Hafsstr. på östra kusten, r. (Sk.—Norra Uppl. Öl. Gottl.) 1—2 quart. hög, slutt. grenad i glesa blomklasär.

- 2 *Floccen Precise* L. Örten utan egentl. stjelk, med blad (i rosett) och allmänt blomskäft ell. stängel från rotstocken.

## 141. PRIMULA Lin. Vifva.

† Kronan [gul] med vidgadt svalg.

- 1 *P. veris* L. bladen äggrunda, med två bas, smalt nedlöpande på skaftet, olikformigt naggade, skrynkligt ojemma, omärkl. finludna, under blekare; blomflocken på utdragen stängel; foderflik. äggrunda, spetsiga [utan särskild udd]; kronans bräm djupt konkavt. 2½ 4, 5. Fig. Sv.B.5. Fl.D.434.  
 Äng. a. (Sk.—Ängml. Jemtl. på Frösön m. fl. st. Boh. Öl. Gottl. Norr om Gelle sällsynt. — N. upp till Lysöen, i Trondhj:s stift; Levangernæset.) *Blrna höggula.* — *P. officinalis* Jacq.

- 2 *P. elatior* Jacq. blad och blomflock som hos föreg.; foderflik. uddspetsiga; kronbrämet vidgadt, föga konkavt. 2½ 4, 5. Fig. Fl.D.433. Reich.t.1090,f.1. H.N.f.2, n:o 32.  
 Äng. och parker, r. (Sk. Kullaberg; Öfvedskloster; Tulesbo; Skartofta sn; Bjärsjö ladugård enl. F. Aresch. — N. södra delen, t. ex. Mandal.) *Blrna stafelgula, med*

större och plattare bräm än hos föreg., men mindre än hos följ. — *P. veris*  $\beta$  elatior L.

- 3 *P. acaulis* Jacq. bladen ovala trubbiga, jemnt afsmalnande till skaft; blomskäften från rotstocken, enkla och enblommiga, eller i mycket kort skaftad flock; fodertänd. lancettlika spetsade; kronbrämet platt. 2 4, 5. Fig. Fl.D.194. Reich.t.1091,f.2,3. H.N.f.2, n:o 33.

Ang. och park. r. (Sk. Kullaberg; vid Bökebol, Råhagen och Gylleröd enl. Lilja. — N. Christiansand; Hitterøe; Hatvigen; Bergen upp till Statlandet.) Blrna svafvelgula med brämet ända till 1 tum i diam. Blomskäftens hår långa. — *P. veris*  $\gamma$  L. *P. grandiflora* Fr. S.V.Sc. *P. vulgaris* Bab. *P. sylvestris* Scop.

†† Kronan [blå ell. rödakt.] med trångt svalg.

\* Bladen på undre sidan tätt hvitmjölige.

- 4 *P. farinosa* L. bladen omv. äggrunda—tunglika; flocken mångblommig; blomfodr. aflångt, med jemnbreda, trubbiga likar n. af kronpipens längd; kronflik. bredt omv. hjertlika, af pipens längd; fruktämne omv. äggformigt. 2 5, 6, rödgredel. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.442. H.N.f.13, n:o 38.

Sidländta äng. (Sk.—Hels. Jeml. allm. i Storsjötrakten. Um. Lpm. Dal. Verm. Öl. Götll.) Stängeln öfversta del jemte blomskäften och fodret hos denna och följ. art vanl. lika hvitmjölige som bladens undersida.

- 5 *P. scotica* Hook. bl. omv. äggrunda; flock mångblommig; fod. aflångt, något buktigt, med äggrunda, trubbiga likar, betyd. kortare än kronpipen; kronfl. som föreg., af halfva pipens längd; fruktämne klotrundt. 2 6, mörkviol. blr. Fig. Fl.D.125 [enl. Blyt]. E.B.2608. H.N.f.8, n:o 12.

Ang. och bergsslutt. i fjelltr. (Lul. Lpm. enl. Ands. Pit. Lpm. Arjeploug; Gullön vid Storafvan. Jeml. Östersund, i Björnmyran. Herjed. Stora Midtåklappen. — N. Finnm. och Nordl. Dovre, allm. Gudbrandsdalen.) Lågre och af stadigare växt än de öfr. i afd., med de mörkt ell. blåaktigt violetta blrna på korta skaft i n. hufvudlikt sammandragen flock.

\*\* Bladen på undre sidan gröna ell. mycket glest mjölprickiga.

- 6 *P. stricta* Horn. bladen aflånga ell. tunglika—spadlika, afsmalnande till ett kort skaft, n. bara [utan mjöl]; flock. meränd. fåblommig; fod. n. äggformigt, buktigt med äggrunda likar, betyd. kortare än kronpipen; kronflik. viggformigt omv. hjertlika åtskilda, omkr. 3 gr kortare än pipen. 2 6, 7, ljust gred. blr. Fig. Fl.D.1385. H.N.f.5, n:o 11.

Fukt. äng. i fjelltr. (Lpl.—Herjed. — N.) Stängeln vanl. högre, och glänsande mörkgrön, men mer fåblommig än hos de föreg.; blrna smärre, mycket ljusa med smälare kronflikar, kortare foder. Var. enl. Norm. i Finnm. med 5—10blommig, tjock och stadig stängel, närmande sig något till föreg. — *P. farinosa*  $\beta$  Wg.

- \*7 *P. sibirica* Jacq. bladen äggrunda—ovala, helbräddade med uldraget, smalt skaft, fullkomligt bara; flocken 1—3blommig; fod. n. af kronpipens längd; kronflik. som hos föreg., vanl. längre än pipen. 2 7, 8, gred. blr. Fig. Sv.B.530. Fl.D.1809. H.N.f.8, n:o 13.

Strandäng. r. (N. Finnm. vid Altenfjord; Talvig, Kaafjord, Elvbacken; Hammerfest; Hasvig i Loppens sn; Maasøe; Vardøe; Renøe i Pasvigfjord; Jarfjorden enl. Th. Fr.) Har säll. mer än 3 blr i flocken, men större än hos de 3 föreg. — *P. integrifol.* Gunn. *P. norvegica* Retz. *P. finnmarchica* Ed.4.

#### 142. ANDRÓSACE Lin. Hillsko.

- 1 *A. septentrionalis* L. stäng. finluden; bladen i rosett, lancettlika tandade, n. glatta; blomflockens svepebl. kortare än skäften; fodret glatt, kantigt, något kortare än kronan. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.483. Fl.D.7. H.N.f.8, n:o 14.

Sandåsar, r. (Sk.—Gefle. Ner. Öl. Götll. — N.) Var. med n. oskaftad blomflock.

#### 143. HOTTONIA Lin. Vattenblink.

- 1 *H. palustris* L. stängelu upprät, med kransvisa, skaftade blr. 2 6, 7. Fig. Sv.B.603. Fl.D.487 och 1867.

Stillastående vatt. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Öl. Gottl.) Stjelken ned-sänkt, bladen kammligt paradelade; blrna hv. ell. rödlätta.

- 22 Fam. GLOBULARIÆ DC. Blomkorg. Krona oregelbund. Stånd. 4. Fruktämne inom blomman, slutt. enrumm. enfröig, nöt med ett hängande frö.

144. GLOBULARIA Lin. Bergskrabba.

- 1 *G. vulgaris* L. rotbladen ovala ell. spadlika, hela ell. i spetsen 3tandade; stjelklbladen lancettlika. 2 6. Fig. Sv.B.364. Fl.D.suppl.84. H.N.f.4, n:o 18.

Kalkberg, r. (Öl. vestra landtborgen, mångenståd. från Borgholm ned till Ottenby; på alvaren från Resmo till Hulterstad sn enl. Sjöstr. Gottl. mångenstädes.) Ört med 3—6 tum hög, enblomstrig stjelt, hvilken vid blomningens början ofta är föga utvecklad; blrna blå, stund. hvita. — *G. spinosa* Lam. — *G. suecica* Nym. Utl. förf.: *G. vulgaris* är en helt annan art, näml. *G. Willkommii* Nym.

- 23 Fam. PLANTAGINEÆ Juss. Krona regelbunden. 4-klufven. Stånd. 4, skiftevisa med kronlikarne. Fröh. med centralt fröfäste. 2- ell. 4rummigt. säll. nötliskt, enrummigt, enfröigt.

145. PLANTAGO Lin. Groblad.

† Bladen äggrunda—lancettlika, hela.

- 1 *P. major* L. stäng. trind, otydl. strimmig; bladen äggrunda tandade glatta, ell. omärkl. småbåriga; axet cylindriskt; fröh. mångfröigt. 2 7, 8. —  $\beta$  *scopulorum*: bladen mer och mindre groftandade tjocka. —  $\gamma$  *agrestis*: roten enårig; bladen tunna ludna; axet aflångt. Fig. Sv.B.93. Fl.D.461.

Väg. åkr. stränd. a. (Sk.—Lul. Lpm. — N. till Finn. — Norm. —  $\beta$  Sk. — Rosl. Hall. Öl. Gottl. — N. —  $\gamma$  Sk. vid Gessige. Blek. Ronneby. Smål. Algutsboda; Kalmar. VG. vid Väringe ka; Säby. Boh. på Klöfverön; Grebbestad; samt Hall. flerest. enl. Leml.) Var. från 1 tum hög med n. äggformigt ax till 1½ fot med qvarterslångt, jemntjockt ax; ståndarknapparne rödbruna. — Anm. Alla Skand. arter hafva bladlös stängel.

- 2 *P. media* L. stäng. som hos föreg.; bladen ovala—äggrunda, ludna; axet aflångt, slutt. cylindriskt; fröhuset 2—4fröigt. 2 6, 7. Fig. Sv.B.631. Fl.D.581.

Ång. a. (Sk.—Um. Lpm. — N. till Lofoden.) Axet utblommadt cylindriskt; ståndarknapp. n. hvita på ljusröda strängar.

- 3 *P. lanceolata* L. stäng. kantig, färad; bladen lancettlika, glest naggtandade, spetsade; axet klot- ell. äggformigt; fröh. 2fröigt. 2 5—7. —  $\beta$  *dubia*: rothalsen och bladen vid basen täckta af snöhvitt ull. Fig. Sv.B.632. Fl.D.437.

Torra st. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Sk. Ystad, vid Köpingeåns utlopp etc. Blek. Smål. Kalmar; Vestervik. ÖG. Gryt sn: Kindb. Öl. Gottl.) Stånd. n. hvita. Var. mycket till storl. och axels form; på fet, odlad jord stund. almhög och bredbladig: var. *maxima*, på hafstr. med n. jemnbreda långhåriga blad: var. *graminisfolia*. —  $\beta$  *P. dubia* L.

†† Bladen jemnbreda, hela, ell. parklufna med jemnbreda flikar.

- 4 *P. minor* Fr. stäng. trind; bladen smalt jemnbreda, nervlösa; axet aflångt ell. cylindriskt; fröh. mångfröigt. 2 6. —  $\beta$  *depressa*: större, nedliggande; bladen bredare, glest tandade; axet längre. Fig. Ups.Vet.Soc.H.1851,t.4,f.a;  $\beta$  f.b. Fl.D.suppl.t.9. H.N.f.4, n:o 27;  $\beta$  f.16, n:o 28.

Tor. st. r. (Öl. på alvarens ofruktbaraste ställen. —  $\beta$  Öl. Åhs sn, vid Kärra; Gräs-gård sn, vid Qvingsröta; Segerstad sn, vid Schy.) 1—2 tum hög, med knappt 1 lin. breda blad, ofta längre än stängeln; axet når hos  $\beta$  en tums längd; frön 6—8.

- 5 *P. maritima* L. stäng. trind; bladen köttiga, jemnbreda, rännformiga; axet långt cylindriskt, med glatta blomskärm af fodrets längd; fröh. merändels 2fröigt. 2 7.



— *β dentata*: bladen något lancettlika, glest tandade. Fig. Fl.D.691, 243. H.N.f.16, n:o 27. *β* Fl.D.1634.

Hafsstr. (Sk.—VB. Boh. Öl. Goull. — N.) Bladen variera från trådlika ennerviga till 3—6 linier breda, och ända till 5nerviga [*P. serraria* Retz.?]; stånd. gula. En var. med korta, trådlika blad dr *δ genilis* Fr. Fl. Hall.

6 *P. Coronopus* L. stäng. trind; bladen jemnbreda, parklufna, med långt åtskiljda smalaflikar [stundom hela]; axet cylindriskt, med egggrundt syl-lika blomskärm; fröb. omkr. 6fröigt. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.723. Fl.D.272. H.N.f.1, n:o 23.

Hafsstr. (Sk. Blek. Smål. Hall. Boh. Domsö; Koön vid Marstrand m. fl. st. Öl. Goull.) Hårig ört, med såfröiga fröhus, emedan flere frön icke mogna. Bladen på magra ställen n. hela, glest tandade; stånd. gula.

#### 146. LITORELLA Lin. Strandpryl.

1 *L. lacustris* L. bladen upprätta trinda syl-lika, jemte de enblomm. blomskäften från rotstocken; blirna skildkönade. 2 6—8. Fig. Sv.B.532. Fl.D.170. H.N.f.11, n:o 25. Sjöstr. i vattenbrynet, r. (Sk.—Uppl. Dalelven vid Söderfors bruk. Helsl. Norrbo vid Dellarne; Ströms bruk; Wistr. Ängml. Skog och Styrnäs sn; Högsjö sn, vid Mört-sjön; Arn. Pil. Lpm. i Svärdeffen. Vestml. Ridön; Skinnsk.berg; Nora. Ner. Verml. Dalsl. VG. Boh. Hall. Öl. Goull. — N. till Nordl.) Hanblommans skäft 1—2 tum högt, bladen likna dem hos *Isoetes*, men äro icke 4pipiga inuti.

24 Fam. PLUMBAGINÆÆ Juss. Krons regelbunden, med 5 stånd. motsattaflikarne. Fruktenrumm., med ett, vid centralfästet hängande frö.

#### 147. STATICE Lin. Marrisp.

1 *S. Behen Drej.* stängeln trind; bladen aflånga—omv. äggrunda, med udd i spetsen, under tydl. svartpunkterade; blomsamlingens grenar utböjda, tätblommiga, med sina nedersta fjäll tomma. 2 7, 8, ljusb. blir. Fig. Fl.D.2409. Reich.t.1140.f.1. H.N.f.10, n:o 21.

Hafsstr. r. (Sk. vest. kusten: Hvellinge; Eskilstorp; Gessie; mell. Landskrona och Helsingborg; Kullen etc.) Vanl. mindre och mer tätblommig än följ.; bladens sidonerver variera hos bägge arterna mer och mindre tydliga. — *S. Limonium β Ed.3.*

2 *S. rariflora Drej.* stäng. kantig; bladen som föreg., otydl. punkterade; blomsamlingens grenar n. upprätta, glesblommiga, med blir inom alla fjällen. 2 7, 8, ljusb. blir. Fig. Fl.D.315 och 2410. Reich.t.1140.f.2. H.N.f.3, n:o 18; f.11, n:o 26.

Hafsstr. r. (Sk. Torrekov på Skäppaskär. Boh. på Lågholmen i Tanum; Lindön; Marstrand, på Koön; Domsöe; Gåseskär nära Henån etc. — N. Christianiafjorden, Krageröe m. fl. st.) 2—3 qv. hög. — *S. Limonium* L. *St. Bahusiensis* Fr. (den högre formen).

#### 148. ARMERIA Willd. Trift.

1 *A. elongata* Koch: stängeln vanl. glatt; bladen smalt jemnbreda, något spetsiga, vanl. hårbraddade; yttre holkfjällen uddspetsiga; fodret hårigt längs nerverna. 2 6, 7, ljusr. blir. Fig. Fl.D.1092 och 2585. H.N.f.8, n:o 15.

Torra äng. (Sk.—Uppl. Vestml. Dal. Grangärde sn, Sunnansjö bruk. VG. Venersborg. Boh. Öl. Goull. — N.) Stängeln fotshög, mer central [från bladknippets midt] än hos följ.; bladen n. trådsmåla, ennerviga, säll. en linie breda och då med 2 svagare sidonerver. — *A. vulgaris* W. *Statice Armeria* L.

2 *A. maritima* W. stäng. vanl. finhårig; bladen som föreg. trubbiga; yttre holkfjällen triangulära med ingen, ell. omärklig udd; fodret öfverallt hårigt. 2 7, 8, r. blir. Fig. Fl.D.2584. H.N.f.5, n:o 12; f.16, n:o 26 [glatt var.].

Hafskust. (Sk. längs hela kusten, mest på den vest. Hall. Snöstorp; Theor.; mell. Varberg och Kongsbacka, högst ymnig och gående långt in åt landet. Boh. — N. Fredriksvärn på vallarne. Christiania; och trol. hela södra och vest. kusten. Molde.

Trondhj. Nordl. Helgeland; Bodøe; Hadselø i Vesteraalen: Norm. Finnm. på Maasøe: Th. Fr.) Växer i stora, rikt blommande tufvor, med qvartershöga, sällan 7—8 tum höga blomstänglar. — *A. pubescens* Lk.; *Statice Armeria* E.B. *S. marit.* Mill.

\*3 *A. sibirica* Turcz. stäng. glatt ell. nedtill gles hårig; bl. som föreg., glatta, endast vid basen hårbräddade; holkfj. rundade och trubbiga; fodr. som hos föreg. 24 7, ljusr. blr. Fig.

Fjellv. r. (N. Ost-Finm. Svartnæs midt för Vardøe; mell. Vardøe och Persfjorden: E. Henschen enl. Th. Fr. Vest-Finm. Porsanger, på spetsen af Silfavarre: Norm.; Tsatsa, på öfversta sluttn. mot Kiutdalen.) *Norska ex. enl. Th. Fr. bestämda af Boiss.* Synes vara en från föreg. föga skild art.

## 2 Serien: THALAMIFLORÆ.

### 4 KLASSEN

### DISCIFLORÆ.

- 25 Fam. **CORNEÆ DC.** Kronblad 4, i knoppen kantlagda. Fruktämne 2rummigt, vidväxt fodret och täckt af disken, slutl. en 2rummig, 2fröig, bärlik stenfrukt.

149. **CORNUS Lin.** Kornell.

- 1 *C. sanguinea L.* buske med glätta grenar; bladen *skaftrade*, äggrunda, på båda sidor gröna; blrna *utan svepe*, i platta qvastlika knippen.  $\frac{1}{2}$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.235. Fl.D.481. H.N.f.2, n:o 35.

Lund. r. (Sk. Blek. Vemmö; Berntorp och Ramdala enl. Gosselm. ÖG. VG. Boh. Lindö; Koster. Öl. Gottl. — N. Porsgrund, Langesund etc. upp till Söndmøer och Tellemarken.) *Manshög buske, med röd bark på grenarne, svarblå stenfrukter.*

- 2 *C. suecica L.* ört; bladen *oskaftrade*, äggrunda, bågnerliga; blomflocken mycket kortare än de 4, äggrunda spetsiga *färgade svepebladen*.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Sv.B.201. Fl. D.5. H.N.f.2, n:o 34.

Fukt. st. (Lpl.—Gestr. och Verml. Mer spridd i rikets sydl. prov. ända till Sk. Blek. Hall. och Boh. Gottl. — N.) *Quartershög med små svarröda blr inom ett stort hvitt kronbladlikt svepe. Röda [någon gång hvita] stenfr.*

- 26 Fam. **CELASTRINEÆ R. Br.** Kronblad 4, 5, i knoppen tegellagda. Fruktämne flerrumm., nedsänkt inom disken, fritt ell. vidväxt fodrets botten, slutl. fröhus ell. bärlik stenfrukt, med lika många frön som rum.

150. **ILEX Lin.** Kristtorn.

- 1 *I. Aquifolium L.* bladen äggrunda spetsiga vågiga och med styfva tornar i kanten; blrna flockvisa i bladveckan.  $\frac{1}{2}$  7, hv. blr. Fig. Fl.D.508. H.N.f.10, n:o 17.

Lund. r. (Boh. vid Vägga i Tossene sn; nu mer trol. utrotad. — N. Christiansands och Bergens st. till Söndmøer; t. ex. Arendal på Mærdøe och vid Lindesnäs, ymnig.) *Träd med läderartade, glänsande blad, de öfre stundom utan tornar; röda stenfr.*

151. **EVONYMUS Lin.** Benved.

- 1 *E. europæus L.* bladen bredt lancettlika ell. aflånga, glatta; blomskäften 2—3blommiga plattade; blomdelarne 4taliga; kronbl. äggrundt aflånga; fröhusen trubbvinkliga.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Sv.B.247. Fl.D.1089. H.N.f.2, n:o 36.

**Skogsäng. r.** (*Sk. Hall. Blek. Smål.* Tykatorp i V. Torsås. *Öl. Goull.* — *N. Smålehnene; Tellemarken.*) *Omkring manshög buske, med korsvisa grenar, gulgröna blr, röda fröhus.*

**27 Fam. ARALIAOEÆ Juss.** Kronbl. 5, i knoppen kantlagda. Frukt sterrummigt bär, med ett hängande frö i hvarje rum.

152. *HÉDERA* *Lín.* Murgrön.

1 *H. Helix* *L.* bladen handhått 3—5flikade, blomgrenarnes hela äggrunda spetsade; blrna i flock. 5 9, 10, gr. blr. *Fig. Sv.B.397. Fl.D.1027. H.N.f.13, n:o 30.*

*Skog. berg etc. (Sk.—Mälaren. VG. Halleberg. Dalsl. på Kroppefjell; Lindheden; Hedeberget etc. Boh. Uddevalla; Marstrand; Henån, på Hedberget. Öl. Goull. Sällsynt norr om Smål. — N. vid kusten från Arendal och Christiansand upp till Hardangerfjorden.) Buske med klängande grenar, som fästa sig medelst luftrotter; beständigt gröna blad och svarta bär, som mogna året efter blomningen.*

**28 Fam. UMBELLIFERÆ Juss.** Kronbl. 5, i knoppen inrullade. Stånd 5. Fruktämne beklädt af det vidväxta fodret; slutl. 2:ne hopväxta, vid mogningen skiljbara, enfröiga delfruktar [dubb. skalfr.]. Stift 2.

1 **Flocken Cælospermæ.** Delfrukternas mot fogen vända sidor skålformigt konkava.

153. *CORIANDRUM* *Lín.* Koriander.

†1 *C. sativum* *L.* hela växten glatt; stjelen strimmig; de nedre bladen mindre delade med n. vigglika flikiga småblad, de öfre findelade; blomflocken 3—5strålig. ☉ 6, 7, hv. blr. *Fig. Fl.D.1989. Reich.Umbellif.t.202.*

*Förvildad omkr. plant. r. (Boh. på backar omkr. Marstrands fästning; mell. Kongsbacka och Walda. Smål. Kalmar; Hjorthed och Westerum snr. Goull. Stenkyrke sn enl. Leml.) Örtén illaluktande, men frukterna mycket aromatiska.*

2 **Flocken Campylopermæ.** Delfrukternas mot fogen vända sidor på längden färade.

154. *PLEUROSPERMUM* *Hoffm.* Slökesticka.

1 *P. austriacum* *Hoffm.* hela växten n. glatt; bladen dubbelt och 3dubb. parbladigt delade, med aflångt äggrunda, inskuret sågade slutflikar; svepebl. lancettlika, nedböjda. 2 7, 8, hv. blr. *Fig. Fl.D.suppl.70. Reich.t.192. H.N.f.16, n:o 29.*

*Steniga st. r. (ÖG. Kolmorden, nära Marmorbruket; Rödmosen, Eriksberg, Häradsveden och Hult i Qvillinge sn enl. Kindb.) 3—5 fot hög, upptill förgrenad i en mängd blomflockar, med de allm. svepebladen dels hela, dels parklufna. Utmärkt af de nedåt föga vidgade, knappt halftomfattande bladskafven, hvarigenom stjelen ihållighet fortsättes ända upp utan leder. — Ligusticum L.*

155. *CONIUM* *Lín.* Odört.

1 *C. maculatum* *L.* hela växten glatt; bladen 3dubbelt parbladigt delade; det enskilda svepets blad äggrundt lancettlika, kortare än blomflocken. ☞ 7, hv. blr. *Fig. Sv.B. 226. Fl.D.2168.*

*Torra st. åkr. (Sk.—Gestr. Vestml. och Verml. vid Bäck i By sn. Boh. Öl. Goull. — N. söd. del. sällsynt, t. ex. Brevig.) Stjelen 3—4 fot hög, brunfläckig.*

156. *MYRRHIS* *Scop.* Spansk Körvel.

†1 *M. odorata* *Scop.* hela örten mjukhårig; bladen 3dubbelt parbladigt delade; slutflikarne sågade. 2 7, 8, hv. blr. *Fig. Sv.B.374. Fl.D.1928.*

Odl. st. r. (Sk.—Södm. Ner. och Verm. Öl. Öfverallt förvildad. — N. Selbøe i Bergens st., såsom det påstås verkligt vild; äfven funnen vid Bergen och Molde.) 1—2 alnar hög, med starkt luklande blad; tumslånga, skull. svarta frukter. — *Scandix L.*

## 157. CHÆROPHYLLUM Lin. Hundloka.

1 *C. temulum L.* hela växten smått stråfluden; stjelen strimmad; bladen dubb. parbladigt delade, med äggrunda ell. aflånga trubbiga, inskurna likar; svepebl. härbräddade; stiftet af diskens längd. 7, hv. blr. Fig. Fl.D.918.

Torra st. (Sk. Blek. Vemmö; Risanäs m. fl. st. enl. Goss. Smål. Kalmar; Oscarshamn; Seglerum nära Vestervik; Figeholm; m. fl. st. nära kusten. ÖG. Norrköping. Odenfors och Vadstena enl. Kindb. VG. Kinnekulle. Hall. Öl. Gottl.) Stjelen vanl. fläckig. — *Scandix Wg.*

\*2 *C. aureum L.* stj. nedtill ell. vid de något uppsvällda lederna mer och mindre stråflårig, upptill glatt, strimmad; bladen dubb. parbladigt delade med smakt äggrunda lancettlika, nedtill parklufna, upptill hvass sågade och långt spetsade slutblad; svepebl. som föreg.; stift. mycket längre än disken. 4 7, hv. blr. Fig. Reich. Umb.t.177. H.N.f.16, n:o 30.

Tor. st. r. (N. Christiania, ej långt från Natmandhougen: Krok.) Stjelen fläckig; bladen vanl. glatta. — *C. maculatum W.*

## 158. CEREFOLIUM Hall. Körvelfloka.

1 *C. sativum Bess.* stjelen finstrimig, vid lederna mjukhårig; bladen 3dubb. parbladigt delade; småbladen med n. vinkelrätt utspärrade skaft, inskurna trubbiga likar; en del blomflock. n. oskaftade, på stj:s sidor. 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.283. Fl.D.1640.

Odl. st., skugg. r. (Sk.—Boh. Smål. Fernsjö; Kalmar. ÖG. mångenstäd. enl. Kindb. Södm. Hörningsholm på klipporna omkr. slottet. Stockh. Öl. n. om Borgholms slott. Gottl. För öfr. här och der förvildad. — N. Christiansand; Arendal; Christiania.) Har vanl. 3bladiga enskilda svepen. Lukt och smak af Spansk körvel, hvarföre växten stund. odlas. — *Scandix Ceref. L. Anthriscus Ceref. Hoffm. Chæroph. sativum Wg.*

2 *C. silvestre Bess.* stjelen fårad, nedtill fluden, upptill glatt; bladen 2—3dubb. parbladigt delade; småbl. med utstående skaft, och parklufvet inskurna likar; alla blomflock. skaftade, i stj:s och grenarnes topp. 4 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.124. Fl.D.2050.

Odl. st. lund. a. (Sk.—Ipl. — N.) 2—3 fot hög. — *Chæroph. L. Anthriscus Hoffm.*

## 159. ANTHRISCUS Pers. Kax.

1 *A. vulgaris Pers.* stjelen glatt; bladen 3dubb. parbladigt delade; fåstråliga blomflock. på stj:s sidor; frukt. äggrunda, öfverallt smått kroktaggiga. 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.863.

Vid väg., jordvall. (Sk. Hall. Blek. Smål. Kalmar; Jönsö i Mönsterås sn. ÖG. Lönsbo under Väsby i Horns sn: Dr Ax. Lund. Öl. Gottl.) Altnshög; enskilda svepen 2—3bladiga. — *Scandix Anthr. L. Chærophyll. Wg.*

## 160. SCANDIX Lin. Nälkörvel.

1 *S. Pecten L.* stjelen grenig; bladen 3dubb. parbladigt delade med små jemnbreda likar; fruktens spröt på 2 sidor uppåt styfhårigt. 5—7, hv. blr. Fig. Fl.D.844. H.N.f.4, n:o 28.

Åkr. r. (Öl. flerst. i Köpings och Högsrums sn; mera sälls. i Gärdslösa. Repplinge och Thorslunda m. fl. sn i mell. delen enl. Sjöstr. Gottl. Visby; Ejsta. Klinte, Roma och Vänge m. fl. st. Fordom äfven funnen i Smål. vid Kalmar.) Allm. flocken delad i 2, säll. 3 strålar; de mogna frukterna långa, bildande en kammlig flock.

## 161. TORILIS Adans. Rödfloka.

1 *T. Anthriscus Gmel.* hela växten sträf; bladen dubb. parbladigt delade, med aflånga, inskurna och sågade slutblad; blomflock. långt skaftade, med mångbladigt enskildt svepe. 7. Fig. Sv.B.759. Fl.D.919.

Torra st. (Sk.—Uppl. och Dal. Dalsl. Boh. Uddevalla; Strömstad etc. Öl. Gottl. —

- N.) 2—3 fot hög; blrna rödl., säll. rent hvita. — *Tordylium* L. *Caucalis Liljebl.*

### 3 Flocken *Orthospermæ*. Delfrukternas mot fogen vända sidor platta.

#### 162. DAUCUS Lin. Morot.

- † *D. Carota* L. stjelken stråfhårig, färad; bladen 2—3dubb. parbladigt delade, med djupt inskurna spetsiga slutblad; fruktslockerne i midten insänkta. 7, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.104, odlad. Fl.D.723.
- Torra st. åkerren. (Sk.—Uppl. Vestml. och Verml. Råda sn enl. Lem. VG. Dalsl. Boh. Christinedal nära Gustafsberg. Hall. Varberg: Scheutz; Hasslöf: Theor. Öl. Gottl. — N.) Bladflikarne variera smalare och bredare; flockarne mycket tätta, roten hos den vilda smal och vit. Blir odlad mera glatt och får tjock, ofta röd rot.

#### 163. LASERPITIUM Lin. Spenört.

- † *L. latifolium* L. hela växten n. glatt; bladen 2—3dubb. parbl. delade, med snedt hjertlika, trubbiga, hvass-sågade, säll. inskurna slutblad; flocken stor, med n. tråds-mala svepebl.; fruktens vingade åsar krusiga. 24 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1513.
- Skogsäng. (Sk.—Gefle, vid Nyberg. Dal. Vestml. Hall. flerst. i söd. delen: Theor. Öl. Goull. — N. mell. Laurvig och Skien.) 3—5 fot hög, blåaktig växt; rotbladen, särdeles yngre, stundom under småludna.

#### 164. HERACLEUM Lin. Björnfloka.

- † *H. sibiricum* L. stråfhårig; bladen enkelt ell. dubb. parbladigt delade; småbladen par-delade ell. djupt inskurna, med ovala—jembreda, grofsågade, tandade ell. n. hela likar; flockens kantbl. (hos hufvudform.) föga större än de öfriga. 7, 8. — *β angustifolium*: bladflikarne långa och jembreda, n. hela. Fig. Sv.B.363. Reich.Umb. t.131. *β* H.N.f.4, n:o 29.
- \* *australe* Hn. blrna hvita ell. rödaktiga, de i kanten större och mer olikformiga än de öfriga; delfr. smalare, ovala. Fig. Fl.D.2406. Reich.t.128.
- Äng. a. (Sk.—Ängml. VB. Umeå sn. Backen. Jemtl. Verml. och Dalsl. Hall. Öl. — N. till Trondenås i Finn. — Norm. — \* i södra och vestra prov. till Verml. och Stockh. på Färingön. Gottl. Visby: Vestöb. — N. enl. Ax. Bl.) Stor och stråf växt; den nordligare formen med gröngrula ell. gulakt. blr och mycket varierande blad. Kronbl. öfven hos denna oftast omv. hjertlika med inviken spets, stundom t. o. m. i samma flock, inböjda utan den hjertlika intryckningen. — *H. Sphondylium* L.F.Su. och Herb. *β* H. *angustif. L.* \* *H. Sphondylium* Fries, hvars *H. sueticum* är en medelform med hvita blr.

#### 165. PASTINACA Lin. Palsternacka.

- † *P. sativa* L. bladen enkelt parbladigt delade, omkr. 4pariga; småbladen äggrunda inskuret sågade, stund. likiga. 7, 8, g. blr. — *β silvestris*: småluden, med smal tråktig, något bitter rot. Fig. Fl.D.1206. H.N.f.11, n:o 29.
- Odl. st., vid vägar etc. (Sk. allm. på slättbygd. Hall. Öl. på hafsstr. För öfr. troligen endast förvildad, ända upp till Uppl. och Verml. — N. Opdal; Rörås.) Var. helt och hållet glatt, med under och *β* på båda sidor håriga blad. *β*, som af Fr. anses vara *P. opaca* Bernh. och endast förekommer i Skåne, torde vara den ursprungligt vilda.

#### 166. ANETHUM Lin. Dill.

- † *A. graveolens* L. blågrön, glatt; bladen dubb. parbladigt delade i tråds-mala likar. 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.1572.
- Odl. st. (Sk.—Gestr. sjelfsädd i kryddgårdar.) *Alnshög*, med små blr i stor gles flock.

#### 167. LEVISTICUM Koch. Libsticka.

- † *L. officinale* K. bladen parbladigt delade; småbladen n. vigglika, likiga, de nedre 3-delade. 24 7, 8, g. blr. Reich.Umb.t.100.
- Gårdstomt. (Trol. öfver hela Sv., ursprungligen odlad.) 1—2 alnar hög, illaluktande. — *Ligusticum Levist. L.* *Levisticum paludapifolium* Reich.

168. *ANGÉLICA* Lin. Strätta.

† Delfrukternas skal sammanhängande med fröet.

- 1 *A. silvestris* L. blad- och småbladskäften *kölade*; de nedre bladen 2—3dubb. parbladigt delade, 3—4pariga; småbladen äggrunda, sågade [vanl. icke nedlöpande], uddbladet meränd. helt, stund. 3deladt; flockskäften *finludna*; delfr. plattade *vingkantade*. 2½ 7, 8, hv. blr. — *β montana*: de öfre småbladen nedlöpande på de gemensamma skäften. Fig. Sv.B.303. Fl.D.1639. Reich. Umbt. 95, f. 1, 2; *β* t. 96.

Fukt. äng. och stränd. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.: Norm. — *β* i öfre delarne af Sv., samt i N. enl. Fr. S.V.Sc.) Småbladen hos den allm. formen vanligen *hela*, något *tjocka*, *fint* och *lät* sågade, men *variera* äfven *djupt* och *ojmnt* sågade, då de *tillika* äro *stora*, *tunna* och *glänsande*: var. *nitens*. Växten *vanl. 1½ aln* hög, men *blifver* i *fjelltr.* och på *hafsstr.* ofta dubb. *högre*, till *alla delar* *mycket* *grof*: var. *majör* ed. 9.

†† Delfrs skal slutl. lossnande från fröet: *Archangelica Hoffm.*

- 2 *A. litoralis* Fr. bladskäften *fårade*; bladen dubb. parblad. delade; småbladen *olikformigt* sågade, uddbladet 3klufvet; flockskäften *n. glatta*; delfr. konvexa, med *höga* och något *uppsvällda* åsar. 2½ 6, 7, gulgr. blr. Fig. Fl.D.2407. H.N.f.10, n:o 23.

Hafsstr. (Sk. Malmö; Färköfsholm och Vidtsköfse. — Rosl. Öregrunds skärgård. VB. Neder-Kallix skärg. Hall. Boh. Götll. Fårö enl. G. v. Ced. — N. till Finnm.) *Föga* skiljd från följ. Bladskäften *n. trinda* med en *grund fåra* ofvanpå. — *A. Archangelica β* Wg.

- 3 *A. Archangelica* L. allm. bladskäften ofvanpå *platta*; bladen som föreg. med *dubbel*-sågade småblad, uddbladet 3klufvet; flockskäft. meränd. *platta*; *sidoslock*, *högre* än den *mellersta*; delfr. *som föreg.* 2½ 7, 8, gulgr. blr. Fig. Sv.B.633. Fl.D.206. H.N. f.11, n:o 27.

Fjelltr. (Lpl.—Dal. — N.) Stjelken 5—6 *qv.* hög, *alldeles* *trind*; *rotbl.* 2—3 *fet* *breda* med 2—3 *tum långa*, *under grågula* *fikar*; *flockarne* 8—12 *tum vida*. — *Archang. officinalis* Fr.

169. *IMPERATORIA* Lin. Mästerrot.

- 1 *I. Ostruthium* L. bladen dubb. 3fingradt delade; sido-småbladen *djupt* 2klufna, uddbladet 3klufvet, *flikarne* *oval*, *olikformigt* *grofsågade*. 2½ 7, hv. blr. Fig. Sv.B.368. H.N.f.5, n:o 13.

Skogsäng. r. (Hall. Boh. Sörbygden. Smål. Femsjö i Elfdalen; Jönköpingstrakten, vid Sanna; Bredaryds sn, Anneberg; Åhs och Odensjö m. fl. st. i vest. delen. VG. Frödered sn, torpet Källebacka. Daläl. vid Fölens gåstagg. Verm. Vestgård i Emterviks och vid Ränneherget i Östmarks sn. Vestml. nära Stjernfors bruk. Dal. Lima och Transtrand. ÖG. flerst. i Åtvedstrakten; Sommarhygden; samt mell. Vettern och Stångån enl. Kindb.) *De öfre bladen enkelt 3fingr. delade*.

170. *PEUCEDANUM* Lin. Mossrot.

- 1 *P. palustre* Mönch: stjelken *kantig* och *strimmig*; bladen 3dubb. parbladigt delade *mångpariga*, med *jernbredt lancettlika*, *kortspetsiga* *fikar*; svepebl. *small lancettlika*; flockstrål. *finludna*. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.380. Fl.D.257 och 412.

Kärräng. stränd. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl.) *De findelade bladens omkrets triangulär*; småbladens skäft *icke tillbakaböjda*. — *Selinum* L. *Thyselinum* Hoffm.

- 2 *P. Oreoselinum* Mönch: stj. *trind* och *strimmig*; bladen 3dubbelt parbladigt delade med småbladens skäft *tillbakaböjda*, bladflikarne *vigglika*, *insurna*; svepebl. *trådsmla*; flockstrål. *n. glatta*. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1750. H.N.f.2, n:o 38.

Torra betesm. och sandfält. r. (Sk. teml. allm. i öst. delen från Stenshufvud till Ystad, samt h. o. d. i de inre delarne enl. F. Aresch. Öl. Sandby och Gårdby på öst. sidan; samt Wickley, Resmo och Borghyborg på den vestra enl. Sjöstr.) — *Athamanta* L. *Selinum* Lin. Sk. resa.

171. *SELINUM* Lin. Kruffrö.

- 1 *S. Carvisolia* L. stjelken *fårad* med *kinnaktiga* kanter; bladen 2—3dubb. parbladigt delade *mångpariga*, med skäft *n. utan* *slidor*; *flikarne* *small afånga uddspetsiga*; svepebl. *jernbreda*. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.667.

Skogsång. (Sk.—Rosl. Vestml. Ner. Verm. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. södra del.)  
*Bladens omkrets äggrund ell. något aflång.*

- 2 *S. lineare* Schum. stj. strimmig, upptill något hvasskantig; bladen dubb. parbladigt delade, med långa slidor:flik. långa, n. jemnbreda, spetsiga; svepebl. n. hårfina. 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1330. H.N.f.4, n:o 30.

Bland buskar, r. (Smål. från Blekingegränsen till Döderhult, t. ex. Söderåkra, Ljungby, Arby, Kalmar etc. Öl. från Ottenby upp till Böda.) *Älnshög, med de öfre bladen föga längre än de n. 2 tum långa, stjelen insvepande slidorna; bladflik. smala, 1—1 tum långa; delfr. med djupa åsdålder.* — *Cnidium venosum* Koch.

### 172. CONIOSELINUM Fisch. Finnkarv.

- \*1 *C. Gmelini* (Bray): stj. strimmig, glatt; bladen n. 3dubb. parbladigt delade, med långa och breda slidor; de i korta aflånga flikar delade småbladens omkrets äggrund; svepebl. n. hårfina, lätt affallande. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Gmel.Fl.Sib.1,t.44. Reich.t.78. H.N.f.8, n:o 17.

Fukt. gräsbevuxta st. i fjelltr. r. (N. Vest-Finnm. Alten vid Bossekop, Hjemmeluft, Qveenigen, Elvbacken; Mageröde: Th. Fr. etc.; Ost-Finnm. vid Varangerfjorden flerst., t. ex. Vester-elven, Gornitak. Vadsö.) 2—3 quart. hög, med vida, tumslånga, från stjelen snart utvikta bladslidor, talrika flockstrålar. — *C. tataricum* Fisch. och Fr.S.V.Sc. C. Fischeri Wim. & Gr. *Selinum* ed. 9.

### 173. SILAUS Bess. Ängsticka.

- 1 *S. pratensis* Bess. stj. nedtill trind, upptill kantig; bladen 2—3dubb. parbladigt delade, med jemnbredt lancettlika uddspetsiga ådriga flikar; enskildta svepet af småflockens längd. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.suppl.69. H.N.f.1, n:o 24.

Skogsång. r. (Sk. i Hörteskog nära Trelleborg; Almaröd; Malmö, vid Rosenlund.) *Liknar Peuced. palustre, men har smärre, 5—8stråliga, meränd. svepelösa flockar.* — *Peuced. Silaus* L. *Cnidium* Sm.

### 174. HALOSCIA Fr. Strandsticka.

- 1 *H. scoticum* Fr. stjelen trind; bladen dubb. 3fingradt delade; småbladen snedt äggrunda, ofvan midten grofsågade, med vigglik helbräddad bas. 2 7, hv. blr. Fig. Sv.B. 622. Fl.D.207. H.N.f.11, n:o 28.

Häfsstr. bland klipp. r. (Sk. Kullaberg; Torrekov m. fl. st. i n.v. delen. Hall. Boh. — N. hela kusten till Finn.) *Omkring fotsög, till alla delar glatt, med tumsbreda småblad, lukt och smak af Libsticka.* — *Ligusticum* L.

### 175. LIBANOTIS Crantz. Säfferot.

- 1 *L. montana* All. stjelen färdt kantig; bladen parbladigt delade; småbladen par-delade ell. ånyo parbladigt delade med inskurna flikar; frukten luden. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.760. Fl.D.754. H.N.f.12, n:o 45.

Ångsback. (Smål. öst. delen. — Gestr. Vestml. Ner. VG. Öl. Gottl. — N. södra del.) *Blomflockarne vanl. mycket täta, konvexa; fruktflock. platta ell. n. konkava.* — *Athamanta Libanotis* L.

### 176. ÆTHUSA Lin. Vildpersilja, Glis.

- 1 *Æ. Cynapium* L. stjelen färdt; bladen dubb. parbladigt delade; småbladen par-delade och inskurna, med lancettlika flikar. ☉ 6—8, hv. blr. Fig. Sv.B.64. Fl.D. 1991.

Öd. st. kryddgård. a. (Sk.—Helsl. Ångml. Hernösand: Arn. Dal. Verm. och Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Till alla delar glatt; bladen tunna och glänsande; svepet längre än småflocken, nedböjdt.*

### 177. OENANTHE Lin. Ståkra.

- 1 *O. fistulosa* L. rotbladen 2—3dubbelt, de öfre bladen enkelt parbladigt delade, med korta, n. jemnbreda flikar, ihåliga skaft. längre än sjelfva bladet; allm. blomflock. 2—4stråliga. 2 7, hv. blr. Fig. Sv.B.619. Fl.D.846. H.N.f.2, n:o 39.

Fukt. st. vattengrop. (Sk. Hall. Smål. Kalmar, Hosmo-å och Berga. Gottl.) *Rot-trädarna till en del uppsvållda till ovala knölar; flockens kantbl. stora och oregelbundna, könlösa.*

Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).



- 2 *O. Phellandrium* Lam. stjelkbladen 3dubb. parbladigt delade, med småbladsskaften tillbakaböjda, samt aflånga trubbadlika flikar; flock. mångstråliga.  $\gg$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.155. Fl.D.1154.  
 Vatten. (Sk.—VB. Dal. Verml. — N.P.) Bladflikarne små, under vattnet stundom hårfina. — *Phell. aquaticum* L.

178. *CICUTA* Lin. Sprengört, Bunarot.

- 1 *C. virosa* L. bladen dubb. parbladigt delade med dels enkla, dels sammanflytande, lancettlika hvass-sågade flikar.  $\gg$  7, 8, hv. blr. —  $\beta$  *tenuifolia*: bladflik. liniebreda, grundt och glest sågade. Fig. Sv.B.134. Fl.D.208. Fl.N.1,1,2.  
 Vatten. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl. —  $\beta$  Verml. Ekshärads prestgård. VB. Salmi-nanti. Torn. Lpm.) Glatt värt af alnshöjd ell. mera, med omkr. 2 tum långa,  $\frac{1}{2}$  t. breda bladflikar;  $\beta$  knappt med tumslånga. Roten stor, rundadt aflång och ihålig, mycket giftig.

179. *APIUM* Lin. Selleri.

- 1 *A. graveolens* L. de nedre bladen parbladigt, de öfre 3fingradt delade, med vigglika inskurna småblad; sido-blomflockarne i bladveckan, med inga ell. korta skaft.  $\gg$  7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.790.  
 Hafsstr. och vallar, r. (Sk. vestra kusten, t. ex. Hvellinge; Malmö; Landskrona etc. Gottl. — N. sydl. kust.) Glatt och glänsande med stark lukt.

180. *ÆGOPODIUM* Lin. Kirsål, Qvaller.

- 1 *Æ. Podagraria* L. bladen dubb. 3fingradt delade; småbladen äggrunda med snedt hjertlik bas.  $\gg$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.147. Fl.D.670.  
 Od. st., lundar, a. (Sk.—Hels. Ängml. allm. i Viksjö enl. Lem. Vestml. Verml. Dalsl. Öl. Gottl. — N.) Hela växten glatt, 3—4 fot hög.

181. *CARUM* Lin. Kummil.

- 1 *C. Carvi* L. bladen dubb. parbladigt delade med findelade småblad.  $\gg$  6—8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.115. Fl.D.1091.  
 Äng. och renar, a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnsm.: Norm.) Fotshög, glatt. — *Bunium* Godr. & Gren.

182. *BUNIUM* Lin. Jordnöt.

- \*1 *B. flexuosum* With. stjelken nedtill bladlös; stjelkbladen n. oskaftade, dubb. parbladigt delade i n. jemnbreda inskurna flikar; stiften hos frukten upprätta.  $\gg$  6, 7, hv. blr. Fig. E.B.988. H.N.f.13, n:o 41.  
 Torra st. sandback. r. (N. mellan Stavanger och Nordmör. t. ex. Mundeim; Storöen; Aalesund: Dr P. Olsson; Molde etc.) Stjelken fotshög, mycket smal ned mot den rundadt knölformiga roten; rotbladen skaftade, 3dubb. parbladigt delade. — *Carum* Fr. S.V.Sc. *Conopodium denudat.* Koch och Fr. H.N.

183. *PIMPINELLA* Lin. Bockrot, Anls.

- 1 *P. magna* L. stjelken fåradt kantig; bladen parbladigt delade, med utdraget äggrunda spetsiga, inskuret sågade, glänsande småblad, 3flikigt uddblad; äfven de öfversta bladens småblad äggrunda ell. lancettlika, sågade.  $\gg$  7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.741. Fl.D.1155. H.N.f.2, n:o 41.  
 Äng. r. (Sk. mångenstād. i vest. delen. Smål. Ökna mell. Emhult och Åsgärde; Rödsle nära Vestervik. ÖG. flerst. enl. Kindb. Södm. Tullgarn nära slottet, ymnig. Öl. mell. Mörbylånga och Borgby; Sandby och vid Vickleby. Gottl. mell. Arshamn och Vialmsudde.) Småbladen större mer utdraget ell. lancettlikt äggrunda än hos följ.; de öfversta, vid blomflockarne, af samma form, icke så smal-flikiga som hos denna. Var. i Sk. och på Gottl. med parbladigt delade småblad: var. dissecta.  
 2 *P. Saxifraga* L. stj. trind och strimmig; bladen parbl. delade, de nedre med rundade ell. bredt äggrunda trubbiga sågade småblad, de öfre med smalt jemnbreda helbräddade flikar.  $\gg$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.160. Fl.D.669.  
 \* *nigra* W. roten innehållande en blå saft.

Äng. a. (Sk.—Um. Lpm.—N. till Nordl.—\* Sk. Limhamn m. fl. st. enl. Aresch. ÖG. flerest.: Kindb. Öl. Götll.) Var. som föreg., samt glatt och småluden. — *P. nigra*, hvars rotsaft blir i luften blåaktig, skiljes af Koch med ludna flockstrålar, en hårrighet, som är lika obeständig som stjelnens.

184. *FALCARIA* Host. Skärfloka.

1 *F. Rivini* Host: bladen 3fingradt delade i dels hela, dels 2—3delade, långa och n. jemnbreda flikar med brosklikt kantade sågtänder. 2½ 7, hv. blr. Fig. Sv.B.621. Fl.D. 1749. H.N.f.2, n:o 40.

Torra åkrar, r. (Sk. vid byn Glemminge i Ingelstads härad. Götll. söder om Visby.) Blåaktig glatt, alnshög växt, med läderartade, 2—6 tum långa bladflikar, trådmala svepen. — *Sium Falcaria* L. *Critamus* Reich.

185. *SIUM* Lin. Märke.

1 *S. latifolium* L. stjelnken såradt kantig; stjelkl. enkelt parbladigt delade; småbladen utdraget lancettlika ell. jemnbreda, n. likformigt sågade, med uddspetsade sågtänder; blomflock. långt skäftade; svepebl. helbrädd. ell. tandade. 2½ 7, 8, hv. blr. — *β longifolium*: småbl. jemnbreda och något krökta. Fig. Sv.B.178. Fl.D.246.

Vatten. (Sk.—VB. och Um. Lpm. Boh. Öl. Götll. i Wall. — *β* ÖG. Norrköp. på Bykholmen; Egebylund i Mjölby: Kindb. Göteborg, Quillebäcken etc. Hall.) 3—4 fot hög, med flere tum långa flockskäft. Rotbl. dubb. parbladigt delade. — *β* har 2—4 tum långa, 2—3 linier breda småblad.

2 *S. angustifolium* L. stjelnken trind och strimmig; bladen enkelt parbladigt delade; småbladen åggrunda—lancettlika, olikformigt hvass-sågade, vid basen något inskurna; sidobloflock. kort skäftade. motsatta bladen; svepebl. vanl. flikiga. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.620. Fl.D.247. H.N.f.1, n:o 25.

Vatten, r. (Sk. allm. Blek. Sölvisborg; Sissebäck och Ynde: Gosselm. ÖG. Vallerstad sn, Skenaån. Hall. Boh. Möllö. Öl. Götll.) 1—2 fot hög, med 1—2 tum långa flockskäft. — *S. nodiflorum*, samt enl. Fries *Oenanthe crocata* L.Fl.Su. *Berula* Koch.

186. *HELOSCIADIUM* Koch. Kärrfloka.

1 *H. inundatum* K. de nedre bladen dubb. parbladigt delade i härfinaflikar, de öfre enkelt parbl. delade i vigglika 3klufna flikar; blomflocken 2-, säll. 3strålig, fåblommig. 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.740. Fl.D.89. H.N.f.1, n:o 26 och f.8, n:o 18.

Vattengrop., öfersv. st. r. (Sk. Christianstad; Ystad; Skanör; Lund; Landskrona; Kullaherg etc. Hall. Varberg; Onsala sn, nära Stenkilsås etc. Dalsl. i Orselven vid Vestergrården och Krokfors i Ör sn. Blek. Ronneby; Säby i Ramdala m. fl. st. Smål. Söderåkra i Kalm. län; Applerum i Thorsås enl. Ekstr.; i Vexjö län flerest. enl. Scheutz. Öl. Näsby i Åhs sn enl. Lemm.) 1 djupare vatten stund. fotlång, simmande, på uttorkade ställen 3—4 tum lång och krypande; småflock. 3—6 blommiga. — *Sison* L.

187. *BUPLEURUM* Lin. Harfloka.

1 *B. tenuissimum* L. stj. grenig; bladen hela jemnbreda, spetsiga; blomflockarne nästan hufvudlika skiftevisa, af det 5bladiga svepets längd. 7, 8, gulakt. blr. Fig. Sv.B. 618. Fl.D.1090. H.N.f.1, n:o 27.

Hafstr. och torra st. r. (Sk. här och der från Landskrona till Skanör; samt vid Ystad: F. Aresch.; Lund vid Fogelsång etc. Blek. Carlskrona; Ronneby; Smål. Kalmar. Öl. Götll. Sanda; Sproge; Öja sn, vid Stockviken; Visby; G. v. Ced.) Har 6—10 tum långa trådmala uppstigande stjelnkar. — *Odonites* Spreng.

188. *SANICULA* Lin. Låkeört.

1 *S. europæa* L. stj. enkel, bar ell. enbladig; bladen handdelade i 3—5, vigglika 3klufna ell. inskurna och sågade flikar; småflock. hufvudlika. 2½ 7, hv. rödl. blr. Fig. Sv.B.245. Fl.D.283.

Lundar. (Sk.—Gestr. och Vestml. VG. Dalsl. Boh. Smörkullen; Uddevalla; Christinedal. Hall. Särö; Hallandsås: Fr. Öl. Götll. — N. till Molde.) Fotshög.

## 189. HYDROCYTILE Lin. Spikblad.

- 1 *H. vulgaris* L. stj. krypande och rotsläande; bladen sköldlika cirkelrunda, glest naggade; blomflocken hufvudlik, omkr. 6blommig, slutligen förlängd i form af ett kort, afbrutet ax. 2 7, 8, rödl. blr. Fig. Sv.B.617. Fl.D.90. H.N.f.16, n:o 31.  
Stränd, dik. etc. (Sk.—ÖG. Värna i Slutorp enl. Kindb. och VG. Lidköping i skogen Kartåsen; Thorsön i Ven.; Fritsla sn. nära torpet Hagen. Dalsl. Krokfors i Ör sn, samt nära Venersborg. Boh. Öl. Gottl. — N. söd. del, Lister etc.) *Blott bladen och blrna visa sig öfver jordytan.*

## 190. ERYNGIUM Lin. Manskraft, Martorn.

- † *E. maritimum* L. rotbladen hjertlikt rundade, jemte stjelklbladen veckiga, taggsågade och inskurna; blomflock. hufvudlika, skaftade, med 3gafflade fjäll mell. blrna. 2 7—9. Fig. Fl.D.875. H.N.f.14, n:o 23.  
Hafstr. r. (Sk.—Norra Boh. Blek. Sillnäs vid Torsövik: Gosselm. Öl. Byerum. Gottl. vid Ithrevik; Lummelund. — N. Listers fögderi. Hvalöarne i Smålehnene.) *Hela växten styf, blåaktig; bladen läderartade, taggiga; blrna ljusblå.*

- 29 Fam. ADOXEE E. Mey. Kronbl. vid basen hopväxta, i knoppen kantlagda. Stånd. dubb. så många som kronbladen, med enrummiga knappar. Fruktämne 4—5; rummigt, till hälften täckt af disken, slutl. bärligt fröhus med ett frö i hvarje rum.

## 191. ADÖXA Lin. Desmeknopp.

- 1 *A. Moschatellina* L. rotbl. långt skaftade, dubbelt 3fingrade; stjelkl. 2, motsatta, 3-fingr.; alla medflikade småbl. 2 4, 5, gr. blr. Fig. Sv.B.435. Fl.D.94.  
Skugg. back. (Sk.—Medelp. och Jemt. Öl. Gottl. — N. till Ost-Finnm.) *Blomhufvudet af en ärts storlek. Örten luktar Moschus.*

- 30 Fam. ACERINEZE DC. Kronbl. i knoppen tegellagda. Fruktämne fritt, 2—3rummigt, med 2 fröämnen i hvarje rum; slutl. vingfrukt ell. läderartadt fröhus.

## 192. ACER Lin. Lönn.

- 1 *A. platanoides* L. bladen handlikt 5flikiga, glatta, med spetsade flikar och tänder; blomskäften glatta, i upprätt qvast. 5 5, g. blr. Fig. Sv.B.86.  
Skogsäng. byar. (Sk.—Ängml. Nora sn, Bölesta och Skuluberget. Jemt. Stugu sn. Dal. upp till Hykjeberget. Verm. Boh. Koster. Öl. Gottl. — N. Aggerhus och Christiansands st. Bergens st. sällsynt. Romsdalen: Gunn.) *Högt träd med stora tunna blad.*  
2 *A. campestre* L. bladen handlikt 3—5klufna, med trubbiga, inskurna ell. groftandade flikar; blomskäften småludna, i något lutande qvast. 5 5, gr. blr. Fig. Sv.B.409. Fl.D.1288. H.N.f.2, n:o 37.  
Back. r. (Sk. Svedala sn nära Brännemölla och Aggarp på Nafverbacken; i skogen vid L. Lindholmen enl. F. Aresch. Skall äfven finnas i skogar vester om Sönnerskog.) *Litet träd eller buske.*  
†3 *A. Pseudoplatanus* L. bladen som föreg. med spetsiga olikform. grofsågade flikar, under blekare; blrna i hängande klasar. 5 5, gr. blr. Fig. Fl.D.1575.  
Byar, r. (Sk. planterad vid vägar etc., mer sällan ända upp till Helsl. — N. i södra delen planterad.) *Högt träd; frukten med mindre usperrade ringar än hos de föreg.*

## 193. ÆSCULUS Lin. Hästkastanie.

- †1 *Æ. Hippocastanum* L. bladen 7—9fingrade; småbladen vigglika spetsade sågade. 5 5, hv. blr. Fig.

Planterad. (Sk.—Helsl. — N.) Högt träd med blr i stora upprätta klasar, samt stull. med stora, meränd. groftaggiga fröhus.

---

31 Fam. **RESEDACEÆ DC.** Blr oregelbundna. Kronblad i knoppen åtskiljda. Fröh. i toppen öppet, enrummigt, med fröfästen i fogarne mellan skalén.

194. **RESÉDA Lin.** Wau.

1 *R. Luteola L.* bladen lancettlika, helbräddade; med en omärkl. tand vid basen; blrna oskaftade i tätt och smalt ax; fodr. 4deladt.  $\curvearrowright$  7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.82. Fl.D.864. H.N.f.1, n:o 32.

Sandback r. (Sk. Helsingborg, Landskrona, Lund, Ystad, Gladsax, Åhus etc. *Blek.* Sölvisborg; Carlshamn och Silltorp: Gosseln. *Smål.* Kalmar; Ljungby sn, Harby gästg.; Visingsö. *Hall. Boh.* på Koön. *Öl. Gottl.* Othem sn, på Enholmen ymn.; Slite och Visby. I de öfre prov. någon gång förvildad ell. införd med ballast. — N. Christiania, förvildad: Ax. Bl.) *Axet från 3 tum till mer än fotslångt.*

---

## 5 KLASSEN

# SERTIFLORÆ.

32 Fam. **NYMPHÆACEÆ DC.** Kronbl. i flere kransar, öfvergående i äfvenledes talrika ståndare. Frukt läderaktigt, mångrummigt fröhus med fröfästen på väggarne.

### 195. NYMPHÆA Lin. Näckros.

- 1 *N. alba* L. bladskaften *trinda*; bladen rundade, med hjertlik bas, platta helbräddade; pist:s märke 10—20stråligt. 2½ 7, hv. blr. — *β biradiata* Som. märket tecknadt med en stor stjernformig mörkröd fläck. — *γ rosea*: blr stora, rosenröda. Fig. Sv.B.92. Fl.D.602. *β* Reich.D.Fl.f.119. *γ* H.N.f.16, n:o 32.

Sjöar och vattenpöl. (Sk.—Lul. Lpm. och nor. del. af VB. Boh. Öl. Goutl. — *N.* till Nordl. — *γ* Ner. i sjön Fagertårn på Tiveden.) *Blrna utbredda ofta 4 tum vida, stund. blott hälften så stora, då äfven bladen blifva små. Inskärningen mell. flikarne vid bladens bas än smal, än bred; märket gult, brandgull ell. rödt.*

### 196. NUPHAR Sm. Näckblad.

- 1 *N. luteum* Sm. bladskaften *upptill 3kantiga*, en kant rundad; bladen rundadt elliptiska med hjertlik bas; ståndarknapp. *jembredt aflånga*; märket 10—20stråligt, odeladt. 2½ 7, g. blr. — *β minus*: blr små, omkr. en tum i diam.; märket 10—12stråligt. Fig. Sv.B.266. Fl.D.603.

Sjöar, a. (Sk.—Lpl. Boh. Goutl. — *N.* — *β* Lpl. Karesuando.) *Kronbl. mycket små i jemförelse med de stora gula foderbl.; stånd.-knapparne 2—3 gånger så långa som breda. — Nymphæa L. — Möjl. tillhör β följ., då bladskaftets form på de pressade ex. ej kunnat utrönas. En medelform till β har O. Nordst. såndt från VG. — Enl. Läst. skulle närv. och följ. arter endast vara lokalformer af en och samma art.*

- 2 *N. intermedium* Ledeb. bladsk. *plattade*; bladen och ståndarkn. *som hos föreg.*; märket 9—15stråligt, helt ell. något *flikadt*. 2½ 7, 8, g. blr. — *β? Spennerianum*: bladen små med frånstående basflikar; kronbl. teml. stora, vigglika; märket omkr. 10tandadt ell. flikadt. Fig. H.N.f.14, n:o 24. *β* Reich.D.Fl.f.116.

Sjöar. (Torn.—Pil. Lpm. VB. nor. del., t. ex. i Gäddträsk ymnig. Jemtl. Ovikens sn. vid Kjanneråsbodarne. — *N.* Finnmark. Karasjok: Norm.) *β synes tillhöra denna art, ehuru bladskaftens form ej kan bestämmas. Var i VB. med på undre sidan mer och mindre till smätudna blad; vanligast äro de glatta.*

- 3 *N. pumilum* DC. bladskaften *trubbigt 3kantiga*; ståndarkn. n. *kvadratiska*, blott en half gång längre än breda; märket omkr. 10stråligt, flikadt. 2½ 7, g. blr. Fig. Reich.D.Fl.f.115.

Bäck. dammar, r. (Smål. Gärdserum sn. i flere sjöar. ÖG. teml. allm. i Åtvedstrakten enl. Kindb. Dal. i Nässjön nära Hykjeberget. Helsl. Aktjärn och Lillbotjärn i Arbrå: Stud. E. Collinder. Ångml. Arnäs sn. i Prostjärn och Elfsjön; Själevad sn. i Lomsjön. VB. Småträsk i Neder-Kalix: Reutergrn. Um. Lpm. Fatsjön i Wilhelmina sn. Torn. Lpm. i bäckar vid Muonio elf upp till Karesuando. — *N.* Christia-

nia; Tellemarken; Valders; Gudbrandsdalen, söder om Laurgaard. Bergen etc. Ost-Finnm. Colmijaure vid Svanvik.) *Blrna ej större än på Caltha pal.*; *bladen omkr. 2 tum breda. Kronbladen små, omv. aggrunda. Var. liksom föreg. med under småtuden blad.* — *N. minimum* Sm.

**33 Fam. RANUNCULACEÆ Juss.** Blomhylla enkelt, ell. dubbelt af skiftevisa foder- och kronblad. Stånd. vanl. talrika. Frukt af flere fria karpeller [sällan hopväxta till ett bär].

**1 Flocken Ranunculeæ.** Kronbl. med honingsgrop på klon. Karpeller nötlika, slutl. enfröiga.

197. *RANUNCULUS* Lin. Solögon.

† Kronbl. 5, hvita.

**1 R. glacialis** L. stjelken upprät, *1—2blommig*; rotbladen skaftade, jemte de nedre stjelkl. *3fingradt delade*, med djupt 3flik. och inskurna småblad; blomfodr. *qvartsittande, brunulligt*; karpellerna halfmånlika hinnryggade. 2 7, 8. Fig. Lin.Fl.L. t.3,f.1. Sv.B.747. Fl.D.19. H.N.f.9, n:o 30.

Hög fjellv. (*Lpl.—Herjed.* — *N.*) *I Jemtland är denna art vanl. 1-, i Lpl. 2-, sällan 3blommig, quartershög. Blrna stora, med utvändigt rödvioletta kronbl.*

**2 R. aconitifolius** L. stjelken upprät *grenig, mångblommig*; bladen *djupt 3—7klufna*, med ovala inskurna och grofsågadeflikar; bl.fodret *snart affallande, glest hvithårigt*; karp. utan hinnkant. 2 7, 8. Fig. H.N.f.8, n:o 28.

Fjellv. r. (*Jemt. Stor-Li* etc.; flerst. i Frostviken; Fölinge sn. *Herjed.* från Sylfjellen ned till Funnes- och vest. Tenndalen. *Dal.* Särna på Fulufjellen. — *N. Kälåhögen; Ridalen; Holtaalen; Dovre; Romsdalen; Filefjell; Valders* etc. ned till Håckefjell.) *1—3 alnar hög, med blad, som likna Stormhattens.* — *R. platanifolius* Godr. & Gren.

†† Kronbl. gula; örtbl. odelade.

**3 R. Lingua** L. stjelken upprät; bladen *utdraget lancettlika, långspetsade*, glest nagg-tandade; karpellerna med *utdraget kroklikt spröt.* 2 7, 8. Fig. Sv.B.636. Fl.D.755. Å- och sjöstrand, i vatt. (*Sk.—Helsl. Jemt.* Håsjö sn; Ragunda i elfven. *Dal. Verm. Dalsl. Boh. Ramtjärn i Näsinga* enl. Lem. *Hall. Öl. Gottl.* — *N. i Vigsån nära Korsegården vid Mjösen.*) *Ofta alnshög och deröfver, bladen quarterslånga, med korta ell. inga skaft; blrna tumsvida. Var. glatt och stråfhårig.*

**4 R. ophioglossifolius** Vill. stjelken upprät; bladen *aflånga ell. elliptiska*, de nedre n. hjertlika. *alla trubbiga*; karp. *stråfva* af upphöjda knölar, med kort spröt. ☉ 6. Fig. H.N.f.16, n:o 33.

Kärr. r. (*Gottl. ½ mil n. om Visby* vid vägen till Skälsö i Väskekinde sn.) *Från några få tum till omkr. fots hög med pipig stjelk; öfre bl. n. oskaftade, de nedre långt skaft., dels helbräddade, dels naggågade.*

**5 R. Flammula** L. stjelken *uppsittande eller krypande* [säll. upprät]; bladen *aggrundt lancettlika—jemnbreda, kortspetsade ell. trubbiga*, glatta; karp. *slåta ell. gropigt punkterade*, med mycket kort spröt. 2 7. — *β reptans*: stjelken trådlik, båglikt krypande; bladen n. trådsmla. Fig. Sv.B.117. Fl.D.575. *β* Lin.Fl.L. t.3,f.5. Fl.D. 108. H.N.f.10, n:o 27.

Kärr. strand. a. (*Sk.—Lpl. — N.*) *α har ofta fingerbreda blad, men öfvergår utan gräns i β, som är Linnés R. reptans. Första rotbladen på våren aggrunda och, då de växa i vatten, långt skaftade och flytande; likna då bladen af Alisma natans.*

††† Kronbl. gula; örtbl. flikiga ell. delade.

\* Stjelken krypande, med enkla blomskäft i bladvecken.

**6 R. lapponicus** L. bladen glatta *3delade*, med bredt spadlika, naggade eller inskurna

flikar; blomskafsten upprätt, enblommiga, bladlösa ell. enbladiga; karp. med *utdraget*, krökt spröt. 2 6. Fig. Lin.Fl.L.t.3.f.4. Sv.B.749. Wg.Fl.L.t.8. Fl.D.2292. H.N.f.3, n:o 28.

Fukt. st. i fjelltrakter, r. (*Torn.—Um. Lpm. Jemtl.* Oviksfjellen; Sunne, Offerdahl och Ström snr. *Herjed.* vid Kolsätt. *VB.* Skellefteå, Falkberget. *Ängml.* Vallsjö i Sollefteå; Hellgum, Edsele och Ramsele snr: Arn. *Medelp.* Sättna, vid Flata fabodar. — *N. Finnm.* Anarjok och i Sydvaranger vid Pasvig-elv: Norm.) *Egentl. stjelen kryper lik en rot under jorden eller i mossan, uppskjulande i lederna blad och quartershöga blomskafst. Blomfodr. mest af 3, och kronan af 7, små blad, hvilket dock varierar; karpell. föga längre än deras spröt. — Coptidium ranunculoides Beurl.*

7 *R. hyperboreus* Rottb. bladen 3klufna, med aflånga, helbräddade, trubbiga flikar; blomskafsten korta, enblommiga, bladlösa; karp. n. utan spröt. 2 7. Fig. Sv.B.710. Fl.D.331. H.N.f.5, n:o 25.

Fukt. st. i fjelltrakter, r. (*Torn. Lpm.* flerst. t. ex. Kedkesuando, Naimakka, Kilpisjärvi, Jukkasjärvi etc. *Lul. Lpm.* Sirkosluokte vid Wirihau. *Pit. Lpm.* Akarisfjell: H. Widm. *Jemtl.* Ovikens sn, vid Elnäset och Borgen; Bergs sn, vid Vigge. *Dal.* Idre, vester om Djupgrafsstöten vid Löfsäsen. *VB.* vid Öfver-Torneå. — *N. Varanger;* Vadsöe; Bossekop etc. Salten; Dovre: Tronsfjellet etc.) *Blomskafsten tumslånga; ganska små blr med oftare 3 ell. 4 kronbl. Karpell. hafva omogna ett kort, klotlikt stift, som stult. n. alldeles försvinner.*

\*\* Stjelen uppstigande ell. upprät, enblommig.

8 *R. pygmaeus* Wg. stjelen uppstigande; rotbladen n. njurlika, djupt 3—6klufna, med helbräddade flikar; blomfodret föga hårigt, n. längre än kronbladen; karpell. med kort spröt. 2 7, 8. Fig. L.Fl.L.t.3.f.3. Sv.B.748. Wg.Fl.L.t.8. Fl.D.144. H.N.f.7, n:o 28.

Fjellv. (*Lpl.—Herjed. — N.*) Blommande 1—3 tum hög; vid fruktmogn. ofta quartershög, men mycket spenslig. — *R. nivalis* β L.

9 *R. nivalis* L. stjelen upprät; rotbladen njur- eller hjertlika, nedom midten 5—7klufna; stjelen bladen djupt 3—5klufna med helbräddade flikar; blomfodret brunludet, dubb. kortare än kronbladen; karp. med utdraget, krökt spröt. 2 7, 8. Fig. Lin. Fl.L.t.3.f.2. Sv.B.394. Wg.Fl.L.t.8.f.3. Fl.D.1699. H.N.f.7, n:o 27.

Högre fjellv. (*Torn. Lpm.—Jemtl.* Ekorrdörren. — *N. Finnm.* allmän. Dovre, på Finnshöe m. fl. st. ofvanför Drivstuen och Vaarstien, samt på Knudshöe.) *Omkr. quartershög; bladen glänsande, med 3 hufvudflikar, den mellersta hel, sidoflikarne inskurna; blommorna guldgula.*

\*10 *R. altaicus* Lax. stjelen upprät; rotbladen rundade eller viggförmiga [icke intryckta] vid basen, grundt mångflikiga; stjelen bladen 5—7flikade eller klufna till och nedom midten i lancettlika flikar; blomfodr. som hos föreg.; karpell. med något utdraget krökt spröt. 2 8. Fig. Fl.D.suppl.82. H.N.f.15, n:o 29.

Fjellv. r. (*N. Vest-Finnm.* Magerö, samt andra öar vid Nordkap. Ost-Finnm. Lebesbyfjellen, Langfjordfjellen etc.; Berlevaag.) *Vanl. större än föreg., bladen n. utan glans, blrna ljusgula. — R. niv. β sulphureus Wg.Fl.L. R. sulph. Fr. S.V.Sc.*

\*\*\* Stjelen meränd. upprät och flerbliommig; roten trådig.

a — Blomskafst släta [oreffnade]; karpell. ludna.

11 *R. auricomus* L. stjelen glatt, mångbliommig; rotbl. njur—hjertlika, meränd. djupt 3klufna ell. delade. stund. hela, groft naggtandade, under glatta; stjelen bl. oskafade, handdelade, med jemnbreda, vanl. helbräddade flikar; karp. dubb. längre än deras spröt. 2 5, 6. Fig. Fl.D.665.

Äng. a. (*Sk.—Lpl. — N.* till Ost-Finnm.: Norm.) *Var. med alldeles odelade och ända till basen handdelade rotbl.; de nedre stjelenbladens flikar äro stund. handklufna: var. palmatus. Den bladlösa slida, som hos R. cassub. omsluter basen af rotbladens skafst, saknas hos närr. art, hvars rotbl. i stället hafva skafstet vid basen vidgad till en slida.*

12 *R. cassubicus* L. stjelen som hos föreg.; rotbl. rundadt njurlika, odelade, groft naggtandade, under gleshåriga; stjelen bl. som hos föreg., meränd. med lancettlika,

*sågade* flikor; karp. *knappt* längre än sprötet. 2½ 5. 6. Fig. Fl.D.suppl.83. H.N. f.5, n:o 23, 24.

Skugg. st., äng. r. (*Gestr.* vid Fleräng. Grinduga. Kubbo m. fl. st. *Rosl.* i Vaddö; Grisslehamn etc. — *Uppl.* Ytterboda i Elfskarleby; Uppsala, vid Godtsunda och Vreta-  
udde; Hågeby; Öfver-Gran; Husbysjölöst. *Vestml.* Björnön och öst. Håstholmen i  
Vesteråsfjärden; Sättra brunn enl. Lemm. *Verm.* Aspsäter i Gilberga. ÖG. Runstorp  
i Kimstad enl. Kindb. *Smål.* Almesåkra: Zett.) *Gröfre än föreg.*; rotbl. äldre ofta  
4 tum breda, med skafstens bas innesluten i en vid, hinnaaktig slida.

b — Blomskaft släta; karp. glatta och släta.

13 *R. acris* L. stjelken meränd. *tilltryckt småhårig*; bladen 3—5delade, med inskurna  
flikar. håriga; öfre stjelklbladens flikar n. jemnbreda. 2½ 7, 8. —  $\beta$  *nothus*: rotbl.  
3fingradt delade, med skafade småbl. Fig. Sv.B.375. Fl.D.2415.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Var. från alnshög till några få tum hög, samt med  
gleselhåriga ända till silkesludna blad.*

14 *R. Friesii* Godr. & Gren. stjelken nedtill kort stråfhårig, upptill jemte bladen silkes-  
hårig; alla bladen likformiga, 3fingradt delade, med kort skafade, n. ruiformiga,  
djupt inskurna flikar. 2½ 7, 8. Fig. H.N.f.11, n:o 31.

Äng. r. (*Uppl.* Uppsala, på en äng bredvid Akademiens materialbod. — N. vid vägen  
mell. Aalesund och Steenvaagen: Doc. P. Olsson; i Torpen, vid Finden och Nörste-  
lien: Bl.?) *Större och gröfre än föreg.*, från hvilken den är väl skild genom de  
ända upp likformiga bladen, samt den utsperrade hårigheten på stjelkens nedre  
del och bladskafsten, hvari den mera liknar *R. lanuginosus*. Bladnerverna starkt  
upphöjda, hvitaktiga. — *R. silvaticus* Thuill. enl. Fr. *R. Steveni* Andr. enl.  
Beurl. *R. acris*  $\gamma$  *pubescens* Ax. Bl. Bot. Reise i Valders?

c — Blomskaften refflade; karp. glatta och släta.

15 *R. repens* L. stjelken uppstigande, med grenskott; bladen 3fingradt delade, med  
långt skafade, 3delade och inskurna flikar; blomfodr. *tilltryckt* (till kronan); frukt-  
fästet styfårigt. 2½ 5—8. Fig. Sv.B.400. Fl.D.795.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn.) *Har vanl. stora, höggula blr. Var. från  
glatt till silkesluden; funnen vid Strengnäs med upprätt stjelk, utan grenskott.*

16 *R. polyanthemus* L. stjelken upprätt, utan grenskott och knöl vid roten, utsperradt  
stråfluden, mångblommig; bladen djupt 3—5delade och flikiga, med n. oskafad  
ändflik; blomfodr. och fruktfästet som hos föreg. 2½ 6, 7. Fig. Fl.D.1700.

\* *nemorosus* DC. rotbl. klufna till  $\frac{3}{4}$  nära basen i 3—5, omv. äggrunda inskurna flikar.  
Fig. H.N.f.14, n:o 25.

Äng. (Sk.—Gestr. Helsl. i Tuna och Bergsjö: Wistr. Ängml. Nordingrå prestg. enl.  
Lemm. Dal. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Lofoten. — \* Gottl. mångenstädes.)  
2—5 qv. hög, med stora blr; hos hufvudformen äro rotbladen delade ända till  
basen. — \* *R. silvaticus* Thuill. enl. Godr. & Gr.

17 *R. bulbosus* L. stjelken upprätt, utan grenskott, uppsvåld till en knöl vid roten, ut-  
stående mjukhårig, fåblommig; bladen djupt 3delade, med bredt viggliga, klufna och  
tandade flikar, skafad ändflik; blomfodret nedböjdt; fruktfästet styfårigt. 2½ 5, 6.  
Fig. Sv.B.387. Fl.D.551.

Ängsback. a. (Sk.—Helsl. Söderhamn. Vestml. VG. Dalsl. Venersborg. Boh. Öl.  
Gottl. — N. Christiansand.) Stjelken quartershög, ofta enkel; i skugga stundom  
hög och grenig, hvarvid knölen vid roten n. försvinner och bladflikarne blifva n.  
lancettlika.

d — Karpell. upphöjdt grynprickiga ell. taggiga.

18 *R. Philonotis* Ehrh. stjelken hårig, mångblommig; bladen 3fingradt delade, med  
breda, 3delade och inskurna flikar; blomskaften refflade; foderbl. nedböjda, af  
halfva kronbls längd; karp. omkring kanten grynprickiga. 2½ 5—8. Fig. Fl.D.  
1459. H.N.f.7, n:o 26.

Äng. och äkerrenar. r. (Sk. Trelleborg; Håjebro. Blek. teml. allm.: Goss. Boh.  
Kodn enl. G. v. Ced. Öl. vid Näsby i Åhs; Gamlegårde i Ventlinge; Sjöstr. Gottl.  
allm. i sydv. del.; samt Hallgårds i Östergarn. Hörsnö sn etc. — N. Söndmör?)  
Stj. grenig, stundom föga hårig. — *R. hirsutus* Curt.



- 19 *R. arvensis* L. stj. glatt ell. omärkligt hårig, mångblommig; bladen 3fingradt delade i smala, änyo delade småbl. med n. jemnbredaflikar; blomskäften släta; foderbl. tilltryckta, n. af kronans längd; karp. taggiga, kanttaggarne störst. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.537. Fl.D.219. H.N.f.8, n:o 27.  
Åkr. (Sk. Blek. Smål. Kalmar; Gamleby; Nygård i Lofta. ÖG. öst. Ryd. Södm. Bergshammar sn, vid Vreta enl. C. Ind. Stockh. på Lidingsön och Lofön. Uppl. Frötuna m. fl. st. Hall. Öl. Gottl. — N. söd. del. på ballast: Ax. Bl.) Stj. 1—3 qv. hög, nedtill glatt, högre upp med mycket glesta, tilltryckta hår.

\*\*\*\* Stj. upprätt, flerblommig; roten knölig.

- 20 *R. illyricus* L. stj. vitullig, fåblommig; bladen delade i 2—3, hela ell. 2klufna, jemnbredt lancettlika, helbräddadeflikar. vitulliga; blomskäften släta; foderbl. nedböjda. 24. 6. Fig. Fl.D. suppl. 1, t. 19. H.N.f.4, n:o 40.  
Sand. st. r. (Öl. mångst. på både öst. och vest. Landtborgen, t. ex. Hulterstad, Sandby, Thorslunda, Glömminge m. fl. snr. Förvildad vid Stockh. i Beylons park.) Blrna mycket stora; roten af ell. rundadt knippe grofva grynlika knölar; bladen stundom odelade.

### 198. BATRACHIUM Wimm. Grodnate.

† Kronblad gula.

- 1 *B. sceleratum* Th. Fr. bladen djupt 3klufna, med trubbigt inskurnaflikar; de öfre delade n. till basen i lancettlika—jemnbredaflikar; foderbladen nedböjda, längre än kronbl. slutl. kortare än det utdragna fruktfästet. ☉ 6—8. Fig. Sv.B.412. Fl. D.571.  
Vid och i grundare vatt. a. (Sk.—Um. Lpm. — N.) Var. till storleken, från n. alshög till ett par tum, samt dels, på det torra, upprätt, dels, i vatten, flytande; blrna mycket små. — *Ranunculus* L.

†† Kronblad hvita; fruktfäste hårigt. [*Ranunc. aquatilis* L.]

\* Alla blad nedsänkta likformiga, delade i hårfinnaflikar.

a — Bladen oskaftade, flere gr kortare än blomskäften.

- 2 *B. marinum* Fr. stj. trind; bl. med oregelbunden omkrets, af framadt rigtade, föga utståendeflikar; stånd. talrika, kortare än pist.; fruktfästet kagellikt; karpeller med kort, men tydligt stift. 24. 7. Fig. H.N.f.9, n:o 28.  
Hafsvatt. (Sk. Saxaviken. — Helsl. Ängml. Hernösand; Eden och Grönsvik i Nora sn. Öl. Gottl.) Stj. lång, benhvit, omärkl. hoptryckt; karp. 40—60.

- 3 *B. circinatum* Fr. stj. trubbkantig; bladen med half- eller helrund omkrets, af i samma plan utståendeflikar; stånd. talrika, längre än pist.; frukt. klotrundt; karp. som hos föreg. 24. 6—8, hv. blr. Fig. Fl.D.2236. H.N.f.9, n:o 29.  
Sjöar. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. Hall.) Utmärkt af bladen, hvilkasflikar ligga i ett teml. rundadt plan, samt ej äro så mjuka och hopfallande som hos de öfriga. Karp. uppgifvas vara håriga och okölade, men hos ex. i H.N. äro de lika glatta och kölade som hos föreg. — *R. divaricatus* Schrank.

b — Bladen skaftade.

- 4 *B. trichophyllum* Chaix: stj. trubbkantig; bl. med oregelbunden omkrets, af åt alla håll utståendeflikar; blomskäft ungefär af bladens längd; stånd. 12—talrika, längre än pist.; frukt. klotrundt; karp. med kort stift spelsade, oftast håriga. 24. 6—8. Fig. Fl.D.2357.

\* *pantothrix* DC. ståndarne talrika. —  $\beta$  *succulentum*: mindre, med köttiga bladflikar. Fig. H.N.f.9, n:o 27;  $\beta$  f.11, n:o 33.

Vatten. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.?) Denna jemte arterna 6—9 innefallas i *B. aquatile* Wimm. — *Ran. paucistamineus* Tausch. ; *R. caespitosus* Thuill.

- \*5 *B. Drouetii* Nym. stj. trubbkantig; bl. som hos föreg., med slakaflikar; blomskäft. dubb. längre än bladen; stånd. få [vanl. färre än 12], längre än pist.; frukt. klotrundt; karp. mot spetsen vidgade och afrundade. 24. 6. Fig.

Vatten, r. (N. Vaagedalen, i en bäck vid vest. ändan af Selsvandet; Gudbrandsdalen,

nära Laurgaard: Eigenstj.) *Blomskäften finare och längre än hos föreg., bladflikarne slakare, så att de ofvan vattnet falla tillhopa.* — *Ranunculus* Schultz.

- 6 *B. confervoides* Fr. stj. och bl. som föreg.; stånd. 6—10, längre än pist.: frukt. 7. cylindr.; karp. rundadt trubbiga, utan stift. 2. 7. Fig. H.N.f.13, n:o 45.

Vatten. (Torn. Lpm.—Medelp. och Jemt. Hels. Iggesundsåns utlopp: C. Berg. Gestr. Gefle, i Stenborgsviken. ÖG. Tåkern enl. Kindb. — N. Ost-Finm. Tanaelv; Berle-vaag, och flerst. vid Varangerfj.: Th. Fr. Vest-Finm. Flöjsfeld vid Tromsø etc.: Norm. Dovre.) Vanl. liten, från 2—3 tum till föllång och mera; blrna alltid små, med ett par linier långa, smala kronblad. — *R. paucistam. v. borealis* Beurl. i Bot.No. — Anm. *B. admixtum* W. Nyl. är af Dr Ångstr. sänd från Stensele i Um. Lpm., men ex. äro icke så fullständiga, att utg. fördrår skilja dem från föreg.

\*\* De nedre bl. alltid nedsänkta och delade i hårfina flikar, de öfre ofta flytande, med breda flikar.

- 7 *B. confusum* Schultz: de nedre [ändelade] n. oskaftade bladens flikar med en ell. flere borster i spetsen; de flyt. bladen små, ofta felande, 3klufna ell. delade i vigglika—omv. ågrunda tandade flikar; kronbl. knappt dubb. längre än fodret [2—3 lin. långa]; stånd. omkr. 10; frukt. kägellikt; karp. med kort stift. 2. 6—8. Fig. Fl.D.1993. H.N.f.10, n:o 28 [ut. flyt. bl.]; f.13, n:o 28 [med fl. bl.].

Vatten, r. (Sk. Lund; Kälinge: Ystad m. fl. st. Blek. Tornby; Sissebäck: Goss. Smål. Vestervik, på Norrlandet. Rosl. Blidö sn, Köpmanholm. Vestml. Ramnäs Bruk; Åshulta i Munktorp sn; Vesterås, vid Carlsund. Ner. Humlemyrsviken i Götthunda: Past. Blomb. Dalsl. Ekholmen i Gunnarsnäs; samt Boh. Tjörn enl. Lem.) Förblandas lätt med den utländska *B. tripartitum* (DC.) Fr., som dock skiljes med karp. utan märkl. stift och kronbl. knappt längre än fodret. — *B. Peliveri* Ed.5. *Ran. tripartitum* Nolle. *R. Kochii* Beurl. i B.N.

- 8 *B. heterophyllum* Fr. de nedre bl. som hos föreg.; de flyt. bladen [stund. felande] njurlika, till midten ell. djupare 3—5klufna och tandade; blrna vanl. stora med talrika ståndare; frukt. klotrundt; karp. som föreg. 2. 6—8. —  $\beta$  *crassicaule* Fr. stj. tjock uppblåst; karp. glatta, 60—80 i hvarje gyttring. Fig. H.N.f.11, n:o 32.

Vatten, n. (Sk.—Lpl. — N. till Finm.: Norm.) *Blomskäften hos denna och följ. ungefär af bladens längd, hos föreg. mycket längre; de flyt. bladens bas stund. todruggen.* — *Ranunc. Friesii* Beurl.

- 9 *B. pellatum* Fr. de nedre bladen långskaftade, utan borst i flikarnes spets; de flyt. bladen aldrig felande; frukt. äggformigt; i öfr. som föreg. 2. 7, 8. —  $\beta$  *isophyllum*: krypande; alla bl. njurlika, inga ändelade. Fig. H.N.f.12, n:o 48.

Djupare vatt. (Sk. vid Ringsjön m. fl. st. enl. F. Aresch. Smål. — Ångml. och Jemt. VB. nor. delen. Pst. Lpm. Arjeplog. Storafvan. Hall. Wessige, i Åtran. Boh. Strömstad. — N. Christiania i sjön Gjellumsvand. Ost-Finm. i flere sjöar i Syd-Varanger.) — *B. setigerum* Fr. i Bot. Ufl. *Ranunculus* Schrank.

+++ Kronblad hvita; fruktfäste glatt.

- 10 *B. hederaceum* Dum. stjelen krypande; alla bladen flytande njurlika, med 3—5, breda trubbiga flikar; kronbladen knappt längre än fodret; karp. trubbiga, utan märkligt stift. 2. 6—8. Fig. Sv.B.673. Fl.D.321. H.N.f.2, n:o 43.

Vattengrop. nära hafvet, r. (Sk. Össjö nära Engelholm. Hall. Halmstad; Eldsberga. Boh. på Klöfverön. Gottl. Visby vid gamla hamnen. — N. Trondhjem.) Krypande och roslående; kronbl. små, hvita, med gul klo. — *Ranunculus* L. — Anm. Den utländska *B. Lenormandii* liknar mycket denna art, men karp. hafva ett tydligt qvarrsittande stift.

(*B. pellatum*  $\beta$ .)

#### 199. FICARIA Hall. Svalört.

- 1 *F. ranunculoides* Mönch: stjelen meränd. enblommig; bladen hjertlika, de nedre grundt, de öfre djupare bugtbräddade. 2. 5, g. blr. Fig. Sv.B.17. Fl.D.499. Lundar. (Sk.—Hels. Vestml. Ner. Verm. Dalsl. Öl. Gottl. — N. till Nordl.) Rot med ett knippe klubblika knölar. — *Ranunc. Ficaria* L.

## 200. MYOSCRUS Lin. Mustippa.

- 1 *M. minimus* L. bladen n. trådsmla, jemte det enblommiga blomskafket från rotstocken. (4—6, g. blr. Fig. Sv.B.690. Fl.B.406.  
Torra st. (Sk.—Ängml. Dal. Boh. Uddevalla; Strömstad. Öl. Gottl. — N. upp till Trondhjem. Blomman liten på ett  $\frac{1}{2}$ —2 tum högt skafst; fruktfästet stult. 1—2 tum långt.

- 2 Flocken *Anemones*. Kronbl. utan boningsgrup. Karp. nötlika, stult. enfröiga.

## 201. THALICTRUM Lin. Ängsruta.

† Karpellerna med 3—4, breda, hinnaktiga kanter.

- 1 *T. aquilegifolium* L. bladen 3dubb. parbladigt delade, med stipler vid småbladens skafst; småbladen rundade ell. omv. äggrunda, framtill trubbigtflikiga; blrna i n. qvastlikt knippe. 2 6, rödl. blr. Fig. H.N.f.2, n:o 42.  
Lundar, r. (Sk. här och der, ymnig. Blek. Yude i Sölvisborgs sn; Carlshamn; Mörum och Elleholm snr m. fl. st. Smål. Virestad sn. Almås; Stenbrohult vid Elmhults gästgg.; Tingsås vid Tingsryd; Götheryd; Scheutz.) Bladen icke olika Aklejons, ehuru smärre.

†† Karp. mångfärade; blr i en enda, enkel klase.

- 2 *T. alpinum* L. stjelen n. bladlös; bladen dubbelt parbladigt delade i rundade småblad; klasen vid blomm. nedböjd. 2 6, 7, Fig. Sv.B.655. Fl.D.11. H.N.f.3, n:o 27.  
Fjelltr. a. (Lpl.—Dal. vid Storho i Idre. Ängml. Tåsjö sn. — N.) Quarternshög, enkel, med små, glänsande småblad, viol. ell. gula blr.

††† Karp. mångfärade; blr i knippe ell. sammansatta klasar.

\* Blrna uppräta; stjelen färadt kantig.

- 3 *T. kemense* Fr. bladen 2—3dubbelt parbladigt delade, med de nedersta sidogrenarne mycket långa; småbl. rundade ell. något omv. äggrunda, trubbflikiga, under bleka; blomsamlingen yngre tät, äldre gles. 2 7, 8, gulakt. blr. Fig. H.N.f.9, n:o 26.

Fukt. skogslund. r. (Torn. Lpm. — N. Finnm. Alten etc.; vid Tana-elv: Norm.) Ofta stor som *T. flavum*, men har mer sammansatt delade blad, tunnare och mer rundade småblad, ej olika dem hos *T. minus*, ehuru större. De enskilda bladskafen skola, enl. Fries, hos denna art vara trinda, hos följ. kantiga. — *T. majus* Wg.

- 4 *T. rariflorum* Fr. bladen mest dubb. parbladigt delade, med kortare sidogrenar, omv. äggrunda, trubbigt flikiga småblad; blomsamlingens grenar uppräta, med n. klasevisa blr. 2 7, 8. Fig. H.N.f.16, n:o 34.

Ängar och elfstränder. r. (VB. utmed Torn. och Muonio elfvar från Huukis ned till Haparanda. Ängml. Nämsforsen i Liden sn. Medelp. vid Indals prestg.; Hälsjö sn: F. Kempe enl. Lem.) Liknar föreg., men bladen hafva, såsom hos följ. art, mindre ångulär omkrets; småbl. än tunna och rundade såsom hos föreg., än fasta och mer uldragna såsom hos följ. — *T. Friesii* Rupr. och Beurl. — Anm. Denna och föreg. art anses af Læst. vara blott varieteter af *T. simplex*.

- 5 *T. flavum* L. bladen dubb. parbladigt delade, med korta sidogrenar, omv. äggrunda [säll. smalt viggliga], vanl. 3flikiga småblad; blomsamlingens grenar med mot toppen flockvis samlade blr. 2 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.328. Fl.D.939. H.N.f.9, n:o 25; f.15, n:o 26 [var.].

Fukt. äng. a. (Sk.—VB. nor. delen och Um. Lpm. — N.) 1—1 $\frac{1}{2}$  aln hög, med minst tumslånga småblad, än med bred, än riggformig bas, rik blomsaml. med ljusgula ståndarsträngar. Har stundom fjäll-lik, snart försvinnande stipler vid småbladsskafen. Var. i ÖG., på Gottl. och vid Christiania med smalt viggliga småbl.: var. *angustatum* Fr.

- 6 *T. angustifolium* Jacq. bladen 3dubb. parbladigt delade; småbl. jemnbreda ell. lancettlika, uddbladet ofta smalt viggligt, 2—3flikigt; blrna som hos föreg. 2 7. Fig. Jacq.Hort.3, t.43. H.N.f.13, n:o 43.

Fukt. skogsäng. r. (Öl. i Föra sn.) Lik en smalbladig form af följ.; de nedre bla-

*dens småbl. bredare* [1—2 lin., med omkr. 1 tums längd], *de öfres trådsmla; roten trådig.*

\*\* *Blrna lutande; stj. kantig utan fårör.*

- 7 *T. simplex* L. bladen dubb. parbladigt delade, med vanl. *smala, vigglika, 3flikiga ell. jemnbreda* och hela småblad; blomsamlingens grenar med *klasevisa, skiljda blomkransar*. 24 7, grågul. blr. —  $\beta$  *dubium*: småbl. n. omv. äggrunda med spetsiga flikar. —  $\gamma$  *boreale*: de nedre bladens småbl. n. omv. äggrunda, med trubb. flikar. Fig. F.I.D.244. H.N.f.3, n:o 26;  $\gamma$  f.10, n:o 24.

Äng. (Sk.—VB. och Jemtl. — N. —  $\gamma$  VB. vid Torn. elf. nerest. Ängml. Liden och Junsele snr.) Till alla delar spädare än *T. flav.*; enskildta blomskäften 2—5, i åtskiljda halfkransar; strängarne mörka. —  $\gamma$ , som synes bilda en öfvergång till *T. rarifl.*, är *T. strictum* bor. Nyl. Var. på Öl. och Gottl. med mycket smala, n. jemnbreda småbl.: H.N.f.13, n:o 44; men denna form öfvergår vid odling till den vanliga.

\*\*\* *Blrna nästan hängande; småbladen n. runda.*

- 8 *T. minus* L. stjelen refflad och något kantig, vid basen bladlös; bladen 3—4dubb. parbladigt delade; småbl. rundade, 3—5klufna; med spetsiga flikar; blomsaml. ganska grenig, med vidt utböjda grenar; karp. n. lancettlika, något 2åggade. 24 6, 7, grå-röd. blr. Fig. F.I.D.732? Reich.D.Fl.4627. H.N.f.7, n:o 23.

Sandiga strandäng. r. (Sk.—Boh. — N. Jædderen upp till Hardangersfjord.) Vanl. mindre än följ. med mera utsperrade blomgrenar, men i synnerhet skiljd med de smalare, åt båda ändarne mer spetsade karpellerna. — *T. vulgatum* Schultz och Beurl.

- 9 *T. Kochii* Fr. stj. n. slät, under lederna något refflad, från basen bladig; bladen som hos föreg.; blomsaml. ganska grenig med utstående grenar; karp. äggformiga. 24 7, grå-röd. blr. Fig. Reich.4628. H.N.f.7, n:o 25.

\* *flexuosum* Reich. stj. vanl. något zigzag-böjd mell. lederna; bladflikarne längre och spetsigare; karp. med något längre spets. Fig. H.N.f.7, n:o 24 [varr.].

Äng. (ÖG. Gräsmarö i Gryt sn: Kindb. Gottl. allm. — \* Sk. Ön Hven, St. Ibbs kyrkog. Gottl. Vänge och Løjsta snr.) Ett par fot hög, med rik blomsamling; karp. smärre än hos föreg. \* har ofta blomgrenarne mer utstående och något plattade karpeller. Odlat har *T. Kochii* i lefvande tillstånd mörkröda märken, *T. flex.* gula. Båda formerna skola dock på Gottl. öfvergå i hvarandra. — *T. minus* L. Gottl. resa och herb. *T. collinum* H.N.

## 202. ANEMONE Lin. Sippa.

† Svepet aflägsnadt från blomman, af 3fingradt delade blad.

- 1 *A. silvestris* L. stängeln enblommig med flere rotblad vid basen; svepebladen skaf-tade med flikiga småbl. och hvitludna skaft; hyllebladen meränd. 5, ovala ell. omv. äggrunda; karpeller hvitulliga. 24 5, hv. blr. Fig. H.N.f.8, n:o 29.

Torra st. r. (Öl. Föra sn, omkr.  $\frac{1}{4}$  mil öster om kyrkan, på 2 ställen vid Husvalla by. Gottl. Fårön nära kyrkan samt vid Lauters; Capellshamn; Lokrum sn, i en hage vid Martebo-myr; Hesse i Fläringe; vid Hangvahr kyrka.) Gröfre än följ., med större blr, trådig hopknippad rot. Hyllebladen säll. flere än 5 och då smalare. Rotbl. hos denna och de 2 följ. långt skafade, 3—5fingradt delade, med flikiga småbl.

- 2 *A. nemorosa* L. stäng. enblomm., med ett enda rotblad; svepebl. skafade med in-skurna småbl. och gleshåriga skaft; hyllebl. 6 ell. flere, aflånga; karp. gleshåriga. 24 4, 5, hv. ell. röd. blr. Fig. Sv.B.3. F.I.D.549.

Skog. fukt. st. a. (Sk.—Um. Lpm. och VB. — N.) Rotstocken hos denna och följ. jemntjock. horisontal. Finnes stund. med särskilda honbl., hvilka äro smärre än de 2 könade.

- 3 *A. ranunculoides* L. stängeln 1—2blomm.; svepebl. föga skafade, med såglik in-skurna småbl.; hyllebl. meränd. 5, elliptiska; för öfr. som föreg. 24 4, 5, g. blr. Fig. Sv.B.405. F.I.D.140.

Lund. äng. r. (Sk.—Södml. och Vestml. vid Mälaren, derofvan mycket sällsynt, t. ex. Rosl. Väddö i Hammarby äng. Öl. Gottl. — N. Asker. Christiansand—Salten.) Mindre än de föreg., alltid med höggula blr.

†† Svepet tätt under blomman, foderlikt, af odelade blad: *Hepatica DC.*

- 4 A. *Hepatica L.* rotbladen klufna till midten i vanl. 3 helbräddadeflikar. 24 4, 5. —  $\beta$  *glabrata*: fullkomligt glatt, afven fruktämnena; bladflik. med kort udd. —  $\gamma$  *multiloba*: bladen klufna i 5—9 flikar. Fig. Sv.B.141. Fl.D.610.  
Skogshack. a. (Sk.—*Angml.* och *Jeml.* Öf. *Gottl.* — N. till Trondhj. —  $\beta$  ÖG. Åtvedsnäs. Södml. Strengnäs i Olivehålls park. *Uppl.* Uppsala, i Kungsparken; Funbo sn, vid Halmbyboda. Ner. i Hammar. —  $\gamma$  *Uppl.* Råsho sn. Södml. Fridövn vid Tullgarn: C. Ind. VG. Billingen.) *Blrna* vanl. blå, stund. röda ell. hvita, någon gång dubbla. — *Hepatica triloba DC.*

### 203. PULSATILLA Mill. Vippra.

† Bladen 3fingradt delade.

- 1 P. *patens* Mill. bladen långt skäftade; småbl. n. rutformiga, 2—3delade med vigglika, i spetsen djupt 2—3standade, ell. mångdelade flikar; blomman n. upprät. 24 4, 5, ljust viol. blr. Fl.D.suppl.80. H.N.f.15, n:o 27.  
\* *Wolfgangiana* Bess. småbladens flikar mångdelade; uddbladet långskäftadt. Fig. Back. r. (*Gottl.* vid Løjsta kyrka. *Angml.* Ramsele sn.  $\frac{1}{2}$  mil ofvan Nylands by; Resele sn; Liden sn, vid Nämforssen enl. Lemm. — \* *Gottl.* bland hufvudformen.) *Liknar under blomningstiden ganska mycket P. vulgaris, men skiljes från denna och öfr. Sv. arter genom de efter blomningen framväxande långskäftade och 3fingradt delade rotbladen, hvilka hos \* i ans. till den långt skäftade 3delade ändfliken tyckas vara 2pariga. — Anemone L. \* P. Hackelii Bot. Not. 1856.*

†† Bladen parbladigt delade.

- 2 P. *vernalis* Mill. bladen en gång parbladigt delade; småbl. n. omv. åggrunda, djupt inskurna med åggrunda flikar och tänder; hyllebl. dubb. längre än ståndarne. 24 5. —  $\beta$  *rosella*: blrna små, rosenröda. Fig. Sv.B.637. Fl.D.29. H.N.f.5, n:o 22.  
Skogshed. r. (*Jeml.* Bergs. Sunne och Mysjö snr. Herjed. och nor. Helsl.—Smål. Blek. Skillinge och Listerby. Sk. Örkelljunga; mell. Kådarps gästg. och Röke kyrka m. fl. st. i nor. del. enl. F. Aresch. Hall. Öf. Mörbylånga. — N. mell. Kongsvinger och Elverum. Gudbrandsdalen. Dovre etc. —  $\beta$  Smål. Femsjö sn, vid Torpet Bjellö.) *Blomman i början på en kort stängel, n. upprät; äldre blir stängeln quartershög, med lutande, endast i solen vidt öppnad blomma; färgen hvit, dragande i rödt, utvändigt rödbrun. Svepet hos alla arterna ändeladt, mycket ludet. — Anemone L.*  
3 P. *vulgaris* Mill. bladen 2—3dubb. parbl. delade, med smalt jemnbreda—trådsmla flikar; blomman något lutande, med n. raka blad, dubbelt längre än stånd. 24 4, 5. —  $\beta$  *glabra* Nordst. hela växten fullkomligt glatt; blrna hvita. Fig. Sv.B.292. Fl.D.153.  
Sandback. (Sk.—*Uppl.* och *Vestml.* Verml. vid Gullspångselfven i Råda sn. Dalsl. Lockerud nära Venersborg. Boh. Öf. *Gottl.* — N.? —  $\beta$  VG. nära Sandhems kyrka enl. ex. af O. Nordst.) *Blomman stor, hos hufvudf. rödviolett. Hyllebl. stundom mer och mindre flikiga: var. schizantha ed. 8. Hos  $\beta$  är afven karp:s eljest till ludna spröt alldeles glatt. — Anemone L.*  
4 P. *pratensis* Mill. bladen som föreg.; blomm. n. hängande, med i spetsen tillbakaböjda blad, knappt  $\frac{1}{2}$  längre än ståndarne. 24 5. —  $\beta$  *glabrata* M. Flod. hela växten glänsande glatt. Fig. Sv.B.299. Fl.D.611. H.N.f.1, n:o 34.  
Torra Ång. r. (Sk.—Södml. VG. Öf. *Gottl.* — N. Christiania på Hovedöen, samt i Skiebergers sn. —  $\beta$  Öf. sparsamt vid Mörbylånga.) *Blomm. mindre än hos föreg., invändigt purpurrod, utv. blyfärgad. — P. nigricans Störk. Anem. L.*

### 204. ADONIS Lin. Kastlöser.

- 1 A. *vernalis* L. bladen oskäftade, 2—3dubb. parbladigt delade, med trådsmla flikar; kronbladen öfver 10, lancettlika, i spetsen något trubbnaggade; karpellerna mjukhåriga, i äggformig samling. 24 5, 6, g. blr. Fig. Sv.B.555 [dålig]. Fl.D.suppl.81. H. N.f.4, n:o 38, 39.  
Backar. r. (Öf. Borgholm: Thorslunda vid Aronstorp; mell. Kastlösa och Ottenby; Näsby i Ås sn. *Gottl.* Hoborgen; st. Carlson m. fl. st.) *Blommande foishög; blrna vanl. öfver 2 tum vida.*

3 Flocken **Helleboreæ**. Karp. kapsellika, flerfröiga.205. **CALTHA** Lin. Kabbelök.

- 1 *C. palustris* L. stjelken uppstigande ell. nedligg.; bladen hjert- ell. njurlika, grofnagade, med rundade likar vid basen. 2 4, 5, g. blr. — *β radicans*: stjelken nedliggande, rotsläande i lederna. Fig. Sv.B.200. Fl.D.668.

Väta st. a. ((Sk.—Lpl. — N. — *β* N. Finnm. Tanen och Varanger flerst.)

206. **TROLLIUS** Lin. Bullerblomster.

- 1 *T. europæus* L. stjelken upprät; bladen handlikt 5delade, medflikiga och inskurna småbl.; foderbladen öfver 10, slutande sig tillsammans i klotform; kronbladen af de öppnade ståndarnes längd. 2 6, 7. Fig. Sv.B.383. Fl.D.133.

Äng. etc. (Sk.—Lpl. och VB. Öl. Mest i vestra prov., på mer spridda ställen i de östra. — N. till Finnm.) 3—4 qv. hög, glatt växt, med stora klotrunda ljusgula blr. Då ståndarne utlömt frömjölet, äro de längre än kronbladen. Var. med små blad och blr.

207. **AQUILEGIA** Lin. Akleja.

- 1 *A. vulgaris* L. stj. upprät; de nedre bladen dubbelt 3fingradt delade; småbladen grundt inskurna i rundadt trubbiga likar; kronsporrarne med inkrökt spets, kortare än foderbl. 2 7, 8. Fig. Sv.B.118. Fl.D.695.

Lund. i bergstr. r. (Sk.—Södm. Ner. Vestm. Dal. Grangärde; Boda Capell vid vägen till Styggforsen. Verm. Öl. Goull. Förvildad vid Gefle m. fl. st. upp till Sundsvall. — N. upp till Gudbrandsdalen och efter kusten till Trondhj.) Alnshög, vanl. glatt växt, med stora, blå, stund. ljusröda ell. hvita blr. Var. med hårig stjelk.

208. **ACONITUM** Lin. Stormhatt.

- 1 *A. septentrionale* Köll. bladen handlikt 3—7klufna och flikade; blomklasen klubbig af tätta glandelhår; hjelmen utan tydlig klo; honingsgömmena med tillbakarullad sporre, lancetlik läpp. 2 7, 8. Fig. Sv.B.654. Fl.D.123. H.N.f.5, n:o 26.

Fjelltr. a. (Lpl.—Herjed. Dal. Särna och Elfdalen. Verm. nor. Finnskoga sn. Ängml. Medelp. Uppl. Hillebola. — N. till Finnm. nordligast på Laxetind: Norm.) 2—3 alnar hög, med blå, stund. n. hvita, högst sällan hos oss gula blr. \*) — *A. Lycoctonum* L.Fl.Su.

- 2 *A. Napellus* L. bladen 5fingradt delade, med vigglika 3klufna och flikiga småbl.; klasen tal rak, finkluden; hjelmen finkluden, halfrund, med till klo afsmalnande bas; honingsgömm. med kort, tillbakahöjd sporre och urnupen läpp; karp. med utstående spets. 2 7, 8, b. blr. Fig. Sv.B.46. H.N.f.6, n:o 23.

Fukt. skogsäng. r. (Dal. Viks sn, Stämshöjden, vid Trostbäcken i Stortäkten. Södm. Åker sn, vid Berga-ån. Sk. Hasselmöllan vid Romeleklint.) Hyllebladen ut- och invändigt småhåriga; de nedre örtbladen glatta och glänsande. — *A. napelloides* Sw. *A. neubergense* Reich.

- 3 *A. Cammarum* L. bladen som hos föreg.; klasen slutt. glesblommig, flerhöjd glatt; hjelmen glatt, koniskt hvalf-lik, med afsmalnande bas; honingsgömm. som hos föreg.; karp. yngre med hopstötande spets. 2 7, 8, b. blr. Fig. Fl.D.1698. H.N. f.6, n:o 24.

Byar etc. r. (Hall. vid Fylleåns stränder. Smål. vest. del. t. ex. Femsjö; Klefshult etc. Fastorp i Nye sn.) Lik föreg., men är glatt, med längre skafade blr, stundom, särd. odlad, med usperradt grenig klase, smärre och mer bredflikiga blad. — *A. Störchianum* Reich. *A. neomontanum* Fl.D.

209. **DELPHINIUM** Lin. Riddarsporre.

- 1 *D. Consolida* L. bladen dubh. 3fingradt delade, med smalt jemnbreda—trådsmla likar; blomsm. utsperradt grenig; honingsporren enkel; karpell ensam, glatt. ☉ 6, 7, viol. blr. Fig. Sv.B.58. Fl.D.683.

Åkrar. (Sk.—Hels. Vestm. Ner. VG. Öl. Goull. — N.) Omkring fotshög med stora blr i klasar.

\*) Enl. Wbg:s Fl. Lapp. n:o 275 är en gulblommig form (*β*) tagen vid Kirkewara i Lul. Lpm.

4 Flocken **Pæonicæ**. Frukt: [flerfröiga karpeller ell.] bär.

210. **ACTÆA** Lin. Trolldrufva.

1 *A. spicata* L. bladen 2—3dubbelt parbladigt ell. 3fingradt delade, med äggrunda—omv. äggr., hvass-sågadeflikar; blrna i tät, äggformig klase. 2½ 3, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.291. Fl.D.498.

Lund. (Sk.—Lpl. — N. till Finn. : Norm.) Med ensam blomklase, svarta bär.

34 Fam. **BERBERIDÆ** Juss. Blr regelbundna af 6 foder- och kronblad motsatta hvarandra. Stånd. motsatta kronbladen. Frukt enrummig, med fröfäste på ena sidan.

211. **BÉRBERIS** Lin. Surtorn, Berberis.

1 *B. vulgaris* L. stammen med sammansatta taggar och knippevisa, omv. äggrunda, taggsagade blad; blomklasarne hängande; kronbl. trubbiga. ½ 6, g. blr. Fig. Sv.B.24. Fl.D.904.

Betesh. (Sk.—Gestr. Helsl. flerst. vid Hudiksvall: Wistr. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Borgholm. Gottl. Visby. — N. Arendal; Holmestrand; Christiania; Fredrikshall.) Buske med aflånga, röda, ganska sura bär.

35 Fam. **PAPAVERACEÆ** Juss. Blr regelbundna. af 2bladigt snart affall. foder och 4 kronbl. Stånd. fria talrika. Fröh. enrummigt med ofullkoml. skiljeväggar. ell. 2-rummigt.

212. **PAPÄVER** Lin. Vallmo.

† Fröh. styfhårigt, klubblikt.

\*1 *P. nudicaule* L. stängeln bar, enblommig; bladen enkelt pardelade, med bredt lancettlika, stundom djupt inskurna flikar; blomskåfens hår utstående; ståndsträng. ända upp trådmala. 2½ 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.41. H.N.15, 1:10 20.

Fjellv. r. (N. Ost-Finnm. Syltvigfjorden vid Osterelv. Vest-Finnm. Talvig etc.; på Langfjeldene vid Maalselv; Norm. Dovre på Blaa- och Knudshøe samt Finnshøe; vid Drivelsen nedom Vaarstien, samt i Svisdal, Druedal etc. Valders vid Helestrand.) Tufvad växt. — *P. radiculatum* Rottb. *P. alpinum* Fr. S.V.Sc.

2 *P. Argemone* L. stjelen bladig, mångblommig; bladen dubbelt pardelade med smala flikar; blomskåfens hår tilltryckta; ståndsträng. uppåt bredare. ☉ 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.538. Fl.D.867.

Åkrar, etc. (Sk.—Södm. Nyköping. Stockh. Uppl. Håtuna sn; Vahlö sn; Norrtelge etc. Vestml. Skinnskatteberg. Ner. VG. Kinnekulle. Öl. Gottl.) Blrna mycket mindre än hos de öfr. med röda blr. Var. med sargadt flikiga kronblad.

†† Fröh. glatt, aflångt ell. klotrundt.

3 *P. dubium* L. stjelen bladig, flerblommig, med dubbelt parklufna och flikade blad; blomskåfens hår åtminstone upptill tilltryckta; ståndsträng. ända upp trådmala; fröh. aflånga. ☉ 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.457. Fl.D.902.

Åkrar, etc. (Sk.—Gefle. Medelp. Skön enl. Leml. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Hall. Särö: Leml. Öl. Gottl. — N.) Blommorna omkring 2 tum vida.

†4 *P. Rhoeas* L. stjelen bladig, flerblommig, med pardelade blad, inskurna flikar; blomskåfens hår utsperrade; stånd. som hos föreg.; fröh. klotrunda. ☉ 7, r. blr. Fig. Sv.B.519. Fl.D.1580.

Åkr. och odl. ställ. r. (Sk.—Uppl. och Vestml.; förvildad med andra frön; äfvenså i Norge.) Större än de föreg.

†5 *P. somniferum* L. hela växten vanl. glatt; bladen stjelkomfallande, äggrunda—bredt aflånga, grundt flikade; ståndsträng. uppåt bredare; fröh. klotrunda. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.525.

Obl. st. r. (Sk.—Held. och Vestml. här och der sjelfsådd i och utom trädgårdar. — N. enl. Ax. Bl. Förvildad.) *Blåaktig vårt, med hvita ell. röda, vid basen violetta kronblad.*

## 213. CHELIDONIUM Lin. Sköldört.

1 *C. majus* L. stj. gleshårig; bladen parbladigt delade, med slika småbl.; blrna i flock; fröb. långa, släta. 2½ 5—8, g. blr. —  $\beta$  *crenatum*: kronbladen slika; fröb. längre, vridna. Fig. Sv.B.67. Fl.D.542.

Vid murar och hus. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Sk. vid Lund: F. Aresch.; Klinta nära Ringsjön.) *Bladen under blåaktigt gröna, gleshåriga, med vid basen bladlikt vidgade småbladskäft.*

## 214. GLAUCIUM Scop. Möblomma.

1 *G. luteum* Scop. stjelen glatt; rotbladen skafade, pardelade; stjelen bl. omfattande, djupt buktiga ell. slika; fröb. mycket långa, stråknöliga. 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.171 Fl.D.585. H.N.f.10, n:o 29.

Hafastr. r. (Bok. Quille sn. Vassholmen och Tistelholmarne; Strömstad, på S. Koster och Bredviksmarken; Grötö; Otterö och Hvalö; Hjertö; Svinäslandet och Furaby strand i Tanum, ymn. — N. Christianiafjord på Ithöen; Spjärland; Aggeröen, Langesund, Mandal etc.) *Blrna stora som på Vallmo; växten blåaktig. — Chelidonium Glaucium L.*

36 Fam. FUMARIOIDEÆ DC. Fod. 2bladigt, affallande. Kronan oregelbund., 4-bladig. Stånd. 6, sammenväxta i 2 stammar, med enrummiga knappar. Frukt enrummig.

## 215. CORTALIS Pers. Nunneört.

† Stjelen med ett stort fjäll nedom lägsta bladet; knölstammen tät.

\* Blomskärmen omv. äggrunda, n. alltid flerklufta.

1 *C. solida* Sm. de 2 yttre kronbl. i spetsen urnupna, småtandade, det nedre med knöl vid basen; de 2 inres rygg *småll vingad*; stiftet vid basen *knölikt nedböjdt*; fruktskäft. af *den småll lancettlika baljans längd*. 2½ 4, 5, r. blr. Fig. Sv.B.531.f.1. H.N.f.11, n:o 34.

Lundar. r. (Blek. vid Ronneby; Carlskamen: Gosselm. Söderl. Tjufholmen vid Nyköping: C. Ind. Uppl. Funbo i Kersbärsunden vid prestgården. Rosl. Stockh. Bergöland, förvildad.) *Blomklasen vanligen glesare och mer rikblommig, samt med längre blomskäft än hos de följ. Bladen hos alla arterna dubb. 3fingradt delade, med flerklufta småblad.*

2 *C. laxa* Fr. de yttre kronbl. *knapp* urnupna, småtandade, det nedre med knöl; de inre som hos föreg.; stiftet utan knä; fruktskäft. *kortare än den småll lancettl. baljan*. 2½ 4, 5, r. blr. Fig. Sv.B.531.f.2 [blrna för mörka]. H.N.f.8, n:o 25.

Lund. r. (Sk. Esperöd; Helsingborg och trol. flerst. enl. F. Aresch. Småll. Kalmar. — Uppl. holmen Fläskjan i Mälaren; Steninge; Säbyklint i Dalby enl. Lessl. Gottl. Lilla Carlson enl. G. v. Ced.) *Var. större och mindre, stundom med tät och rikblommig klase, samt med klufta och hela skärm. — C. Lobelii Tausch. Fum. bulbosa a Lin. Fl.Su.*

3 *C. pumila* Host: de yttre kronbl. i spetsen *tvärhuggna*, småtandade, det nedre utan knöl vid basen; de inres rygg *småll och kort vingad*; stiftet utan knä; fruktsk. 2—3 *gr kortare än den äggrundt lancettlika baljan*. 2½ 4, 5, r. blr. Fig. Fl.D.1224. H.N.f.8, n:r 26.

Lund. (Sk.—Uppsala. Rosl. Öl. Gottl. — N. Christiania.) *Varierar som föreg., men är i allmänhet till alla delar mindre, med blekare blr. — C. laxa \* pum. Ed. 6.*

\*\* Blomskärmen äggrunda, n. alltid hela.

4 *C. fabacea* Pers. de yttre kronbl. urnupna, otandade, det nedre utan knöl; de inres *Hartman, Skandinaviens Flora* (10:de uppl. .



rygg med en *upptill bred, högt öfver kronbl:s spets* framskjutande vingkant; för öfr. som föreg. 2, 4, 5, r. bl. Fig. Sv.B.15. Fl.D.1394. H.N.f.10, n:o 30.  
Lund. (Sk.—Medelp. Jemtl. Åreskutan; Hackås. Um. Lpm. Laxfjellet. Vestml. Ner. VG. Dalsl. Hall. Öl. Götth. — N. till Finnsm.) 3—5 tum hög, fäblommig; skärmen mycket sällan grundt inskurna. — *Fumaria bulbosa* β Lin.

†† Stjelen utan fjäll; knölstammen ihållig.

5 C. *cava Schw. & K.* blomskärmen äggrunda—*af långt lancettlika*, meränd. *hela*; kronsporrer med trubbig krökt spets; fruktskaftet mycket kortare än baljan. 2, 4, 5, r. ell. hv. bl. Fig. Fl.D.605. H.N.f.1, n:o 33.

Lund. r. (Sk. skogväxta delen allm. Smål. Eds sn. ÖG. Omberg vid Alvastra?; Vadstena; Stafsäter i Wist m. fl. st. trol. förvildad enl. Kindb. Öl. från Ottenby upp till Föra.) *Större än de föreg., vanl. fotshög; knölstammen afven större, med rötter på hela sin yta, hos de föreg. endast nedtill.* — *C. bulbosa Pers. Fumaria bulb. γ Lin.*

## 216. FUMARIA Lin. Jordrök.

† Fodret af halfva kronans längd.

\*1 F. *media Lois.* bladskafen klängelik vridna; småbl. med omv. äggrund omkrets och aflånga likar; frukt, något äggrundt klotformiga, trubbiga, något smågropiga, på utböjda skaft. ☉ 6, 7, ljusr. bl. Fig. Hamm.Fum.t.3. H.N.f.15, n:o 30.

Åkr. och odl. st. r. (N. Stavangers amt, i åkrar och vid vägen mellan Nærstrand och Ölen, ymnig. — Sv. på ballastplatser, t. ex. Malmö och Gelle.) *Bladen [såsom hos alla arterna] dubb. parbladigt delade.* — *F. muralis* Sond.

†† Fodret mycket kortare.

2 F. *officinalis L.* bladen med lancettlika likar; skärmen *något kortare* än fruktskaften; foderbl. äggrunda, 1/2 del af kronans längd; frukterna klotrunda, i toppen *intryckta*. ☉ 6, 7, r. säll. hv. bl. Fig. Sv.B.42. Fl.D.940. Hamm.Fum.t.1.

Odl. st. a. (Sk.—Um. Lpm. — N. till Finnsm. Tromsøe.) *Stundom upprät, stundom klängande; utmärkt af de något njurtlika frukterna.*

3 F. *tenuiflora Fr.* bl. som föreg.; skärmen *dubb.* kortare än fruktskaften; foderbl. n. lancettlika, 1/2 del af kronans längd; frukterna klotrunda. ☉ 6, 7, hvitr. bl. Fig. Hamm.Fum.t.1.

Odl. st. r. (Sk. Lund, Krageholm m. fl. st.; synes enl. F. Aresch. Sk.Fl. ej i sednare tider vara återfunnen. Uppl. Häggeby, enl. ex. fordom samlade af förf.) *Bläna mycket mindre och isynnerhet smalare än hos föreg., n. hvita, endast i spetsen mörka; bladen blåaktiga.* — *F. Wirtgeni Koch [till en del] enl. Fr. och Garcke.*

4 F. *Vaillantii Lois.* bladflik. smalt lancettlika, n. jemnbreda; skärmen *som hos föreg.;* foderbl. äggrunda, *många gånger kortare än kronan*; frukt, klotrunda, i toppen *hela*, ell. med en omärklig vårlig spets. ☉ 6, 7, blekr. bl. Fig. Sv.B.574. Hamm.Fum.t.1. H.N.f.3, n:o 25.

Åkr. r. (ÖG. Linköping, Slaka, Ljung och Kisa enl. Kindb. Södm. Lunda vid prestgården; Vester-Hanninge, vid Häringe. Stockh. nära Lofö kyrka; Drottningholm; Bromma etc. Uppl. i synnerhet omkr. Mälaren; Tierp vid Fors; Funbo sn; Hökhufvud vid prestg. Vestml. Sala; Suruhammersbruk.) *Bladen blåaktiga.*

- 37 Fam. **ORUOIFERÆ** Juss. Fod. och krona regelbundna, 4bladiga [korsformiga]. Stånd. 6, af hvilka 4 längre. Frukt: skida. Fröhvite 0.

Anm. Genom felslagning kunna stund. kronbl. och 2 ell. 4 stånd. saknas, samt skidan blifva enrummig.

- †1 Flocken **Brassicæ**. Skida lång, öppnande sig på längden i 2 skal. Fröen med hjertbladen vikna omkring det ryggliggande rotämnet.

### 217. BRASSICA Lin. Kål.

- 1 *B. campestris* L. roten smal, hos  $\gamma$  tjock; rotbl. skaftade, lyrformiga, *glost stråfhåriga*: stjelbl. *hjerlik* *äggrunda* eller *afånga*, med djup stjelkomfattande bas, *glatta* blåaktiga. ☉ 6, 7, g. blr. —  $\beta$  *biennis*: rot. smal, 2årig; nedre stjelbl. lyrförmigt inskurna. —  $\gamma$  *Rapa*: roten tjock och köttig [rofv], 2årig. Fig. FLD.550, H.N.f.9, n:o 21;  $\beta$  f.10, n:o 31;  $\gamma$  f.9, n:o 22.

Åkr. etc. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn. —  $\beta$  och  $\gamma$  odlade och förvildade.)  $\gamma$  *B. Rapa* L.

- 2 *B. Napus* L. roten tapplik; rotbl. som hos föreg., men *glatta*; stjelbl. lancettlika, med *smalare*, n. *pil-lik*, stjelkomfattande bas, *glatta*. ☉ 6, 7, g. blr. —  $\beta$  *rapifera*: roten tjock, tapplik. Fig. Reich.Tetrad.f.4435. H.N.f.10, n:o 32; f.14, n:o 29.

Åkrar, hafstr. r. (Sk. nordöstra kust.; äfven Kullaberg. Smål. i skären. Södm. Nämndö; Örnö. Stockh. Rosl. Ljusterö, Börstel etc. Öl. Gottl. Burs och När sur etc. — N. Toten. —  $\beta$  odlad och förvildad.) Var. *præcox* H.N. kan knappt skiljas från a.

### 218. SINAPIS Lin. Senap.

- 1 *S. alba* L. stjelken stråfhårig; bladen vid basen parklufna; skidorna styfåriga, *vidt utsperrade*, *nåstan kortare* än det *sabelformiga* stiftet. ☉ 7—9, g. blr. Fig. FLD. 1393. H.N.f.7, n:o 13.

Åkrar, r. (Sk. Hall. samt här och der upp till Verml. Vestml. och Uppl. Jeml. Östersund. Öl. förvildad. Gottl. Blåse i Fleringe sn. — N. Christiania. Vig och Leganger etc. i Bergens st. Vang i Valdres.)

- 2 *S. arvensis* L. stj. stråfhårig; bladen äggrunda, groftandade ell. [de nedre] lyrförmigt flikade; skidorna trinda, knöliga, *utstående*, *längre* än det *styrkantiga* stiftet. ☉ 6—8, g. blr. —  $\beta$  *ambigua*: skidorna stråfhåriga. Fig. FLD.753.  $\beta$  Reich.f.4425, b.

Åkrar, a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finn. —  $\beta$  Sk.—Gestr.)  $\beta$  har mer *utstående grenar*, *alla bladen kortskaftade*, *flikiga*, med *något pil-lik* bas: *S. arv. Schkuhriana* Reich. Var. *incisa* Fr.

### 219. MELANOSINAPIS DC. Svartsenap.

- †1 *M. communis* Spenn. bladen lyrförmiga, de öfversta hela, jemte stjelken *glatta*; skidorna *tryckta till stjelken*. ☉ 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.83. FLD.1582.

Odl. st. etc. förvildad. (Sk. Hall. VG. Göteborg, på Ærne. Boh. Marstrand. Blek. Lyckeby m. fl. st. Smål. Oscarshamn. Öl. Gottl. Följande med skånsk såd ända upp till Norrl. — N. Christiania.) *Sinapis nigra* L. *Brassica nigra* Koch.

### 220. ERUCASTRUM Schimp. & Spenn. Kålsenap,

- 1 *E. Pollichii* Sch. & Sp. stj. kort och nedböjdt stråfhårig; bladen *afånga*, pardelade med ojemnt och trubbigt tandade flikar, *glost stråfhåriga*; skidorna i nedtill bladiga klasar, *utstående*. 2 6—9, g. blr. Fig. Reich.Tetrad.4428. H.N.f.15, n:o 31.

Odl. st. r. (ÖG. på sjön Tåkerns genom urtappning uttorkade stränder, t. ex. mell. Säby och Hyngesta, samt mell. Hofgården och byn Furåsa i Hof sn. — Införd med ballast till Gelle Brobänk.) Omkring *fosshög växt*, med *smutsigt gula*, *svagt ådriga* blr. — *Sisymb.* *Erucastrum* Poll. *Diplotaxis bracteata* Godr. & Gren. samt Fr. H.N.

### 221. DIPLTAXIS DC. Sandsenap.

- †1 *D. tenuifolia* DC. stjelken *bladig*; bladen groftandade eller pardelade, med jemnbreda flikar, *glatta*, de öfversta hela. 2 7—9. Fig. Sv.B.501. H.N.f.9, n:o 23.

Sand. stränd. r. (Sk. Sandhammar. ÖG. med föreg. vid Hofgården i Hof sn. För öfr. införd med ballast till Ystad; Malmö; Landskrona; Varberg; Scheutz; Carlskrona; Kalmar; Nyköping; Gefle; Sundsvall; Nyland i Ångml.; Ratan i VB.; Visby och Ljugarns hamn på Gotland etc. — N. flerst. på ballastpl. i söd. delen: Ax. Bl.) Ofta 3—4 quart. hög, med ljusgula blr, stora n. som hos *Brassica camp.* — *Sisymb. L. Sinapis Sv.B.*

- 2 Flocken **Sisymbriea**. Skida som föreg. flock. Hjärtblad platta med ryggliggande rotlämne.

## 222. SISYMBRIUM Lin. Vägsenap.

† Birna gula.

- †1 *S. Loeselii* L. bladen *pardelade*, med båglik utböjda, i nedre kanten vanl. helbräddade, i den öfre bugttandadeflikar; ändfliken stor, n. spjutlik; kronbl. längre än fodret; skidorna vidt utstående, dubbelt längre än deras skaft. 7.8. Fig. Reich.f.4409. H.N.f.13, n:o 49.

Mur. odl. st. r. (Stockholm på murar och i potatesland kring väderqvarnar mell. Sabbatsberg och Kungsbacken; Djurgårdsbrunn; Observatoribacken. Uppsala.) Birna stora som hos *Nasturt. silv.* Bladflikarnes hufvudnerv följer till efter deras nedre kant. Stjelen meränd. stråfhårig.

- 2 *S. Sophia* L. bladen dubbelt parbladigt delade i n. jemnbreda flikar; kronbl. kortare än fodret; skid. trädsmala, n. upprätta, dubb. längre än de utstående skaften. 7. Fig. Sv.B.203. Fl.D.526.

Torra st. a. (Sk.—söd. Lpm. och VB. nor. del. Lul. Lpm. Storbacken: Ind. — N. till Alten.) Kronbladen hälften så långa som de utskjutande ståndarne.

- 3 *S. officinale* Scop. utsperradt grenig; bladen nedåt parflikiga, med ojemnt groftandade flikar. stor, ofta spjutlik ändflik; kronbl. längre än fodret; skid. n. oskaftade, kort syl-rika, tilltryckta. 7—9. Fig. Sv.B.158. Fl.D.560.

Byar, vägar, a. (Sk.—Hels. Vestml. Ner. Verm. Dals. Boh. Ö. Göt. — N. till Bergen.) Vanl. gles hårig: var. i Verm. och N. n. glatt. — *Erysimum L. Chamæplium Wallr.*

†† Birna hvita.

- 4 *S. supinum* L. bladen n. pardelade, med trubbtandade flikar; skidorna ensamma i bladvecken, ganska kort skaftade, jemnbreda, något båglik krökta. 7. Fig. Fl. D.Suppl.86. H.N.f.4, n:o 31.

Kalkberg, på fukt. st. (Ö. allmän. Göt. vid Ar i Fleringe sn m. fl. st.) Kulliggande, någon gång upprätt, med tumslånga, kort skaftade skidor. — *Braya Koch. Chamæplium Wallr.*

## 223. HESPERIS Lin. Natuviol

- †1 *H. matronalis* L. bladen ågrundt lancettlika, spetsade bugttandade; skidorna kantigt trinda, glatta. 2, 6, 7, hv. ell. rödviol. blr. —  $\beta$  *inodora*: blr hvita med ringa lukt. Fig. Fl.D.921 och 924.

Skogsback. ruin. r. (Sk. Kulla-Gunnarstorp, Trolleholm, Toppe- och Bjersjö-ladugård m. fl. st. Hall. Göteborg etc.; förvildad upp till Verm. och Hels.) Alnshög med välluktande blr, hvarföre den odlas. Den vilda är vanligen hvitblommig och n. utan lukt: *H. inodora L.Sp.Pl.*

## 224. ERTSIMUM Lin. Gyllen.

- 1 *E. cheiranthoides* L. bladen lancettlika helbräddade, eller gles tandade, stjernhåriga; birna kortare än skaften; skidorna dubbelt längre än de meränd. utsperrade skaften. 6—8, g. blr. —  $\beta$  *nodosum*: stjelen högväxt, med en knöl vid basen; skidorna tilltryckta. Fig. Fl.D.731 och 923.

Odl. st. a. (Sk.—VB. och Lul. Lpm. — N. —  $\beta$  Sk. vid Gyllerup i Hörup. ÖG. Kullen i Kärna sn.)

- 2 *E. hieracifolium* L. bladen lancettlika, gles naggsågade stjernhåriga; birna dubbelt, skidorna många gånger längre än skaften, n. upprätta. 5, 6, g. blr. Fig. Wg.Fl. Lt.12,f.1. H.N.f.8, n:o 20.

\* *strictum* Koch.: blrna större; skid. kortare och tjockare, alltid tilltryckta med 2klufvet märke. Fig. Fl.D.229. H.N.f.8, n:o 19.

Torra st. helst i skären och fjellen. (Smål. i skären. — VB. Kalix skärgård. LuL och Torn. Lpm. Jemtl. Verm. Sibberön nära Christinehamn. Ner. vid Hjelmaren. ÖG. Omberg m. fl. st. vid Vettern. Öl. ön Norman. Göt. — N. Christiania; Dovre; Snaasen i Trondhj. st.; Nordl. och Finnm. mångenst. enl. Norm. — \* Sk. Sularp nära Fogelsång enl. F. Aresch. Blek. Smål. Grenna och Jönköping: Scheutz. VG. Boh. Göt. Lokrume myr enl. G. v. Ced. — N. söd. del.) *Ofta mer än alshög, enkel ell. endast upptill grenig, med större blr än föreg. — Cheiranthus alpinus* Wg.Fl.L. \* *E. hieracifol.* Fr. S.V.Sc.

## 225. ALLIARIA Adans. Hvittlöksört.

1 A. *officinalis* Andr. bladen skaftade hjertlika bugitandade. 5, hv. blr. Fig. Sv.B. 208. Fl.D.935.

Lundar. (Sk.—Uppl. och Vestml. Boh. Öl. Göt. — N. Bergen.) *Luktat hvittlök. — Erysimum* L. *Sisymbrium* Koch.

## 226. BRAYA Stenb. & Hop. Stenkrasse.

1 B. *alpina* S. & H. bladen skaftade, smalt lancettlika, hela ell. glest tandade; skidorna i en kort, sammandragen klase, uppräta, längre än skaften. 2, 7, 8. Fig. Reich. f.4370.

Fjelltr. r. (LuL. Lpm. Sähk. Ångstr. 1837; sedan icke återfunnen. — N. Finnm. ön Hukö; vid Skjervö, Rostafield vid Maalselv; samt Nordl. ofvanför Muldjord och Solö i Bejeren: Norm. Salten på Baadfjellet.) *Svenska ex., 3—4 tum höga, likna en förkrumpt form af Arabis petræa; blrna hvita ell., enl. de torra exemplaren, violetta.*

3 Flocken *Arabidese*. Skida som föreg. flock. Hjärtblad platta med kantliggande rotämne.

## 227. DENTARIA Lin. Tandört.

1 D. *bulbifera* L. bladen parbladigt delade [2—3pariga], med lancettlika, sågade småbl.; de öfversta bladen hela, med knopplökar i bladvecken. 2, 5, ljus. blr. Fig. Sv.B. 356. Fl.D.361.

Lundar, r. (Sk.—Uppl. upp till Dalelven, t. ex. på En-noten nedom Söderfors. Vestml. Ner. Dalsl. Boh. Uddevalla; Christinedal. Öl. Göt. — N. efter kusten från Christianiafjorden till Bergen.) *Rotstocken grenig, beklädd med tjocka hvita fjäll.*

## 228. CARDAMINE Lin. Ängskrasse, Brämsa.

† Bladen parbladigt delade.

\* Kronbl. omv. äggrunda, minst 3 gånger längre än fodret.

1 C. *pratensis* L. stjelen trind; bl. 5—mångpariga; rotbladens småblad rundade, vinkligt tandade, stjelbladens lancettlika, meränd. helbräddade; ståndarknapp. gula; skidorna med ganska kort stift. 2, 5, 6, gredel. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.350. Fl.D.1039.

Våta äng. dik. s. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.: Norm.) *Har större blr än de öfriga. Växande i renare vallen får denna art stundom större, rent hvita blr och stora småblad: var. speciosa. Var. med något tandade småblad samt med dubbla blr.*

2 C. *amara* L. stj. färdigt kantig; bl. 2—5pariga; alla småbladen rundade—afånga, vanl. vinkligt tandade; ståndarkn. violettbruna; skid. med syl-lik stift, dubbel längre än skidans bredd. 2, 5, 6, hv. blr. — β *hirta*: till alla delar spåre; stjelen småluden eller hårig. Fig. Reich.f.4305. β Fl.D.148.

\* *œquiloba* C. Hn. bl. 4—5pariga; småbl. likform. afånga, de nedre bladens ellipt., alla helbräddade, fasta och glatta, hårbräddade.

Källback. etc. β fukt. skogsäng. (Sk.—Lpl. α allmännast norr om Mälaren. — N. — \* VG. mell. Finnerödja kyrka och Skagersholm 1863: C. Elgenstjerna.) — β C. *silvatica* Hoffm. C. *hirtula* Fl.D. Var. afven med bladen delade i 3 småbl., hvaraf det yttersta skaftadt: var. *trisecta*; samt med alla bladen odelade, ovala, tandade:

var. *anomala* Ed.9. — \* är en högst egendomlig form, måhända egen art, men behöfver närmare observeras i naturen.

\*\* Kronbl. aflångt tung- ell. spadlika, högst dubb. längre än fodret.

a. — Bladskäften med 2 stipelform. bihang vid basen.

- 3 *C. impatiens* L. stj. upprät; bladen mångpariga, med äggr.—lancettl. *likigt inskurna* småblad; skid. utstående, 4 gång. längre än deras skaft. ☉ 6, hv. blr. Fig. FL.D. 1339. Reich.f.4302.

Bergshöjder, skog. (Sk. Smål. nor. del, och Urshult i Kronob. län. — *Uppl. och Vestml. Ner. Dalsl.* Färglanda sn. Öl. Borgholm; Thorslunda. — N. Skien; Christiania etc.) *Ofta alnhög, med mycket små blr; kronbl. saknas stundom och då får fodret ofta hvit färg.*

b — Bladskäften utan stipelform. bihang.

- 4 *C. silvatica* Link: stjelen vanl. *flerböjd, mångbladig*; rotbl. få och små; stjelnbl. 5—7pariga med tandade småblad; kronbl. aflångt tunglika; stånd. 6; skidorna 3 gånger längre än de utstående skaften. ☉ 6, 7, hv. blr. Fig. FL.D.735. Reich.f. 4303. H.N.f.16, n:o 38.

Fukt. skog. r. (Sk. Stehag; n. Vram; Pugerup etc. *Blek. Smål.* Kalmar; Kronoberg; Femsjö. ÖG. Bersbo grufva i Värna sn: Scheutz; i Björsäter, Kärna och V. Ny snr enl. Kindb. *Stockh.* Gladöqvarn i Huddinge: Åhrl. *VG.* Kinnekulle; Hunneberg i Fristorps hage. — N. Laurvig; Christiania, Egeberget vid Græssæter.) 2—3 quart. hög och gröfre än följ., men med lika små blr. *Svenska ex. smärre, mer närmande sig C. hirsuta än de norska.*

- 5 *C. hirsuta* L. stj. mest rak, *fäbladig*; rotbl. talrika och stora; stjelnbl. 2—4pariga; småblad och kronblad som föreg.; ståndarne 4; skid. som föreg. med upprätta skaft. ☉ 5, 6, hv. blr. Fig. Reich.f.4304. FL.D.1762. H.N.f.3, n:r 20; f. 7, n:o 18 [var.].

Skogsback. etc. r. (Sk.—*Uppl.* i Vahlö sn. *Herjed.* vid byn Malmagen, och Ormaruet. *Jemt.* flerstäd. i Frostviken. *Dal. Vestml.* Nora, vid Elfhyttan. *Ner.* Apelvik i Hammar, och vid Skarbyssjön. *VG.* Kinnekulle. *Dalsl. Boh. Öl. Göt.* — N. till Trondhj.) *Nyses blommande fingerhög, äldre 6—8 tum; kronbl. 1—1½ linie långa, saknas stundom: var. clandestina. — C. intermedia Hörn.*

- 6 *C. parviflora* L. stj. nedligg. ell. upprät; bladen mångpariga, med aflånga eller jemnbreda, vanl. *helbräddade* småbl.; kronbladen aflångt spadlika; skid. omkring dubbelt så långa som de utstående skaften. ☉ 6—10, hv. blr. Fig. Sv.B.568. Vet.Ak. H.1822. H.N.f.3, n:o 21.

Öfversväm. st. i vattnet, r. (ÖG. i trakten af sjöarne Roxen och Glan; flerst. i skärg., samt vid Vettern, nedom Omberg enl. Kindb. *Södml.* Eskilst. Rosenbergs bruk: Nyköping; Åkerö m. fl. st. *Ner.* Myrö; Göthlunda och Lillkyrka snr vid Hjelmaren; Sörön vid sjön Qvismaren. *Vestml.* Fullerön. *Dal.* By sn, vid bäckens utlopp i Bysjön. *Verm.* Carlstad m. fl. st. *Dalsl.* Sjötorp i Änimskog sn. *VG.* Sjötorp; Degeberget; Kållandsö vid hamnen Pirum; Kinnekulle, vid Venern.) *Stjelen 3—10 tum hög, grenig med små blr., men kronbladen dubbelt längre än fodret. Rotbladens småblad bredare, stundom jemte stjelnbl.: tandade.*

†† Bladen odelade.

- 7 *C. bellidifolia* L. alla bladen äggrunda helbräddade, långt skaftade; kronbl. dubb. längre än fodret; skid. flere gånger längre än skaften. 2½, 7, 8, hv. blr. Fig. Lin.FLL.t.9,f.2. Sv.B.772. FL.D.20. H.N.f.7, n:o 17.

Högre fjellv. (Lpl.—*Herjed.* — N. Finnm. — Dovre.) 1—2 tum hög stjeln, än högre, än kortare än rotbladen.

## 229. ARABIS Lin. Backbränna.

† Stjelnbl. talrika, omfattande, sågtandade.

- 1 *A. hirsuta* Scop. rotbl. smalt omv. äggrunda; stjelnbl. aflånga; blrna längre än skaften, med upprätta, aflånga kronbl.; skidorna upprätta tilltryckta. 2½, 5, 6, hv. blr.

- *β glabrata*: bladen glatta, vid basen härbräddade. Fig. Fl.D.1040. H.N.f.12, n:o 50.
- \* *sagittata* DC. gröfre, bladen fingerbredda, med större tänder och pil-liket stielkomfatt. bas; frön hinnkantade, otydl. punkterade. Fig. Reich.f.4343, b. H.N.f.10, n:o 33.
- \* *Gerardi* Bess. stult. alnsbög, med bl. som *sag.*, frön hinnkantade och nättlikt punkterade. Fig. H.N.f.14, n:o 30.
- Ängsback. (Sk.—Lul. Lpm. Boh. Öl. Gutt. — N. till Finnm. — *β* Sk. Öst. Torp. Öl. Gutt. Carlssvärd, Thorsborgsen etc. — N. Egeberget. — \* *sagitt.*: VG. Södm. Mariefred. Stockh. Vermdön. Öl. Gutt. — N. Christiania. Öurdal. — \* *Ger.*: Gutt. i Akebäcksmyr.) *Turritis* L. *β* *T. alpina* Retz. \* *sag.* Ar. *sagittata* DC. A. *kirs.* *γ* *crassior* Wg. \* *Ger.* A. *glastifolia* H.N.
- 2 *A. alpina* L. rotbl. omv. äggrunda; stielkbl. *äggrundt aflånga*, alla finludna; blrna kortare än skaften, med *utböjda*, omv. *äggrunda* kronbl.; skidorna *utstående*. 2 7, hv. blr. Fig. Sv.B.773. Fl.D.62. H.N.f.7, n:o 16.
- Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) *Stielken vid basen nedliggande och gifvande grenar, som utvecklas och blomma efterhand. Blrna större än hos de öfriga arterna.*
- †† Stielkbl. fåtaliga, icke omfatt., ätm. de öfre helbräddade.
- 3 *A. petraea* Lam. rotbladen tunglika, *tandade eller grundt*flikiga; stielkbladen n. *jembreda, helbräddade*; blrna *längre* än skaften; kronbl. omv. *äggrunda*; skidorna *utstående*, på upptill *knöl-liket* vidgade skaft. 2 6, 7. Fig. Sv.B.676. Fl.D.386, 1392 och 1462. H.N.f.3, n:o 22.
- Grusiga stränd. r. (Ängml. Hernön, Hemsön, Bondskär, Lofmen; Nora sn, Grönsvik m. fl. st. — N. Inre Sogn här och der: Ax. Bl. Hardanger-fjellen; Oldendalen; Romsdalen i Eikisdal; Lom; Dovre etc.) *Har större blr än de följ., vanl. hvita, stund. violetteröda; stj. och bl. variera från n. glatta till stråfhåriga. — Cardamine* L.
- 4 *A. arenosa* Scop. *β borealis* Fr. rotbladen omv. äggrunda, meränd, *lyrformigt parflikiga*, med n. vinkelrätt utsperrade flikar; stielkbladen *lancetlika, de nedre hvass-tandade*; blrna *af skaftens längd*; kronbl. *spadlika*; skid. som föreg. med något vidgadt fäste. 2 6, 7, gred. blr. Fig. Fl.D.1760. Reich.f.4322, c. H.N.f.7, n:o 15.
- \* *suecica* Fr. stj. mera bladig; rotbl. mindre djupt flikade; kronbl. hvita, vid basen gula. Fig. H.N.f.7, n:o 14 och f.10, n:o 34.
- Vid städer, byar etc. r. (Smål. Kråksmåla; Fagrasög i Elghult enl. Scheutz. ÖG. Norrköping; Skenninge enl. Kindb. Uppl. Onrike i Tibble. G. v. Ced.; Uppsala; samt Medelp. Löjdö bruk enl. Lemf. Vestm. Vesteråstrakten. — \* Södm. Ner. och Verm. — Helsl. Dal. Jemt. Östersund. Ängml. Hernön och Säbrå sn: Arn. VB. Umeå.) *Väl utvecklade ex. äro, blommande, 1/2 aln höga, med 1/2 tums breda, djupt flikade blad; men öfvergår på olika lokaler i underarten. Fröen, dubb. större än hos följ., hafva rotämnet alltid kantliggande. — Sisymb.* *arenosa* L.F.L.Su.
- 5 *A. thaliana* L. rotbladen aflånga ell. ovala, *helbräddade* ell. *glost tandade*; stielkbl. *lancetlikt jembreda, helbräddade*; blrna vanl. kortare än skaften; kronbl. *tunglika*; skid. som föreg. ☉ 4, 5, hv. blr. Fig. Fl.D.1106. Reich.f.4380.
- Torra st. a. (Sk.—Pit. Lpm. — N. till Finnm. (Norm.) *Quartershög, spenslig, med små rotblad. — Conringia* Reich. *Sisymbrium* Koch.

## 230. TURRITIS Lin. Räckentraf.

- 1 *T. glabra* L. rotbladen aflånga, bugttandade, fint mjukludna; stielkbladen äggrundt lancetlika, pil-liket omfattande, helbräddade, glatta; skidorna många gånger längre än skaften. 2 6, 7, hvit. blr. Fig. Sv.B.399. Fl.D.809.
- Torra st. a. (Sk.—Lpl. — N.) 1—2 alnar hög blågrön, oftast enkel växt, med *låttsittande, uppd. i storlek aflagande* blad. — *Arabis perfoliata* Lam.

## 231. BARBAREA R. Br. Sommargyllen.

- 1 *B. vulgaris* Br. rotbladens ändflik *hjerterlikt rundad*; stielkbladen groft bugttandade eller pardelade; kronbladen *bredt* vigglika, i spetsen *intryckta*; skidorna meränd. *frånstående*, med smalare stift. 2 6, 7, g. blr. — *β arcuata*: stielkbl. pardelade med

aflånga sidoflikar, 3—5klufven ändflik; skidornas skaft utstående. jemte skidorna hågligt krökta uppåt. Fig. Sv.B.194. Fl.D.985.  $\beta$  Reich.f.4357. H.N.f.6, n:o 17.

\* *præcox* Br. stjelkl. som hos  $\beta$ ; skid. smala, n. upprätta; smaken bitter (krasselflk). Fig. Fl.D.1759. H.N.f.1, n:o 28.

Åkerren. dik. etc. (Sk.—Held. Ängml. Säbrå; m. fl. snr: Arn. Vestml. Verml. Carlstad och i bergslagen. Dalsl. Ö. Gottl. — N. — \* Sk. Vidtsköfve; Åhus; Lund. Smål. Rostad nära Kalmars; Ön i Sjösås sn; Vexjö. ÖG. flerst: Kindb. Hall. Varberg. Verml. Carlstad.) 1—2 fot hög, med rika höggula blomklasar, 6—10 linier långa skidor. \* är mycket utmärkt af sin bittra smak, hvarför den odlas; ehuru öfven  $\beta$  någon gång finnes lika bitter. — *Erysimum Barbarea* a L.Fl.Su.  $\beta$  Barb. arcuata Reich. \* är  $\gamma$  *acidula* ed.9.

2 *B. stricta* Fr. rotbladens ändflik aflångt äggrund; stjelkbladen ovala—afånga, tandade, ofta med små sidoflikar vid basen; kronbladen smalt vigglika, tvärhuggna; skid. tilltryckta, med kort, n. lika tjockt stift.  $\Delta$  6,7, g. blr. Fig. Fl.D.2727. Reich. f.4355. H.N.f.6, n:o 16.

Fukt. äng. stränd. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) 1—3 fot hög, äldre med långa upprätta klasar af tumslånga skidor; blrna dubbelt mindre än hos föregående, ofta öfvervuxna af de äldre skidorna. Rotbladens ändflik stundom med något hjertlik bas. — *B. parviflora* Fr. Nov. ed. 2. *B. vulgaris* a Wg. *Erysimum Barbarea*  $\beta$  L.Fl.Su.

### 232. NASTURTIIUM R. Br. Vattenkrasse.

† Blrna hvita; kronbl. alltid längre än fodret.

†1 *N. Armoracia* Fr. rotbladen äggrundt aflånga odelade rundsågade; stjelkbladen lancettlika, hela och sågade, eller parklufna; skidorna ovala, mycket kortare än skaften.  $\Delta$  6,7. Fig. Sv.B.242. H.N.f.8, n:o 21.

Vid vatten. r. (Sk.—Held. Vestml. och Verml. Boh. Ö. Thorslunda sn; G. v. Ced. Öfverallt förvildad.) Hög växt, med mycket stora rotblad. — *Cochlearia* L. *Armoracia rusticana* Koch.

2 *N. officinale* Br. alla bladen parbladigt delade, med n. hjertlikt rundade eller aflånga småblad; sidoklasarne motsatta bladen; skid. jemnbreda, krökta, af skaftens längd.  $\Delta$  7,8. Fig. Sv.B.624. Fl.D.690. H.N.f.15, n:o 33.

Vatten. (Sk. Hall. Smål. Misterbult sn, vid Horfve källa nära Köksmåla. Gottl.) Småbladen variera i hög grad till storlek och form, från 2—3 lin. till 2 tum i längd, samt från rundade till aflångt hjertlika ell. n. lancettlika: *N. trifolium* Reich. — *N. aquaticum* Wg. *Sisymb. Nasturtium* L.

†† Blrna gula.

\* Kronbl. längre än fodret.

3 *N. amphibium* Br. de nedre bladen pardelade, de öfre odelade, lancettlika; skidorna n. klotrunda af stiftets längd, flere gånger kortare än skaften.  $\Delta$  7,8. Fig. Sv.B. 697. Fl.D.984 enl. Lge.

Vatten. (Sk. Blek. Smål. Kalm. län; Pjetteryd i Vexjö län enl. Scheutz. — Uppl. och Vestml. YG. Venersborg. Boh. Christinedal. Hall. Ö. Gottl. — N. söd. och vest. del.) Bladen under vattnet ofta fint pardelade. — *Sisymb. L. N. aquaticum* Wallr. *Roripa* Bess.

4 *N. silvestre* Br. alla bladen pardelade; skidorna jemnbreda plattade tväggade, många gånger längre än stiftet, ungefär af skaftens längd.  $\Delta$  7,8. Fig. Sv.B.695. Fl.D. 1881. H.N.f.11, n:o 35.

Stränd. (Sk. Blek. Carlshamn: Goss. Smål. Kalm. län. — Gefle. Ner. Göthlunda sn, Locknäs; norr om Örebro. Boh. Ö. Gottl.; särd. ymnig omkr. Mälaren. — N. Christiania.) Skidorna i början trådlånga, slutt. n. sabelformiga. — *Sisymbrium* L.

5 *N. anceps* Wg. bladen som hos föreg.; skidorna aflånga plattade zeggade, tre gånger längre än det utdragna stiftet, nära dubb. kortare än skaften.  $\Delta$  7,8. —  $\beta$  *micropetalum*: blrna mycket små, söga öfver en linie långa. Fig. Sv.B.696. H.N.f.6, n:o 18;  $\beta$  f.11, n:o 36.

Stränd. (Sk. ÖG. Täby, nära Mem; samt vid Roxen, Svartån och Vettern: Kindb.

*Södm. Uppl. och Vestm. städ. kring Mälaren. Öl. Köping sn. Gottl.) Föga skiljd från föreg. — Sisymbrium Wg. Fl.Ups.*

\*\* Kronbl. af fodrets längd.

- 6 *N. palustre* DC. bladen pardelade; skidorna aflånga, uppsvållda, i båda ändar och kanter trubbiga, af skaftens längd, med ganska korta stift. ☉ 6—9. Fig. Sv.B.694. Fl.D.409 och 931. H.N.f.6, n:o 19.

Våta st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) *Sisymbrium amphibium* β *L. S. islandicum* Fl.D. *Roripa* Bess.

- 4 Flocken **Lomentaceae**. Ledsida med 2, eller flere rum öfver hvarandra, affallande hel eller styckewis i lederna.

### 233. RAPHANUS Lin. Rocka.

- 1 *R. Raphanistrum* L. bladen lyrförmiga med likförmigaflikar; skidorna slutl. ledade strimliga eller färade. ☉ 7, 8. Fig. Linn. Diss. de Raphania. Sv.B.623. Fl.D.678. Åkrar och odlade st. (Sk.—Ängml. och Jeml. Östersund och Ovikén. Boh. Oroust. Öl. Gottl. — N. till Finm.) Skidorna äro stundom djupt färade, blrna vanl. hvitgula med något viol. ädror, stund. rent gula, lika dem hos *Sinapis arvensis*, men lätt skiljbara af det tillslutna fodret. — *Raphanistrum innocuum* Mönch. *R. segetum* Reich. *Sinapis* arv. Fl.D.

### 234. CRAMBE Lin. Strandkål.

- 1 *C. maritima* L. bladen bredt äggförmiga, inskuret bugtiga, tandade och vågiga, köttiga blåaktiga, jemte stjelen glatta; skid. n. klotrunda. 2 7, hv. blr. Fig. Sv.B.495. Fl.D.316.

Hafsstr. r. (Sk. Sandhammar; Helsingborg; Kulla-Gunnarstorp; Torekow etc. Hall. Boh. på Vinga och Domsö; Koster, Lyngholmen etc.; Storön, Hvalö etc. — N.) Liknar kål.

### 235. BUNIAS Lin. Buna-ria.

- 1 *B. orientalis* L. de nedre bladen n. lyrförmiga, med stor spetsad ändflik, de öfre hela lancettlika; skid. snedt äggförmiga. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.1651. Reich.f.4162. H.N.f.16, n:o 36.

Odl. st. (Sk.—Helsl. Jeml. Dal. Smedjebacken; Hedemora. Vestm. Ner. Dalsl. Ekholmen i Gunnarsnäs enl. Leml. Öl. Gottl. enl. G. v. Ced. — N. Christiania; Skien; Kongsberg etc.) Stor blomrik växt; bladen mer och mindre tandade. — *Lælia* Reich.

### 236. CAKILE Scop. Mar-viol.

- 1 *C. maritima* Scop. bladen parflikiga, pardelade ell. bugtigt tandade, köttiga; skidans öfre rum pil-lik, något plattadt. ☉ 7, 8, blåroda blr. — β *latifolia*: bladen aflånga, bugtigt ell. trubbigt tandade. Fig. Sv.B.407. Fl.D.1168; β 1583. H.N.f.3, n:o 19.

Hafsstrand. (Sk.—Boh. Blek. Smål. Kalmar, vid Stensö; Oscarshamn och Vestervik. Södm. Ålön under Utön; Sandhem enl. G. v. Ced. Öl. söd. udde, Runsten sn etc. Gottl. — N. till Nordl. och syd. Finm. Ost-Finm. vid Kjöllefjord. Norm.) Meränd. nedliggande. — *Bunias Cakile* L. β *C. marit.* β *integrifolia* Koch.

- 5 Flocken **Nucamentaceae**. Skida kort; mogen enrummig och enförg, nötkl.

### 237. NESLIA Desv. Korndådra.

- 1 *N. paniculata* Desv. bladen lancettlika, pil-liket stjelkomfattande, stråfva; skidorna nättlikt ryngiga, med långt stift. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.204. H.N.f.15, n:o 36.

Odl. st. (Sk.—Uppl. Vestm. VG. nära Venersborg. Dalsl. Stakesund i Gunnarsnäs enl. Leml. Boh. Christinedal. Hall. Öl. Gottl. — N.) *Myagrum* L. *Rapistrum* Gärtn.

### 238. ISATIS Lin. Vejde.

- 1 *I. tinctoria* L. rotbl. småtandade; stjelkl. helbrädd., pil-liket stjelkomf.; skidorna af-



långa, afsmalnande mot basen, i spetsen rundade glatta.  $\text{D}$  7, g. blr. Fig. Sv.B.35. H.N.f.4, n:o 33.

Torra st. särdeles hafsstrand. r. (Sk. Åhus samt på Öar i Saxaviken.—Gefle skärgård. Stockh. på många st. Öl. Gottl. — N. Salten på Grönholmen.) Blågrön; blrna små, föga öfver en linie långa; bladen lancettlika.

6 Flocken **Lepidinese**. Skida kort, 2rummig, med smal skiljevagg.

### 239. LEPIDIUM Lin. Krasse.

† Stiftet flere g:r kortare än skidan, ofta omärkligt.

1 *L. latifolium* L. bladen pil-lik, stjelkomfattande, odelade, äggrundt lancettlika sågade, mot spetsen helbräddade; skid. bredt äggr., med omärkligt stift.  $\text{D}$  7—10, hv. blr. Fig. Sv.B.638. FLD.557. H.N.f.9, n:o 24.

Grusiga st. vid kusten, r. (Sk. Lilla Hammar; Löddeström; Landskrona; Torekow etc. Bleik. Sölvitsborg på skären; Ronneby, yttre Stekö m. fl. st. Smål. Kalmar; Misterhult vid Figeholm, samt på Svinskär under Öro Lotsplats. Boh. Gottl. Visby; Östergarn bortåt Katthammarsvik.) Stor rikblommig växt.

2 *L. campestre* Br. bladen pil-lik, omfatt., odelade, aflånga, naggtandade, grålundna; skidorna rundade, urnupna, upptill vingade, med kort stift.  $\text{D}$  6, 7, hv. blr. Fig. FLD.1221.

Åkerrenar. (Sk.—Gestr. Ångml. Vestanå bruk: Arn. Vestml. Ner. VG. Hall. Öl. Gottl. — N.) Stjelken vanl. grenad i upprätta, n. jemnhöga blomklasar. — *Thlaspi* L.

3 *L. rudérale* L. bladen icke omfattande, de nedre dubbelt ell. enkelt parbladigt delade, de öfre hela jemnbreda; kronbl. 0; stånd. 2; skid. rundade, med omärkligt stift.  $\text{D}$  5—9. Fig. Sv.B.321. FLD.184.

Vid hus, vägar etc. (Sk.—Gestr. Hels. Iggesund m. fl. st. Medelp. Sundsvall. Vestml. Ner. Verm. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N.) Ganska små blr; luktar illa.

†† Stiftet af omkr. skidans längd.

†4 *L. Draba* L. bladen odelade, aflånga, bugtandade; skid. bredt äggrunda med något hjertlik bas.  $\text{D}$  6, 7, hv. blr. Fig. Reich.f.4211. H.N.f.6, n:o 22.

Ballastplatser etc. r. (Carlskrona, på Kronovarvet, der den fordom blifvit införd, och nu bibehållit sig ymnig i åtm. 50 år.) Blomklasarne talrika med små blr. — *Cardaria* Reich.

### 240. CAPSELLA Mönch. Lomme.

1 *C. Bursa Pastoris* Mönch: rotbladen hela eller parklufna; stjelkbladen pil-lik, omfatt.  $\text{C}$  4—9, hv. blr. Fig. Sv.B.273. FLD.729.

Åkrar etc. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Bladen variera hela, bugtandade och parklufna. — *Thlaspi* L.

### 241. THLASPI Lin. Skärf-frö.

1 *T. arvense* L. glatt; bladen aflånga, med pil-lik, omfatt. bas, tandade; skidorna rundade, i spetsen med smal och djup urskärning, omärkligt stift.  $\text{C}$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.214. FLD.793.

Åkrar, a. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl.) Skid. n. af en half tums diam. med n. jemnbred urskärning i spetsen, mångfröiga; rotbladen snart bortvissnande.

2 *T. perfoliatum* L. glatt; stjelkbl. hjertlikt äggrunda, n. helbrädd., med basens likar långt öfverskjutande stjelken; skid. bredt omv. hjertlika, med vid urskärning och omärkligt stift.  $\text{C}$  5, 6, hv. blr. Fig. Reich.f.4183. H.N.f.4, n:o 37.

Grus. st. sandåkr. r. (Uppl. Rasbo, mell. Frötuna och Näset. Öl. Borgholm; Vannborga i Köping och Husvalla i Föra sn; Holmudden i Böda. Förr äfven vid Stockh., på Experimentalfältet.) Skid. omkr. 8fröiga; rotbladen fortvarande, skaftade, mer och mindre rundade.

3 *T. alpestre* L. glatt; stjelkbl. lancettlika, med hjertlik omfatt. bas, icke öfverskjutande stjelken, tandade; skid. smalt omv. hjertlika, med upptill bredare vingkant,

nedåt vigglikt afsmalnande; urskärningen *vidgad* med *utdraget* stift. 2 6, hv. blr. Fig. Fl.D. suppl. 85. H.N.f.7, n:o 22.

Back. r. (ÖG. Norrköping i den mindre Ekbacken vid Marieberg; Smedstad i S. Lars och vid Tinnerbäcken: Kindb. Södm. Åkers styckebruk. Stockh. Nacka Damtorp; Manilla och Marieberg: G. v. Ced. Uppl. Knifsta sn, vid Barrsjön samt på Röd-mossen.) Skid. *mer vigglika än hos de föregående*, 8—10fröiga. — *T. brachypetalum* Jord. *T. suecicum* Fl.D.

#### 242. SENEBIÉRA Poir. Kråk-krasse.

1 *S. didyma* Pers. bladen pardelade; kronbl. 0; skidorna *hvasst urnupna*, nätrynkiga, utan stift. ☉ 6, 7. Fig. H.N.f.6, n:o 21.

Vid kusten, trol. införd med ballast, r. (Hall. Halmstad enl. Theor. Gottl. Hellvigs sn vid kyrkan och Kyllejs hamn; Visby, vid Gamla hamn.: G. v. Ced. Gefle på Brobänken. Hudiksvall på strandgatan. Ängml. Hernösand: Arn.; Nylands lastageplats. — N. Christiania: Möb.) Blrna *ytterst små*; skidans rum *lossnande från hvarandra*. — *Lepidium* L. *Coronopus* Sm.

2 *S. Coronopus* Poir. bladen som hos föreg.; skid. halfrunda *hela*, med *udd af stiftet*, rynkiga, i kanten *knöliga*. ☉ 6—8, hv. blr. Fig. Sv.B.733. Fl.D.202. H.N.f.15, n:o 34.

Vid väg, byar etc. r. (Sk.—Boh. Blek. Smål. Kalmar och Vestervik. ÖG. flerst. i Stångådalen, samt nära Gylttinge i Kärna enl. Kindb. Uppl. Uppsala. Helsl. Söderhamn, Hudiksv. och Ströms bruk: Wistr. Medelp. Sundsvall. Ängml. Hernösand: Arn.; vid Nyland. Öl. Gottl. — N. Arendal; Christiania; Bergen.) Blrna i korta *lätta klasar*. Skidan *affaller hel, utan att rummen åtskiljas*. — *Cochlearia Coronopus* L. *Coronopus depressus* Mönch.

#### 243. TEESDALIA R. Br. Vallkrasse.

1 *T. nudicaulis* Br. rotbl. lyrformigt pardelade, stund. hela; ståndarsträngarne med ett fjäll-lik bibang. ☉ 4—6, hv. blr. Fig. Sv.B.732. Fl.D.323. H.N.f.1, n:o 31.

Torra st. sand, etc. (Sk.—VG. Göteborg; Alingsås etc. Boh. Blek. Smål. Kalm. län, vid kusten. Öl. — N. efter kusten från Arendal till Bergen.) Har 2—4 *tum hög*, *vanl. bladlös stjelk*. — *Iberis* L.

#### 244. HUTCHINSIA R. Br.

1 *H. petraea* Br. stjelen grenig bladig; bladen parbladigt delade, med hela likar; skidorna elliptiskt ovala. ☉ 4, 5, hv. blr. Fig. Reich.f.4190. H.N.f.4, n:o 36.

Torra st. klipp. r. (Sk. Kåseberga; Brösarp. Blek. Carlskrona, flerst. ymnig; Kungsholms fastn. Södm. Utöns norra udde, och vid grufvan; Landsort; Fridön vid Tullgarn. VG. Kinnekulle. Öl. Gottl.) 2—3 *tum hög*, *späd och slutt. mycket grenig*. — *Lepid.* L. *Iberis* Wg. *Capsella* Fr.

#### 245. SUBULARIA Lin. Sylört.

1 *S. aquatica* L. stängel, med syl-lik blad vid roten. ☉ 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.35. Reich.f.4232. H.N.f.6, n:o 20.

Stränd. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Blomstängeln, som *utgår från ett af bladvecken*, 1—1½ *tum hög*. Blrna *små klasvisa*, utan kronblad, då de äro under vallen.

7 Flocken *Alyssineæ*. Skida kort, 2rummig, med bred skiljevägg.

#### 246. LUNARIA Lin. Månviol.

1 *L. rediviva* L. bladen skaftade, hjertlika, ojemnt hvasstandade; skidorna ovala, åt båda ändar spetsiga, med kort stift. 2 6, 7. Fig. Fl.D.2241. H.N.f.16, n:o 39.

Lundar, r. (Sk. Gladsax vid Jerrestads-hallar; Krageholm, på ön Lybeck; Gudmundstorp; Öfvedskloster; Kullaberg m. fl. st. VG. Kinnekulle vid Hellekis och Råbäck etc. Boh. Uddevalla i skärgården.) *Älnshög*, med *stora blad och skidor, ljusröda ell. något viol. blr.*

#### 247. CAMELINA Crantz. Lindådra.

1 *C. silvestris* Wallr. bladen *lättsittande fasta*, lancettlika, n. *helbrädd.* med pil-lik

bas; skid. något plattade, päronformiga, af fasta skal, åtskiljda af en smal *utskjutande* kant, fint *sträfsprickiga*, i spetsen rundade; stift. af *halfta skidans längd* ell. längre.  $\gg$  6, ljusg. blr. Fig. Sv.B.339. Fl.D.2726. H.N.f.7, n:o 19.

\* *microcarpa* Reich. skid. små, föga längre än stiftet, och med bredare kant. Fig. Reich.f.4293.

Åkr. etc. (Sk.—VB. och Jeml. — N.) Något blåaktig till färgen. Var. *glatt* och *hårig*, samt med *glet småtandade* blad, aldrig *groftand.* ell. *flikiga*. — *Myagrum sativum* L. *Alyssum* Sv.B.

2 *C. sativa* Fr. bl. som föreg.; skid. aflångt omv. äggformiga, af fasta skal, med *mycket smal* kant, fint *nåldådriga*, i spetsen rundade; stift. *knappt* af *halfva skidans längd*.  $\odot$  6, 7, g. blr. Fig. H.N.f.15, n:o 35.

Linåkr. r. (Sk. här och der i linåkr. enl. F. Aresch. Hall. Gottl.) Var. som föreg., samt har *lika* som den *fastare* blad och *skidor* än följ. Blrna och skid. äro *ordnade* n. i *vippa*, hos föreg. och följ. i *enkel* klase. — *Myagr. sativum*  $\beta$  L.

3 *C. fetida* Fr. bl. åtskiljda, tunna, än *hela*, än *bugttandade* eller *parklufna*, med pil-lik bas; skid. omv. äggformiga—n. klotrunda, med *mycket upplåsta* och *tunna* skal samt *föga märklig* kant, fint *nåldådriga*, i spets. *tvärhuggna* eller n. *intryckta*; stift. *merändels kort*.  $\odot$  6—8, ljusg. blr. Fig. Fl.D.1038 och 1824. H.N.f.7, n:o 20, 21.

Linåkr. (Sk.—Ångml. och Jeml. Boh. Öl. Gottl.) *Hela örten vekare* och af *renare grön färg* än de föreg.; skid. *stora* med *lätt hoptryckta* och *bristande* skal, *större frön*. — *C. sativa* och *dentata* Fr. i H.N.f.7.

#### 248. ALYSSUM Lin. Gråddråra.

1 *A. calycinum* L. stjelken vid basen delad i uppböjda grenar; bladen jemnbredt tung-ell. lancettlika, stjernludna; foderbladen kölade, quarsittande vid de cirkelrunda, i spetsen intryckta, finhåriga, vingkantade skidorna.  $\odot$  5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.1704. Reich. f.4269. H.N.f.1, n:o 29.

Sandback. r. (Sk.—Uppl. Rasbo och Edebo snr, och Verm. Sundsta vid Carlstad. Boh. Uddevalla: Lem. Öl. Gottl. — N. Christiania: Ax. Bl.) Var. *mer* och *mindre* *hvitluden*. Vid *första blomningen* *fingerhög*, *sedermåra* *flere* *gångar större*; *kronbl. små*, *torra* n. *hvita*.

#### 249. FARSETIA R. Br. Sandhvita.

1 *F. incana* Br. bladen lancettlika; kronbl. 2klufna; skidorna smått grålludna.  $\gg$  7, hv. blr. Fig. Sv.B.675. Fl.D.1461. H.N.f.1, n:o 30.

Torra st. r. (Sk. vest. delen. Blek. Carlskrona och Carlshamn. Smål. Vexjö: Scheutz. ÖG. Qvillinge vid Ettarp; Norrköp. m. fl. st. Stockh. på Observatorien-backen etc. *Helsl.* Söderhamn vid Långör; Ströms och Iggesunds bruk: Wistr. Dal. Smedjebacken. Verm. vid Bäckängen i Ö. Ullerud; vid Carlstad i Sundsta. Boh. Marstrand; Kongelf enl. Lem. Hall. mell. Karup och Båstad: Theor. Gottl. Visby enl. Lem. — N. Christiania: Ax. Bl.) *Fotshög* ell. *mera*, *grå* af *stjernludd*. — *Alyssum* L. *Berteroa* DC.

#### 250. COCHLEARIA Lin. Skörbjuggsört.

1 *C. danica* L. rotbladen *spjutlikt hjertlika*; stjelkbl. triangel-ell. rutformiga, vinkligt tandade, *de öfre kort skafade*; skidorna rundadt äggformiga.  $\gg$  5, 6, hv. blr. Fig. Fl.D.100. Reich.f.4257. H.N.f.4, n:o 35.

Sten. hafsstr. r. (Sk.—Rosl. t. ex. Ornö; Utö; Singö; Grisslehamn. Hall. Sandö. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Bladen* hos *alla arterna köttiga*; *rotbl. skafade*.

2 *C. officinalis* L. rotbladen *hjertlikt rundade*; stjelkbl. äggrunda eller aflånga, merändels vinkligt tandade, *de öfre pil-lik* *stjelkomfattande*; skid. n. klotrunda.  $\gg$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.87. Fl.D.135. H.N.f.13, n:o 50.

\* *arctica* (Schlecht.) rotbls bas ofta tvär ell. afrundad; skid. äggformiga, med längre stift. Fig. H.N.f.16, n:o 40.

Hafsstr.; \* vid Sjellbäck. (Sk. Hall. Boh. Blek. Smål. Kalmar, vid Jutnabben; Refsudden i Ryssby; Vestervik. Öl. vid Färjestaden och Karlevi hamn enl. Ekstr. — N. till Finn. — \* N. Vest-Finn. i Tromsödalén; Lyngen; Maasö: Th. Fr. Ost-Finn. sterest. nära Varangerfjorden; Berlevaag.) *Slutl. fotslång* och *mycket grenig*; skid. *trubbiga* med *tydligt* stift. \*, som dr *C. arctica* Fr. *Mant. III* och

*Hn.ed.9*, utgör en medelform till följ. art, hvilken måhända sjelf ej är annat än en form af *C. offic.*

- \*3 *C. anglica* L. rotbl. *ägggrunda*, stund. med grundt hjertlik bas; stjelkl. lancettlika ell. aflånga, helbrädd. ell. något tandade, stjelkomf.; skid. *ovala—lancettlika*, med tydligt stift.  $\textcircled{D}$  6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.329. Reich.f.4258.  
*Hafstr.* r. (N. Finnm. t. ex. Hammerfest; Kaafjorden, nedom Sakkabani enl. Th. Fr.; Lyngen etc. Nordl.)  $\frac{1}{2}$  *aln* hög; *knappt skiljd från föreg.* med annat än de aflånga skidorna.

### 251. DRABA Ltn. Nagelört.

† Kronbl. ungef. till midten 2klufna: *Erophila* DC.

- 1 *D. verna* L. stängeln bar; skid. aflånga—ovala, kortare än skaften.  $\textcircled{D}$  4, 5, hv. blr. —  $\beta$  *præcox*: mindre; skid. ovala. Fig. Sv.B.298. Fl.D.983.  $\beta$  Reich.f.4233. H.N.f.4, n:o 34.

Torra st. a. (Sk.—*Ängml.* och *Dal.* — N. till Trondhj. —  $\beta$  *Gefle.* Stockh. VG. Venersborg enl. Leml. Blek. enl. Gosselm. Öl. Goutl.) *Blommande tumshög, med ovala ell. aflånga rotblad, sedan 3—4 tum hög;  $\beta$  alltid mindre, ofta med bredt ovala skidor. Var. med köttiga, än n. glatta, än stråfhåriga bl., aflånga skidor: var. pinguis Th. Fr.*

†† Kronbl. hela ell. grundt urnupna.

\* Roten svag, en-årig, utan grenskott.

- 2 *D. nemorosa* L. bladen *ägggrunda* sågade; kronbladen *urnupna*; ståndarne 6; skid. elliptiskt aflånga, *dubbelt* kortare än skaften.  $\textcircled{D}$  4, 5, g. blr. Fig. Sv.B.767. H.N.f.3, n:o 24.

Sandåsar, murar, r. (Södml. vest. Vingåker, Vannala. Stockh. på Observatoriibacken. Uppsala. *Gefle.* Medelp. Hälsjö sn enl. Leml. *Ängml.* *Dal.* Säter, Klothytan; Grängårde sn, Björnhytte bruk och Grängesberget. Vestml. Skinnskatteberg; Nya Kopparberget. Ner. Örebro. Verm. Ölmeåhrad, vid Kungskogens hytta. — N. Kongsberg.) *Är först på våren n. stjelklös, sedan ofta stor och grenad i långa klasar; skidan vanl. fñluden, på ex. fr. Dal. glatt: D. lulea Gillsb. — D. muralis  $\beta$  L.Fl.Su.*

- 3 *D. muralis* L. bladen hjertlikt *ägggrunda* sågade stjelkomfattande; kronbl. *hela*; stånd. 4; skid. som hos föreg., *föga* kortare än skaften.  $\textcircled{D}$  5, 6, hv. blr. Fig. Reich.f.4235. H.N.f.5, n:o 16.

Skogsback., lund r. (Sk. öst. delen.—Uppl. Vestml. Öl. Goutl. — N. Tönsberg, i parken vid Berg.) *Skidor och skaft utsperrade.*  
*(D. incana)*

\*\* Roten 2—flerårig, merändels bärande flere stjelkar eller grenskott.

a — Stjelken vanl. flerbladig; bl. tydl. sågade ell. tandade.

- 4 *D. incana* L. stjelken 3—*mångbladig*, jemte de *ägggrunda—lancettlika*, sågtandade bladen tätt och fint stjernluden; skid. *utdraget* aflånga ell. lancettlika, *vridda, mycket längre än skaften.*  $\textcircled{D}$  5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *stricta*: högre, styfvere, med talrika, vanl. tättsittande, lancettlika blad. Fig. Fl.D.130. Reich.f.4249 [ $\beta$ ]. H.N.f.5, n:o 14,  $\beta$  n:o 15.

Torra st. r. (Södml. Tynnelsö djurg. i Ölver-Selö; Hammar i Vester-Hanninge. Uppl. Uppsala; Lidö; Forsmark; Ångskär i Hollnäs; Elfkarleby. Gestr. Limön. *Ängml.* Hernösand. Herjed. Ljusnedal; Vallarne; Hamrafjell; Malmagen etc. Vestml. Sala grufva; Hälla äng i Badelunda. VG. Kinnekulle och Mösseberg. Öl. Goutl. — N. till Finnm.) *a har så och mer åtskiljda blad än  $\beta$ . Skidorna vanl. fñludna, stundom glatta. Saknar stundom grenskott vid roten. —  $\beta$  D. contorta Ehrh.*

- 5 *D. hirta* L. stjelken meränd. 1—4bladig, stjernluden eller småhårig; bladen som hos föreg., med 1—3 sågtänd. i kanten; skid. *ägggrundt* aflånga—lancettlika, *än längre, än kortare än skaften.*  $\textcircled{D}$  6, 7, hv. sällan något gulakt. blr. Fig. Sv.B.768. *Var. i hög grad och har gifvit anledning till flere arter, som dock näppeligen kunna begränsas; sådana äro:*

\* *D. incano-hirta* Hn. 1—2 qv. hög med stjelk och blad fint och tätt stjernludna; skid. lancettlika, med något utdraget stift; blrns torra gulaktiga. H.N.f.8, n:o 24. *D. dovreensis* Fr.

- \* *D. rupestris* Br. 1—2 qvart. hög och slak, glesare stjernluden och hårig; skid. lancettlika med omärkligt stift; blrna alltid hvita. H.N.f.3, n:o 23 och f.8, n:o 22. *D. hirta* och *laxa* Lindbl. *D. hirta*  $\alpha$  *infernalis* Wg. Fl.L.  $\gamma$  *rupest.* Fl.Su. —  $\beta$  *scandinavica* Lindbl. lågväxt och upprät, hårig, men föga stjernluden; stjelen bar, eller 1—2bladig; skid. äggrundt aflånga, med omärkligt stift; blrna alltid hvita. H.N.f.8, n:o 23. *D. hirta* L. enl. Solanders ex. *D. hirta*  $\beta$  *alpicola* Wg. *D. hirta* Sm. *D. rupestris* Bab. och trol. Br.
- \* *D. lutescens*: stjelen låg, bar ell. enbladig, jemte blomskafven hårig; blrna små gulaktiga.
- \* *D. trichella* Fr. stj. låg, bar ell. enbladig, jemte blomskafven hårig och stjernluden; skid. äggr. ell. ovala utan stift; bl. oftare helbrädd; blrna små hvita.
- Fjelltr. (Lpl.—Herjed. — N.) Saknar aldrig grenskott.

b — Stängel ell. enbladig stjelen; bl. helbräddade.

- 6 *D. Wahlenbergii* Hn. stj. bar ell. enbladig glatt; bladen lancettlika, merändels håriga; blomskafven och de n. ovala skid. glatta. 2 6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *heterotricha*: bladen hår dels enkla, dels gaffelklufna. Fig. Wg.Fl.L.t.11. Sv.B.770. H.N.f.5, n:o 17.
- \* *glacialis* Ad. bladen glatta hårbräddade; blrna smärre och gulaktiga.
- \* *brachycarpa* Zell. bl. ofvan glatta, under stjernludna; stiftet tydligt.
- Fjellv. r. (Lul. Lpm. Pit. Lpm. Kåbdespakte etc. — N. Finnm. Lyngentind m. fl. st. Dovre vid Kongsvold allmän; Blaaohø; Jerkind; Vaarstien; Drivstuen etc. Valdres och Tellemarken. — \* *glac.* N. Finnm. Lyngen på fj. Tsatsa. — \* *brachyc.* N. Dovre, på Gederyggen vid Jerkind.) Är ofta svår att skilja från smärre former af *D. hirta*, särđ. i blom. tillstånd, då den är föga utmärkt af annat än glattheten, som stund. sträcker sig afven till bladen. — *D. androsacea* Wg.Fl.L. *D. lapponica* DC. och Wg.Fl.Su. *D. stellata* Fl.D. enl. Blytt. *D. lactea* Adams enl. Ledeb. — \* *glac.* synes vara *D. ochroleuca* Bunge och Ledeb.
- 7 *D. nivalis* Liljeb. stängeln och blomskafven stjernludna; bladen tunglika, grå af ett tjockt stjernludd; skid. lancettlika, glatta. 2 6, 7, gulakt. hv. blr. Fig. Wg.Fl.L.t.11. Sv.B.769. H.N.f.5, n:o 18.
- Fjellv. r. (Torn.—Pit. Lpm. — N. Finnm. Mehavn. Nordl. Salten. Dovre, på Fogstuevols, högst på Harbacken, samt på Gederyggen vid Jerkind.) Blommande vanligen 1—1½ tum hög, stulligen n. 3 tum; utmärkt af de genom luddet hvilgrå bladen, som sakna längre hår, samt de smala skidorna. — *D. muricella* Wg. *D. Liljebladii* Wallm. i Lilj.Fl.ed.3.
- 8 *D. alpina* L. stäng. och blomsk. småhåriga; bladen lancettlika håriga; skid. äggrundt ovala, n. glatta, med kort stift. 2 6, 7, g. blr. Fig. Wg.Fl.L.t.11. Sv.B.771. Fl.D.56. H.N.f.5, n:o 19.
- Fjellv. (Torn.—Pit. Lpm. Herjed. stora Midtåklappen, på nordvestra sidan. — N. Finnm.—Dovre allm. Vangsfjellet.) Utmärkt af sina teml. stora, rent gula blr och de vid basen bredare, ofta bredt äggrunda skidorna, hvilken sednare form är *D. oxycarpa* Somf.; stäng. n. alltid bladlös, vid fruktmogningen ofta quartershög.

38 Fam. POLYGALEÆ Juss. Fod. och krona oregelbundna. Ståndarsträng. 8, samväxta, med enrummiga knappar. Fröhus 2rummigt, med ett hängande frö i hvarje rum.

252. POLYGALA Lin. Jungfrulin, Fogel-ört.

- 1 *P. vulgaris* L. de nedersta stjelen bl. ovala, smärre än de öfre jemnbreda—smalt lancettl. bladen; skärmb. ovala, alltid kortare än de ouslagna blrna; de större foderbl. betydligt längre än fröb. 2 6, 7. —  $\beta$  *oxyptera*: foderbladen mycket spetsiga, smärre än fröb. Fig. Sv.B.712. Fl.D.516. H.N.f.14, n:o 27.  $\beta$  Reich.t.1346.f.2.

\* *depressa* Wend. nedliggande, spåhare och grenig, med fåblomm. klasar, en del blad motsatta. Fig. Reich.t.1347.f.1.

Ängsback. a.; \* bland ljung etc. (Sk.—Medelp. och Jemt. Boh. Grebhestad. Öl. Gotl. — N. till Nordl.) Blrna störst i släktet, vanl. rent blå, sällan hvita, eller på kalkgrund röda. Skärmb. hos alla arterna affalla tidigt.

- 2 *P. comosa* Schk. stjelkbl. som hos föreg.; skärmb. lancetlika, de öfre längre än de uteslagna blrna; de större foderbl. knappt längre än fröh. 2 6, 7, viol. röda blr. Fig. Sv.B.713. Reich.t.1346, f. 4. H.N.f.3, n:o 13.
- Äng. (Sk. och Blek. sällsynt. Smål. Kalm. län; samt flerst. i Kronob. län. — *Gesle. Helsl.* Friggesund i Bjuråker. *Vestml. Ner. Dalsl.* i Ed sn. *Öl. Gottl.*) 6—10 tum hög, med något mindre blr än föreg. Utmärkt af att fröh. och foderblad äro n. lika långa. — *P. vulg.* β *violacea* L.
- 3 *P. amara* L. de nedersta stjelkbl. störst och spadlika, de öfre som hos föreg.; skärmb. ovala, alltid kortare än de uteslagna blrna; de större foderbl. som hos föreg. 2 6, 7, b. eller hvitakt. blr. — β *alpestris*: de nedersta bladen små, kortare, men bredare än de öfre. Fig. Fl.D.1169. Reich.t.1348, f. 2. H.N.f.3, n:o 14.
- Fukt. äng. (Sk.—*Gestr.* och *Dal. Helsl.* byn Naggen i Ramsjö: *Wistr. Medelp.* Torp sn; Hässjö sn: *Arn. Jemt.* *Öl. Gottl.* — *N. Aggerhus* stift; *Vaage*; *Gudbrandsdalen*; *Dovre*. — β *Dal.* Boda kapell. *Trol.* flerst.) *Vanl. grenad vid roten i flere, 2—5 tum långa stjelkar, med smärre blr än de föreg.; de nedersta bladen samlade i rosett.* — *P. uliginosa* Reich.

39 Fam. **BALSAMINEÆ DC.** Fod. och krona oregelb.; det förre med sporre. Ståndarknappar sammanhängande. Fröhus af 5, elastiskt uppspringande skal, med centralt fröfäste. Fröhvite 0.

#### 253. *IMPATIENS* Lin. Springkorn.

- 1 *I. Noli tangere* L. stjelkens leder uppsvällad; bladen tunna, äggrundt aflånga; blomskäften ensamma i bladvecken, flerblommiga. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.371. Fl.D.582. Skugg. och fukt. st. r. (Sk.—*Ängml.* *VB.* Umeå sn, *Baggböble.* *Dal.* *Verm.* och *Dalsl. Boh.* — *N. till Salten.*) *Har stora, på fina skaft hängande blr. Stundom förblifva blomknopparne små och outvecklade, men sälla dock mogen frukt.*

## 6 KLASSEN

### COLUMNIFLORÆ.

- 40 Fam. **TILIACEÆ** Juss. Fod. i knoppen kantlagdt, affallande; kronbl. tegellagda, likformiga. Stånd. talrika, fria. Frukt sierrummig, med centralt fröfäste, eller [hos de Svenska arterna genom feblagning] enrummig.

#### 254. *TILIA* Lin. Lind.

- 1 *T. parvifolia* Ehrh. bladen snedt, rundadt, hjertlika hvass-sågade *glatta*, på undre sidan blågröna och i nerv-vinklarne ulliga; blomskärmet *längre* än den *mång-* [vanl. 5—7-] *blommiga* blomqvasten; frukt. n. *päronformig*, utan kanter, åluden med *tunnt* skal.  $\frac{1}{2}$  7, hvitg. blr. Fig. Fl.D.553. H.N.f.9, n:o 32.

Ängsback. lund. (Sk.—Ängml. Skuluberget. Del. Verml. Boh. Öl. Gottl. Thorsborgens. — N. till Ringebos i Gudbrandsdal, samt efter kusten till Nordfjord.) *Träd med väl-lukt. blr i qvast, vid hvars skaft ett stort gulaktigt skärm är fästadt. Frögmömet är mycket tunnt, n. mjölligt ludet och har vid basen en omärklig hals, som sak-nas hos följ. Var. med något flikiga blad. — T. europæa L. T. silvestris Desf. T. ulmifolia Scop.*

- 2 *T. vulgaris* Hayn. bl. som hos föreg., under bleka; blomskärmet af den *mång-* [vanl. 5—10-] *blommiga* qvastens höjd; frukt. n. *klotrund*, utan kanter, tjockkullig, med *hårdt*, n. *trädartadt* skal.  $\frac{1}{2}$  7, hvitg. blr. Fig. Sv.B.40. H.N.f.9, n:o 31.

Lund. r. (Boh. Greby, Klefve och Rörvik i Tanum sn: Rect. For. Allmänt planterad vid städer och byar i söd. och mell. Sv.) *Träd som föreg., med större blad, blr och frukter. Blomqvasten mera mångblommig än hos de båda andra arterna. — T. intermedia DC.*

- 3 *T. grandifolia* Ehrh. bladen som hos föreg., deras undre sida *gleshårig*, med ner-verna och nerv-vinklarne ulliga; blomskärmet *som hos föreg.*; blomqvasten *så-* [vanl. 3—4-] *blommig*; frukt. omv. *äggformig*, *upphöjdt kantig*, luden, med *hårdt*, n. *trädartadt* skal.  $\frac{1}{2}$  7, hvitg. blr. Fig. Fl.D.2722. H.N.f.14, n:o 33.

Lundar. r. (Boh. på Öar i Strömstadstrakten, t. ex. Ödön, vid Blötebogen; och Helsö.) *Träd som föreg. Frukten har omkr. 5, tydliga utstående kanter, och de mellan-liggande sidorna något plattade. — T. platyphylla Scop.*

- 41 Fam. **MALVACEÆ** Juss. Fod. i knoppen kantlagdt, qvarsittande; kronbl. hop-vridna, likformiga. Stånd. talrika, med alla strängarne hopväxta. Frukt af flere kar-peller, kranslikt sammanväxta omkring stiftets bas. Fröhvite 0.

#### 255. *LAVATÉRA* Lin. Stockros.

- 1 *L. thuringiaca* L. stjelen gråluden; bladen på undre sidan ludna, de nedre vinkliga och flikiga, de öfre 3flikade, mellersta fliken längre, trubbig; blomskäften ensamma i bladvecken.  $\frac{2}{3}$  7, 8, ljusr. eller hv. blr. Fig. Jacq.A.211. H.N.f.3, n:o 30.

Äng. vid byar etc. r. (Södm. Vestm. och Uppl. ymnigast vid Mälaren, såsom Ekebyhof på Ekerön; Svartsjö; Strengnäs vid Kungsberg; Selaöarne; Sundby gästg.; Hesselhyholm; Berghammar; Aggarön i Gränfjärden. Uppsala vid Vårdsätra etc. Ner. vid Sickelsjö; O. G. Blomb. ÖG. vid Stegeborg och Degerhof enl. Lemm. Hall. Hasslöf: Theor. Öfverallt säkerligen förvildad.) *Ofta alnshög och deröfver.*

## 256. MALVA Lin. Kattost.

† Bladen mer ell. mindre grundt flikade [aldrig djupare än till midten].

\* Stj. nedliggande; karp. småludna: *M. rotundifolia* L.

1 *M. borealis* Wallm. bladen rundadt njurlika, grundt 5—7flikiga, med rundade, naggade flikar; kronbladen föga längre än blomfodret; fruktskaften *nedböjda*; karpeller omkr. 10, med upphöjda skarpa kanter, något *rynliga*. ☉ 6—9, hv. blr. Fig. Sv.B.142. Fl.D.1825. H.N.f.8, n:o 33.

Gator, väg. a. (Sk.—Medelp. Dal. Verm. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Kronbladen sällan öfver ½ gång längre än fodret.*

2 *M. vulgaris* Fr. blad som hos föreg.; kronbladen *mer än dubbelt* längre än fodret; fruktskaften *nedböjda*; karp. 12—15, utan kanter, släta. ☉ 7, 8, blekröda blr. — *β pelargonifolia*: bladen småludna, med helbräddade flikar. Fig. Fl.D.721. H.N.f.8, n:o 34.

Odl. st. (Sk.—Gefle och Vestm. Hall. allm.: Theor. Öl. Gottl. Sällsynt norr om Mälaren. — N. till Hedemarken. — *β Blek.* Carlskrona på Stumholmen. Vestm. Strömsholm. Gottl. Lummelunds bruk.) *Kronblad ofta en half tum långa och något breda.* — *M. rotundifolia* ed.9 *Skiljes icke af Linné från föreg.*

\*\* Stjelken upprät; karp. glatta.

3 *M. silvestris* L. bladen rundade, 5—7flikiga; blomskafven gytttrade i bladvecken, jemte bladskafven håriga; kronbladen *flere gånger* längre än fodret; fruktskaften *upprätta*; karp. med skarpa kanter, rynliga. ☉ 6—8, r. blr. Fig. Sv.B.602. Fl.D.1223.

Grus. och odl. st. r. (Sk. allmän—Boh. Blek. Smål. i Kalmar län vid kusten. ÖG. flerst. i skärg. enl. Kindb. Öl. Gottl. Förvildad omkring Mälaren, t.ex. Stockholm, på Aggarön och Stora Hessingen. — N. Arendal i mängd. Fredrikstad.) *Bladen variera mer och mindre djupt inskurna, stundom till midten, med sågade flikar; kronbladen tumslånga, någon gång hvita.*

†† Stjelkbladen delade n. till basen.

4 *M. Alcea* L. stjelen upprät, *kort stråfhårig*, ell. stjerneluden; bladen handdelade med vanl. tandade eller inskurna flikar; foderholklbladen *aflånga* ell. *lancellika*; karp. *glatta, rynliga*. 2 8, 9, blekröda blr. Fig. Sv.B.601. Fl.D.1882. H.N.f.14, n:o 34.

\* *fastigiata* Cav. stj. gråluden af stjerneludd, utan längre enkla hår; de öfre bladens flikar n. hela. Fig. H.N.f.13, n:o 51.

Odl. st. r. (Sk. allmän i nord- och sydöstra del. enl. F. Aresch. Blek. Smål. Kalmar, i Dörby; Vestervik: Dr Lund. ÖG. flerst. på slättbygd. enl. Kindb. Öl. mellersta delen. Gottl. Klinte, Hafdhem och Hejde snr. — \* Sk. särd. i sydöst. delen: Aresch. Blek. Smål. i Kalm. län. Öl. Förvildad flerst. i mell. Sv.) *Alnshög, med stora blr.* \* *lär allestädes, der den träffas tills. med hufvudarten, n. utan gräns sammanflyta med denna.*

5 *M. moschata* L. stjelen upprät, *långt stråfhårig*; de nedre bladen *njurlika* flikiga, de öfre fingerlikt delade i mest 5, parklufna flikar; foderholklbladen n. *jernbreda* spetsiga; karp. *håriga, släta*. 2 7, 8, hv. eller ljusröda blr. Fig. Fl.D.905. H.N.f.10, n:o 37.

Grus. st. r. (Sk.—Södm. Nyköping. Uppl. Penningby i Länna sn, och Lunda enl. Lemm. Ner. Riseberg och Falkenå. Hall. Hasslöf, Karup etc.: Theor. Gottl. På de flesta ställen förvildad. — N. Christiania: Ax. Bl.) *Liknar något föreg., men är vanl. mindre.*

## 257. ALTHÆA Lin. Alté-rot.

†1 *A. officinalis* L. stjelen upprät; bladen hjertlikt äggrunda, 3—5flikiga med tandade flikar, gråludna; blomskafven i bladvecken, de öfre meränd. 3blommiga. 2 7—9, ljusr. blr. Fig. Fl.D.530.

Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).



Strändäng. r. (Sk. Malmö och Trelleborg enl. F. Aresch.; fordom äfven på öst. kusten mell. Yngsjö och Furahoda. Troligen förvildad.) *Hela växten fint mjukluden; foderholken stundom 10—12klufven.*

42 Fam. **GRUINALES** Lin. Fod. i knoppen tegellagdt; kronbl. hopvridna, [hos de Sv. arterna] likformiga, Stånd. 5 ell. 10 [af hvilka sednare stund. 3 ell. 5 sakna knappar], med vid basen förenade strängar. Frukt: 5, kransvisa karpeller, stund. flerrummigt fröhus.

1 Flocken **Geraniæ**. Frukt af 5, kransvisa, slutl. skiljbara karpeller, fastade med sina stift vid spetsen af ett långt sprötliskt fäste. Fröhvite 0.

#### 258. GERANIUM Lin. Näfva.

† Blomskäften enblommiga.

1 *G. sanguineum* L. bladen rundade, handdelade i 5—7, vigglika, 3—5klufna likar; foderbl. borstuddiga; kronbl. grundt urnupna. 2 6, 7, purp. blr. Fig. Fl.D.1107. Ängsback. och klipp. (Sk.—Medelp. Dal. Vestml. Ner. Ullavikl. Skålekl. Verm. Dalsl. VG. Boh. Öl. Göt. — N.) Stj. och blomskäft långhåriga; blrna mycket stora

†† Blomskäften 2blommiga; rotstock grof, flerårig.

‡ Karpeller på tvären rynkiga.

\*2 *G. macrorrhizum* L. stj. upprät, *smådluden*; bladen 5—7delade, med inskurna och tandade likar; de gemensamma blomskäften *parvisa*; foderbl. *upphöjdt* nerviga, *långt* borstuddiga; kronbladen bredt spadlika, med *klo af fodrets längd*; karp. *glatta*. 2 5—7, r. blr. Fig. Jacq.Rar.134.

Bergstrakt. r. (N. Holmestrand vid Ekelund, trol. förvildad.) *Fothög; fingertjock rotstock och uppblåsta, n. klotrunda blomfoder.*

3 *G. phaeum* L. stj. upprät, *långhårig*; bladen djupt 5—7klufna, med likar som hos föreg.; de gemens. blomskäften *ensamma*, motsatta bladen; foderbl. *otydligt* nerviga, *kort* borstuddiga; kronbladen omv. äggrunda, med *kort klo*; karp. *styf/håriga*. 2 5, 6, violettbruna blr. Fig. Fl.D.987. H.N.f.9, n:o 33.

Skugg. st. r. (Sk. Krageholm; Tosterup; F. Aresch. — N. vid Bergen enl. Ax. Bl.) *Enskildta blomskäften i början tillbakaböjda, slutl. upprätta.*

†† Karpeller icke rynkiga.

a — Kronblad rundade, hela.

4 *G. palustre* L. stj. *uppstigande*; bladen delade *nedom midten* i 3—5, inskurna och tandade likar; fruktakäften *nedböjda*; fodret *n. glatt*; stånd.strängarne *syl-lika*; karp. *omärkligt finkludna*. 2 7, r. blr. Fig. Sv.B.677. Fl.D.596. H.N.f.16, n:o 41.

Fukt. äng. r. (Sk. Kullen; Ramlösa; N. Vram; Fogelsång; Christianstad m. fl. st. VG. Göteborg i Brudängen vid Lundagården i Fässbergs sn. Boh. Utgård i Qville sn. — N. Eidsfoss.) *Blrna något mindre än hos de 2 följ.; foderbladen likasom hos dessa borstuddiga, vanl. mycket kortare än kronbl.*

5 *G. pratense* L. stj. *upprät*; bladen *delade nästan till basen* i omkring 7, inskurna och tandade likar; fruktakäften *nedböjda*; fodret *hårigt*; stånd.strängs bas *vidgad* äggrund; karp. *glandelhåriga*. 2 7, ljusbl. blr. Fig.

Äng. etc. r. (Sk. i vest. delen: F. Aresch. Blek. Afvelsgårde. Smål. Lommaryd i Jönköp. län. — Uppl. nor. del. Gestr. Vahlbo sn, Löflunds gistvall. Helsl. Enånger: Wistr. Vestml. Boh. — N. Christiania; Tönsberg; Skien; Vårdal; Gudbrandsdalen. Trondhj. Tutterön och Stördalsutbygden.) *Alnehög grenig, med renare blå blr än de öfr. arterna.*

6 *G. silvaticum* L. stj. upprät; bladen delade *nedom midten* i 5—7, inskurna och sågade likar; fruktakäften *upprätta*; fodret *hårigt*; stånd.sträng. *syl-lika*; karp. *glandelhåriga*. 2 7, rödvio. ell. hvitakt. blr. Fig. Fl.D.124.

Äng. och skogsback a. (Sk.—Lpl. — N.) *Varierar mer och mindre hårig, ända till stråfhårig; blrna vanl. stora, stundom små med kronbl. knappt längre än fodret: var. parvisflorum.*

b — Kronblad 2flikiga.

7 *G. pyrenaicum* L. stjelen upprät; bladen rundade, nedom midten 5—7flikiga; fruktskåften nedböjda; foderbl. småludna, n. uddlösa; karp. önludna. 2, 6, 7, viol. blr. Fig. Fl.D.2240. H.N.f.9, n:o 34.

Odl. st. r. (Sk. Lund; Årup etc. Smål. Hvena sn, mell. Kareby och Skinnarp enl. Ekstr.; Vestervik: Dr Lund. ÖG. vid Torpa prestgård; Kisa, Tåby m. fl. snr enl. Kindb. Stockh. vid Carlberg och Marieberg etc. Uppl. Rosenberg. Vestml. Skinn-skatteberg. Hall. Hasslöf. Öl. Runsberga. Gottl. Kräklingbo etc. enl. Leffl. och G. v. Ced. Sannolikt öfverallt förvildad.) *G. umbrosum* Kil. *G. rotundifolium* β Wg.

+++ Blomsk. 2blommiga; utan rotstock; roten späd, enårig.

\* Karpell. rynkiga; kronbl. nära dubb. längre än fodret.

a — Foderblad horstuddiga.

8 *G. Robertianum* L. bladen 3—5fingradt delade, med *parklufna* småblad; fodret 10kantigt. *slätt, glandelhårigt*; kronbl. *hela*, omv. äggrunda, med lång klo; karp. *gles-håriga*. 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.694.

Klipp. stenbundna st. a. (Sk.—VB. och Jemtl. — N. till Nordl.) *Blrna mindre än hos föreg. arter, mer klocklika; stjelen och blad ofta röda, illaluktande. Var. med korta kronbl., söga längre än fodret: G. purpureum* W.

9 *G. lucidum* L. bladen rundade ell. njurlika, till *nedom midten* klufna i 3—5, trubbiga, inskurna, *flikar*; fodret med 5 *hinnaktiga kanter*, på tvären *rynligt, glatt*; kronbl. *som hos föreg.*; karp. fint glandelhåriga. 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.556. Fl. D.218.

Skugg. klipp. r. (Sk.—Rosl. Uppl. Krusenberg. Vestml. Ängsön, på Kallholmen. VG. Dalsl. Boh. Hall. Särö. Öl. Gottl. — N. Christiania; Laurvig; Arendal; Hitteren; Trondhj. etc.) *Stjelen och rotblad blodröda, hela växten glänsande, n. glatt.*

b — Foderblad utan borstudd.

10 *G. molle* L. stj. och bladskaften mjukt *långhåriga*; bladen rundadt njurlika, klufna något *nedom midten* i 5—7, vigglika, *hela* ell. 2—3tandade *flikar*; fodret *långhårigt*; kronbl. urnupet 2flikiga; karp. *glatta*. 6, 7. Fig. Sv.B.639. Fl.D.679. H.N.f.1, n:o 36.

Tor. st. (Sk.—Rosl. Verml. Gårdsjö i Gilberga sn. Boh. Öl. Gottl. — N. söd. delen.) *Späd och slankig; stjelen och bladskaftens hår längre än samma delars diameter; blrna små, lifligt röda.*

\*\* Karpell. släta; kronbl. alltid urnupna, ungefär af fodrets längd.

a — Foderblad utan borstudd.

11 *G. pusillum* L. stj. och bladskaften *kort småludna*; bladen runda, 5—7klufna, med *flikar* som föreg.; karp. *tilltryckt håriga*. 6—9. Fig. Fl.D.1994. H.N.f.14, n:o 35.

Tor. st. vid byar etc. a. (Sk.—Helsl. och Dal. Verml. Dalsl. Hall. Öl. Gottl. — N.) *Vanligen liten, utbredd, stundom större och upprät; blrna ljusst violettröda; fröen släta. — G. rotundifolium* L.Fl.Su.

b — Foderbl. långt borstuddiga.

12 *G. bohemicum* L. stjelen upprät, *klubbhårig*; bladen till *nedom midten* 3—5klufna, med inskuret tandade *flikar*; fruktskaften *upprätta*; karp. *klubbigt långhåriga*. 7, 8. Fig. Fl.D.suppl.71. H.N.f.10, n:o 38.

Svedjel. r. (Smål. öst. del., samt n. Wedbo härad: Scheutz. — Ängml. Dal. Larsbo bruk. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. i Ed och Steneby snr. — N. Christiania; Eidsfoss.) *Hela växten af en mycket vidrig lukt; kronbl. violettblå, hårkantade, nående söga öfver foderbladens långa borstudd; karp. svarta.*

13 *G. dissectum* L. stjelen från basen grenig, *nedböjdt hårig*; bladen n. till basen 5—7-

delade, med 3- ell. flerklufna blisar; blomskafsen *kortare* än bladen, slutl. *nedböjda*; karp. *glandelhåriga*. ☉ 6, 7, violettröda blr. Fig. Fl.D.936. H.N.f.14, n:o 36.

Odl. st. r. (Sk. allm. *Blek.* Carlskrona; Carlshamn; Ronneby etc.: Goss. *Smål.* Grenna; Långtiden; Slingsö i Vesterum sn: Ekstr. *ÖG.* Öst. Ryd; Olstorp i Kaga och Engelholm i St. Annæ enl. Kindb. *Hall. Boh. Öl. Gottl.* — N. Christiansands st.; samt på Kirköe, en af Hvalöarne.) *Fröen nämligt gropiga*.

- 14 *G. columbinum* L. stj. som hos föreg., *nedböjdt småhårig*; bladen *som hos föreg.*; blomskafsen *mycket längre* än bladen, slutl. *nedböjda*; karp. n. *glatta*. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.1222. H.N.f.15, n:o 37.

Svedjel. berg. (Sk.—*Stockh. Ner.* Askersund och i Asker sn. *VG. Dalsl. Boh.* kring Uddevalla; Marstrand, på Koön. *Öl. Gottl.* — N. Arendal. Storöen i Bergens st. vid Leervig, Söndmör.) *Har dubbelt större blr än föreg. Fröen grundt nämligt gropiga*.

## 259. ERÓDIUM L'Herit. Skat-näfva.

- 1 *E. cicutarium* L'Her. bladen parbladigt delade *med n. pardelade* och tandade blisar; blrna i flock; stånd.sträng. [de knappbärande] vid basen vidgade, otandade. ☉ 4—7, r. blr. Fig. Fl.D.986.

Byar, gat. (Sk.—*Ängml.* och *Jemtl.* Röds sn. *Boh. Öl. Gottl.* — N. till Trondhj.) *Meränd. nedliggande och klubbhårig. — Geranium L.*

- 2 Flocken *Oxalidese*. Stånd. 10. Fröhus 5rummigt, med centrala fröfästen och flere frön i hvarje rum.

## 260. ÓXALIS Lin. Har-syra.

- 1 *O. Acetosella* L. bladen 3fingrade, med omv. hjertlika, helbräddade, håriga småblad; blomskafsen från *rotstocken, enblommiga*. 2 5, hv. blr. — *β rosea*: blrna *rosenröda*. — *γ lilacina* Lge: blr ljus gredel. med mörkt violetta nerver. Fig. Sv.B.10. Fl.D.980.

Skugg. st. a. (Sk.—*Lpl.* — N. till Finn. — *β VG.* Kinnekulle; Göteborg: *Leml. Södm.* Tvetaberg enl. *Leml.* — *γ Smål.* Vexjö flerst. *Dalsl.* Gunnarsnäs sn flerst. enl. *Leml.*) *Växten med rent sur smak; rotstocken ledad, fjällig*.

- †2 *O. stricta* L. bladen som föreg., utan stipler; blomskafsen från *en upprätt stielk, flerblommiga*; fruktskafsen icke nedböjda. ☉ 6—9, g. blr. Fig. Fl.D.873.

Odl. st. r. (Sk. Lund; Malmö; Vegeholm; Åkersholm etc. Växande som ogräs i trädg.; på ballast vid Vestervik.) *O. corniculata* Fl.D.

- 3 Flocken *Lineæ*. Stånd. 4—5. Fröh. 8- ell. 10rummigt, med lika många skiljeväggar, af hvilka hvarannan är ofullkomlig: ett frö i hvarje rum. Fröhvite 0.

## 261. LINUM Lin. Hör.

- 1 *L. catharticum* L. stjelen upptill klynnegrenad; bladen motsatta, oskafade och helbräddade, de nedre omv. äggrunda, de öfre aflånga. ☉ 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.250. Fl.D.851.

Äng. betesm. a. (Sk.—*VB.* och *Jemtl.* — N. till söd. Finn.: Norm.) *Qvartershög, n. glatt ört med blr i knippen. Var. stundom tumshög, enkel och enblommig*.

## 262. RADÍOLA Roth. Jordknöple.

- 1 *R. linoides* Roth: stjelen ända från basen klynnegrenad; bladen motsatta, oskaf. och helbrädd., äggrunda. ☉ 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.652. Fl.D.178. H.N.f.14, n:o 37.

Fukt. sand. r. (Sk. *Blek.* allmän. *Smål. ÖG.* Kaga vid Roxen enl. Kindb. *VG. Verml.* Carlstad m. fl. st. *Boh. Hall. Öl.* — N. Mandal; Romsdalen etc.) *1—2 tum hög, vanl. mycket grenig, med talrika, men ytterst små blr i knippen. — Linum Radiola L. R. millegrana Sm.*

- 43 Fam. **HYPERICINÆ DC.** Krons regelbunden. Stånd. talrika. med strängarne vid basen förenade i 3 ell. 5 flockar. Pist. med flere stift. Fröb. en- ell. fler- rummigt af skalens invikna kanter, hvilka bära talrika frön. Fröhvite 0.

263. **HYPERICUM Lin.** Johannisört, Mansblodknopp.

† Foderblad med glandler i kanterna; stielk trind.

- 1 *H. pulchrum L.* stielken *glatt*; bladen *hjerligt omsfattande*, trubbiga, *glatta*, *genomskinligt punkterade*; grenbladen *aflånga*, icke omfätt.; foderbl. omv. *äggrunda*, *rundadt trubbiga*, med *oskaftade* glandler. 2½ 7, g. blr. Fig. Sv.B.536. Fl.D.75. H.N. f.7, n:o 30.

Berg vid v. kusten, r. (Hall. vid Björkeris, ofvan Kungsbacka i Töle sn [på många år ej återfunnen: Lemm.]. VG. Sotenäs nära Partilled: Stud. Ax. Belfrage enl. Lemm. — N. Arendal; Christiansand; Lindesnäs; samt derifrån allmän ända upp till Molde. Trondhj. nära Strands kyrka.) *Har fotshög, upprät stielk, med mindre blr än följ. Rodnar lät vid torkning. Bladen hos denna och alla de följ. helbräddade.*

- 2 *H. montanum L.* stielken *glatt*; bladen *stielkomsfattande*, *aflånga*—smalt *äggrunda*, trubbiga *glatta*, *långa* undre kanten *svartprickade*; foderbl. *lancettlika*, *spetsade*, med *långskaftade* glandler. 2½ 7, g. blr. Fig. Sv.B.641. Fl.D.173.

Berg, r. (Sk.—Stockh. och Verm. på spridda lokaler i alla de mellanligg. prov. Gottl. — N. Arendal; Christiansand upp till Vårdalen i Trondhj. st.) *Endast de öfre bladen något genomskinligt punkterade; blomknippena hopdragna.*

- 3 *H. hirsutum L.* stielken *smålugn*; bladen *kort skaftade*, *ovala*—*äggrunda*, trubbiga, under *smålugna*, *genomskinligt punkterade*; foderbladen *aflånga*, med *kortskaftade* glandler. 2½ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.802. H.N.f.11, n:o 37.

Betesmark. berg, r. (Sk. ÖG—Uppl. Uppsalatrakten. Rosl. Norrtelge. Vestml. Fagerön i Granfjärden. VG. Öl. — N. till Trondhj. Gävingåsen. Nordl. Indyr i Gildeskaal och Arstad-åsen i Bejeren: Norm.) *Stj. bladtig ända upp till blomsaml.; hos föreg. upptill n. bladlös. De öfre bladen oskaftade.*

†† Foderblad utan glandler; stielk 4kantig.

- 4 *H. tetrapterum Fr.* stielken *upprät*, med 4 *hinnaktiga* kanter; bladen *oval*a, *glatta*; foderbladen *spetsadt lancettlika*. 2½ 7, 8, blekg. blr. Fig. Fl.D.640. H.N.f.7, n:o 29.

Fukt. ång. r. (Sk. Ystad; Krageholm; Benestad; Vidtsköffe; Gladsex; Roslätt; Reften vid Fogelsång; Landskrona; Helsingborg etc.) *Har mindre och blekare blr än följ. Bladen, isynnerhet de öfre, hos båda mycket glest, genomskinligt punkterade.* — *H. quadrialatum Wg. Fl.Su. H. quadrangulum Sm.*

- 5 *H. quadrangulum L.* stielken *upprät*, med 4, *föga upphöjda* kanter; bladen *äggrunda*, *glatta*; foderbladen *elliptiskt ovala trubbiga*. 2½ 7, 8, brandg. blr. Fig. Sv.B.359. H. N.f.11, n:o 37.

Skogsång. (Sk.—Ångml. och Jeml. Boh. Öl. Gottl. — N. till Lofoden.) *H. dubium Willd. Sm.*

††† Fod. utan glandler; stielk trind, med 2 upphöjda ränder.

- 6 *H. perforatum L.* stielken *upprät*; bladen *oval*a—*aflånga glatta*, *tätt genomskinligt punkterade*; foderbl. *lancettlika*, *spetsiga*. 2½ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.75. Fl.D.1043.

Back. a. (Sk.—Ångml. Från Gestr. och längre mot norden sälls, och endast vid kusten. Dal. Verm. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Nordlanden.) *Ålnshög, blomrik. Var. med mycket smala blad.*

- 7 *H. humifusum L.* stielken *nedliggande*, trådläk; bladen *aflånga*—*lancettlika*, de öfre genomskinligt punkterade och svartprickiga; foderbl. *aflånga*, *trubbiga*. 2½ 7—9, g. blr. Fig. Fl.D.141. H.N.f.1, n:o 35.

Fukt. sandåkr. och strand. r. (Sk. särdeles östra delen, från Ystad till nära Blekingska gränsen, såsom Köpinge; Esperöd; Maglehem; Degeberga; Träne; Vestra Vram; Gualöf etc. Kullaberg nära Bärikull. Blek. Sturkö; Agdatorp enl. Goss. Smål. från Kalmar till Påskallaviks g.g.) *Rotstocken bär flere, 3—8 tum långa stielkar; blrna små, ofta ensamma i bladvecken.*

- 44 Fam. **OISTINEÆ DC.** Krona regelbund. Stånd. talrika. frisa. Stift 1. Fröh. enrummigt, med fröfästen längs skalens midt, ell. flerrummigt med centralt fröfäste.

264. **HELIANTHEMUM Mill.** Solvända.

- 1 *H. Fumana Mill.* stammen tråktigt nedtryckt; bladen utan stipler, upptill skiftevisa. jemnbredt syl-lika [barrlika], i kanten något sträffa; blomskäften ensamma, enblommiga, stult. nedböjda. ½ 7, g. blr. Fig. Fl.D. suppl. 79. H.N.f.4, n:o 48.  
Kalkberg, r. (Gottl. Hangvar och Fleringe; vid Bredsunds fiskeläge i Väskinde; norr om Visborgs kalkugn etc.) Buskväxt med fingerlånga grenar. Fröhus 3rummigt, med lät från skalen lossnande skiljeväggar. — *Cistus L. Fumana procumb.* Godr. & Gren.
- 2 *H. ölandicum Pers.* stammen tråktigt, något uppstigande; bladen utan stipler, motsatta lancelllika eller ovala, trubbad, med härkantade skaff; blrna i klasar; kronbladen urnupna; fruktskaften utsperrade. ½ 6, 7, g. blr. —  $\beta$  *canescens*: bladen under ljost gråldna. Fig. Sv.B.499. H.N.f.4, n:o 46;  $\beta$  47.  
Kalkberg, r. (Öl. söder om Råpplinge; i norra delen sparsamt. —  $\beta$  Öl. mellan Ottenby och södra Möckleby.) Vanl. fingerlång buskväxt; stund. 1–2 quart. lång, utbredd, mycket grenig och risaktig. „, som är föga hårig, dock aldrig fullkomligt glatt, öfvergår genom allt mer håriga former, ciliatum, hirtum, alpestre etc., till  $\beta$ . — *Cistus L.  $\beta$  C. canus L. C. Marifolius E.B.*
- 3 *H. vulgare Gärtn.* stammen nedtill något tråktigt, med uppstigande grenar; bladen med stipler, motsatta, aflånga, under vanl. gråldna; blrna i klasar; kronbl. hela; fruktskaften nedböjda. 2 ½ 7, g. blr. —  $\beta$  *obscurum*: bladen under gröna. —  $\gamma$  *petraeum*: bladen dubbelt mindre, under hvitgrå. Fig. Sv.B.391. Fl.D.101.  
Ängsback. (Sk.—Gestr. Helsl. Friggensund i Bjuråker. Dal. Ner. VG. Hall. Öl. Gottl. — N. —  $\beta$  Sk. Blek. Ronneby. Smål. Ubhemåla i Algutsboda: Scheutz. —  $\gamma$  Öl. Gottl. Hoburgen, och Bogevik i Othem: O. Nordst.) Har stora, n. tumsvida, lutande blr, hos  $\gamma$  dubbelt smärre. — *Cistus Helianth. L. —  $\beta$  H. obscurum Pers.*

- 45 Fam. **VIOLARIÆ DC.** Krona oregelbunden [med sporre]. Stånd. 5, med mer och mindre sammanhängande knappar. Stift 1. Fröh. enrumm., med fröfästen på skalen.

265. **VIOLA Lin.** Viol.

† Blomskäften från rotstocken.

\* Pistillens märke vinkelrätt nedböjdt.

- 1 *V. odorata L.* med krypande grenskott; bladen rundadt hjertlika, tätt naggade, jemte skäften n. glatta och glänsande; blomfoderlikarne rundadt trubbiga; endast det nedersta kronbl. urnupet. 2 4, 5, viol. blr. Fig. Sv.B.8. Fl.D.309. H.N.f.4, n:o 41.  
Lund. gamla park. r. (Sk.—Uppl. Gestr. Gefle, vid Kastet. Ner. Riseberga kloster. Hall. Öl. här och der från Ventlinge till Horn i Högby sn. Gottl. Vishy. På Öl. inhemsk, för öfrigt sannolikt endast förvildad. — N. Hardanger.) Blrna mycket väl-luktande; fruktskaft och kronlösa blr lika följ. arts.
- 2 *V. hirta L.* utan grenskott; bladen aflångt hjertlika, tätt naggade, glanslösa, jemte skäften småldna; foderlikarne trubbiga; alla kronbl. urnupna. 2 5, 6, b. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.543. Fl.D.618. H.N.f.8, n:o 30.  
Lundar. (Sk.—Uppl. Medelp. Siljeberget. Vestml. Ner. VG. Göteborg, i Gamlestads-bergen. Hall. Öl. Gottl. — N.) Rotstocken något tjock, ofta tapplik; blr utan lukt. Har de sednare blrna kronlösa och mycket små, på korta till jorden böjda skaff, men sällande mogen frukt.
- \*\* Märket rakt ell. föga höjdt; foderlik. spetsiga.
- 3 *V. umbrosa Fr.* utan grenskott; bladen mycket tunna, hjertlika, glest naggsågade, gles-håriga; kronsporrer lång, punglikt vidgad nedåt. 2 5, 6, b. stund. hv. blr. Fig. H.N. f.5, n:o 28.

Fukt. st. vid bäckstränd. etc. r. (*Um. Lpm. Jeml. Åreskutan*, vid Mörviksån. *Herjed. Ulfsberget*: E. Collind. *Dal. Falun*; *Säthersdalen. Verm. Kyrkebo* i Ny; *Ränneherget* i Östmark; *Strandås* och *Sysselsbäck* i Dalby sn. *Ängml. Ramsle* och *Sollefteå. Medelp. Sundsvallsberget*; *Rösåsberget* i Sätuna sn m. fl. st. *Hedsl. i Hö* och *Norrbo* sn; *Forssa* sn: *Wistr.* — *N. Fondsfjellet* i *Merager*. Här och der från *Vang* i *Valders* och *Tofte* i *Gudbrandsd.* ned till *Christiania* och *Porsgrund*.) *Rotstocken* spdd och trådig; *bladen* med *djup* och *smal* *inskränning* vid *basen*, *tvärt* *sammandragen* *spets*. — *V. hirta*  $\beta$  *Wg. V. borealis Weinm.*

\*\*\* Märket som i föreg. afd.; foderfl. trubbiga.

- 4 *V. uliginosa* Schrad. *bladen* *utdraget* *hjerlik*, *glost* *naggsågade*, *n. glatta*; *blomskärmen* *ofvan* *skaflets* *midt*; *kronbladen* *aflånga*, *alla* i *spetsen* *intryckta*. 2 6, viol. blr. Fig. Fl.D 2709. Reich.f.107. H.N.f.5, n:o 27.

Öfversväm. stränd. r. (*Uppl. Dälfven* på *öar* mellan *Elfskaröns* bruk och *Söderfors*, såsom *Aspnöten*, *Ängsön*, *Björkö*, *Kälsörne* etc.; *Örnäs* i *V. Ryd* sn enl. *G. v. Ced. ÖG.* mell. *Husbyfjöl* och *Gistorp. Smål. Kalmar* län, vid *åar* i *Ljungby. Arby* och *Madesjö* m. fl. snr. *Öl.* mell. *Vickleby kyrka* och *Karlevi hamn* enl. *Ekstr.*) *Uvärt* *bladen* 1—1½ t. *breda*, 2—2½ t. *långa*, *med* *djup* *urskränning* *vid* *basen*, *på* *undre* *sidans* *nerv* *omärkl. gleshåriga*. *Har*, *likasom* *V. pal.*, 2 *former*, *den* *ena* *med* *n. dubbelt* *större* *blr* *än* *den* *andra*.

- 5 *V. suecica* Fr. *bladen* *rundadt* *hjerlik* *med* *kort* *spets*, *det* *nedersta* *njurlikt*, *glost* *naggade* *glatta* *ell.* *under* *glost* *småhåriga*; *blomskärmen* *ofvan* *blomskaflets* *midt*; *foderflik.* *aflånga*; *de* 4 *öfr.* *kronbl.* *ovala* *trubbiga*, i *spetsen* *hela*. 2 5, 6, b. blr. Fig. Reich.f.105. H.N.f.3, n:o 29.

*Dyga* stränd. r. (*Lpl.—Smål. Öl. Resmo.* — *N. Finnm.* och *Nordl. mångenst.*: *Norm. Nedalen*; *Dovre*, *Drivstuen* och *Kongsvold. Vang* i *Valders. Fondsfjellet* i *Merager.*) *Större* *än* *följ.*, *från* *vilken* *den* *knappt* *torde* *vara* *tillräckligt* *skild*. *Var* *med* *hv. blr.* *Äfven* *denna* *art* *skjuler* *nya* *kronlösa* *blr* *på* *høgsommaren* *från* *rotstocken* *likom* *V. hirta*.

- 6 *V. palustris* L. *bladen* *rundadt* *njurlik*, *glost* *naggade* *glatta*; *skärmen* *vid* *eller* *nedom* *blomskaflets* *midt*; *foderflik.* *oval*; *för* *öfr.* *som* *föreg.* 2 5, 6. Fig. Fl.D.83. H.N.f.8, n:o 31.

\* *epipsila* Led. *örten* och *blrna* *större*; *öfversta* *bladet* *med* *kort* *spets*. Fig. Fl.D.2405. H.N.f.8, n:o 32.

*Våt* *gräsmark*, a. (*Sk.—Lpl.* — *N. till* *Finnm.*: *Norm.* — \* *Ängml. Sollefteå. Hedsl. Verm. Råda* sn. *Ner. Södm. Tveta* sn enl. *Leffl. ÖG. Vinnerstad. Smål. Femsjö*; *Åhs. Sk. Lindved* m. fl. st. enl. *F. Aresch. Hall.*) *Liten*, *med* *små* *blekgredelina*, *stund. hvita*, *ådriga* *blr.* *Äldre* *bli* *bladen* *mycket* *större*, *men* *alltid* *slåta* *och* *glänsande*. \* *Stor* *som* *föreg.*, *till* *vilken* *den* *bildar* *en* *tydlig* *öfvergång*, *är* *V. scanica* Fr. *S.V.Sc. V. fennica* Nyl.

†† Första *blrna* från *rotstocken*; *de* *sedan* *utvecklade* *på* *en* *bladig* *stjolk*, *kronlösa*.

- 7 *V. mirabilis* L. *stjolk* och *bladskaf* *längsefter* *ena* *sidan* *håriga*; *bladen* *njurlikt* *hjerlik*, *med* *spets*, *glost* *naggade*; *foderflikarne* *spetsade*. 2 4, 5, *hvitblå* *blr.* Fig. Jacq. A.1.19. Fl.D.1045.

*Lund. (Sk. Blek. Ronneby* och *Vämö.* — *Lpl. Sälls. norr* om *Uppl. Vestml.* och *Verm. Öl. Gottl.* — *N. till* *Salten.*) *De* *tidigaste* *blrna* *på* *skaf* *från* *rotstocken*, *med* *kronbl.* *samt* *välluktande*, *men* *ofruktamma*; *de*, *som* *sedan* *framskjula*, *sitta* *i* *bladvecken* *på* *en* *bladbärande* *stjolk* och *sakna* *n. alltid* *kronbl.*, *men* *utveckla* *frukt*.

††† *Blrna* *alltid* *på* *en* *bladbärande* *stjolk*.

\* *Blrna* *enfärgadt* *blå* *ell.* *hvita*.

a — *Bladen* *icke* *nedlöpande* *på* *skaften*.

- 8 *V. silvatica* Fr. *bladen* *bredt* *hjerlik*, *rundadt* *naggsågade*, *glatta* *ell.* *omärkligt* *småhåriga*,  *tunn*, *med* *korta* *lancettlika* *stipler*; *foderflik.* *lancettlika* *spetsiga*, *med* *tvårhuggna* *bihang*, *kortare* *än* *kronsporen*; *frö*h. *aflångt*, *glatt*. 2 5—7. —  $\beta$  *Rivi-*

- niana*: blrna stora i jemf. med örten, med rundade kronblad, hvitgul sporre. Fig. Sv.B.290. Fl.D.1453. H.N.f.6; n:o 25.
- Skogsång, lund. a. (Sk.—VB. och Jemt. Öl. Göt. — N. till Finn.: Norm.) *Ofta stor, alltid bredbladig; blrna rent blå ell. stund. hvitaktiga. En sednare sommarform är V. canina frustanea* Wg. med lång nedligg. stjelk och blr utan kronbl. — *V. silvestris* Reich.
- 9 *V. arenaria* DC. bladen *rundadt hjertlika*, naggade, *lång småludna, blågröna och fasta*, med bredt lancetl. stipl.; foderflik. som hos föreg.; fröh. äggformigt, småludet. 2, 4, 5. Fig. Reich.f.142—149. H.N.f.6; n:o 26.
- Hed., sandback. (Sk. Smål. vid Vettern och i öst. del. — Ångml. Vestml. Ner. Verm. Boh. Öl. Göt. — N. till Ost-Finn.) 2—4 tum hög, *tufvadl mångstjelkig; bladen små, afvensom de blågred. blrna; sporren ofta hvit. En n. glatt form bildar öfvergång till föreg. art. — V. Allioni* Pio.
- 10 *V. canina* L. bladen *af långt hjertlika*, rundadt naggågade, *glatta, blågröna och fasta*; stipl. lancetlika ell. aflånga, de nedre alltid kortare än bladskafet; fröh. *af långt, glatt*. 2, 5—7, b. stund. hv. blr. Fig. Fl.D.2646. H.N.f.4; n:o 42.
- \* *montana* L. stipl. aflånga grofstandade; kronbladens skifva rundad, sporren af foderbihagens längd. Fig. Sv.B.682. H.N.f.10; n:o 36.
- \* *stricta* Horn. stjelen utdragen upprät; de nedre stipl. af halftva, de öfre af hela bladskafets längd; sporren meränd. längre än foderbihagen. Fig. Fl.D.1812.
- Skog. back. a. (Sk.—Ångml. och Jemt. Öl. Göt. — N. — \* *mont. Lpl.—Gestr. Verm. Blek. — N. — \* stricta* i lundar, helst vid stränder. *Blek. Smål. Kalmar. Södm. Strenghäls etc. Uppl. Gefle* flerstädes. *Medelp. på Marmens strand i Åtmar. Dalsl. Björnsäter i Gunnarsnäs enl. Lem. — N. Christiania.) Utmärkt af de mer äggrunda bladen, hvilka hos stricta mycket närma sig dem hos följ. art. Af arterna synas nog afvikande, helst deras yppigare former; men någon bestämb. gräns finnes icke i naturen. Äfven till de 2 föreg. finnas medelformer, ehuru icke så tydliga. — V. stricta är V. nemoralis Kütz.; och V. mont. är V. Wahlbergii Beurl.*
- b — Bladen nedlöpande på de derigenom vingkantade skafeten.
- 11 *V. stagnina* Kt. *glatt*; bladen *äggrundt ell. något hjertlikt lancetlika, smalt nedlöpande* på skafet, glest naggade; stiplerna *jembredt aflånga tandade*; kronsporren kågellik; fröh. aflångt. 2, 6—8. Fig. Reich.f.208. H.N.f.4; n:o 43.
- Fukt. st. stränd. (Sk.—Gestr. och Vestml. Ner. Verm. Sällsynt längre norr upp till Jemt. Öl. Göt. — N. till Salten.) *Vanl. upprät, flerstjelkig; stipl. variera från halftva bladskafets längd till längre än detta; kronbl. bredt aflånga, mycket ljusblå ell. nära hvita. Synes, att döma af Linnés Herb., hafva varit inbegripen i hans V. montana. — V. persicifolia Fr. V.Sc. — Viola lancifolia Thore.*
- 12 *V. pratensis* MK. *glatt*; bladen *lancetlika med äggrund bas, bredt nedlöpande* utföre hela skafet, glest naggade; stiplerna *lancetlika*, vid basen inskuret tandade, de mellersta på stjelen längre än bladskafeten; kronsporren punglik; fröh. äggformigt. 2, 7, 8, b. ell. hvitakt. blr. Fig. Reich.t.99,f.c—f. H.N.f.4; n:o 44.
- Fukt. st. på kalkbotten, r. (VG. vid Jarlehus. Öl. Göt.) *Rolstocken tjock, n. tappformig, flerstjelkig; stjelen än nedliggande, än upprät; sporren jembijock, kort. — V. lactea Fries H.N.*
- 13 *V. elatior* Fr. *vanl. småluden; bladen lancetlika, med något intryckt bas, glest naggade*; stiplerna *mycket stora, bladlika*, längre än bladskafet, *aflånga*, vid basen tandade. 2, 6, 7, ljusbl. blr. Fig. Fl.D.suppl.68. H.N.f.4; n:o 45.
- Bäckstränd. r. (Öl. ymnigast i Thorslunda vid Skogsby och Tveta; mera spridd i Vickleby, Hulterstad, Runsten samt Kastlösa i stora Dalby skog. Göt. Storgärdet vid Walls prestg. — N. enl. Hornem.) *Större växt än föreg.; bladen 2 tum långa ell. mera; blrna stora. — V. persicif. Wg.*

\*\* Blrna rent gula ell. flersfärgade.

- 14 *V. biflora* L. stj. *vanl. 2blommig; bl. njurtlika, rundnaggade, med små, hinnaktiga, helbrädd. stipler*. 2, 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.753. Fl.D.46. H.N.f.5; n:o 29.
- Fjelltr., i bäckdalar. (Lpl.—nor. Helsl. och Dal. Idre. — N.) *Späd, knappt kvartershög.*

- 15 *V. tricolor* L. de nedre bladen *hjärtlikt äggrunda*, de öfre lancettlikt *aflånga*, gles och trubbigt sågade, n. glatta; stiplerna *mycket stora*, *lyrformigt flika*; sporren af foderbihangets längd. ☉ 4—9. — *β arvensis*: fodret af kronans längd ell. längre. Fig. Sv.B.44. Fl.D.623, *β* 1748.

Berg, åkrar och odl. st. a. (Sk.—*Lul. Lpm.* och *VB.* nor. del. — *N.* till Finnm. Tromsøe.) Var. i hög grad till blrnas färg, vanl. *violetta* och *gula*, stund. *rent gula* eller *kvitgula*. Den *rent gulblommiga* anses af Koch och Fries som var. *saxatilis*. — *β: V. arvensis* Murr., har mest gulhvita blr med söga blått.

- 46 Fam. **DROSERACEÆ** DC. Krona regelbunden. Stånd. 5, fria. Stift flere. Fröb. 1- ell. ofullständigt sierrummigt, med fröfästen på skalen.

266. *PARNASSIA* Lin. Visil.

- 1 *P. palustris* L. bladen *hjärtlika*; honingsfjäll *mångstråliga*. 2 7, 8, hv. blr. — *β tenuis*: med omkr. 9stråliga honingsfjäll, mer äggrundt stjelkblad. Fig. Sv.B.172. Fl.D.584. Våta äng. (Sk.—*Lpl.* — *N.* — *β Lpl.* Ängml. Junsele sn och vid Fjellsjö. Medelp. Sättna prestg. Götll. — *N.* Ost-Finm. mell. Gornitak och Bunæs.) Stjelkbladet omfattande den enblommiga stjelken; rotbl. skafade. *β spådare* med liten blomma.

267. *DROSERÆ* Lin. Daggört, Silesår.

- 1 *D. rotundifolia* L. blomstängeln *upprät*, *betydligt* högre än bladen; dessa *runda*, med bredden större än längden; frön omgifna af en lös och slät hinna. 2 7, hv. blr. Fig. Sv.B.688. Fl.D.1028.  
Kärr, a. (Sk.—*Lpl.* Öl. Götll. — *N.*) Omkring *quartershög*. Bladen hos alla arterna hafva i kanterna långa röda glandelbärande hår, som utsippra en kläbbig vätska; blrna öppna sig endast i solsken.
- 2 *D. longifolia* L. stängeln som hos föreg.; bladen *tung-* ell. *spadlika*; fröen som hos föreg. 2 7, hv. blr. — *β obovata*: bladen *spadlika* [ell. hälften så breda som långa]; märkena urnupna. Fig. Sv.B.689. Fl.D.1093; *β* 2715. H.N.f.5, n:o 30; *β* n:o 31.  
Kärr. (Sk.—*Lpl.* Öl. Götll. — *N.* till Ost-Finm. — *β Smål.* — Ängml. VB. Nilsmyran vid Björkforss. *Lul. Lpm.* Storholmen m. fl. st. Ands. Boh. i Krokstad sn: Lem. Hall. Hasslöv: Theor. Götll. Sällsyntare i de vestra prov. — *N.* Christiania m. fl. st.) Stängeln 3—6 tum hög; bladen hos *a*, utom skafsten, n. *tumslånga*; hos *β* kortare och bredare, närmande sig till följ., men till alla delar större. — *D. anglica* Sm. *β D. obovata* Koch och H.N.
- 3 *D. intermedia* Hayne: stängeln *uppböjd*, *knappt* högre än de omv. äggrunda eller *spadlika* bladen; fröens skal *fast* och *grynprickigt*. 2 7, hv. blr. Fig. Fl.D.2108. H.N.f.5, n:o 32.  
Kärr. (Sk.—*Lpl.* — *N.*) Stängeln ofta kortare än bladen, stundom något längre, sällan 2 tum hög, fröen svartbruna, mycket knottiga, saknande den lösa hinnan, som finnes hos de föreg.



- 47 Fam. **SILENAOEÆ** Braun. Fodret sambladigt, upptill tandadt. Kronbl. 5, Hk-form., med lång klo, jemte de 10 ståndarne fastade på ett under pist. förlängdt fäste. Fröh. af ett, eller flere ofullkomliga rum, med upptill fritt centralfäste.

1 Flocken **Lychnideæ**. Fröhus af 3—5 skal och med lika många stift.

268. **SILÈNE** Lin. Glim.

† Blomfodret upphlåst äggformigt: **Behen** L.

- 1 *S. inflata* Sm. stjelken mer och mindre upprät, med klynnedeladt blomknippe; skärmb. hvita, hinnaktiga; fodret glatt, nätadrigt, med spetsiga tänder; kronbladens skifva 2klufven nedom midten. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.914.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) *Ofta alnshög blågrön; kronbladen utan märkliga bikronblad, endast med ett par otydliga knölar vid skifvans bas. — Cucubalus Behen* L.

- 2 *S. maritima* With. rotstocken meränd. bärande talrika, nedliggande, vid blomningen uppstigande. 1—3blommiga stjelklila grenar; skärmb. gröna, örtarlade; fodr. som föreg.; kronbls skifva till ell. något nedom midten 2klufven. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.857. H.N.f.4, n:o 51,52.

Grus. hafsstr. (Sk.—Boh.—VB. Haparanda skärg. Öl. mell. Vickley och Resmo. — N. till Finnm.) *Rotstocken vanl. tjock, djupt nedligg. bland stenarne, uppdät smal, grenad i flere slaka, ofta risaktigt nedligg. grenar; bladen smalare och köttigare, blrna färre och större än hos föreg.; kronan än med små fjäll-likä bikronblad, än blott med knölar som föreg., ehuru något större.*

†† Fod. cylindriskt ell. utdraget anängt: **Viscago** Fr.

- 3 *S. nutans* L. småluden, säll. glatt; rothbladen bredt tunglika; stjelkbl. smalt lancettlika; blomknippet med motsatta, utdragna grenar, lutande blr; kronbladsskifvan 2delad, med 2 syl-likä bikronblad vid basen. 2 6, 7, hv. blr. — *β glabrata*: glatt. Fig. Fl.D.242. H.N.f.4, n:o 50.

Backar. (Sk.—VB. nor. del. Dal. Verml. Dalsl. Öl. Gottl. — N. — *β* Sk. Öl. Gottl.) *Upprätt något klubbhårig. — β S. infracta* Kit.

- 4 *S. viscosa* Pers. klubbhårig; bladen lancettlika, i kanten vågiga; knippe n. azlikt, med motsatta korta, 1—flerblomm. grenar; fodertänder trubbiga; kronbladsskifv. djupt 2klufven utan bikronblad. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.1209. H.N.f.13, n:o 53.

Hafsstr. r. (Blek. Utklipporna.—Rosl. Grisslehamn på skären. Öl. vid Holmudden i Böda sn.) *Upprätt enkel, mycket täbladig och högst klubbig växt. — Cucubalus* L.

- 5 *S. noctiflora* L. klubbhårig; de nedre bl. omv. äggrunda, de öfre lancettlika; blrna 1—2, ell. i klynnedeladt knippe i stjs spets; fodret 10nervigt, med långa syl-likä tänder; kronbladsskifv. 2klufven, med 2, tvärhuggna bikronbl. vid basen. 2 7, 8. Fig. Fl.D.2470. H.N.f.9, n:o 37.

Åkr. och odl. st. r. (Sk.—Uppl. Gestr. vid Lärkbo. Jemt. Åreskut. vid Mörviken. Dal. Vestml. sydöstra del.; Sala. Ner. Vinterås och Tysslinge. Verml. Råda sn enl. Leml. Dalsl. i Ed sn. Boh. Lindö; Uddevalla, Kuröd. Öl. Gottl. — N.) *Var. enkel och med stort knippe af hvita, ell. i synnerh. utnppä rödlilla blr. — Melandrium* Fr.

††† Fod. uppåt vidgad ell. bågrikt: **Atocion** Fr.

- 6 *S. rupestris* L. vanl. tufvad, med upprätta stjelkar; bladen bredt lancettlika, glatta; blrna i klynnedeladt knippe; kronbl. urnupna; fröh. omv. äggformigt, föga utskjutande ur fodret. 2 7, hv. blr. Fig. Fl.D.4. H.N.f.14, n:o 39.

Berg. r. (Lpl.—Smål. Kalm. läns nor. del samt Femsjö och Refteled i Jönk. län. Blek. Carlshamn. VG. Boh. Hall. — N. Finnm. — Christiania och Skien.) *Skall genom grenskott stundom bli flerårig.*

- 7 *S. acaulis* L. tufvad, med nedligg. ell. uppböjda stjelkar; bladen smalt jemnbreda—n. syl-likä, hårbräddade; blrna ensamma i bladvecken; kronbl. urnupna; fröh. n. cylindr., långt utskjutande. 2 7, r. säll. hv. blr. Fig. Fl.D.21 [♂]. H.N.f.14, n:o 40; f.15, n:o 39.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) *Växer i ofta vidsträcktä 1—2 tum höga, listigt gröna mattor; blrna meränd. 2byggare, honblrna smärre.*

## 269. MELANDRIUM Röhl. Klimt-blåra.

1 *M. silvestre* R. luden af långa mjuka hår; bladen ovala—ågggrunda, kortspetsade; honblommans foderänder utdraget ågggrunda, spetsade, icke nående öfver fröhuset. 2½ 5—8, r. säll. hv. blr. Fig. Fl.D.2172.

\* *crassifolium* Fr. lågväxt, med lancettlika, tjocka, mjukludna bl.; blrna i hopdraget knippe. Fig. H.N.f.16, n:o 43.

Lundar, \* stränd. (Sk.—Lpl. Öl. — N. — \* N. på kusten vid Christiansand. Bladen var. till formen, men äro n. alltid bredare i jemf. med längden än hos följ.; blrna luktlösa, var. i Norrl. blekröda: var. *carneum*, samt i Finnm. rent hvila: *lacteum*. — *M. diurnum* Fr. *Lychnis dioica* L. L. silv. Schk.

2 *M. pratense* R. kort gråluden; bladen lancettlika, långspetsade; honblommans foderänder från något bredare bas utdraget jemnbreda, nående öfver fröhuset. 2½ 7, 8, hv. säll. rödl. blr. Fig. Fl.D.792.

Åkr. odl. st. (Sk.—Ångml. och Jeml. Öl. Gottl. — N.) Blrna stora, vanl. snöhvila och vålluktande, särdeles om afsnarne, då de mest öppna sig, hvaraf namnet *Lychn. vespertina* Sibth. — *Mel. vesp.* Fr. *Lychnis dioica* β L. L. prat. Schk.

## 270. VAHLBERGELLA Fries. Fjellklimt.

1 *V. apetala* Fr. stjelken enblommig; bladen lancettlikt jemnbreda; kronbladen föga längre. skull. kortare än det uppblåst äggformiga fodret; fröen med vidgade uppslådla kanter. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.12, f.1. Wg.Fl.L.t.7. Fl.D.807. H.N.f.11, n:o 39.

Fjellv. r. (Torn. Lpm. Lul. Lpm. vid Alkaware och Wirihau, samt Kallowarats vid Rovejaure enl. H. Widm. — N. Finnm. och Nordl.; Dovre; Tyedalsfj.; Tronsfjellet etc.) Vid blomn. ett par tum, skull. quartershög ell. mera, med 1, säll. 2, lutande blr, upprätt frukt. — *Lychnis L. Melandrium* ed.9.

2 *V. affinis* Fr. stj. 1—3blomm.; bladen som hos föreg.; kronbl. betydligt längre än det aflånga, icke uppblåsta fodret; fröen bredt hinnkantade. 2½ 7, 8. Fig. Fl.D.2170. H.N.f.9, n:o 36.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. på fjellet Nuljelaki vid Torn. Trask. — N. Finnm. Bossekop, vid Rajpas: Th. Fr.; samt i fururegionen längs efter Alten elv.) Lik föreg., men spådare, med upprätta blr och frukt, lätt omsluten af fodret. Kronbl. hvila ell. rödlätta. — *Lychn. affinis* J. Vahl. L. triflora Fl.D. Melandr. ed.9.

## 271. VISCARIA Röhl. Tjärblomma.

1 *V. vulgaris* R. stjelkens öfre ledstycken limaktigt klubbiga; bladen n. jemnbreda, de öfre ulliga i kanten; kronbl. hela ell. grundt urnupna. 2½ 6, 7, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.672. Fl.D.1032.

Ångsback. a. (Sk.—Ångml. och Jeml. Boh. Öl. Gottl. — N.) Blrna gytttrade. Var. i Blek., der den växer tills. med följ., med djupare urnupna kronblad, och glattare stjelblad: *V. purpureo-alpina* (media) Fr. H.N.f.15, n:o 38. — *Lychnis Viscaria* L. *V. purpurea* Fr.

2 *V. alpina* Fr. stjelken glatt [icke klubbig]; bladen jemnbreda, glatta; kronbl. 2klufna. 2½ 7, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.693. Fl.D.65. H.N.f.9, n:o 35; f.4, n:o 49 [var.].

Back. stränd. m. m. helst i fjelltr. (Lpk.—Dal. och Hels. söd. del. Vestml. Bjurfors i Norberg. Boh. Koön. Hall. Marbäck i Snöstorp enl. Theor. Södm. Hökberget i V. Vingåker sn. Blek. Jemjö och Thorhamn m. fl. snr; Nätraby på Mycklamoberget. Öl. på södra Alvaren etc. — N. Finnm. ned till Kongsberg, på Jonsknuden.) 6—10 tum hög med smärre blr än föreg. Var. på Öl. med låg och spenslig ört: var. *petraea* Fr. S.V.Sc. — *Lychn. alpina* L.

## 272. LYCHNIS Lin. Gök-blomma.

1 *L. Flos cuculi* L. stjelken sträff; bladen lancettlikt jemnbreda, glatta; blrna i klynnegrenigt knippe; kronbladens skifva 4delad. 2½ 7, r. säll. hv. blr. Fig. Fl.D.590.

Fukt. ång. a. (Sk.—Ångml. och Jeml. Boh. Öl. Gottl. — N. till Lofoden och Tromsöe.) Vanl. alshög med gles blomknippe.

## 273. AGROSTEMMA Lin. Klätt.

1 *A. Githago* L. stråfluden; bladen smalt jemnbreda; foderflikarne smalt lancettlika,

meränd. längre än de omv. hjertlika kronbladen. ☉ 7, r. blr. Fig. Sv.B.448. Fl. D.576.

Åkrar. (Sk.—söd. Lpm. — N.) *Vanl. alnshög, med stora vackra blr. Var. 6—7 tum hög, enblommig med dubbelt mindre blomma, korta foderflikar: var. nana. — Lychnis Gith. Koch. Githago segetum Ledeb.*

## 2 Flocken **Dianthese.** Fröh. af 2 skal och med 2 stift.

### 274. SAPONARIA Lin. Såpört.

† *S. officinalis* L. bladen äggrundt lancettlika; blrna i qvastlikt knippe; fodret glatt. 24 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.338. Fl.D.543.

Öl. st., helst gamla kyrkogård. r. (Sk.—Uppt. Vestml. och Ner. Boh. Hall. Öl. Götth. — N. Skien.) *Fordom odlad, nu förvildad.*

### 275. DIANTHUS Lin. Nejlika.

† Kronbladen odelade.

1 *D. Armeria* L. småluden; bladen jemnbreda; blrna *latrika*, i *lita qvastlika knippen*; foderholkladen 4, lancettlikt *syl-lika*, n. af *blomfodrets längd*; kronbl. i spetsen *svagt* tandade. 24 7, 8, mörkr. blr. Fig. Fl.D.230. H.N.f.16, n:o 42.

Åkrar, lund, och betesm. r. (Sk. *Blek. Skärfva*; Neuraby. *Smål. nor. del. af Kalm. län. OG. här och der i öst. slättbygden*: Kindb. *Stockh. Tyresö; Munsön. Boh. Köön*, vid Halsen: Stud. Thorstenson; Oroust; S. Koster; samt *Hall. Släp sn enl. Lem. Öl. Borgholm; Resmo m. fl. st. Götth.*) *Vanl. 2—3 qv. hög.*

2 *D. deltoides* L. fint småluden; bladen jemnbreda; blrna *få* [1—4] och *åtskiljda*; foderholkladen *vanl. 2, äggrunda* spetsiga, *mycket kortare än* fodret; kronbladen i spetsen *djupt* tandade. 24 7, 8. — *β glaucus*: blågrön; foderholkladen merändels 4, de nedre slutl. frånskiljda; blrna hvitaktiga. Fig. Sv.B.477. Fl.D.577. *β H.N. f.7, n:o 31.*

Äng. etc. a. (Sk.—Jemt. och Ångml. Öl. Götth. — N.) *6—8 tum hög, vanl. med röda blr. — β D. glaucus L.*

†† Kronbladen mångklufna.

3 *D. arenarius* L. tufvig, af *latrika grenskott* och *rest enblommiga* stjelkar; stjelkl. smalt jemnbreda, *icke* bredare än stjelken; foderholkl. äggrunda kortspetsiga; kronbl. håriga. 24 7, hv. blr. Fig. Sv.B.613. Fl.D.suppl.72. H.N.f.1, n:o 37.

Sandfält, r. (Sk. Ljungby till Cimbritshamn; Kållinge; Malmö etc. *Blek. Sölvisborg. Hall. Boh. på Otterö.*) *Quartershög n. glatt; kronbladen stundom n. glatta på insidan, vålluktande.*

4 *D. superbus* L. tufvig af *glesa grenskott* och upptill *meränd. greniga* och *flerblommiga* stjelkar; stjelkl. jemnbredt lancettlika. *mycket* bredare än stj.; foderholkl. och kronbladen som hos föreg. 24 7, 8, ljusr. blr. Fig. Sv.B.436. Fl.D.578.

Ängsmark, r. (Sk. vest. Vram; Löddeköping; Bosarp; Lund etc. *Hall. Laholm; Eldsberga; Snöstorp och Knäred enl. Theor. VB. Tornio. — N. Finnm. Porsanger och Varanger; Tanafjord; Norm.*) *Fotshög, med något lancettlika rotblad, svag lukt. Var. på hafstr. lågräst, med en ell. 2, hv. blr: β pumilus ed.9., D. plumarius Gunn. och Vahl. enl. Fries.*

### 276. TONICA Scop. Hös-nejlika.

† *T. prolifera* Sc. bladen jemnbreda; blomhufvudet ovalt. ☉ 7, ljusr. blr. Fig. Fl.D.221. H.N.f.2, n:o 44.

Sandback. och torra st. r. (Sk. Kåseberga, samt deremell. och Sandhammar enl. F. Aresch.; fordom äfven nära bäcken, som skiljer Rafluuda och Torups egor. *ÖG. Stenbro i Dagsherg och Hjortstorp i St. Johannes sn enl. Kindb. Öl. Resmo; Borgholm, samt på Holmudden. Götth. Visby; Ålskog i Kråkingbo; Thorsborg; lilla Carlson etc.*) *Mest enkel stjelk med ett blomhufvud af torra, färglösa skärblad, små, föga utskjutande kronblad. — Dianthus prolifera L.*

### 277. GYPSOPHILA Lin. Fänting, Såprot.

† *G. fastigiata* L. stjelken upptill grenad; bladen n. jemnbreda. trubade; blrna i *lita*, qvastlika knippen med korta, klubbhåriga skaft. 24 7, 8, hv. blr. Fig. H.N.f.4, n:o 53.

Torra st., sandfält, r. (Sk. vid Snogeholmsjön; mell. Snogeholm och Tågra, samt mell. Söfde och Söfdeborg; F. Aresch. Dal. mell. Mora och Garberg. *Öl. Goll.*) 6—10 tum hög, tuftad vid roten; var. på Goll. mer glesblommig: *G. arenaria* Klt.

- 2 *G. muralis* L. stjelen ända från basen mycket grenig; bladen syl-lik jämbreda; blirna åtskilda, på utdragna, glatta skaft. ☉ 7, 8, rödl. blr. Fig. Fl.D.1268. H.N. f.15, n:o 40.

Torra st. r. (Sk.—ÖG. Stockh. vid Edsviken. Uppl. Öfvergran, nära Varpsund; Sigtuna; Uppsala vid Alsike. *Held.* Arbrå sn: J. A. Wistr. *Vestml.* Vesterås; Badelunda sn flerst. VG. Hall.) Sällan mer än 2—4 tum lång, utstående grenig, med små blr på n. hårfina skaft. Var. med urnupna [*G. serotina* Hay.] och hela kronbl. på samma stielk.

- 48 Fam. **ALSINACEÆ** Bartl. Fodret fribladigt. Kronblad likformiga, med kort klo, stund. inga. Stånd. af samma ell. dubbelt så stort antal som foderbl. Fröh. som föreg. sam. med fritt fröfäste.

- 1 Flocken **Stellarieæ**: blad utan stipler. Fröh. öppnande sig med dubbelt så många skal som stift.

#### 278. MALACHIUM Fr. Vatten-arv.

- 1 *M. aquaticum* Fr. stjelen slak; bladen hjertlikt äggrunda, de öfre stielkomfattande; blirna i stjelen spets, samt i de öfre blad- och grenveckan; fröh. n. klotrundt. 2 7, hv. blr. Fig. Fl.D.1337. H.N.f.6, n:o 27.

Stränd. fukt. st. (Sk.—Gestr. och Dal. Boh. Goll. Visby gamla hamn, engång sunnen. — N. sällsynt; *Christiania* och på Ringerige.) Bladen stundom tumsbreda, de nedre ofta skaftade. — *Cerastium* L. *Larbrea* DC.

#### 279. STELLARIA Lin. Stjernblomma.

† Bladen äggrunda ell. hjertlika, de nedre skaftade.

- 1 *S. nemorum* L. stjelen vanl. upprät, öfverallt småluden; de nedre bladen hjertlika, de öfre oskaftade äggrunda spetsade; blomknippet i stjelen spets; kronbladen klufna nedom midten, längre än fodret. 2 6, hv. blr. Fig. Fl.D.271. H.N.f.6, n:o 28.

Bäckdalar etc. r. (Sk.—Lpl. Mest i de vestra prov. — N. till Finnm.) Stor, med mer än en tum breda, 2 t. långa blad.

- 2 *S. media* With. stj. vanl. nedliggande, ensidigt hårig; alla bladen äggrunda ell. ovala; blirna både i stjelen spets och i bladveckan; kronbl. 2delade, kortare än fodret. ☉ 4—10, hv. blr. — *β neglecta*: större, med längre kronbl., 10 ståndare. Fig. Fl.D.525; *β* 438.

Odl. st. etc. a., *β* skog. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm. — *β* Sk.) Bladskafven vingkantade; hufvudformen har oftast 3—5 ståndare. — *Alsine media* L. *β St. neglecta* Weih.

†† Bladen smala, alla oskaftade; kronbl. till midten 2klufna; fröh. klotrundt.

- 3 *S. holostea* L. bladen smalt lancettlika långspetsade, i kanten sträffa; blirna i knippe i stjelen spets; kronbl. längre än de nervlösa spetsiga foderbladen; frön mycket stora och taggiga. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.2650. H.N.f.16, n:o 45.

Lundar, r. (Sk.—ÖG. och Boh. Öl. — N. Stavanger. Findöe, Vigefjell, Norrfjord etc.) Har stora blr: bladen sträffa af korta, styfva hår i kanterna; fröen stora som små hampfrön, tätt taggiga af höga trubbiga vårtor.

††† Bladen som i föreg. afd.; kronbl. n. till basen 2delade; fröh. aflångt—äggformigt.

\* Blomskafven med hinnaktiga skärblad.

a — Kronbl. märkbart längre än foderbl.

- \*4 *S. longipes* Gold. stj. nedliggande med långa, upprätta grenar; bladen lancettlika—

- jembreda; blrna i fåblommigt knippe på långa, uppräta skaft i grenarnes spets; foderbl. äggrunda—aflånga, otydligt nerviga; fröh. *mycket längre* än fodret; fröen *släta*. 2½ 7, hv. blr. Fig.
- Fjelltr. r. (N. Finnm. »Talvig, på Wassbottenfjellets fuktiga afsatser, ej långt från den stora permanenta snödrifvan»: J. E. Zeit.) *Varierar i hög grad, glatt ell. småluden, rent ell. blåaktigt grön. Bladen styfva, mycket kortare än hos följ., ofta lättsittande.* — S. *Edwardsii* Br.
- 5 *S. palustris* Retz. stjelen meränd. *upprät*; bladen jembreda; blrna i knippe i stjelen spets; skärmb. glatta; foderbl. äggr. lancettlika långspetsade, *upphöjdt* 3nerviga; fröh. *knappt längre* än fodret; fröen *grynprickiga*. 2½ 6, 7, hv. blr. — *β micropetala* Kr. kronbl. små, icke längre än foderbl. Fig. Fl.D.2115. H.N.f.7, n:o 33.
- Fukt. äng. stränd. (Sk.—Ängml. Dal. Verml. Boh. Öl. — N. — *β Stockh.* på Ellgarn: Krok.) *Var. rent grön: S. Dilleniana* Mönch, samt blågrön: *S. glauca* Wilt., hvilken sednare är vanligast. Blrna *mycket större* än hos följ.
- b — Kronbl. af foderbladens längd, ell. kortare.
- 6 *S. graminea* L. stjelen slak; bladen som hos föreg.; blrna i knippe i stjelen spets; skärmb. hårbräddade; foderbl. som hos föreg.; fröh. *längre* än fodret; fröen *grynprickiga*. 2½ 6—8, hv. blr. Fig. Fl.D.2116.
- Äng. etc. a. (Sk.—VB. och Lpl. — N.) *Bladen med föga smalare, ofta något hårbräddad bas, stund. mera tunna och platta: β juncea; kronbl. än af fodrets längd, än något längre; hela blomman dock alltid mindre än hos föreg., med hvilken denna är mest beslägtad.*
- 7 *S. Friesiana* Ser. stjelen slak, upptill vanl. sträf; bladen platta, jembreda, med *smalare*, hårbräddad bas, i kanten sträfva; blrna som hos föreg., ell. i de öfre bladvecken; skärmb. glatta; foderbl. otydligt 3nerviga; fröh. *n. dubbelt längre* än fodret; fröen *glänsande släta*. 2½ 6—8, hv. blr. Fig. Sv.B.506. Fl.D.suppl.1, t.16. H.N.f.2, n:o 45.
- \* *alpestris* Fr. stjelen glatt, bladen med något bredare bas. Fig. H.N.f.7, n:o 34.
- Fukt. skog. (Sk.—VB. och Lpl. — N. till Finnm. — \* Torn Lpm.) *Till alla delar späddare än föreg., med smärre blr, hvilkas foder knappt visa spår till nerret före fruktens utbildning, då de vanl. blifva tydligare.* — *S. longifolia* Fr. \* *S. alpestris* Fr. S.V.Sc.
- 8 *S. uliginosa* Murr. stjelen uppstigande, glatt; bladen *aflånga—lancettlika, något tjocka*, blågröna, vid basen hårbräddade; blomskafen *ensamma i bladvecken ell. i små glesa knippen*; skärmb. glatta; foderbl. som hos föreg., *längre* än kronbl.; fröh. *af fodrets längd*; fröen *grynprickiga*. 2½ 5—8, hv. blr. Fig. Fl.D.2335. H.N.f.3, n:o 32.
- Källdrag etc. (Sk.—Medelp. och Herjed. Boh. Öl. — N. till Finnm. Tromsöe.) *Vanl. lågtväxt, bräcklig, med blomknippena oftast i bladvecken.*
- \*\* Blomskafen vanl. i öfre bladvecken, alltid utan hinnaktiga skärmb.
- 9 *S. borealis* Big. stjelen slak, vanl. uppstigande; bladen smalt lancettlika, *tunna*, vid basen hårbräddade; foderbl. *spetsiga, längre* än de snart affallande kronbl.; fröh. *mycket längre* än fodret; fröen *släta*. 2½ 7, hv. blr. Fig. Fl.D.2355. H.N.f.3, n:o 31.
- Fukt. st. i fjelltr. (Lpl.—Herjed. Ängml. Tåsjöby; Ramsele sn, Vikens fabodar: Arn. — N. Finnm. — Dovre; Trysilfjell i Österdalen; Christianistrakten, nära Tyrifjorden: Ax. Bl.) *Grön, spädd, med små, ofta felande kronblad. Då blrna någon gång sitta i knippe, tillkomma skärm, men gröna och liknande förkrumpta örblad.*
- 10 *S. crassifolia* Ehrh. stjelen slak och uppstigande ell. upprät; bladen *aflånga—ägrundt lancettlika, glatta, något tjocka* och spröda; foderbl. *spetsiga, kortare* än kronbl.; fröh. *som hos föreg.; fröen knottiga*. 2½ 7, hv. blr. — *β subalpina*: n upprät; med blomskafen i gles knippe; bladen lancettlikt äggrunda. Fig. Fl.D.2114. H.N.f.5, n:o 33; *β* f.11, n:o 41.
- Hafsstr. *β* helst i fjellen, r. (Sk.—Bok. Öl. Högsrum sn. Gotl. Kulleys hamn, VB hafsstr. nära Sangiselfvens ud. — N. till Finnm. — *β Torn. Lud. Pil. Lpm. Ängml. Tåsjö sn. VG.* vid Barnesjön i Åsaka sn. Vartofta härad. — N. Dovre vid Toft och Jerkind.) *Var. i hög grad och är vanl. 5—6 t. hög, stund. föga mer än*

tumshög; mest skiljd af de utskjutande kronbladen och de något köttiga, styfva örtbladen.

- \*11 *S. humifusa* Rotb. stjelken ända från basen delad i talrika, nedligg. ell. uppstig. grenar; bladen aflånga—ovala, glatta, något tjocka; foderbl. aflånga trubbiga, söga kortare än kronbl.; fröh. af fodrets längd; fröen släta. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Vet. Ark.H.1789, t.6, f.1. H.N.f.8, n:o 35; f.12, n:o 52 [var.].  
Isahafvets kust, r. (N. Finnm. Varanger. Tana- och Altenfjord; Hammerfest etc. ned till Hardanger i Bergens st.) Liknar stundom föreg:s smärre, mer bredbladiga former.

280. *CERASTIUM* Lin. Hönsarv.

† Kronbladen betydligt [omkr. dubbelt] längre än fodret.

\* Stjelken fåblommig.

- 1 *C. alpinum* L. stjelkarne 1—3blommiga, meränd. ludna; bladen aflånga; skärmb. bladen med hvit hinnaktig spets; stift 5; fröh. cylindriskt, krökt, med små grynprickiga frön. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.745. Fl.D.6; 979 var. H.N.f.3, n:o 33.  
Fjelltr. a. (Lpl.—Dal. Medelp. Randklöfven. VG. Hunneberg. — N.) Enkel, ell. grenad vid roten i flere, vanl. 2blommiga stjelkar. Var. glatt: *glabratum*, och tjockt ullhårig: *lanatum*.
- 2 *C. latifolium* L. stj. som föreg., glandelhåriga; bladen ovala—aflånga; skärmb. n. helt och hållet gröna; stiften 5; fröh. smalt äggformigt, rakt, med stora, på ytan rynkiga frön. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. E.B.473. H.N.f.9, n:o 29.  
Fjellv. r. (Torn. Lpm. på fjellen Ripanes och Nuljalaki vid Torn. träsk. Lul. Lpm. Quikkjokk. Njuonjes vid Tarrejokk; Wirihauere; Rovejaure; H. Widm. Pil. Lpm. Tjiddjokk. — N. Finnm. Tromsøe; Tsatsa. Dovre, på Finnsjøen och Knudshøe; vid Stölan och Nystuehæcken; Fogstuen; Joradalen etc.) Mer tuffig och nedliggande än föreg.; blrna större, med längre kronbl.
- 3 *C. trigynum* Vill. stj. nedligg. 1—4blomm., n. glatta, med finhåriga blomskäft; bladen aflånga, något spetsade och rigtade åt en sida, glatta; skärmb. utan hinnkant; stiften meränd. 3; fröh. uppåt smalare, n. rakt, med frön som hos föreg. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.744. Fl.D.92. Fl.N.2, t.6, f.2. H.N.f.7, n:o 35.  
Fjellv. (Lpl.—Dal. Gröfvelsjön i Idre. — N.) Har stundom 4 ell. 5 stift. Är för öfrigt spåddare och mer glänsande mörkgrön än de föreg. — *Stellaria cerastoides* L. *C. stellarioides* Ed.I.

\*\* Stjelken mångblommig.

- 4 *C. arvense* L. stj. grenig, vanl. småluden; bladen lancettlikt jemnbreda spetsade; skärmb. med hvit hinnkant; fröh. något krökt. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.626. H.N. f.15, n:o 41.  
Torra st. (Sk.—Uppl. Verml. Dalsl. Åmål: Stud. Thorstenson. VG. mell. Falköp. och Ranten, samt i Slöta enl. Nordst. Öl. Gottl. — N. Christiania till Romsdalen.) Vanl. ½ aln lång, mångstjeltig, med kronbl. mer än dubbelt så långa som fodret; bladen mer och mindre fjn-ludna, ända till stråfludna, stund. n. glatta.

†† Kronbl. söga eller icke längre än fodret.

\* Med grenskott vid rothalsen.

- 5 *C. vulgatum* L. stjelken nedligg. ell. uppstigande, småluden; bladen ägggrundt lancettlika ell. aflånga; skärmb. hinnkantade; kronbladen 2klufna; fröh. krökt, dubbelt längre än fodret; fröen öfverallt grynprickiga. 2½ 6—8, hv. blr. — β flisforme: enårig, trådsmaal n. upprätt, 1—4blommig. Fig. Fl.D.1645. H.N.f.10, n:o 40; f.15, n:o 42, var.
- \* alpestre: örtbl. n. ovala; kronbl. utskjutande. Fig. Sturm. 63 häft.  
Allmän. (Sk.—Lpl. — N. — β N. Buskeruds sögd. vid Sorteberg. — \* Torn. Lpm. Allmän. Lul. Lpm. Quikkjokk. Jemt. Frostviken sn, på Mejsklumpen. — N. Finnm. — Dovre.) 1—2 qv. lång, meränd. med kort hårlighet, men var. öfven i söd. So. glatt: *holosteoides* [H.N.f.15], på Gottl. stråfluden: *anomalum*, och i fjelltr. klubbhårig: *viscidum*; bladen stundom mycket smala, n. jemnbreda. — *C. viscosum* Sm. E.B. och Wg.Fl.L. *C. vulgare* Hn. *C. triviale* Link.

## \*\* Utan grenskott.

a — Fröh. krökt, dubb. längre än fodret.

- 6 *C. viscosum* L. stj. meränd. upprät, kljtbluden af långa hår; bladen rundade eller ovala; skärmb. utan hinnkant; kronbl. 2flikiga, af fodrets längd; fröh. kort skaftade; fröen i kanten grynprickiga. ☉ 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.1931. H.N.f.14, n:o 41.  
 Fukt. gräsväxta st. (Sk.—Held. Ängml. Nyland i Ytter-Länäs och Ulånger sn. Del. Verml. södra delen. Boh. Hall. Öl. — N. till Opdal i Trondhjems st.) Var. större och mindre, samt utan kronbl.: apetalum, då stånd. oftast äro blott 5; blrna i början lätt gylltrade, vid fruktmogn. diskiljda; fröen på sidorna n. släta ell. omärkligt prickiga. — *C. vulgatum* Lin. herb. och Sm. i E.B. *C. ovale* Pers. *C. glomeratum* Thuill.

b — Fröh. n. rakt, föga längre än fodret.

- 7 *C. brachypetalum* Desp. stj. meränd. upprät, jemte de aflånga ell. äggrunda bladen och blomfodret stråfhårig; skärmb. utan hinnkant; kronbl. 2flikiga, kortare än fodret; fröh:s skaft långa, i spetsen krökta; fröen öfverallt, men glest prickiga. ☉ 5, 6, hv. blr. Fig. Fl.D.2536. H.N.f.1, n:o 38.  
 Back. torra st. r. (Sk. Gladsax-häßer; Cimbritshamn; Lund vid Fogelsång m. fl. st. Blek. Carlskrona på Vemmö; Ronneby vid Bustorp etc. Smål. i Tryserums och Malmbackes snr. ÖG. Gusum; Kindb. Södm. Bränningeklint enl. Lem. Hall. Öl. Borgholm. Götll.) Quarternshög eller mera. Blr tidigt, såsom de följ. — *C. strigosum* Fr.  
 8 *C. tetrandrum* Curt. stj. upprät ell. uppstig., jemte de aflånga bladen kljtbluden; skärmb. utan hinnkant; blomdelarne 4—5flikiga; kronbl. 2flikiga, något kortare än fodret; fröh:s skaft långa, raka och upprätta; fröen öfverallt grynprickiga. ☉ 5, hv. blr. Fig. Fl.D.2117 och Sturm. D.Fl.h.63. H.N.f.15, n:o 44.  
 Hafsstr. r. (Boh. öar utanför Göteborg, t. ex. Halleskär, Buskär, Varö etc.; Sydskoster enl. Lem. — N. på kusten: Bl. enl. Lindeb.) Stor som följ., med hvilken den är närmast beslägtad; ofta grenad ända från basen. De nedersta skärmb. äro större än örtbladen, bredt äggr.—n. runda. — *C. atrovirens* Bab.

c — Fröh. n. rakt, nära dubb. längre än fodret.

- 9 *C. glutinosum* Fr. kljtbluden; bladen ovala; skärmb. med smal ell. ingen hinnkant; kronbl. 2flikiga, något kortare än fodret; stånd. 10; fröh:s skaft utslående ell. utböjda; fröen öfverallt, glest grynprickiga. ☉ 5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *obcurum*: mörkgrön och n. klynnegrenig; skärmen n. utan allt spår till hinnkant. Fig. H.N.f.4, n:o 54.  
 Tor. st. r. (Sk. Blek. ÖG. Söderköping; Gränsö i Jonsberg; Fredberg i V. Stenby, och flerest vid Linköping enl. Kindb. VG. Kinnekulle. Öl. Götll. —  $\beta$  Blek. Carlskrona. Götll. Carlsvärd. — N. Stavanger.) 2—4 tum hög, med mycket gröfre och stadigare stjeln än följ., som lätt skiljes med sina bredt hinnkantade skärmb. — *C. pumilum* Koch och Bab.  
 10 *C. semidecandrum* L. kljtbluden [ $\beta$  glatt]; bladen ovala; skärmb. med bred hvit hinnkant; kronbl. kortare än fodret, urnupna ell. naggade; stånd. 5; fröh:s skaft i början nedböjda, slutl. alla ell. till en del upprätta; fröen som hos föreg. ☉ 5, hv. blr. —  $\beta$  *macilentum*: liten och glatt. Fig. Fl.D.1212. H.N.f.1, n:o 39;  $\beta$  f.15, n:o 43.  
 Torra st. a. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. Verml. Philipstad, Carlstad m. fl. st. i söd. delen. Hall. Öl. Götll. — N. —  $\beta$  Blek. vid Gredby.) 1—4 t. hög; varl. gulaktig, stund. tunnt gråbluden. —  $\beta$  *C. macilent. Asperg.* med djupare inskärning hos kronbl. och smalare stjeln. har ett mycket afvikande utseende.

## 281. HOLÖSTEUM Lin. Fogelary.

- 1 *H. umbellatum* L. bladen ovala ell. lancellika; blrna i flock; fröh:s skaft nedböjda. ☉ 4, 5. Fig. Fl.D.1204. H.N.f.1, n:o 40.  
 Mur. sandfält, r. (Sk. Blek. Tromtö tegelbr. och Skillinge. Smål. Kalmar; Vestervik, vid Grantorpet. Öl. Götll.) Blågrön, med hv. ell. något rödl. blr. Lik ell. *Cerastium*.

282. *ARENARIA* Lin. Sandnary.

† Fröen med en hvit fästknöl. [Bladen stora,  $\frac{1}{2}$ —1 tum]: *Moehringia* Koch.

\* *A. trinervia* L. stjelen uppstigande, grenig; bladen kortskäftade äggrunda, spetsiga, 3—5nerviga; blömmor ensamma i de öfre bladvecken; foderbl. lancettlika, spetsiga, längre än både kronan och fröhuset.  $\textcircled{D}$  6, hv. blr. Fig. Fl.D.429.

Skog. (Sk.—VB. och *Jeml. Ö. Götll.* — N. till söd. Finnm.: Norm.) 3—7 tum hög.

\* *A. lateriflora* L. stj. enkel ell. delad vid roten i flere, långa och n. enkla grenar; bladen n. oskäftade, ovala—lancettlika, 1—3nerviga; blömmor 1—3 tillsammans på skaft i bladvecken; foderbl. äggrunda trubbiga, mycket kortare än kronan.  $\textcircled{D}$  7, 8, hv. blr. Fig. H.N.f.9, n:o 39.

Fukt. gråsväxta st. r. (N. Ost-Finnmarken, Sydvaranger, vid Klösterelf.) Något lik föreg., men mera enkel och med nära  $\frac{1}{2}$  tum vid blomkrona.

†† Fröen utan n. fästknöl. [Bladen 1—2 lin. långa.]

\* *A. ciliata* L. tufvig, med talrika grenskott; bladen oskäftade, omv. äggrunda—tunglika spetsiga, vid basen meränd. hårbreddade ottydligt nerviga; fodret kortare än kronan.  $\textcircled{D}$  6—8, hv. blr. Fig. Fl.D.346. H.N.f.10, n:o 41.

\* *norvegica* Gunn. bladen något köttiga, icke hårbreddade; foderbl. äggrunda, ottydligt 3nerviga. —  $\beta$  *humifusa*: blomgrenarne mycket korta, 1—2blommiga. Fig. Fl.D.1269. Fl.N.L.9, f.7—9. H.N.f.5, n:o 35.

Fjelltr. och berg, r. (N. Finnm. Porsanger, vid Kulvig och Staburselv: Norm.; Bosekop, vid Rajpes samt nedom Sakkabani vid Kaafjord: Th. Fr.; Maalselv, vid ån Divielv och Thronenäs, vid Skamland; samt Nordl. Ofoten och Gildeskaal: Norm. — \* Finnm.: Hardanger; Sogn på Ravnanaasi i Uriand: Ax. Bl. —  $\beta$  *Lul. Lpm.* Wirihaure, på Unna Tokiware, numera näst. utrotad enl. H. Widm.) 1—4 tum lång; frö. föga längre än fodret. Hufvudarten är utmärkt af smalare och mer spetsade foderblad, med tydliga, något upphöjda nerver, men talrika öfvergångar till \* låra enl. Norm. förekomma i Finnm.

\* *A. gothica* Fr. stjelen grenig från basen, utan grenskott; bladen oskäftade, aflånga, hårbreddade, ottydligt nerviga; foderbl. trubbad, kortare än kronbl. och frö.  $\textcircled{D}$  6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D. suppl. 1, t.15. H.N.f.5, n:o 34.

Tor. st., kalkberg, r. (VG. Kinnekulle, Öster- och Vesterplana. Götll. en fjerdingsväg öst. om Visby; Thorsborg; samt Hau i Fleringe enl. G. v. Ced. — N. Salten?) Stor som föreg., hvilken den liknar vida mer än följ. Grenarne meränd. enkla, upprätta, fåblommiga, med teml. stora blr.

\* *A. serpyllifolia* L. utan grenskott; bladen oskäftade, bredt äggrunda spetsiga, tydligt flernerviga; foderbl. lancettlika, spetsiga, längre än kronbl., af fröhus längd.  $\textcircled{D}$  6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *tenuior*: dubbelt spädare, med hälften så stora blr och fröhus. Fig. Fl.D.977.  $\beta$  H.N.f.16, n:o 46.

Torra st. a. (Sk.—Ångml. och *Jeml. Pit. Lpm.* Ischjakk. Dal. — N. till söd. Finnm.: Norm. —  $\beta$  Götll. vid Thorsborg; Svalstade i Vamlingbo: O. Nordst.) Hela växten något gråaktig, sträf, stund. något klubbhårig, vanl. mycket grenig, från ett par tum till nära fotshög.

2 Flokken *Alsinese*. Fröhusets skal af samma antal som stiften. Stipler 0.

283. *HALIANTHUS* Fr. Saltarv.

\* *H. peplodes* Fr. bladen äggrunda—lancettlika köttiga; blömmor ensamma, på skaft i öfre bladvecken.  $\textcircled{D}$  6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.624.

Sandiga hafstr. (Sk.—Held. Hudksvæls skärgård. Ångml. Hernösand. VB. Haparanda skärg. Boh. Öl. Götll. — N. till Ost-Finnm.) Bladen låderaktigt tjocka, vanligen så tätt sittande, särdeles de öfre, att de nä. öfver stjelen mellanled; var. dock med bladen vida gläslare och smalare: var. *oblongifolius*. — *Arenaria* L. *Alsine* Wg. *Honkenya* Ehrh. *Ammadenia* Gmel.

284. *ALSINE* Wahlenb. Nörel.

† Enårig, aldrig tufvad.

\* *A. tenuifolia* v. *viscosa* Schreb. stjelen upprätt, från basen n. klönnegrenig; bladen Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).



*syl-lik*; foderbladen *hvas-spetsade*, *långre än* kronan. ☉ 6, 7, hv. blr. Fig. FLD. 389 och 1754. H.N.f.1, n:o 41.

Sandfält, r. (Sk. Ifötofta ned till Rastunda och Degeberga, Cimbritshamn etc.) 2—5 tum hög, mångblommig; den i Sv. förekommande var. *skiljd endast genom sin hårlighet från den vanl. alldeles glatta hufvudformen*. — *Arenaria* L. *Sabulina viscosa* Reich.

†† Fleråriga, tufvade växter.

2 *A. biflora* Wg. delad vid roten i flere, meränd. 2blommiga, särdeles upptill håriga grenar; bladen *syl-lik*t jemnbreda, trubbiga, utan tydl. nerver; foderbl. *trubbiga*, 3nerviga, något kortare än de aflånga kronbladen, mycket kortare än fröb. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Vet.Ac.H.1789.t.1.f.1. Sv.B.763. H.N.f.5, n:o 37.

Fjellv. (Lpl.—Herjed.—N. till Ost-Finm.) 1—3 tum hög, med trubbiga, ofta urnupna, någongång rödlätta kronblad. — *Stellaria* L. *Alsinella* Sv.

3 *A. hirta* Hn. delad vid roten i 1—2blommiga, upptill glandelhåriga grenar; de nedre örtbladen jemnbreda, de öfre *lancellika*, alla upphöjdt 3nerviga; foderbl. *spetsiga*, 3nerviga, *långre än* de ovala kronbl., lika långa som fröb. 2 7. — *a foliosa*: grenarne utdragna slaka, med 3—6 bladpar; blrna hvita. — *β rubella*: gren. n. upprätta enblomm., med 1—2 bladpar; blrna rödlätta. Fig. Fl.D.1518 och 1646. H.N.f.5, n:o 38. *β* Wg. Fl.L.t.6. Sv.B.764.

Fjellv. r. (N. Ost-Finm. Dovre, på Finnshöe; i Drivdalen från Kongsvold till Vaarstien upp till snögränsen. — *β Tornio* tråsk. *Lul. Lpm.* mycket sparsamt. — N. Finm.—Dovre.) *a* har fingerlånga, slaka, vanl. 2blomm. grenar; *β* är tätare tufvad och mer upprätt, 1—2 tum hög. — *Aren. hirta* och *Gieseckii* Fl.D. *Alsinella verna* Carr. *Ledeb. β A. rubella* Wg.

4 *A. stricta* Wg. delad vid roten i ganska långa upprätta 1—2blommiga, glatta grenar; bladen *syl-lik*a trubbiga glatta, utan tydl. nerver; foderbl. *spetsiga*, nervlösa, n. af kronbladens och fröb:s längd. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Vet.Ac.H.1799,t.3. Sv.B.762. H.N.f.5, n:o 36.

Fjellv. r. (Torn. Finm. Nuljalaki och Ripanes. *Lul. Lpm.* Wirihauere; på en kulle vid Stalajokk: H. Widm. *Pit. Lpm.* Um. *Lpm.* Högsta by. *Jemil.* Snasabögen; Åreskutan; Mejsklumpen i Frostviken. *Herjed.* Helagsfjellen; Midtåkläpparne; Hamra och Skarfjellen etc. — N. Finm. på fjellet Silfvarre i Porsanger; Norm.; Mortensnes i Varanger; Th. Fr. Dovre.) Örtan vid basen bladig; blomgr. 2—6 tum långa, vanl. endast med ett eller annat bladpar vid och nedom midten. — *Spergula* Sw. V.Ac.H.

## 285. SAGINA Lin. Hönsbet.

† Blommans delar 5taliga: *Spergella* Reich.

\* Kronbl. betydligt större än foderbl.

1 *S. nodosa* Fenzl. delad vid roten i flere, upprätta ell. uppstig. mångblommiga grenar, upptill knutiga af små bladgyttringar; bladen *syl-lik*a trubbiga; foderbl. trubbiga, af fröb:s längd. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D.96.

Stränd, fukt. st. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) Vanl. 3—6 tum hög; var. glatt och smått glandelhårig. — *Spergula* L.

\*\* Kronbl. af foderbladens längd, ell. kortare.

2 *S. subulata* Presl. stjelen tufvad; bladen jemnbredt *syl-lik*a med lång nål-lik udd, meränd. gäst glandelhåriga; blomskafen utdragna, slutl. upprätta; foderbl. trubbiga, af kronbl:s längd, kortare än fröb. 2 6, hv. blr. Fig. Vet.Ac.H.1789,t.1.f.3. Sv.B.708. FLD.858. H.N.f.4, n:o 56.

Klipp. och fukt. st. helst nära hafvet, r. (Sk. Hall. Boh. Smål. Femsjö; Odensjö; Ljunga och Vilstad; Unnarvåg m. fl. st. VG. Göteborg; Alingsås. Ö. Ruosten. — N. södra och vstra del.) Stjelkarne korta, med 1—1½ tum långa blomskaf; den färglösa bladudden betyd. längre än bladets bredd. — *Spergula subulata* Sw. *Sp. saginoides* Osb. och Lin. i herb. *Sp. laricina* Fl.D.

3 *S. nivalis* Lindbl. tät tufvad; bladen tegellagda, från bred bas *syl-lik*t spetsade med

*udd*; blomskafren korta, uppräta; foderbl. trubbiga, af kronbls och fröh:s längd 2½, 8, hv. blr. Fig. H.N.f.12, n:o 51.

Hög fjellv. r. (*Torn. Lpm.* fjellen Ripanes och Nuljalaki. *Lul. Lpm.* Wirihauere; Kal-lowarats vid Rovejaure: H. Widm. *Pil. Lpm.* Kåbrenåiwe och Tjiddjakk. *Herjed.* Helagsfjellen. — N. Finnm. vid innersta viken af Lyngensfjord. Dovre, Fogstuen; vid Nystuebækken; Knudshøe, vid öfre delen af Sprenbækken; Finnshøe, på högsta toppen; Vaarstien, ymnig; klipporna midtför Drivstuen.) *Hela växten tumshög; den spåda roten bärande en lät tufva stjekar med små, söga lutande blr. Var. med slakare, nedligg. grenar och mer åtskiljda blad. En medelform mell. föreg. och följ* — *Sperg. saginoid. var. Blytt.*

4 *S. saxatilis* Wimm. stj. mycket kort, med långa utbredda grenar; bladen smalt syl- lika, kort uddspetsiga, glatta; blomskafren *uldragna*, uppstigande, med *lutande* blr; foderbl. trubbiga, *långre* än kronbl., *dubb. kortare* än fröh. ☉ 2½ 6—8, hv. blr. Fig. Vet.Ac.H.1789.1.f.2. Sy.B.765. Fl.D.1577. H.N.f.9, n:o 40.

Fjelltrakt. a. (*Lpl.—Dal. Ångm.* Tåsjöberget. *Medelp.* Liden sn. — N.) Något större och med längre blomskafren än följ. art, hvarifrån närv. är söga skiljd, helst den stundom har 4taliga blomdelar och ofta små eller inga kronblad. — *Spergula saginoides* Sw. S. Linnæi Ledeb.

†† Blommans delar 4taliga: *Sagina L.*

\* Alla foderbladen trubbiga.

5 *S. procumbens L.* nedliggande, med grenar och blad som föreg., glatt; blrna *lutande*; foderbl. mycket längre än kronbl. [som oftast felslå], något kortare än fröh. ☉ 5—8. Fig. Fl.D.2103. H.N.f.15, n:o 45 [var.].

Fukt. st. a. (*Sk.—Lpl.—N.*) Grenarne 1—3 tum långa; stånd. vanl. 4—7; pist. 4, 5. Träffas någongång med fyllda blr af tatrika kronblad, långa som fodret. — *Sperg. Sagina Sw.*

6 *S. stricta* Fr. stjelen uppräta, n. *kllynnegrenad* med uppräta grenar, glatt; bladen syl- lika, halftrinda, utan märklig udd, vanl. glatta; blrna uppräta, utan kronbl; fo- derbl. af fröh:s längd. ☉ 5—7. Fig. Sv.B.562,f.2. Fl.D.845, 2104. H.N.f.1, n:o 43 och f.10, n:o 42.

Fukt. st. nära hafvet, r. (*Sk.—Boh. Blek. Smål.* Påskallevik; Kalmar samt på Furön m. fl. st. Öl. Färjestaden m. fl. st. på vest. sidan; Böda hamn etc. *Gottl.* Bursviken i Öja sn; Klintehamn, och vid Storugns m. fl. st. Fårön på stranden nedom Landt- näs; Lilla Carlön. — N. Christiania etc. efter kusten.) *Liten, äldre något styf ört. Var. enl. O. Nordst. vid Ronneby med hårbräddade bl. — S. marit. Don. S. ape- tala β Wg.*

7 *S. apetala L. v. caespitosa Aresch.* stj. *tufvad*, jemte grenarne uppräta, glandelhårig; bladen syl- lika, uddspetsiga, vid basen glest hårbräddade; blrna uppräta; kronbl. inga ell. mycket kortare än foderbl.; dessa kortare än fröh. ☉ 6, hv. blr. Fig. (hufvudformen) Fl.D.2102 (öfversta fig.). H.N.f.13, n:o 54.

Tor. st. r. (*Sk. på sandiga trädesåkr. mell. Stenshufvud och Rörum: F. Aresch.*) *Hufvudformen, som ännu icke blifvit funnen i Sv., är högre och spådare.*

\*\* Två foderblad uddspetsiga.

8 *S. ciliata* Fr. nedliggande med utbredda grenar, glatt ell. upptill glandelhårig; bladen syl- lika, uddspetsiga, vid basen hårbräddade; blrna något lutande, med kronbl. som föreg.; foderbl. kortare än fröh. ☉ 6, hv. blr. Fig. Sv.B.562,f.1. Fl.D.2102 (nedersta fig.). H.N.f.1, n:o 42.

Åkrar, r. (*Sk. vid Snårestad, mellan Ystad och Trelleborg; Hvellinge; Sandhammar; Hököpinge etc. Boh. Domsö.*) Blrna mindre än hos föreg. — *S. apetala Wg.*

3 Flocken **Lepigonosæ.** Blad med hinnaktiga stipler.

286. SPERGULA Lin. Spergel.

1 *S. arvensis L.* stjelen klubbhårig, säll. glatt; bladen kranssittande, trådlila, med en långsgående fära på undre sidan; fröen tjocka, med en smal och slät hinnkant. ☉ 7, 8, hv. blr. — *a vulgaris:* frön beströdda med hvita, stutligen brunaktiga klubblika

vårtor. — *β sativa*: frön utan vårtor, prickade. — *γ maxima*: dubbel större, n. glatt; frön som *α*. Fig. Fl.D.1033. Reich.f.705, *β* 704.

Åkrar, stränd. etc. *α*. (Sk.—Lpl. — *N.* till Nordl.) Blirna hos begge arterna i gästlikt knippe. Blir stund. mycket biten och har då vanl. blott 5 ståndare. De 2 varr. upplagas som arter af Reich.

- 2 *S. vernalis* Willd. stj. glatt; bladen som hos föreg., utan fåra på undre sidan; fröen plattade, i kanten grynplockiga och vingade med en bred strålstrimmig hinnkant. ☉ 6,7, hv. blr. Fig. Sv.B.308. Fl.D.1940. H.N.f.4, n:o 55.

Torra skogsberg. (Sk.—Uppl. Helsl. Ångml. Jemt. Frösön. Vestml. Ner. Verm. Boh. Öl. Göt. — *N.* söd. del, t. ex. Arendal på Kloppehöjen. Christiania.) Öppnar sällan blirna; vanl. glatt och mer stel än föreg. — *S. arvensis* Sv.B. var. *β* Wg. *S. pentandra* Ed.6 och de flesta Sp. förf., men icke *L.*, hvars art af detta namn tillhör södra Europa och har spetsiga kronblad och släta frön, hvaremot vår art har kronbl. trubbiga och fröen med en prickig kant innesän för hinnkanten. *S. Morisonii* Bor. och Ed.9 dr, såsom Lange visat, ett mycket yngre namn.

### 287. LEPIGONUM Fries. \*) Fjällnerv.

- 1 *L. rubrum* Fr. stipl. äggrundt lancettlika, med vanl. utdragen och finklufven spets; fröh. ungefär af fodrets längd; fröen n. päronformiga, gråakt. bruna ell. svartaktiga, ovingade, knöliga. ☉ 24. Kronbl. vanl. mörkt lila-röda. Fig. Kindb. Monogr.t.3, f.29. H.N.f.8, n:o 36.

Tor. st. (Sk.—VB. nor. del. — *N.* till Nordl.) Växten oftast mörkgrön och upptill klibbluden, vanl. grenig och uppstig. med glänsande stipl., utdragna och bladiga blomklasar samt långa fruktskaft. Stjelnens ledstycken vanl. n. längre än de plattade ell. halfrinda, oftast uddspetsiga bladen, men stund. mycket förkortade (såsom hos var. *radicans* [Presl.] Kindb.). Var. från ett par tum till fotlång; fröh. omkr. 4, fröen omkr. 0,5 m.m. långa. — *Aren. rubra* a *L. Absine* Wg. *Spergularia Pers.*

- 2 *L. caninum* Leffl. stipl. äggrundt triangulära, med vanl. föga utdragen ell. klufven spets; fröh. mer ell. mindre utskjutande ur fodret; fröen tresidigt rundade—plattade, bruna, ovingade ell. vingade, knöliga ell. släta. ☉ 24. — Sinsemellan sammanslötande, men för synonymiens skull anmärkningsvärda äro följande varieteter:

*α salinum* (Presl.) växten upptill något klibbluden ell. n. glatt; kronbl. vanl. ljus lila-röda ell. hvitaktiga; fröh.  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$  utskjut.; fröen knöliga. Fig. Kindb.t.3,f.27. H.N.f.15, n:o 46. — *L. neglectum* Kindb. Synops. och Hn.ed.9. *Spergularia salina* Presl. Leipzig. sal. Kindb. Mon. *L. salinum* Fr. tyckes innefalla denna och *δ*.

*β sperguloides* (Lehm.) växten vanl. mörkgrön, tätt klibbluden, med oftast utdragna och kortbladiga klasar; kronbl. mörkt lila-röda; fröh. vanl. kort utskjut.; fröen knöliga ell. n. släta. Fig. Kindb.t.3,f.28 (dålig). — *Holost. spergul.* Lehm. *Lepig. salin.* \* *spergul.* Kindb. Mon.

*γ urbicum* Leffl. växten oftast späd och ljusgrön; fröh. litet, vanl. kort utskjut.; fröen släta ell. otydl. knöliga. Fig. Kindb.t.2,f.11. H.N.f.8, n:o 37. — *L. medium* Fr. (och Hn.ed.9), ett namn som stöder sig på det osäkra synonym. *Arenaria media* *L.* och dessutom blifvit förut användt i annan bemärkelse.

*δ leiospermum* (Kindb.) fröen som hos *γ*, men större och plattare; för öfr. som *α*. Fig. Kindb.t.2,f.10. H.N.f.14, n:o 42. — *L. leiospermum* Kindb. *L. salinum* Hn. ed.9. *L. medium* Wahlb.

Varr. *α* och *δ* på hafsstr. teml. *α*. (Sk.—Boh. — VB. nor. del. — *N.* till Nordl. — *β* utmärkt på muddrupplag etc. vid Göteborg; osäkrare former på styf lerford flerst. t. ex. Carlskrona och Uddevalla. — *γ* gator i Upsala, Vesterås, Gefle, Visby, Lund m. fl. städer [ofta inuti landet]; på hafsstr. vanl. oskiljbar från *δ*.) Bladen hos alla formerna halfrinda ell. plattade, utan ell. med kort udd i spetsen; foderbl. vid basen mörkfläckade. Fröh. 4—7, frön 0,6—1 m.m. långa. Blomklarnes, stödjebladens och fruktskaftens längd, växtens storlek m. m. högst föränderliga.

\*) Detta släkte är redigeradt af J. A. Leffler.

3 *L. marinum* Wahlb. (till en del). stipl. som föreg.; fröb. vanl. långt utskjutande; fröen som hos föreg., oftare vingade och släta, mörkbruna, ell. sällan svartakt. 24. Kronbl. vanl. ljust lila-röda. — Varierar:

*α marginatum* DC. fröb. stort och oftast till hälften utskjutande; fröen vanl. stora, vingade, mörkbruna och släta. Fig. Kindb.t.1.f.6. H.N.f.8, n:o 38. — *Spergularia media* Pers. *Arenaria marginala* DC. Ar. *media* Wallr. *Lep. marinum* Wahlb. *L. marginatum* Koch, men beskrifn. tvetydig. — Äldre synonym. än Wahlb. teml. osäkra, såsom innefatt. vingfröiga former afven af föreg. art.

*β fasciculare* (Lönnr.) Lge. fröb. smärre och mindre utskjut.; fröen små, ovingade, svartaktiga och ofta knöliga. — *L. fascicul.* Lönnr. till en del (form med sammanträngd blomsamling och tätt tuftade stjelkar etc.)

Hafsstr.; *α* mindre allm. än föreg. (Sk.—Boh. och Små. — N. till Finnmark? — *β* mycket sällsyntare: Boh. Midskär bland Väderöarne. Gold. Klintehamn etc. — Mellanformer finnas flerstädes.) Skild från föreg. genom sin olika habitus, till alla delar gröfre växt, större och bredare fröb. m. m. Fröb. 7—10, frön 0,7—1,3 m.m. långa. Blomskaf vanl. långa och klararne utdragna, ofta alldeles bladlösa, hvilket hos föreg. högst sällan är fallet.

49 Fam. *ELATINEAE* Juss. Fod. 3—5klufvet. Kronbl. lika många. Stånd. af samma ell. dubbelt antal. Fruktämne 3—5rummigt, med centrala fröfåsten. Fröhvite 0.

### 288. *ELATINE* Lin. Lonkeserf.

1 *E. Hydropiper* L. bladen aflångt omv. äggrunda, långt skaftade; blr oskaftade i bladvecken; kronbl. och foderflik. 4; stånd. 8; fröb. 4rummigt. ☉ 6—9, rödl. blr. Fig. Sv.B.597. Fl.D.156. H.N.f.9, n:o 41; f.6, n:o 29 [var.].

\* *orthosperma* v. Dub. fröen n. raka.

Stränd. vid och i vatn. (Sk.—VB. Haparanda. Lul. Lpm. enl. Ande. — N. Nittedalselv i Skydsmoe nära Christiania; Romerige.) Liten krypande och rotsläende ört, på det torra vanl. rödaktig; blommande under vattnet, saknar den kronbl. Frön hos *α* hästskoformigt krökta, hos \* [*E. spathul.* Gorsk. enl. Walp. Repert.] nära raka, hvilket synes vara tillfälligt, då på samma lokal än den ena, än den andra formen olika är förekommer.

2 *E. triandra* Schk. bl. som föreg., kort skaftade; blr oskaftade; kronbl., foderflik. och stånd. 3; fröhus 3rummigt. ☉ 6—9, rödl. blr. Fig. Sv.B.597. H.N.f.6, n:o 30.

Stränd. r. (Blek. vid Lyckeby å m. fl. st. ÖG. Vetterns strand vid Bisp-Motala. Södml. Strengnäs, Nabbviken samt Norrstacken. Gestr. Gefle, Stenborgsviken och Avaäns mynning. Ängml. Själevad, vid Vestansjö by. VB. Neder-Kalix; Tornio. Vestml. Svartön; Kärrbo; Kungsör. Ner. sjön Qvismaren. Verml. vid Venern; Rådasjön; Möckeln, vid Bredgården; Reuterm. VG. Göteborg.) Till alla delar något större än föreg. med bredare blad på kortare skaft. Fröen föga krökta. — *E. callitricoides* Rupr.

3 *E. hexandra* DC. bl. som hos föreg.; blrna utdraget skaftade; kronbl. och foderflik. 3; ståndare 6; fröb. 3rummigt. ☉ 7, rödl. blr. Fig. Reich.f.599. H.N.f.11, n:o 43.

Stränd. r. (VG. Göteborg vid elfven, samt vid Gunnebo; Venersborg, Kasen. Dalsl. i Viksjön vid Ryr. i n. Ryr sn. Verml. i sjön Värmeån, vid Finneback i Brunskog sn; Kila sn, i Harfjorden enl. Leml.; Karliskoga, i Timselfven vid Björkborn, och i Möckeln, vid Bredgården; Reuterm.) Utmärkt af blomskafen, som äro 1—2 linier långa. Frön som hos föreg. — *E. paludosa α hexandra* Godr. & Gren.

### 3 Serien: CALYCIFLORÆ.

#### 7 KLASSEN

#### FAUCIFLORÆ.

50 Fam. **CUCURBITACEÆ Juss.** Blr skiljddkônade, med samväxta kronblad. Stånd. 5, till en del hopväxta. Fruktämne 3—5rumm. med fröfästen på väggarne, slutl. bär.

289. **BRYONIA** Lin. Hundrosva.

1 **B. alba** L. bladen hjertlika handflikiga med 5 tandade flikar, stråsprickiga; blrna i qvast, sambyggare. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.105. Fl.D.813.

Vid gärdesgård. etc. r. (Sk.—Uppl. Vestml. Vesterås; Strömsholm. Hall. Hasslöf: Theor. Öl. Gottl.) *Klångväxt, med blad, som likna lönnens, och trådlika klängen från stjelken; hanblrna större än ♀blrna; bären svarta.*

51 Fam. **RIBESIACEÆ Reich.** Kronbl. och stånd. 5, fria. Fruktämne enrummigt, slutl. bär med 2 fröfästen på väggarne.

290. **RIBES** Lin. Ribs.

† Grenarne väpnade med taggar.

†1 **R. Grossularia** L. grenarnes taggar vanl. 2—3 tillsammans; bladen 3flikiga; blomskäften *ensamma* 1—3blommiga. 3 4, 5, brungr. blr. —  $\beta$  *Uva crispa*: fruktämnena finhåriga; bären glatta, gröngula. —  $\gamma$  *reclinatum*: grenarne båglikt utböjda; bären glatta röda. Fig. Sv.B.133. Fl.D.546.

Torra st. vid väg. byar,  $\beta$  allmänna. (Sk.—Uppl. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Gottl. — N. Arendal; Hedemarken etc.) *Frukten saftfull, söt; krusbär.*

†† Utan taggar.

2 **R. nigrum** L. bladen 5flikiga, under hartsprickiga; blrna i lutande klasar, klocklika, med *spetsade* skärm, kortare än de enskilda blomskäften. 3 5, brungr. blr. Fig. Sv.B.169. Fl.D.556.

Skugg. st. mest nära vatt. r. (Lul. Lpm. Gellivare, Skräselfven, Saivitskölen; samt VB. Pajala: H. Widm.; Kengis. Skärgården från Torn. till Stockholm; 6ar i Mälaren. Uppl. Hacksta sn: E. Hensch. Södm. Åkerö och Södertelge; Nyköpingstrakten: C. Ind. Vestml. Ner. flerst. Smål. Jönköpingstrakten: Eds kapell. Boh. Hall. Sk. — N. vid kusten upp till Söndmör. Ost-Finnm. Svanvik vid Colmejavre.) *Bladen starkt luktande; frukt svarta vinbär.*

- 3 *R. rubrum* L. bladen 5flikiga, icke hartsprickiga; blirna i lutande ell. hängande klasar, skållformiga, med rundade skärm, kortare än blomskåften.  $\frac{1}{2}$  5, g. blr. —  $\beta$  *pubescens*: blad och blomklasar småludna; blirna djupare, brunfläckade, med hårbräddade foderflikar. Fig. Sv.B.199. Fl.D.967. H.N.f.4, n:o 57.

Lundar. (Lpl.—Hall. och Sk. — N. till Finnm. —  $\beta$  Lpl. — Gefle. Uppsala, Läby trask. Smål. Skeen i Annerstad sn. Verm. Boh.) Frukt röda vinbär.  $\alpha$  har glänsare, glattare, mer slaka blomklasar samt enfärgade blr.  $\beta$  har tätare och mer håriga klasar, som någon gång träffas n. uppräta. *R. petraeum* Wulf. är knappt skild från  $\beta$ .

- 4 *R. alpinum* L. bladen 3—5flikiga, under glänsande glatta; blirna i uppräta klasar, skållika, med skärm längre än blomskåften.  $\frac{1}{2}$  5, 6, g. blr. Fig. Sv.B.223. Fl.D.968. Fl.N.2, t.2. H.N.f.13, n:o 56.

Skogsback.  $\alpha$ . (Sk. Smål. mell. och öst. del.—Ångm. Herjed. Funnesdalen. Jemtl. Ö. Goull. — N. till Nordl. Ost-Finm. Svanvik.) Är ofta 2byggare genom ena könets felslagning. Bären röda: måbär.

- 52 Fam. RHAMNEÆ R. Br. Kronbl. och stånd. 4, 5, fria och motsatta. Frukt. 2—4rummig stenfrukt, med enfärgat rum.

291. RHAMNUS Lin. Toste.

- 1 *R. cathartica* L. grenarne tornspetsade; bladen ovala sågade; blirna 2byggare, 4-klufna med fjerdeladt märke.  $\frac{1}{2}$  7, grön. blr. Fig. Sv.B.307. Fl.D.850.

Skogsback. (Sk.—Held. Tuna sn. Vestml. Ner. Verm. på öar i Venern. Dals. Boh. Ö. Goull. — N. Christiansands och Aggerhus st.) 3—4 aln. högt träd ell. buske; stenfrukterna först gröna, slutt. svarta, vanl. 4fröiga. Skall enl. Sv.B. på Älleberg finnas quartershög och krypande.

- 2 *R. Frangula* L. oöppnad; bladen ovala helbräddade; blirna 2kånade, 5klufna, med enkelt märke.  $\frac{1}{2}$  6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.109. Fl.D.278.

Skogsäng. (Sk.—Pit. Lpm. och VB. nor. del., Gäddträsk. — N. till Trondhj.) 3—4 alnars buske; stenfr. först röda, slutt. svarta, mest 2fröiga. — *Frangula vulgaris* Reich.

- 53 Fam. SAXIFRAGEÆ Juss. Fod. mer ell. mindre vidväxt det 2skaliga, 1—2rummiga fruktämnet. Fröh. öppnande sig i 2, af stiftet sprötade skal.

292. SAXIFRAGA Lin. Bräcka.

† Bladen odelade.

\* Stjelken bladig; rotbladen i rosett med hvit, brosklik, finsågad kant: *Chondrosea* Haw.

- 1 *S. Cotyledon* L. stjelen långt ned delad i blombarande grenar; rotbladen tunglika, kantade med hvita sågtänder; blomfodret glandelhårigt; kronbl. bredt tunglika. 2, 8, hv. blr. —  $\beta$  *maculata*: mindre, med omv. ågrunda rotbl., smal blomsmåling, bredare och kortare, rödfläckiga kronblad. Fig. Fl.D.244. H.N.f.5, n:o 42.  $\beta$  Lin. Fl.L.t.2, f.2.

Fjellklipp. r. (Tornio träsk. Lul. Lpm. Nammats vid Qvikkjokk; Njuonjes vid Tarre-jokk; H. Widm. Jemtl. Frostviken; vid Anjens utlopp i Kallsjön. — N. Finnm. Kaafjorden—Christiania; Krokkleven och Hortekollen; Gousta fj. —  $\beta$  Nordl. mell. Mavasjaur och Ballaur vid gränsen till Pit. Lpm.) 8—18 tum hög, vanl. mycket rikblommig. Kronbl. icke runda som på figg.

- \*2 *S. Aizoon* Jacq. stjelen upprät, *upptill delad* i en n. qvastlik blomställning; rotbladen aflånga—omv. åggrunda, med kant som föreg; blomfod. glatt; kronbl. bredt åggrunda. 24 8, hv. blr. Fig. Fl.D.2352. H.N.f.14, n:o 43.  
Fjellklipp. r. (N. Nordl. med föreg. β. Aggerhus st. enl. Fr. Ligger äfven i Vahls herb. från N. enl. Blytt.) *Fingerhög, med flere bladrossetter vid roten; bladen på Norska ex. små, ovalt—omv. åggrunda; stjelen ögrenad utom i toppen; blrna mycket mindre än hos föreg.*

\*\* Bladlös stängel; bladen vid roten.

- 3 *S. stellaris* L. bladen *aflångt vigglika spetsiga, gles kvass-ågade*; blrna i *gles, qvastlikt knippe*; kronbl. lancettlika, *långre än det nedböjda fodret*. 24 7, 8, hv. blr. — β *comosa*: meränd. enblommig, med knippe af en mängd små gyttningar af fjälllika blad; kronbl. åggrunda med klo. Fig. Fl.D.23. H.N.f.15, n:o 47. β Lin. Fl.L. 1.2.f.3. Fl.D.2354.  
Fjelltr. a. (Lpl.—Dal. — N. — β Torn. — Pil. Lpm. — N. Finnm.—Dovre.) *Kronbladen något olifformiga. — Spathularia* Haw.  
\*4 *S. hieraciifolia* Kt. bladen *oval-lancettlika spetsiga, grundt bugtandade*; blrna i *gles axlik klase*; kronbl. *kortare än fodret*. 24 7, 8. Fig. Fl.D.2351. H.N.f.14, n:o 44.  
Fjellv. r. (N. öfre Gudbrandsdalen vid Vaage; Beshögden; Grasvigsätteren; Solläsetteren i Lom; Dovre, på Storhøe omkr. en mil ofvanför gården Tofte nära snögränsen, samt vid Tvärån nära de beständiga snödrifvorna.) *Något lik solj., men större; kronbl. små, grönaktigt röda. — S. stricta* Chr. Smith. *Micranthes* Don.  
5 *S. nivalis* L. bladen *rundade ell. omv. åggrunda trubbiga, trubbedgade*, n. glatta; blrna i *låta, n. kufvudlika knippen*; kronbl. *af fodrets längd*. 24 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Lin. Fl.L. 1.2.f.5.6. Sv.B.728. Fl.D.28. H.N.f.9, n:o 44.  
Fjelltr. (Lpl.—Herjed. Medelp. Randklöfven i Borgsjö sn. — N.) 3—6 *tum hög, med en ell. flere, vanl. rundade, stundom mer glesa blomgytt. i toppen, ofta underlödda af ett mindre och aflångt skärblad; var. mera späd, n. glänsande glatt, med något skaflade blr: β tenuis* Wg. — *Dermasea* Haw. *Micranthes* Don.  
\*\*\* Stjelen slak, åsidigt täckt af motsatta blad: *Antiphylla* Haw.  
6 *S. oppositifolia* L. stjelen nedligg. ganska grenig; bladen åggrunda ell. omv. åggr., jemte foderlikarne hårbräddade, i spetsen tvära med en intryckt punkt; blrna *ensamma* i grenarnes spets; kronbl. 2—3 *gr längre än fodret*. 24 6, 7. Fig. Lin. Fl.L. 1.2.f.1. Fl.D.34. H.N.f.5, n:o 41.  
Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) *Lång och slak med grenarne i början åkantiga af de låta bladen, hvilkas hår sakna glandler; blrna blå- ell. violröda, säll. hvita.*

\*\*\*\* Stjelen bladig; alla bladen strödda, smala: *Lejogyne* Don.

- 7 *S. aizoides* L. stj. *grenig nedliggande*, med uppstig. blomgrenar; bladen jemnbreda, n. halftrinda, med en liten grop nära spetsen; blrna *plattade*; kronbl. *föga längre än de utstående foderbl.* 24 7, g. blr. — β *aurantia*: med större blad och blr, mörkgula kronblad, röd pistill. Fig. Sturm 35 häft. H.N.f.14, n:o 45. β Fl.D.72. H.N. f.11, n:o 46.  
Fjelltr. a. (Lpl.—Dal. — N.) *Bladen stundom glatta, oftare med styfva hår i kanterna: S. autumnalis* L.Sp.Pl.  
8 *S. Hirculus* L. stjelen *enkel upprät, fåblommig*; bladen smalt lancettlika, trubbede; blrna *n. klocklika*; kronbl. 2—3 *gr längre än det stult. nedböjda fodret*. 24 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.625. Fl.D.200. H.N.f.1, n:o 45.  
Torfkärr, r. (Sk. Hyby, Eksholmen, Roslätt; Börringe; Yngsjö etc. Småll. mell. Bona gästg. och komministerbostället i Bredestad; Lannaskede helsobrunn; Forssarum vid Kallsåg. VG. Vartofta; Hunneberg; Berga i Vellinge sn. Vestml. vid Norråsbo by i Nora sn. Jemt. Ragunda och Hammerdal. Ångml. Långsele sn, Ledinge. VB. Koddis i Umeå sn: Dr Håkanson. Umeå—Torn. Lpm. — N. Ost-Finnm. Sydvaranger; samt Vest-Finnm. mell. Masi och Lappojavre: Norm.) 8—12 *tum hög, med fritt fruktämne inom blomman.*

†† Bladenflikiga eller inskurna.

\* De nedre bladen rundade ell. njurlika.

- 9 *S. granulata* L. stjelken vid basen omgifven af ett knippe smålökar, rak och upprät, mångblommig, utan knopplökar i bladvecken; rotbladen njurlika inskurna, med rundadeflikar, de öfre stjelkbl. n. vigglika, med aflångaflikar. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.153. Fl.D.514.

Äng. a. (Sk.—Gestr. och Dal. Ängml. Forssé bruk: Arn. Öl. Gottl. — Södra Norge.) Fotsög, med öfver ½ tum långa, klocklika blr.

- 10 *S. cernua* L. stjelken med smålökar vid basen, något flerböjd, vanl. enkel och enblommig, med knopplökar i öfre bladvecken; de nedre bladen njurlika, till midten klufna i meränd. 5, rundade ell. äggrunda, kortspetsigaflikar; de öfversta bl. odelade aflånga. 2 7, 8, hv. blr. — *β racemosa*: med 3—6 blr i toppen. Fig. Lin. Fl.L.2.f.4. Sv.B.630. Fl.D.390. Fl.N.2,t.8. H.N.f.5, n:o 43.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. på Skarf- och Ljungdalsfjellen; st. Midtåklappen. — N. Finnm.—Dovre och Quamskleiven i Valdres. — *β Torn. Lpm.* Kåbdåvanka. — N. Tromsøe; Tena på fjellet Kåmjokaisse etc.) Omkr. kvartershög, spenslig; blrna stora med långa kronblad. — *β S. bulbifera* Gunn.

- 11 *S. rivularis* L. stj. utan smålökar vid basen, uppstigande, 1—2blomm., utan knopplökar; rotbladen som föreg., med rundadt trubbigaflikar; det öfversta stjelkbladet odeladt, äggrundt ell. omv. äggrundt. 2 7, 8, hv. ell. r. blr. Fig. Lin. Fl.L.2,f.7. Sv. B.729. Fl.D.118. H.N.f.8, n:o 40.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. Helags- och Skarfj.; Midtåklappen; Ösjöklappen. Dal. Fulu-fjell i Särna, vid Njupaskärs vattenfall. — N. Finnm.—Dovre och Filefjell; Gousta-fjell.) 1—3 tum hög, med små blommor och kronblad.

\*\* De nedre bladen vigglika, 3—7flikade.

a — Med täthladiga grenskott vid stjelkens bas.

- 12 *S. caespitosa* L. tät tufvad; grenskottens blad 3—5klufna, med aflånga ell. jemnbreda, trubbladeflikar; stjelkbl. få [1—3], mindreflikiga, det öfversta vanl. odeladt, aflångt. 2 6, 7, hv. ell. gulakt. blr. — *β palmata*: kvartershög, med 5—6 hvita blr; bladen kantade med långa ledade bår. — *γ repens*: med utdragna, nedligg. grenskott och uddspetsigabladflikar. Fig. Sv.B.731. Fl.D.1388. Fl.N.2,t.7. H.N.f.3, n:o 35. *β* Fl. D.suppl.1,t.14. H.N.f.13, n:o 57.

Fjellv. (Lpl. Jemtl. Snasabögen; Åreskutan på Blå-sten; flerst. i Frostviken; Grubb-fjellet i Föline. Herjed. Skarfj.; Ljungdals- och Funnesdalsbergen. Ängml. Nora sn, Eden samt vid Rödåsen: Arn.; Skuluberget. Medelp. Randklöfven. — N. — *β* Dovre—Modum på Hovlands fjell. — *γ* Ost-Finm.) Fingerhög, något kort-hårig, oftast 1—3blommig. — *S. decipiens* Ehrh. *γ* *S. hypnoides* ed.4.

b — Utan grenskott.

- 13 *S. adscendens* L. stj. upprät, upptill vanl. grenig; bladen omv. äggrunda ell. vigglika, 3—7tandade ell. grundt flikade i äggr. ell. ovalaflikar, klibbiga; blrna i glesa klasar; frukten af omkr. skaflets längd. 2 6, 7, hv. blr. — *β lutea*: blrna gula. Fig. Fl.D.1.68. Fl.N.2,t.9. H.N.f.8, n:o 39.

Klipp. r. (Lpl.—Herjed. Medelp. Rosl. Östhammar; Harg. Stockh. på Kungsholmen. Södm. Forssa Storäng m. fl. st. enl. C. Ind. ÖG. Skenningetrakten enl. Kindb. Vestml. Sala grufva och Sättrabrunn; Arboga, Ållholmen. Ner. Örebro; Lillkyrka och Skyllersta snr. Verm. Carlstad etc. VG. Bergegården nära Venersborg. Dalsl. — N. — *β* Herjed. — N. Dovre.) Har stadigare, mer rak och upprät stjelk än följ. samt är till alla delar större. — *S. tridact.* *β* L.Fl.Su.ed.2. och Herb. S. petraea Gunn. *S. controversa* Sternb.

- 14 *S. tridactylites* L. bladen vigglika, delade till ell. nedom midten i 3, säll. 5, lancettlika, mycket utståendeflikar, klibbiga; fruktskafen meränd. längre än frukten; för öfr. som föreg. 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.476. Fl.D.1517. H.N.f.13, n:o 58.

Klipp. och sandback. (Sk.—Uppl. Vestml. Ner. Verm. Jemtl. Boh. Uddevalla; Syd-koster: Lem. Öl. Gottl. — N. till söd. Finnm.: Norm.) Är vanl. 2—6 tum hög, späd grenig, med små blr; stund. liten enkel, med odelade lancettlika blad; blomskafen stult. utstående och vanl. flere gånger längre än frukten.



## 293. CRYOSPLENIUM Lin. Guldpuddra.

- 1 *C. alternifolium* L. stj. n. upprät, endast i spetsen grenig; stjelkbladen njurlika; *skiftevisa*, på öfre sidan *glost håriga*; skärmb. halfrunda—äggrunda; stånd. 8. 2 5, g. blr. Fig. Fl.D.366. H.N.f.16, n:o 47.
- Källdrag och sukt. st. (Lpl.—Sk. Öl. mell. Vickelby och Fröbygårda. — N.) *Ljusgrön*; skärmb. *likasom hos de öfr. arterna gylltrade, hysande mellan sig de små, föga skaftade blrna*.
- 2 *C. tetrandrum* Th. Fr. stj. uppstigande, enkel ell. grenig; bl. *som föreg.*, på öfre sidan *glatta*; skärmb. *vigglika*; stånd. 4. 2 6, 7, gulgr. blr. Fig. H.N.f.11, n:o 42.
- Fjelltr. r. (Torn. Lpm. Enontekis. — N. Ost-Finm. allm. vid hela Varangerfjorden från Nyborg och Carlebotten till Vardöe; Tanasfjorden, Store-Lerpollen: Norm.) *Blekgrön*; *hålfven till flere gr mindre och spädare än föreg.* — *C. alternifol.* β Lund.
- \*3 *C. oppositifolium* L. stj. *delad vid basen i långa, nedliggande grenar*; bl. njurlika *motsatta*, på öfre sidan *glost håriga*; skärmb. *rundade*; stånd. 8. 2 5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.365. H.N.f.14, n:o 47.
- Källr. etc. r. (N. Christiansands st. vid Nørstrand. Bergens st. Hardanger, Bergen, Sausund, Svanöe, Sande etc.) *Af mörkare grön färg än de föreg.; stjelkbl. talrikare.*

- 54 Fam. ORASSULACEÆ Juss. Fruktämnen lika många som kronbladen, slutl. enrummiga flerfröiga, kapsellika karpeller, bvarje med eget stift.

## 294. SEMPERVIVUM Lin. Taklök.

- 1 *S. lectorum* L. stj. vid basen bärande rosetter af platt utbredda, omv. äggrunda blad; stjelkbl. lancettlika, alla spetsiga hårbräddade. 2 7, 8, rödl. blr. Fig. Sv.B.260. Fl. D.601.
- Klipp. tak. (Sk.—Södm. och Ner. Vestm. Skinnskatteberg. VG. Kinnekulle; nära Lidköping etc. Hall. Öl. Götll. — N. södra delen, t. ex. Öarne vid Holmestrand; Skien vid Mikael's kyrka; Arendal etc.) *Växten tjock och saftfull, fotskög ell. derulöfver.*

## 295. RHODIOLA Lin. Rosenrot.

- 1 *R. rosea* L. bladen tätsittande, ovala—åflånga platta köttiga; blrna i tät knippen i toppen, tvåbyggare. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.466. Fl.D.183.
- Fjelltr. (Lpl.—Dal. Boh. på Koön; Dyrö; samt vid Gullmarsviken. — N.) *Stj. upprät, quartershög, med smärre bl. nedtill. Bladen vanl. helbrädd., mer sällan mot spetsen sågade. Rotstocken knölig, gul och vålluktande. — Sedum Rhodiola DC.*

## 296. SEDUM Lin. Fetknopp.

† Bladen breda platta [ehuru tjocka].

- 1 *S. Telephium* L. stjelken upprät; bladen bredt äggrunda—lancettlika sågade; blrna i tät, något rundade qvastlika knippen. 2 8. — β *angustifolium*: bladen från smal bas lancettlika. Fig. Sv.B.447. Fl.D.2174; β 686.
- \* *purpureum* Fr. bladens bas afrundad; blrna röda.
- Klipp. murar, tak, a. (Sk.—Ängm. VB. Umeå skärg. enl. G. v. Ced. Vestm. Ner. Verm. Öl. Götll. — N. — β Sk. vid Mälinge nära Torekow enl. A. Falck; fordom flerst. Södm. Stafsjö bruk: Dr J. Samzelius. — \* Sk. på kyrkogårdar etc.: Lund; v. Sallerup; mell. Pugerup och Vemberga etc. Trelleborg. VG. Göteborg 1862: J. Hulting. Götll. Söderbys i Vesterheide; Valls kyrkog.) *Bladen oskaftade tjocka saftfulla, vanl. motsatta, stund. skiftevisa, de öfre hos hufvudf. med hjertlik bas; blrna hos samma form hvitgula. — Hufvudformen är S. maximum Koch. \* S. purpurascens Koch.*

†† Bladen nästan trinda.

\* Med öfvervintrande grenskott vid basen.

a — Blommor gula.

2 *S. rupestre* L. grenskottens blad tätsittande, utstående ell. utböjda; stjelkbl. raka, alla trinda, jemnbredt syl-lik, uddspetsiga, blågröna, med sporrlikt bihang vid basen; blirna kortskafade, i knippvis förenade klasar; foderbl. spetsiga, dubb. kortare än kronbl. 2 7, 8. Fig. Fl.D.113. H.N.f.4, n:o 58.

Bergstr. (Sk. Stenshufvud. Smål. Ilingetorp i Thorsås sn enl. Ekstr.; Wista kulle i Skärstad; Scheutz. ÖG. Ner. Mårsätter i Hammar sn. Verml. VG. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. Christiania samt vestra delen upp till Trondhj. Stördalselvans utlopp.) Var. med båglikt utböjda blad på grenskotten, och större blir i mer utdragna klasar: *S. reflexum* Koch.

3 *S. sexangulare* L. grenskottens blad 6radiga; alla bl. tätsittande, trinda, jemnbredt aflånga, trubbiga, blågröna, med spetsigt bih. vid basen; blirna som hos föreg.; foderbl. trubbiga, dubb. kortare än kronbl. 2 7. Fig. Fl.D.1644. H.N.f.9, n:o 43.

Backar. (Sk. Smål. Ed.—Gestr. Jemtl. Åreskutan. Vestml. kring Mälaren. Ner. Gottl. — N. Hitteren etc.) Har ljusgrön, något blåaktig färg; i växelsätt lik följ., men utmärkt af de smalare, i 6 spiralrader legellagda bladen. — *S. boloniense* Godr. & Gren.

4 *S. acre* L. grensk:s blad otydl. 4—6radiga; alla bl. äggformiga, trubbiga, med afrundad bas, ljusgröna; blirna oskafade i knippen; foderbl. som hos föreg. 2 6, 7. Fig. Sv.B.149. Fl.D.1457.

Torra st. a. (Sk.—VB. nor. del. och Jemtl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Ost-Finnm.) Mycket grenig af nedligg. grenskott.

b — Blommor hvita.

5 *S. album* L. bladen trinda aflånga trubbiga utstående; blirna i grenigt knippe; foderbl. trubbiga, flere gr kortare än kronbl. 2 7, 8. Fig. Sv.B.430. Fl.D.66.

\* *ballicum* C. Hn. hela örten rent ljusgrön; blirna dubb. smärre, med gula knappar. Berghällar. (Blek.—Uppl. Helsl. Söderhamn; samt Kuggörns hamn enl. Wistr. Vestml. på Ångsön. Ner. vid Hjelmaren. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. till Romsdalen. — \* Södm. Tullgarn på Fridön; Utön, vid Alhagen. Gottl. Thorsborg; mell. Fleringe och Bunge kyrkor; Öthem, vid Slite och på Åsundholmen; Visby, och Stenkyrka sn enl. G. v. Ced.) Bladen vanl. rödfäckiga, ståndarknapp. hos hufvudformen rödvioletta. — \* synes vara en väl skild form, trok. egen art.

\*\* Grenskott inga ell. helt små.

6 *S. anglicum* Huds. bladen något 3kantigt äggformiga, blågröna, glatta; blirna i n. bladlöst knippe; foderbl. mycket kortare än kronbl. 2 7, hv. ell. rödl. blir. Fig. Sv.B.604. Fl.D.82. H.N.f.3, n:o 36.

Back. och klipp. r. (Boh. Styrsö nära väderqvarnen; Hallonskär; Koön vid Märstrand. — N. Arendal; Stavanger—Molde, efter kusten.) 1—2 tum hög; äldre rödaktig. — *S. rubens* Fl.D.

7 *S. annuum* L. bladen jemnbredt aflånga, halftrinda, glatta, något utböjda; blirna som hos föreg.; foderbl. n. af kronbladens längd. 6, 7, g. blir. Fig. Fl.D.59. H. N.f.5, n:o 45.

Torra st. (Lpl.—Boh. och nordöst. Skåne. — N. Ost-Finnm.—Christiania, Svennäs etc.) Vanl. upprätt, 2—3 tum hög, mörk, ofta rödfäckig. — *S. rupestre* Fl.D.

8 *S. villosum* L. bladen jemnbreda, halftrinda, trubbiga, glandelhåriga; blirna skafade, i glandelhårigt knippe; foderbl. mycket kortare än de bredt äggr. kronbl. 2 7. Fig. Sv.B.746. Fl.D.24. H.N.f.6, n:o 31.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. nedom fjellet Ripanes: Rect. Forel. Pit. Lpm. Læst. enl. G. v. Ced. — N. Salten upp till Ballaur, nära Sv. gränsen. Vangsfi.; Jettasfjell vid Vaage, samt Lomseggen i Gudbrandsdalen; Filefjell; Valdres i Quamskleven; Benshöjden i öfra Tellem. Slidre etc.) 2—3 tum hög, stull. mot hösten med mycket små rundade grenskott; blirna ljusröda, torra violetta.

## 297. BULLIARDA DC. Fyrling.

- 1 *B. aquatica* DC. bladen jemnbreda; blirna i bladvecken, utan tyd. skaft. ☉ 6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *prostrata*: stjelen nedliggande; bladen något bredare. Fig. Sv.B.724. Fl.D.1510. H.N.f.9, n:o 42.

Sjöstr. fukt. st. (Sk.—Ångml. VB. vid Lule-elf, Boh. Götll.? — N.)  $\frac{1}{2}$ —2 tum lång ört, ofta med köttiga, n. sylformiga blad. — *Tillæa* L.  $\beta$  *T. prostrata* W.

- 55 Fam. LYTHRARIÆ Juss. Fod. klock- ell. bägerlikt af samväxta blad, tandadt. Fröh. fritt, flerrumm., mångfröigt, med centralfäste. Fröhvite 0.

## 298. LYTHRUM Lín. Fackelblomster.

- 1 *L. Salicaria* L. bladen motsatta ell. 3 i krans, sällan skiftevisa, oskaftade, lancettlika—åslånga, med något hjertlik bas; blirna kransvisa i ax. 2, 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.256. Fl.D.671.

Stränd. a. (Sk.—VB. nor. del. och Jeml. Stugu sn, Strånäset. Öl. Götll. — N. till Finnm.) 1—3 fot hög, med blomrikt ax, stjelkomfallande, stund. mjukludna blad.

## 299. PEPLIS Lín. Rödlonke.

- 1 *P. Portula* L. bladen motsatta, omv. ågrunda ell. spadlika, helbräddade; blirna vanl. utan kronblad. ☉ 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.592. Fl.D.64.

Vattengrop. sjöstr. (Sk.—söd. Lpm. Öl. — N.) Nedliggande, ell. i djupare vatten upprätt, med små, oskaftade blr i bladvecken.

- 56 Fam. ONAGRARIÆ Juss. Fod. trattlikt, med pipen omgifvande och vidväxt det flerrummiga fruktämnet. Frukt 2—4rumm. fröhus med centralfäste. Fröhvite 0.

## 300. OENOTHERA Lín. Gultráf.

- † 1 *O. biennis* L. stj. sträpprickig och hårig; bladen åggrundt lancettlika; ståndarne kortare än de i spetsen intryckta kronbladen. 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.549. Fl.D.446. Od. st. r. (Sk.—Uppl. Ner. och Verm. Öl. Glömminge. Götll. Förvildad i och omkring trädgårdar. — N. förvildad: Ax. Bl.) Har stora blr med lång pip, oskaftade fröhus i skärmbladens veck.

## 301. CHAMENERION Scop. Kropp.

- 1 *C. angustifolium* Scop. bladen strödda lancettlika, med n. vinkelrätt utstående sidonerv; blomklasen mångblommig. 2, 7, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.130. Fl.D.289.

Back. skog. a. (Sk.—Lpl. — N.) Oftast ett par alnar hög, i fjelltrakt. till alla delar mindre. — *Epilobium* L. *E. Gernerii* Vill. *E. spicatum* Lam.

## 302. EPILOBIUM Lín. Dunört.

† Märket 4deladt, med utböjda filkar.

- 1 *E. hirsutum* L. stj. slutl. mycket grenig, mjukluden; bladen motsatta, halftomfallande, lancettlika, till sågade, mjukludna; foderflikarne med en syl-lik udd i spetsen. 2, 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.326. H.N.f.5, n:o 39.

Back. och fukt. st. r. (Sk. flerstädes ymnig. Hall. Halmstad. VG. Göteborg; Eggby sn. Smål. Jönköping, vid Rocksjön; Vestervik vid Horns rusthåll. Stockh. Djurgården. Rosl. omkr. Norrtelge; Björnö etc. Uppl. Uppsala; Tierp sn, Gryttjom: Arn. Öl. Bredinge i Kastlösa sn; Borghy i Mörbylånga. Götll. Visby, vid gamla hamn.) 1—2 alnar hög, med tumsvida vackra blr. Var. låtare luden, med hvitulliga fröh.: *E. intermedium* Reich. — *E. hirsutum*  $\beta$  L.Fl.Su.

2 *E. parviflorum* Schreb. stj. vanl. enkel, mjukhårig; bladen motsatta, oskaftade, lancettlika, glesl naggsågade, småludna ell. glatta; foderflik. spetsiga, utan märklig udd. 2, 7, 8, r. blr. —  $\beta$  *glabratum*: bladen och nedre delen af stjelen glatta. Fig. Fl.D. 347. H.N.f.8, n:o 43;  $\beta$  f.5, n:o 40.

Fukt. st. diken, r. (Sk.—Uppl. Rosl. Vestml. Frösåker, samt vid Qvistberga i Kungsåra sn. Ner. Lanna i Hidinge sn. Boh. Nord-Koster. Öl. Götth. — N. —  $\beta$  Uppl. vid Bergsbrunna i Danmarks sn. ÖG. flerst. enl. Kindb. Smål. Svartorp i Odensvi sn enl. Ekstr. Sk. enl. F. Aresch. Öl. Bredinge; Glömminge. Götth. lilla Carlsön.) 2—3 qv. hög, spåddare och med smärre blr än föreg. Var. med 3 blad i krans. — *E. hirs. a* L.Fl.Su.;  $\beta$  L. herb. *E. pubescens* Roth.  $\beta$  *E. rivulare* Wg.

3 *E. montanum* L. bladen motsatta, ganska kort skaftade, meränd. åggrunda, sågtandade, n. glatta; foderflik. n. trubbiga. 2, 7, 8, r. stund. hv. blr. Fig. Fl.D. 922. Skogsmark etc. a. (Sk.—Pit. Lpm. — N. till Finn. Tromsöe.) Var. *allester fuktigare* ell. *torrare lokal från alnshög till några få tum hög, samt med större och mindre blad och blr; bladen stundom 3 i krans.* (*E. virgatum*.)

†† Märket helt, ell. slutl. olikformigt flikadt.

\* Stjelen trind och glatt med 2 hvitludna ränder.

4 *E. origanifolium* Lam. bladen kort skaftade, åggrunda, spetsiga sågtandade, glatta. 2, 7, 8, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.707.f.2. H.N.f.5, n:o 41. Fjelltr. vid källdrag etc. (Lpl.—Dal. ned till Svartnäs bruk och Helsl. nor. och vest. del. — N.) Vanl. 3—6 tum, stundom 2—3 qvart. hög. På fjellen så varierande, att någon gräns mellan denna och följ. knappt står att finna. — *E. alpinum*  $\beta$  Ed.4. *E. alsinifolium* Vill.

5 *E. alpinum* L. bl. med korta ell. inga skaft, ellipt.—åflånga trubbiga, n. helbrådade, glatta. 2, 7, 8, r. säll. hv. blr. —  $\beta$  *dasyarpum*: fröhusen hvitludna. Fig. Sv. B.707.f.1. Fl.D.322. H.N.f.8, n:o 44.

Fjelltr. (Lpl.—Herjed. Ångml. Tåsjöberget m. fl. st. Medelp. Torp sn. — N.) Var. som föreg., från 8—10 tum hög och n. upprätt [*E. Hornemanni* Reich. och Beurl.], till ett par tum låg, nedliggande, med 1—3 blr i den uppböjda toppen; en sådan liten form af denna ell. föreg. art var Linnés ursprungliga *E. alpinum*. —  $\beta$  *E. mutans* Schmidt. *E. sudeticum* Beurl.

\*\* Stjelen glatt, ell. öfverallt småluden, med 2—4, mer och mindre tydliga kanter.

6 *E. roseum* Schreb. med knoppbärande grenskott; stj. med vanl. 2, strimlika kanter, sård. upptill småluden; bladen skaftade, åggrundi lancettlika, glesl småsågade, n. glatta; foderflik. spetsiga. 2, 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.742. Fl.D.1815. H.N.f.3, n:o 34. \* *purpureum* Fr. stj. från bladfästena nedåt grundt 2fårad.

Fukt. st. r. (Sk.—Uppl. Uppsala; Norrtelge. Vestml. Köping. Ner. Verm. Christinehamn. Dalsl. Ödsköldst sn. Boh. Öl. — N. Christiania; Bergen. — \* Fordom funnen i Hall. vid Halmstad och i Södm. vid Eskilstuna.) 2—3 qvart. hög, ofta mycket grenig.

7 *E. tetragonum* L. med rosettbärande grenskott; stjelen 4kantig, vanl. glatt; bladen något omfattande ell. oskaftade, utdraget lancettlika—åflånga, tätt sågtandade, glatta; foderflik. spetsiga. 2, 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.1267 (var.). Reich.t.198, 199. H.N.f.2, n:o 46; f.8, n:o 41, 42.

Fukt. st. r. (Sk.—Uppl. Uppsala. Ner. flerstådes. Boh. Marstrand. Öl. Götth. — N. Arendal i Barbodalen.) Stjelen 2—4 qv. hög; bladen dels glatta och glänsande, stund. rödaktigt anslupna, dels, och hos oss kanske ofast, glanslösa och ånhåriga: var. *obscurum*; vanl. motsatta, säll. 3 i krans.

8 *E. virgatum* Fr. med utdragna bladiga grenskott; stj. otydligt 2—4kantig, upptill ofta småluden; bladen oskaftade, knappt omfattande, stundom omärkligt skaftade, lancettlika, glesl sågtandade; foderflik. trubbad. ☉ ☽ 7, r. blr. Fig. Fl.D.2588. H. N.f.10, n:o 46.

Fukt. st. diken, r. (Sk. Kropps sn, vid Björka; Resten, Esperöd m. fl. st. enl. F. Aresch. Blek. Djupadal; Aspö, Sjuhalla och Klackebäck enl. Gosselm. Smål. Femsjö; Jön-

köping; Bergqvara nära Vexjö; Nässjö; Vestervik; Hjortheds prestg. och Rinkaby i Hosmo enl. Ekstr. ÖG. trol. mångenstädes: Kindb. Hall.) *Ofta mycket högväxt, 1—1½ aln. på en gång lik. föreg. och följ. — E. tetragonum* β Wg. *E. tetrag. var. chordorhizum* Beurl.

\*\*\* Stjelken öfverallt småluden, utan kanter.

- 9 *E. palustre* L. stjelken trind, slät; bladen *lancetlika*—*jernbreda*, helbräddade ell. glest naggade; foderflik. trubbiga; fröhusen *finludna*. 2½, 7, 8, r. säll. hv. blr. Fig. Fl.D.1574.
- Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Var. mycket, enkel och grenig, med från ½ tum breda, fingerlånga blad, till 1 lin. breda, tumslånga: var. angustum* ed.9, som isynnerhet träffas i fjelltrakter och synes vara en öfvergångsform till följ.
- 10 *E. lineare* Mühlenb. stj. trind, med några upphöjda strimmor; bl. *smått jernbreda*, helbräddade ell. glest naggtandade; foderflik. som hos föreg.; fröb. *glatta*. 2½, 7, 8, hv. blr. Fig. H.N.f.10, n:o 43.
- Fjelltr. (Lpl.—Herjed. Ängml. Bjerträ sn, i Rammeldalen; Stigsjö sn: Arn. Helsl. nedom Tenberget i Loos: Wistr. — N. Finnm.—Dovre och Hugelien i Torpen. Aggerhus st.) *Vanl. quartershög och föga skiljd från föreg:s smärre former.*

### 303. CIRCÆA Lin. Hexört.

- 1 *C. luletiæna* L. stjelken *finluden*; bladen *äggrunda*, glest småtandade, n. glanslösa, med *okantade* skaft; blomskäften *finludna*. 2½. Fig. Sv.B.586. Fl.D.210. H.N. f.1, n:o 41.
- Lundar, r. (Sk. Hall. Boh. på Skaftölandet; Lyrön vid Oroust enl. Leffl. VG. t. ex. Hunneberg på affallet till Bursleds gästg. etc. Blek. Åryd; Carishamns kastell: Gosselm. Öl. Halltorp i Högsrum och vid Resmo; Lökenäs i Glömminge. — N. Christiansands st. på flere ställen. Bergens st. i Goustalien vid Ous, samt på Borgöen.) 2—4 qv. hög, stund. med något *hjerlika blad*; *blomfod. grönt ell. brunaktigt; kronbl. rödlåta*.
- 2 *C. intermedia* Ehrh. stjelken *glatt*; bladen *hjerlika*, glest groftandade glänsande, med *föga ell. icke kantade* skaft; blomskäften *finludna*. 2½, 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.703. Fl.D.256. H.N.f.2, n:o 47.
- Bokskog. (Sk. Hallandsås: Söderåsen; Helsingborg i Pålsjöskogen; vid Ringsjön m. fl. st. enl. F. Aresch. Smål. Husqvarna: J. E. Zett. Hall. i Hasslöf. — N. enl. Bytt.) 10—15 tum hög; *fod. grönaktigt. Föres som var. än till föreg., hvilken den liknar till storlek och blomning, än till följ., som den i anseende till bladen är närmast.*
- 3 *C. alpina* L. stjelken *glatt*; bladen *som föreg.*, med *tydligt hinnkantade* skaft; blomskäften *glatta*. 2½, 6, 7. Fig. Sv.B.576. Fl.D.1321. H.N.f.16, n:o 48.
- Skog. på fukt. st. (Sk.—Lpl. Boh. Hall. Öl. — N. till Ost-Finnm.) *Dubbelt mindre än de föreg. med både fod. och krona hvita, säll. rödaktiga.*

- 57 Fam. HALORAGELÆ Br. Fodret omgifvande och samväxt med fruktämnet, som är 1- ell. flerrummigt. Kronbl. flyktiga ell. inga. Frukt uppbristande i 1 eller flere nötlika rum med ett hängande frö i hvarje.

### 304. MYRIOPHYLLUM Lin. Vattenslinga.

- 1 *M. verticillatum* L. bladen kammligt parbladigt delade, de nedre med långa hårfiner, de öfre med mycket korta flikar; alla blrna kransvisa i de öfre bladvecken; blomfodret tydligt; kronbladen med utdragen klo. 2½, hv. blr. — β *pectinatum*: öfre bladen knappt längre än blrna. Fig. Fl.D.1046 [β]. H.N.f.16, n:o 51; β n:o 52.
- Vattenpöl. r. (Sk.—Gestr. Helsl. Tuna sn, vid Hallsta m. fl. st., samt vid Hudiksvall: Wistr. Ängml. Ytter-Lännäs sn, Nyland; Bjerträ sn, Strinnefjärden: Arn. Vestml. Ner. Örebro; stora Mellösa; Vinteråsa etc. VG. Boh. Hall. Öl. Götth. — N. Porsgrund; Drammen.) *Stjelken vanl. nedliggande, öfverst slutande i ett litet bladknippe; blomkrans. föga aflågnade från hvarandra. — β M. pectinatum* DC.

- 2 *M. spicatum* L. bladen parbladigt delade, *alla* [hos hufvudformen] med *långa, hår-fina* flikar; *alla* blrna *kransvisa*, bildande *glesa bladlösa* ax; ♀-foder 0; kronbladen utan klo. 24 6, 7, hv. blr. Fig. Fl.D.681. H.N.f.16, n:o 49.
- \* *squamosum* Læst. de nedre stjelklbladen flere gånger mindre än de öfre, med mycket korta och breda flikar.
- Sjöar och renare vatt. (Sk.—Lpl. Öl. Gottl. — N. sälls. Äfven i Ost-Finnm.: Norm. — \* Torn. Lpm. Karesuando.) *Blomskärmen tydliga, fjäll-lika. Hanblrnas kran-sar inlaga toppen af det afbrutna, axet; honkransarne nedtill, men ofvan de öf-versta bladen. De nedre bladen hos \* likna fullkomligt föreg. arts öfversta, blrna stödjande blad.*
- 3 *M. alterniflorum* DC. bladen som hos föreg.; honblrna *kransvisa*, till en del i de öfversta bladvecken; hanblrna *skiftevisa*, bildande ett bladlöst ax; för öfr. som föreg. 24 6, 7. Fig. Fl.D.2061. H.N.f.4, n:o 82.
- Sjöar. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.: Norm.) *Till alla delar mycket finare än föreg. Axet kortare, bladlöst, utom de nedersta ♀-kransarne, som vanl. under-stödjas af de öfre stjelklbl.*

## 305. HIPPOCRIS Lin. Ledgräs.

- 1 *H. vulgaris* L. stjelken ledad, med kransvisa, jemnbreda—lancettlika, trubbad bl. 24 6—8. Fig. Sv.B.335. Fl.D.87. H.N.f.14, n:o 50.
- Sjöstränd. a (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Vanl. fotshög, upprätt, med omkr. 8 blad i krans. Var. i rinnande vatten med lång kulliggande stjelk, talrika [omkr. 12] och långt utdragna blad i hvarje krans: var. fluvialis; samt vid hafsstr. med så [4—8], breda, stund. n. ovala bl. i kransen: var. maritima. Bägge for-merna öfvergå utan gräns i den vanliga.*

## 8 KLASSEN

# ROSIFLORÆ.

**38 Fam. POMACEÆ L.** Blomkrona roslik. Stånd. många. Fruktämnen 1—flere, inväxta i, och med fodrets bas slutl. bildande en äplefrukt. Fröhvite 0.

306. PYRUS Lin. Apel (1), Pärnträd (2).

1 *P. Malus L.* bladen äggrunda kortspetsiga sågade; blrna i ockelad flock, med vid basen *hopväxta* stift; frukten med *intryckt* bas.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. ell. rödf. blr. —  $\beta$  *tomentosa*: undre sidan af bladen och de yngre fruktämnen ludna. Fig. Sv.B.229. Fl.D.1101. Löfbackar och ängar. (Sk.—Gestr. Vestml. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Götll. — N. till Toten och Romsdalen. —  $\beta$  sällsynt: Sk. Blinkarp vid Kyrkoåkern. Blek. Kronovarfvet i Carlskrona. Smål. Södml. Nyköping: C. Ind. Ner. VG. Göteborg. Boh. Hall. Varberg: Scheutz; Släp sn: Lem.) *Qvistarne hos  $\alpha$  ofta tornspetsiga; bladen på båda sidor glatta.*

2 *P. communis L.* bladen äggrunda *smalspetsiga* finsågade ell. helbräddade; blrna i qvast, med till basen *fria* stift; frukten *afsmalnande* mot skaftet.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *Pyrastr*: bl. rundade spetsiga; fruktämnen glatta. Fig. Fl.D.2118.

Hagar etc. r. (Sk.—Uppl. Vestml. Boh. Öl. Götll.) *I vildt tillstånd äro grenarne tornspetsiga. Bladen hos den vanliga formen stull. glatta, endast i kanten finludna; fruktämnen yngre småulliga. Fruktarna stund. (vanl. hos  $\beta$ ) rundade, men ej intryckta vid stjelnästet som hos föreg. —  $\alpha$  P. comm.  $\alpha$  Achras DC. Prodr.*

307. SORBUS Lin. Oxel, Rönn (4).

1 *S. Aria Crantz*: bladen omv. äggrunda—smalt aflånga, *hela, dubbelsågade*, under täckta af *snöhvitt* ludd; blrna i tät qvast.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. Fig. Fl.D.302. H.N.f.6, n:o 38.

Bergsback. byar, r. (Sk. Kullaberg. Boh. i skären, t. ex. Lindö; Koster, vid Kile; Thorsby sn. Dalsl. Ed sn, på Falkberget vid st. Leesjön; Hedeberget i Dalskog. Södml. Landsort: C. Ind. Götll. Visby, Snäckgårdet; bergen vid Ihrevik; Lilla Carlsons. Sandön etc. — N. Christiania upp till Tellemarken. Arendal; Christiansand och Lindesnäs upp till Tutterön vid Trondhj.) *Frukten röd, bärlik: Ozelbär. Bladen vanl. omv. dggr., men var. i N. i Bergens skärg. smalt aflånga: var. salicifolia. — Crataegus Aria  $\beta$  L.Fl.Su. Pyrus W.*

2 *S. scandica Fr.* bladen äggrunda aflånga, *inskeret stikiga och sågade*, under *gråaktigt* hvitludna; blrna som föreg.  $\frac{1}{2}$  6, hv. blr. Fig. Sv.B.45. H.N.f.6, n:o 39. Bergsback. byar. (Sk.—Medelp. och Dal. Boh. Grebhestad; Henån på Oroust. Öl. Götll. — N. Porsgrund mellan Kalletangen och Öjenkast; nära Molde: Dr P. Olsson.) *Bladens och blomskafstens ludd mindre hvitt än hos föreg.; de förra dubbelt djupare sågflikade; frukt som föreg.: Ozelbär. — Crat. Aria  $\alpha$  L.Fl.Su. Pyrus Aria Sv.B.*

3 *S. hybrida L.* bl. äggrunda—*aflånga, vid basen parbladigt delade, uppåt endast stikiga och sågade*, under *blekt* hvitludna; blrna som föreg.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. Fig. Fl.D. 301. H.N.f.6, n:o 40.

Äng. byar, r. (Rosl. Väst. Stockh. skärg. på Mörtön och Welinge; Lidingön, nära Mölna udde; Kungshamn på Sicklaön; parken vid Svindensvik. Smål. Lunnaby i Öjaby sn enl. Scheutz. Boh. norr om Märstrand. Gottl. Eista; Bunge; Carlsöarne; Fårö; Sandön etc. — N. Christiania upp till Ringerige; Arendal; Christiansand; Stavanger, på öarne, ymnig. Bergens st. Sælløe och Svanøe. Trondhj. på Bladehammeren.) Träd mell. Oxel och Rönn. — *S. ambigua* L. herb. *S. fennica* Kalm och Fr.

- 4 *S. Aucuparia* L. bladen parbladiga, med sågade, under glatta ell. fluludna småblad; blrna i mindre tät qvast; frukten något aflångt rundad.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.145. Fl.D.1034.

Bergiga skog., byar, a. (Sk.—Lpl. Boh. — N. —  $\beta$  N.) Var. någon gång med flikiga småbl.: v. *laciniata*.

### 308. CRATÆGUS Lin. Hagtorn.

- 1 *C. Oxyacantha* L. bladen omv. äggrunda, meränd. grundt 3—5flikiga glatta; blrna i flocklik qvast; foderflikarne bredt äggrunda, kortspetsiga; stiften vanl. 2—3 [säll. 1].  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *laciniata*: bladen djupare klufna i aflånga, mer utstående flikar; stiftet meränd. 1. Fig. Sv.B.157. Fl.D.634.  $\beta$  H.N.f.9, n:o 45.

Back. (Sk.—Uppl. och Vestml. Mälartrakten. Boh. Öl. Gottl. — N. till Romsdalen. Trondhj. Tutteröen.) Torntagig buske, med röda bärlika mjöliga frukter och meränd. 2 stift; bladen hos  $\alpha$  dels omärkligt och trubbigt flikade (*C. oxyacanthoides* Thuill.), dels till  $\frac{1}{2}$ -del nära medelnerven, med spetsigare flikar: *C. Ox.  $\alpha$  obtusata* och  $\beta$  *vulgaris* DC. Prodr.  $\beta$  till bladen mera lik följ., men skiljd med de korta alltid hos frukten tillbakaböjda foderflikarne: *C. monogyna* Fingerh.

- 2 *C. monogyna* Jacq. bl. meränd. djupt 3—5klufna glatta, med utstående, äggrunda spetsiga och sågade flikar; blrna som hos föreg.; foderflik. från bred bas lancettlika ell. n. jemnbreda; stiftet ensamt.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. Fig. Fl.D.1162.

Back. r. (Sk.—Gestr. vid Brynäs; Fleräng. Vestml. Ner. Götlanda sn. Verml. Härön i Venern. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. upp till Romsdalen.) Har oftare trädslam än föreg., ofta småludna fruktlämnar och blomskäft; frukterna som föreg., något mer aflånga, med längre, mindre bestämdt nedböjda, ofta upprätta foderflikar. Både denna och föreg:s  $\beta$  variera med blad, som äro delade nära, eller ända till medelnerven: var. *pinnatifida*. — *C. kyrtostyla* Fingerh.

### 309. COTONEASTER Med. Oxbärsbuske.

- 1 *C. vulgaris* Lindl. bladen äggrunda—oval, säll. lancettlika, helbräddade, under fint och tät grå- ell. hvitludna; blomskäften i bladvecken, vanl. 1—3blommiga.  $\frac{1}{2}$  6, hv. ell. röd. blr. —  $\beta$  *lutea*: bladen n. lancettlika; frukt. gula. Fig. Sv.B.295. Fl.D. 112. H.N.f.15, n:o 48 [var.].

\* *nigra* Wahlb. blrna flere tillsammans; frukterna längre skaftade, svarta. Fig. Fl.D. suppl.73. H.N.f.6, n:o 37.

Back. (Sk.—Gefle. Herjed. Jemt. på Åreskutan; Hackås sn. Vestml. Mälartrakt. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. upp till Snaasen. —  $\beta$  Hall. Varberg, på strandklippor vid Fiskläget. — \* Sk. Stenshufvud. Blek. Ronneby; Vämö, Flåskholmen. ÖG. Klingsberg enl. Kindb. Stockholm. Dalsl. i Änimskog, Ed och Skällered snr. VG. Kinnekulle; Göteborg. Boh. Domsö m. ö. öar; Uddevalla. Hall. Varberg på Näset. Gottl. flerst. — N. Christiania.) 2—4 fot hög buske, vanl. med röda bärlika frukter. — *Mespilus Coton* L. \* *C. melanocarpa* Blytt.



59 Fam. **SENTIOOSÆ** L. Krona roslik. Fruktämnen flere, fria ell. insänkta i fodrets bas, slutl. en- ell. fåfröiga, åtskilda karpeller. Fröhvite 0.

1 Flocken **Rosæ**. Karpeller tatrika, inneslutna i fodrets slutl. köttiga och bärlika pip [nypon].

310. **ROSA** Lin. Törne, Nyponbuske.

† Taggarne kloiskt krökta; bladen alltid 2—3pariga.

\* Småbladen dubbelsågade.

1 *R. rubiginosa* L. taggarne grofva, mycket krökta, blandade med smala raka; småbl. ägrunda, under och i kanten glandelbärande; nyponen äggformiga—oval, på meränd. glandelhåriga skaft.  $\frac{1}{2}$  7, r. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.463. Fl.D.870. H.N.f.3, n:o 41.

Backar. (Sk.—Uppl. och Vestml. i Munktorp sn. Dalsl. Dalbobergen vid Venersborg. Boh. Öl. Gottl. — N. Drammen, Laurvig etc.) Har starka taggar, meränd. glandelborstiga nyponskaft, vållukande blad. — *R. Eglanteria* L.Fl.Su.2. [men icke Herb.] Sv.B. *Rosa suavisolia* Lightf.

2 *R. inodora* Fr. alla taggarne likformiga, kloika; nyponskaften glatta; för öfr. som föreg.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. H.N.f.10, n:o 51.

Backar, r. (Hall. teml. allm. i Tölö sn, vid Blomberget i Släp, samt i Fjärås enl. Leml. Boh. vid Grinsbyvattnet på Oroust; samt mellan Henå och Rödderget; Kalfö; Askerörarne. VG. Kinnekulle, Vesterplans Storäng. Gottl. i Mästerby sn enl. G. v. Cederv.) Lik *R. canina* med karaktärer af föreg., men har blrna mer ensamma, säll. 2—3 tillsamm. näst. alltid med hvita kronbl.; bladen utan märklig lukt, med smälare, mer sylspetsade sågtänder.

3 *R. Acharii* Billb. tagg. något kloiskt krökta; småbladen glest småhåriga; nyponen elliptiska, glatta, med glandelhåriga skaft och foderflikar.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. blr. Fig. Sv.B. 577. H.N.f.6, n:o 42.

Back. lund. r. (Sk. Smål. i Kalm. län. ÖG. Södm. Nyköping flerst.: Ind.; Örnön och Dalarön. Stockh. Hagapark; Beckbruket m. fl. st. Vestml. VG. Trollhättan. Dalsl. Boh. Hall. Varberg; Släp sn, nära Prestbron; Leml. Öl. Borgholm. Gottl. Vänge och Follingbo snr. — N. vid Molde, samt Bævik vid Isfjorden.) Har rakare och smälare taggar än de 2 föreg., tunna småblad, med sågtänder, som i kanten hafva några smärre glandelbärande tänder; förenas af några förf. med följ. art. — *R. collina* Fr. Mant. 3.

\*\* Småbladen enkelsågade.

4 *R. canina* L. taggarne likformiga kloika; småbladen ovala—lancettlika, släta och glatta; nyponen äggformiga—afånga, jemte skaften glatta.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. ell. hv. blr. —  $\alpha$  nitida: bladen glänsande; nyp. afånga. —  $\beta$  opaca: bladen blåaktiga, utan glans; nyp. elliptiska. —  $\gamma$  senticosa: tagg. föga krökta; nyp. rundade. Fig. Sv.B.541. Fl. D.1695. H.N.f.6, n:o 41.  $\beta$  Sv.B.29. Fl.D.555. H.N.f.8, n:o 45.  $\gamma$  Sv.B.475.

Back. etc. a. (Sk.—Ångml. Dal. Öl. Gottl. — N. till Nordl.) Var. någongång t. ex. på Lilla Carlstens klippor n. tagglös. —  $\alpha$  *R. sarmentacea* Sw. *R. Swartzii* Sv.B.  $\beta$  *R. venosa* Sw.  $\gamma$  *R. senticosa* Achar.

5 *R. dumetorum* Thuill. tagg. som hos föreg.; småbladen bredt ovala, ojemna och småludna; nyponen elliptiska, jemte skaften glatta.  $\frac{1}{2}$  6, 7, ljusr. ell. hv. blr. Fig. Fl.D. 2718. H.N.f.7, n:o 43.

Back. etc. (Sk.—Helsl. Ångml. Säbrå sn, Bondsjö och Själand: Arn. Dal. Ner. Dalsl. — N.) Bladens sågtänder äro tydligare framåtrigade än hos följ., der de oftast hafva spetsen utbildad. Utgör en medelform mell. föreg. och följ. — *R. collina* Wg.

6 *R. coriifolia* Fr. tagg. som hos föreg.; småbladen tjocka och ojemna, småludna; nyponen rundade, jemte de mycket korta skaften glatta.  $\frac{1}{2}$  6, r. ell. hv. blr. H.N. f.6, n:o 43.

Back. och lund. (Sk.—Uppl. vid Carlholms bruk. Gefle på Limörarne. Vestml. Boh. Öl. — N. södra del.) Svår att skilja från föreg.; i fruktillståndet utmärktare af de stora rundade, stundom päronlika och tidigare nyponen, hvilkas foder-

*likar qvarsitta, ej som hos föreg. snart affalla. — R. crassifolia Wallm. R. collina* γ *Wg.*

†† Tagg. raka, ehuru stund. något nedböjda ell. omärkligt krökta; bladen 2—3pariga.

\* Småbladen dubbelsågade: *R. villosa L.*

- 7 *R. pomifera* Fr. småbladen *aflånga* småludna; nyponen *runda*, mogna *lutande*, jemte skaften *stift glandelhåriga*.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.313. H.N.f.9, n:o 47.

Jordvall. back. r. (Sk.—Södm. Stockh. Vestml. Frösåker. Ner. Örebro; Almby sn; Riseberga etc. VG. Göteborgstrakten. Dalsl. Låttby i Gunnarsnäs sn. Boh. Koön; Christinedal vid Gustafsberg. Götll. — N. Romsdalen.) Nyponen i *södra länderna stora som plommon, uppåt mellersta Sv. som krusbär och mindre lutande; stult. knappt skiljbara från större former af följ., med hvilken denna art synes sammanflyta. — R. villosa ed.9.*

- 8 *R. mollissima* Fr. småbl. *oval*—n. *runda*; nyponen *klotrunda upprätta*, jemte skaften *glandelhåriga* med qvarsitt., *samstående* foderlikar.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. ell. hv. blr. —  $\beta$  *glabrata*: bladen *glatta*, glest glandelprickade. Fig. E.B.2459. H.N.f.7, n:o 44.

Ångsback. etc. (Sk.—Helsl. Jeml. Ner. Verm. Dalsl. Öl. Götll. enl. G. v. Ced. — N. till Senjen: Norm.) *Låg buske med gråludna, ofta trubbiga ojemna blad, klotrunda ell. något nedplattade nypon, som mogna i medl. af Sept. och hafva föga fiskiga foderblad. — R. villosa L. herb.*

- 9 *R. tomentosa* Sm. småbl. *oval* ell. *ägggrundt lancettlika*; nyponen *elliptiskt rundade* ell. *oval*, *upprätta*, stult. *glatta* med glandelhåriga skaft och vanl. *affallande, utböjda* foderlikar.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. ell. hv. blr. —  $\beta$  *scabriuscula*: bl. tunna gråaktiga, föga ludna, något stråfva. Fig. Sv.B.571. Fl.D.2719.  $\beta$  E.B.1896. H.N.f.9, n:o 46.

Ångsback. (Sk. öst. del. Blek. Smål. Vestervik. — Geste på Holmudden vid fjärden. Helsl. Söderhamn. Vestml. Ner. Boh. Öl. Götll. enl. G. v. Ced. — N. Molde och Båevik vid Isfjorden.) *Högre buske, med något aflånga, hårdare och mer senmogna nypon än föreg.; foderflik. mer pardelade och utslående; än qvarsittande till mogningen, än icke. Denna och föreg. art ofta knappt skiljbara, om icke af den mogna frukten. — R. tomentosa γ subrubiginosa [med glandelbärande vålluktande blad] Handb. ed.3.*

\*\* Småbladen enkelsågade.

- 10 *R. cinnamomea L.* småbladen *aflånga*—omv. *ägggrund*a, vanl. *trubbiga*, under gråhvita och meränd. småludna; nyponen *klotrunda, jemte skaften glatta*.  $\frac{1}{2}$  6, r. blr. —  $\beta$  *turbineola*: nyp. i flock, päronlika. —  $\gamma$  *stuvialis*: n. tagglös, bladen under glatta, blott skaften och nerverna småludna. Fig. Sv.B.553. Fl.D.1214. H.N.f.7, n:o 45, 46. γ Fl.D.868.

Ång. och skogsback. (VB.—Sk. nor. del. Boh. Thorskog i Vesterhunda enl. Lem. Öl. Götll. — N. — γ Smål. vid Elmhult i Långemåla enl. Ekstr. — N. vid Glommen och Randsfjorden.) *Bladen stundom spetsiga, särdeles de öfre; vid stiplernas vidfästning finnas n. alltid 2:ne taggar. Nyponen små och mjuka, lifligt röda. — R. majalis Retz. R. cinerea Sw. R. stuvialis Fl.D. R. spinosissima Wg. och L.Fl.Su.*

- 11 *R. carelica* Fr. stammen *tall* beklädd med *taggar och borster*; småbl. *aflånga*—*ägg*-*runda*, glest småhåriga, under gråaktiga; nypon. *aflånga* sneda, uppått jemte skaften *glest glandelhåriga*.  $\frac{1}{2}$  6, r. blr. Fig. Fl.D.suppl.75 H.N.f.13, n:o 59.

Skogsback. r. (VB. Skellefteå, vid Furunäs.) *Foderlikarne äro både på Sv. och i H.N. lemnade Ryska ex. hela, men icke helbräddade, samt mot basen håriga af glandler, som äfven sträcka sig ned på nyponets sneda spets.*

††† Tagg. raka; bladen 3—5pariga.

- 12 *R. pimpinellifolia L.* stammen vanl. *mycket taggig*; bladen 4—5pariga med *rundade* eller *oval*, på båda sidor *glatta, enkelsågade* småbl.; nyponen *klotrunda*, jemte skaften *glatta*.  $\frac{1}{2}$  6, hv. blr. Fig. Sv.B.559. Fl.D.398. H.N.f.10, n:o 52.

Beckar, stränder, r. (Boh. Marstrand, på Koön. Sk. Kullaberg enl. F. Aresch. — N. Leervig på Storöen i Bergens st.) *Lätt skiljbar genom sina lakrika små glän-*

sande småblad. Finnes någon gång flyktig ur trädgårdarne. — *R. spinosissima* Sm. m. fl. *R. pimpinellif.* β *intermed.* Godr. & Gren.

- \*13 *R. alpina* L. stammen med inga ell. borstlika taggar; grenarne tagglösa; bladen 3—5pariga, med ovala, glatta, dubbelsågade småbl.; nyp. aflånga, mogna hängande, glatta, på glandelhåriga skaft. ½ 6, 7, r. blr. Fig. Jacq.A.279. H.N.f.9, n:o 48 [odl.]. Fjelltr. r. (N. Eidswold på Mistberget. Christiania, på Malmoe.) *Foderflik. meränd. hela.* — *R. inermis* Mill.

- 2 Flocken **Sanguisorbese.** Karp. få [1—4], inneslutna inom det slutl. hårdnande blomfodret.

### 311. AGRIMONIA Lin. Småborre.

- 1 *A. Eupatoria* L. bladen olikparigt delade, med äggrundt aflånga småblad; fruktodret omv. äggformigt, *fåradt anda till basen* med *utstående* kantborster. 2½ 7, g. blr. Fig. Sv.B.99. Fl.D.588.

Skugg. st. (Sk.—Gestr. Helsl. Söderhamn. Vestml. Ner. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Vanl. 3—4 quart. hög. Klasen lång och smal, axlik.*

- 2 *A. odorata* Mill. blad. som hos föreg., under glandelprickiga; fruktodret halvklotrundt klocklikt, *slätt* ell. *blott till midjen* grundt *fåradt*, med *nedböjda* kantborster. 2½ 7, g. blr. Fig. Fl.D.2471. H.N.f.14, n:o 31.

Skugg. st. r. (Sk. Fogelsång, Gladsax och Jerresta hallar enl. F. Aresch.; Helsingborg. Blek. Carlskrona skärg., på Håstö, Flåskholmen och Aspö m. fl. st. enl. Gosselm. ÖG. i skären. Stockh. på Håstholmen. Rosl. Blidö sn allm. Dalsl. Heden i Dalskog sn. Boh. på Koön, Brännö, Hinsholmen etc. vid Göteborg; Uddevalla, söd. om Gustafsberg; vid Stora Bratteröd; Qville sn, på Hjertö och Väderöarne m. fl. st. samt Hall. Vallda vid Ulfås; Klefbergen i Släp, och Blixered i Tölö sn: Lemm. — N. Bekkelaget och Malmoe vid Christiania.) *Liknar mycket föreg., men skiljes med fruktodren, hvilka derjemte vanl. innesluta 2 karpeller (hos föreg. oftast blott 1), samt med kortare klarar på högre stjelk. Har terpentinaktig lukt.* — *A. procera* Wallr.

### 312. SANGUISORBA Lin. Blodtopp.

- 1 *S. officinalis* L. glatt; bladen parbladiga; axen rundade ell. kort elliptiska; stånd. icke längre än blomkronan. 2½ 7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.305. Fl.D.97. H.N.f.6, n:o 51.

Fukt. ång. r. (Gottl. — N. Skien vid Gjerpen; Lister; Jeddere; Stavanger till Storöen i Bergens st.) *Omkring alnshög, med blodröda ax.*

### 313. POTERIUM Lin. Får-pimpinell.

- 1 *P. Sanguisorba* L. stjelken kantig, upprät; axen rundade ell. aflånga; fruktsodren hårda nätrynkiga, med 4, otydligt vingade, trubbiga kanter. 2½ 6, 7. Fig. Fl.D.1939. H.N.f.7, n:o 52; f.11, n:o 48.

Backar, r. (Sk. mell. Stenshufvud och Rörium, samt vid Helsingborg enl. F. Aresch.; Limhamn. Smål. Eds sn ¼ mil öst. om Djursnäs; flerst. i Gamleby och Lofta snr. Stockh. i Drottningholms park. Uppl. mell. Sånge och Skå kyrkor, samt vid Svartsjö ladug. Gottl. Visby, Snäckgårdet.) *Icke olik Sanguisorba off. med parbladiga blad och rundadt, men grönt ell. något brunaktigt ax; stjelken vanl. glatt, stund. nedtill hårig: var. hirta.* — *P. dictyocarpum* Spach.

### 314. ALCHEMILLA Lin. Dagdkåpa.

- 1 *A. vulgaris* L. bladen njurlika 7—9flikiga, veckiga, med rundade, *öfverallt sågade* flikar, på *begge sidor gröna*; blirna i *stjelkens spets*. 2½ 5, 6, gr. blr. — β *montana*: bladen något silkesludna, mest i kanterna. — γ *hybrida*: rotbladen handdelade. Fig. Sv.B.261. Fl.D.693.

Ång. a. (Sk.—Lpl. — N. — γ N. Dovre.) *Var. glatt och hårig; i fjelltrakter ofta storbladig och glänsande glatt: β grandis Bl. Enum. γ har rotbl. n. så djupt delade som följ., hvaraf den möjligen är hybrid, såsom växande bland båda.*

- 2 *A. alpina* L. bladen *fingerlikt delade* i 5—9, *aflånga, endast i spetsen hvass-sågade, under silkesludna småbl.*; blirna *som hos föreg.* 2½ 6, 7, gr. blr. Fig. Sv.B.758. Fl. D.49. H.N.f.14, n:o 53.

Fjellstr. a., i söd. prov. r. (*Lpl.*—*Dal.* *Ängml.* Hernön. *Boh.* *VG.* Göteborg. *Hall.* Vallda: *Leffl.* *Sk.* nära Bälinge. — *N.*) *Omkring quartershög.*

3 *A. Aphanes Leers*: bladen skaftade 3delade, med 2—4klufna fikar; blirna i bladvecken. ☉ 7—10, gr. blr. Fig. *Fl.D.* 973.

Fält och åkr. (*Sk.*—*ÖG.* och *VG.* Billingen och Kinnekulle. *Hall.* Hasslöl och Skottorp: *Theor.* *Öl.* *Gottl.* — *N.* Holtaalen; osäker såsom sedan Gunners tid icke funnen.) 1—4 tum hög, enkel ell. ända från stjeltens bas grenig. — *A. arvensis Scop.* *Aphanes arv.* *L.*

3 Flocken *Dryadesæ*: Karp. talrika enfröiga, fria [på från fodret skildt fäste].

315. *RUBUS Lin.* \*) *Hallon* (1), *Björnbär* (2—14), *Hjortron* (18).

† Buske, med frukt. vid mognaden lossnande från det gemensamma fruktfästet: *Hallonbuske.*

1 *R. idæus L.* stammen trind borsttaggig; de nedre bladen meränd. 2parigt parbladiga, de öfre (stundom alla) 3fingrade ell. enkla; småbladen under meränd. hvita; foderbl. utv. gröna, i kanten hvitulliga; kronbladen aflånga upprätta. † 6, 7, hv. blr. Fig. *Sv.* *B.* 181. *Fl.D.* 788.

*Back. stenrösen, a.* (*Sk.*—*Lpl.* *Öl.* — *N.* till Alten: *Norm.*) *Var. med alla bladen 3fingrade, samt med aflånga och rundade, stund. fiktigt inskurna småbl.: var. laciniatus, någon gång sammanflytande till ett enda: var. anomalus. Det snöhvita luddet under försvinner stundom. Bären röda, sällan hvita.*

†† Buskar, med frukt. starkt fastsittande vid och affallande tillsammans med fruktfästet.

\* Stammen upprät [endast med toppen lutande].

a — Foderbladen utvändigt gröna, endast i kanten hvitulliga.

2 *R. suberectus Anders.* stammen n. trind, upptill trubbkantig, glatt, med raka ell. något nedböjda taggar; stambladen meränd. 5fingrade; småbladen aggrunda, under blekare och småludna, uddbladet något hjertlikt; blommor i klase, ell. gles qvast; kronbladen omv. aggrunda. † 7, hv. blr. Fig. *Fl.D.* 1992. *H.N.f.6.* n:o 44.

*Bergsrött. stenrös.* (*Sk.* *Broby*; *Ousby*; *Kullaberg m. fl. st.* — *Södm.* *Ner. Vestml.* *Barkarö. Verml.* *Öl.* — *N.* *Christiania* och *Dröbak. Molde.*) *Blomfodret nedböjdt; frukten svartröd. Var. med 3- och 7fingrade blad. — Rub. fruticosus var. elegans Myr.*

3 *R. fruticosus L.* stamm. 5kantig strimmig, kroktaggig; stamblad. 5fingr.; småbl. något hjertlikt aggrunda, under gröna småludna; blommor i qvast; kronbl. omv. aggrunda. † 7, ljusröda blr. Fig. *Fl.D.* 2589. *H.N.f.5.* n:o 51.

*Bergsrött. etc. i graunskapet af hafvet.* (*Sk.*—*Södm.* *Dalsl.* *Boh.* *Hall.* *Hallandsås: Theor.* *Öl.* I *Smål.* funnen ända till 8 mil från hafvet vid *Ilfa* i *Ljunga sn.* — *N.* *Christiania st.*) *Stammen glatt eller beströdd med mörka glandler; fodret nedböjdt; fr. svart, glänsande. — R. plicatus Weih.*

4 *R. affinis Weih.* stammen kantig och fårad, med raka, i klasen något krökta taggar; stambl. 5fingrade; småbl. ovala, uddbladet hjertlikt, alla under gröna småludna, afsmaln. mot basen; blr i enkel, utdragen klase; kronbl. ovala † 7, hv. blr. Fig. *H.N.f.6.* n:o 45.

*Lund. stenbundna st.* (*Sk.* *Krappertup enl. F. Aresch.*—*Stockh.* *Hall.* vid *Algussered.*) *Stammen glatt; foder tilltryckt; fr. som hos föreg.*

\*) Arterna 2—13 sammanfattas af *Linné m. fl.* i dess *R. fruticosus*. Årstammen bär vanl. endast blad, meränd. 5fingrade, hos få arter (8, 10, 14) sällan mer än 3fingrade; då den året efter bär blr och frukt, blifva bladen, åtminstone de öfre, ofta endast af sednare alaget, t. o. m. enkla. Uddbladet vanl. mer och mindre hjertlikt. Med stam menas ofvan årsstammen; taggarne äro antingen klolikt krökta, ell. raka, ehuru stundom nedböjda, d. v. s. rigtade nedåt.

## b — Foderblad öfverallt hvitludna.

- 5 *R. thyrsoides* Wimm. stamm. rundadt kantig, fårad, upptill *kroktaggig*; bladen 5fingr., småbl. åggrunda—afånga, under meränd. *hvit- eller gråludna*; bir i utdraggen klase ell. spira; kronbl. *utdraget* omv. åggrunda.  $\frac{1}{2}$  7, blekr. blr. Fig. Fl.D.2539. H.N.f.3, n:o 42.

Bergsrödt. etc. (Sk.—ÖG. Stockholmstrakten, vid Mörtviken och Ahlby; Skurusund. Boh. på Marstrandön; Kongelf. Hall. vid Malvik. Ö. — N. Dröbak på Haasö.) *Stammen glatt ell. småhårig; de nedre taggarne smärre och rakare; småbladen smalare än hos de flesta öfriga. stundom på undre sidan mer gröna; fr. som hos föreg.*

\*\* Stammen nedböjd ell. nedliggande.

a — Stammen kantig, med platta sidor, hårig ell. luden.

- 6 *R. discolor* Weih. stamm. strimmig småluden, med *raka ell. något nedböjda taggar*; bladen 5fingr.; småblad. åggrunda eller ovala, under meränd. *hvit- ell. gråludna*; klase mycket grenig *kroktaggig*; kronbl. omv. åggrunda.  $\frac{1}{2}$  7, hv. ell. ljusr. blr. Fig. Fl.D.2414. H.N.f.8, n:o 48.

\* *umbrosus* Weih. bladen under gröna, ehuru något ljusare än ofvanpå. Fig. H.N. f.10, n:o 53; f.13, n:o 60.

Bland buskar etc. r. (Sk. mell. södra Åsen och Ljungby hed; Helsingb.; Kullaberg. Blek. Carlshamn; Listerhufvud etc. enl. Gosselm. Södm. Vester-Hanninge sn, Häringe. Hall. Särö. Boh. — N. Christiansands st.) *Lik föreg., men med mer sammansatt och utbredd blomställn.; fodr. nedböjdt; fr. svartviolett. — R. vulgaris \* discolor* Arrh. Monogr.

- 7 *R. Radula* Weih. stamm. hårig, med *gröfre, raka ell. nedböjda taggar*, glest *blandade med glandler* och små *raka* borst; bladen *som föreg.*; klase grenig, med glandler och *raka* borstlika taggar; kronbladen *bredt* omv. åggrunda.  $\frac{1}{2}$  7, hv. ell. blekröda blr. Fig. Fl.D.2413. H.N.f.8, n:o 47.

Bergsrödt. etc. vid hafvet, r. (Sk. Helsingborg; Kullaberg; Romeleklint och Stens Hufvud enl. F. Aresch. Boh. Långedalen; Koön vid Marstrand. Blek. Carlskronatrakten; Carlshamn; Ronneby. — N. södra del.: Ax. Bl.) *Stamm. sträf som ett risfjörn [radula] af de fina, lätt lossnande nåltaggarne; bladen tunnare än hos föreg., som denna art för öfrigt mycket liknar. — R. vulg. \* Radula* Arrh. Monogr.

- 8 *R. horridus* Hn. stamm. upptill luden och glest glandelhårig, med *grofva krökta och finare raka taggar*; bladen 3fingr.; småbl. bredt åggrunda, under gröna håriga; klase qvastlik glandelhårig med *kroktaggiga* blomskåft och foder; kronbl. *afånga*.  $\frac{1}{2}$  6, 7, hv. ell. rödl. blr. Fig. Fl.D.suppl.77. H.N.f.6, n:o 46.

Stenbundna st. nära hafvet, r. (ÖG. Rönö vid Ettersundet; Jonsberg, jemte många andra st. i skärg. enl. Kindb. Smål. Stensrum i Ukna sn: Dr A. Lund; Blidstena i Eds sn enl. Ekstr.) *Utmärkt af sin taggighet, låta ludd, blandadt med gröfre glandelhår, rundade småblad och flere små blomsaml. i de öfre enkla bladens veck. Bl.fodret nedböjdt; fr. liten, n. svart. — R. infestus* ed.3.

- 9 *R. tæniarum* Lindeb. stamm. *som föreg.*, strimmig; bladen 5fingr.; småbl. n. omv. åggrunda, med kort spets, under *blekare*; klase glandelhårig, *kroktaggig*; kronbl. åggr., i spetsen urnupna.  $\frac{1}{2}$  7, hv. ell. r. blr. Fig. Lindeb.Nov.Fl.Scand.t.1. H.N. f.15, n:o 50.

Bergsrödt. nära hafvet, r. (Boh. Öarne Oroust och Kalfö, på många st. t. ex. vid Svanvik, Varekil, Henå.) *Ej olik föreg., men skiljes med de anförda kännetecknen. Bl.fodret vid blomn. utstående, sedan tilltryckt; fr. n. svart.*

b — Stammen trind ell. rundadt kantig.

a — Alla småbladen tydligt skaftade; stammen glandelhårig.

- 10 *R. glandulosus* Bell. stamm. *alldeles trind*, med gröfre och finare, *raka*, men något nedböjda taggar; bladen 3fingr.; småbl. åggrunda eller ovala, under, med undantag af nerverna, n. glatta; klase af 1—4blommiga, utsperrade borstaggiga blomskåft; kronbladen *spadlikt afånga*.  $\frac{1}{2}$  7, hv. blr. Fig. Fl.D.1696. H.N.f.5, n:o 52.

Stenbundna st. nära hafvet, r. (Smål. Misterhult på Snuggö; Brändö; Öro; Vesterums sn på Nötgårdso etc.; Kålmårdsö och Loftahammar; Vestervik flerst. t. ex. vid

Hornsbygga: A. Lund. ÖG. Dala i Grebo sn enl. Scheutz; Missjö i S. Annæ enl. Kindb. VG. Kinnekulle.) *Taggarne nålfina; stambladens småblad stora (tjocka\*)*, med rundad bas, fäst och n. likformigt hvass-sågade; fr. svart.

β — De 2 nedersta småbladen oskaftade; stammen glatt.

- 11 *R. Wahlbergii* Arrh. stamm. rundadt kantig, med korta raka, i qvasten något krökta taggar; bladen 5fingr.; småbladen tjocka, rhombiskt äggrunda, under blekt småludna och något bleka; blrna i sammansatt, kroktaggig och småluden qvast; kronbl. rundadt äggrunda. ½ 7, r. blr. Fig. H.N.f.9, n:o 49.
- Stenbundna st. nära hafvet. (Sk. Kullaberg etc. — Södm. Utön; Vermdön; Tollarö. Stockh. Djurgården. Dalsl. Låtsbyn i Gunnarsnäs enl. Leffl. Boh. Toltp; Grötö etc. Hall. Öl. — N. Arendal; Tönsberg.) *Stammens taggar raka och nog starka; blgrenarnes längre och något krökta; småbl. stora, rundade med kort spets och största bredden n. vid midten; uddbl. vanl. hjerlik. Fr. svartblå, af stora småbär.*
- 12 *R. corylifolius* Sm. stamm. trind, upptill något kantig, med raka taggar; bladen 5-ell. 3fingr.; småbladen tunna, äggrunda, under omärkl. håriga gröna; blr som föreg. med raka, något nedböjda taggar på skaften; kronbl. bredt omv. äggrunda. ½ 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.187. Fl.D.2538. H.N.f.7, n:o 48.

\* *pruinosis* Arrh. stamm. trind, dagglå; bl. 5—7, säll 3fingr.; blrna i enklare, klaselik saml.; kronbl. äggrunda. Fig. H.N.f.7, n:o 47.

Stenbundna st. bergsrött. (Sk. Ystad; Ramlösa; Kullen; Torrekow etc. Blek. Ronneby; Lyckeby. Smål. Kalmr. Örö. ÖG. Gusum. Hall. Boh. i skären. VG. Kinnekulle; Venersborg. — N. söd. del. Ax. Bl. — \* Smål. och ÖG. i skären. Stockh. skärg. Hall. Klef. Sannö m. fl. st. Boh. Koön etc. Öl. Borgholm.) *Lik R. cæsius med tunna, ofta endast 3fingr. blad, raka, men längre och starkare taggar. Fodr. nedböjdt; fr. något blåaktigt svart, stundom finluden, af stora småbär. — \* R. pruinosis ed.9.*

- 13 *R. nemorosus* Hay. stamm. rundadt kantig, dagglå, med starka, nedtill raka, i klasen något krökta taggar; bladen 5fingr., småbl. tunna, rhombiskt äggrunda, under vanl. som hos föreg.; blr i gles och meränd. enkel klase; kronbladen n. aflånga. ½ 6, 7, hv. ell. rödl. blr. Fig. H.N.f.6, n:o 47.

Bergsrött. lund. helst i skärg. (Sk.—Södm. Utön m. fl. öar i Stockh. skären. Boh. Instön, Koön m. fl.) *Lik föreg., men med smärre, ofta n. glatta småblad och smal klase. Fr. svartblå. Var. med under hviludna bl.: var. tomentosus, samt med lått laggiga blad- och blomskaf. Denna jemte de 2 föreg. arterna sammanflyta stundom med hvarandra och anses af flere förf., trol. med rätta, blott vara former af en enda art.*

- 14 *R. cæsius* L. stamm. trind, meränd. dagglå, med raka borstlika taggar; bladen 3fingr., småbl. som föreg., klasen qvastlik, något hårig; kronbl. bredt omv. äggrunda. ½ 6, 7, hv. blr. — β *paniculatus*: småbladen nära glatta; blrna i flocklik samling. Fig. Sv.B.241. Fl.D.1213.

Stenbundna st. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Romsdal. — β Blek. Lyckeby. Boh. Vingaö och Varö i Styrö sn. Gottl. Stora Carlön enl. G. v. Ced. — N. Langöe vid Holmestrand.) *Stammen får någon gång på mycket drifvande, men skuggiga ställen 5fingr. blad; blomgrenarne stundom taggiga eller glandelhåriga; fodr. icke nedböjdt; fr. dagglå.*

+++ Örter.

\* Bladen 3fingrade.

- 15 *R. saxatilis* L. stjelen sträf fjerblommig, med krypande refvor; småbl. ojemnt och n. flikigt grofsågade; blomskafen sällan längre än blomman; kronbladen lancettlika, föga längre än fodret; frukt af få, föga sammanhängande småbär. 2½ 6, hv. blr. — β *hybridus*: kronbl. bredare, dubbelt längre än fodret, vanl. rödlätta. Fig. Sv.B.349. Fl.D.134.

\*) Tjocka och tunna blad tagas här endast relativt; de förra mer pergamentsfasta, de sednare n. som postpapper; på skuggiga ställen blifva dock bladen i allmänhet tunnare.

- Steniga skogslund. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Lpl. *Helsl.* Norrbo sn, norr om söd. Dellen: C. O. Berg. — N. Ost-Finm. Fjelmä i Tanen.) *Frukten sammansatt af stora röda småbär.*  $\beta$  R. *triflorus* Hook. enl. Fr. öfvergår i följ., som mera liknar R. *arcticus*.
- 16 R. *castoreus* Læst. stjelen säblommig, vanl. sträf och utan refvor; småbl. hvass-sågade; blomskäften utdragna; kronbl. flere g:r längre än fodret; frukt af (5—7) småbär. 2 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.766. Fl.D.suppl.76. H.N.f.3, n:o 43.
- Elf- och bäckstränder. (Torn. Lpm. mellan Karesuando och Muonioniska; Kurkiokoski; Jukkasjärvi. *Lul. Lpm.* Qvikkjokk; Jokkmokk: Ind. m. fl. st. enl. H. Widm. *Pit. Lpm.* nedanför Käksa vid Hundviken. VB. nor. del, vid Gädträsk samt i Nilsmyran nära Björkfors. *Helsl.* Norrbo, med föreg.  $\beta$ ; Arbrå sn. vid Kyrkbyn och Hosätter: Wistr.) *Oftast lik följande; stundom mer lik föreg., hvaraf den synes hybrid. Bären syrliga.*
- 17 R. *arcticus* L. stjelen 1—3blommig, utan taggar och refvor; småbl. trubbsågade; kronbladen n. omvänt äggrunda utdragna; frukterna af talrika småbär. 2 6, r. blr. Fig. Sv.B.26. Fl.D.488 och suppl.17. H.N.f.3, n:o 44; f.12, n:o 53 [var.].
- Svedjel., dikeskanter etc. (Lpl.—Gefle. Uppl. Järlåsa sn. Stockh. i ett kärr bortåt Uggelviken och på en holme utom Blockhusudden. *Dal. Vestml.* vid Brattheden nära Ramnäs kyrka; Hedbo i Möklinta sn enl. Leffl. *Verm.* i Elfdalen samt Ny sn. — N. Ost- och Vest-Finm. till Hedemarken.) *Mörkröda, syrligt aromatiska bär: Åkerbär.*

\*\* Bladen enkla.

- 18 R. *Chamaemorus* L. stjelen enblommig; bladen nästan njurlika, 5—7flikiga; blrna tvåbyggare. 2 6, hv. blr. Fig. Sv.B.469. Fl.D.1.
- Skogskärr. (Lpl.—Sk. och söd. *Hall.* enl. Theor. — N.) *Var. med 4taligt foder och krona. Har röda, skull. gula bär: Hjortron.*

### 316. FRAGARIA Lín. Smultron.

- 1 F. *vesca* L. bladen 3fingrade, säll. enkla, med utsperradt håriga skaft; blomskäftens hår tilltryckta ell. föga utstående; fruktodret tillbakaböjdt; pistillernas fäste glatt. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.16. Fl.D.2235. H.N.f.12, n:o 54 [var.].
- Back. och skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) *Bären lösa, saftiga, lätt lossnande från fästet: Smultron. Småbl. sammanflyta någongång till en enda, hjertlik bladskifva: var. monophylla.*
- 2 F. *elator* Ehrh. blomskäftens hår utsperrade; för öfr. som föreg. 2 5, 6, hv. blr. Fig. H.N.f.6, n:o 48.
- Ängsback. r. (Sk.—Gefle. *Vestml. Verm.* Venerstrakten, särd. vid Norselven. *Hall. Öl.* Troligen på de flesta ställen förvildad, såsom allmänt odlad.) *Betydl. större än föreg. En del stånd sätta aldrig frukt. — F. magna Thuill.*
- 3 F. *collina* Ehrh. blad och bladskäft som hos de föreg.; blomskäftens hår föga utstående; fodret uppböjdt; pistillernas fäste hårigt. 2 5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *calycina*: fodret långt som kronbl. Fig. Sv.B.548. Fl.D.1389. H.N.f.6, n:o 49.
- Torra ställen, back. (Sk.—Norra Uppl. och *Vestml.* Målartrakt. *Ner. Dalsl. Boh.* Sör Edsvik i Tanum; Otterön: Leffl. *Hall. Öl. Götth.* — N. Skien; Christiania; Ringerige; Toten etc. —  $\beta$  *Blek. Ronneby.*) *Bären mer hårda och fastsittande vid fästet. Var med större och mindre blr.*

### 317. COMARUM Lín. Kråklöfver.

- 1 C. *palustre* L. bladen 2—3pariga, med tunglika—afånga, hvass-sågade, under blågrå småbl. 2 6, 7, rödr. blr. Fig. Sv.B.310. Fl.D.636.
- Kärr, a. (Sk.—Lpl. — N.) *Kronbl. mycket kortare än fodret.*

### 318. POTENTILLA Lín. Fingerört.

† Bladen parbladigt delade.

- 1 P. *fruticosa* L. buske; bladen 2—3pariga, med helbräddade småblad. 2 6—8, g. blr. Fig. Sv.B.253. Fl.D.suppl.74. H.N.f.4, n:o 63.

Torra st. r. (Öl. södra delen, nedom Thorslunda. Förvildad flerest. i ÖG. enl. Kindb., samt vid Gunnebo nära Göteborg.) 2—3 fot hög.

- 2 *P. rupestris* L. *stjelken upprät*; bladen 2—3pariga, de öfre 3fingr.; småbladen äggrunda. djupt sågade, de öfre större; blrna i knippe i *stjelnens spets*. 2 7, hv. blr. Fig. Jacq. A. 114. H.N.f.11, n:o 45.

Bergshöjd, bland buskar, r. (Smål. Alsheda, Stenberga, Skirö och Skede snr; Döderhult sn: Scheutz; flerest. i Mörlunda sn enl. Ekstr. VG. på de högre bergen; mell. Degeberg och Stola; Åsaka i Vartofta härad etc. *Dalsl. Hall. Boh.* mell. Kongsbacka och Göteborg; Tjörn flerest. enl. Leffl.; Uddevalla; Smörkullen i Skredsvik, och flerest. i Foss sn: Leffl. — N. Christiania: Moe enl. Ax. Bl.)

- 3 *P. Anserina* L. *stjelken krypande*; bladen *mångpariga*, med olikstora bladpar; småbladen hvass-sågade; blomskäften i *bladvecken*, *enblommiga*. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.152. Fl.D.544.

Betesm. väg. a. (Sk.—VB. och södra Lpm. — N. till Ost-Finnm.: Norm.) *Bladen merändels hvithåriga, särdeles på undre sidan, hvilken ofta är silfverhvit.*

†† Bladen fingerlikt delade; blomfodret 10klufvet; kronbl. 5.

\* Alla bladen 3fingrade.

- 4 *P. norvegica* L. *stjelken upptill klynnegrenig*; småbladen *lancettlika—oval*, djupt sågade eller inskurna, *under håriga och gröna*; kronbladen *icke längre* än fodret. ☉ 6—8, g. blr. Fig. Fl.D.171 och 1874. H.N.f.3, n:o 45.

Torra, stund. fukt. st. r. (Verm. Dal. Gestr. och Helsl. ymnig, spridande sig derifrån sparsamt ända till Blek. Sk. Hall. och Boh., samt till Jemt. och Ångml. VB. Umeå sn. Gottl. Rohnemyr enl. G. v. Ced. — N. Christiania, särdeles på öarne i fjorden; Österdalen, Hallingdalen, Voss etc. Ost-Finnm. vid Pasvigelv i Sydvaranger: Norm.) *Ofta 2—3 quart. hög, med små blr, snart försvinnande rotblad, hvilka stund. dro parbl. delade i 2—3 par småbl.*

- 5 *P. nivea* L. *stjelken uppstigande*, med slutl. ganska *långa* blomskäft; småbladen *omv. äggrunda—vigglika*, inskuret sågade, *under meränd. hvitludna*; kronbl. *längre* än fodret. 2 7, g. blr. —  $\beta$  *pallidior*: bladen under gråiludna. Fig. Fl.D.1035.

Fjellv. (Torn.—Pit. Lpm. — N. Finnm. Porsanger: Norm. till Gudbrandsdalen. —  $\beta$  N. Nordl.; Tromsöe.) *Bladen under silfverhvita.*  
(*P. maculata* \* *gelida*.)

\*\* Alla bladen 5fingrade, endast de vid blrna stund. 3fingrade.

- 6 *P. reptans* L. *stjelken långt krypande*; småbl. *tunglika—vigglika*, under *gröna*, småiludna, sågade, med *platta* kanter; blomskäften *ensamma* i *bladvecken*, *enblommiga*. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.709. Fl.D.1164.

Ängsrenar. (Sk.—Helsl. Vestml. och Verm. Hall. Öl. Gottl. — N. sällsynt.) *Stjeln ofta flere fot lång; blrna stora.*

- 7 *P. argentea* L. *stjelken uppstigande*, upptill grenad i *qvastlikt knippe*, med *korta raka* blomskäft; småbladen *vigglika*, *under meränd. hvitludna*, n. från basen *flik-tandade*, med fram- och utåt riktade tänder, den yttersta utdragen, kanterna *tillbakaböjda*. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.865.

Torra st. a. (Sk.—VB. nor. del. och Pit. Lpm. Lul. Lpm. Njammats. — N. till Senjen: Norm.) *Stjeln fotshög; bladens undre sida snöhvitt luden, stundom n. bar och gröngrå: P. argentea  $\beta$  sordida* Fr. H.N.f.4, n:o 64, ända till n. rent grön: var. *virescens* ed.9.

- 8 *P. collina* Wib. *stjelkarne mest nedliggande*, från midten grenade i *utdragna*, slutl. *båglikt utböjda* blomskäft; småbl. som föreg., omv. äggrunda, *under grågrönt ludna*, kanterna meränd. *platta*. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.2591. H.N.f.7, n:o 49, 50.

\* *pallascens* Hn. småbladen *öfångt vigglika*, under omärkligt *håriga*, gulkröna, yttersta tanden föga utdragen. Fig. H.N.f.4, n:o 65; f.7, n:o 51.

Torra st. r. (Öl. Gottl. — \* Sk. Andrarum; Stens Hufvud: F. Aresch. Blek. på Verkö; Christianopol. Smål. Högsby sn.  $\frac{1}{4}$  mil v. om Staby; Påskallavik. ÖG. Lennestad i Regna enl. Kindb. Upps. bot. trädg. förvildad. Öl. ymnig i Ventlinge sn, derifrån spridd till Ottenby och Persnäs.) *Stjelkarne utgående från sidorna af det centrala bladknippet, nedligg. eller uppböjda, mera greniga än hos föreg.; bladen*



under tunnare gråhudna. \* har högre och mer uppstig. stjelk, ljusgröna, under gulaktigt bleka småblad, med mindre utdragen uddtand. — a *P. Wiemanniana* Günth. *P. Güntheri* Pohl. \* *P. collina* Lehm. och *Fr. S.V.Sc.* *P. intermedia* Lin. Herb. och Fr.

(*P. procumbens* \* *mixta*.)

\*\*\* Rotbladen 5-, stjelkbladen 3fingrade.

9 *P. verna* L. stjelkarne som hos föreg., jemte de veka blomskaften strävt långhåriga; rotbladen 5fingrade, med n. jemnbreda stipler; stjelkbl. 3fingrade, snart förvissnande; småbl. omv. äggrunda eller bredt vigglika, ofvan midten tandade, under enkelt håriga, gröna. 24 4, 5. Fig. Fl.D.2510. H.N.f.4, n:o 66.

Sandåsar. (Sk.—Uppl. Vestml. Dalsl. omkr. Änimm. Hall. Öl. Göt. — *N. Christiania* etc.) Liten och nedliggande, med alltid grön stjelk och gula kronblad, som meränd. sakna den mörkare fläcken, hvilken utmärker *P. macul.* Bladtänderna små äggrunda, den yttersta vanl. kortare än de på sidan.

10 *P. incana* Moench: stjelk och blad, utom de glesare längre håren, lutt småhudna af ett stjernformigt ludd; för öfrigt som föreg. 24 5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.2592. H.N.f.3, n:o 46.

Sandåsar, r. (Blek. Carlskrona på många st.; Sillhöfda sn; Fridlefstad sn, t. ex. a. om Kuleryd gästgg. Smål. från Eksjö, Ökna, Fåreda, Mörlunda och Högsby till Kalmar, Thorsås, Vissefjerda och Linneryd enl. Scheutz. VG. Öl. Göt. Lilla Carlön och i Burs sn enl. G. v. Ced.) Föga skiljd från föreg., hvarmed den af många förenas. — *P. cinerea* ed.9.

11 *P. maculata* Pourr. stjelkarne uppstigande, jemte de raka blomskaften småhudna och glest korthåriga; rotbladen 5fingrade, med aflångt äggrunda stipler; stjelkbl. 3fingrade; småbl. vigglikt omv. äggrunda, djupt sågtandade, under håriga. 24 5, 6. Fig. Fl.D.114. H.N.f.3, n:o 47.

\* *ambigua* Gaud. småbl. likade halfvägs till ryggnerven i aflånga samstående tänder.

\* *gelida* C. A. Mey. alla bl. vanl. 3fingr., n. glatta. H.N.f.15, n:o 52.

Torra ängsback. a. (Lpl.—Boh. nor. delen och Smål. Göt. Öl. icke sällsynt. — *N.* — \* *amb.* i fjelltrakter. — \* *gel.* Lpl. Lpm. flerst. kring Qvikkjokk: And. — *N.* teml. allm. på fjellen i Lom, Valders och Sogn: Ax. Bl.) Större och mer uppstigande än *P. verna*, ofta med röd stjelk. Kronbl. med en mörkare, brandgul fläck mot basen. Skiljes icke från *P. verna* af Linné. — *P. salisburgensis* Hænke. *P. alpestris* Hall. d. Yngr.

12 *P. opaca* L. hela örten långt mjukhårig; stjelkarne nedliggande; rotbladen 7—5fingrade, med tvärhuggna småbl., stipl. som hos föreg.; stjelkbl. 3fingrade, småbladen smalt vigglika, öfverallt sågade. 24 5, 6, g. blr. Fig. Sturm. 17 häft. Fl.D. 1648. H.N.f.1, n:o 51.

Sandåsar. (Sk. Käflinge och Lackalänge, Ivetofta, Årup etc. Blek. nära Skånska gränsen.) Liten, mångstjelig, rödaktig, med smalare och hårigare småblad, men för öfrigt lik *P. verna*.

+++ Foder meränd. 8klufvet och kronblad 4: *Tormentilla* L.

13 *P. Tormentilla* Scop. stjelken uppstigande; stipl. n. handdelade; bladen 3- eller 5fingrade; stjelkbladen oskaftade, med aflånga—vigglika, ofvan midten djupt sågade småblad. 24 6—8, g. blr. Fig. Sv.B.19. Fl.D.589.

Betesm. skog. a. (Sk.—Lpl. — *N.* till Finn. Alten: Norm.) Stiplerna stora, djupt delade. — *T. erecta* L.

14 *P. procumbens* Sibth. stjelken nedliggande; stipl. hela eller grundt 2—3flikiga; alla bladen skaftade, med 5 eller 3 småblad. 24 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1217 och 1819. H.N.f.2, n:o 51.

\* *mixta* Nolle: alla bl. 5fingrade; kronhl. 4—5.

Skogväxta betesm. etc. r. (Sk. Röstånga och Torlösa socknar; Dalby och Hellesta; Roslätt; Andrarum; Trolleholm; Pugerup etc. Blek. Carlskrona. Boh. Gustafsberg. — *N.* på Svanö i Bergens st. — \* Blek. Carlskrona.) Stiplerna små, mest hela; blrna betydligt större än hos föreg. — *P. nemoralis* Nestl. *Torm. reptans* L.

\*, som något liknar *P. reptans*, af hvilken några förf. anse den hybrid, har dock vid odling befunnits öfvergå i *a*.

319. *SIBBALDIA* Lin. Trefingerört.

- 1 *S. procumbens* L. bladen 3fingrade, med vigglika, i spetsen 3tandade småblad; blrna gytttrade. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.761. Fl.D.32. H.N.f.15, n:o 53.  
Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) Blrna ganska små på korta, stult. förlängda grenar från rostocken.

320. *GEUM* Lin. Kummer.

- 1 *G. hispidum* Fr. hela växten stråfhårig; stjelkladen pardelade; blrna upprätta, med omv. eggunda kronblad längre än fodret; småfrukternas spröt längre än de mycket långhåriga märkena. 2 7, g. blr. Fig. Fl.D.suppl.78. H.N.f.5, n:o 53.  
Buskväxta st. r. (Blek. Carlskrona på Saltö, Gastaskär etc. Smål. Klöfdala i Järeda sn; Tjustgöl och Svinshår i Misterhult; Vestervik; Lofta skärgård; Hagstaviken i Vesterum sn etc. ÖG. Gryt sn i skären, t. ex. på Fångö och lilla Ålö. Hall. Varberg och Karup.) Rotbl. hos alla arterna hyrformigt parbladigt delade; ändstiken hos näro. art parklufvet inskuren. hos de öfr. meränd. 3flikig. — *G. urbanum* β Wg.  
2 *G. urbanum* L. mjukhårig; stjelkl. 3delade, sågade; blrna upprätta, med omv. ägg-runda kronblad, sällan längre än fodret och med omärklig klo; småfrs spröt som hos föreg. med småhåriga märken. 2 6, 7, g. blr. — β *hirtum*: mer hårig; kronbl. längre än fodret. Fig. Sv.B.94. Fl.D.672.  
Buskväxta st. a. (Sk.—Medelp. Dal. Öl. Gottl. — N. till Nordl. — β Hall. VG. Göteborg på Danmarks Lilja.) β *G. hirtum* Wahlb.  
× *G. intermedium* Ehrh. blrna något lutande; kronbladens skifva rundad, med kort klo; för öfr. som föreg. 2 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.1874. H.N.f.6, n:o 50.  
Buskväxta st. (Sk.—Helsl. Tuna sn. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Strömstad; Vinga m. fl. st. Öl. Runsten etc. Gottl. Hessle i Fleringe. — N. Christiania; Trondhjem; trol. flerstädes.) En tydlig hybriditet af *G. urban.* och *rivale*, än närmande sig mer den förra, än den sednare, hvarföre den af en del förf. föres som afart än till den ena, än till den andra.  
3 *G. rivale* L. mjukhårig; stjelkl. 3delade, tandade; blrna lutande; kronbladen af fodrets längd, med utdragen klo; småfrs spröt af de långhåriga märkenas längd. 2 4, 5, 6. Fig. Sv.B.231. Fl.D.722.  
Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) Har nästan hängande blr med omv. hjertlika blekgula brunådriga kronblad. Stundom utväxa foderslikarne till stora stiklandade blad, hvarjemte kronbladens antal förökas: *G. hybridum* Wulf.

321. *DRYAS* Lin. Fjellvippa.

- 1 *D. octopetala* L. bladen aflånga, grofsågade, under hvitludna. 2 8, hv. blr. Fig. Sv.B. 427. Fl.D.31. H.N.f.15, n:o 51.  
Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N. från Finnmark, ned till Langesund enl. Ax. Bl.) Blrna likna Hvitsippor.

- 4 Flocken *Spirææ*. Karpeller 5—10, fröhuslika, flerfröiga, fria.

322. *SPIRÆA* Lin. Kassöta.

- +1 *S. salicifolia* L. buske; bladen odelade, lancetlikt aflånga dubbelsågade glatta; blr i tät spira. 2 6, 7, ljusr. blr. Fig. E.B.1468.  
Odl. st. (Allmänt odlad, och mångenstädes förvildad.) 3—4 fot hög.  
2 *S. Ulmaria* L. ört; stjelken kantig; bladen parbladigt delade, uddbladet större, 3-klufvet, sido-småbladen odelade dubbelsågade, vanl. på undre sidan hvitludna; blr i knippen; karpeller sammanvridna. 2 6, 7, hv. blr. — β *denudata*: bl. på undre sidan gröna. Fig. Sv.B.189. Fl.D.547.  
Fukt. äng. a. (Sk.—Lpl. — N.) Har starkt luktande blr.  
3 *S. Filipendula* L. ört; stj. trind; bladen parbladigt delade med talrika par af sti-

*kiga*, på undre sidan gröna och glatta småblad; blr i knippen; karpeller *raka*. 24  
7, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.154. Fl.D.635.

Torra äng. a. (Sk.—Gestr. och Dal. Um. Lpm. Boh. Öl. Gottl. — N. till Sönd-  
möder.) *Foderstikar och kronblad vanl. 6—7; rotträdarne med hängande knölar.*

60 Fam. DRUPACEÆ L. Krona roslik. Fruktämne fritt, inom blomman, slutl. sten-  
frukt med en enda sten.

323. PRUNUS Lin. Slån, Kirs, Hägg (6).

† Blr 1—3 ur samma knopp före ell. samtid. med bladen, kortskaftade; frukt  
blådaggig, med plattad sten.

†1 P. *domestica* L. utan tornar; bladen ovala naggsågade, under *småludna*; blomskäften  
mest parvisa, *finhåriga*; fruktämn. och frukter slutl. *aflånga*.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. Fig.  
Sv.B.193 [med undant. af fig. d].

Odl. och förvild. (Sk. Broby skog enl. F. Aresch. Blek. enl. Gosselm. ÖG. flerst.  
förvildad: Kindb. Hall. vid Åsbro nära Viska-ån. VG. Göteborg i Rosenlund;  
Tunhem; Kinnekulle m. fl. st.) *Lågt träd med aflångt äggrunda kronbl. samt mer  
aflång och plattad sten än hos följ. Den äggformiga frukten har många för-  
ändringar, uppkomna genom odling: Plommon.*

2 P. *insititia* L. [i vildt tillstånd] med tornar; blad och blomskäft *som hos föreg.*;  
fruktämnen och frukter *n. klotrunda*.  $\frac{1}{2}$  5, 6, hv. blr. —  $\beta$  *rustica*: träd utan tor-  
nar; frukterna större. Fig. Fl.D.2651.  $\beta$  E.B.841. H.N.f.5, n:o 50. Sv.B.193, f. d.  
[frukten].

Back.,  $\beta$  odl. st. r. (Sk. nor. del. enl. F. Aresch. Blek. Carlskrona; Ronneby. Smål.  
Markaryd. ÖG. här och der: Kindb. Stockh. Gäddviken. Öl. Borgholm. —  $\beta$  Sk.  
Ifö. Hall. Hallandsås, Torup och Getinge. Smål. Femsjö; Unnaryd vid Rangalsbro  
m. fl. st. ÖG. Mogata. Gottl. Hesse i Fleringe. Flerst. upp till Gestr. i bond-  
täppor. — N. enl. Fr. S.V.Sc.) *Buske med större blr och frukt än följ., som  
arten i vildt tillstånd liknar [v. rupestris Fr. i S.V.Sc.]. Odlad blir den ett litet  
träd med temligen stora svartblå frukter: Krikon [β].*

3 P. *spinosa* L. med tornar; bladen lancettlikt omv. äggrunda, finsågade, *n. glatta*;  
blomskäft. 1—2, *glatta*; fruktämnen och frukter *klotrunda*.  $\frac{1}{2}$  5, hv. blr. Fig. Sv.B.  
151. Fl.D.926.

Back. (Sk.—Uppl. Vestml. Verml. Ölmehärad. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. södra  
del.) *Buske med blr på bar qvist, dock stundom med något utvecklade blad:  
var. coactanea. Frukt. likna stora daggbär: Slånbär. Tornarne, ofta 2 tum  
långa, uppkomma, likasom hos föreg., af blommande sidoqvistar.*

†† Blr 1—flere i flock, samtida med bladen, långt skaftade; frukten utan  
daggöfverdrag, med klotrund sten: *Cerasus Adams*.

†4 P. *Cerasus* L. bladen ovala spetsiga *småsågade*, *öfverallt glatta*, utan glandler på  
skaftet; blomflockarne *n. oskaftade*.  $\frac{1}{2}$  5, hv. blr. Fig. E.B.706.

Odl. och förvildad, r. (Sk. Hall. Smål. Visingsö; samt här och der upp till Gestr.)  
*Bladen fasta och släta; fr. svartbrun: Kersbär. — Cer. acida Barkh. C. vulga-  
ris Mill.*

5 P. *avium* L. bladen äggrundt ell. omv. äggrundt ovala, med smal spets, *olikformigt  
grofsågade*, på undre sidan *gleshåriga*; bladskäften nära skifvan *2glandlade*; blom-  
flockarne oskaftade.  $\frac{1}{2}$  5, hv. blr. Fig. Sv.B.205. Fl.D.1647.

Skogsäng. mest i bergstr. r. (Sk. Kullaberg; Helsingborg; Trolleholm; Håckeberga etc.  
Blek. Ronneby; Lyckebytrakten: Gosselm. Smål. Ekesjö, Skurugatan; mell. Jönköp.  
och Grenna; Husqvarnabergen, samt på Norrlandet vid Vestervik. ÖG. mångenst.,  
särđ. mell. Stångån och Vettern enl. Kindb. Stockh. Djurgården m. fl. st. Vestml.  
på Hallingen. Verml. på Lurön. Dalsl. Dalskog sn. VG. Billingen, Kinnekulle  
etc. Boh. mell. Strömstad och Tistedalen; Tanum sn, Klefva vid stranden etc.

*Hall.* Österö. *Gottl.* i När sn. — *N.* Arendal; Eger; Svanöe i Bergens stift.) *Bladen stora, tunna och ojemna; frukterna röda ell. svarta, kallade Fogelbär.* — *Cer. avium Mönch.*

+++ Blr i klase, senare än bladen; frukten som i föreg. afd.: *Padus Koch* (Hägg).

6 *P. Padus L.* bladen ovala hvass-sågade, med 1—2 glandler vid basen; blomklasarne utdragna, något slaka.  $\frac{1}{2}$  5, hv. blr. Fig. Sv.B.121. Fl.D.205.

Skogsäng. a. (Sk.—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finnm.) *Frukterna små, svarta.*

61 Fam. **PAPILIONACEÆ** *Lin.* Krons fjärl-lik. Fruk. ärtbalja. Fröhvite 0.

1 Flocken **Viciae**. 9 ståndare samväxta, en fri [diadelphiska]. Baljan enrummig. Hjärtblad tjocka. [Örtbladen parbladiga utan uddblad, oftast med klänge.]

324. **PISUM** *Lin.* Ärt.

1 *P. arvense L.* stipl. groft hvassnaggade; bladen 1—2pariga; blomskäften 1—2blommiga; fröen ojemna fläckiga. ☉ 7, rödviol. blr. Fig. Sturm, 4 häft.

Åkr. etc. (Sk.—*Gestr.* Ångml. Vestml. Verm. — *N.* till Trondhj.) *Den eg. vilda: P. arv. infestum Fr., är till alla delar mindre än de odlade grärdarterna: var. cereale Fr., hvilka afven ofta förekomma bland säden.*

325. **LATHYRUS** *Lin.* Vial.

† Stjelken med 2 vingkanter.

1 *L. silvestris L.* stipl. icke bredare än stjelken; bladen enpariga, med vingkantade skaft och lancettlika småblad; blomfodrets 4 öfre tänder n. likstora, bredt syl-lik; fröärret omgifvande halfva fröet.  $\frac{1}{2}$  7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.325. Sv.B.254. H.N. f.12, n:o 55.

\* *platyphyllus Retz.* småbladen elliptiska—afånga. Fig. Fl.D.785.

Ångsback. (Sk.—*Gefle.* Helsl. Bergsjö sn, Storön i Kyrksjön. Ångml. Dal. Ner. Verm. Dalsl. Öl. Gottl.? — *N.* söd. del. Ax. Bl. — \* Sk. Kullaberg; Ramåsa. Smål. Kalmar, vid Skälby. ÖG. flerst. enl. Kindb. Hall. Karup. Boh. Lilla Edet; Vingaö; Musön i Tanum; Otterö; Styrsö etc.) *Småbladen smala, svärdlikt spetsade; hos \* mer afånga, vanl. trubbiga med en liten udd, var. från  $\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$  tum breda: L. latifolius L.Fl.Su.*

2 *L. heterophyllus L.* stipl. vanl. bredare än stjelken; bl. 1—2pariga, med bredt vingkantade skaft och elliptiskt lancettlika småblad; fodrets 2 öfversta tänder kortare och bredare än de öfriga, trubbiga med udd; fröärret till  $\frac{1}{2}$ del omgifvande fröet.  $\frac{1}{2}$  7, 8, r. blr. Fig. H.N.f.4, n:o 62.

Steniga lundar, r. (Smål. Vissefferd; Kalmar; Hagelsrum och Lockebo i Mälilla sn; vid Krigsdala prestg.; Skureda i Lommaryd etc. ÖG. mångenstäd. i nor. skogsbygden, Stångådalen och Sommarbygden enl. Kindb.; Motala sn nedom Hållberget. Ner. Hökerkulla äng; Snafunda sn flerstädes. VG. vid de större bergen; vid Grimstorp och Grimmerstorp i Sandhem sn. Boh. Koön. Gottl. Martebo i Prästängen.) *Vanl. gröfre än föreg.*

3 *L. palustris L.* stipl. af stjelkens bredd; bladen 2—3pariga med ovingade, ofvanpå kölad skaft och lancettlika—jemnbreda småblad; fodertänd. som hos föreg., men spetsiga.  $\frac{1}{2}$  7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.399.

Våta äng. (Sk.—*VB.* Neder-Kalix och Dal. Öl. Gottl. — *N.* till Ost-Finnm.) *Var. med  $\frac{1}{2}$  tum till 2 linier breda småblad.*

++ Stjelken 4kantig, n. ovingad.

4 *L. tuberosus L.* bladen enpariga; småbladen afånga, ell. något omv. äggrunda, trubbiga; de öfre fodertänderna breda, n. triangulära.  $\frac{1}{2}$  7, 8, r. blr. Fig. Sv.B.382. Fl.D.1463. H.N.f.1, n:o 50.

Åkr. äng. r. (Sk. Hendriksfelt vid Glemminge: Eug. Hemb.; Trelleborg och Björns-  
torp enl. F. Aresch. Fordom på flere andra st. ÖG. vid Åby i Horns sn. Södm.  
Aspö sn, Skärs äng; Viñholm. Stockh. vid Ullsunda; Näsby i Täby sn. Uppl. Sjö  
slott, ymn. Vestml. Björksta sn enl. G. v. Ced.) Rotstockens grenar uppväldade  
till tumslånga älliga knölar, hvarföre växten fordom blifvit odlad och trol. för-  
vildad.

5 *L. pratensis* L. bladen som hos föreg.; småbladen lancettlika spetsiga; alla foder-  
tänd. sylspetsade. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.49. Fl.D.527.

Äng. a. (Sk.—VB. Umeå. Jemt. Öl. Gottl. — N. till söd. Finnm.) Var. med bre-  
dare och smalare småblad, glatt och hvitluden.

6 *L. maritimus* Big. bladen 3—8pariga, med ovala småblad, stora n. hjertlika stipler.  
2 7, 8, r. blr. Fig. Fl.D.338. H.N.f.2, n:o 50.

Grus. hafsstr. r. (VB. Neder-Kalix skärg. — Helsl. Hudiksvall. Södm. Landsort;  
Muskön; Ålön etc. Sk. Boh. Strömstrakten; Tanum sn, Finnö. — N. till Ost-  
Finnm.) Var. glatt och mer ell. mindre hårig, samt i Boh. enl. Leffl. med  
smärre, bredt lancettlika småbl.: *β acutifolius* Bab. — *Pisum* L.

### 326. *ORBUS* Lin. Vippärt.

1 *O. vernus* L. stjelen upprätt, enkel, ovingad; stipl. halft pillika, spetsiga, vanl. kor-  
tare än bladskafen; bladen 2—4pariga, med ågrunda långspetsiga småblad. 2 4  
5, r. ell. viol., säll. hv. blr. Fig. Sv.B.640. Fl.D.1226. H.N.f.16, n:o 54, var.

Lund. (Sk.—Ängml. och Jemt. Boh. Öl. Gottl. — N. upp till Lysöen i Trondhjems  
stift.) Småbladen ofta tumsbreda, stundom såsom hos ex. i H.N. knappt tredje-  
delen så breda, smalt lancettlika: *β angustifolius* Fr. — *Lathyrus* Wimm.

2 *O. tuberosus* L. stjelen uppstigande, enkel, vingkantad; stipl. halft pil-lika spetsade.  
vanl. längre än bladskafen; bladen 2—4pariga, med smalt aflånga—elliptiska små-  
blad. 2 5, 6, purpur. ell. viol., säll. hv. blr. Fig. Fl.D.781. H.N.f.5, n:o 49, var.

Ängsback. a. (Sk.—Ängml. och Dal. Öl. Gottl. — N.) Småbladen meränd. trub-  
biga, stund. n. jembreda: var. *tenuifolius* H.N. — *Lathyrus macrorhizus* Wimm.

3 *O. niger* L. stjelen upprätt, grenig, ovingad; stipl. smala, halft pil-lika sylspetsade.  
af bladskafens längd; bladen 5—8pariga, med bredt lancettlika småblad. 2 6, 7,  
purp. blr. Fig. Fl.D.1170.

Ängsback. (Sk.—Uppl. Vestml. Ner. Göthlunda. Verml. Dalsl. Hall. Öl. Gottl. —  
N. till Bergen.) Stundom alnhög. Svartnar gerna torr; baljorna långa, mång-  
fröiga. — *Lathyrus* Wimm.

### 327. *VICIA* Lin. Vicker.

† Klasar mångblommiga, långt skaftade.

\* Bladen högst 5pariga.

1 *V. pisiformis* L. bladen 3—5pariga, småbladen hjertlikt ågrunda trubbiga med  
udd, nedersta paret fastadt utan skaft tät vid stjelen; pist:s märke öfterallt finludet.  
2 7, gröngula blr. Fig. Sv.B.608. H.N.f.5, n:o 48.

Skogsback. berg. r. (ÖG. återstäd. i Åtvedstrakten, Stångådalens och Sommarbygden  
enl. Kindb.; Östra Ryd; Omberg. Små. vid sjön Tynn i Dalhem sn: Stud. P. A.  
Nilsson; Husqvarnabergen: Stud. C. A. Burén enl. Zett. I Bot. Not. äfven uppgifven  
för Ed sn, men origtigt enl. Dr Lund. VG. vid Bursle på södra sidan af Hunne-  
berg. — N. Christiania.) Stor bredbladig växt; stiplerna hela eller bugtandade;  
klasarne med talrika blr.

2 *V. dumetorum* L. bladen 3—4pariga, småbladen ågrunda, trubbiga med udd, alla  
kort småskaftade, något tillbakaböjda; märket ofvanpå glatt. 2 7, purp. blr. Fig.  
Fl.D.1464. H.N.f.16, n:o 53.

Lundar. r. (Sk. vid Kaddsjö i Kaslösa sn; Krageholm; Öfvedskloster; Stenbyhällar i  
Benestad sn; Baldringeskogen etc. Små. Högsby sn: Stud. Lunell enl. Ekstr. ÖG.  
Stegeborg. Stockh. Sickla-ön. Hall. bland Slån och Törnbuskar på Halmstads gårde;  
i ångar söder om Vreärps g.g.) Liknar mycket föreg. Stipl. fiktandade; kla-  
sarne vanl. med 6—8 blr.

\*\* Bladen minst 6pariga.

a — Pistillens märke rundtomkring småludet.

- 3 *V. silvatica* L. stipl. halfmånlika, *syltandade*; bladen *med klänge*; småbl. äggrundt *afånga*; blomklasarne *längre* än bladen, *utan skärm*. 2 7, 8, hvita blåstrimmiga blr. Fig. Sv.B.136. Fl.D.277.  
Skogsäng. (Sk.—VB. och Jemll. Boh. Öl. vid Horn. Gottl. i Follingbo sn. — N. till Salten.) *Stjelken klängande*; bladen *med långt, grenigt klänge*.
- \*4 *V. Orobis* DC. stipl. helft spjutlikt lancettlika, *helbräddade*; bladen *utan klänge*; småbl. äggrundt lancettlika; blomkl. *något längre* än bladen, *utan skärm*. 2 6—8. Fig. Fl.D.98. H.N.f.7, n:o 41.  
Ängsback. nära hafvet. (N. från Lister till Svanöe i Bergens st.) *Blirna hvita och viol. med mörkare ådror, i korta klasar; i stället för klänge en borstlik udd i bladspetsen.* — *Orobis silvaticus* L. *Vic. cassubica* Fl.D.
- 5 *V. cassubica* L. stipl. *som hos föreg.*; bladen *med klänge*; småbl. aflånga—elliptiska; blomklas. *kortare* än bladen, *med borstlika skärm af småskaftens längd*. 2 7, 8, viol blr. Fig. Fl.D.1395. Jacq.A.229. H.N.f.3, n:o 40.  
Lund r. (Sk.—Södm. Stockh. Nacka- och Danviksbergen; Beateberg m. fl. st. på Vermdön; Drottningholm. VG. Halle- och Hunneberg; på en ö i Tiden vid Ullevad. Dalsl. Stora Wahlberg vid St. Leesjön, samt på Boxåsen i Färglanda sn. Boh. Lackarebäcks oxbage i Fässbergs sn. Hall. Öl. Algutsrum på en kulle vid Möllstorp.) *Stjelken styf och upprät; klängen långa greniga*.

b — Märket ofvanpå glatt.

- 6 *V. villosa* Roth: *ulligt luden*; stj. klängande; småbl. aflånga ludna; blomfodrets nedre tänder långa, syl-lika; kronseglets skifva *halften kortare* än klon; baljorna *ovata fåfröiga*. ☉ 7, 8, viol. blr. Fig. Sv.B.166? Fl.D.2599. H.N.f.4, n:o 61.  
Åkr. (Sk.—Ängml. och Jemll. Lüh sn. Öl. Gottl. Pavik i Eskelhem sn enl. G. v. Ced. — Södra N.) *Har nästan dubbelt större, mer i purpur dragande blr än följ., som den kommer nog nära; balj. 3—6fröiga.* — *V. Cracca* Sv.B.
- 7 *V. Cracca* L. *kort småluden*; stj. slak ell. klängande; småbl. utdraget lancettlika, *trubbade* med udd; fodrets *trenne* nedre tänder *n. likformiga*, kort lancettlika; kronseglets skifva *af klons längd*; baljorna *cyindriska* 6—10fröiga. 2 6—8, b. blr. Fig. Fl.D.804. H.N.f.8, n:o 42.  
Åkrar. äng. a. (Sk.—VB. och Pit. Lpm. Lul. Lpm. Storbacken: Ind. — N. till Ost-Finnm.: Norm.) *Cracca major* Godr. & Gren.
- 8 *V. tenuifolia* Roth: *kort och glest stråfhårig*; stj. *styf, flerböjd*; småbl. jemnbreda, *spetsiga* med udd, under upphöjdt nerviga; fodrets *nedersta tand syl-lik*, de 2 sidotänderna äggrunda sylspetsiga; kronseglets skifva *längre* än klon; baljorna *något plattade*. 2 6—8. Fig. Fl.D.2177. H.N.f.13, n:o 61.  
Back. åkerren. (Sk. mångenstād. helst i östra delen. ÖG. Hagebyhöga sn; Omberg. VG. Göteborg. Öl. Gottl.) *Blirna blå, eller viol. med bleka klor; bladen stund. något trubbiga. Föga skiljd art.*

†† Klasar fåblommiga, ganska kort skaftade.

- 9 *V. sepium* L. bladen mångpariga, med aflångt äggrunda helbräddade småblad, de öfre mindre; klasarne i öfre bladvecken, 3—5blommiga, med uppräta (stund. blott 1—2) baljor; märket ofvanpå glatt. 2 5, 6, purpurr. ell. viol. blr. Fig. Sv.B.326. Fl.D.699.  
Ängsback. a. (Sk.—Ängml. och Jemll. Öl. Gottl. — N. till söd. Finn.)

††† Blommor ensamma ell. parvisa i bladvecken.

- 10 *V. sativa* L. stipl. *tandade*; bladen 5—7pariga, småbladen aflångt vigglika, tvärhuggna, med udd; blirna *parvisa*; balj. *håriga*; fröen *något plattade*. ☉ 7, purpurr. blr. Fig. Sv.B.230. Fl.D.522.  
Åkr. (Sk.—Ängml. VB. Björkfors och Neder-Kalix. Jemll. Dal. Boh. Öl. Gottl. — N. till Trondhj.) *Mycket större än följ., med bredare och plattare, mer ludna baljor.*

- 11 *V. angustifolia* Roth: stipl. *tandade*; bladen 3—4pariga; småbl. lancettlika—jemn-

breda, de nedersta bladens kortare, urnupna; blrna 1—2; balj. tunnt småludna, skul. n. *glatta*; fröen *klotrunda släta*. ☉ 7, purpurr. sällan hv. blr. — *β Bobartii*: de öfre bladens småblad nästan parallelt jemnbreda, i spetsen intryckta. Fig. Fl.D.1340. H.N.f.12, n:o 56.

Åkr. back. etc. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. VG. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. södra del.) 1—2 fot lång; med 1—2 linier breda blad; foderländ. *vanligtvis kortare än pipen*. — *V. sativa β nigra* L. *V. segetalis* Thuill.

12 *V. lathyroides* L. stipl. *helbräddade*; bladen 2—3pariga, de nedres småblad omvändt äggrunda, med intryckt spets, de öfres aflånga; blrna *ensamma*; balj. *glatta*; fröen *prickiga*. ☉ 5, 6, viol. blr. Fig. Fl.D.58. H.N.f.14, n:o 55.

Grus. st. r. (Sk. *Blek. Smål.* vid Kalmar; Vestervik; Taxås i Stenbrohult; *Madesjö*, samt Segersgårde i Lofta sn; Sandsjö i Kronob. län. ÖG. Gryt; Engelholm i S. Annæ, samt Norrköping enl. Kindb.; HäradsHAMMAR. *Stockh. Uppl.* vid Wijks slott. VG. Göteborg. Hall. Öl. Gottl. vid Lärbro kyrka enl. G. v. Ced. — N. Christiansand.) 3—5 tum hög.

### 328. ERVUM Lin. Lins.

†1 *E. Lens* L. bladen omkring 6pariga; blomklasarne 1—2blommiga, med ett horstlikt *bihang* nedom blrna; fodret af kronans längd; baljorna breda, 2fröiga *glatta*. ☉ 6, 7, blåhv. blr. Fig. Sturm. 52 häft.

Förvild. r. (ÖG. i Hällestå, Nykil, V. Tollstad och V. Stenby sn; Skeninge; Ömberg. Allt enl. Kindb. Gottl.) *Större än de följ. med korta och mycket breda baljor, plattade frön: Linser*. — *Lens esculenta* Mönch.

2 *E. hirsutum* L. bladen 6—8pariga, med n. jemnbreda, vanl. tvärhuggna ell. urnupna småbl.; blomklas. meränd. *flerblomm.*, utan bihang; kronan längre än fodret; balj. *ludna* 2fröiga. ☉ 6, 7, ljusblå blr. — *β angustifolium*: småbl. spetsiga; klas. vanl. 2blomm. Fig. Fl.D.639.

Torra st. åkr. (Sk.—VB. nor. del. och Um. Lpm. — N.) *Blrna mycket små*. — *Vicia* Fr. S.V.Sc. *Cracca minor* Godr. & Gren.

3 *E. tetraspermum* L. bladen 3—4pariga, med n. jemnbreda, trubbad, uddspetsiga småblad; blomklas. 1—3blommiga; kronan som hos föreg.; balj. *glatta*, 4—6fröiga. ☉ 6—8, ljusblå blr. — *β tenue*: småbl. spetsiga; blrna *ensamma*. Fig. Fl.D.95.

Torra st. (Sk.—Gestr. och Dal. Öl. Gottl. — N.) *Blrna små, med kort foder*. Var. med 3blommiga klasar och 5—6fröiga baljor. — *Vicia* Fr. S.V.Sc.

2 Flocken *Hedysareæ*. Stånd. diadelphiska. Balja affallande hel eller ledvis [ledbalja. Örtbladen parbladiga med uddblad].

### 329. CORONILLA Lin. Kronärt.

1 *C. Emerus* L. buske, med kantig stam; bladen 3—4pariga, med omv. äggrunda småbl.; blomklas. 2—3blommiga; kronbladens klo 3 gång. längre än fodret. ☉ 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.343. Fl.D.suppl.89. H.N.f.4, n:o 60.

Kalkberg, r. (Öl. på kalkbergets afsättning ar mell. Vickelby och Resmo kyrkor; Borg-holms slott,  $\frac{1}{2}$  mil på södra sidan ymnig; Rösslösa. Gottl. Thorsborgens samt Mull-valds i Ardre. — N. västra kusten.) 1—2 fot hög, med stora blr, långa och smala baljor.

### 330. ORNITHOPUS Lin. Klovicka.

1 *O. perpusillus* L. bladen mångpariga, med äggrunda—elliptiska småbl.; blrna i huf-vud; baljorna något plattade, krökta nätrynkiga. ☉ 5, 6. Fig. Fl.D.730. H.N. f.2, n:o 49.

Betesm. vid hafvet, r. (Sk. Ystad, mellan Köpinge och Kabusa; Köpingsberg enl. F. Aresch. Fordom äfven i Smål. på Stensö, Svinö och Engö vid Kalmar.) Späd, vid basen grenig ört, med röda och hvita blr.

### 331. ONOBRICHIS Gärtn. Helghö.

†1 *O. sativa* Lam. bladen mångpariga, med aflånga—lancettl. småbl.; foderflikarne af halfva kronkolens längd, längre än vingarne; baljan horsttaggig, i framkanten kölad. 2, 6, 7, violett-röda blr. Fig. Fl.D.2243.

Äng. r. (Sk. Malmö vid Limhamnsvägen och på en pilvall nära Rosenlund; Torup på en backe, ymnig. ÖG. Omberg etc. enl. Kindb. Stockh. Ulfunda. Götth. Visby, Snäckgården. Fordom odlad.) *Alnahög; bl.klasar axlika, 2—4 tum långa. — Hedysarum Onobr. L.*

3 Flocken **Astragaleæ**. Stånd. diadelphiska. Balja genom ena fogens invikning mer och mindre drummig. [Blad som föreg. flock.]

### 332. ASTRAGALUS Lin. Backsöta.

† Blrna gula.

- 1 *A. glycyphyllus* L. stjelken nedliggande; stipl. äggrundt lancettlika, spetsiga; bladen 5—6pariga, med äggrunda—elliptiska, trubbiga glatta småblad; blomklasarna kortare än bladen; baljorna trekantiga, något krökta. 2 6, 7. Fig. Sv.B.237. Fl.D.1108. Lund. (Sk.—Stockh. och Södm. Uppl. Funbo sn, vid Löfsta. Helsl. Carlsberg och Tenberget i Loos sn. Medelp. berget Klacken i Hafverö sn. Jemtl. Håsjö sn. Dal. Hykjeberget. Vestml. Klacken i Norberg. Ner. Verm. VG. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Götth. — N. Christiania till Næs på Hedemarken. Arendal etc.)

†† Blrna blå ell. violetta.

\* Stiplerna trubbiga.

- 2 *A. oroboides* Horn. stjelken uppstigande; stipl. äggrunda; bladen 5—7pariga, med aflånga trubbiga glatta småblad; klasskaften längre än bladen; balj. äggrunda, till hälften inneslutna i blomfodret, nedböjda. 2 7, 8, b. blr. Fig. Wg.Fl.L.12,f.4. Fl.D.1396. H.N.f.3, n:o 39.

Fjellv. (Lul. Lpm. Titir njarka vid Wirihaure; Kallowarats vid Rovejaure, samt vid Puolaure: H. Widm. Jemtl. Snasahögen; Åreskutan; Helagsfjellen. Herjed. vestl. fjell. — N. Ost-Finnm.; Saltdalen; Stuedal; Dovre; Lom etc.) *A. Leontinus* Wg. Fl.L. *Phaca oroboides* DC.

- 3 *A. alpinus* L. stjelken i början mycket kort, slutligen uppstig.; stipl. äggrunda; bladen 8—10pariga med aflånga under mjukhåriga småblad; klasskaften längre än bladen; balj. 3kantiga, med ur blomfodret utskjutande bas. 2 6, 7. —  $\beta$  *dilutus* Norm. fodr. och balj. ljust gulhåriga. Fig. Lin.Fl.L.9,f.1. Wg.Fl.L.12,f.1. Fl.D.51. H.N.f.14, n:o 56.

Fjelltr. a. (Lpl.—Helsl. nordvestra socknarne. VB. Torn. elfs nedre lopp; Öfver-Kalix, vid elfven. Ängml. Tåsjö och Fjällsjö. — N. Finnm. ned till Hardanger. —  $\beta$  Jemtl. Åreskutan; Getvalen: R. Hn. — N. Finnm. Alten: Norm.) I början knappt fingerhög, likasom med stängel från roten, sedan 6—10 tum hög, grenig; blrna mest hvita blåstrimmiga, stundom rent blå ell. hvita. Fodret och balj. hos hufvudformen svarthåriga. — *Phaca astragalina* DC. *Ph. minima* Less.

\*\* Stiplerna spetsiga.

- 4 *A. hypoglottis* L. stjelk. som hos föreg.; stipl. äggrundt lancettlika; bladen 8—12pariga, med äggrundt aflånga, glesl långhåriga småblad; klasskaften längre än bladen; balj. kort äggrunda med hjertlik bas. 2 6, 7, blå ell. viol. blr. Fig. Fl.D.614. H.N.f.14, n:o 49.

Gräsväxta st. r. (Sk. strandängar mell. Malmö och Lomma. Smål. Kalmar, vid vägen mell. Lindelund och Engö.) 2—6 tum hög, med aflångt äggformiga tålblommiga klasar. — *A. arenarius* Fl.D. *A. danicus* Retz.

- 5 *A. arenarius* L. stjelken nedligg. ell. uppstigande, grenig hvittluden; stipl. hinnaktiga, äggrundt lancettlika; bladen omkr. 4pariga, småbladen jemnbredt lancettlika, med uppvikna kanter, under hvittludna; klasskaften icke längre än bladen, fåblommiga; balj. cylindriska. 2 6, 7, rödviol. blr. Fig. Sv.B.734. Fl.D.suppl.87. H.N.f.1, n:o 49. Flygsand, r. (Sk. Vidtsköffe på Stora Drifvan, samt derifrån spridd dels åt Köpinge och Lyngby, dels längs hafskusten till Hvitemölle enl. F. Aresch.) 4—7 tum hög, med djupl gående grenig rotstock; småbladen på öfre sidan gröna; klasen 4—8-blommig.

### 333. PHACA Lin. Fjellvicker.

- 1 *P. frigida* L. stjelken upprät; bladen 4—5pariga, småbladen äggrundt aflånga; blom- Hartman, Skandinavians Flora (10:de uppl.).



klasarne 2—4, jemnhöga; baljorna nedböjda, med ur fodret utskjutande bas. 24 7, g. blr. Fig. Wg.Fl.L.t.10,f.2. Fl.D.856. H.N.f.9, n:o 51.

Fjellv. r. (Torn. Lpm. Lul. Lpm. Nammats vid Laidaure: F. Björkm. enl. H. Widm. Um. Lpm. vid Högsta by. Jeml. Snashögen i Åre sn; Smålhögarne och Helagsfjellen. Herjed. Midtåkläppen etc. — N. Finnm.; Salten; Trondhjem i Stuedalen på Vakterhögarne etc. Ramsfjellet; Tronsfjellet; Dovre.) *Ph. alpina* L.Fl.Su.

### 334. OXYTROPIS DC. Kloärt.

1 *O. pilosa* DC. stjelen täckt af långa mjuka, n. vinkelrätt utstående hår; bladen mer än 10pariga, med lancettlika ell. aflånga, meränd. spetsiga, på båda sidor ludna småblad; balj. upprätta trinda spetsiga håriga. 24 6, 7, ljusgula blr. Fig. Fl.D.suppl. 88. H.N.f.6, n:o 36.

Torra st. r. (Smål. östra del. ÖG. Omberg på klippor mot Vettern; Högby sn vid Skogssjö; Norrö i Heda: Kindb. Goutl. Vestergarn. Skansholmen; Väske sn, vid Bredunds fiskläge; på hafstr. norr om Skälsö; Öfversteqvarn etc.) *Goutl. exempl. hafva den vanligen upprätta, 8—10 tum höga stjelen sällan quartershög, oflast nedtryckt, stängelformig. — Astragalus L. Phaca Wg.*

2 *O. lapponica* Gaud. stjelen ganska kort, grenig, tilltryckt hårig; bladen omkr. 10—12pariga, med lancettlika spetsade gråludna småblad; balj. nedböjda, för öfr. som hos föreg. 24 7, blårdöda blr. Fig. Wg.Fl.L.t.12,f.3. Fl.D.suppl.20. H.N.f.5, n:o 47.

Fjellv. r. (Torn. Lpm. Kåbdåvanka; Nuljalaki vid Torn. trask. Lul. Lpm. Wirihaure, på Unna Toki, Jälle etc.; Kallowarats nära Rovejaure: H. Widm. Pit. Lpm. Akarisfjell; Tjiddjakk. Herjed. Midtåkläppen; Åshögen etc. — N. Finnm. Tsatsa. ofvan Lyngen, Kaafjorden och Senjen; Maalselv och Salangdal m. fl. st.: Norm. Saltdalen. Dovre. Lom etc.) *Liknar mest Astrag. alp. med fingerhöga klas-skaft, men har mindre och färre blr; bladen stund. nära glatta ofvanpå. — Ph. montana Wg. Fl.L. Phaca lapp. Wg.Fl.Su.*

3 *O. campestris* DC. stjelen uppstigande, med glesa, utstående hår; bladen som hos föreg., med spetsade silkesludna småblad; balj. upprätta, åggrunda—aflånga, uppblåsta mjukhåriga. 24 6, 7. —  $\beta$  sordida: blrna gula med viol. ell. blå fläckar, stund. rent blå; fodertänderna mer jemnbreda och längre än hos  $\alpha$ . Fig. H.N.f.3, n:o 38.  $\beta$  Fl.D.1041. H.N.f.10, n:o 50.

Torra st.,  $\beta$  i Gelltr. r. (Smål. mellan Järeda och Klöfdaläsåg; mellan Fröreda och Prestnäs; Mållila sn vid Årena; Alsheda, vid Kibbe och Ådelfors enl. Schentz. Öl. ymnig på Landtborgarne och Alfvaren, samt nära stränderna. *Goutl.* Närs holme; samt vid Torpet på Sandön: Vestö. —  $\beta$  N. Finnm. Skuggevar i Tana och längs-ester norra sidan af Varangerfjord, ymnig; Bugönäs i Sydvaranger: Norm.) *Blrna hos  $\alpha$  gula; balj. n. 2rummiga, uppblåsta, på Öl. ex. 3—4 gånger längre än sprölet, ehuru mer åggrunda än hos  $\beta$ , hvilket dock torde variera. — Phaca Wg.  $\beta$  Astrag. uralensis L.Fl.Su. och Herb. A. sordidus W.*

2 Flocken **Trifoliese.** Stånd. diadelphiska. Balja enrumm. Hjerblad tunna. [Örtblad 3fingerade.]

### 335. TETRAGONOLOBUS Scop. Klöfverört.

1 *T. siliquosus* Roth: småbladen omv. åggrunda; blomskäften enblommiga; blomskärmen lancettlika. 24 6, 7, g. blr. —  $\beta$  maritimus: mera glatt; bladen köttiga, glest hårkantade. Fig. Jacq.A.361. H.N.f.1, n:o 48;  $\beta$  f.4, n:o 59. Sv.B.448. Fl.D.800.

Fukt. st. och hafstr. r. (Sk. Benestad på kalkbackar vid bäckarne. Smål. Kalmar. Öl. Borgholm; Sörby i Gärdslösa sn etc. — N. Lofoden vid Kunnen. —  $\beta$  Hafstr. Sk. på Hven; Tjörndala enl. F. Aresch. Blek. Smål. Värnanäs; Kalmar; Öro: Tjust i. ex. Gränsö. Öl. *Goutl.*) *Hos hufvudformen äro stjelk, blomfoder och bladen undre sida håriga. — Lotus L.  $\beta$  L. maritimus L.*

### 336. LOTUS Lin. Gigelsärt.

1 *L. uliginosus* Schk. stjelen n. upprätt; stipl. åggrunda; småbl. omv. åggrunda—n. ovala; blomhufvuden 6—12blommiga; fodertänderna före blomm. utsperrade; baljorna raka jemnbreda, ut- ell. nedböjda. 24 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.1521. H.N.f.15, n:o 56. Fukt. st. r. (Skånska slätten vid stränder. Smål. Vestervik. ÖG. Kärna sn. Södm. Stigtomta sn, numera trol. utgången: Ind. Hall. vid Laga-, Löje- och Nissa-år.

*Gottl. St. Carlsh. — N. Brevig.) Större och mera upprät än följ.; stjelen tydlig. — L. major Sm.*

- 2 *L. corniculatus* L. stj. nedliggande; blomhufv. 2—6blommiga; fodertänd. före blomn. tilltryckt; för öfr. som föreg. 2 5, 6, g. blr. Fig. Sv.B.334. Fl.D.991. H.N.f.15, n:o 55, var.

Betesmark etc. a. (Sk.—V.B. och Jemll. — N. till Finnm.) Var. glatt och luden, samt får på stränder köliga blad: var. *crassifolius* H.N.

- 3 *L. tenuifolius* Reich. stj. nedligg.—upprät; stipl. lancettlika; småbladen lancettlika—aflånga och mot spetsen bredare; för öfr. som föreg. 2 5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.1995. H.N.f.12, n:o 58.

Fukt. st. helst nära hafvet. (Sk. mell. Skanör och Landskrona; Skillinge på öst. kusten enl. F. Aresch. Smål. Kalmar. Hall. Särö.) Mycket spåddare, ehuru ofta med längre grenar än föreg., mer glatt och såblommig. — *L. tenuis* Kii.

### 337. MEDICAGO Lin. Luzern, Smäre.

† Baljorna oväpnade, öppnande sig vid mognaden.

- †1 *M. sativa* L. stjelen n. upprät; de nedre stipl. något tandade, de öfre helbräddade; småbladen aflånga—omv. äggrunda, mot spetsen tandade; blrna i klase, med skaft kortare än blomskärmen; kronseglet ådrigt; baljorna smäckformigt vridna, n. glatta. 2 6, 7, viol.—g. blr. Fig. Fl.D.2244. H.N.f.7, n:o 37.

Ängsback. r. (Sk. vid Tågarp nära Trelleborg; Malmö; Landskrona etc. Blek. Carlskrona. Smål. Skramstad i Gamleby sn; Vestervik; Visingsö. ÖG. Södml. Målsåker. Stockh. vid Skönstavig; Djurgården; Vermdön, på Vindön etc. Uppl. Ekolsund. Ner. Sierestädes. Öl. Näsby i Ås sn. Gottl. Malmö i Helvigs sn; Siite hamn.) *M. sat. versicolor* Koch.

- 2 *M. silvestris* Fr. stj. uppstig. ell. nedliggande; stipl. och småbl. som hos föreg.; blrna i kort klase, med skaft meränd. längre än skärmen; kronseglet som hos föreg.; balj. halfcirkelformigt ell. mer krökta. 2 7, 8. — *β procumbens*: stjelen nedliggande; stiplerna större, tandade. Fig. H.N.f.7, n:o 38. *β* 39.

Ängsback. åkerrenar. r. (Sk. Malmö, Lund m. fl. st. enl. F. Aresch. Stockh. på Stora Höggarn. Uppl. Höja. VG. KinnekuLe. Hall. Halmstad, vid Nissa-ån: Theor. Öl. Gottl. — *β Uppsala*. Öl. Gottl.) Blrna mest gula, men var. som föreg. i grönt och viol. Är en medelform mell. föreg. och följ. samt trol. *M. media* Pers., hvilken dock föres till än den ena, än den andra.

- 3 *M. falcata* L. stj. uppböjd; småbl. aflånga ell. jemnbreda, mot spetsen tandade; blrna som hos föreg., med blott nedtill ådrigt segel; balj. aflånga halfmånlikt böjda, något håriga. 2 6, 7, g. säll. viol. blr. Fig. Sv.B.248. Fl.D.233. H.N.f.7, n:o 40.

Back. åkerrenar. (Sk.—Uppl. Boh. Öl. Gottl. — N. Christiania; Bergen; aldrig funnen vild af Prof. Blytt.) Småbladen smalare än hos de föreg.

†† Baljorna affallande öppnade.

- 4 *M. lupulina* L. stj. och grenar nedligg. ell. uppböjda; stipl. helbräddade; småbl. omv. äggrunda, i spetsen tandade; blrna i ovala täta mångblomm. hufvud; baljorna njurlika oväpnade enföriga. ☉ 6—8, g. blr. — *β Willdenowiana*: balj. med ledade glandelhår. Fig. Fl.D.992.

Åkerrenar, väg. (Sk.—Helsl. Medelp. Selånger sn, Silje; Sundsvall: Ind. Ängml. Utansjö bruk: Arn. Dal. Boh. Öl. Gottl. — N.) Spådd med mycket små blr.

- 5 *M. minima* Lam. stj., stipl. och småbl. som hos föreg.; blrna i rundade, 3—6blommiga hufvud; balj. smäckformigt tätt hoptridna, med krokuddiga taggar. ☉ 6, 7, g. blr. Fig. Fl.D.211. H.N.f.1, n:o 47.

Sandback. r. (Sk. vid Käseberga i branterna mot hafvet. Sedan flere år förvildad i Södml. kring Nyköping enl. Ind.) Småbl. ofta smalare än hos föreg.; baljorna klotrunda, af större årters storlek, med nästan en linie långa taggar. — *Med. polymorpha* *μ minima* L.

### 338. MELILÖTUS Adans. Amur.

† Stiplerna syl-lika, helbräddade.

- 1 *M. officinalis* (L.) Willd. småbladen omv. äggrunda—aflånga, sågade; alla kronbladen

lika långa; baljorna kort skaftade, äggrunda, kortspetsiga rynkiga småhåriga.  $\gamma$  7, g. blr. —  $\beta$  *macrorrhiza* Pers. de öfre bladens småbl. aflånga. Fig. Fl.D.934. H.N.f.6, n:o 33;  $\beta$  32.

Äng. vid väg etc. (Sk. teml. allmän. Eljest sälls., kanske oftast förvildad. Blek. Carlkrona. Småbl. Kalmars; Vestervik; Jönköping enl. Scheutz. ÖG. mångenstād enl. Kindb. Södm. Tullgarn; Nyköping, vid Rosenkälla: Ind. Stockh. Medelp. Vifsta varf; Sundsvall enl. Leml. Verml. Ölmeåhrad vid Långnäs. Ner. Latorp; Åskersund. VG. Kinnekulle. Boh. Strömstad; Qville sn, Hjertö; Koön. Öl. Götll.) Stjelken uppgående, hög; blrna större än hos de följ. arterna. — *Trifolium Melilotus officinalis* L. *M. macrorrhiza* ed.8.

2 *M. arvensis* Wallr. småbl. som hos föreg.; kölen kortare än de öfriga lika långa kronbladen; baljorna kort skaftade, omvändt äggrunda, trubbiga med udd, n. släta och glatta.  $\gamma$  7, g. blr. Fig. Sv.B.69. Sturm, 15 häft. H.N.f.6, n:o 34.

Torra st. r. (Sk. Småbl. Kalmars. ÖG. Söderköping: L. V. Djurh.; Dagsmosse; Kars-torp vid Svartån enl. Kindb. Stockh. vid Stockby i Danderyd sn. Rosl. Östhammar på Söderöns stränder. Hall Halmstad: Theor. Öl. Stundom förvildad, såsom vid Uppsala, och Gefle på Brobänken samt Vestml. vid Nordanby. — N. Porsgrund; Christiania etc.) Bladtänderna korta, mest trubbiga, försvinnande nedom småbladets midt; baljorna hos denna och föreg. art långt ulskjulande ur fodret; blrna mindre än hos föreg., blekare och stundom nästan hvita, då den blir *M. Petiolaris* Willd. — *M. officinalis* Lam. och ed.8.

3 *M. alba* Lam. småbl. smalt omv. äggrunda—afånga, sågade; vingarne och kölen kortare än seglet; baljorna oskaftade, äggrunda nätrynkiga och glatta, till hälften inneslutna i fodret.  $\gamma$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.69, f.d. Fl.D.1705. H.N.f.6, n:o 35.

Gat. och odl. st. r. (Sk.—Gefle. Helsl. Söderhamn, Bollnäs etc. Medelp. Sundsvall. Dal. Vestml. Vesterås. Ner. Tysslinge och Asker snr. Verml. Björkefors i Sunne sn. Boh. Strömstad; Mörstrand. Hall. Halmstad: Theor. Götll. — N. Christiania och södra prov.) Stjelken vanl. upprätt, stundom manshög och busklått grenig; bladen variera mycket till formen, men arten skiljes lätt af de oskaftade baljorna. — *M. vulgaris* Willd. Trifol. Melil. var. L.

†† Stipl. med horstlika tänder vid basen.

4 *M. dentata* Pers. småbladen aflånga, tättaggsågade; blrna som hos föreg.; baljorna oskaftade, ovala föga rynkade, glatta.  $\gamma$  7, g. blr. Fig. Fl.D.1883. H.N.f.10, n:o 49. Hafsstr. r. (Skånes vstra kust vid Borreby, Hillesborg i Hårslöf sn.) Har kortare blomklasar än de föreg., föga längre än bladen; blrna mycket små; småbladens sågtänder föga utmärkta af annat än de borstlika uddarne.

### 339. TRIFOLIUM Lin. Väpling, Klöfver.

† Blrna gula ell. bruna; seglet merändels refladt, med nedböjd spets.

\* Alla småbladen oskaftade; stipl. lancettlika.

1 *T. spadicum* L. stjelken upprätt; stipl. kortare än bladskafen; småbl. aflånga—smak omv. äggrunda; blomhufvud elliptiska, tätblomm., med håriga blomfoder.  $\gamma$  6—8. Fig. Sturm, 16 häft. H.N.f.3, n:o 37.

Äng. r. (Medl. Sverige. ÖG. Södm. Ner. och Verml. — Ängml. och Jeml. Öl.) Har i början gulaktiga, sedan bruna glånsande blomhufvud.

2 *T. agrarium* L. stjelken merändels upprätt; stipl. icke kortare än bladskafen; småbl. som hos föreg.; blomhufvud ovala tätblommiga, med mycket fårade segel, n. glatta blomfoder.  $\gamma$  7, g. blr. Fig. Fl.D.558. H.N.f.9, n:o 52.

Äker- och ängsback. (Sk.—Gestr. Gefle och Ofvansjö kungsgård. Helsl. Hudiksvall. Medelp. Siljeberget. Ängml. Sidsjö sn; Hernön: Arn. Dal. Boh. Hall. nor. del.: Leml. Öl. Götll. — N. till Trondhj.) Fodrets tänder hos denna och följande hafva några få hår. Var. i södra Sv. med nedliggande stjelk. — *T. aureum* Poll., saml. Godr. & Gren.

\*\* Mellersta småbladet skaftadt; stipl. äggrunda.

3 *T. procumbens* L. stjelken merändels nedliggande; stipl. kortare än bladskafen; småbl. omv. äggrunda—viggliska, trubbiga ell. urnupna; blomhufvud låta ovala, med

n. glatt blomboder, mycket fårade segel. ☉ 6, 7, g. blr. — *β humile*: småbladen vigglika urnupna; blomhufvudskäften längre än bladen. Fig. Sturm, 16 h. H.N.f.9, n:o 53. *β* F.I.D.796.

Torra betesm. (Sk. allmän. — Stockh. Ner. Verm. Boh. Öl. Gottl. — N. Arendal; Spjärland, Svinesund; Hvalöarne; Christiania.) *α* 6—10 tum lång, till alla delar större och mer nedliggande: *T. campestre* Schreb.; *β* mindre, oftast upprätt och mycket grenig: *T. procumbens* Schreb. i Sturms Fl. — *T. agrarium* Godr. & Gren.

4 *T. filiforme* L. stjelen meränd. nedliggande; stipl. ungefär af bladskäftens längd; småbl. som hos föreg.; blomhufvud glesa; blombodr. n. glatt; seglen omärkligt strimmade, n. släta. ☉ 6, 7, blekg. blr. Fig. F.I.D.1707. E.B.1256. H.N.f.2, n:o 48; f.9, n:o 54.

Betesm. r. (Sk. ymnig. *Blek* i Lyckebytrakten och nor. delen. Småll. Kalmar; Vester-vik; Hagby; Elmaboda: Scheutz. VG. Degeberg. Boh. Hall. Öl. Gottl. Hoburgen m. fl. st.; Fårön. — N. Laurvig. Christiansands st. upp till Findö.) *Har 2 former, en större, med mer utdragen stielk, omv. åggrunda blad, rikare och tätare blomhufvud: T. minus* Sm. [*T. procumbens* Godr. & Gren.], samt en mindre, med vigglika blad och fåblommiga glesa bl.hufvud: den ursprungliga *T. filif. Raji* Synops. t.14.f.4 [samt Godr. & Gren.].

†† Blrna hvita ell. hvitroda.

\* Blombodren slutligen blåsligt uppsvållda.

5 *T. fragiferum* L. stjelen nedliggande; blomhufvuden klotrunda, skaftade; blombodrets öfre del slutl. uppbålad, hårig, jemte tvänne af fodertänderna nedböjd. 2 7, 8, rödl. blr. Fig. Sv.B.714. F.I.D.1042. H.N.f.11, n:o 50.

Sjö- och hafsstr. r. (Sk.—Uppl. vid Mälaren etc. t. ex. Stockholm vid Carlbergs kanal; Ulriksdal etc. Rosl. Hargs bruk; Söderön etc. Medelp. Sundsvall. Vestml. Barkarö; Vesterås, i Biskopshagen. Hall. Boh. Öl. Gottl. — N. Hvalöarne; Mandal; Christiania etc.) Småbladen små ovala mycket nerviga, i spetsen något intryckta.

\*\* Blombodren glatta, icke blåslika.

6 *T. repens* L. stjelen krypande, med långa blomhufvudskäft från bladvecken; småbladen meränd. omv. åggrunda, i spetsen intryckta; blombodrets tänder märkbart oliklånga. 2 6—9, hv. stund, rödl. blr. Fig. Sv.B.344. F.I.D.990.

Ång. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Var. med n. åggrunda småblad.

7 *T. hybridum* L. stjelen uppstigande, grenig, med blomhufvudskäft i öfre bladvecken; småbladen ovala ell. åggrunda trubbiga; blombodrets tänder n. liklånga. 2 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.129. F.I.D.1706. H.N.f.7, n:o 36.

Ång. (Sk.—Ångml. VB. Björkfors i nor. delen. Jemt. Östersund. Vestml. Ner. Verm. VG. Hall. Öl. Gottl. — N. Christiania; Drammen.) Baljorna få sällan mer än 2 mogna frön, hos föreg. vanl. 3—4.

\*\*\* Blombodren håriga, icke blåslika.

8 *T. montanum* L. stjelen rak upprätt; småbl. bredt lancettlika, spetsiga, taggsågade; blomhufvuden klotrunda skaftade, utan skärmblad; fodret kortare än kronan; seglet smalt, utdraget, dubbelt längre än vingarne. 2 7, 8, hv. blr. Fig. F.I.D.1172.

Torra st. (Sk.—Gestr. Heds. Friggessund i Bjuråker; Wistr. Vestml. Ner. VG. Falbygden. Hall. Hasslöf: Theor. Öl. Gottl. — N.) Roten tapplik; baljorna enfröiga håriga.

9 *T. striatum* L. stjelen som hos föreg.; småbl. omv. åggrunda, otydligt sågade; blomhufvuden åggformiga, de på sidan oskaftade, inom skärmblad; blombodret ludet, med upphöjda nerver, syl-lika tänder, knappt kortare än kronan. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B. 616. F.I.D.1171. H.N.f.15, n:o 54.

Torra st. r. (Sk. Ystad; Cimbritshamn; Köpinge; Trelleborg; Lund; Malmö; Skabersjö; Rå; Helsingb. etc. *Blek* Carlskrona, Tyskbagarebergen; Ronneby m. fl. st. Småll. södra delen af Kalmar län. Norra Hall. vid berget Klefskyrka i Släp st. Öl. Ramsåtra; Thorslunda och Kastlösa snr: G. v. Ced. Fordom äfven på Gottl. i Linderfve.) Öfverallt mjukhårig; blrna små rödlätta.

10 *T. arvense* L. stj. som hos föreg.; småbl. n. jemnbreda, mot spetsen bredare, n.

*helbräddade*; blomhufvuden *aflånga*, *skafstade*, utan skärmbli., mycket håriga; fodret med borstlika tänder, *dubbelt längre* än kronan. ☉ 6, 7, rödlätta blr. Fig. F.I.D.724. Back. (Sk.—Gestr. Helsl. Tuna sn vid Vi by. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Styrso; Tanum sn. Öl. Gottl. — N. till Trondhj.) *Hela växten mjukhårig. Var. med nedtryckt, utsperradt grenig stjelk: var. prostratum Myr.*

+++ Blommorna högröda.

11 *T. pratense* L. stjelken uppstigande, rak; stipl. *ågggrunda*, uddspetsiga; småbli. *ågggrunda*—omv. *ågggrunda*, svagt tandade; blomhufvuden 1—2 tillsamm., vanl. oskafstade, *åggformiga*; blomsfodrets nedre tand *föga längre* än foderpipen. 2 6—8, r. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.268. F.I.D.989.

Ång. a. (Sk.—Lpl. — N. till Senjen; Noïm.) *Blomhufvud vanligen inom skärmbliad, stundom kort ulskjulande; fodret öfverallt hårigt. Hela växten stundom silkestuden.*

12 *T. medium* L. stjelken uppstigande, merändels *flerböjd*; stipl. n. *jembreda*, sylspetsade; småbli. *lancettlikt aflånga*, svagt tandade; blomhufvudet ensamt, slutt. *skafstadi, klotrundt*; blomsfodrets nedersta tand *föga längre* än pipen. 2 6—8, r. blr. — *β strictum*: rakare stjelk, smalare blad. Fig. Sv.B.460. F.I.D.1273.

Ång. löfskogsback. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Lofoden. — *β Öl. Gottl.*) *Har nästan helbräddade småblad, axen ofta utan skärm; blomsfodren n. glatta, med håriga tänder. β lages ofta för T. alpestre. — T. flexuosum Jacq.*

13 *T. alpestre* L. stjelken rak; stipl. *syl-lika*; småbli. *smalt lancettlika*, svagt tandade; blomhufvuden *oskafstade, klotrunda, tvänne* tätt sittande inom samma skärmbliad; fodrets nedre tand 2—3 *gångar längre* än pipen. 2 7, 8, r. blr. Fig. Jacq.A.433. H.N.f.13, n:o 62.

Ångs- och skogsback, r. (Sk. i synnerhet södra delen. Af Prof. Fries tagen vid Harlösa; äfven funnen vid Roslät och Kullaberg. Sannolikt icke återfunnen i sednare tider: F. Aresch.) *Blomhufv. synes före blomningen fullt med långa borst, mycket längre än de outslagna blrna, härrörande af fodrets ofvannämnda långa tand.*

5 Flocken **Genistese.** Stånd. monadelphiska. Balja enrummig. Hjärtbl. tunna. [Örtbl. vanl. 3fingrade ell. enkla.]

### 340. SAROTHAMNUS Wimm. Hare-ris.

1 *S. scoparius* Koch: grenarne kantiga, utan taggar; bladen enkla och 3fingrade, med aflånga småblad. ½ 6. Fig. Sv.B.421. F.I.D.313.

Torra st. r. (Sk. Engelholm, Höja; Söfde; Gualöf; Torup etc. Hall. Gåsevadsholm; Hasslöf och Skottorp, i furuplant.; Theor. VG. på en ö i Venern; Göteborg. mellan Elfsborg och staden. Boh. Gunnebo, Fåssbergs sn. Smål. Nottebäck: Åsheda sn. Stockh. nära Rydboholm. Gottl. Slite, och vid Etebols i Lummelunda enl. G. v. Ced. — N. Mandal, införd med hallast.) 2—5 *fots buske med stora gula blr, som ofta bilda rika klasar. — S. vulgaris Wimm. Spartium L.*

### 341. GENISTA Lin. Ginst.

1 *G. germanica* L. stammen med sammansatta taggar; blommgrenarne oväpnade, jemte de lancettlika bladen *långhåriga*; blomklasarne i toppen, med omärkl. blomskärm; baljorna *ludna*. ½ 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.547. F.I.D.1826. H.N.f.13, n:o 64.

Bland ljung, r. (Sk. Saxalljung i Finja sn: Doc. P. Olsson enl. G. v. Ced. Hall. mellan Fostaby och Enslöfs färjställe, vid Hålvägen på venstra vägkanterna, då man kommer från Fostad; Skedala exercisfält; Theor: fordom på Mikedala berg i Vapnö socken. Dalsl. på en ljungbacke nära Sunnanå i Holms sn.)

2 *G. tinctoria* L. stammen *oväpnad*, med uppräta trinda och uppböjdt strimmiga grenar, jemte de lancettlika bladen *nästan glatta*; blomklasarne i toppen, med skärm vid blrna; baljorna *glatta*. ½ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.451. F.I.D.526. H.N.f.5, n:o 46. Betesmark. r. (Hall. Halmstad, allmän: Theor. VG. mellan Börstorp och Släuevalla; på en höjd i Malma på Hunnebergssidan; Lyrestads prestgård i Nordängen; på kanalbankarne nära Sjötorp, m. fl. st.) *Fotshög buskväxt.*

3 *G. pilosa* L. stammen *oväpnad*, nedliggande, knölig; bladen lancettlika, mot spetsen bredare, på undre sidan jemte kronan *silkesmåriga*; blrna 1, eller flere tillsamman,

på grenarnes sidor, närmade till klesar i dessas topp; baljorna *småludna*.  $\frac{1}{2}$  5, 6, g. blr. Fig. Sv.B.678. Fl.D.1225. H.N.f.1, n:o 46.  
Ljunghedar, r. (Sk. nordvest. delen. Hall. i söd. del. ymnig. Smål. Femsjö, vid Elmås; Vrå.) *Några tum stor, nedtryckt buskväxt.*

## 342. ONONIS Lin. Stallört.

1 *O. campestris* Koch & Ziz. stjelken upprät, ell. uppstigande, *skiftevis* på en sida *tydligare hårig, taggig* af nedtill *parvisa* tornar; småbl. n. glatta, aflånga; blrna mest ensamma, i bladiga klesar; balj. ågrunda, *icke kortare* än fodret.  $\frac{1}{2}$  6, 7, r. blr. Fig. E.B.682. H.N.f.10, n:o 44.

Torra äng. r. (Sk. Limhamn och på stranden nedom Edenryds gästg.; Lund, Örestädes; Ystad, på fl. st.; Oppmanna. Gottl. Visby gamla hamn; Sandön, vid Torpet: Stud. Eisen och Stuxberg. — N. Arendal; Christiania.) *Stjelken mer tråktig än hos följ., öfverallt småluden, med en sida långhårig; de långa tornarne hafva vanl. en mindre torn ned vid sidan; bladen smalare och mera glatta. — O. spinosa Koch. Syn. O. antiquorum Lin. herb.*

2 *O. arvensis* L. stjelken nedligg. eller uppböjd, *likformigt småluden*; yngre oväpnad, *stult, med enkla* tornar; småbl. ovala eller bredt aflånga; blrna som hos föreg.; balj. ågrunda, *kortare än* fodret.  $\frac{1}{2}$  7, 8, rød, stund. hv. blr. Fig. Sv.B.243. Fl.D.783, enl. Reich. H.N.f.10, n:o 45 och 46.

Torra äng. (Sk.—Uppl. Medelp. Sundsvall. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N.) *Nedligg., ofta rotsläående vid basen, med uppstigande toppar; mer glandelhårig än föreg. Har stundom parvisa blr. Föga skild art. — O. spinosa L.Fl.Su. O. repens L.Sp.Pl. O. procurrens Wallr.*

3 *O. hircina* Jacq. stjelken upprät, ell. uppstig. jemte grenarne *öfverallt långt klubbhårig, alltid oväpnad*; småbladen meränd. ågrunda; blrna *parvisa*, n. i ax; balj. som hos föreg.  $\frac{1}{2}$  7, r. blr. Fig. Fl.D.1584. Jacq.H.93. H.N.f.10, n:o 47.

Äng. åkerrenar. (Sk.—Uppl. Jemtl. vid Östberget på Frösön. Vestml. Ner. Verm. vid Christinehamnselven. Boh. Öl. Gottl. Sandön, vid Torpet: Eis. och Stuxb. — N. södra och vest. delar upp till Lysöen i Trondhjems st.) *Stjelken mer örtartad än hos de föreg., mycket mer luden; illaluktande.*

## 343. ANTHYLLIS Lin. Getväpling.

1 *A. Vulneraria* L. bladen parbladiga, uddbladet störst; blomhufv. tvänne, tätstättande i stjelkens spets.  $\frac{1}{2}$  7. —  $\beta$  *ochroleuca*: blrna gulaktigt hvita. —  $\gamma$  *coccinea*: med röda blr. Fig. Sv.B.395. Fl.D.988; 2728 och 2729, varr. H.N.f.10, n:o 48.  $\gamma$  H.N. f.14, n:o 57.

Ängsback. (Sk.—Uppl. och Dal. Herjed. Ulfberget vid Viken. Jemtl. Åreskutans södra Hummel; Fölinge sn; Rödön och Frostviken. Um. Lpm. Storforsen. Lul. Lpm. Qvikkjokk. Boh. Öl. Gottl. — N. till Alten. —  $\beta$  Öl. Gottl. —  $\gamma$  ÖG. Kanalbenkarne vid Husby. Öl. Gottl.) *Har vanligen gula blr.*

## 9 KLASSEN

### CENTRIFLORÆ.

62 Fam. **ERICINEÆ** Juss. Blr samkönade, af 4—5, mer och mindre samväxta ell. fria kronblad. Frukt sierrummigt, mångfröigt fröhus eller bär, med centralt fröfäste. Stift enkelt.

1 Flocken **Vacciniosæ**. Frukt inom och beklädd af fodrets bas [under blomman], bärlik.

#### 344. MYRTILLUS Gilib. Blåbärsbuske.

1 *M. nigra* Gil. grenarne *kantiga*; bladen *äggrunda sågade*, glätta; blrna i bladvecken; kronan n. *kloformig*. 2½ 5, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.163. Fl.D.974. Skog. a. (Sk.—Lpl. — N.) Fodret *odeladt, ringformigt*; bären *svariblä*: *Blåbär*. — *Vaccinium Myrtillus* L.

2 *M. uliginosa* Drej. grenarne *trinda*; bladen *omv. äggrunda, helbräddade* glätta; blrna *gyttrade* i grenarnes spets; kronan *äggsformigt klocklik*. 2½ 5, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.331. Fl.D.231.

Skogskärr, a. (Sk.—Lpl. — N.) *Bären blå, större än hos föreg.: Uddbär ell. Odbn.* — *Vaccinium* L.

#### 345. OXYCOCUS Pers. Tranbär.

1 *O. palustris* Pers. stjelen *trådlk, krypande, glatt*; bladen *äggrunda*, med *utbökade* helbrädd. kanter, under *hvitgrå*. 2½ 5, 6, r. blr. Fig. Sv.B.12. Fl.D.80.

\* *microcarpus* Turcz. till alla delar *spädare*, med *hållsten* mindre blr och bär; blomskåften och *foderflikarnes* kanter *glatta*.

Tufviga kärr, a. (Sk.—Lpl. — N. — \* Helst i fjelltr. Torn. Lpm. Lul. Lpm. Qvikkjokk. Jemtl. VB. Uppl. Tibble: allt enl. Th. Fr. Blek. Johannishus enl. G. v. Ced. — N. hela Finnm.: Th. Fr. Nordl.: Norm. Lomsfjellen: Moë.) *Bären stora och röda. Blomskåften hos hufvudformen mjukhåriga och foderflik. härbräddade.* — *Vaccinium Oxyc. L. Schollera* Roth.

#### 346. VACCINIUM Lin. Lingonris.

1 *V. vitis idæa* L. bladen *omvänt äggrunda* med *nedböjda naggsågade* kanter, under *punkterade*; blrna *klavisa* i toppen, med *utskjutande stift*. 2½ 5, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.116. Fl.D.40.

Skogsback. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Bären röda, säll. hvita.*

2 Flocken **Ericosæ**. Frukt fri, inom blomman. Frön utan hylle.

#### 347. ARCTOSTAPHYLOS Adans. Mjölönris.

1 *A. officinalis* W. & Gr. bladen *af långt omv. äggrunda, läderaktiga, helbräddade, silda* med *intryckta nerver*. 2½ 5, rödl. blr. Fig. Sv.B.85. Fl.D.33.

Skogsbed. a. (Lpl.—Sk. nor. del. och Hall. söd. del. Gottl. — N.) *Beständigt grönskande, med röda saflösa bär. — Arbutus Uva ursi L.*

2 A. *alpina* Spr. bladen omv. äggrunda, sågade, ojemna af på undre sidan upphöjda nerver. 2½ 5, hv. blr. Fig. Sv.B.487. Fl.D.73.

Fjelltr. (Lpl.—Dal. — N.) *Bladen vissna öfver vintern; bären svarta saftiga.*

### 348. ANDRŌMEDA Lin. Rosling.

1 A. *polifolia* L. bladen lancettlika—jemnbreda, med tillbakavikna kanter, under gråhvita; blomskäften flockvis gyttrade, i toppen, med äggformiga blr. ½ 5, 6. Fig. Lin.Fl.L.t.1.f.2. Sv.B.445. Fl.D.54.

Kärr. (Lpl.—Sk. nor. del. och Hall. söd. del. Öt. Borga träsk. Gottl. — N.) 1—2 qv. hög, med vackra hvita, mer och mindre rödl. blr.

2 A. *tetragona* L. bladen n. trekantiga med pil-lik bas, tegellagda i 4 rader; blomsk. ensamma från bladvecken, med klocklika blr. ½ 7, hv. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.1.f.4. Fl.D.1030. H.N.f.8, n:o 50.

Fjellv. r. (Torn.—Pil. Lpm. — N. Finnm.—Salten.) 1—3 qv. hög buskväxt, liknande grof ljung. — *Cassiope* DC.

3 A. *hypnoides* L. bladen syl-lika, tätt sittande; blomsk. ensamma i toppen, med klocklika blr. 2½ 7, 8. Fig. Lin.Fl.L.t.1.f.3. Fl.D.10. H.N.f.8, n:o 51.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N. Finnm.—Dovre; Sölenfeld vid Fämundsjön; Valders; Tind etc.) *Liten, beständigt grön, n. lik en moss; blrna hvita med rödl. bräm. — Cassiope* DC.

### 349. ERICA Lin. Klockljung.

1 E. *Tetralix* L. bladen mest 4 i krans, lancettlikt jemnbreda, med tillbakavikna kanter, glandelhåriga; blomkronorna vidgad äggformiga, i hufvudlika flockar. ½ 6—8, ljus. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.439. Fl.D.81.

Ljungkärr. (Sk.—Vernl. och Ner. Blek. vest. delen. Smål. Kalm. län, i Madesjö sn; Vimmerby; Bänarp i Lönnberga sn: Scheutz. Södm. i Kila sn: C. Ind. Mest i de vestra prov. — N. till Finnm.) *Bladkanterna mindre betäckande undre bladytan än hos följ.*

\*2 E. *cinerea* L. bladen mest 3 i krans, barrlika, under konvexa, med en smal fåra efter midten, glatta; kron. aflångt äggformiga, n. i hufvud eller grenig klase. ½ 7, 8, violetteröda blr. Fig. Fl.D.38. H.N.f.11, n:o 51.

Klipp. och back. r. (N. Stavangerfjorden på Rennisöe. Bergens st. vid Evenvig, Stensund, Husöe etc.)

### 350. CALLUNA Salisb. Ljung.

1 C. *vulgaris* Sal. bladen motsatta oskaftade, med pil-lik bas; blrna i ensidiga klasar. ½ 8, r. ell. hv. blr. Fig. Sv.B.53. Fl.D.667.

Hedar och skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) *Grenarne 4kantiga af de till sittande bladen; stundom utvåxa dessa och blifva syl-lik jemnbreda och utböjda. Var. glatt och småluden. — C. Erica* DC. *Erica vulg. L.*

### 351. PHYLLODOCE Salisb. Lappljung.

1 P. *coerulea* Sal. bladen jemnbreda, i kanten sträfvä; blrna lutande på skaft gyttrade i grenarnes spets. ½ 7, viol. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.1.f.5. Sv.B.535. Fl.D.57. H.N.f.3, n:o 48.

Fjellv. (Lpl.—Dal. — N.) 3—8 tum hög. — *Andromeda* L. *Menziesia* Smith.

### 352. AZALEA Lin. Krepling.

1 A. *procumbens* L. stammen nedtryckt; bladen aflånga trubbiga glatta, med tillbakaböjda kanter; blrna i grenarnes spets. ½ 7, 8, r. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.1.f.2. Fl.D.9. H.N.f.15, n:o 58.

Fjellv. (Lpl.—Dal. — N.) *Har fingerlånga vedartade grenar, alltid grönskande blad. — Loiseleuria* Desv. *Chamaedon* Link.

### 353. RHODODENDRUM Lin. Alp-ros.

1 R. *lapponicum* Wg. bladen äggrunda trubbiga, punkterade och kådprickiga; blrna



flockvisa i toppen, med glatta kronor.  $\frac{1}{2}$  6, 7, viol. blr. Fig. Lin.Fl.L.6.f.1. Sv.B. 481. FLD.966. H.N.f.9, n:o 55.

Fjellv. r. (*Torn*. tråsk. *Lul. Lpm.* teml. allm. i alla de högre fjelltrakterna: C. Ind. *Pil. Lpm.* Tjiddjakk. — N. Finnm. på Goskevere och Sakkavare i Alten-Talvig past., m. fl. st. Nordl. Sulitälma, Kaddåive: H. Widm. Gudbrandsdalen, Lomseggen på sidan åt Båfverdalen.) Några få tum hög buskväxt, uppskjutande blott qvistarnes topp med blad och blr öfver jordytan. Ståndarne 5 eller 10, längre än kronan. — *Azalea L.*

### 354. LEDUM Lin. Squattram.

1 *L. palustre L.* bladen jernnbreda—aflånga, med tillbakavikna kanter, under brunulliga.  $\frac{1}{2}$  6, hv. blr. —  $\beta$  *dilatatum*: bladen aflånga. Fig. Sv.B.18. FLD.1031. H. N.f.15, n:o 57.

Tufviga skogskärr. (*Lpl.*—*Sk.* nor. del. och *Hall.* söd. del. *Öl.* nor. del. *Gottl.* — *N.*) *Alnshög buske*, med blr i tät flock.  $\beta$  har dubbelt bredare blad än den vanliga, men ej så ovala som *L. grönlandicum Retz.*

3 Flocken **Pyrolaceæ**. Frukt fri. Frön omgifna af ett aflångt hylle.

### 355. PYRÖLA Lin. Vintergrön.

† Blrna i klase; ståndarknapparne utan bihang.

\* Stiftet nedböjdt.

1 *P. rotundifolia L.* bladen rundade, läderaktiga, af skaftens längd; blrna i rak mångblommig klase, vidöppna; foderflikarne lancettlika fränböjda; stiftet längre än kronan.  $\frac{1}{2}$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.304. FLD.1816.

Skog. a. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finmm.) Bladen  $1\frac{1}{2}$  tum långa och n. lika breda.

2 *P. chlorantha Sw.* bladen som hos föreg., kortare än deras skaft; blrna i vanl. flerböjd, fåblommig klase, vidöppna; foderflik. *triangulära tilltryckta*; stift som hos föreg.  $\frac{1}{2}$  7, 8, hleg. blr. Fig. Sv.B.453. FLD.1693. H.N.f.13, n:o 65.

Barrskog. (*Sk.*—*Ängml.* och *Jeml.* Boh. Oroust, i Svineviks skog. *Hall.* Torup; Skottorp: Theor. *Öl.* *Gottl.* — *N.* till Nordl. Bejeren: Norm.) Bladen knappt  $\frac{1}{2}$  tum i längd och bredd.

\*\* Stiftet rakt, upprätt.

3 *P. media Sw.* bladen rundade, läderaktiga; blrna i allsidig klase, halft klotrunda, något slutna; stiftet kort utskjutande.  $\frac{1}{2}$  7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.311. FLD.110. H.N.f.9, n:o 56.

Skog. r. (*Sk.*—*Helsl.* *Ängml.* Skog sn, Gallsättsbölen. *VB.* Umcå: Reuterm. *Jeml.* Dal. *Vestml.* Ner. *Verm.* *Gottl.* — *N.* Christiansands och Bergens stift. Molde. Solber i Österdalen. Finmm. Renöe; Skjervö: Norm.) Har dubbelt större blr än följ.; bladen vanl. större än hos någon af de öfr. arterna. — *P. rotundifolia FLD.*

4 *P. minor L.* blrna n. klotrunda tillslutna, med inneslutet stift; för öfr. som föreg.  $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. Sv.B.550. FLD.55.

Löskog. etc. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.*) Blrna hv. ell. rödlätta, smärre än hos föregående arter; bladen stund. n. ovala. Fig. i Sv.B. dålig. — *P. rosea Sm.*

5 *P. secunda L.* bladen ovala, spetsiga, finsågade; blrna i ensidig klase, aflånga; stiftet långt utskjutande.  $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. Sv.B.566. FLD.402.

Skog. a. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finmm.) Blrna grönaktigt hvila.

†† Blomman ensam; ståndarkn. med 2 från hvarandra böjda hornlika bihang vid basen: *Moneses Sal.*

6 *P. uniflora L.* bladen rundade, hvess-sågade; blomman nedböjd, vidöppen, med långt rakt stift.  $\frac{1}{2}$  7, hv. blr. Fig. Sv.B.176. FLD.8.

Fukt skog. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finmm.: Norm.) *Fingerhög*; blomman väl-luktande; frukten upprät. — *Chimaphila Fr. S.V.Sc. Mones. grandiflora Salisb.*

+++ Birna i flock; stånd. som i föreg. afd.; stiftet omärkligt.

- 7 *P. umbellata* L. bladen läderartade, vigglika, ofvan midten sågade; blomflocken 3—6blommig. 2 $\frac{1}{2}$  7,8, rödl. blr. Fig. Sv.B.27. Fl.D.1336. H.N.f.16, n:o 55.  
 Barrskog. r. (Sk. Baldringe; Blekmåsa enl. Scheutz. Smål.—Held. och Dal. Verml. Dalsl. Boh. Hall. Halmstad. Öl. Götth. — N. Dramsfjorden mell. Hurum och Holmsboe; Ulderud; Christiania.) Omkr. quartershög buskväxt; bladen n. kransvisa, trubbiga ell. kortspetsiga. — *Chimaphila* Nutt.

356. MONOTROPA Lin. Gultopp, Tallört.

- 1 *M. Hypopitys* L. blomklasen i yngre tillstånd nedböjd; sidoblirna med 8 ståndare. 2 $\frac{1}{2}$  7,8, g. blr. —  $\beta$  *glabra*: blommans delar aldeles glatta. Fig. Sv.B.97. Fl.D.232;  $\beta$  2051. Reich.f.675.

Skog. r. (Sk.—Gestr. Held. Kölberget i Hanebo sn. Vestml. Ner. Verml. VG. Dalsl. Boh. Orust, i Svineviks skog m. fl. st. enl. Leffl. Öl. Götth. — N.) Hela växten blekgul, bladlös, fjällig; kronbl. och ståndare hos  $\alpha$  håriga; roten bestående af en massa mögel-lik trådar och gulaktiga rotknölar, fast hoppgylltrade med jord och andra växters rottrådar. — *M. hirsuta* Nolle. *Hypopitys multiflora* Scop.  $\beta$ , eller *M. Hypophegea* Wallr., *Hypopitys glabra* Bernh., är vida sällsyntare.

- 63 Fam. EMPETREÆ Nutt. Blr skiljtkönade, med 3taliga blomdelar. Fruktämne fritt, [3-] 9rummigt, slutl. ett bär, med lika många frön som rum.

357. EMPETRUM Lin. Kråkris.

- 1 *E. nigrum* L. låg, n. glatt buske, med nedliggande grenar; bladen barrlika, jemnbredt aflånga, med en blekare fära på undre sidan. 2 $\frac{1}{2}$  4,5. Fig. Sv.B.259. Fl. D.975.

Hedar etc.  $\alpha$ . (Sk.—Lpl. — N.) Bladen ihåliga, likasom med kanterna tillbakavikna och sammanväxta i ryggsfåran; blirna i bladvecken, små, med mörkvioletta kronbl. och knappar; bären svarta.

- 64 Fam. EUPHORBIACEÆ Juss. Blr skiljtkönade. Fruktämne fritt, 2—3rummigt, med centralfäste; slutl. 2—3 fria småfrukter. Frön hängande, 1—2 i hvarje rum.

358. EUPHORBIA Lin. Törel.

+ Blomflocken mångstrålig; fleråriga arter.

- 1 *E. palustris* L. stjelk- och grenbladen lancettlika trubbiga, alla likformiga; svepebl. aggrunda; flockskafven först 3-, sedan 2delade; kalkflik. utan borstlika bihang. 2 $\frac{1}{2}$  5,6, g. blr. Fig. Sv.B.329. Fl.D.866. H.N.f.4, n:o 67.

Kärräng. r. (Öl. Öfver nästan hela ön. Götth. mellan Ejsta och Sproge; Gothem; Tänglingsmyr i Etelhem. Boh. i skären — N. Christiania; Kragerø; Arendal etc.) Störst bland de Skand. arterna, stundom 2 alnar hög, buskformig. Bladen hos alla arter i afdelningen helbräddade.

- 2 *E. Esula* L. stjelk- och grenbladen jemnbredt lancettlika spetsiga, alla likformiga; allmänna svepets blad bredt lancettlika, det enskildas njarlika, uddspetsiga; de större kalkflik. med 2 borst- ell. hornlika bihang. 2 $\frac{1}{2}$  7,8, g. blr. Fig. Fl.D.1270. H.N.f.4, n:o 68.

Åkrar, murar etc. r. (Sk. Tågarp; Kabusa; Husröd etc. Blek. Vedby. Smål. Kalmer, Karlsberg. ÖG. Norrköp. Vestralund etc. Stockh. Uppl. Rasbo; Uppsala, Malmgård. Gestr. Hillevik. Held. Ljusdal, vid Moravallen; Wistr. Dal. Säter; Furudal; Sunnansjö bruk. Vestml. Sala; Skinnskatteberg. Ner. Örebro; Tysslinge, Vinter-

åsa och Hidinge snr etc. *Hall.* Vållda, vid Vällås och Gustafsberg enl. Lem. *Öl.* Algutsrum m. fl. st.) *Omkring 3* kvarter hög; *bladen 2—4 linier breda, grenbladen något smalare.*

- 3 *E. cyparissias* L. stjelkladen jemnbreda *trubbiga*, grenarnes mycket smalare: allm. svepets blad *jemnbreda*, det enskildtas *njurlika*, vanl. *trubbiga*; kalkflik. *som hos föreg.* 2½ 5, 6, g. blr. Fig. Fl.D.2052. H.N.f.10, n:o 55.

Sandback., gamla kyrkog. r. (Sk. Andrarum, Hvitaby, Maltesholm, Brösarps kyrkogård, mest i östra Sk., dock äfven vid Björnstorp i Göddelöfs sn. År på de flesta dessa ställen försvunnen, men i sedn. tider funnen i Rafunda; Loushults och Örkeneds kyrkog. Smål. mell. delen, icke vest. om Lagan; i Kalm. län, på Lönnberga kyrkog.: Ekstr. ÖG. Skönberga prestg.; Asby m. fl. st. enl. Kindb. *Hall.* Dömmestorp och Hasslöfs kyrkog.: Theor. *Gottl.* Halfvars i Vesterbejde.) *Mindre än föreg.; bladen omkr. en linie breda, mot spelsen något bredare; grenarne talbladiga, ofta öferskjulande blrna i stjelkens spets.*

†† Flocken 3—5strålig; ettåriga arter.

- 4 *E. exigua* L. stjelkladen oskaftade, *jemnbreda*, *trubbiga* med kort udd, *helbräddade*; svepebl. *lancettlika*; flocken 3- [säll. 5strålig], med klynnedelade strålar. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.635. Fl.D.592. H.N.f.1, n:o 52.

Åkr. r. (Sk. i sydväst. del., t. ex. kring Lund, Trolleberg, Lomma, Malmö och derifr. till Hvellinge och Trelleborg: F. Aresch. *Vestml.* Kärbo sn vid Springsta. *Uppl.* Enköping. *Medelp.* Sundsvall, på ballastplatser. *Gottl.* Taxstens i Lärbo sn; Enges i Alfva sn enl. G. v. Ced.) *Vanl. fingerhög, stund. fotshög och mycket grenig.*

- 5 *E. peplus* L. stjelkladen skaftade, *omv. äggrunda*, *helbräddade*; svepebl. *äggrunda*; flocken 3strålig, med klynnedelade strålar. ☉ 7—9, gulgr. blr. Fig. Fl.D.1100.

Od. st. a. (Sk.—*Gestr.* och *Vestml.* Ner. Verml. Caristad. *Boh.* *Öl.* *Gottl.* — N. till Trondhj.) *Vanl. ända från rothalsen grenig.*

- 6 *E. helioscopia* L. stjelk- och svepebladen *omv. äggrunda* vigglika *småsågade*; flocken 5strålig, med först 3-, sedan 2-delade strålar. ☉ 7—9, g. blr. Fig. Sv.B.70. Fl.D.725.

Od. st. och täppor, a. (Sk.—*Ångml.* och *Jeml.* *Boh.* *Öl.* *Gottl.* — N. till Nordl.) *Vanl. fotshög, föga grenig; stundom fingerhög och enkel.*

### 359. MERCURIALIS Lin. Bingel.

- 1 *M. perennis* L. stjelen *enkel*; bladen skaftade, eggrundt lancettlika, *stråfhåriga*; honblrnas gemensamma skaft *utdraget*. 2½ 5. Fig. Sv.B.455. Fl.D.400.

Lundar. (Sk.—*Södml.* *Stockh.* Rosl. Sessön i Norrtelgeirakten; Frötuna vid klockstapelbacken. *Vestml.* VG. *Dalsl.* *Boh.* *Öl.* *Gottl.*? — N. Dröbak, Laurvig etc. upp till Storöen i Bergens stift.) *Har i bladvecken glesa ax af små gröna blr; svartnar torr.*

- \*2 *M. annua* L. stjelen *grenig*; bl. skaftade, n. äggrunda, *glatta*; honblommornas skaft *ganska kort*. ☉ 7—9. Fig. Fl.D.1890. H.N.f.13, n:o 66.

Od. st. etc. (N. på flere st. enl. Fr. S.V.Sc. troligen öfverallt införd med ballast såsom vid Christiania, äfvensom i Sv. vid Hernösand, Gefle, Kalmar och *Gottl.* vid Killejshamn.)

- 65 Fam. TAMARISCINEÆ Desv. Foder- och kronblad 5. Fruktämne fritt, enrummigt, slutl. 3skaligt fröhus med fröfästen på väggarne. Frön med fjun, utan hvite.

### 360. MYRICARIA Desv. Klådris.

- 1 *M. germanica* Desv. buske; bladen aflånga ell. från en bredare bas jemnbreda oskaftade *trubbiga*; blomskärmen längre än blomskafet. ½ 7, 8, rödl. blr. Fig. Sv.B.670. Fl.D.234. H.N.f.3, n:o 49.

Stränd. r. (*Ångml.* Sollefteå och Ed snr, vid Ångermanelfven. *Jeml.* och *Medelp.* längs Indalselfven från Dövik i Ragunda ned till Liden sn; Indals sn, Lagmansö

fiskeläge. — N. Staburs- och Börselv i Porsanger, samt på Skjervö: Norm.; Altenelv; Salten; Namselven i Grongs och Overhaldens snr; Stördalselven; Drivselven; Lougenelv upp mot Dovre; Over- och Vårdalen; Leyerdalselven nedom Gafferna. Öar i Bergens fjord.) 2—5 fot hög, till grenar och blad icke oliv gröf ljung. — *Tamarix* L.

66 Fam. **PORTULACACEÆ** Juss. Foder vanl. 2bladigt. Frukt ett enrumm. mångfröigt fröhus med centralt fröfäste.

361. *MONTIA* Lin. Lunk.

- 1 *M. fontana* L. bladen motsatta n. spadlika. ☉ 6—8, hv. blr. — *α minor*: stjelen mindre, mer upprät; frön med matt glans. — *β rivularis*: stj. utdragen flytande; frön med starkare glans. Fig. Sv.B.540. Fl.D.131; *β* 1926. H.N.f.14, n:o 58.  
Fukt. st. källdrag, *β* i bäckar. (Sk.—Torn. Lpm. — N. till Ost-Finnm.) Lik en liten *Stellaria*. Har hvita blr, nedböjda fröhus, svarta frön. De begge formerna anses af några förf. för skilda arter. På punkteringen hos fröen kan förf. ej finna någon märklig skilnad, likasom glansen icke är synnerligt olika. — *M. minor* Gmel. *β M. rivularis* Gm.

67 Fam. **PARONYCHIEÆ** St Hil. Fod. 5deladt ell. likadt. Stift 2—3. Frukt. enrummigt fröhus med centralfäste och ett enda frö.

362. *HERNIARIA* Lin. Knytling.

- 1 *H. glabra* L. bladen aflånga—omv. åggrunda, glatta; blrna talrika, gytttrade i öfre bladvecken. 2 7, 8. Fig. Fl.D.529.  
Torra st. a. (Sk.—Medelp. och Dal. Hall. Öl. Gottl. — N. söd. och vest. delar.) Liten, platt, tryckt till marken; blrna små, gulgröna, stundom bildande axlika, bladiga gytttringar.

363. *SCLERANTHUS* Lin. Knafvel.

- 1 *S. perennis* L. blomkalkensflikar trubbiga, bredt hinnkantade, slutl. plattadt slutna omkr. frakten. 2 6. Fig. Fl.D.563. H.N.f.12, n:o 62.  
Back. (Sk.—Medelp. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Gottl. — N. söd. del till Bergen.) Örtan fingerhög blåaktig; bl. syl-lika; blrna genom den bredare hinnkanten mer hvitaktiga än hos följ.  
2 *S. annuus* L. kalkflik. spetsiga ell. något trubbiga, smalt hinnkantade, alltid utstående. ☉ 6, 7, gr. blr. — *β biennis* Fr. tvåårig; blrna tätare gytttrade, med något trubbiga kalkflikar. Fig. Fl.D.504. *β* H.N.f.12, n:o 61.  
Back. åkr. a. (Sk.—VB. och Jemt. Öl. Gottl. — N.) Grönare, mer risaktigt utbredd än föreg. Blomkalkensflikar hos den ettåriga hufvudformen spetsiga. — *β S. verticillatus* Tausch.

68 Fam. **POLYGONEÆ** Juss. Blomkalk 3—6delad. Frukt enfröigt nöf.

364. *FAGOPYRUM* Gärtn. Bokhvete.

- † *F. esculentum* Gärtn. bladen pilformigt hjertlika; blrna i alla klasar; fruktens kanter hela. ☉ 7, hv. ell. rödl. blr. Fig. E.B.1044. Sturm 18 häft., Åkr. r. (Sk.—Uppl. Helsl. Gnarp och Bjuråker snr: Wistr. VB. Neder-Kalix, vid Åkroken. Ner. Ekeby och Asker snr. VG. Hall. Gottl. Öfverallt förvildad. —

*N. Christiania*, Christiansands och Bergens stift; öfverallt förvildad.) *Stjelken krokig, ehuru upprät; hufvudsakligen skild från följ. med frukten.* — *Polygonum Fagopyrum L.*

+2 *P. emarginatum* Gärtn. blad. som hos föreg.; blrna i glesa klasar; fruktens kanter bugtländade. ☉ 7. Fig. Vet.Ac.Handl.1744.t.4. Fl.D.2649.

Åkr. etc. r. (Sk. särdeles i östra delen förvildad. — *N. söd. delen: Ax. Bl.*) *Lik föreg., men blrna smärre och mer grönaktiga.* — *Polygonum tataricum L.*

### 365. POLYGONUM Lin. Slideknå.

† *Stjelken upprät enkel, med ett enda ax i toppen; ståndare 8: Bistorta Tourn.*

1 *P. Bistorta L.* bladen äggrunda med tvärhuggen eller hjertlik bas, nedlöpande på skaftet, de öfre omfattande; axet aflångt äggformigt. 2 4, 6, 7, rödl. blr. Fig. Fl.D.421. H.N.f.11, n:o 52.

Fukt. äng. r. (Sk. Vegeholm; Duseke; Hurfva; Krageholm etc. *Blek. Silltorp. Smål. Vexjö, vid Tufvan; Stenbrohult; Öhrs. Aringsås och Blädinge kyrkog. etc. enl. Scheutz. Stockholm, vid Byströms villa; Lill-Sikla och Skuggan. Vestml. Vesterås, nära Carlberg. Hall. Halmstad: Theor.)*

2 *P. viviparum L.* bladen jemnbreda—bredt lancettl., åt båda ändar spetsiga, med tillbakavikna kanter, icke nedlöp. på skaftet; axet cylindrikt. 2 4, 6, hv. ell. rödl. blr. — *β alpinum:* med bredare, stund. n. ovala blad. Fig. Sv.B.336. Fl.D.13.

Äng. a. (Lpl.—Smål. Sk. nor. del. sälls. *Boh. och Hall.* — *N.* — *β* i fjelltrakter.) *Axet blommor först nedtill och sätter små knopplökar i stället för blr.*

†† *Stjelken vanl. grenig, med bladlösa ax i toppen; stift 2—3, meränd. nedtill samväxta: Persicaria Gärtn.*

\* *Axen tjocka, tätblommiga.*

3 *P. amphibium L.* bladen aflånga med något hjertlik bas; axet ensamt, på glatt skaft; ståndarne 5. 2 4, 7, 8, ljusr. blr. — *α aquaticum:* stjelen och bladen flytande, glatta; stånd. längre, pist. icke längre än kalken. — *β terrestre:* upprät; bladen från bredare bas lancettl. spetsiga; stånd. kortare, pist. längre än kalken. Fig. Fl.D.282.

*α* i, *β* vid vatten etc. (Sk.—Lul. Lym. Råneelf mellan Gellivare och Jokkmokk. — *N. till Ost-Finnm.)*

4 *P. lapathifolium L.* stipelslid. med inga ell. korta hår i kanten; bladen äggrunda—bredt lancettlika; axen flere, på stråsprickiga skaft; stånd. 6; stiften endast vid basen hopväxta; nöterna på sidorna intryckta. ☉ 7, 8, blekg. ell. rödl. blr. — *β nodosum:* med mycket uppsvällda stjelkleder, smalare ax, smärre blr. — *γ incanum:* bl. under gråakt. och vanl. hvitludna; stipelslid, hårbräddade. Fig. Fl.D.2412, *β* 2648. H.N. f.4, n:o 69, 70; *β* 71, 72; *γ* 73.

Od. st. etc. a. (Sk.—Lpl. — *N.* — *γ* Sk. — *Helsl. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Gotl.* — *N.*) *Bladen ofta på midten tecknade med en brun fläck.* — *β P. nodosum Pers. γ P. incanum Schmidt.*

5 *P. Persicaria L.* stipelslid. kantade med långa hår; bladen lancettlika glatta, under föga blekare; axen flere, på glatta skaft; stånd. 6; stiften n. till midlen hopväxta; nöter dels plattade, dels 3kantiga. ☉ 7, 8, r. ell. hv. blr. Fig. Fl.D.702. H.N.f.4, n:o 74 och 75; f.10, n:o 57.

Fukt. st. stränd. (Sk.—Medelp. Dal. Verml. och Dalsl., mest i Venerstrakten. *Boh. Öl. Gotl.* — *N.* upp till Finn.) *Var. i storlek från att låta med P. lapathif. [H.N.f.10, n:o 57] till fingerhög och späd som P. minus Huds. [f.4, n:o 75]. Märkena i en mindre antal blr 3-ne; dessa gifva de 3kantiga nöterna.* — *P. biforme Wg.*

\*\* *Axen smala, glesblommiga; stånd. 6.*

6 *P. mite Schrank:* stipelslid, långt hårbräddade; bladen utdragat lancettlika—jemnbreda platta; kalkbladen glatta [utan glandler]; stiften hopväxta n. upp till märkena. ☉ 7—9, r. ell. hv. blr. Fig. Reich.f.686. H.N.f.4, n:o 76; f.7, n:o 56.

\* *minus Huds.* mindre; bladen n. jemnbreda; nöterna dubbelt smärre. Fig. Fl.D.2230. H.N.f.4, n:o 75; f.11, n:o 53.

Fukt. st. r. (Sk.—Helsl. VB. Neder-Kalix sn, på Fables-ön. Vestml. Ner. Verm. Hall. Öl. — N. söd. del.: Ax. Bl.) Var. som föreg., men utmärkt af sin vekhet, tunna blad och smala, vanl. glesa ax; lätt skiljd från följ. genom sin milda smak. — *P. laxiflorum* Weihe. \* *P. mile* \* *strictum* Fr.

7 *P. Hydropiper* L. stipelslid. borstbräddade; bladen lancettlika vågiga; kalkbladen glandelprickiga; stiften hopväxta vid basen. ☉ 8, 9, gul. ell. rödakt. blr. Fig. Sv.B. 424. Fl.D.1576.

Diken etc. a. (Sk.—VB. — N.) Bladen hafva en brännande bitter smak; kalken ofla 4delad.

+++ Blommorna 1—4, i bladvecken eller i bladiga ax: stiften fria: *Avicularia* Meisn.

8 *P. aviculare* L. stjelken meränd. nedligg. och grenig; stipelslid. hvita ell. hvitröda, glest enkelnerviga, sargade; bladen lancettlika—ovala, i kanten sträfvä, ådriga; nötterna inneslutna i kalken, finprickiga, n. glanslösa, svartbruna. ☉ 5—10, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.406. Fl.D.803.

Od. och trampade st., stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) Var. i hög grad, från ett par tum hög och upprät, till alnslång, risaktig och nedliggande, samt på hafsstr. med något tjocka, blågröna bl., stora stipelslidor.

9 *P. Ragi* Bab. stjelken som hos föreg., vid basen vedartad; stipelslid. som hos föreg., mot basen bruna; bladen lancettlika, blågröna, ådriga; nött. till hälften utskjutande, n. släta, glänsande, ljusbruna. 2, 7—9, hv. ell. rödl. blr. Fig. E.B.2805.

Hafsstr. r. (Sk. vid Tjörndala och Brantevik, samt Kulla Gunnarstorp enl. F. Aresch. Finnes äfven fr. Sk. i L. Borgströms herb., men utan närmare angifven lokal.) Närmast den utländska *P. maritimum*, som dock skiljes med talrikare och greniga nerver på stipelslid. — En medelform mell. närv. och föreg. art, måhända blott en strandform af den sednare, upptages af F. Aresch. i Sk.Fl. såsom *P. Robertii* Lois., ett namn som Meisner af namngifvarens egna ex. funnit beleggna en blandad art, omfattande former af både *P. Ragi* och *aviculare*.

+++ Stjelken slingrande; blomklasar i bladvecken; stånd. 8; stiftet enkelt med 3knöligt märke: *Tinearia* Meisn.

10 *P. Convolvulus* L. stjelken kantig; bladen hjertlikt pil-lika, spetsade; blirna i utdragna glesa klasar; kalkbladen småådriga, icke vingkantade; nötterna finprickiga, glanslösa. ☉ 7. Fig. Fl.D.744.

Od. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finm. Alten.) Enskildta blomskäften kortare än den invändigt hvita, utv. gröna blomman.

11 *P. dumetorum* L. stj. n. trind; kalkbladen glatta, bredt vingkantade; nötterna släta och glänsande; för öfr. som föreg. ☉ 7. Fig. Fl.D.756. H.N.f.13, n:o 67.

Skogsback., svedjeland. (Sk.—Ångml. Pil. Lpm. Itstjakk. Verm. Venerstrakten. Dalsl. Boh. Öl. — N.) Blomskäft af den med hvita vingar försedda blommans längd.

### 366. RUMEX Lin. Syra.

† Alla eller de flesta blirna 2könade: *Lapathum* Tournef.

\* De 3, frukten inneslut. kalkbladen \*) smalt rutformiga, långtandade.

1 *R. maritimus* L. örtbladen n. jemnbreda; blomkransarne tättsittande; de 3 kalkbladen grynbarande, med borstlika tänder längre än kalkbladets bredd. 7, 8. Fig. Sv.B.706. Fl.D.1208. H.N.f.1, n:o 54.

Hafs- och sjöstr. r. (Sk. Blek. Smål. från söd. gränsen till Kalmar. ÖG. Omberg; Linköping; Laxfjällen etc. Stockh. Södm. Nyköping: C. Ind.; Julitha sn, vid Öljaren. Ner. norra Hjelmarstrand genom Lillkyrka och Götblunda snr. Verm.

\*) Då kalkbladen i det följande beskrifvas, förstås endast de 3 inre ell. större, hvilka innesluta nöten, och som böra undersökas vid dennes mognaingstid på hösten. Blirna i detta slagte gröna ell. brunaktiga.

vid sjön Banken nedom Vee i Väsbyrad. VG. vid sjön Ymsen enl. Wahlstedt. Hall. Öl. Gottl. — N. till Romsdalen samt Skognen vid Trondhjemsfjorden.) Blir vid fruktmogningen helt och hållet gul, hvaraf den fått namnet aureus Wüh. Bladen meränd. vågiga.

- 2 *R. palustris* Sm. örtbladen *smått lancettlika*; blomkransarne *åtskiljda*; de tre kalkbladen grynbarande, med syl-ika tänder, kortare än kalkbladets bredd. 7. 8. Fig. Fl.D.1873. H.N.f.2, n:o 52.

Stränd. och kärr, r. (Sk. hela söd. och vest. slättbygd. enl. F. Aresch. Gottl. Visby gamla hamn.) Liknar föregående; bladen vanl. jemna.

- 3 *R. Steinitii* Beck. rotbladen *bredt aflånga*, med *hjärtlik* bas; stjelkl. från afrundad bas lancettlika; blomkrans. *glesblommiga* och *åtskiljda*; kalkbl. som hos föreg. 2. 7—9. Fig.

Fukt. st. r. (Sk. vid Lilla Hammar, bland *R. palustr.* och *conglom.*) Bladen jemna. Lik föreg. till kalkbl., följ. till habitus. Allt enl. F. Aresch.; osedd af utg.

\*\* Kalkbladen aflånga, helbräddade; blomkransar åtskiljda.

- 4 *R. conglomeratus* Murr. de nedre bladen åggrundt ell. hjertlikt lancettlika, de öfre lancettl.; blomkrans. *tätblommiga*; alla kalkblad grynbarande. 2. 7. Fig. Fl.D.2228. H.N.f.9, n:o 57.

Fukt. st. r. (Sk. sydväst. del, t. ex. mellan Lilla Hammar och Kämpingeljung etc.) Bladen något vågiga; blomkransarne med små skärblad. — *R. Nemolapathum* Ehrh.

- 5 *R. sanguineus* L. de nedre bladen *hjärtlikt* aflånga, spetsiga, de öfre från bredare bas lancettlika; blomkrans. *glesblommiga*; ett enda kalkblad grynbarande. 2. 7. 8. Fig. Sv.B.653. Fl.D.2229. H.N.f.1, n:o 53.

Fukt. bokskog. r. (Sk. Roslätt; Öfvedskloster på Fruali; Helsingb. i Pålköpskogen; Kullaberg etc. Små. Värnanäs i Halltorps sn; omkr. Arby. Hall. Hollandsås. Theor. Öl. Thorslunda; Halltorp etc. — Södra N.) Mycket lik föreg.; bladen något vågiga; endast de nedre blomkrans. med skärblad. — *R. Nemolapathum* Wg. och Fries. *R. nemorosus* Schrad.

\*\*\* Kalkbl. utdraget triangulära ell. [*R. acutus*] något hjertlika, hvasstandade; blomkrans. åtskiljda.

- 6 *R. obtusifolius* L. rotbladen hjertlika, vanl. trubbiga; stjelkl. smalare, alla jemna; blomkrans. *tätblommiga*, de nedre med bredt lancettlika skärblad; kalkbl. *triangelformiga*, gles hvasstandade, alla grynbarande. 2. 7. —  $\beta$  *divaricatus*: rotbl. rundadt trubbiga; kalkbl. bredare, upphöjdt nätådriga, långt syltandade, ett i synn. grynbar. Fig. Fl.D.1335. F. Aresch. i Öfvers. af K.V.A.Förh. 1862, t.3, f.1. H.N.f.5, n:o 54;  $\beta$  f.7, n:o 57.

Fukt. st. vid byar. (Sk.—Helsl. och Vestml. Verml. Carlstad. Dalsl. i Ånimskog; Frösög. Boh. Öl. Gottl. — N. Vestanfjells. —  $\beta$  Sk.—Uppl. VG. Hall. Öl. Gottl.) 3—5 fot hög; bladen åggrundt hjertlika, ofta ganska stora, vid fruktmogn. qvarsittande, friska och gröna. Ena kalkbladets gryn vanl. något större än de 2 öfriga. —  $\beta$  *R. divaric.* Fr., *R. Friesti* Godr. & Gr., *R. obtusifol.* Wallr. lärar enl. F. Aresch. och fl. utan gräns öfvergå i *a.*, som är *R. silvestris* Wallr.

- 7 *R. acutus* L. rotbladen aflånga; de nedre stjelkl. hjertlika, de öfre lancettlika, alla krusigt vågiga; blomkrans. n. *bladlösa*; kalkbl. bredt triangelformiga med hjertlik bas, lått och kort hvasstandade, alla grynbarande. 2. 7. Fig. F.Ar.l.c.f.2.

Stränd. r. (Sk. östra delen, t. ex. Cimbritshamn och Esperöd; i sydväst. del. vid Hammarlöf och Skegrie m. fl. st. enl. F. Aresch. Blek. Carlskrona, Kronovärml. och vid Björkholmen: Gosselm.) Förvexlad under namnet *R. pratensis* Koch med former af föreg.:  $\beta$  från hvilken, utom anf. kar., de vid fruktmogn. bostvissnade bladen skilja den. Anses af F. Aresch., som fullständigt uredd denna hos oss allmänt misskända art, för en hybriditet af föreg. och följande. — *R. cristatus* Wallr. — Hitt lär ock, enl. F. Aresch. och Lönnroth., den sednare *R. gentilis* höra.

\*\*\*\* Kalkbl. rundadt hjertlika, helbräddade ell. [*R. conspers.*] otydl. småtandade; blomkrans. tåtsittande.

a — Kalkbladen grynbarande.

8 *R. crispus* L. örtbladen lancettlika, spetsiga, krusigt vågiga; alla 3 kalkbladen grynbarande, hjertlika helbräddade. 2 7. Fig. Fl.D.1334. F.Ar.f.4. H.N.f.7, n:o 55. Fukt. st. a. (Sk.—Ängml. Vestml. Ner. Verm. Dalsl. Boh. Öl. Götll. — N. till Trondhj.) Kalkbladen gryn stora, vanligen ett större än de öfriga, hvilka stundom ej utväxa: örtbl. vid fruktmogn. vissnande. — Anm. *R. propinquus* J. E. Aresch. i Bot.Not.1840, p.22, F. Aresch.f.3, f.6, har bredare och vid basen mer intryckta kalkbl., och torde sannolikast vara hybrid af *R. crisp.* och *domest.*

9 *R. conspersus* Hn. rotbladen äggrundt aflånga, med hjertlik bas; stjelkl. hjertligt äggrunda ell. smälare, alla jemna; blomkrans. bladlösa; kalkbl. bredt hjertlika, något spetsade, småtandade, ett enda grynbarande. 2 7, 8. Fig. F.Ar.f.3. H.N.f.7, n:o 54; f.9, n:o 58.

\* *platyphyllus* F. Aresch. nedre bladen bredare; kalkbl. längre spetsade, derigenom aflångt hjertlika. Fig. F.Ar.f.7.

Stränd. r. (Sk. Blek. Carlskrona, på Kronovarvet: Gosselm. Smål. Kalmar. — Gefle. Vestml. Vesterås m. fl. st. Ner. Skogaholm. Dalsl. vid Dalhobron nära Venersborg. Hall. Särö, och söd. Boh. Öl. — \* Stockh. och Uppsala.) Stjelken omkr. 2 alnar hög, rödfäckig; bladen vid fruktmogn. qvarsittande friska, kalkbl. grundt, stundom omärkligt tandade. Förmodas af Prof. Andersson, trol. med rätta, vara hybrid af *R. domest.* och *obtusifol.*, till hvilken sednare enl. hans åsigt *R. gentilis* Lönnr. skulle vara en tydlig öfvergångsform.

(*R. acutus.*)

b — Kalkbladen bara (med inga eller otydliga gryn.)

10 *R. domesticus* Hn. örtbladen bredt lancettlika, krusigt vågiga, med eller utan hjertlik bas; kalkbladen rundade hjertlika bara, helbräddade. 2 7, 8. —  $\beta$  *latifolius*: större; bladen hjertlika. Fig. Fl.D.2349. Fr.Ar.f.5. H.N.f.7, n:o 55.

Byar, stränd. a. (Sk.—Lpl. — N.) 2 å 3 fot hög. Örtbladen vid fruktmogn. qvarsittande friska; rotbladen n. aflånga, stundom med snedt hjertlik bas. —  $\beta$  har bladen ända in på stjelken nog stora och hjertlika, ehuru mer aflånga än hos följ., hvarmed den blifvit sammanblandad. — *R. longifolius* DC. *R. Hippolapathum* Fr. Nov.ed.2. *R. aquaticus*  $\beta$  Wg.Fl.Lapp.

\*\*\*\*\* Kalkbl. triangulära ell. äggrunda, n. helbräddade; blomkrans. tätt sittande.

a — Kalkbl. bara.

11 *R. Hippolapathum* Fr. örtbladen bredt hjertlika, jemna; blomkransarnes skärmb. äggrundt lancettlika; kalkbl. äggrunda, med tvär bas, trubbiga. 2 7. Fig. Sv.B. 209. F.Ar.f.8. H.N.f.5, n:o 55.

Stränd. (Sk. Köpingsöns stränder vid Högsta Fyla enl. F. Ar. Uppl. Södm. och Vestml. omkr. Mälaren och närmare hafvet. Helsl. Hudiksvall och Ströms bruk: Wistr. Ängml. VB. nor. del. Um., Pit. och Torn. Lpm. Jeml. Lith sn. Dal. Leksand; Grycksbo bruk. VG. Mariestad. Boh. Strömstad; Kongell m. fl. st. vid Göta elf. — N. till Ost-Finnm.) 2—3 alnar hög; rotbladen stora, n. triangelformiga, stundom med blodrött skaft och ryggner; stjelkl. ofta hjertlika med n. rälliniga kanter. Kalkbladen, äfven vid sin högsta mognad, hafva sål-lan någon märkbar intryckning vid basen, så att de öfver hufvud icke kunna kallas hjertlika. — *R. aquaticus* Lin. Herb. *R. Friesii* J. E. Aresch. Bot. Not.1840.

b — Kalkbl. grynbarande.

12 *R. maximus* Schreb. örtbladen hjertlika spetsiga, platta; kalkblad triangelformigt aflånga, alla grynbarande. 2 7. Fig. Sv.B.161. Fl.D.2347. H.N.f.6, n:o 53.

Stränd. (Sk. vid Köpingsö. Smål. Kranklösaolm vid Hosmo-ån. ÖG. Linköp., vid Nyqvärn; Åtvedaberg enl. Kindb. Södm. Rosenbergs bruk; Ekenberg; Sundsörs tegelbruk; Nyköpings. C. Ind. Stockh. vid kanalerna i Hagapark; Djurgårdsviken m. fl. st. Uppl. Skokloster; Ultuna; Norrtälge, på Björnö etc. Vestml. Tortuna, i

Hartman, Skandinavien Flora (10:de uppl.).



Bocksjön; Kärrbo, i Ångsjön. VG. Göteborg.) 2—3 alnar hög stjälk; bladen hjertlikt äggrunda, ofta en fot långa, 4—6 tum breda. Äldre kalkbl. vid basen småtandade. — *R. acutus* Sv.B.

- 13 *R. Hydrolapathum* Huds. alla örtbladen lancettlika, platta; kalkbl. som hos föreg. 24 7. Fig. Fl.D.2348. H.N.f.6, n:o 52.

Stränd. (Sk.—Uppl. och Dal. Verml. vid sjön Hyngen i Bro sn. Dalsl. Nordkärr i Holm sn; Lockerud nära Venersborg. Götth.? — N. Christiania.) Liknar mycket föreg., undantagande bladen, som äro spetsade åt båda ändar, de nedersta 1—2 fot långa, ljusgröna. — *R. aquaticus* Fr. *R. acutus* Wg.Fl.Su.

†† Tvåbyggare. Bladen pil- ell. spjutlika: *Acetosa* T.

\* De inre kalkbladen mycket större än nöten, hinnaktiga.

- †14 *R. scutatus* L. örtbladen gigformiga ell. spjutlika med äggrunda baslikar; blirna både 1- och 2kånade; de yttre kalkbl. tilltryckta, de inre hjertlika rundade helbräddade. 24 6, 7. Fig. Sturm 74 häft.

Back. r. (Uppsala på Slottsbacken, förvildad; flerstädes enl. Fr.) Bladen något tjocka, bidaaktiga.

- 15 *R. Acetosa* L. örtbladen bredt lancettlika—äggrunda, med pil- ell. hjertlik bas; blirna tvåbyggare; de yttre kalkbl. nedböjda, de inre som hos föreg. 24 6, 7. — *a vulgaris*: bladen lancettl. med pil-lik bas. — *β alpestris*: bl. äggrunda med hjertlik bas, nerv. mer uppböjda. Fig. Sv.B.190. Fl.D.2534. *β* H.N.f.11, n:o 54.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — N. — *β* i fjelltr. Torn. Lpm.—Herjed. — N.) *β*, som af några ansetts vara den Sydeurop. *R. Arifolius* All., öfvergår i våra fjelltrakter till *a*.

- 16 *R. thyrsoides* Desf. örtbladen aflångt lancettlika, med spjutlik bas; blirna i mycket sammansatt, stor och tål samling, tvåbyggare; de yttre kalkbl. som hos föreg., de inre rundadt njurformiga. 24 7, 8. Fig. H.N.f.16, n:o 56.

Äng. r. (VG. Kinnekulle, från Husaby till Martorp, isynnerhet på sedn. stället. Smål. Kalmar; Stenbrohult sn mell. kyrkan och Elmhult; Jönköping enl. G. v. Ced. Götth. vid Botvede i Sanda sn.) Oftast 2—3 fot hög, mycket gröfre än de öfriga i afd., och från dem utmärkt isynnerhet af den stora och täta blomsamlingen. — *R. subhastatus* Lindgr. *R. Acetosa* var. *thyrsiflora* Fr. *R. thyrsiflorus* H.N.

\*\* De inre kalkbl. knappt större än nöten, och tätt omslutande denna.

- 17 *R. Acetosella* L. örtbl. lancettlika—jernnbreda, meränd. spjutlika af 2, utstående likar vid basen; blirna tvåbyggare; de yttre kalkbl. tilltryckta, de inre äggrunda, helbräddade. 24 6, 7. Fig. Fl.D.1161.

Torra st. a. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl. röd till färgen; bladen stundom mycket smala, saknande än den ena, än bådaflikarne vid basen.

367. OXYRIA Hill. Fjellsyra.

- 1 *O. digyna* Campd. blad n. endast vid roten, njurlika, hela ell. urnupna. 24 7. Fig. Sv.B.692.

Fjellbäckar. (Lpl.—Herjed. Dal. Särna sn, Fulusjället. — N.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med tumsbreda blad. — *Rumex* L. *Rheum* Wg. *Oxyria reniformis* Hook.

368. KOENIGIA Lin. Königsört.

- 1 *K. islandica* L. de nedre bladen skiftevisa, n. spadlika trubbiga glatta, de öfre gyttade omkring blirna. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.513. Fl.D.418. H.N.f.5, n:o 57.

Fjellv. r. (Lul. Lpm. Muorateskäbbo, Kåbrek, Ståkkejokk, Stuortoki Wassja: H. Widm., m. fl. st. Pit. Lpm. Kåbrenäiwe. Jemtl. Ekorrdörren. — N. Finnm. allm. kring hela Varangerfjorden; Berlevaag, samt Nordkap. Nordl. Salten. Kålabögen vid Jemtska gränsen; Dovre; Gousta; Hardanger; Stuedalen.) En half till 2 tum hög, saftig växt, med ganska små gulaktiga blr; bladen med stípelsidor.

## 4 Serien: INCOMPLETÆ.

### 10 KLASSEN

### BRACTEIFLORÆ.

69 Fam. **ARISTOLOCHACEÆ** Juss. Stånd. fastade vid pistillen. Frukttämne under blomman, 3—6rummigt, med centrala mångfröiga fröfästen.

369. **ARISTOLOCHIA** Lin. Hållrot.

†1 **A. Clematitis** L. stjelken upprät; bladen hjertlika trubbiga; blöna flere i hvarje bladveck, med enläppigt, utdraget äggrundt bräm. 2 7, 8, g. blr. Fig. Sv.B.377. Fl.D.1235. Od. st., gamla trädg. etc. r. (Sk. Helsingborg. För öfr. förvildad här och der upp till mellersta Sv. — N. Laurvig: Ax. Bl.) 1—2 fot hög med krypande rotstock.

370. **ASARUM** Lin. Hasselört.

1 **A. europæum** L. bladen njurlika, trubbiga ell. urnupna; kalkflikarne spetsiga. 2 5. Fig. Sv.B.31. Fl.D.633. H.N.f.11, n:o 55.

Lund. r. (Vestml. Sättra brunn: Prof. Hedenius enl. Frist. Fordom i Sk. vid Heckerberga och på Romeleklint. Skall äfven vara funnen i VG. på Alnsö i Hornborgasjön, samt i Verml. vid Ölmebärads prestgård i ett alkärr. — N. uppgifven för Tellemarken, men enl. Blytt trol. af misstag.) *Blomman ensam mellan de 2 toppbladen, utanpå mörkgrön, inuti brunröd.*

70 Fam. **SANTALACEÆ** Br. Kalk med i toppen kantlagda flikar samt lika många på flikarnes bas fastade ståndare. Frukttämne inväxt i kalkens bas, enrumm., enfröigt.

371. **THESIUM** Lin. Spindelört.

1 **T. alpinum** L. bladen jemnbreda, något rännformiga; blöna i något ensidig klase, fastade inom 2:ne småskärm på det större, jemnbreda skärmbladets skaft, meränd. 4klufna. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.611. Fl.D.suppl.t.10. H.N.f.3, n:o 50.

Back. r. (Blek. vid Fuhrs gästgg. Smål. från Åreda gästgg., Lenhofda, Högsby och Oskarshamn upp till Vestervik, Grönhult, Locknevi, S. Wi, Rumsquilla, Ekesjö, Olsatorp i Askeryd, Öggestorp och Forssarum: Scheutz. ÖG. i Kinds, Ydre och angränsande härader mångenstädes enl. Kindb. VG. vid Semsholm i Skölvfvenad sn: J. Hult och O. v. Zweigh.) *Quartershög, med små, utanpå gröna, inuti hvita blr. — Th. Linophyllum L.Fl.Su.*

- 71 Fam. **THYMELEÆ** Juss. Kalk med pip och i knoppen tegellagda slikar. Stånd. fästade i pipen, dubbelt så många som kalkflikarne. Fruktämne fritt, inom kalken, enrumm., med ett hängande frö.

372. **DAPHNE** Lin. Tibast.

- 1 *D. Mezereum* L. blrna oskaftade, gyttrade 3—5 tillhopa på den ännu bladlösa stam-  
mens sidor.  $\frac{1}{2}$  4, 5, r. blr Fig. Sv.B.7. Fl.D.268.  
Fukt. skogsäng. (Sk.—Lpl. — N. till Salten.) *Alnshög buske, hvars lancettlika blad framkomma i grenarnes spets först efter de vålluktande blrna; stenfrukterna röda, giftiga.*

- 72 Fam. **ELÆAGNEÆ** Br. Kalk som föreg. fam. med stånd. fästade i mynningen. Fr.ämne fritt, slutl. falsk stenfrukt, bildad af den saftiga kalken och den nölika 1-fröiga frukten.

373. **HIPPÓPHAË** Lin. Haftorn, Finnbär.

- 1 *H. rhamnoides* L. bladen jemnbredt lancettlika, under hvitfjälliga.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Sv.B. 385. Fl.D.265.  
Hafsstr. (V.B. Haparanda.—Rosl. — N. Nordl. Stegen enl. Norm.; mell. Salten och Trondhj.) Omkr. 3 alnar hög, tornig buske, med tidiga, små och gulaktiga blr i bladvecken; frukten bärlik, gul.

- 73 Fam. **ULMAOEÆ** Ag. Blr 2könade. Fr.ämne fritt, med 2 stift, slutl. enrummig, enfröig, platt vingfrukt.

374. **ULMUS** Lin. Alm.

- 1 *U. montana* Sm. bladen aflånga—omv. åggrunda, med tvärt sammandragen spets, dubbelsågade, på öfre sidan *stråfva*; blomskåften n. kortare än kalken; blrna samlade i rundade gyttringar; ståndarne 5—6; frukterna ovala ell. rundade, n. *glatta*, i spetsen *grundt* 2klufna.  $\frac{1}{2}$  4, 5. —  $\beta$  *major*: grenarne korkbarkiga; bl. större. —  $\gamma$  *nitida*: bl. glatta och glänsande. Fig. Sv.B.13. Fl.D.632 och 2532. E.B.1887. Reich.t.1332. H.N.f.12, n:o 63.  $\beta$  E.B.2542.  
Skogsäng. berg. (Sk.—Helsl. Delsbo, på Gryttesbergen. Medelp. Borgsjö sn. Ångml. Skuluberget. Jemtl. upp till Frostviken. Dal. Verml. Dalsl. Boh. Öl. nor. del. Götll. [var.  $\gamma$ ]. — N. till Helgeland; Bejeren: Norm.) Högst träd med brunakt. blr på bar qvist; vid basen småa blad. —  $\beta$  *U. major* Sm.  
2 *U. campestris* Sm. bladen ovala, spetsiga, dubbelsågade, på öfre sidan *föga stråfva*; blrna n. *oskaftade*, med 4 ståndare, för öfr. som föreg.; frukt. omv. åggrunda ell. cirkelrunda, *glatta*, i spetsen 2klufna *ända ned till fröet*.  $\frac{1}{2}$  5. —  $\beta$  *suberosa*: grenarne med korklik, kantig bark. Fig. Fl.D.2531. E.B.1886. Reich.t.1331,  $\beta$  1333.  $\beta$  H.N.f.4, n:o 80.  
\* *glabra* Mill. bl. smälare, något tjocka, glatta; frukt. små, n. cirkelrunda med smal urskränning. Fig. H.N.f.8, n:o 57.  
Lund. r. (Öl. södra del. Götll. —  $\beta$  Öl. Götll. — \* Öl. Högsums kyrkog. enl. Leml. Götll. Gothen m. fl. st.) Träd med smärre frukter och blad än föreg., hvarmed denna art förenades af Lin. under namnet *campestris*. —  $\beta$  *U. suberosa* Ehrh.  
3 *U. effusa* W. bladen som hos föreg., glest småludna; blomskåften flere gånger längre än kalken; stånd. 6—8; frukt. omv. åggrunda ell. cirkelrunda, i kanten ludna, *djupt* 2klufna.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Reich.f.1337. H.N.f.4, n:o 81.  
Lund. r. (Öl. i vestliga, mellersta delen, såsom vid Borgholms kungsgård, Högsum, Rönnerum, Skogsby m. fl. st.) Blrna med 3—7 lin. långa skåft. — *U. ciliata* Ehrh. *U. pedunculata* Lam.

74 Fam. **URTICACEÆ** Juss. Blr skiljckönade, med 1 stift. Frukt enfrög nôt.375. **HÖMULUS** Lin. Humle.

1 *H. Lupulus* L. stjelken slingrande; bladen handflikiga, med sågade flikar, på öfre sidan stråfhåriga. 2 7, gulgr. blr. Fig. Sv.B.332. Fl.D.1239.

Bergsrött, stenrös, r. (Sk.—Jemtl. Ängml. flerst. enl. Arn. VB. Degerselvby i Råne: H. Widm. Boh. Öl. Gotl. — N. södra del till Ringboe i Gudbrandsd. och till Sellöe i Bergens st.; Sundalsören i Trondhj. st.: Scheutz.)

376. **URTICA** Lin. Nässla.

1 *U. urens* L. bladen motsatta, ovala, fliksågade, med skaft meränd. längre än de parvisa blomgyttringarne; sambyggare. ☉ 6, 7, gulgr. blr. Fig. Sv.B.206. Fl.D.739.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) Mindre och mer ljusgrön än föl.

2 *U. dioica* L. bladen motsatta, mer och mindre hjertlika spetsade, grofsågade, med skaft kortare än de klaselika blomgyttr.; tvåbyggare. 2 6, 7, gr. blr. Fig. Sv.B.68. Fl.D.746.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) Var. med bredare och smalare, ända till äggrundt lancetlika blad, samt fintuden, n. utan brännborster: var. *holosericea*, mer sällan glatt: var. *glabra*.

377. **PARIETARIA** Lin. Blidnässla.

†1 *P. officinalis* L. stjelken n. upprät, föga grenad; bladen utdraget äggrunda, punkterade korthåriga. 2 7, 8, hvitgr. blr. Fig. Fl.D.521. Reich.D.Fl.f.1317. H.N.f.1, n:o 58.

Vid vägar och hus, r. (Sk. omkr. Cimbritshamn; Malmö. Ursprungl. förvildad.) Blrna små, gyttrade i bladvecken. — *P. erecta* Mert.

75 Fam. **AMARANTACEÆ** Juss. Kalk hinnaktig färgad [hvit eller röd]. Stånd. utgående från fruktfästet. Frukt enummig, en-[fler]-frög fröblåsa, affallande öppnad.378. **AMARANTUS** Lin. Amarant.

1 *A. Blitum* L. stjelken med utbredda grenar; bladen äggrunda urnupna; blrna knippevisa i bladvecken, och i stjelkens spets bildande ax; ståndarne 3. ☉ 6—8. Fig. Fl.D.2246. H.N.f.1, n:o 55.

Odl. st. gator etc. r. (Sk. Lund. Smål. vid Smedby i Dörby sn: Ekstr. Stockh. Kungsholmen; Bergianska trädg. m. fl. st. Hall.) Liknar *Chenopod. polyspermum*, som stundom blifvit misstagen för denna; äfven skiljd från *Chenop.* med föga annat än kalken, hvars blad hafva en bred hvit genomskinlig hinnkant. — *Albersia Kunth*.

76 Fam. **CHENOPODIACEÆ** Juss. Kalk örtartad, foderlik. Stånd. fästade i kalkens botten. Frukt hinnaktig enfrög fröblåsa, affall. öppnad.379. **TRIPLEX** Lin. Gråmålla.

† Kalkbladen \*) rundade och helbräddade, åtskiljda till basen.

†1 *A. hortensis* L. stjelken upprät; bladen något hjertlikt 3angelformiga, bugttandade, på båda sidor af samma färg; kalkbl. rundade med omärklig spets. ☉ 7, 8, gr. blr. Fig. Sturm 79 häft.

Odl. st. stränd. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. VG. Hall. som ogräs i plantager och dessas grannskap.) 1—3 fot hög med stora, ofta röda ell. gula blad.

\*) Med kalkblad afses i detta och följ. släkte de, som tillhöra honblrna och omgifva frukten, vid hvars mognad arterna böra undersökas.

†† Kalkbladen rut- ell. 3angelformiga, hopväxta vid basen.

\* Kalkbl. vid mogn. gråhvita, med tillhårdnad bas.

- 2 *A. rosea* L. bladen n. åggrunda bugttandade, under hvitmjölige; kalkbl. bredt triangelformiga småtandade, med 3 upphöjda nerver på den hvitmjölige basen. ☉ 7, 8, gr. blr. Fig. Sv.B.626. H.N.f.4, n:o 77.

Byar, hafsstr. r. (Sk. Lomma, Borreby etc. Smål. Kalmar; Förlösa. ÖG. Grytön m. fl. st. i Grytön: Kindh. Södm. Nyköping, v. om staden: C. Ind. Ö. Skogsby i Thorslunda; vid Färjestaden och på ön Norman etc. — N. södra kusten.) Bladen stundom på båda sidor hvitmjölige. — *A. laciniata* Wg.

\*\* Kalkbl. fortfarande gröna, bladartade (icke tillhårdn.).

a — Bladen meränd. med tvär ell. något hjertlik bas.

- 3 *A. calotheca* Fr. örtbladen spjutlikt triangelformiga, fliktandade, enfärgade; kalkbl. 3angelf., upphöjdt nätådriga, flikade i syl-likä ändar. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.627. Fl. D.1638. H.N.f.1, n:o 56; f.8, n:o 55.

Hafsstr. etc. r. (Sk. Kullaberg; Malmö; Lomma etc. Blek. Smål. Kalmar slott. Hall. Boh. Ö. — N.) Har mycket tandade, likasom taggiga kalkblad, hvilka ofta utväxa stora och bladlika, med långa flikar: *A. hast. calotheca* Rafn. — *A. hastata* Lin. herb. [genom förväxling]. *A. laciniata* L.Fl.Su. enl. beskrifn.

- 4 *A. hastata* L. örtbladen spjutlikt 3angelformiga, bugttandade ell. helbräddade; kalkbl. ruffformiga, i kanten och på ryggen tandade. ☉ 7—9, gr. blr. —  $\beta$  salina: upprät, med under hvitmjölige blad. Fig. Fl.D.1286. H.N.f.8, n:o 54.  $\beta$  Sv.B.628. Utmärktare former, som af några förf. anses som egna arter, äro:

\* *Babingtonii* Woods. utsperradt grenig, vanl. nedtryckt, med stora breda tjocka och spröda blad. Fig. Fl.D.2712,13. Lindeb.Nov.Fl.Sc.1,2,f.2. H.N.f.14, n:o 60? *A. crassifolia* Fr. och ed.7.

\* *deltoides* Bab. n. upprät; bladen utdraget åggrunda, spjutlika af 2, horisontalt utstående, ell. hakut rigtade flikar vid basen [hvilka dock stundom saknas]; kalkbl. mycket större än de släta fröen.

\* *microsperma* Kit. n. upprät; bladen som hos föreg. n. helbräddade, med tvärhuggen bas och horiz. flikar; kalkbl. föga större än fröen.

\* *prostrata* Bouch. nedtryckt, vanl. lefverbrun; bladen små, spjutlikt 3angelform. ell. åggrunda, tandade, med 2, rakt utstående flikar vid basen; de öfversta bladen vid fruktgyttr. n. jemnbreda, vanl. med spjutlik bas. *A. hast.* \* *depressa* Ed.9.

Stränd. fukt. st.,  $\beta$  hafsstr. (Sk.—Hels. Ångml. Hernösand; Nora etc.: Arn. VB. Haparanda. Vestml. Ner. Verml. Carlstad. Boh. Ö. Gottl. — N. till Ost-Finnm. Norm. — \* Bab. Sk. söd. och vest. kust. Hall. Boh. Väderöarne. — N. söd. del. Finnm. Hammerfest. — \* delt. Sk. vest. kust. — Boh. — N. — \* microsp. Sk. Malmö; Lomma. Blek. Saltö; Carlshamn. — \* prostr. Sk.—Boh. Blek. Smål. Lindö vid Vestervik: Dr Lund. Gottl.) Var. i hög grad, nedligg. och upprät, med stora och breda bl. till åggr., groftandade och n. helbrädd., små och stora kalkbl. o. s. v. — *A. hastata* L. enl. synonym. och växtställ. *A. latifolia* Wg. *A. patula* Sm.

b — Bladen med afrundad ell. afsmaln., aldrig tvär bas.

- 5 *A. patula* L. stjelen meränd. upprät; de nedre grenarne korsvisa utsperrade; de nedre bladen åggrundt lancettlika, med 2, utdragna, något framåt rigtade flikar vid basen, de öfre lancett., jemnbreda, helbräddade; kalkbl. ruffformiga spetsade helbrädd. ell. något tandade, på ytan släta ell. småtandade. ☉ 6—9, gr. blr. —  $\beta$  angustifolia: nedligg.; alla bladen n. jemnbreda. Fig. Fl.D.1285,  $\beta$  2226. H.N. f.8, n:o 53.

\* *longipes* Dr. kalkbl. vanl. skaftade, ofta med hjertlik bas. Fig. Fl.D.2714.

Odl. st. stränd. a. (Sk.—Ångml. Dal. Verml. Ö. Gottl. — N. till Ost-Finnm. — \* Hafsstr. i Sk. Blek. Boh. Ö. enl. Vesterl.) Stundom af tillfälliga orsaker nedliggande; bladen var. i bredd och tandning, äfvensom kalkbl. i storlek. — *A. angustifolia* Sm.

- 6 *A. litoralis* L. stj. och grenar upprätta; bladen jemnbreda; kalkbl. smalspetsiga,

*landade* på ytan och i kanterna. ☉ 6—8, gr. blr. — *β maritima*: bladen bredare, glest och olikformigt bugtlandade. Fig. Fl.D.1287. H.N.f.5, n:o 58, 59.

Hafsstr. (Sk.—Uppl. Medelp. Sundsvall: C. Ind. Boh. Öl. Gottl. — N. till Nørø vid Nordt: söd. gräns: Norm.) *Bladen hos α ½—2 lin. breda, hos β 2—3½; var. med större och mindre kalkbl. samt stund. nedligg. stjelk.* — *β A. marina* L. enl. Sm.

### 380. HALIMUS Wallr. Saltmålla.

1 H. *pedunculatus* Wallr. bladen omv. äggrunda—aflånga, helbräddade; kalkbl. långt skafade, omv. hjertlika, med en liten udd i urskärningen. ☉ 7, 8, gr. blr. Fig. Fl. D.304. H.N.f.1, n:o 57.

Hafsstr. r. (Sk. vestra kusten från Skanör upp till Kullen; Hven. Hall. Varberg. Boh. Skafö; Oroust, Henån. Smål. Kalmar vid Törnebacksbro. Öl. Ottenby etc. Gottl. Eista, Sproge, Grötlingbo etc.) *Vid blomn. vanl. fingerlång, sedan större, med blomgyttr. i toppen och öfre bladvecken; utmärkt af de ½ tum långa fruktskafsten.* — *Atriplex* L.

### 381. BLITUM Lin. Rödmålla, Sminkbär.

† Blomkalken vid fruktmogn. uppsvällad saftig, hvarigenom fruktgyttringarne slutl. likna röda bär: egentl. *Blita* L.

†1 B. *capitatum* L. bladen spjutlikt äggrunda, med få och glesa tänder; de flesta blomgyttr. bildande ett *bladlöst*, afbrutet ax i stjelkens topp. ☉ 6, 7, gr. blr. Fig. Sturm 74 häft.

Odl. st. r. (Sk. Lund enl. F. Aresch. Smål. Kronoberg. ÖG. flerst.: Kindb. Södml. Strengnäs; Stafsjö bruk: C. Ind. Stockh. Bondgatan på Söder, och på Djurgårdsslätten. Uppl. Elfskarlöbruk omkr. herregården. Dal. Grycksbo Bruk. Vestml. Vesterås. Ner. Iboholm i Boo sn. — N. Christiania; Langesund.) *De mogna blomgyttringarne ej olika smultron; endast de nedre hos denna art i bladvecken.*

†2 B. *virgatum* L. stjelken *bladig ända till toppen*; bladen spjut- ell. 3angelformigt äggrunda, olikformigt och *tall hvasstlandade*; blomgyttr. i *bladvecken*. ☉ 6, 7, gr. blr. — *β chenopodioides*: fruktgyttr. saftlösa gröna. Fig. Sturm 74 h. *β* H.N.f.8, n:o 52.

Odl. st. r. (Sk. Kullaberg. Smål. Håkanstorp i Bredaryd sn; Ahlsborg i Hvena sn enl. Ekstr. ÖG. Motala; Adelsnäs enl. Kindb. Södml. Stockholm. Uppl. Gestr. Vestml. Ner. Örebro. VG. Sköfde. — N. Kongsberg. — Förvildad i och omkr. plantager. — *β Uppsala*, vid Hammarby. — N. Christiania.) *Bladen med bred, tvär bas, mycket landade; frukt som hos föreg.*

†† Fruktgyttr. icke bärlika: *Chenopodia* L.

3 B. *rubrum* Reich. bladen äggrunda trubbiga, *djupt* trubbtandade, tjocka glänsande; blomgyttringarne i *greniga*, något *bladiga* ax; alla fröen utom toppblommans i hvarje gyttring stående på kant. ☉ 7—9, gr. ell. τ. blr. Fig. Fl.D.1149.

Odl. st., str. (Sk.—Gestr. Helsl. Hudiksvall och Söderhamn: Wistr. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Stjelkar och blomgyttr. stundom röda; bladen n. fiktandade, mer säll. n. helbräddade, på strand. köttiga.*

4 B. *glaucum* Koch: bladen *aflånga* ell. äggrundt aflånga trubbiga, *grundt och bugtigt* trubbtandade, *under blågrå*; blomgyttr. i *bladlösa* ax; fröen dels horisontala, dels på kant. ☉ 7—9, gr. blr. Fig. Fl.D.1151.

Gator, str. a. (Sk.—Gefle. Helsl. Hudiksvall: Wistr. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Gottl. — N.) *Stjelken vanl. nedligg., mer sällan upprät.*

5 B. *Bonus Henricus* C. A. Mey. bladen *spjutlikt 3angelformiga*, n. *helbräddade*; blomgyttr. i *länga och täta*, *upptill bladlösa* ax; alla fröen utom toppblmnas kantstående. ☉ 6—8, gr. blr. Fig. Fl.D.579.

Väg. gård. a. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. Boh. Öl. Gottl. — N. till Bergen.)

(*B. virgat.* *β.*)

## 382. CHENOPODIUM Lin. Målla, Mell.

† Bladen tandade.

\* Fröen glanslösa.

- 1 *C. hybridum* L. bladen något hjertlika spetsade, djupl, men glesl groftandade. tunna; blomgyttr. i utsperradt greniga klasar; fröen gropigt punkterade. ☉ 7, 8, gr. blr. Fig. Fl.D.2049.

Odl. st. (Sk.—Uppl. Dal. Ner. Verml. södra delen. Hall. Öl. Goull. — N. Christiania.) *Bladen stora, n. flisktigt tandade.*

- 2 *C. urbicum* L. bladen 3angelformiga trubbtandade ell. n. hela, något tjocka; blomgyttr. samlade i utdragna uppräta ax dels i stjelkens topp, dels i bladvecken; fröen finprickiga. ☉ 7, 8, gr. blr. —  $\beta$  *intermedium*: bladen mer gröna och glänsande, spetsigt groftandade. Fig. Sv.B.459. Fl.D.1148.  $\beta$  Sturm 75 häft.

Byar, gat. (Sk.—Gefle. Dal. Ner. Verml. Hall. Öl. Goull. — N. Christiania; Åsker; Ringerige. —  $\beta$  Södm. Eskilstuna; flerest. enl. Fr. S.V.Sc.) *Bladen vanl. bidaktiga och glanslösa.*

- 3 *C. murale* L. bladen äggrunda, spetsiga, hvassrandade, yngre glänsande; blomgyttr. i utsperradt greniga klasar; fröen finprickiga. ☉ 7, 8, gr. blr. Fig. Fl.D.2048. H. N.f.15, n:o 59.

Odl. st. mur. r. (Sk. Ystad—Höganäs. Hall. nor. del. VG. Göteborg. Blek. ÖG. Linköping; Lunnä i Appuna; Svenneby i Örtomta m. fl. st. enl. Kindb. Öl. Runsten. Goull. i Wall sn.) *Bladen och de talrika bladtänderna spetsigare än hos öfr. arter; fröen med hvassare kant. Har enl. Fr. en var. med helbräddade blad: crassifolium.*

\*\* Fröen glänsande.

- 4 *C. album* L. bl. äggrunda trubbtandade, de öfre lancettlika, meränd. helbräddade, glanslösa, oftast under hvitmjölliga; blomgyttr. i greniga ax; fröen n. släta. ☉ 7—9, g. blr. —  $\alpha$  *spicatum*: blomgyttr. i sammansatta täta uppräta hvitmjölliga ax. —  $\beta$  *viride*: mindre hvitmjöllig, ända till rent grön; axen vanl. utböjda. —  $\gamma$  *glomerulosum*: bladen tunna, mera och hvassare tandade; blomgyttr. mycket små och glesa. Fig. Sv.B.411. Fl.D.1150.

Odl. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. —  $\gamma$  vid Gefle, trol. flerestädes.)  $\alpha$  *C. album* L.  $\beta$  *C. viride* L. Fig. i Sv.B. visar en medelform mellan båda: *C. peganum* Reich. —  $\gamma$  *C. glomerul.* Reich. *C. opulifolium* Drej. Fl. Hafn.

†† Bladen helbräddade.

- 5 *C. polyspermum* L. upprät ell. nedligg., icke klubbmjöllig; bladen äggrunda glatta och gröna; blomgyttr. i toppen och bladvecken, slutl. utväxande i greniga klasar; ståndarne meränd. 3. ☉ 7, 8, gr. blr. —  $\beta$  *acutifolium*: bladen spetsiga. Fig. Fl.D.1153.  $\beta$  E.B.1481.

Odl. st. stränd. (Sk.—Gestr. Oslättfors. Helsl. Söderhamn. Medelp. Tuna sn. VII. Vestml. Ner. Verml. Kohlsäter. Hall. Öl. Goull. — N. söd. del.: Åx. Bl.) *Kalken öppen, icke tillsluten omkr. den stora rödbruna fröblåsan. Hufvudformen har rundadt trubbiga blad.*

- 6 *C. Vulvaria* L. hela växten nedliggande, klubbmjöllig; bladen rutligt äggrunda; blirna gytttrade i täta ax. ☉ 7, 8, g. blr. Fig. Fl.D.1152. H.N.f.16, n:o 58.

Gator etc. r. (Sk. Ystad; Trelleborg; Lund; Landskrona etc. Blek. Carlshamn. Småll. Kalmar. ÖG. vid Roxen. Stockh. Uppsala. Goull. Visby. — N. Mandal etc.) *Mycket stinkande ört; kalken tillsluten omkring fröblåsan. — C. olidum* Curt.

## 383. KOCHIA Roth. Saltört.

- 1 *K. hirsuta* Nolte: stjelken upprät, jemte de jernbreda halftrinda trubbiga bladen mjukluden; blirna parvisa oskaflade i bladvecken, ludna. ☉ 7. Fig. Fl.D.187. H.N. f.4, n:o 79.

Hälsfr. r. (Öl. Ottenby schäferiäng, samt något öst. och söd. derom.) *Lik Schoberia marit., men är större; yngre upptill hvitluden af långa mjuka hår. Blirna synas på torra ex. gulaktiga. — Salsola* L. *Sueda* Reich. *Chenopodium* Wg.

384. *SCHOBERIA* C. A. Mey. Saltört.

- 1 *S. maritima* Mey. stjelken nedligg. ell. upprät; bladen jemnbreda ell. syl-lika, half-trinda glatta; blrna gytttrade i bladvecken; stiften 2. ☉ 7, 8, grönakt. blr. Fig. Fl.D. 489. H.N.f.4, n:o 78.

Hafsstr. (Sk.—Boh. Öl. Ottenby etc. *Gottl.* Öja sn, vid Stockviken; Sproge; Rohnehavn; Gothem: G. v. Ced. — N. till Nærbø: Norm.) *Chenopodium* L.

385. *SALSOLA* Lin. Sodaört.

- 1 *S. Kali* L. stjelken nedligg., meränd. hårig; bladen trinda hvasst sylspetsiga; blrna ensamma i bladvecken; kalkflikarnes bihang slutt. rundade och utstående. ☉ 7, 8, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.471. Fl.D.818.

Hafsstr. (Sk.—Södm. Ålön och Nottarön. Boh. Öl. *Gottl.* — N.) *Vanl. nedtryckt grenig ört, taggig af de hvassuddiga styfva bladen; kalkbihangen utbildas vid frömogningen.*

386. *SALICORNIA* Lin. Glasört.

- 1 *S. herbacea* L. stjelken enkel ell. med motsatta, i toppen kolfbärande grenar; ledstyckena upptill något vidgade och urnupna. ☉ 7, 8. Fig. Sv.B.252. Fl.D.303.

\* *biennis* Afz. tvåårig med nedtill träaktig stjelk, n. jemntjocka ledstycken. Fig. H.N. f.10, n:o 58.

Hafsstr. (Sk.—Boh. Blek. Smål. ÖG. Dagsbergs sn. Södm. Mörkö sn, mell. Skansen och Hörningsholm. VB. Neder-Kalix skärg., på Hvitgrundet. Öl. *Gottl.* — N. till Senjen: Norm. — \* Sk. på Hven. Hall. vid Onsalaviken; Varberg på Getteröns östra kust. Boh. Gåsö; Skaftö; Uddevalla. Öl. Långöre Kapell.) *Var. upprät och nedliggande: S. prostrata* Osb. Fl.D.1621; samt med mycket långa och tjocka blomkolfvar: var. *pachystachys* Koch [H.N.f.16, n:o 59], hvilken form enl. *Leffl.* i Boh. tydligt öfvergår i hufvudformen. — \* *S. fruticosa* Retz.



## 11 KLASSEN

# JULIFLORÆ.

**77 Fam. CUPULIFERÆ Rich.** Sambyggare. Honblommans hylle vidväxt det 2—6-rummiga främnet, och sedan quarsitt, såsom s. k. bägarfoder omkring den genom felslagning enrummiga, enfröiga nöten. Fröhvite 0.

### 387. QUERCUS Lin. Ek.

**1 Q. Robur L.** bladen med korta skaft, aflånga, meränd. bugtlikade med rundade flikar, glatta; gemensamma fruktskaftet *flere gånger längre* än bladskafsten.  $\frac{1}{2}$  5. —  $\beta$  *lanceolata H. v. Post.*: bl. utdraget lancettlika, oflikade. Fig. Sv.B.73. Fl.D.1180. Reich. D.Fl.f.1313.

Skog. äng. a. (Sk.—Gestr. Vestml. söd. Dal. Verml. Öl. Gottl. — N. till Nordmör samt Näs på Hedemarken. —  $\beta$  *Smål.* i en hage på ön Keanäs i Bruddsjön vid Berga i Högsho sn. Fordom äfven i Blek. på Sternö.) *Stort träd, med om hösten affallande blad. Blr och bl. hos begge arterna samtidiga. — Q. pedunculata Ehrh.*

**2 Q. sessiliflora Salisb.** bladen *längre* skaftade, under vid nerv. småludna, för öfr. som hos föreg.; gemensamma fruktsk. *omärkligt* ell. *kortare* än bladskafsten.  $\frac{1}{2}$  5. —  $\beta$  *intermedia*: bladen under håriga; frukter något längre skaftade. Fig. Reich. f.1309.

Skogsback. (Sk.—ÖG. och VG. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. Löjsta; Sandön enl. G. v. Ced. — N. allmän i de sydl. delarne.) *Anses af många förf. icke skiljd från föreg. Bladen skola vissnade quarsitta öfver vintern; skaften 3 gånger längre än hos föreg. Ollonen kortare och flere hopgyttrade. — Q. Robur W.  $\beta$  Q. intermed. Don.*

### 388. FAGUS Lin. Bok.

**1 F. silvatica L.** bladen äggrunda, föga tandade, glänsande glatta, hårbräddade.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Sv.B.361. Fl.D.1283. H.N.f.1, n:o 59.

Skog. (Sk.—ÖG. Omberg; Börshult i Torpa: Kindb. VG. Boh. Dalsl. vid Vågsäter i N. Ryr sn. Öl. vid Rälla [ett enda träd]. — N. i Grefskaperna; på vestra kusten till 4 mil norr om Bergen; Molde: Dr P. Olsson.) *Högstamligt träd med slät bark. Blr och bl. samtidiga.*

### 389. CARPINUS Lin. Annbok.

**1 C. Betulus L.** bladen aflångt äggrunda, djupt och hvasst dubbelsågade; frukthängets fjäll 3klufna, mellersta fliken mycket större, aflång.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Sv.B.433. Fl.D.1345. Löfskog. (Sk. Hall. söd. om Lagaån: Theor. Blek. Smål. söd. delen. Öl.) *Låg-växt träd eller buske; blr på bar qvist.*

### 390. CORYLUS Lin. Hassel.

**1 C. Avellana L.** bladen rundade med hjertlik bas och smal spets, flikigt dubbelsågade;

bägarfodret klocklikt öppet, med sargadt tandadeflikar.  $\frac{1}{2}$  3, 4. —  $\beta$  *laciniata* H. v. *Post.*: bl. parflikigt inskurna. Fig. Sv.B.139. Fl.D.1468.

Skogsäng. a. (Sk.—nor. *Ängml.* Själevad sn, vid Billaberget. Dal. söd. del. *Verm.* Boh. *Öl. Gottl.* — N. till Nordl. samt i Gudbrandsdalen. —  $\beta$  *ÖG.* Regna sn, i prestigs äng bland den vanl. formen.) *Bladen tunna ojemna; blr på bar qvist.*

- 78 Fam. **SALICINEÆ** Rich. Tvåbyggare. Hänge af tegellagda enkla fjäll, hysande i sin vinkel ett glandel- eller strutlikt hylleämne. Frukt ett enrumm. 2skaligt fröhus, med fröfästen på väggarna och talrika frön med fröfjün, utan hvite.

391. *PÖPULUS* Lin. Poppel, Asp (1).

† Hängfjällen hårbräddade.

- 1 *P. tremula* L. bladen *rundade*, groft trubbtandade, säll. sågade, på båda sidor gröna och glatta [undant.  $\beta$ ], med plattade skaft.  $\frac{1}{2}$  4, 5. —  $\beta$  *villosa*: bladen på båda sidor hvitludna. Fig. Sv.B.103. Fl.D.2184. H.N.f.16, n:o 61 [var.].

Skog. och äng. a. (Sk.—*Lpl.* — N. till Ost-Finnm. —  $\beta$  *Verm.* Risäter vid Rådasjön. Sk. Gladsaxgården enl. F. Aresch. — N. Christiania.) *Högt träd med långa grå-ludna hängen på bar qvist. Rotskottens blad hjertlika ludna. Var. i Verm. enl. ex. i L. Borgstr. herb. med små, halftumsstora blad: microphylla; samt enl. H.N. vid Uppsala med regelbundet småsågade bl.: var. serrulata Frist. —  $\beta$  P. villosa Lang.*

- †2 *P. canescens* Sm. bl. som hos föreg., under grå-ludna; de yngsta i qvistarnes topp, något hjertlika, hela.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. E.B.1619. Fl.D.2183.

Fukt. st. vid byar, herrgård. etc., ursprungl. odlad. (Sk. Lund i Paradislyckan; Svane-holm i Skurup sn, etc. Derifrån odlad i parker här och der upp till Stockh. och Uppsala.) *P. alba* L.Fl.Su. och Willd. *P. hybrida* M.B. *Anses af en del förf. såsom hybrid af föreg. och följ.*

- †3 *P. alba* L. bl. som hos föreg., under snöhvitt ludna; de yngsta hjertlika, 3—5flikiga.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. E.B.1618. Fl.D.2182. H.N.f.13, n:o 69.

Som föreg. (Sk. Lund; Kronetorp; Krageholm, på holmen Hamburg; Bäckaskog vid Oppmannasjön etc. Sedan odlad upp till Uppsala.) *P. nivea* W. (*P. balsamifera*.)

†† Hängfjällen glatta, i kanten smalflikiga.

- †4 *P. nigra* L. grenarne *utstående*; bladen deltoidiska med n. tvärhuggen bas, *uldragen* spets, trubbsågade, på båda sidor samt i kanten *glatta* och gröna.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. E.B.1910. Reich.f.1275. H.N.f.12, n:o 64.

Plantager. (Sk. *Blek. Hall.* etc. upp till Uppsala.) *Träd med vidgad krona.*

- †5 *P. pyramidalis* Roz. grenarne *upprätta*; bladen *ruiformiga* spetsade, grundt trubbsågade, för öfr. som föreg.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig.

Plant. (Sk.—*Medelp.*) *Buskformigt, men högt träd med smal krona af de nästan rakt upprätt växande grenarne; bladens bas icke så tvärhuggen som hos föreg., utan bildande en trubbig vinkel mot skaftet. — P. dilatata Ait.*

- †6 *P. monilifera* Ait. bladen deltoidiska, med något *hjerlik* bas [mer breda än långa], spetsade, sågade, med trubbiga framåt böjda sågländer, i kanten *finludna*.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig.

Plant. (Sk.—*Geste.*) *Har stult. quarterslånga glesa hängen af stora fröhus.*

- †7 *P. balsamifera* L. bladen *aggrunda* spetsade trubbigt *finsågade*, glatta, under bleka nätådriga; knopparne mycket *balsamkådiga*; hängfjällensflikar med några långa hår  $\frac{1}{2}$  5. Fig.

Plant. (Sk.—*Medelp.* och *Verm.*) *Träd, stund. buske, med knoppar och yngre blad klubbiga och starkt, n. Rhabarberlikt luktande, af en seg, balsamisk kåda. Sprider sig mycket genom krypande rotskott.*

## 392. SALIX Lín. Pil, Vide, Sälq.

† Träd eller högre buskväxter med enfärgadt ljusgula hängfjäll; 2 honingsglandler [hos *S. undul.* blott 1] i hvarje blomma: *Amerina* Fr.

\* Hängfjällen snart affallande. Vanligen träd.

1 *S. pentandra* L. bladen med glandler på skaften, *aflånga—omv. äggrunda smalspetsiga*, fint och tätt sågade, *glatta*; ståndarne 4 eller flere \*); fröhusen slutt. kort skäftade glatta, med kort stift \*)). § 5, 6. Fig. Lin. Fl. L. t. 8, f. 2. Sv. B. 325. Fl. D. 943. Ands. Sal. Lapp. f. 1; Mon. Sal. i K. V. A. Hantl. 1867, t. 2, f. 24. H. N. f. 9, n:o 60; f. 11, n:o 59.

Skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Porsanger: Norm.) Vanl. 3—5 alnar hög buske stundom temligen högt träd, med glänsande, bredare ell. smalare blad. *S. cuspidata* Schultz [H. N. f. 15, n:o 61], med glandler på bladskafen och flere ståndare såsom föreg., men med smala blad och halft hjertlika stipl. såsom följ., af hvilka två arter den anses hybrid, har enl. Ands. och Thed. funnits i Stockholmstrakten.

2 *S. fragilis* L. bladen lancettlika, vanl. *med-spetsade*, sågade, glatta, under isgrå; hängena slaka; stånd. 2; fröh. som hos föreg. § 5. Fig. Sv. B. 373. Fl. D. 2484. Ands. Mon. t. 3, f. 28. H. N. f. 1, n:o 60; f. 9, n:o 61.

Vid stränder etc. a. (Sk.—Helsl. och Dal. Verml. och Dalsl. i Venerstrakten. Öl. Goutl. — N. till Trondhj.) Träd med vid basen utsperrade grenar och qvistar, sköra i vecken, hvarföre de lätt blåsa af och, då de falla i valtnet, bortföras och slå rot vid stränderna. Stipl. på höstqvistarne halft hjertlika. Honträdet mycket sällsynt i öfre delen af riket. Var. stundom med qvistarnes bark gulglänsande och deras nedre blad trubblade: var. *decipiens* [H. N. f. 9].

† 3 *S. viridis* Fr. bladen smalt lancettlika, liksformigt spetsade, tätt småsågade, glatta; hängena upprätta; stånd. 2; fröh. som hos föreg. § 5. Fig. Fl. D. 2486. Ands. Mon. t. 3, f. 29. H. N. f. 1, n:o 61.

Stränd. och vid vägar, r. (Sk. Smål. Jönköping; Kalmar etc. ÖG. nära Hofgården: Kindb. Södm. Thuringe sn, Nyquarns bruk; Nyköping, vid Harg: C. Ind. Stockh. Verml. i söd. och särd. vest. delen. VG. Nygård i Venersb. trakten. Dalsl. Frendefors sn enl. Leml. Boh. — N. Christiansands st.; Christiania; Tellemarken; Hadeland.) Bladen mer udragna, grenarne upprättare än hos föreg.; de sednare icke bräckliga i vecken. Enl. Wimmer och Ands. hybrid af föreg. och följ.; honträdet mest likt den förra, honträdet den sednare arten. — *S. alba* γ Wg. Fl. Su. ed. 2.

† 4 *S. alba* L. bladen lancettlika smalspetsade finsågade, på undre sidan silkes håriga; häng. upprätta; stånd. 2; fröh. glatta, med *ganska korta* skaft, n. intet stift. § 5. Fig. Sv. B. 523. Fl. D. 2552. Ands. Mon. t. 3, f. 30. H. N. f. 1, n:o 62.

Stränd. och vid väg. (Sk.—Mälaren. Gefle vid Kastet. Hall. Öl. Goutl. Klinte sn. Urspr. förvildad. — N. Vid Leerelven i Skydsmoe sn. Flerestädes planterad.) Mindre träd; liknande *S. fragilis*, men har mer upprätta och vidjelika grenar, som dock hafva nästan samma skörhet; yngre bladen på båda sidor silfverhåriga; stipl. smala lancettlika. Var. med glatta blad.

\*\* Hängfjällen quarsittande. Buskar ell. låga träd.

5 *S. triandra* L. bladen *aflånga—lancettlika*, spetsiga, sågade glatta, under mer ell. mindre isgrå; stånd. 3; fröhusen äggrunda skäftade glatta, med *omärkligt* stift. § 5, 6. Fig. Fl. D. 2558. Ands. Sal. Lapp. f. 2; Mon. t. 2, f. 17. H. N. f. 3, n:o 51.

Stränder, r. (VB. Neder-Torneå. Ängml. mell. Sollefteå och Bots; Styrnäs sn; Mjellån i Viksjö sn; Arn. Medelp. vid Sättna-ån och Indalselven. Gestr. Persbacka vid Avaån; Olvansjö prestg. vid ån. Uppl. vid Elfskarleby, nedom gästg. ÖG. Omberg. Dal. Tuna sn, vid elfven. Verml. Klarellven. I söd. Sv. stundom odlad. — N. Christiania; Porsgrund; Glommen mell. Kongsvinger och Elverum. Gudbrandsdal. Guledalen. Ringebo etc.) Träd eller trädlik buske; bladen 2—3 tum långa, stund.

\*) Då ståndarnes antal ej uppgifves, äro de alltid 2.

\*\*) Stiftet kallas kort, då det är kortare än märkena, långt eller utdraget, då det är längre än dessa.

tumsbreda, med kort spets. *Öhängen* latrika, 2—3 tum långa, smala och slaka, med gula fjäll. *Stipl.* halft hjertlika. — *S. amygdalina* L. och ed.9.

- †6 *S. undulata* Ehrh. bladen jemnbredt lancettlika, tätt finsågade, glänsande glatta, under blekare; stånd. 3; fröh. ägggrundt kägelformiga skaftade småludna eller glatta, med utdraget stift.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Fl.D.2550. Ands.Mon.t.2,f.19. H.N.f.3, n:o 55.  
Odl. st. stränd. r. (Sk. *Blek. Stockh.* i Hagaparken och vid Roslagstull. *Södm.* Eskilstuna; Nyquarns bruk. *Uppl.* Uppsala, vid Fyrisån. *Öl.* södra delen.) *Buske* eller lågt träd; bladen ofta vågiga i kanten, 3—4 tum långa, sällan öfver  $\frac{1}{2}$  tum breda, långt och smalt spetsade, med  $\frac{1}{2}$  tum långa skaft, hängen ludna. *Stipl.* som hos föreg. Enl. Ands. och flere förf. hybrid af föreg. och *S. viminalis*.

†† Högre buskar ell. träd, med ätm. i spetsen bruna, liksom svedda, hängfjäll; 1 honingsglandel i hvarje blomma.

\* Fröhus oskaftade, med omärkligt stift: *Helix* Fr.

- †7 *S. purpurea* L. bladen lancettlikt jemnbreda, mot spetsen något bredare och sågade, glatta; ståndarne hopväxta till 1; fröh. äggformiga hvitludna, med klubblikt märke n. utan stift.  $\frac{1}{2}$  5. —  $\beta$  *Helix*: hängen större, kort skaftade; stiftet tydligare. Fig. Sv.B.589. Fl.D.2554. H.N.f.2, n:o 56;  $\beta$  57.  
Stränd. etc. (Sk. *Blek. Lyckeby* och Vämö. *Smål.* Markaryds gästgg. *Hall.* I de öfre prov. odl. upp till *Gestr.* —  $\beta$  Sk.) *Buske* med vidjelika grenar, vanl. röd bark,  $\beta$  med gulgrön; hängen oskaftade, tumslånga smala, ofta motsatta.  $\frac{1}{2}$  knappt funnen i Sv. —  $\beta$  anses af en del förf. såsom egen art. — Anm. *S. rubra* Huds. Fr. H.N.f.10, n:o 60, skild med blott till hälften hopväxta ståndare, utdraget stift och jemnförelsevis bredare blad, lærer enl. Andr. vara hybrid af *S. purp.* och *viminalis*, samt aldrig hos oss förekomma annat än odlad.

\*\* Fröh. oskaftade, ell. med skaft kortare än honingsglandeln; utdraget stift: *Vetrix* Fr. [med undantag af *S. glauca*].

a — Äldre bladen fullkomligt glatta.

- 8 *S. daphnoides* Vill. qvistarnes bark daggbå; bladen bredt lancettlika, sågade; hängen mycket ludna; fröh. glatta, med utdraget stift.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Reich.f.1253. H. N.f.6, n:o 54.

Stränd. r. (*Dal.* Mora kyrka, på sandångarne norr om elfven. *Verm.* på Klarellvens stränder från Dalby sn till utloppet. — N. mell. Ourdal och Land till Rands-fjorden; mell. Ringeboe och Biri vid Lougen; Ringerige; Glommen upp till Elverum.) *Träd* ell. hög buske med oftast glatta och daggbå grenar, 2 tum långa, tjocka hängen; bladen likna *S. triandra*; stipler halft hjertlika. — *S. acutifolia* Horn. — Anm. *S. acutifolia* W. Fr. H.N.f.8, n:o 58, med mer jemnbreda blad, och lancettl. stippler, lär enl. Ands. hos oss icke förvildas, ehuru den ofta planteras i söd. och mellersta Sv.

b — Äldre bladen håriga ell. ludna; yngre grenar långa. raka och vidjelika.

- †9 *S. viminalis* L. bladen lancettlikt jemnbreda, med helbräddade tillbakaböjda kanter, under silfverglänsande silkeshåriga; hängfjällens hår kortare än fröh.; fröh. n. oskaftade, hvitludna.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Sv.B.211. Fl.D.2485. H.N.f.1, n:o 64.

Stränd. och odl. st. (Sk.—*Boh.* *Verm.* vid Klarellven. *Öl.*; samt flerstädes ända upp till *Gestr.* odlad och förvildad.) *Hög buske*, stundom träd, med upprätta, n. enkla, vidjelika grenar, långa honhängen; fullväxta bladen omkring  $\frac{1}{2}$  tum breda, 4 tum långa.

- †10 *S. mollissima* Ehrh. bladen n. jemnbredt lancettlika, i kanten gles glandelnaggade, under omärkligt silkeshåriga, något gråglänsande; hängfj. hår nående öfver märkena; fröh. som hos föreg.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Fl.D.2604. H.N.f.1, n:o 65.

Odl. st. r. (Sk. Lund, på Kanikmarken m. fl. st. Odlad.) *Bladen*  $\frac{1}{2}$  tum breda, 4 t. långa, under knappt märkligt håriga, grågröna. Enl. Ands. hybrid af föreg. och *S. triandra*.

- 11 *S. Smiliciana* Willd. bladen utdraget lancettlika, n. helbräddade, under tätt silkes-

*ludna*, slutl. *hvitulliga*; hängsja här icke nående öfver märkena; fröb. kort skaft, hvitludna.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Fl.D.2551. H.N.f.1, n:o 63; f.2, n:o 59.

Odl. st. (Sk. Hall. Ursprungl. odlad. Hanväxten funnen endast i Sk. vid Kullen i Brunby sn. — N. vid Laurvig.) *Trädstam eller högre buskväxt; bladen lika föreg., men dubbelt bredare, med en omärklig tand här och der i kanten. Enl. Ands. hybrid af S. vimin. och caprea. — S. lanceolata Fr. S. mollissima Sm.*

c — Blad som i föreg. afd.; grenar korta och knöliga. [Nordliga arter].

- 12 *S. lanata* L. bladen ovala eller rundade, under ojemna af det upphöjda ådernätet; hängena oskaftade, ell. med korta småbladiga skaft; fröb. n. oskaftade, glatta.  $\frac{1}{2}$  6. —  $\beta$  *chrysantha*: hängen ludna af långa guldfärgade hår. —  $\gamma$  *glandulosa*: bladen föga håriga, glandelsågade. —  $\delta$  *subhastata*\*): bl. ovala glatta; stipl. långspetsade. Fig. L.Fl.L.t.7 och 8, f.x. Ands.Sal.Lapp.f.3.  $\beta$  Fl.D.1057. H.N.f.8, n:o 59.  $\gamma$  Wg.Fl. L.t.26, f.1.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N. —  $\gamma$  N. Finnm.) 2—4 fot hög buske med tjocka och breda blad, hvilka variera från mycket ulliga till nära glatta, under något groppa mellan ådernätet. Hängen i grenarnes lopp, tjocka och grå- eller gulhåriga. —  $\beta$  *S. chrysantha* Vahl. —  $\delta$  *S. Hartmaniana* Ands.

- 13 *S. glauca* L. bladen lancettlika—bredt ovala trubbiga, meränd. helbräddade. med platt kant, släta meränd. mjukludna; hängena med bladiga skaft; fröb. meränd. oskaftade, ulliga, med föga utdraget stift.  $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *angustifolia*: bladen smalt lancettlika, helbräddade, ludna. —  $\gamma$  *appendiculata*: bladen ludna, helbräddade, med äggrunda stipler. —  $\delta$  *pallida*: bladen helbräddade glatta, under isgrå. —  $\epsilon$  *subnigricans*: bladen aflånga eller lancettl. småågade, vid torkning lätt svartnande. Fig. L.Fl.L.t.7, f.5. Ands.Sal.Lapp.f.21. Fl.D.1058. H.N.f.3, n:o 52.  $\gamma$  Fl.D.1056.

Fjellv. (Lpl.—Dal. Verml. bergslagen, vid skansen på Persberget. VB. Piteå sn: Dr Håkanson. Ängml. — N.) Omkring 2 alnar hög buske, med på båda sidor hvitludna, sällan glatta blad. Stifet kortare än hos alla andra arter i afd., knappt längre än märket. —  $\beta$  *S. glauca*  $\gamma$  Lapponum Wg. c: *nivalis* Fr. —  $\gamma$  *S. appendiculata* Vahl. —  $\epsilon$  *S. Amandæ* Ands

- 14 *S. Lapponum* L. bladen ovala—lancettlika spetsade, merändels helbräddade, särdeles under glånsande hvitludna, kanterna något tillbakavikna; fröb. oskaftade, hvitulliga.  $\frac{1}{2}$  5, 6. Fig. L.Fl.L.t.8, f.1. Wg.Fl.L.t.16, f.4. Ands.Sal.Lapp.f.4. H.N.f.7, n:o 58; f.12, n:o 67, var.

Kärr. (Lpl.—Uppl. Vestml. Ner. Göthlunda: O. G. Blomb.; Dylta. Verml. Sällsynt nedom Helsl. — N. Finnm. ned till Udalen och Skien.) 2—4 alnars hög buske, med slutl. 3 tum långa, tjocka blad, varierande mellan utdraget lancettlik och äggrund form; omväxla äfven till ludenheten, ända till nära glatta. En medelform till *S. nigricans*, ell. enl. Ands. troligen hybriditet, är *S. Angströmiæ* Ands., funnen i Lycksele, med hängen af Lapp., blad af nigric. En annan form, ansedd af Ands. som hybrid af Lapp. och myrsinites, är *S. phæophylla* Ands. från Finnm. Lyngen. — *S. limosa* Wg. En bredbladig form är *S. n:o 362*. L.Fl.L. *S. arenaria* L. Herb. *S. lapp. v. leucophylla* Fr.

- 15 *S. Læstadiana* Hn. bladen aflångt lancettlika—omv. äggrunda, merändels spetsiga, omärkligt och glesl naggade, under tät gråludna, utan glans; fröb. kort skaftade gråludna.  $\frac{1}{2}$  6. —  $\beta$  *obtusifolia*: bladen utdraget omv. äggrunda, de nedre trubbiga. Fig. Ands.Sal.Lapp.f.5. H.N.f.5, n:o 64.

Fjelltr. r. (Torn.—Pit. Lpm. Ängml. Säbrå sn, ännu kvarlevande: Arn. — N. Salt-dalen.) Högre buskväxt, stundom med trädstam; hängen långa, n. fingertjocka af mycket tät sittande fröhus; bladen vanl. spetsiga, på båda sidor tät fñludna, särdeles under gråfilade, men utan glans. — *S. canescens* Fr. *S. caprea*  $\beta$  L.Fl. Su. ed.2 enl. O. Rudbeck's fig. [Bot. Not. 1841, p.65], *churu ex.* i Linné's Herb. snarare är en form af *S. glauca*. Anses af Ands. i Mon.Sal. innesfalla 3 former, alla blott hybrida, näml. den smalbladigaste af *Lapponum* och *caprea*, de bred-

\*) Detta slähtes arter variera i hög grad och synas hybridisera, så att mellanformer uppkomma; en del af dessa förmodade hybriditeter upptagas här tillvidare såsom varieteter, men betecknas med tillägget *sub*; *subhastata* en medelform till *S. hastata* o. s. v.

*bladiga dels af Lapp. och cinerea, dels af Lapp. och aurita; i D.C. Prodr. upp-  
tages S. Læst. sednare af samme förf. såsom egen art, med antydning om dess möj-  
ligen hybrida ursprung.*

(*S. caprea* γ.)

\*\*\* Fröh. långt ell. tydligt \*) skafade, med intet eller kort stift:  
*Caprea* Fr.

a — Bladen, isynnerhet yngre, skrynkligt ojemna och nätådriga,  
oftast gråludna.

- 16 *S. caprea* L. grenarne *glatta*; bladen aflånga—omv. åggrunda spetsade, slutl. vågigt  
groftandade ell. sågade, *ofvan glatta*, under gråludna eller håriga; häng. meränd.  
*oskafade* och *bladlösa* \*\*); fröh. *ulliga*, med kort stift.  $\frac{1}{2}$  4, 5. —  $\beta$  *alpestris*:  
buske; bladen bredt lancettlika, föga ludna. —  $\gamma$  *lanataefolia* Björnstr. bl. starkt  
hvitulliga; småqvistarne gråludna; fruktskaft och stift något längre. Fig. Sv.B.98.  
Fl.D.2603. Ands.Sal.Lapp.f.6; Mon.Sal.t.5,f.45.

Skogsång. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\gamma$  Pil. Lpm. på Kåksa. Lul. Lpm. Njuonjes vid  
Tarrejokk.) *Tenligen högt träd [Sålg], stundom hög buske, med korta och tjocka  
hängen, stiplerna liknande en gåsfol. Var. i högsta grad; en smalbladig form:*  
*var. angustifolia* Ands. Mon. har hos oss varit tagen för *S. grandifolia* Ser.,  
vilken art dock enl. Ands. icke förekommer i Skand.

- 17 *S. cinerea* L. de vidjelika [yngsta] grenarne *gråludna*; bladen lancettlika eller af-  
långa—n. omv. åggrunda, vid eller ofvan midten bredast, *kortspetsade* sågade, *ofvan*  
*småludna*, under meränd. gråludna; häng. *oskafade*, n. *bladlösa*; fröh. *ulliga*, med  
omärkl. stift.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Fl.D.2601. Ands.Sal.Lapp.f.7; Mon.t.4,f.44. H.N.f.7, n:o 59.  
Stränd. diken etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Buske med föga grenade, vidjelika upprätta*  
*smågrenar, breda, n. njurlika stipler; vågigt sågländade, under n. hvita blad.*  
*Var. med tunna, på båda sidor gröna blad: c: virgulosa* Fr.

- 18 *S. aurita* L. grenarne vanl. *glatta*; bladen omv. åggrunda, med kort, *tillbakaböjd*  
spets, n. *helbräddade*, slutl. glest småtandade. *ofvan småludna*, under meränd. grå-  
ludna, ojemna; häng. n. *oskafade* och *bladlösa*; fröh. meränd. *ludna*, med omärkl.  
stift.  $\frac{1}{2}$  4, 5. —  $\beta$  *sublivida*: fröhus och blad slutl. glatta. — \* *rugulosa* Ands.  
hängskatt bladiga; fröh. glatt, med kort stift. Fig. Sv.B.565? Fl.D.2600. Ands.Sal.  
Lapp.f.8; Mon.t.4,f.43. H.N.f.7, n:o 60. \* Ands.Sal.Lapp.f.20; Mon.t.5,f.55.

Våta skogsång. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Lpl. — \* Pil. Lpm. Galgkärn. Herjed. vid  
Kolsätt.) 3—6 *alnars buske med brun, n. glatt bark på qvistarne; breda, ofta*  
*njurlika stipler. Bladen variera i hög grad. — S. cinerea* Sv.B.  $\beta$  är troligen  
*hybrid af aurita och vagans*  $\beta$  *livida*. \* *S. palud.* Ed.4. *S. aurita* + *palud.* Ed.9.  
*S. finmarkica* Fr. anses af Ands., som visat dessa namns olämplighet, vara hybrid  
af *aurita* och *myrtilloides*.

- X *S. ambigua* Ehrh. bladen omv. åggrunda—lancettlika, merändels naggsågade, ofvanpå  
intryckt nerviga, under upphöjdt nätådriga och *småludna*; häng. med kort, *småbla-*  
*digt* skaft; fröh. *silkesludna*, med mycket kort stift.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Fl.D.2670. Ands.  
Mon.Sal.t.6,f.65. H.N.f.2, n:o 58; f.11, n:o 63, 64.

Skogsång. (Sk.—Södm. Strengnäs; Eskilstuna; Nyköping; C. Ind. Stockh. nära Sund-  
sta. Uppl. Uppsala, Lassby-backar. Rosl. mellan Frötuna k:a och Stegelbäcken.  
Ner. Viby. Boh. VG. Göteborg.) *Lik S. repens till storlek och växtsätt; bladen*  
*lika S. aurita, men mindre; till formen olika: lancettlika, ovala o. s. v.; något*  
*styfva, med uböjd, litet sammanviknen spets. Utan tvefel hybrid af de båda*  
*nyssnämnda, med hvilka den alltid växer blandad. — S. spathulata* W., den  
*form som mest liknar aurita; S. plicata* Fr. Nov. den, som mest liknar *repens*.  
*S. incubacea* Fr. Mant. 1 och S.V.Sc.

- 19 *S. vagans* Ands. bladen bredt lancettlika—oval, *helbräddade* eller glest naggsågade,  
merändels *glatta*, under isgrå; häng. med kort, *småbladigt* skaft; fröh. *långt* skaf-  
tade, vanl. *silkesludna*, med ganska kort stift.  $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *livida*: *fotsög* buske

\*) Skaftet ätm. dubbelt längre än honingsgländeln.

\*\*) Med undantag af några få fjäll-lika blad, som vanl. understödja hänget eller kläda  
det hos äldre hängen stund. förlängda skaftet.

med tunna, n. genomskinliga blad. — *γ cinerascens*: bladen större, gles småtudda slutl. ofvanpå glatta. Fig. Fl.D.suppl.t.38. Wg.Fl.L.t.16 (β). Ands.Sal.Lapp.f.14; Mon.t.5,f.51. H.N.f.5, n:o 63.

Fukt. skogsäng. (Lpl.—Sk. — N. — β Lpl.—Helsl. — N. Romerige etc. — *γ Torn. Lpm.* — N. nordligaste del: Ands.) 1—3 fot hög buske, med korta, mer och mindre bladiga hängskaft, stundom n. inga. Svartnar icke vid torkning. Var. mycket sällan med de mogna fröhusen glatta: var. *glabrata* Ed.9, *S. hirtula* Ands.? — *α S. bicolor* Fr. *S. depressa* Ed.9, ett namn, som enl. hvad Ands. ådagalagt trol. icke af Linné varit gifvet åt närv. art. — β *S. livida* Wg. *S. arbusc. γ L.Fl.Su. ed.2.* — *γ S. sphacelata* Somf.

b — Bladen alltid släta, vanl. smala och helbräddade, yngre silkes-håriga.

20 *S. repens* L. bladen aflånga—ovala, merändels helbräddade, med vanl. tillbakaböjda kanter, yngre under silkeshåriga, slutl. isgrå [hos β på båda sidor hvitludna]; fröh. långt skaftade, aflånga, med kort stift.  $\frac{1}{2}$  4, 5. — β *argentea*: yngre bladen på båda sidor, de äldre på undre sidan, tjockt silkesludna. Fig. Fl.D.2489. Reich.f.1239. H.N.f.6, n:o 55. β Fl.D.2605.

\* *rosmarinifolia* L. bl. smalare, jemnbredt lancettlika, med platta kanter, under silkes-håriga; hängen korta; fröh. hvitludna. Fig. Fl.D.2556. Ands.Mon.Sal.t.6,f.64. H.N.f.6, n:o 56.

Kärr, sand. str. a. (Sk.—VB. Piteå. Herjed. — N. till Nordl. — \* Sk. Andrarum; Roslät. Hall. Gotl. — N.?) Låg buske, vanl. endast uppskjulande grenarne ur marken; bladen ofta äldre alldeles glatta, varierande från n. jemnbred till oval form; ståndarknapparne gula; fröh. dels ludna, dels glatta: var. *glabrata*. En medelform till *S. myrtilloides*, ell. enl. Ands. hybriditet, är *S. aurora* Læst., Ands. Mon.Sal.t.5,f.57, med små, under blågröna bl., som yngre äro silkeshåriga. — β *S. arenaria* L. Öl. och Gotl. Resa. — Anm.: Förf. anser *S. incubacea* L.Fl.Su. ed.2 vara en form häraf med under silkeshåriga blad [parallela hår]; *S. fusca* L. [Reich.f.1240] en form med bredare, under mer håriga blad, hvilket Rudbecks af L. citerade fig. samt Linnés Herb. öfven bestyrka.

× *S. Friesiana* Ands. bladen jemnbredt lancettlika, med helbräddade tillbakaböjda kanter, under glänsande silkeshåriga; fröh. tydligt skaftade, silkesludna, utan märkligt stift.  $\frac{1}{2}$  4. Fig. Fl.D.2557. Ands.Mon.Sal.t.6,f.66. H.N.f.2, n:o 60, samt f.5, n:o 65 [en bredbladig form].

Sand. hafsstr. r. (Sk. i Köpingsåns gamla strömfåra vid dess fordna utlopp. Hall. Halmstad; vid Störans utlopp.) Bladen likna dem hos *S. viminalis*, men busken är låg, med nedligg. stam och med föga mer än  $\frac{1}{2}$  t. långa hängen vid blomningen. Enl. Ands. m. fl. tydligt hybrid af föreg. och *viminalis*. — *S. angustifolia* Ed.9, icke Wulf. enl. Ands.

c — Bladen alltid släta och glatta; hängskaften långa bladiga.

21 *S. myrtilloides* L. hela växten glatt; bladen elliptiskt ovala eller aflånga med intryckt bas, trubbiga helbräddade, under blåaktiga.  $\frac{1}{2}$  6. Fig. Sv.B.646. Fl.D.suppl.t.11f. Wg.Fl.L.t.18.f.1. Ands.Sal.Lapp.f.19; Mon.t.5,f.53. H.N.f.8, n:o 63.

Fjelltr. (Lpl.—Herjed. VB. nordliga del, teml. allm. Ängml. Medelp. Halverö, Kösildret. Helsl. Ljusdal s., nedom Backa: Wistr. Smål. i nor. ändan af Spetsa-mossen vid Hof nära Vexjö; Kalm. län, i S. Wi. — N. Ost-Finnm. mell. Elvenäs och Jarfjord i Sydvaranger; samt Vest-Finnm. vid Sjuosjävre och Maalselven: Norm. Nordl. i Soelvigmarken.) *Alnshög*, till alla delar glatt buske, endast hängfjällen hafva vanligtvis några långa hår i spetsen. Stipler finnas enl. Ands. endast på luxurierande skott och äro mycket små, aggrunda.

\*\*\*\* Fröh. långt ell. tydligt skaftade, med utdraget ell. långt stift.

a — Bladen glatta ell. håriga, lätt svartnande vid torkning; stift mycket långt.

22 *S. versifolia* Wg. bladen lancettlikt aflånga snedspetsade helbräddade, under småludna med upphöjda ådror och något nedböjd kant; hängskaften bladiga; fröh. långt skaftade, meränd. finhåriga, med utdraget stift.  $\frac{1}{2}$  6. Fig. Sv.B.511. Wg.Fl.L.t.18, f.2. Ands.Sal.Lapp.f.17; Mon.Sal.t.5,f.58. H.N.f.3, n:o 56; f.15, n:o 62.

\* *myrtiloides* Fr. fröh. och blad glatta. Fig. Ands.Sal.Lapp.f.18, a, b.

Fjellv. (Lpl.—Jemil. VB. i Nilsmyran vid Björkfors; vid Selets bruk. — N. — \* Lpl. VB. Piteå. — N. Finnm. Kistrand.) Låg buske med 1—1½ tum långa, särdeles under småludna blad. Anses af Ands. vara hybrid af föreg. och *S. Lapponum*, samt alldeles icke beslägtad med följ. — *S. fusca* Fr. Mant. 1.

- 23 *S. nigricans* Sm. bladen aflånga—ågggrunda eller omv. ågggrunda, vågbräddadt sågade, under upphöjdt ådriga och stull. isgrå; fröh. med skaft af hängesjällens längd, åggformiga, smalspetsiga, med utdraget stift.  $\frac{1}{2}$  5. — *a. protea* Ands. hängen oskaftade, knappt bladiga. —  $\beta$  *borealis* Fr. hängeskaften utdragna, bladiga. Fig. Wg.Fl.L.t.17. Fl.D.2553. Ands.Sal.Lapp.f.15; Mont.7,f.69. H.N.f.5, n:o 62; f.8, n:o 62.  $\beta$  H.N.f.7, n:o 63.

\* *latifolia* Forb. bladen tjocka, tät gråludna; fröh. smala, med kort stift.

Skogsång. a.,  $\beta$  fjelltr. (Sk.—Lpl. — N. — \* Lpl. och ÖG. enl. Ands.) Buske, som var. i högsta grad, med glatta, småhåriga och ulliga fröh., glatta och ludna blad o. s. v., stipl. halft hjertlika. Är alla äldre författares *S. phylicifolia*, sedan Linnés tid. En medelform mell.  $\beta$  och *S. myrsiniles*, ell. enl. Ands. en hybriditet, är enl. nämnde förf. *S. punctata* Wg. ell. *S. Wahlbergii* Ands., som äfven innefaller *S. myrsiniloides* Fr. H.N.f.16, n:o 62. — \* *latif.* åter anses af Ands. för hybrid af *S. nigric.* och *caprea*.

b — Bladen glatta, under isgrå, icke svartnande.

- 24 *S. phylicifolia* L. bladen lancettlika—ovala naggsågade; fröh. tydligt skaftade, finhåriga, stundom glatta, med något utdraget stift.  $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *majalis*: mer högväxt; bladen ovala; hängen n. bladlösa; fröh. glatta. —  $\gamma$  *subglauca*: fröhus med kortare skaft; bladen undertill ludna, omärkl. sågade, slutligen gulnande. Fig. Wg. Fl.L.t.16,f.2. Ands.Sal.Lapp.f.9; Mont.7,f.70. H.N.f.3, n:o 54; f.8, n:o 61 [*S. tenuifolia* Fr.].  $\gamma$  Ands.Sal.Lapp.f.10.

Stränd. etc. i fjelltr. (Lpl. och VB.—Ångml. Dal. Verm. Tåsångarne i nor. Finn-skoga sn. Vestml. Odensvi sn; Skinnskatteberg. Södm. flerst. — N. —  $\beta$  och  $\gamma$  i fjelltr.) 3—8 fot hög buske. Stipler finnas sällan; de, som förf. sett, äro mycket små, aflånga tandade. — *S. bicolor* Koch. Syn. —  $\beta$  *S. majalis* Wg.Fl.L. —  $\gamma$  *S. Wichura* Ands.Mon.Sal. trol. hybrid af *phylicifol.* och *glauca*.

- X *S. laurina* Sm. bladen bredt aflånga eller ovala, glest naggsågade; fröh. n. lancettlika, silkestudna, med skaft n. af fjellens, stift af märkenas längd.  $\frac{1}{2}$  4, 5. Fig. Ands. Mon.Sal.t.8,f.87. H.N.f.8, n:o 60.

Skogsång. och odl. st. r. (Smål. Femsjö; Boarp i Barkeryd; Scheutz. Torn. Lpm. VB. Öfver-Kalix (?). R. Fr. — N. enl. Fr.) Bladen endast yngre något småludna, sedan glatta; stipl. halft hjertlika; hängena ett par tum långa, stull. med  $\frac{1}{2}$  tum långa småbladiga skaft. Förklaras af Ands. på det säkraste vara hybrid af föreg. och *S. caprea*. — *Salix silsiaca* Fr. i Mant. 1 anses i S.V.Sc. vara en skuggform, med tunnare blad och längre skaftade fröh., af *S. laurina*; Ands.f.13.

- 25 *S. hastata* L. bladen ovala—aflånga, naggsågade, under nåldådriga; fröh. aflånga glatta, med skaft och stift som hos föreg.  $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *subreticulata*: bl. tunna rundade, under gulådriga. Fig. Sv.B.719. Fl.D.1238. Wg.Fl.L.t.16,f.5. Ands.Sal. Lapp.f.11; Mont.9,f.102. H.N.f.3, n:o 53.

Fjelltr. etc. (Lpl.—Dal. Verm. bergsl. vid Hornkullen i Kroppa sn. Uppl. Film sn, nära Filmsjön. Sällsynt i södra prov. ända till Skåne. — N. —  $\beta$  Lpl.) 1—3 alnar hög buske, med blad, som variera från lancettlik till åggrund och hjertlik form; fasta till byggnaden, med platta kanter; stipl. vanl. mycket stora, halft hjertlika, men hos smärre fjellformer små, ofta felande; hängeskaften bladiga. Formen hyperborea Ed.9 skall enl. Ands. vara helt och hållet tillfällig. — *S. malifolia* Sm. [den stora bredbladiga formen].  $\beta$  *S. reticuloides* Ands. i DC. Prodr.? (*S. arbuscula*.)

+++ Mycket lågväxta (sällan mer än fotshöga) arter, med hängesjäll som afd. ++; honingsgländl. vanl. 2: *Chamelix* Fr. [äfven innefatt. *S. glauca*].

\* Bladen vanl. ovala—aflånga.

- 26 *S. myrsiniles* L. bladen ovala ell. omv. ågggrunda, sågade, nåldådriga, yngre lång-Hartman, Skandinavien Flora (10:de uppl.).



- håriga, slutl. *glatta*, på båda sidor gröna och glänsande; fröh. n. *oskaftade ludna*, med *uldraget* stift.  $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *procumbens*: 3—6 tum hög, nedtryckt; stiftet kortare. —  $\gamma$  *subglauca*: hängen i toppen och på sidorna; fröh. tjockt hvitludna. Fig. L.Fi.L.t.7,f.6. Ands.Sal.Lapp.f.22. Fl.D.1054. H.N.f.5, n:o 66.
- Fjelltrakt. (*Lpl.*—*Herjed.* — *N.* —  $\gamma$  *Pit. Lpm.* Löfmokk: Ands. — *N. Finnm.* Tsatsa enl. ex. af Læst.) 3—12 tum, *stundom alnehög buske*, med *tumslånga tjocka uppråta hängen*, mest i *qvistarnes topp*, bladen *tjocka*. —  $\beta$  *S. myrsin.* var. *subpolaris* Læst. mskr., *S. Sommerfeltii* Ands.?, med hvilket *sednare* namn *betecknas en hybrid af S. myrsin. och herbacea.* —  $\gamma$  *S. Normani* Ands., *trol. hybrid af myrs. och glauca.*
- 27 *S. arbuscula* L. bladen *aflånga—lancellika*, på midten vidgade och naggsågade, *glatta* glänsande, under grågröna; fröh. *kort skaftade, småludna*, med *ndgot uldraget* stift.  $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *vacciniifolia*: bl. elliptiska; fröh. slutl. n. *glatta*. Fig. L.Fi.L.t.8,f.m. Ands.Sal.Lapp.f.23; Mon.t.7,f.80. H.N.f.5, n:o 61.
- Fjelltrakt. r. (*Torn.*—*Pit. Lpm.* *Jeml.* *Herjed.* på alla fjell i nordvestra delen; *Hamra* och *Skarfjellet*. — *N. Alten*; *Dovre*; *Gudbrandsdalen*, *Jöndalen* etc.) *Vanl.* 6—12 tum hög, *men stundom öfven ett par fot*; bladen  $\frac{1}{2}$ —1 tum långa, *öfvan glänsande*, under *opaca*; hängen *småla*, med *kort*, *bladigt skaft*. — *S. arbusc.*  $\beta$  *L. Fl.Su. ed.2.*
- 28 *S. ovata* Ser. bladen *ovala spetsiga*, glest och grundt sågnaggade, slutl. *glatta*, med kanterna och nerverna under finludna; fröh. n. *oskaftade*, äggformiga *ludna*, med *uldraget* stift.  $\frac{1}{2}$  6. Fig. Ser. Monogr.t.2. Fl.D.suppl.t.39. Ands.Sal.Lapp.f.24. H. N.f.7, n:o 64.
- Fjellv. r. (*Lul. Lpm.* mellan *Rissajokk* och *Alkajaure*; *Wallibacken* och *Snjårak m. fl. st. i Qvikkjokk* enl. Ands. *Pit. Lpm.* *Tjdtjakk* ymn., samt på *Rebnits*; *Gaissats*; *Sartajokk*: *H. Widm.* *Um. Lpm.* *Stuoraware. Jeml.* *Sylfjellen*; *Åreskutan*; *Drommen. Herjed.* *Helags- och Rutfjellen.* — *N. Finnm.* — *Dovre* öfvan *Fogstuen*; *Joradalen.* *Filefjeld*, vid foten af *Suletind.* *Voss* på *Graasiden*.) 5—10 tum hög *buske*, med omkr. *tumslånga blad*; hängena *korta.* Förmodas af Ands. vara hybrid af ant. *S. arbusc.* ell. *S. phyllicif.* med *S. glauca* (*Bot.Not.1867,p.114*), ell. ock af *S. glauca* och *herbacea* (*D.C.Prodr.XVI,p.288*). — *S. pyrenaica* \* *norveg. Fr.*; den *Pyreneiska* arten är dock mycket afvikande. *S. alpestris* Ands.
- 29 *S. sarmeniacea* Fr. bladen äggrundt aflånga—elliptiska, merändels *trubbiga*, *naggsågade*, parallelt ådriga, yngre håriga; fröh. *skaftade*, aflångt äggformiga, slutl. *glatta*, med *uldraget* stift.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Ands.Sal.Lapp.f.20.
- Fjellv. r. (*Lul. Lpm.* samt *Jeml.* *Åreskutan* enl. Ands. *Herjed.* på södra *Skarfjellet* och *Sånfjellet*. — *N. Finnm.* och *Nordl.* enl. Ands. *Heckesfjell*, på gränsen mell. *Åserald* och *Fjotland*s sockn. vid *Knaberejsen*; nära *Ouse* i *Oustads* sn m. fl. st. i *Christianssands* st.) 3—6 tum hög. Bladen *variera mellan bredt aflånga trubbiga och omv. äggrunda, mer spetsiga.* Stånd. ofta 3-ne, icke sällan med *samväxta strängar.* Anses af Ands. för en hybrid af *S. hastata* och *herbacea.* — *S. retusa* \* *sarm. Fr. Manl. 1.*
- \*\* Bladen oftast rundade, ända till cirkelrunda.
- 30 *S. polaris* Wg. bladen *runda eller ovata, helbräddade* glatta och *slåta*; fröh. n. *oskaftade* äggrunda *ulliga* eller mjukhåriga, med *uldraget* stift.  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Sv.B. 493. Fl.D.suppl.110. Ands.Sal.Lapp.f.28. H.N.f.5, n:o 68.
- Fjellv. r. (*Vid Tornio* träsk. *Lul. Lpm.* *Qvikkjokk*, *Kerkeware* m. fl. st. *Pit. Lpm.* *Tjdtjakk. Jeml.* på *Snasahögen* etc. *Herjed.* *Helags- och Skarfj.* — *N. Finnm.* *Hammerfest* etc. — *Dovre.* *Finnshöe*, *Jerkind*, *Knuds- och Blåhöe*, *Joradalen* etc.) *Endast qvistarnes blad- och blombärande toppar visa sig öfver marken*; bladen *mer slåta*, icke så skrynkligt ådriga som hos följ., till hvilken dock öfvergångar icke saknas; äro stundom urnupna. — *S. herbacea* A: *Lilj. ed.2.*
- 31 *S. herbacea* L. bladen vanl. n. *cirkelrunda* trubbiga eller urnupna, *glatta naggade* nätådriga *ojemna*; fröh. n. *oskaftade*, meränd. *glatta*, med *kort stift.*  $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. L.Fi.L.t.7,f.3, 4. Sv.B.367. Ands.Sal.Lapp.f.27. Fl.D.117. H.N.f.5, n:o 67; f.8, n:o 64, var.
- Fjellv., a. (*Lpl.*—*Dal.* *Idre*; *Städjan* och *Löfåsen.* — *N.*) *Växetsätlet* som hos föreg.,

hvilken jemte *S. herbacea* troligen äro de minsta buskväxter i världen. Var. betydligt större: var. *fruticosa* Fr. H.N.f.8, samt med småludna frö.

- 32 *S. reticulata* L. bladen n. cirkelrunda eller bredt elliptiska, med hela, tillbakaböjda kanter, under hvithåriga eller isgrå, gropiga mellan\*de upphöjda nättlika ådrorna; frö. oskafade, ludna, n. utan stift. 5 6. Fig. L.F.L.t.7,f.1, 2. Sv.B.529. Fl.D. 212. Ands.Sal.Lapp.f.25. H.N.f.9, n:o 62.

Fjellv. (Lpl.—Herjed.—N.) Växtsdtt nästan som hos de föreg. med grof stam och grenar, till större delen under jorden, bladen tjocka, vanl. 1 tum i längd och bredd, stundom något aflånga, alltid rundadt trubbiga.  
(*S. repens*.)

- 79 Fam. BETULINÆ Rich. Sambyggare. ♂hången af sammansatta sköldlika fjäll, hysande 1—3 blr; ♀hången af fjäll utan hyll. Fruktämne 2rummigt, med ett frö i hvarje rum; frukten vingfrukt ell. nöt. Fröhvite 0.

### 393. BÉTULA Lin. Björk.

† Träd med verklig kronstam; frukthängen slaka, hängande: *B. alba* L.

- 1 *B. verrucosa* Ehrh. årsskotten glatta och kådprickiga; bladen deltoidiska ell. rutformiga, med smal utdragen spets, dubbelsågade, alltid glatta; frukthängena aflångt cylindriska, med fjällens sidofilkar riktade horisontalt ut- ell. något nedåt från mellanliken; frögömmet smalare och mycket kortare än den omgifvande vingkanten. 5 5. — *β lobata*: bladen likade i äggrunda spetsiga filkar. — *γ dalecarlica* L. bladen n. pardelade i lancettlika långspetsade filkar. — *δ arbuscula*: med nagelstora rundtrubbiga blad, mer breda än långa. Fig. Sv.B.80. Fl.D.2549. H.N.f.2, n:o 53. *β* H.N.f.9, n:o 59. *γ* Vet.Ac.H.1786.t.6. H.N.f.15, n:o 60. *δ* H.N.f.11, n:o 57.

Skog. och torra äng. a. (Sk.—VB. Kengis. Pil. Lpm. Glommersliden. Jemtl. Storsjötrakten. Dal. — N. — *β* Verml. Christinehamn m. fl. st. Stockh. Varnö på Ornön. — *γ* Dal. Lilla Ornäs. Smål. Adelöfs sn, vid Södraholm; Björknäs i Vireda sn: Scheutz. ÖG. Sillsjö i Skedevi sn; Ornäs i Ödesbög enl. Kindb. Ex. från Smål. och ÖG. visa en medelform till *β*. — *δ* Uppl. Frötuna nära Uppsala. ÖG. Skedevi sn, nära Tisenhult; Skackebo i Nykil enl. Kindb.) Högst träd med hvit, men oftare sprickfull och ojemn, öfverhud ell. näsfer, ofta med smala hängande qvistar: var. *pendula*. Rottelningarnes blad glatta. — *B. odorata* Reich. *γ* *B. hybrida* Blom i V.Ac.H. *B. verrucosa* *γ* *laciniata* Ed.9.

- 2 *B. odorata* Bechst. årsskotten småludna, icke kådprickiga; bladen äggrunda—något hjertlika spetsiga olikformigt sågade, yngre småludna; hängen som föreg. med fjällens sidofilkar riktade mer framåt; frög. smalare men föga kortare än sin vingkant. 5 5. — *β oxyacanthifolia*: bladen trubbigt likade. — *γ microphylla*: bladen nagelstora, bredt äggrunda spetsiga. Fig. Fl.D.1467. H.N.f.2, n:o 54.

\* *pubescens* Ehrh. stor buske med brun bark, småludna qvistar, bladskaf och hängen.

Skog. och fukt. st. a. (Lpl.—Sk. — N. — *β* Smål. Näsbyholm. Verml. vid Liljendal i bergslagen. — *γ* Um. Lpm. Dal. vid Dalfors bruk; Fahlun. Ner. vid Kils Ramsbytta. VG. Göteborg. Helsl. Loos sn: Wistr. Stockh. i Färentuna. Södm. Blacksta prestg.: C. Ind. Smål. Stenbrohult; Korsberga sn.) Träd som föreg. med slätare, hvit näsfer, mer äggrunda och mindre spetsade blad; ofta med hängande qvistar [v. *pendula*]. Telningarnes blad ludna. *γ* vanl. lika stort träd, med blad icke större än hos föreg. *δ*. \* *pub.* torde vara en egen art, som förekommer på fuktig mark. — *B. alba* Lin. Herb. och Fl.D., med hvilket namn Linné omfaller både denna och föreg. art. — *B. glutinosa* Wallr. och Fr. *B. carpatica* W.

†† Buskar, stund. små träd, med uppräta frukthängen; frög. icke bredare än sina vingkanter.

- 3 *B. intermedia* Thom. bladen rundadt äggr.—ovala, stund. med hjertlik bas, olikformigt dubbelsågade, med spetsade sågtänder, nätådriga; frukthäng. ovalt aflånga, kort skafade; fjällens filkar n. likformiga, smala, riktade framåt, nerviga; frög. af vingkantens längd och bredd. 5 6. Fig. Reich.f.1283. Lindeb.Nov.t.2,f.1.

Fjelltr. (Torn. Lpm. och VB.—Herjed. Verml. i bergslagen och Elfdalen flerst. Uppl. Dannemora; Simtuna enl. Leffl. Smål. Gråne i Järeda och Ramseryd i Forssarum enl. Scheutz. — N. Finnm.—Goustaßjell i söd. N.) Omkring 3 alnar hög buske, stund. ett litet träd. Frög. ofta smalare än vingkanterna. Mycket närbeslägtad med en del former af föreg. och ännu mer med följ. art, från hvilken den hufvudsakl. skiljes med de tydligare spetsiga och mer hvass-sågade bladen, samt de bredare vingkant. Bägge hafva hångefj:s flikar håriga. — *B. subalpina* och *B. oycowiensis* Larsson.

+++ Buskar, oftast lågväxta, med häng. som föreg. afd.; frög. vanl. mycket bredare än sina vingkanter.

- 4 *B. alpestris* Fr. bladen runda—*n. vigglika* trubbiga, enkelt, men något olikformigt sågade, under jemna; frukthäng. som hos föreg.; fjällens flikar *n. likformiga åggrunda, rigtade framåt*; frög. vanl. bredare än vingkanten. 5/6. Fig. Fl.D.suppl.t.37. H. N.f.5, n:o 60.

Fjelldalar, r. (Lpl.—Herjed. — N. Ost-Finnm. Tana och Varanger. Vest-Finnm. Magerö: Th. Fr. Trondhj. Goustaßjell; Dovre; Tind; Johnsknuden etc.) 2—3 alnar hög buske, med blad som *B. nana*, ehuru ofta en tum breda. Synes jemte föreg. vara hybrid af *B. odorata* och *nana*, med hvilka den sparsamt förekommer blandad. — *B. humilis* Ed.4. *B. alba* ð Wg. *B. pallescens* Larsson enl. Lindeb.

- 5 *B. humilis* Schrank. bladen åggrunda, olikformigt sågade, under nätdruga bleka; frukthäng. som hos föreg.; fjällens flikar *n. likformiga jemnbreda*, sidoflikarne utstående; frög. dubb. bredare än vingkanten. 5/6. Fig. Reich.f.1279, 1281. H.N. f.13, n:o 72.

Skog. r. (Smål. Forssarum sn. vid torpet Arken på Ramseryds egor: Kyrkoh. Montelin enl. Scheutz.) Alnehög buske med upprätt växt, utmärkt af sina smala, *n. glatta*, men kådprickiga grenar, tunna åggrunda, vid basen ofta hjertlika blad, samt hångefjällens mycket och likformigt utdragna flikar. — *B. fruticosa* Willd. och Reich.D.Fl. [f.1279].

- 6 *B. nana* L. bladen *n. cirkelrunda* naggsågade, med trubbiga tänder, under upphöjdt nätdruga; frukthäng. som hos föreg.; fjällens flikar *n. likformiga, jemnbredt aflånga*, något utstående; frög. dubb. ell. flere gånger bredare än vingkanterna. 5/6. Fig. Sv.B.379. Fl.D.91. H.N.f.2, n:o 55.

Kärr, i synnerhet i fjelltr. (Lpl.—Gestr. Vestml. Ner. och Verml. ÖG. Brunneby sn. nära Husbyfjöl; Sund sn. Bultsjö skog m. fl. st.: Kindb. Smål. flerst., sydligast i Skatelöfs sn. Taglamyren, vid Aramo i Urshut och i Ljuder enl. Scheutz. VG. Dalsl. Boh. Hall. — N.) 1—2½ fot hög buske, med håriga grenar, nagelstora blad; hångefjällens flikar lika stora, tvärhuggna och söga utstående.

### 394. ALNUS Gærtn. Al.

- 1 *A. glutinosa* W. bladen rundade eller omvänt åggrunda, i speisen tvärtrubbiga eller intryckta, dubbelsågade [hos  $\beta$  djupt flikade], på undre sidan i nerv-vinklarne ludna, för öfrigt glatta och något klubbiga, på båda sidor gröna. 3/4. —  $\beta$  *laciniata*: bladen parklufvet flikiga. Fig. Sv.B.128. Fl.D.2301.  $\beta$  Thunb. Diss. de Betula t.f.1. Skog. vid vatt. a. (Sk.—Ångml. Dal. och Verml. Boh. Öl. Gottl. på Fårö; Sandöm: Eis. och Stuxb. — N. till Romsdalen. —  $\beta$  Verml. Löfnäs bruk vid sjön Yngen.) Hög träd, stundom buske, med tidiga blr på bar qvist: Al. — *Betula Alnus* L.  $\beta$  *B. laciniata* Thunb.

- 2 *A. pubescens* Tausch: bl. rundade ell. bredt ovala, trubbiga eller med omärklig spets, grundt dubbelsågade, med låta och hvassa sågtänder, under håriga eller småludna, på båda sidor gröna. 5/4, 5. Fig. Reich.f.1292. H.N.f.11, n:o 58.

Fukt. st. helst i fjelltr. (Lpl.—Geste. — N. Ost-Finnm.—Dovre; Lomsfjellen.) Låg träd eller buske, skild från föregående med bladen, som äro smärre och finsågade, mindre trubbiga, samt under håriga; från följande med vida trubbigare och mer finsågade blad. — *A. barbata* Mey. och Fries. *A. hybrida* Al.Br.

- 3 *A. incana* W. bl. åggrunda ell. ovala, spetsiga, groft dubbelsågade, under gråludna. 3/4, 4. —  $\beta$  *pinnatifida*: bladen *n. paradelade*. Fig. Sv.B.595. Fl.D.2302.  $\beta$  V.Ac. H.1790.t.5 Reich.f.1294. H.N.f.13, n:o 70.

Fukt. st. (*Lpl.*—*Uppl.* Tierp sn vid Fors. *Rosl.* Börstel. *Vestml.* Ner. *Verm.* ÖG. *Smål.* norra delen ned till Vrånghult i Nottebäck af Kronob. län; *Vestervik.* Sk. s.ö. del. vid säteriet Smedstorp: Eug. Hemb. *VG.* på och omkring Billingen; Kinna sn; Mösseberg, Grimstorp m. fl. st. *Boh.* *Hall.* Vessige. — *N.* —  $\beta$  *Verm.* Lesjöfors.) *Lågt träd eller buske, med hvitare och slätare bark än A. glut., icke klubbiga blad: Alder. Blr på bar qvist, tidigare än både Alen och Hasseln. Var. med mer och mindre tillt ludna blad. — Betula Alnus  $\beta$  incana L.  $\beta$  B. pinnata Lundm. i Vet.Ac.H.*

80 Fam. *MYRICEÆ* Rich. Hängen af enkla fjäll. Frukt i kottelik samling, af små enfröiga stenfrukter, omsluta af de köttigt uppsvållda blomfjällen.

395. *MYRICA* Lin. Pors.

1 *M. Gale* L. bladen viggformigt lancettlika, i spetsen sågade; häng. med kortspetsade fjäll.  $\S$  4, 5. Fig. Sv.B.76. Fl.D.327. H.N.f.16, n:o 60.

*Kärr, stränd. (Sk.—VB. och Jemtl. Boh. Öl. Gottl. — N. till söd. Finnm. Ibbestad: Norm.) Alnshög buske med blr på bar qvist i bruna upprätta hängen. Är någongång sambyggare.*

81 Fam. *CONIFERÆ* Juss. Hanblommor i hängen eller gyttningar utan hylle. Honblommor gytttrade eller ensamma, slutligen bildande en fjällig eller bärlrik kotte, innehållande ensamma nakna frön. — Barträd.

396. *PINUS* Lin. Furu, Tall (1), Gran (2), Lärkträd (4).

† Barren qvarsittande öfver vintern.

\* Barren parvisa.

1 *P. silvestris* L. barren styfva, plattadt halstrinda, af kottens längd; denne äggformigt kägellik, skafadt, böjd nedåt; fjällen mot spetsen tjocka.  $\S$  5. Fig. Sv.B.91.

*Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Børselv i Porsanger: Norm.; och Ost-Finnm. Syd-Va-ranger.) Högt träd, med de yngre grenarne i krans. — En i Lpl. förekommande form, med kortare och bredare barr i åtskiljda kransar, är var. lapponica Fr. S.V.Sc.*

\*\* Barren enstaka: *Abies* Don.

2 *P. Abies* L. barren spridda, något åkantiga, uddspetsiga, enfärgadt gröna; kotten cylindriskt kägellik, hängande; fjällen platta, rutformiga med tvär, ojemnt tandad spets.  $\S$  5. —  $\beta$  *viminialis*: med långa, n. enkla, nedhängande qvistar, n. trinda af de rundt om spridda långa barren. Fig. Sv.B.217. Fl.D.193.  $\beta$  V.Ac.H.1777, t.8, 9.

*Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Bejernfjord i Nordl. —  $\beta$  sällsynt, något enda träd här och der från Smål. och Hall. upp till Helsl. och Jemtl. — N. Gudbrandsdalen, i Ringeboe: Scheutz.) Högt träd med på undre sidan plattade qvistar. Hos  $\beta$  hänga de yttre qvistarne rakt ned som piskmärkar, mera trinda af de öfverallt spridda, tumslånga barren. — Abies excelsa DC. och Fries. Pinus Picea Parl. i DC. Prodr.*

\*3 *P. obovata* Ant. barren som hos föreg.; kotten äggformigt aflång, upprät; fjällen omv. äggrunda, med helbräddad spets.  $\S$  7? Fig. Ledeb. Ic. pl. rar. Fl.Ross.t.499.

*Skog. r. (N. Ost-Finnm. »i en talkskog på vest. sidan af sjön C'olmejavre, vid pass  $\frac{1}{2}$  mil n.n.v. från Svanvik.») Högt träd, till utseende likt föreg., men af spensligare växt. — P. orientalis Ed.9.*

†† Barren årligen afvallande: *Larix* Endl.

†4 *P. Larix* L. barren i början knippevisa, platta; kotten äggformig, upprät; fjällen med platt, trubbig spets.  $\S$  5. Fig. Reich.D.Fl.1137.

*Parker. (Sk.—Medelp. Planterad och någon gång sjelfsådd.) Högt träd, med knippen*

af talrika barr, hvilka knippen till en del slutt. utväxa i qvistar med enstaka, strödda och långa barr. — *Larix europæa* DC.

397. JUNIPERUS Lin. En. \

- 1 *J. communis* L. barren 3:ne i krans, jemnbredt syl-likä spetsiga, längre än frukterna.  $\frac{1}{2}$  6. —  $\beta$  *nana*: bladen bredare, n. lancettlika, inböjda ell. tegellagda, föga längre än frukten. Fig. Sv.B.289. Fl.D.1119;  $\beta$  2739.

Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  i fjellen.) *Buske, sällan lågt träd med blå bärlika torra frukter: Enbär.  $\beta$  har bladen mer aflånga och tilltryckta, mycket olik  $\alpha$ , i hvilken den dock i fjellarne tydligen öfvergår: J. nana Willd. J. comm. v. alpina Gaud.*

398. TAXUS Lin. Idgran.

- 1 *T. baccata* L. qvistarne platta af de 2sidigt fästade jemnbreda platta barren; bläna oskaftade, i bladvecken; hanhänget klotrundt.  $\frac{1}{2}$  5. Fig. Sv.B.265. Fl.D.1240.

Skog. r. (Sk.—Södm. Utön m. fl. öar; Mörkö sn; Trosa. Uppl. Vätö sn, på Skabbholmen vid Blidö; Hollnäs och Vesslands sockn.; Elfskarleby. Gestr. nära Grinduga och Kubbo. Ner. Verml. Dalsl. VG. Boh. Hall. Öl. Gotl. — N. Christiania; Porsgrund; Mandal; Bergen etc.) *Af en mindre Grans höjd, ehuru mer buskaktig; får dock sällan hinna denna storlek. Har röda bärlika frukter.*

## 12 KLASSEN

### NUDIFLORÆ.

82 Fam. **CALLITRICHINEÆ** Link. Stånd 1. Stift 2. Frukttämne 4knöligt, 4rummigt, slutl. 4, enföriga smånötter.

#### 399. CALLITRICHE Lin. Lonke.

† De öfversta bladen vanl. bredare, n. rosettlíkt ordnade; blrna inom 2 hvita inböjda skärmbblad: *C. verna* L.

1 *C. stagnalis* Scop. alla bladen, äfven de nedre, *spadlika* med utdragen, smal skaftlik bas, elliptiskt rundad 3- eller *sternervig* skifva; skärmb. *svagt* krökta; frukten med *vingade* kanter och *quarsittande*, *nedböjda* stift af fruktens längd. ☉ 6—9. Fig. FL.D.129 och 1741. Lönnr. i Bot.Not.1867, f.a. Reich.f.1184—1186. H.N.f.15, n:o 63.

\* *platycarpa* Kütz. dubbelt mindre, bladen omv. äggunda, de nedersta grenbladen n. jemnbreda. Fig. Reich.f.1187—1199.

Vatten. (Sk. *Blek*. Lyckeby, Ramdala. Smål. mest i vest. delen. — *Uppl. Vestml. Ner. mell. och söd. del. VG. Hunneberg*, vid Karten; Sandhems sn enl. G. v. Ced.; Göteborg. Boh. Inland, midtför Svanesund; Foss sn, nära Munkedal: Lemf. Hall. Goull.) *Större än de följ. stundom ej olik Peplis; bladskifvan ett par lin. lång och n. lika bred; stånd. 2 lin. långa.*

2 *C. verna* Kütz. bl. aflångt *spadlika* med smal bas, *ell. jemnbreda*, de förre 3-, de sednare *inerviga*; skärmb. *som hos föreg.*; frukten med *föga* vingade kanter, *uppråta*, *försvinnande* stift af fruktens längd ell. kortare. ☉ 5—9. Fig. Lönnr.f.b. Reich.f.1179—83.

Vatten. (Sk.—Lpl.? — N. Nordl. och Finnm. mångenst.: Norm.) *Utbredningen i Sv. osäker, emedan följ. art och denna varit sammanblandade. Bladen variera, trol. hos alla arter i afst., efter vattnets djup och beskaffenhet från spadlika till aflånga och jemnbreda; stj. i vatten flytande, på uttorkade ställen krypande.*

3 *C. polymorpha* Lönnr. bladen som hos föreg.; skärmb. *starkare* krökta, quarsittande ovisnade; frukt. med *trubbiga*, fullkomligt ovingade kanter och *quarsittande*, *uppråta*, slutl. *utsperrade* stift *flere gånger* längre än frukten. ☉ 5—9. Fig. Lönnr.f.c.

Vatt. a. (Sk.—Lpl. — N.) Är troligen, såsom Lönnr. uppgifvit, *mycket allmänare än föreg. (i Ner. förekomma bägge), högst varierande i storlek och växtsätt. Förmodades i föreg. ed. vara identisk med den der uppförda C. verna var. intermedia, hvaraf äldre ex. i förf:s herb. noga öfverensstämmde med beskrifn. på polymorpha. Stiftens varaktighet synes hos bägge formerna något föränderlig.*

4 *C. hamulata* Kütz. bladen som hos föreg.; skärmb. *halfcirkelformigt* krökta, *kor-sande* *hvarandra*, vid fruktmogn. visnade; frukten med *hvarsa*, *föga* vingade kanter, *quarsittande*, *utsperrade*, slutl. *rakt nedböjda* stift. ☉ 7, 8? Fig. Lönnr.f.d. Reich.f.1200—1220. H.N.f.15, n:o 64.

Vatten. (Sk. Kullaberg, i Vikenaryds mosse; Gladsaxhallar enl. F. Aresch. *Blek Vämö*: J. Ankarcr.; Djupadal enl. G. v. Ced. *Uppl. Tibble och Åland* snr: G. v. Ced

Vestml. Vesterås; Köping. VG. Tidan i Sandhem sn enl. G. v. Ced. Boh. Klöfverön; Uddevalla, i Risån. Hall. Nissaån. Gottl. Väskinde sn: G. v. Ced.) *C. tenuifolia* Fr. Nov. *C. autumnalis* Kütz.

†† Alla bladen likformiga, jemnbreda; blrna utan skärblad.

- 5 *C. autumnalis* L. alla bladen åtskiljda jemnbreda tvärhuggna eller urnupna, ennerviga; frukten med tunna vinglika kanter, och stift som hos föreg. ☉ 7, 8. Fig. Fl.D.2120. Lönnr.f.e. H.N.f.4, n:o 83.

Vatten. (Sk.—söd. Lpm. — N. till Ost-Finnm.: Norm.) Växer upprätt och grenad ända nedifrån, alltid under vattnet, likväl sällande långt ned på grenarne rikligt med frukter, dubbelt större än hos någon af de föreg. Ståndarknapp. n. utan sträng. — *C. virens* Goldb.

- 83 Fam. CERATOPHYLLÆ DC. Ståndarknapp. 12—16, 2rummiga, utan strängar, inom ett mångbladigt svepe. Stift 1. Frukämne enfröigt, slutl. nött. Fröhvite 0.

#### 400. CERATOPHYLLUM Lin. Hornserf.

- 1 *C. demersum* L. bladen kransvisa, klynnedelade i styfva trådlika, gles tandade likar; nötterna elliptiska sprötspetsade och vid basen taggiga, för öfr. släta. 24 7, 8. Fig. Fl.D.2000. H.N.f.9, n:o 63.

Vattenpölar, grunda sjöar, damm. (Sk.—Uppl. Helsl. Hudiksvall. Medelp. Ångml. Bjerträ sn, Strinnefjärden. Ner. Dalsl. — N. Borrevand i Jarlberga sml.) Växten trind af de hvarandra något täckande bladen. — *C. oxyacanthum* Cham. enl. Lange.

- 2 *C. submersum* L. bladen som hos föreg., med finare och talrikare, svagare tandade likar; nött. äggformiga, oöppnade, beströdda med vdrilika knölar. 24 7, 8. Fig. Fl.D.510. H.N.f.9, n:o 64.

Vattenpöl. r. (Sk. vid Dalköpinge; Landskrona i fästningsgravnen; Lund och Vemmenhögsån etc. ÖG. i hafsvik. mell. Gryts prestg. och Åbäcksnäs: Kindb. — N. Hørsön i mell. Eidsvold och Ullensager.) *C. muticum* Cham.

## II. MONOCOTYLEDONEÆ.

### 13 KLASSEN

### FRUCTIFLORÆ.

84 Fam. **ORCHIDEÆ** Juss. Blomkalken kronlik oregelbunden, med en läppformigflik. Stånd. 1, säll. 2, samväxta med pistillen. Frukttämne under kalken, enrummigt, 3-skalligt, med fröfasten på väggarne.

1 Flocken **Ophrydeæ**. Ståndarknappen 1, orörligt hopväxt med pistillen. [Växter med stjelknölar.]

#### 401. ORCHIS Lin. Nyckelblomster

† Stjelknölarne odelade.

\* De 5 öfre kalkbladen spetsiga.

1 *O. militaris* L. skärmb. *aggrunda*, *flere gånger kortare* än frukttämnet; läppen 3-delad, sidoflik. mycket smala, mellanfiken utdragen, mot spetsen vidgad till 2, vinglika flikar *med en mellanliggande udd*, helbräddad; de öfriga kalkbladen *hjelmlikt hopslutna*; sporren *mycket kortare* än frukttämnet. 24 6. Fig. Sv.B.340. Fl.D.1277. H.N.f.10, n:o 61.

Lund. äng. (Sk. mellan Cimbritshamn och Blek. gränsen, t. ex. mell. Andrarum och Brösarp; Årup; Beckaskog; Lillö etc. *Blek. Sölvitsborg* vid Ynde. *Småll. Kalmar*, Skansängen [nu utgången enl. Sjöstr.]. *Öl. Gottl.*) *Blirna stora*, med *röd läpp*, *utvänd. askgrå kalkblad*. *Örtbladen lancelliskt aflånga*, *ofta öfver en tum breda*; *stjelknöl. äggformiga*. — *O. Rivini* Gouan och Reich. *fil. Orch. eur.*

2 *O. mascula* L. skärmb. *lancellika*, *af frukttämnets längd*; läppen *3klufven* i *föga olivstora* flikar, mellanflik. *urnupen* och *naggad*, utan mellanligg. tand; kalkens 2 yttre sidoblad *tillbakaböjda*; sporren *n. af frukttämnets längd*, uppåtrigtad. 24 5, 6, purp. blr. Fig. Sv.B.220. Fl.D.457.

Lund. äng. (Sk. *Blek. Småll. Urshult* sn, vid Ekekulla, Vesterbo torp och Rörvik; Algutsboda och Elmeboda sn: Scheutz. *Dalsl. Skårsdalen* vid Heden i Dalskog; Ryr och Benebo i Skållerud. *Hall. allm.* i söd. del.: Theor. *Öl. Gottl.* — *N. söd.* och *vest. del.* upp till Lofoden.) *Azel utdraget*, *mångblommigt*; *örtbl. lancelliskt aflånga*; *stjelknölarne elliptiska*. *Var. med hvita blr.*

\*\* De 5 öfre kalkbladen trubbiga.

3 *O. ustulata* L. skärmb. *lancellika*, *något kortare* än frukttämnet; läppen *3klufven*, mellanfiken *djupt 2flikig*; de öfr. kalkbl. *hjelmlikt hopslutna*; sporren *krökt framåt*, *mycket kortare* än frukttämnet. 24 6, 7. Fig. Sv.B.351. Fl.D.103. H.N.f.15, n:o 65.



Äng. (Sk. Blek. Tornby ängar, och Berntorp i Ramdala sn. Öl. Gottl.) *Äzel trubbigt, i toppen brunt af de outslagna blrna; dessa smärre än hos de öfriga, brunröda, med hvit, purpurprickad läpp; bladen smalt lancettlikt aflånga; stj.knölarna n. klotrunda.* — *O. antropophora* Fl.D.

- 4 *O. Morio* L. skärmb. lancettlika, af fr.ämnets längd; läppen grundt 3flikig, med n. likstora, breda trubbiga flisar; de öfr. kalkbladen som hos föreg.; sporren af fr.ämnets längd. 2 5, 6. Fig. Sv.B.233. Fl.D.253. H.N.f.1, n:o 66.

Äng. (Sk. Blek. Lyckeby, Sturkö m. fl. st. i öst. delen. Öl. Gottl. — N. Christiansands st. vid Christians., Mandal, Stavanger etc.) *Vanl. quartershög, med kort, mer fåblommigt ax af stora, purpurroda, säll. hvita blr; ötbl. lancettlikt aflånga; stj.knöl. klotrunda.*

- 5 *O. laxiflora* Lam. skärmb. vanl. längre än fr.ämnet; läpp. 3flikig, mellanfl. urnupen helbräddad; de 2 yttre kalkbl. tillbakaböjda; sporren kortare än fr.ämnet, tillbakarigtad. 2 7, purp. blr. Fig. Vet.Ac.H.1800,t.3,f.A. Reich.fl.Orch.t.40, 41,f.1. H.N.f.6, n:o 58.

Kärräng. r. (Gottl. Skälsö; Fleringe sn, Grindhammarträsk; vid Fardumegård i Rute sn; Tänglingsmyr i Etelhem; på stranden af en djup myr vid Vike i Boge sn; Bista etc.) *Spådare, mer högre än de föreg. med stora och glesa blr; ötbl. jernbreda; stj.knöl. rundade ell. äggformiga. Var. med läppens mellanflik något kortare än sidoflikarne, eller väl så lång som dessa: O. palustris Jacq.*

++ Stj.knölarna aflånga, endast klufna i spetsen.

- 6 *O. sambucina* L. skärmb. hinnaktiga mångnerviga, mycket längre än fr.ämnet; läppen rundad, grundt 3flikig och naggad; de 2 yttre kalkbladen utstående; sporren af fr.ämnets längd. 2 5, 6. —  $\beta$  *incarnata*: med purpurroda blr. Fig. Sv.B.362. Fl.D.1232;  $\beta$  2737. H.N.f.14, n:o 65.

Ängsback. (Sk.—Rosl. Vestml. Engsö och på Kalfholmen. VG. Öl. Gottl.) *Blrna var. gula och blåaktigt ljusröda, med skärm af samma färg; ötbl. aflånga, de nedre mot spetsen bredare, trubbiga. —  $\beta$  O. incarnata L. [dock icke Herb., der under detta namn förvaras O. angustifolia Wimm.].*

+++ Stj.knöl. handlikt delade.

\* Stjelen ihålig, fåbladig; bladen bredast vid eller nedom midten,

- 7 *O. latifolia* L. bladen ovala, vid midten bredast, spetsade; de nedre skärmb. längre än blrna; läppen grundt 3flikig; sporren kortare än fruktämnet; de 2 yttre kalkbladen tillbakaböjda. 2 5, 6, r. blr. Fig. Hall.Hist.t.31. Reich.t.50,51,f.1. H.N.f.7, n:o 67.

\* *elata* Hn.: 1—2 fot hög, med bredt lancettlika blad, starkt tillbakaböjda sidokalkblad. Fig. Reich.t.44,f.2.

Fukt. äng. r. (Sk. Broby: F. Ar. ÖG. V. Ny sn enl. Kindb. Rosl. Vahlö sn. Hall. Onsala, vid Staregården. Gottl. mell. Rute kyrka och Kopparfve. — N. söd. del. och längs vestkusten ända till Lofoden. — \* Sk. Ramstorp. Gottl.) *Hufvudformen  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög; bladen 1—1 $\frac{1}{2}$  tum breda, 3—4 t. långa vanl. brunfläckiga. Näppeligen skiljd från följ. såsom utmärkt endast af de breda bladen. — O. latifol. L. enl. Hallers cit. figur. O. majalis Reich. pl. crit.*

- 8 *O. angustifolia* Wimm. bladen lancettlika, vid ell. nedom midten bredast, något kölad och upprätta; alla skärmb. längre än blrna; läppen grundt ell. otydligt 3flikig; yttre kalkbl. i början utböjda; för öfr. som föreg. 2 6, 7, r. säll. hv. blr. —  $\beta$  *extensa*: bladen n. jernbredt lancettlika; skärmen mycket längre än blrna. Fig. Fl.D.266 och 2476. H.N.f.7, n:o 65, 66;  $\beta$  Reich.t.46,f.2.

\* *cruenta* Müll. bladen något äggrundt lancettlika, mycket brunfläckiga; blrna mörkröda. Fig. Fl.D.876. Reich.t.43,f.1.

Fukt. äng. (Sk.—VB. nor. del, Björkfors. Lul. Lpm.: H. Widm. — N. till Nordl. —  $\beta$  Gottl. i Vänge-myrr. — \* *cruenta*: Jeml. Frösön; samt på spridda st. i hela prov. Herjed. Funnesdalen. Ängml. Långsele sn, Ledinge. Medelp. Hässjö, på holmar vid Indalselvns utl.: Arn. Helsl. Loos, v. om Kyrktjärn: Wistr. — N. Finnm. Kaafjord; Tromsöe. Levangernæset. Rörås; Stuedalen; Børsvolden på Toten; Dovre etc.) *Af Linné icke skiljd från föreg. utan säkerligen hans, så väl som alla äldre St. författare, i Sverige här och der, äfven vid Uppsala, ymniga O. latifolia [under*

hvilket namn så väl som under namnet *incarn. den förvaras i Linnés herb.*] — *O. latif. Reich. Ic. O. incarnata Fr. S.V.Sc. och Reich.Orch.eur.*

- 9 *O. Traunsteineri* Saul. bladen lancettlikt jemnbreda—smalt aflånga, vid midten bredast; de nedre skärmb. längre än blrna; läppen rundad, grundt 3flikig, naggad; yttre kalkbl. tillbakaböjda. 2½ 5—7, r. blr. Fig. Reich.t.42. H.N.f.7, n:o 68.

\* *lapponica* Læst. bl. aflånga; blrna något smärre och tätare. Fig. Reich.t.53, f.1, 2.

Fukt. äng. r. (Sk. Hall. Onsala, vid Stare- och Karsegården. Boh. Sörbygd. VG. Verm. Marboånger mell. Gustafsforss och Liljendal. Små. Lannaskede; Dalhem, Emtöholm; Applerum i Thorsås enl. Ekstr. ÖG. Dagsmosse. Öl. Höghy vid Borgaträsk. Götll. Storugns i Lärbo sn; Hågur i Bunge; ången Ryglossan mell. Rutek:a och Fardume; Åkebäck myr nära Roma; Tånglingsmyr etc. — *N. Christania*; Bærum nära sjön Dæhliand; vid foten af Grønsås. — \* *Lpl. Karesuando* etc. — *N.*) 6—10 t. hög, med större och glesare blr, smälare blad, omkr. ½ t. breda. Torde dock sammanflyta med föreg. — *O. angustifol. Reich. O. incarnata* Handb. ed.2 och Fr. Mant.2. *O. macul. β majalis* Sæve Fl. Götll.

\*\* Stj. tät, mångbladig; bladen vanl. bredast ofvan midten.

- 10 *O. maculata* L. bladen aflånga—tunglika; de nedre skärmen af blrnas längd, de öfre kortare; läppen 3flikig; sporren n. af främnets längd; yttre kalkbl. utböjda. 2½ 6, 7. — *β angustifolia* bladen jemnbredt lancettlika; läppen djupt 3klufven. Fig. Sv.B. 413. F.L.D.933.

Fukt. äng. (Sk.—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finnm.) Blrna gredelina ell. hvita, med violetta teckningar; bladen meränd. brunfläckiga, hos *β* oflata rent gröna.

#### 402. ANACAMPTIS Rich. Salepsrot.

- 1 *A. pyramidalis* Rich. stjelknöl. odelade, klotrunda; bladen jemnbredt lancettlika; blomkalkens läpp 3klufven och helbräddad, med 2 upphöjda tänder vid basen; sporren trådläk, längre än fruktämnet. 2½ 7, r. blr. Fig. Sv.B.584. F.L.D.2113. H.N.f.6, n:o 57.

Äng. r. (Öl. Thorslunda i Skogsbytrakten; Vesterstad i Kastlösa; Runsten; Köpinge vid Lundegård; Böda vid Hunderum etc. Götll. Lummelunds bruk; Hangvar; Bunge; Fläringe; Klinte skansholme m. fl. st.) Äzet rundadt, tätblommigt. — *Orchis L.*

#### 403. GYMNADENIA R. Br. Brudsporre.

† Blrna vanl. röda; sporren smal, längre ell. föga kortare än fruktämnet.

- 1 *G. conopsea* Br. stjelknöl. handklufna; bladen jemnbreda—lancettlika; kalkens läpp likformigt 3flikig; sporren trådläk, mycket längre än fruktämnet. 2½ 6, 7, r. stund. hv. blr. — *β densiflora*: bladen lancettlika; blomaxet långt, tätblommigt. Fig. F.L.D. 224. Reich.t.70, 71. H.N.f.9, n:o 66, 67; *β* 68; Reich.t.72.

Äng. (Sk.—*Lpl.* — *N.* till Ost-Finnm. Varanger. — *β* Hall. Knäsvelstorp nära Halmstad. Öl. Götll. — *N.*) Var. på Dovre med längre och kortare sporre. En form från Jeml. har n. dubbelt mindre blr; en annan, var. *lapponica*, med sporren kortare än främnet, finnes enl. Prof. Zellerstedt i Umeå Lpm. och torde vara skild. — *Orchis L. Satyrium* Wg.

- 2 *G. odoratissima* Br. bladen smala jemnbreda; sporren syl-lik, något kortare än fruktämnet; för öfr. som föreg. 2½ 7, r. blr. Fig. Sv.B.542. H.N.f.6, n:o 59.

Skogsäng. r. (ÖG. Omberg i Höje äng, vid Charlottenborg och Djurkälla: Kindb. VG. Kinnekulle, på Österplana vall nära Stenåsen enl. Lem. Götll. mell. Rute kyrka och Kopparve; mell. Vike gård i Boge och Gothemsån; Storugns i Lärbo m. fl. st.) *Orchis L. Satyrium* Wg.

†† Blrna gulhvita; sporren n. punglik, flere gånger kortare än främnet.

- 3 *G. albida* Rich. stjelknöl. djupt handdelade; bladen aflånga, de nedre mot spetsen bredare; läppens mellanflik något större än sidoflikarne. 2½ 7. Fig. Sv.B.507, f.1. F.L.D.115. H.N.f.14, n:o 66.

Torra äng. r. (Sk. Blek. Hall. Boh. Thorskogs bruk. Små. vestra del; Vexjö och Herråkra; ostligast i Elghult. Dalsl. Bäckefors nära Mon. VG. i bergstrakterna. Herjed. Torkelstötten; Hamrafjell; Axhögen m. fl. st. Jeml. Åreskutan och Snasahögen;

Fölinge sn. Stakafjellet; Frostviken. *Pit. Lpm. Tjiddjakk. Lul. Lpm. Qvikkjokk; Unna Tokiware. — N. Christiansand; Heckeßell. Arendal vid Näs jernverk; Tind; Romsdalen; Dovre etc. upp till Ost-Finnm.) Axet idt af små blr. — Satyrium L. Orchis Sw. Habenaria Br. Coeloglossum Ed.4.*

#### 404. COELOGLOSSUM Hn. Grönkulla.

- 1 *C. viride* Hn. stjelknöl. handklufna; bladen ovala—aflånga; de inre kalkbl. mycket smalare än de yttre; läppen i spetsen 3tandad, mellantanden kortare. 2 6, 7. Fig. Sv.B.507, f.2. Fl.D.77. Reich.t.82. H.N.f.15, n:o 66.  
Skogsång. (Sk.—Lpl. Öl. — N. till Ost-Finnm.) *Blrna gulgröna, kortare än skärmen; på Unna Toki i Lul. Lpm. funna rödbruna. — Satyrium L. Orchis Sw. Habenaria Br. Peristylis Lindl. Platanthera Reich. fl.*

#### 405. PLATANTHERA Rich. Skogsviol, Nosserot.

† Sporren trådläk, åtm. dubbelt längre än fruktämnet.

- 1 *P. bifolia* Rich. stjelen nedtill 2bladig; bladen n. ovala—lancettlika; sporren n. jemnjock; ståndarknappens rum parallela. 2 6, 7, hv. blr. —  $\beta$  *grandiflora*: blrna glesa, dubbelt större. Fig. Sv.B.314. Fl.D.235 och 2360—61 [varr.]. H.N.f.6, n:o 60.  
Skogsång. (Sk.—Um. Lpm. Jeml. Verm. Boh. Öl. Gottl. — N. till Folden fjorden. Finn. Tromsöe.) *Stjelknöl. odelade; blrna starkt valluktande, vanl. i rikare och längre, mindre tvärt avslutadt ax än hos följ. — Orchis L. Satyrium Wg. P. solstitialis Bönn. — Anm. P. brachyglossa Reich. anses som en var. med tvärhuggen knapp.*  
2 *P. chlorantha* Cust. stj. som hos föreg.; bladen bredare, n. elliptiska; sporren nedom midten vidgad och något plattad; knappens rum vid basen vidt åtskilda, upptill närmade hvarandra. 2 6, 7. Fig. Fl.D.2362. H.N.f.6, n:o 61.  
Skogsång. skog. (Sk.—Uppl. Söderfors. Rosl. Gräsön etc. Helsl. Norrbo sn. Sandåkers tomt. Vestm. Köping; Barkarö m. fl. st. Ner. Dalsl. Steneby sn. Boh. Uddevalla; Christinedal. Öl. Gottl. — N. allm. i Aggerhus. Christianss. och Bergens st.) *Vanl. större än föreg.; blrna n. dubbelt så stora, något grönaktigt hvita och luktande; kalkbladen samstötande, och knapprummen bildande en vinkel mot hvarandra. — P. montana Reich. fl. Orchis bifolia E.B.*

†† Sporren kägellik, kortare än fruktämnet.

- \*3 *P. obtusata* Lindl. stjelen nedtill enbladig; bladet aflångt omv. äggrundt; axet glest; sporren krökt framåt. 2 7, 8, hvitakt. blr. Fig. Reich.t.75, f.1, 2. H.N.f.16, n:o 63.  
Fjelltr. r. (N. Finn. Kaafjorden på det ytre Strömsnåset, nedanför och på fjellet Sakkabani, upptäckt af Blyt 1842, återfunnen 1864 af Th. Fr. och E. Henschen.) *Omkr. 4 tum hög, med ett tumslångt ax af 4—7, små blr, flyktigt besedda mer lika dem hos Goodyera ell. Spiranthes än de föreg. Stjelen nedtill kladd af en tumslång hinnaktig slida, från hvars mynning det n. aflånga bladet utgår. — Orchis Pursh.*

#### 406. NIGRITELLA Rich. Brunkulla.

- 1 *N. angustifolia* Rich. bladen jemnbreda; kalkens läpp hel äggrundt spetsad; honingsgömmet punglikt, flere gånger kortare än fruktämnet. 2 6, 7. Fig. Sv.B.500. Fl.D.998. Reich.t.4. H.N.f.11, n:o 67.  
Äng. (Jeml. ymnig. Herjed. i öfre Ljusnadalens ofv. Bruksvallarne. Sälls. i Ängml. och Medelp. Helsl. Ljusdal, nära Backa: H. Gahn. — N. Snaasen; Värmdalen; Dovre vid Drivstuen; Gudbrandsd. Ringeboe; Toten; Östra Torpen, samt Hedemarken.) *Quartershögh med handlika stjelknölar, rundadt, tätblommigt, svart-rött ax. — N. nigra Reich. Orch. Satyrium nigrum L. Orchis nigra Sw.*

#### 407. OPHRYS Lin. Flugblomma.

- 1 *O. myodes* L. stjelbl. aflånga—lancettlika; de 2 inre kalkbladen trådsmla; läppen 3klufven med smala sidofilkar, mellanliken utdragen vidgad och i spetsen 2flikad. 2 6, 7. Fig. Sv.B.293. Fl.D.1398. Fl.N.2, t.5. H.N.f.15, n:o 67.  
Fukt. äng. r. (Sk. Smål. Trästad i Blackstad sn. ÖG. Uppl. Egbyholm; Rosersberg; Vaddö sn, vid Boda; Börstel i Lugnemosse; Elfskarleby. Gestr. Kubbo. Jeml.

Sanne och Frösön; Oviken, Brundlo m. fl. snr. *Ner. Asker, Sköllersta och Lerbäck snr. VG. Öl. Gottl.* — *N. Langöen vid Holmestrand; Brevig. Bl.; Langesund; Snaasen; Bergåsen etc.) Stjelknöl. klotrunda; axet glest, med blr, som på afstånd likna flugor; de inre kalkbl. bruna, de yttre gröna, läppen sammelsbrun, någongång funnen hvit. — O. muscifera Huds.*

## 408. CHAMÆORCHIS Rich. Ripört.

- 1 *C. alpina* Rich. bladen från rothalsen, jemnbreda, af omkring stjelkens längd; läppen äggrund. 2 7, 8. Fig. Sv.B.683. Fl.D.452. H.N.f.11, n:o 65.  
Fjellv. r. (*Torn.—Pil. Lpm.* i de högre fjellen. *Jeml. Snasahögen; Smällhögarne; Tälgstensberget etc. Herjed. Helagsfj.; Axhögen och Midtåkläpparne. — N. Ost-Finnm. — Lomsfjellen och Gudbrandsdalen.*) 2—3 t. hög, med hela elliptiska stjelknölar, små, gulgröna, hjelmlikt slutna blr. — *Ophrys L. Herminium Sw.*

## 409. HERMINIUM Lin. Honungsblomma.

- 1 *H. Monorchis* Br. stj. nedtill med 2—3, lancetlika blad; inre kalkbladen längre än de yttre, vid midten tvärt afsmalnande i en jemnbred spets; läppen med n. rakt utstående sidofilkar. 2 6, 7, g. blr. Fig. Sv.B.700. Fl.D.102. H.N.f.11, n:o 66.  
Sidländta ängar. (*Sk.—Gefle, på Limbörne. VB. Umeå. Dal. Vestml. Lospånga i Dingtuna. Ner. Asker sn. Verm. Tabergs grufvor; Elfdalen och Fryksdalen. Boh. Kosterörne; Lamö och Otterö. Hall. Onsala. Öl. Gottl. — N. öarne i Christiania-fjorden; mell. Kongsvinger och Elverum vid Kongebæk; Tind; Gudbrandsd. m. fl. st.*) 3—7 tum hög; stjelknölen klotrund, vid blomn. alltid ensam. — *Ophrys L. Fl. Sw. ed.2.*

- 2 Flocken *Neottia*. Knappen ensam, fri; pollenmassorna af mjöl- ell. skiflika, elastiska gryn. [Växter med rotstock.]

## 410. GOODYERA R. Br. Knärot.

- 1 *G. repens* Br. bladen äggrunda, slutl. nåtådriga; axet ensidigt; kalkbladen lancetlika, de yttre småludna. 2 7, hv. blr. Fig. Fl.N.2,t.6. Fl.D.812. Reich.t.130. H.N.f.13, n:o 73.  
Skogsmark på mossar. (*Sk. nor. del.—Lpl. Öl. Rälla. Gottl. — N. till Ost-Finnm.) Rotstocken trådlikt krypande i mossagret, utan att nå jorden; axet small, af små blr. — Satyrium L. Neottia Sw.*

## 411. CEPHALANTHERA Rich. Sysla.

- 1 *C. rubra* Rich. bladen lancett- ell. svärdlika, spetsade; skärmb. längre än det småludna fruktämnet; kalkläppen spetsad, af de inre kalkbladens längd. 2 7, r. blr. Fig. Fl.D.345. Reich.Orch.t.117. H.N.f.8, n:o 66.  
Skog. etc. r. (*ÖG. Ringarum nära Fängebosåg och mell. lilla Gusum och Svinbo; Eriksberg i Qvillinge, samt Högboda i Björsätter enl. Kindb. Stockh. vid Skrubba; Häggsta i Botkyrka sn; Vermdön; nära Kroka på Utön. Dalsl. vid Lilla Bräcke i Änimskog. Gottl. vid Vestgård i Hall; Fardume i Rute; på ön Furlen; nära Got-hemsåns utopp; Hallbros i Vesterhejde m. fl. st.: Sandön enl. Eis. och Stuxb. — N. Eger.) Bladen ganska nerviga; blrna få, men stora, 1 tum vida. — *Serapias L. Epipactis Wg.**
- 2 *C. ensifolia* Rich. bladen som hos föreg.; skärmb. kortare än det glatta främnet; läppen trubbig, kortare än de inre kalkbl. 2 6, 7. Fig. Fl.D.506. Reich.t.118. H.N.f.14, n:o 69.  
Skogsäng. r. (*Sk. Hafgård i Gustafs sn, samt i Röddingdalen. Stockh. i Skuruparken; Nacka i skogen vid badstället. Rosl. i Östhammars skärg. Öl. Gottl. — N. Christiansand i Fiskåsskogen.) Blrna teml. stora hvita, säll. röda. — C. Xiphophyllum Reich. fl. Ser. grandiflora L. Mant. 2. S. Helleborine β L.Fl.Su. ed.2. S. ensifolia Wg. Epipactis Sw.*
- 3 *C. pallens* Rich. bladen bredt lancettlika—afånga, söga spetsiga; skärmb. mycket längre än det glatta främnet, de nedre bladlika; läppen trubbig, n. af de inre kalkbl. längd. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.465. Fl.D.1400. Reich.t.119.  
Skogsäng. skugg. st. r. (*Gottl. Stånga sn, på vallarne af en gammal ruin, kallad Stottet.) Blrna stora som hos C. rubra, med alla kalkbl. trubbiga; rotstocken hos alla ar-*

*terna med talrika, hopknippade birötter.* — *C. Lonchophyllum Reich. fl. Ser. grandiflora Scop. Epipactis Sva.*

#### 412. EPIPACTIS Crantz. Knipprot, Zymbel.

† Utan grenskott; blomkalkens läpp spetsig: *E. Helleborine Cr.*

- 1 *E. latifolia Sw.* bladen *äggrunda* ell. *bredt* ovala, de öfre spetsade; läppen hjertlik tillbakarullad, kortare än de öfr. kalkbladen; fruktämnet *glatt*. 2 7, 8. Fig. Reich. Orch.t.136. H.N.f.14, n:o 67.

Skogsback. r. (Sk.—Gestr. Jemtl. Marieby sn; Ås sn, vid Sörbyn och Sem. Dal. Vestml. Vesterås; Sala. Ner. Verml. i Fryksdalen. Dalsl. VG. Boh. Lindö enl. Leff. Öl. Götth. — N. till Finnm.) *Stor växt, med före blomn. lutande ax; grönhvita ell. brunaktiga blr. Rotstocken hos denna och de 2 följ. lätt omgifven af talrika knippvisa birötter.* — *Serapias Helleborine L.Fl.Su. S. latifolia L. Mant.2. E. Helleborine var. viridans Reich. fl.*

- 2 *E. microphylla Sw.* bladen *äggrundt lancettlika*, spetsade, glatta; läppen *som hos föreg.*, tvärt *sammandragen* till spets; fruktämnet *glatt*. 2 7, 8. Fig. Fl.D.811. Reich.t.132,f.1, 2.

Skugg. st. r. (Öl. mellan Ekerum och Halltorp.) *Mycket spädare än föreg., med glesblommigt ax; rödaktigt gröna blommor med slutna kalkblad; fr.äm. på Öl. ex. glatt enl. Sjöstr., men småludet på alla utl. ex., utg. sett.* — *E. Hellebor. var. microphylla Reich. Serapias latifolia Fl.D.*

- 3 *E. atrorubens Hoffm.* de nedersta bladen *som hos föreg.*, de öfre lancettlika; läppen *uddspetsig, af de öfr. kalkbladens längd; fruktämnet småludet*. 2 7, 8. Fig. Fl.D. 1938. Fl.N.2,t.5. Reich.t.133. H.N.f.8, n:o 65.

Skogslund, särd. på kalkbotten, r. (Spål.—Södm. Stockh. Eriks vid Vaxholm enl. Leff. Jemtl. Odensala i Brunflo; Ås sn. Dal. Styggforsen. Ner. Hesselkulla; P. J. Hellb.; Skålekint; Mårsäter. Verml. Ullerud; Långbanshyttan etc. Dalsl. Öl. Götth. — N. Christiania; Trondhj. Gävingåsen; Snaasen; Salten.) *Till alla delar mindre än E. latif.; blrna mer och mindre mörkröda, grönaktiga ell. hvita. Skiljes ej i Blytts Norges Fl. från E. latif. — E. latifolia β atrorub. Hoffm. E. media Fr. E. rubiginosa Gaud. & Koch. E. Hellebor. var. rubiginosa Reich.*

†† Med grenskott från rotstocken; kalkens läpp rundadt trubbig.

- 4 *E. palustris Cr.* bladen lancettlika, de nedre stund. n. ovala; läppen hjertlik, krusig, *af de öfr. kalkbladens längd; fr.ämnet småludet*. 2 7, 8. Fig. Sv.B.449. Fl.D. 267. H.N.f.14, n:o 68.

Fukt. äng. r. (Sk.—Gestr. Ner. Dalsl. Boh. Öl. Götth. — N. från sydl. delen till Snaasen.) *De yttre kalkbl. gröna, invändigt rödaktiga, de inre hv. ell. rödl. Rotstocken krypande, med så, afven kryp. birötter.* — *E. longifolia Reich. fl. Ser. longifolia L. Mant.2.*

#### 413. LISTERA R. Br. Tväblad.

- 1 *L. ovata Br.* stjelken *småluden*, med 2, n. motsatta, *bredt* ovala blad; kalkläppen klufven i 2, jernbreda *trubbiga* flskar. 2 6, 7, gröng. blr. Fig. Fl.D.137. Reich. Orch.t.127.

Skogsäng. (Sk.—Ängml. Hernön; Nätra sn. och Jemtl. Boh. Öl. Götth. — N. till söd. Finnm. Reisenvand. Norm.) *1—2 fot hög, med krypande rotstock och talrika birötter, långt smalt ax.* — *Neottia latifol. Rich. Ophrys L. Epipactis Sva.*

- 2 *L. cordata Br.* stjelken *glatt*, med 2, n. motsatta, n. *hjärtlika* blad; läppen klufven i 2 *smalspetsiga* flskar, samt 2 små sidoflikar vid basen. 2 6, 7, brung. blr. Fig. Sv.B.472. Fl.D.1278. Fl.N.t.3,f.6—8.

Skog. på moss. (Lpl.—Sk. nor. del. och Hall. söd. del. Öl. Götth. och på Sandön. — N. till Ost-Finm.) *5—7 tum hög, späd, med i mossan kryp. rötter, tums långt ax.* — *Synon. som föreg.*

#### 414. NEOTTIA Lin. Näst-rot.

- 1 *N. Nidus avis Rich.* stängeln bladlös fjällig; kalkläppen klufven i 2, utböjda flskar. 2 6, 7. Fig. Fl.D.181. Reich.Orch.t.121.

Skogsmark, bland ruttna löf etc. r. (Sk.—Gefle. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. VG.

Bilingen. *Boh.* Skredsvik sn. *Öl. Gottl.* — *N. Christiania* på ön Malmö; Laurvig, samt Christiansand enl. Bl.; Snaasen.) 6—12 tum hög, till färgen brungul afvensom blrna; rotstocken omgifven af talrika, tjocka birötter, kopknippade n. som ett fogelbo. — *Neottia L.Fl.Su.ed.1; Ophrys ed.2. Epipactis Sw.*

## 415. EPIPOGIUM Gmel. Skogsfrublomma.

1 *E. aphyllum Sw.* rotstocken korallgrenig; stängeln bar, omgifven af bladlösa slidor. 2, 7, 8. Fig. Sv.B.512. Fl.D.1233, 1399. H.N.f.15, n:o 68.

Skog. r. (Sk. nära Börringesjön; Bokenäset vid Karlsholmssjön. *Smål.* Tvärbäck nära Femsjö-fälla vid Färgens strand [numera utgången]. *ÖG.* Kolmården, nära Marmorbruket; nära Rejmyra enl. Lem. *Södm.* Dunker sn, Bråton nära Stålboga bruk. *Gestr.* Limön: Stud. C. Juhlin. *Helsl.* Bjuråker sn, nära Alsjö fåbodar; Bergsjö, nära Ellåsen: Wistr.; Loos sn, Tenberget. *Medelp.* Borgsjö sn, Ånge allmänning. *Ängml.* Hernön enl. Arn.; Bjertrå i Rammeldalen. *Lul. Lpm.* Jokkmokk. *Jemll.* Sunne sn på Andersön; Näskotts sn, vid Vaplan; Stugu sn, vid Strånäset. *Dal.* Orsa, Jocksälls fåbod. vid Skatungen. *Vestml.* Frösåker. *Ner.* Ullaviklint: A. af Geijerstam. *Verm.* Gustafsström. — *N. Christiania* på Bokstadsås. Vid vestra ändan af Sælsvandet i Vaage.) 4—8 tum hög af blek gulbrun färg, med 2—6 stora blekgula blr och rödaktig sporre. — *Satyrium Epipog. L. E. Gmelini Rich.*

3 Flocken **Vandese.** Knappen ensam, fri. Pollenmassorna [4, skiffformiga] vaxartade, medelst en cellulös förlängning fästade på märket.

## 416. CALYPSO Salisb. Toffelblomma.

1 *C. borealis Sal.* örtbladet från stjelkens lökformigt uppsvällda bas, ensamt, äggrundt; läppens bräm n. äggrundt, nående framom sporrén. 2, 5, 6. Fig. Sv.B.518. Fl.D. suppl.99. H.N.f.9, n:o 65.

Fukt. lundar, r. (*Lul. Lpm.* vid Niommelsaska: H. Widm.; Jokkmokk, Kajtum-selet;  $\frac{1}{4}$  mil sydost fr. Jokkm. kyrka, vid en bäck fr. berget Kuotsakåwe m. fl. st.;  $\frac{1}{4}$  mil vest. om Sarkaware. *Um. Lpm.* nära Stensele kyrka. *VB.* Råbäck i Öfver-Luleå: Hj. Holmgr.; Pit. sn, vid Långviken och Alters bruk enl. G. v. Ced.; Skellefteå, mell. Falkbergets norra sida och Falkträsket, samt på Hömyrsberget nära Warutråsk.) Stj. 3—6 tum hög, slidad, med en stor blomma i toppen, hvars läpp är brunfläckig, de öfre kalkbladen ljusröda. — *Cypripedium bulbosum L. Orchidium arcticum Sw. Norna Wg.*

4 Flocken **Malaxideæ.** Knappen ensam, fri. Pollenmassorna [klotrunda ell. aflånga] vaxartade, omedelbart lagda på märket.

## 417. STURMIA Reich. Myggblomster.

1 *S. Loeselii Reich.* stjelken 3kantig; bladen 2, lancettlika; kalkläppen äggrundt aflång, trubbad. 2, 6, 7, blekg. blr. Fig. Fl.D.877. V.Ac.H.1800,t.3. Reich.Orch.t.140. H. N.f.6, n:o 63.

Kärr, r. (Sk. Christianstad, vid Lefrasjön och Veilesjön; Kettils mossen i Stångby sn; kärr mell. Örtöfta och Lackalänge; Christineberg nära Malmö. *ÖG.* Hagebyhöga sn, vid Rangeltorp; Vinnerstad sn vid Boren. *Uppl.* i tufviga kärr vid Norvidsjön nära Björklunge kyrka: Linné i herb. *Gestr.* Kubbo, vid en mindre skogssjö. *Öl.* mell. Borga och Vedborns träsk. *Gottl.* Storholmen i Fardume träsk; i Martehomyr åt Lummelundssidan; Djufves vid Hohorgen m. fl. st. enl. G. v. Ced. — *N. Christiania* på Næsöe.) 3—6 tum hög med gles ax af 2—6, 3—4 lin. vida blr; bladen utgående från stjelkens lökformiga bas. — *Ophrys L. O. paludosa Fl.D. Malaxis Sw.*

## 418. MALAXIS Sw. Myggblomster.

1 *M. monophyllos Sw.* stjelken 3kantig; blad ett, säll. 2, ovala; skärmb. kortare än fruktämnet; kalkläppen rundad med lång jemnbred spets. 2, 6, 7, blekg. blr. Fig. Sv.B.663. V.Ac.H.1800,t.3. Fl.D.1525. H.N.f.6, n:o 62.

Kärr, r. (*ÖG.* Spånghagen, Slaka sn; Kärna i Vårö mosse; Omberg; Vinnerstad etc. *Södm.* Rydby. *Uppl.* Järlåsa sn, vid torpet Granslätt; Elfkarleby, Ytterboda. *Gestr.* Kubbo i Ormkärrsmuren; Edskön i Verkfjärden. *Medelp.* Alnön; Hammar i Torp sn; Hässjö sn enl. Lem. *Ängml.* Bjertrå vid Öster-Strinns fåbod. *Jemll.* Sunne, Frösön och Lith; Rödö m. fl. snr. *Dal.* Boda kapell. *Vestml.* Linde sn, Håkans-

boda; Sättra brunn; Sala. *VG.* Kinnekulle. *Gottl.* Fardume träsk; Sproge. — *N.* Christiania, vid Lysager hjörn, Gjellebäck m. fl. st. Glommen vid Kongebæk; Toten; Klæcken på Ringerige; Gudbrandsdalen, nära Jettasfjell.) 5—8 tum hög, med 1—2, högst sällan 3 blad från stjelkens lökformiga bas, långt och smalt ax af talrika blr, föga mer än en lin. i diam. — *Ophrys L.* *Microstylis Lindl.* Den 2bladiga var. torde vara Linnés *Ophrys latifolia Fl.Su.* och Gunners *O. lilifolia* från Nordal.

- 2 *M. paludosa Sw.* stjelken sterkantigt; bladen 2, 3, omv. äggrunda; skärmb. af fruktämne längd; läppen äggrund, spetsig. 2 1/2, 7, 8, gröng. blr. Fig. Sv.B.662. *V.* Ac.H.1789,t.6,f.2. Fl.D.1234. H.N.f.14, n:o 71.

Kärr, r. (Sk.—*Angml.* Själevad; Botheå sn. Gålsjö m. fl. st.: Arn. *VB.* nor. del, Björkfors. *Um.* *Lpm.* Betsele. *Dal.* *Vestml.* *Ner.* *Verm.* *Dalsl.* *Boh.* Pilgården i Näsing. *Gottl.* — *N.* Aggerhus, Christiansands och Bergens st.) 2—5 t. hög, med smalt ax af talrika, något större blr än hos föreg.; stjelkens bas lökformig. — *Ophrys L.*

#### 419. CORALLORHIZA Hall. Korallrot.

- 1 *C. innata Br.* axet fåblommigt, med spetsiga kalkblad; läppen aflång. 2 1/2, 6, g. blr. Fig. Sv.B.554. Fl.D.451 och 2364. Fl.N.2,t.6. H.N.f.13, n:o 74.

Fukt. skog. (Torn. *Lpm.* Vittangi. *Lul.* *Lpm.* *VB.* nor. del. — *Sk.* *Boh.* Öl. nära Thorslunda. *Gottl.* Askängen i Hejde sn. — *N.* icke sällsynt, till Ost-Finm. Varanger.) Stängeln 6—10 tum hög, med bladlösa slidor och korallgrenig rotstock. — *C. nemoralis Sw.* *C. virescens Drej.* *Ophrys Corallorh. L.*

- 5 Flocken **Cypripedium**. Knappar 2.

#### 420. CYPRIPEDIUM Lin. Gucku-skor.

- 1 *C. Calceolus L.* stjelken flerbladig, med ovala spetsade blad; kalkens uppblåsta läpp något nedplattad, kortare än de öfriga kalkbladen. 2 1/2, 6. Fig. Sv.B.524. Fl.D.999. H.N.f.4, n:o 85.

Fukt. st. i skogar, r. (ÖG. *Ner.* och *VG.* *Dalsl.* Kårud i Bräcke sn: Stud. Thorstenson. *Verm.* bergslag. *Vestml.* *Dal.* *Uppl.* *Gestr.* och *Helsl.* Nordligast i *Um.* *Lpm.* Stensele. Öl. Mörbylånga och Högsrum sockn. *Gottl.* — *N.* till Gudbrandsdalen, Ringeboe och Salten; Gildeskaal: Norm.) Har de största blrna af Skand. arter i denna fam.; läppen stor som ett litet päron, gul; de öfriga, 2 tum långa kalkbladen bruna; stjelken vanl. en-, säll. 2- ell. 3blommig; rotstocken krypande. Har egenl. 3 ståndare, hvaraf den mellersta är steril och fri, bladlik.

- 85 Fam. **IRIDEÆ Juss.** Blomkalk kronlik, regelbunden med 3 ståndare. Fruktämne 3rummigt, mångfröigt.

#### 421. IRIS Lin. Svärdlija.

- 1 *I. Pseudacorus L.* bladen platta svärdlika; blomkalkens likar glatta, de inre jemnbreda, smalare och kortare än märkena. 2 1/2, 6, 7, g. blr. — *β citrina*: bladen smalare; blrna mer än hälften mindre. Fig. Sv.B.110. Fl.D.494.

Stränd. (Sk.—*VB.* *Dal.* *Boh.* Öl. *Gottl.* — *N.* till Helgeland. — *β Gottl.* Vångemyr, vid Staplarne.) Stora praktfulla blr; bladen tumsbreda, af omkr. stjelkens längd. Bladen hos *β* äro öfver 5 quart. långa och en god half tum breda; blrna enl. Fr. brandgula.

- +2 *I. sibirica L.* bladen smalt jemnbreda, kortare än stjelken; kalkens likar glatta, de yttre omv. äggrunda med kort klo, de inre aflånga, större än märkena; fröhuset 3kantigt. 2 1/2, 6, blå blr. Fig. Reich.D.Fl.f.768. H.N.f.12, n:o 69.

Kärr, r. (*VG.* Larf sn vid Slättås. *Vestml.* Nora sn. Fåsjöhyttan. *Gottl.* Kräcklings i Kräcklingbo sn; Lummelund; Vänge-myr; Klinte. Enl. Vestöb skola växtst. på *Gottl.* vara osäkra. Trol. öfverallt förvildad.) Lärer sällan, om någonsin blomma på *Gottl.* En del af de sterila ex. från denna ö hafva dubbelt bredare blad [3 lin.] än de *Vestgötska* och synas osäkra.

## 422. CROCUS Lín. Safran.

- †1 *C. vernus* All. lökens yttre hinna nervig, upplösande sig i hårfina trådar; kalkflikarne ovala konkava, något inböjda, n. dubbelt längre än det 3klufna krusiga märket. 2 4, 5. Fig. Fl.D.2022. Reich.f.786.

Förvildad i trädg. r. (Stockh. på gräsplanerna vid Ulriksdal. Uppl. Löfsta bruk. — N. Bergen, i ångar vid Årstadmark.) Blr och blad från löken; de förra blå ell. hvita.

- 86 Fam. NARCISSINEÆ Juss. Blomkalk kronlik, regelbunden med 6deladt bräm. Stånd. 6. Fruktämne som hos föreg. fam.

## 423. NARCISSUS Lín. Narciss, Påsklilja.

- †1 *N. Pseudonarcissus* L. bladen rännformiga; bikronan klocklik, af kalkflikarnes längd, i kanten vågig och naggad. 2 4, 5, g. blr. Fig. Fl.D.2170. Reich.D.Fl.f.816.

Äng. odl. st. r. (Sk. vest. Göinge vid Sandby; Röstånga sn vid Blinkarp etc. Förr äfven funnen i Blek. och Smål. Gottl. Vesterheide i en ång söder om Lund vid Halfvars. För öfr. förvildad i gamla trädgårdar.) Stängeln hos båda arterna enblommig.

- †2 *N. poeticus* L. blad som hos föreg.; bikronan skål-lik, med röd naggad kant, mycket kortare än de ovala kalkflikarne. 2 4, 5, hv. blr. Fig. Reich.f.808.

Förvild. r. (Från Sk. till Helsl. här och der sparsamt förekommande i ell. omkring gamla trädgårdar.)

## 424. LEUCOJUM Lín. Snökllocka.

- †1 *L. vernum* L. stängeln enblommig; stiftet klubblikt. 2 3, 4. Fig. Reich.f.804.

Förvild. r. (ÖG. Vadstena klosterträdg.; Klosterorlunda i Hof enl. Kindb. Stockh. Dufnäs i Brännkyrka sn. Geste. Källmur i en skogsäng; hvarken der eller annorstädes i Gestr. veterligen planterad.) Blomman lulan, hvit, med en grön fläck i flikarnes spets.

## 425. GALANTHUS Lín. Snödroppe.

- †1 *G. nivalis* L. stängeln enblommig; bladen 2:ne kölade. 2 3, 4, hv. blr. Fig. Fl.D. 1641. Reich.f.807.

Förvildad, r. (Sk. omkr. Lund; på ångar vid Öst. Torp; Dalköpinge, vest. Karaby m. fl. st. Hall. Hasslöf etc. Upp till Södm. t. ex. Åkers sn i parken vid Berga. Öl. — N. Bergen.) Fingerhög, med hängande blomma.

- 87 Fam. HYDROCHARIDEÆ Juss. Blr skiljd-könade, med 3 kronlika och 3 foderlika kalkblad. Frukt fierrummig, med fröfästen på väggarne.

## 426. STRATIOTES Lín. Dyborre.

- †1 *S. aloides* L. bladen jernbreda, kölade, i kanten taggiga. 2 7, 8, hv. blr. Fig. Fl.D. 337. Reich.D.Fl.f.111.

Stillast. vatt. (Sk. Smål. vid Vettern; samt Melby i Ukna: Scheutz. — Helsl. Vestml. Ner. Verml. — N. i Ofoten: Gunn. enl. Bl.) Bladen från rotstocken, i en krets, från hvars midt ell. sida blomstängeln uppskjuter; hela växten före och efter blomn. nedsänkt under vattnet.

## 427. HYDROCHARIS Lín. Dyblad.

- †1 *H. Morsus ranæ* L. bladen runda med hjertlik bas. ☉ 7, hv. blr. Fig. Sv.B.598. Fl.D.878.

Stillast. vatt. (Sk. — Helsl. Vestml. Ner. Verml. Boh.) Örtan flytande; bladen tumsbreda, med form af Näckblad; honbl. mer sällsynta. Sätter knappt mogen frukt i Sv., utan förökas genom knoppar. som affalla och öfvervintra i dyn, hvarifrån de följ. år flyta upp och utvecklas till nya plantor.



- 88 Fam. NAJADEÆ *Link.* Blr skiljdönade. Kalk enkel flasklik, tätt omslutande befruktningsdelarne. Stånd. 1, med 4rumm. knapp. Fruktämne enrummigt, slutl. bildande en af kalken beklädd nöt.

428. NAJAS *Lin.* Nateserf.

- 1 *N. marina* *L.* bladen *motsatta*, ell. vid grenarne 3 i *krans*, jemnbreda, skiftevis och något bugtigt *tandade*; frukten aflångt äggformig. ☉ 7—9. —  $\beta$  *muricata*: stjelen taggig med röda leder. Fig. V.Ac.H.1837,t.8. Fl.D.2121. H.N.f.4, n:o 84.  
Hafsvik. r. (Sk.—*Gestr.* *Hall.* Halmstad: Theor. *Gottl.* Fardume träsk; Pavik i Vestergarn enl. G. v. Ced. — *N.* Christiansand; Hvalöarne, på Kirköe.) *Växer och blommar under vattnet; hanväxten sällsyntare. Ståndarknappen vanl. uppbristande oordentligt och utan sträng; men, upptages växten ur vattnet, ser man den stundom få en kort sträng och öppna sig i 4, tillbakarullade flikar.* — *N. major* *Roth.*
- 2 *N. flexilis* *Rostk.* bladen 5—6 i *krans*, jemnbreda, *mot spetsen småtandade*; frukten som hos föreg. ☉ 7—9. Fig. Willd.Act.Ac.Ber.1798,p.89,t.1,f.1. H.N.f.14, n:o 77.  
Insjöar, r. (Uppl. i sjön Hederviken nära Braheberg i Närtuna sn.) *Växtsätt och frukt likasom hos föreg.; hela växten mycket spåhare, med bladen nedtill helbräddade, endast mot spetsen omärkligt småtandade.* — *Caulinia* *Willd.*

## 14 KLASSEN

### LILIFLORÆ.

89 Fam. **LILIACEÆ Juss.** Kalk kronlik. Ståndarknappar öppnande sig inåt. Stift 1, ell. 0. Fruktämne 3rumm., 3skaligt, med centrala, mångfröiga fröfästen. [Afvikande slägte: *Paris*.]

1 Flocken **Tulipes.** Kalk 6bladig. Frukt: fröhus med platta frön, staplade tätt på hvarandra. [Lökväxter.]

#### 429. TULIPA Lín. Tulpan.

†1 *T. silvestris* L. bladen lancettlika; blomman ensam, lutande; ståndarsträngarne vid basen ludna; pist:s märke tvärhugget. 2½ 5, 6, g. blr. Fig. Sv.B.202. Fl.D.375. Odl. st. r. (Sk. Blek. ÖG. Hall. Goult.; samt flerestädes i gamla trädgårdar förvildad, upp till Uppl.) Märket hos de odl. arterna har 3 tillbakarullade flökar.

#### 430. FRITILLARIA Lín. Kronlilja.

1 *F. Meleagris* L. alla bladen skiftevisa jemnbreda rämnformiga; 1-, sällan 2blommig. 2½ 5, 6. Fig. Sv.B.376. Fl.D.972. H.N.f.13, n:o 75.

Fukt. äng. r. (ÖG. Adelsnäs; Norrköp., samt Spellinge i v. Harg sn. Södm. Strengnäs vid Olivehäll; Tista slott och Nyköping enl. Lem. Stockh. flerestädes. Uppl. Svartsjölandet på Kalfudden; Norrtelje vid Lovisedal, ymnig; Uppsala-trakten på alla ängar; Söderfors, Untra mosse enl. Lem. Gefle, nära Sockerbruket. Vestml. i Säterbo vid Reutersberg. Goult. Klintebys i Klinte sn. — N. Christiania och Drammen; Bergen: Bl.) Blirna stora hängande, dampselsrutiga, bruna, stund. hvita.

#### 431. LILIUM Lín. Lilja.

†1 *L. bulbiferum* L. bladen strödda, jemnbredt lancettlika; blirna upprätta, klocklika, invändigt sträplockiga. 2½ 6, 7, brandg. blr. Fig. Sv.B.398.

Äng. och odl. st. r. (Smål. Fryeled vid Näsbyholm; Björneberg nära Jönköping; Vimmerby: Dr Lund. ÖG. mångenstädes enl. Kindb. Södm. Äspön, Vedböarna-ängen enl. Linné; i en äng mell. Över-Selö kyrka och Landshäll; Ytter-Selö, i Målsäkers äng. Uppl. Bro sn, på en holme i Lejonadalssjön. Rosl. i Norrteljetrakten; i närheten af Björnö. Vestml. vid Ängsö färja, och på Björnö. Verm. Hornkullen i Kroppa sn; Långbanshyttan. VG. Billingen; Kinnekulle. — N. Tönsberg, i parken vid Berg.) Har bruna knopplökar i bladvecken.

†2 *L. Martagon* L. bladen kranssittande, äggrundt lancettlika; blirna i klase, nedböjda, med tillbakarullade, vid honingsfällan häriga kalkblad. 2½ 7. Fig. Sv.B.381. Förvild. r. (Sk.—Hels. i gamla parker och trädg.) Blirna röda, brunfläckiga.

- 2 Flocken **Asphodeles**. Kalk af 6, fria eller samväxta blad. Frukth fröhus, med tjocka, runda ell. kantiga frön. [Lökväxter utom *Anthericum*.]

432. **ALLIUM** Lin. Lök.

† Hvarannan ståndarsträng 3gafflad, med knappen på mellanfiken: *Porrum Tourn.*

- 1 *A. Scorodoprasum* L. bladen *platta* med *2eggade* slidor; blomflocken med knopplökar; kalkbladens köl *småknöttrig*; ståndarsträng *icke* utskjutande. 2 7, viol. blr. —  $\beta$  *minus*: stielk och blad hälften smalare; bladslidorna mindre plattade. Fig. FL.D. 1455;  $\beta$  290. Reich.D.Fl.f.1073;  $\beta$  1074.  
Lund. r. (Sk.—Uppl. *Vestml.* flerstädes. VG. Boh. Öl. Gottl. — N. Svennerbör vid Fredriksvärn. —  $\beta$  sandäkrar: Sk. Fästerbo etc. Öl. i Sandby. Gottl. Lummelund vid Kinners gästg.) Bladen 2—4 lin. breda. —  $\beta$  *A. arenarium* Lin. herb. och Sm.  
2 *A. arenarium* L. bladen n. *trådlika*, jemte slidorna *trinda*; blomfl. med knopplökar; kalkbladens köl *slät*; ståndarsträngarnes sidofliker långa trådlika *utskjutande*. 2 7, viol. säll. hv. blr. Fig. Sv.B.691. FL.D.2227. H.N.f.8, n:o 69.  
Back. sand. st. r. (Sk.—Stockh. Rosl. Söderön. Hall. Boh. Öl. Gottl. — N. söd. och vest. del till Trondhem.) *Utmärkt af de trinda bladen; blrna små, vanl. utskjutande i toppen af knopplöksamlingen.* — *A. vineale* L.Sp.Pl.

†† Alla sträng. enkla syl-ika.

\* Blomflock med knopplökar.

- 3 *A. carinatum* L. bladen jemnbreda, *plattade*, *släta*; blomhölsterbladen med lång 3-kantig udd; stånd. *dubbelt längre* än de *tvärhuggna* ell. *intryckta* kalkblad. 2 7, r. blr. Fig. FL.D.2109. Reich.f.1057. H.N.f.6, n:o 64.  
Buskväxta äng. r. (Sk. vest. Vram, omkr.  $\frac{1}{2}$  mil närmare Christianstad, bland småskog vid vägen; Lund, Fogelsång på norra sidan etc. — N. vid ett landställe nära Christiania.) *Lik följ., men skiljd med de långa ståndarne och platta bladen.*  
4 *A. oleraceum* L. bladen vanl. *halvtrinda*, något sträfvä, under kantigt *nerviga*; hölsterbl. som hos föreg.; stånd. *af de trubbiga, kort uddspetsiga kalkbl:s längd.* 2 7, 8, r. ell. brung. blr. Fig. FL.D.1456. Reich.f.1067.  
Äng. berg. a. (Sk.—Ängml. och Jemtl. Brunflo. Verm. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Lofoden.) *Var. med plattade blad: complanatum, samt med rännformiga: canaliculat., hvilken sednare form vanligen varit ansedd såsom Linnés A. carinatum.*

\*\* Blomflock utan knopplökar.

- 5 *A. Schænoprasum* L. stielk. *trind*; bladen vanl. *trinda*, *ihåliga*; blomflock. n. *klotrund*; stånd. *kortare* än kalken, syl-ika med bredare, otandad bas. 2 6, 7, r. blr. Fig. Sv.B.89. FL.D.971. H.N.f.7, n:o 70.  
\* *sibiricum* L. större och gröfre; bladen ofvanpå plattade. Fig. H.N.f.7, n:o 69. Reich. f.1086.  
Klipp. helst på hafskust. (Blek.—Uppl. Boh. Öl. Gottl. — \* Jemtl. Bergs sn, Vigge by nära Hofverberget. — N. Finnm. t. ex. Senjen, Skjervö, Alten, Porsanger m. fl. st.: Norm.) *Prof. Fries anser A. sibir. som hufvudart och a som underart med namnet schænoprasoides.*  
6 *A. montanum* Schmidt: stj. *upptill kantig*; bladen *platta*, jemnbreda; blomfl. *konvex*; ståndarne *betydl. längre* än kalken. 2 7, ljus. blr. Fig. Reich.f.1094. H.N. f.5, n:o 70.  
Stenback. torra st. r. (Sk. Åhus i Espet vid Helgeåns utlopp. Dalsl. allmän genom Ed sn; samt Rölunda, Gesäter och Lerdal snr vid Bohusgränsen.) *Löken fästad vid en krypande rotstock; bladen ej bredare än stielken; hölsterbladen korta.* — *Allium fallax* R. & S. *A. angulosum* Lin. herb.  
7 *A. ursinum* L. stielken *kantig*; bladen skaftade, *platta lancetlika*; blomflock. *fäblommig*, jemnhög; stånd. *kortare* än kalken. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.236. FL.D. 757. H.N.f.2, n:o 61.

Lund. r. (Sk.—Rosl. VG. Kinnekulle etc.; Göteborg. *Dalsl. Öl. Gottl.* — N. söd. och vest. delar upp till Molde.) *Bladen tumsbreda.*

433. *ANTHERICUM* Lin. Sandlilja.

- 1 *A. Liliago* L. stängeln enkel bladlös; rotbladen jemnbreda; blrna platta, n. i klase; stiftet nedböjdt, kortare än kalken. 2 6, hv. blr. Fig. Sv.B.403. Fl.D.616. H.N. f.10, n:o 62.

Torra st. r. (Sk. östra del, mell. vest. Vram, Maltesholm och Vidtsköffe; Degeberga; Raftunda; Kivik; mell. Rörum och Viks fiskläge etc. *Blek.* vid norra Hoka. *Öl.* vid Gösseunda i Hulterstads sn.) *Gröfre, med längre rotblad, större [tumslånga] kalkblad än följ.; rot af en knippe trådar.*

- 2 *A. ramosum* L. stäng. från midten grenad; rotbl. jemnbreda; blrna platta, i flere klaser; stiftet upprätt, längre än kalken. 2 7, hv. blr. Fig. Sv.B.671. Fl.D.1157. H.N.f.6, n:o 65.

Torra st. r. (Sk. öst. del: Brösarp; Vidtsköffe; Lillö; Åhus; Årup etc. *Öl. Gottl.* — N. Kongsberg på Johnsknuden; Christiania, på Egeberget; Bl.; i sednare tider icke funnen.) *Rot som hos föreg.*

434. *ORNITHOGALUM* Lin. Stjernlök.

- †1 *O. nutans* L. bladen jemnbredt lancettlika; blrna i ensidig klase, hängande, med skäft kortare än skärmladen. 2 5. Fig. Fl.D.912. Reich.D.Fl.f.1031.

Skugg. st. r. (Sk. Lund; Ljungby; Araslöf; Maltesholm. *Blek.* Asarums prestg.; Gosselm. *Smål.* Kalmar, och Hosmo vid Binga. *ÖG.* Sturefors m. fl. st.: Kindb., förvildad; äfvensom vid Stockholm i Carlbergs park. *Vestml.* på Fullerön. *Hall.* Dömmestorp; Skottorp; Theor.) *Lökväxt med perlhvita blr, 2 tum vida. — Albucea Reich.*

- †2 *O. umbellatum* L. bladen jemnbreda rännformiga, med en hvit rand efter midten; blrna i n. jemnhög qvast, med skäft längre än skärml. 2 5, 6. Fig. Sv.B.388. Fl.D.1266.

Odl. st. r. (Sk. Lund; Skabersjö; Malmö etc. *Blek.* Carlskrona, Ronneby, Carlshamn etc.; Goss. *ÖG.* Gusum m. fl. st. *Hall.* *Öl.* Algutsrum, och kring Thorslunda kyrka. *Gottl.* enl. Reuterm.; samt flerstädes förvildad. — N. Christiansand.) *Blrna tumsvida, snöhvita, utvänd. grönaktiga.*

435. *GAGEA* Salisb. Vårlök.

† Med 3, sammanhängande knöl-lika lökar.

- 1 *G. stenopetala* Reich. bladet från löken, vanl. ensamt, jemnbredt; blomskafsen enkla glatta; kalkbladen n. jemnbreda, spetsiga, sjelfva spetsen trubbad. 2 4, 5, g. blr. — *β pratensis* Koch: högre växt; det nedre skärmladet med basen omslutande blomskafsen; kalkbl. trubbiga. Fig. Fl.D.2225. Reich.D.Fl.f.1033—37; *β* 38. H.N.f.2, n:o 62; *β* 63.

Odl. st. åkr. *β* äng. sukt. st. r. (Sk. isynnerh. i vest. del. *Blek.* Carlskrona, Boråkra, Carlshamn etc. enl. Goss. *Smål.* Kalmar; Vestervik; Vimmerby; Dr Lund; Vexjö, Kampen. *ÖG.* Linköping, vid Hunnebergstull. *Stockh.* Bergilund; Ulriksdal; Blecktorner. — *β* Sk. Uppåkra. *Blek.* Lyckeby flerst.; Carlskrona, på Verkö; Spandels-torp; Afvelsgårde och Marielund.) *Örtbladen ett par linier breda; kalkbladen n. tumslånga. — Ornithogalum Fr. Nov. Gagea polymorpha Schultz.*

†† Med en enda, enkel, ell. inuti sammansatt lök.

\* Ört-[rot]-blad från löken ett enda.

- 2 *G. lutea* Ker: örtbladet lancettlikt jemnbredt; blomflocken oskaftad med enkla, glatta blomskäft; kalkbladen rundadt trubbiga. 2 4, 5, g. blr. Fig. Sv.B.634. Fl.D.378. H.N.f.14, n:o 72.

Odl. st. a. (Sk.—Helsl. Ner. *Verm.* söd. delen. *Hall.* *Öl. Gottl.* — N. till Lofoden.) — *Ornith. L.*

- 3 *G. minima* Schult. örtbladet smallt jemnbredt; flocken skaftad, fåblomm.; kalkbl. smalspetsade. 2 4, 5, g. blr. Fig. Sv.B.494, f.1. Fl.D.1331. H.N.f.12, n:o 71.

Odl. st. a. (Sk.—Helsl. *Angml.* Säbrå; Ytter-Lännäs: Arn. *Dal. Verm.* Sjöstad i

Ölme härad. *Hall. Öl. Goutl.* — N. mycket sälls. funnen vid Bergen; äfven uppgifven för Trondhj.) *Mindre än de föreg.; örtbl. ofta en god linie bredt; hos de unga sterila lökarne n. tagelsmallt.* — *Ornith. L.*

\*\* Rotblad 2 ell. flere.

- 4 *G. arvensis* Schult. örtbl. n. trådsmla, krökta; flocken skaftad, mångblommig, med *litt småludna* blomskaff, och 2 stora och breda skärblad vid flockskaflets bas; kalkbladen *spetsiga*, utvänd. *småludna*. 2 4, 5, g. blr. Fig. Fl.D.1869. Reich.f. 1049, 1050.

Åkr. och odl. st. r. (*Sk. åkr. nära Trelleborg. Blek. Carlskrona, i parken enl. Gosselm.) Ofta lågväxt, med teml. små, men talrika (5—10) blr.* — *Ornith. Pers. G. villosa Dub.*

- 5 *G. spathacea* Schult. örtbl. som hos föreg., raka; flocken skaftad, fåblommig, med *glatta* blomskaff och ett *ensamt*, bredt skärblad; kalkbl. *trubbiga, glatta*. 2 4, 5, g. blr. Fig. Sv.B.494.f.2. Fl.D.612. H.N.f.1, n:o 67.

Fukt. lund. r. (*Sk. Rester; Roslätt; Ramlösa och Gyhult, etc. i bokskogarne. Blek. Verkö, m. fl. st. omkring Carlskrona. Smål. Jönköping vid Rosenlund, samt Hus-qvarna. Dalsl. Backa och vid sjön Kålungen i Gunnarsnäs sn. VG. Göteborg flere-städes. Boh. Uddevalla, Marieberg.) Har sällan mer än 3 blr, lika smärre former af *G. lutea*. — *Ornith. minimum* β *Wg.**

#### 436. MUSCARI Mill. Perldrufva.

- †1 *M. botryoides* Mill. bladen upprätta jemnbreda rännformiga, mot basen smalare; blrna n. klotrunda, de nedre i klasen något glesare. 2 5, b. blr. Fig. Reich.D.Fl.998.

Ång. och gamla parker, r. (*Smål. Vexjö i åkrar vid Kampen. ÖG. flerst. i Stångå-dalen, samt vest. om denna enl. Kindb. Stockh. Djurgården nära Fiskarbro-backen; Lidingön, Ekholmsnäs m. fl. st. Uppl. Forsmark i Klockarhagen; Löfsta bruk. Gefle, i Printzens vret. VG. Kinnekulle. Hall. Öl. Tveta gårde.) *Hyacinthus L.**

- 3 Flocken *Asparagee*. Kalk af 6, sällan 4 eller 8, merändels samväxta blad. Frukten bär. [Växter med rotstock.] — Undant. *Paris* med kalk af 8, n. fria blad.

#### 437. ASPARAGUS Lin. Sparris.

- 1 *A. officinalis* L. stjelken upprätt, trind: bladen knippvisa trådsmla glatta; ståndarsträngarne lika långa som de aflånga knapparne. 2 7, 8, gröng. blr. Fig. Sv.B.213. Fl.D.805.

Grus. st., hafsstr. r. (*Sk. Malmö; L. Hammar; Ystad; Sandhammar. Blek. Nettraby. Smål. Kalmar. ÖG. Vallerstad; Vinnerstad etc. Stockh. på Tallholmen och Edsholm i Värtan; Lidingön. Hall. Gåsevad; Balgö. Boh. Vinga ö, ymnig. Öl. Husvalla; Rälla. Goutl. Lummelund. — N. Christiania i Dragonskoven och på stranden vid stora Bäckelaget etc.) Blrna mest parvisa i bladveckan; bären röda.*

#### 438. CONVALLARIA Lin. Konvalje.

† Blrna klocklika, i klase.

- 1 *C. majalis* L. stängeln bladlös; rotbladen ovalt lancettlika; klasen ensidig. 2 5, 6, hv. blr. Fig. Sv.B.9. Fl.D.854.

Skogsback. a. (*Sk.—Pit. Lpm. och VB. till Öfver-Kalix. — N. till Nordl:s gräns.) Blrna vålluktande; bären gulröda.*

†† Blrna rörformiga, i bladveckan: *Polygonatum Tourn.*

- 2 *C. verticillata* L. stjelken kantig; bladen kranssittande, jemnbredt lancettlika. 2 6. Fig. Fl.D.86. Reich.D.Fl.f.966.

Bergstr. r. (*Sk. Hall. Smål. vest. del. af Jönk. län, samt flerst. i mell. delen: Scheutz. — Jemll. i de vest. prov. Um. Lpm. på en holme i ån nära Stensele. Ångml. — N. till Ost-Finm.) Blrna hvita, med grönakt., invändigt håriga flikar; bären gulröda.*

- 3 *C. Polygonatum* L. stjelken kantig; bladen skiftevisa, ovala—bredt lancettlika; blomskäften 1—3blommiga; kalkens flikar och ståndarsträng. *glatta*. 2 5, 6. Fig. Sv.B. 41. Fl.D.377.

Beck. (Sk.—VB. och Jemtl. Boh. Öl. Götll. — N. till Trondhj. och Snaasen: Bl.) Blomskafsten mest enblommiga, blrna hvita med grönakt. flikar; bären svartblå. — *Polygonatum officinale* All.

4 *C. multiflora* L. stjelen trind; bladen som hos föreg.; blomskafst. flerblommiga; kalkflik. invändigt jemte ståndarstr. småhåriga. 2 5, 6. —  $\beta$  *bracteata*: det gemens. blomskafstet utdraget till en liten gren, med skärm vid blrna. Fig. Sv.B.392. Fl.D. 152.  $\beta$  Reich.f.963.

Lund. r. (Sk.—Gestr. Vestmt. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Götll.? — N. söd. del. af Aggerhus och Christianss. st. —  $\beta$  Uppl. Roslagsbro i en äng vid Lundaudd. Södm. Tosterön, Stenby äng. VG. Kinnekulle, Hellekis munkäng.) Dubbelt större än föreg., hvars flerblommiga varr. ofta tagas för denna, ehuru lätt skiljda på stjelen, som hos *C. multifl.* saknar alla kanter; blr smälare; bär som hos föreg. —  $\beta$  *C. bracteata* Thom.

439. *SMILACINA* Desf.

\*1 *S. stellata* Desf. bladen aflånga—lancettlika, skiftevisa, glatta; blrna i tät klase, i stjelen topp. ☉ 6, hv. blr. Fig. H.N.f.15, n:o 70.

Bergstr. r. (N. på nordvestra sidan af Gränsenäs, omkr. 1 mil norr om Christiania.)  $\frac{1}{2}$ —1 f. hög, till stjelen och blad något lik de begge sista arterna i föreg. släkte, men har alla blrna i toppen; bären svarta. — *Convallaria* L. *Majanthemum* Link.

440. *MAJANTHEMUM* Web. Ekorrbär.

1 *M. bifolium* DC. bladen oftast 2, skiftevisa, skaftade, hjertlika, på öfre sidan glatta; blrna i klase. 2 6, 7, hv. blr. Fig. Sv.B.454. Fl.D.291. H.N.f.16, n:o 64.

Fukt. skogsmark, a. (Sk.—Lpl. Öl. Götll. — N. till Nordl.: Norm.) Bären gula, fläckiga, stul. röda. — *Convall.* L. *Smilacina* Desf. *Maj.* *Convallaria* Web.

441. *PARIS* Lin. Ormbär.

1 *P. quadrifolia* L. bladen meränd. 4 i krans [säll. 3, 5 ell. 6], bredt omv. äggrunda, spetsade, glatta; blomma ensam. 2 5, 6. Fig. Sv.B.6, Fl.D.139.

Lund. a. (Sk.—VB. nor. del. och Torn. Lpm. Boh. Öl. Götll. — N. till Ost-Finm.) Stjelen enkel, med en grön blomma i toppen; bäret svartblått.

90 Fam. *COLOCHIOACEÆ* DC. Kalk kronlik med 6deladt bräm. Stånd. 6, med utåt bristande knappar. Stift 3. Fröhus af 3, helt och hållet, eller endast vid basen hopväxta småfrukter med centrala fröfästen.

442. *COLCHICUM* Lin. Tidlösa.

\*1 *C. autumnale* L. löken 1—3blommig, vid blomningen bladlös, sedan uppskjutande lancettlika upprätta blad; kalkens flikar aflånga trubbiga. 2 9, 10. Fig. Fl.D.1642. Reich.D.Fl.f.949, 950.

Äng. r. (Stockholm, Ulriksdal; Agnesberg; Experimentalfältet: G. v. Ced. Uppl. Steninge nära Sigtuna, ymnig. Fordom äfven i Sk. vid Oppmannas prestg.; och i Små. på Plåtängen mell. Grenna och Röttle.) Blrna lika dem hos *Crocus*, men större, rödaktigt blekblå, med quarterslång pip, nående n. till löken. Blommar om hösten utan blad, hvilka jemte frukten utbildas våren efter.

443. *VERATRUM* Lin. Prustrot.

\*1 *V. album*  $\beta$  *Lobelianum* Bernh. bladen omslidande stjelen, ovala spetsade; blomklasarne i tät samling; kalkflikarne utstående naggtandade. 2 8. Fig. Fl.D.1120. Fl.N.2.t.1. Reich.D.Fl.f.938.

Fukt. st. i fjelltr. r. (N. Ost-Finm. Kjöllefjord, samt vid Lille- och Store-Lerpollen i Tanen: Norm.; mell. Hopseidet och Varangerfjorden.) 2—3 fot hög med stora blad, äfven invändigt blekgröna blr; den eg. *V. album* L. har dem utanpå gröna, inuti hvita.

- 91 Fam. **ALISMAOEZE** Juss. Kalk af 6 blad, de 3 yttre oftast foderlika. Småfrukter talrika fria, ell. 3—6 mer och mindre hopväxta, men slutl. fallande från hvarandra. Stift ell. oskaftade märken lika många som småfrukt. Fröhvite 0.

- 1 Flocken **Butomese**. Alla kalkbladen färgade. Småfrukt. fröhuslika, endast vid basen förenade, öppnande sig på insidan.

444. **BUTOMUS** Lin. Blom-vass.

- 1 *B. umbellatus* L. stängeln trind; bladen jemnbreda, nedtill 3kantiga; blrna i flock, långt skaftade. 2½ 7, hv. rödl. blr. Fig. Sv.B.296. Fl.D.604.  
Vatten. (Sk.—Medelp. Njurunda och Tuna sn. VB. Piteå enl. Lessl.; Luleå och i Sangis elf. Jemt. Håsjö sn. Dal. Verml. Christinehamn, Väsehärad och Arvika. Boh. Uddevalla, i Risån. Hall. Öl. Gottl.) 3—4 fot hög med stor, skön blomflock.

- 2 Flocken **Alismese**. Yttre kalkbladen gröna, de 3 inre kronlika. Småfrukter [talrika] nötlika, affall. öppnade.

445. **ALISMA** Lin. Svalting.

- 1 *Plantago* L. bladen äggrunda, stund. vid basen något hjertlika [mer säll. lancettl. —jemnbr.], spetsiga; blrna i långt skaftade, *kranavis öfver hvarandra sittande knippen*; fruktgytt. kranslika, *nedplattade*, af *rundadt trubbiga* småfrukter. 2½ 7, hv. ell. rödl. blr. Fig. Sv.B.440. Fl.D.561.

Vatt. a. (Sk.—VB. nor. del och Um. Lpm. — N. till Trondhj.) Var. *stundom med mer hjertlika blad*: v. *cordifolium* Fr. dock utan all gröns mot den vanl. formen, samt i vatten af växlande djup och starkare ström med flytande, lancettlika, ända till smalt jemnbreda, utdragna blad.

- 2 *A. ranunculoides* L. bladen smalt lancettlika eller jemnbreda spetsade; blrna i ensam och enkel flock; fruktgytt. *klotrunda*, af utstående *spetsiga* småfrukter. 2½ 7, 8, hv. rödl. blr. Fig. Fl.D.122. Reich.D.Fl.f.97. H.N.f.4, n:o 87.

Vatt. torfmossar etc. r. (Sk. Trelleborg; Ystad; mellan Baldringe och Söfvesta; Roslätt; Kullaberg; mellan Rå och Engelholm etc. Små. Gärdserum; Hannäs vid sjön Vindomen; vid Gräfsjön i Tryserum: Ekstr. Hall. nära Holmstad; Vallda sn. flerst. Öl. från söd. delen till Löth sn. Gottl. Vibble kalkugn; Vall; Roma; Boge m. fl. st.) Mindre än föregående med något större blr. Var. på Öl. och Gottl., trol. i följd af djupare vatten, med långa jemnbreda och flytande blad: var. *sosterifolium*.

446. **SAGITTARIA** Lin. Skäkta.

- 1 *S. sagittifolia* L. stängeln enkel; bladen pil-lika med utdragna spetsadeflikar, säll. afånga, med korta ell. inga flikar; blrna kransvisa, 3 i hvarje krans, tillhopa bildande en klase, med de längre skaftade ♀blrna nedtill, ♂blrna upptill. 2½ 7, 8, hv. blr. Fig. Sv.B.164. Fl.D.172.

Vatt. a. (Sk. allm. Blek. och Små. inre del. sälls. — VB. och Jemt. — N. till Steen på Ringerige, sälls.) Första rotbl. äro jemnbreda och gråslika, lika *Vallisnerie*, för hvilken de i Sv. blifvit misstagna; de följande bladen äro afånga och flytande, med korta, knappt utstående flikar vid basen; först blommande får växten de pil-lika bladen. Var. någongång, t. ex. i Strinnefjärden i Ängm., med 3—4 tum långa fingerbredda, alldeles hela blad.

- 3 Flocken **Juncaginee**. Alla kalkbladen n. foderlika [gröna eller gulakt.]. Småfrukter helt och hållet eller vid basen samväxta.

447. **SCHEUCHZERIA** Lin. Kallgräs.

- 1 *S. palustris* L. bladen syl-liket jemnbreda halfrunda, något rännformiga; blrna i gles klase. 2½ 6. Fig. Lin.Fl.L.t.10.f.1. Fl.D.76. H.N.f.15, n:o 71.

Sanka kärr. (Lpl.—Sk. söd. Hall.: Theor. och Blek. Öl. Borgaträsk. — N.) Blrna små gulaktiga med stora hängande ståndarknappar; småfrukter af årters storlek, snedt äggformiga.

448. *TRIGLOCHIN* Lin. Sålting.

- 1 *T. maritimum* L. märken 6; fröhusen [de samväxta småfrukt.] *Grummiga äggformiga*, färade. 2 6, 7, gr. blr. Fig. Sv.B.112. Fl.D.306.  
Hafstr. a.; vid sjöstr. r. (Sk.—VB. *Mälaren* på Munsön; Strengnäs i Gersinge storsång; Thorshälla; Vesterås. *Uppl.* vid Bjelkesta i Giresta sn; Uppsala kungsäng. Boh. Öl. *Gottl.* — N. till Finn.) *Blrna i smal klase; bladen groft trådlika.*
- 2 *T. palustre* L. märken 3; fröh. *Grummiga, small klubblika.* 2 6, 7, gr. blr. Fig. Sv.B.111. Fl.D.490.  
Kärräng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finn.) *Spädare än föreg.*

- 92 Fam. *NARTHECIAEAE* Fr. Kalk kronlik 6bladig. Stånd. 6. Småfrukter helt och hållet samväxta till ett 3rumm. fröhus, ell. i toppen åtskilda, med fröfästen på skalens kanter.

449. *TOFIELDIA* Huds. Björnbrodd.

- 1 *T. calyculata* Wg. blomskäften vid basen försedda med ett *lancettlikt* skärblad, samt *till under kalken* med ett 3klufvet, foderlikt svepe; fruktens stift *syl-lika.* 2 6, g. blr. Fig. Sv.B.482,f.2. Fl.D.suppl.t.13. H.N.f.4, n:o 86.  
Sump. mark, r. (*Gottl.*) *Dubbelt gröfre än följ. Kalken med svepet liknar en krona med sitt foder. Bladen hos båda arterna smala, gräs- ell. svärdlika, 2—3 tum långa, plattadt 2sidiga. — Anthericum L. T. palustris DC.*
- 2 *T. borealis* Wg. blomsk. utan skärblad, i stället vid basen omgifna af det från kalken *afslagnade*, 3klufva svepet; stiften *ganska korta.* 2 6, 7, hvitg. blr. Fig. Lin.Fl.L.t.10,f.3. Sv.B.482,f.1. Fl.D.36. H.N.f.3, n:o 57.  
Fjelltr. (Lpl.—Dal. fram till Oresjön. *Verm.* bergsl., mell. Gustafsfors och Liljendahl Ängml. Vidbyggerå; Nätra och Arnäs sn; Tåsjö. *Helsl.* n.v. del ned till Arbrå och Ofvanåker. — N.) *3—6 tum hög med kortare ax än föreg. — Anther. calyc. β L. T. alpina Sternb. T. palustris Huds.*

450. *NARTHÉCIUM* Möhr. Strandlilja.

- 1 *N. ossifragum* Huds. bladen smalt gräs- ell. svärdlika; blrna i klase. 2 7, g. blr. Fig. Sv.B.489. Fl.D.42. H.N.f.14, n:o 73.  
Fukt. äng. kärr. (Sk.—Jemtl. i de vest. provinserna. *Ner.* Askersunds sn. *Smål.* vest. delen till Lenhofda och Elghult; Madesjö sn i Kalmar län. *Blek.* mell. Eringsboda och Svarthöfdaryd; Scheutz. — N. vest. del. fr. Christianss. st. till Finn.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög; *hela växten, utom ståndarsträngarne, glatt. — Anthericum L.*

- 93 Fam. *JUNCAEAE* DC. Kalk foder- ell. fjäll-lik, 6bladig. Stånd. 6, ell. 3. Stift 1, med 3 märken. Fröh. 3rummigt, mångfröigt ell. enrummigt och 3fröigt.

451. *JUNCUS* Lin. Tåg.

† Blomsaml. (skenbart sidositande) vid basen af ett ensamt, långt och trindt skärm, liknande en fortsättning af det bladtösa strået; fröen ovingade.

\* Slidorna vid stråets bas ljusbruna, glanslösa; stånd. 3.

- 1 *J. conglomeratus* L. strået *finstrimmigt*; blrna ganska talrika, gytrade i ett *rundadt* *hufvud* ell. *kortgrenigt* knippe; kalkbl. spetsiga; mogna fröhuset något *intryckt* i spetsen, med en *vårta* för stiftet. 2 7. Fig. Sv.B.479,f.2. Fl.D.1094.  
Våta st. a. (Sk.—Helsl. *Vestml.* *Ner.* *Verm.* Öl. *Gottl.* — N. till Lofoden.) *Stråets topp (skärmbudet) 4—6 tum lång ofvan den bruna blomgyllringen.*



- 2 *J. effusus* L. strået slätt; blrna talrika i dubbelt sammansatt, *utbredt knippe*; kalkbl. spetsiga; fröh. som hos föreg., utan vårta. 2, 7. —  $\beta$  *subuliflorus* Drej. blrna n. dubbelt smärre; fröhuset trubbigt, icke intryckt. Fig. Sv.B.479,f.1. Fl.D.1096.  $\beta$  H.N.f.9, n:o 70.

Väta st. a. (Sk.—Helsl. Dal. och Verml. Um. Lpm. Öl. — N. till Bergen st. —  $\beta$  VG. Degeberg; Göteborg; Lem. Södm. Landsort. Blek. Saltö. Sk. Dahlby.) *Knippet vanl. grönt, 1—2 tum långt, ungefär lika långt ned som hos föreg. Strået hos växten i lefv. tillstånd slätt, hos pressade ex. finstrimmigt.*

\*\* Slid. vid stråets bas glänsande; stånd. 6.

a — Strået strimmigt ell. färadt, med svartbruna slidor.

- 3 *J. diffusus* Hop. strået *finstrimmigt, grönt*; blrna som hos föreg.; kalkbl. sylspetsiga, betydll. längre än fröh.; detta omv. äggformigt, *trubbigt med udd*. 2, 7. Fig. Reich. f.921.

Fukt. st. r. (Sk. Markie; Stenbyhållar enl. F. Aresch.; äfven erhållen bland *J. glaucus*, antingen från Ramlösa ell. Fogelsång. Smål. Stenbrohult.) *Lik föreg. med stort knippe, men smärre blr; skild från följ. med det finstrimmiga strået; förmodad hybrid af begge.*

- 4 *J. glaucus* Ehrh. strået *djupt färadt, blågrönt*; blrna som hos föreg.; kalkbl. sylspets., längre än fröh.; detta aflängt ovalt, *spetsigt*. 2, 7. Fig. Fl.D.1159. Reich. f.922. H.N.f.1, n:o 69.

Fukt. st. r. (Sk. vest. och söd. del., t. ex. Benestad; Lund vid Getinge, Dalby, Fogelsång etc.; Ramlösa; Svenstorp i Odarslöf sn, m. fl. st. Öl. vid lilla Dahlby och Vesterstad i Kastlösa sn. Götll. Fårön i flygsanden vid Sudergårda.) *Strået 2—3 fot högt, styft, ehuru small, med små blr. — J. inflexus* Retz.

b — Strået slätt; med bruna slidor.

- 5 *J. balticus* Willd. blrna i knippe af 3—4, oliklånga mångblommiga skaft; kalkbl. ägg-rundt lancettl., spetsade, *de inre med udd*; fröh. elliptiskt, *trubbigt med udd*. 2, 7. —  $\beta$  *inundatus*: strået lägre och dubbelt spädare med fåblommigt knippe. Fig. Sv.B.479,f.3. H.N.f.1, n:o 68.  $\beta$  Fl.D.2287. Reich.f.916.

Häfsstr. och fjellmyrar. (Sk. ÖG.—VB. Haparanda. Lul. Lpm. Qvikkjokk; Rovejaure; H. Widm. Pit. Arjeploug; Walläiwe; Kåbrenoiwe. Jemtl. Frösön. Hall. Götll. Fårön; Sandön: Eis. och Stuxb. — N. från Christianss. st. till Ost-Finm. —  $\beta$  Sk. Ystad. — N. Lofoden.) *Strået grönt och teml. styft, knappt märkligt strimmigt, blr och fröh. bruna, mycket större än hos de föreg. Fröh. hos Östersjöformerna väl så långa som kalken, hos de Lappska kortare, för öfr. icke skildja. — J. glaucus* Wg.Fl.L. *J. glauc.  $\beta$  litoralis* Wg.Fl.Su.

- 6 *J. arcticus* Willd. blrna 5—12, gytttrade n. utan skaft på sidan nära toppen; kalkbl. ägg-runda, de yttre spetsiga, *de inre trubbiga*; fröh. ovalt, *mycket trubbigt med udd*. 2, 7, 8. Fig. Sv.B.479,f.5. Fl.D.1095. H.N.f.3, n:o 58.

Fjelltr. (Torn. Lpm. fjellryggen vester om Torn. träsk. Lul. Lpm. fjellen kring Wirihaure; Rovejaure och Rapawagge; H. Widm. Pit. Lpm. flerst. Herjed. i Ljusnedalen och vid Midtälven; Funnesdalen. — N. Finm.—Gudbrandsdalen.) *Strået fotshögt med något stora bruna blr och fröh. i hufvud 1—2 tum nedom stråets topp, långt kryppande rotstock. — J. conglomeratus  $\beta$  L. J. effusus  $\beta$  Fl.D.*

- 7 *J. filiformis* L. blrna i glest n. enkelt knippe, n. midt på det trådlika veka strået; kalkbl. lancettlika, *spetsiga*, vanl. kortare än fröh.; detta n. klotrundt. 2, 6, 7. Fig. Sv.B.479,f.4. Fl.D.1207.

Fukt. st. a. (Lpl.—Sk. Öl. Götll. — N.) *Blr och fröh. gröna, ell. mycket ljusbruna, fästade långt ned på strået. Dettas slidor förlängas stundom till ett kort bladämne.*

†† Blomknippe inom flere skärm, af hvilka det yttre långt, upprätt, trindt, liknande en fortsättning af strået; fröen vid ändarne vingkantade.

- 8 *J. maritimus* Lam. stjelen nedtill med slidor bärande trinda öledade blad; kalkbladen lancettlika, de yttre spetsiga, de inre trubbiga med udd, af det sprötspetsade fröh:s längd, 2, 7, 8. Fig. Fl.D.1689. Reich.D.Fl.895. H.N.f.9, n:o 69.

Kärrakt. häfsstr. r. (Blek. på Rörskärfvet och holmen St. Helena utanför Sölvisborg

enl. Gosseim.; Sälgsö, 1 mil öst. om Carlskrona. *Smål.* vid Horsö, Värnanäs, Björnö m. fl. st. nära Kalmar.) *Knippet af gyllrade blr, på olidlånga skaft, skenbart från sidan af strådet, hvilket synes fortsatt af det ena långa skärmblandet.*

+++ Blomknippe i det bladiga stråets topp, med korta skärm; fröen ovingade.

\* Bladen knutigt ledade \*).

a — Alla kalkbladen likformiga.

9 *J. obtusiflorus* Ehrh. strået upprätt, styft, 1—2bladigt; bladen trinda; blomknippet med *ulsperrade* grenar och *tillbakaböjda* blombufvud-skaft; *alla* kalkbladen *trubbiga*, n. af det spetsiga fröhusets längd. 24 6, 7. Fig. Sv.B.615. Fl.D.1872. H.N.f.1, n:o 70.

Kärr. r. (Sk. vid Köpings-å. Öja, Högesta, Benesta, Baldringe, Ramsåsa etc. *Gottl.* Visby, mell. St. Görans och Snäckgårdet; Lummelund; Hau; Fardume; Båhl; Löjsta; Klinte etc.) *Strået 1—3 fot högt, med jämförelsevis litet, grönt ell. blekbrunt knippe, 2 knappt 3 tum i diam. — Rotstocken hos denna och de 3 följ. krypande.*

10 *J. silvaticus* L. strået upprätt, vanl. *flerbladigt*; bladen n. trinda; knippet 2—3 gånger sammansatt, med *utstående* grenar; *alla* kalkbladen *kort uddspetsiga*, kortare än det kort sprötspetsiga fröhuset. 24 6, 7. Fig. Reich.f.906—908. Fl.D.2112. H.N.f.16, n:o 65.

Stränd. särd. hafskust. (Sk.—*Helsl. Vestml. Verml. och Dalsl. Hall. Öl. Gottl.* — N. till Trondhj. st.) *1—2 fot hög, ofta med mycket sammansatt knippe. — J. articulatus β silv. J. acutiflorus Ehrh.*

b — De yttre kalkbl. spetsiga ell. uddspetsiga, de inre trubbiga.

11 *J. articulatus* L. strået *uppstigande*, ell. *nedliggande*, *flerbladigt*; bladen *sammanstryckta*, *tydl.* ledade; knippet sammansatt, med *utstående* grenar; *alla* kalkbladen *lika långa*, de *yttre uddspetsiga*, de inre trubbade, kortare än det sprötspetsiga fröhuset. 24 6, 7. — *β aquaticus*: med nedligg. ell. flytande, rotsläende strå. Fig. Fl.D.1097. Reich.f.902—904. H.N.f.5, n:o 71.

Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Vanl. med lägre strå och mindre sammansatt knippe än föreg.; fröh. n. svarta och glänsande. — J. lamprocarpus Ehrh.*

12 *J. alpinus* Vill. strået *upprätt*, 2—3bladigt; bladen *trinda*, *otydl.* ledade; knippe föga sammansatt med n. *upprätta* grenar; *alla* kalkbladen *lika långa*, de yttre trubbiga med en kort udd i ell. tät under spetsen, de inre trubbiga, kortare än det *spetsiga* fröhuset. 24 6, 7. — *β rariflorus*: knippet gles, med 2—5blommiga ljusbruna blombufvud. — *γ uniceps*: ett par tum hög, med 1—2, små blombufv. i toppen. Fig. Fl.D.2171. Reich.f.896—900. H.N.f.6, n:o 66; *β* f.7, n:o 72 [en lägre form].

Fukt. st. (Sk.—Lpl. — N. till Finn. — Norm. — *γ* Lpl.) *Strået 1—1 fot högt, spensligt, i fjellen med mångblommiga svarta blombufvuden: J. alpestris ed.1. — J. nodulosus Wg. J. ustulatus Hoppe. J. atratus från Gottl. Fr.Mant.3: en form med något mindre blr och kortare fröhus.*

13 *J. supinus* Mönch. strået spensligt, lökformigt vidgad vid roten, *flerbladigt*; bladen trådsma, *mycket otydl.* ledade med en fåra ofvanpå; blomknippet enkelt ell. sammansatt, af 1—6, dels skaftade, dels oskaftade blombufv.; kalkbl. *lika långa*, de yttre *spetsiga*, de inre trubbade, n. af det *trubbiga* fröhusets längd. 24 6, 7. — *β ripens*: strået nedligg. ell. flytande, rotsläende; blr i bladvecken. — *γ nigritellus* Koch: spåhare, med smärre, svartbruna blombufvud, något intryckt fröhus. Fig. Fl.D.1099. Reich.f.882—886. H.N.f.2, n:o 64; *γ* f.5, n:o 72.

Fukt. st. (Sk.—Lpl. — N. — *γ* mer sällsynt.) *3—6 tum hög med ljust grönbruna blombufvud; stånd. har förf. sunnit vara 3 hos den vanliga, men alltid 6 hos γ. Varierar med bladiga blufvud: J. subverticillatus Wulf. — β kryper ofta hela alnen omkring i grundt vallen. — J. uliginosus Roth.*

\*) Lederna härröra af tvärvägg, som kännas, då bladen dragas mellan fingrarna, och äfven ofta synas, särdeles i torrt tillstånd.

## \*\* Bladen oledade.

- 14 *J. squarrosus* L. strået vanl. vid basen 1—2bladigt, derofvan bart; rotbladen talrika trådlika rännformiga styfva utbøjda; kalkbl. något spetsade, af fröhusets längd. 2 7. Fig. Fl.D.430. Reich.f.893. H.N.f.15, n:o 72.

Kärräng. (Sk. Blek. Smål. i vest. och mell. delen; Äfven vid Jönköping: Scheutz. Hall. Boh. Oroust, nära Svanesund; Uddevalla. VG. Ner. Porla; Lassåna. Jemll. fjell. Lpl.: Linné. Öl. — N. allm. i vest. del. till Örländet i Trondhj. st.; sälls. i Aggerhus st.) Stel och seg, vid roten tufvad och bladig vdrxt.

- 15 *J. compressus* Jacq. strået vid midten enbladigt; bladen trådsmla rännformiga; kalkbl. rundtrubbiga, kortare än det n. klotrunda fröhuset. 2 7. Fig. Fl.D.431. Reich.f.890—92. H.N.f.9, n:o 71.

\* Gerardi Lois. fröh. något mer 3kantigt och spetsigt. Fig. Wg.Fl.L.t.5. Fl.D.2411. Reich.f.888. H.N.f.10, n:o 63.

Sand. och fukt. st. a. (Sk.—VB. nor. del. Jemll. — N. — \* Hafsstr. Sk.—VB. Boh. Öl. Gottl. — N. till Finnm.) Var. från 3—15 tum hög, med krypande rot, som är tydligare och mindre tufvad hos *J. Gerardi*, hvars blr äro brunare och något större än hos *a*; för öfrigt äro de af Koch och fl. gifna karakt. icke beständiga: *J. bottnicus* Wg.Fl.L. — *a* *J. bulbosus* L.

- 16 *J. bufonius* L. strået klynnedeladt, ell. enkelt, 1—flerbladigt; bladen som hos föreg.; blrna vanl. ensamma, n. oskaflade längs grenarnes sidor och i deras spets; kalkbl. spetsade, längre än det aflånga, trubbiga fröh. ☉ 7. —  $\beta$  *fasciculatus*: blrna 2—4 tillsammans. Fig. Fl.D.1098. Reich.f.872—76;  $\beta$  877—81. H.N.f.7, n:o 73.

Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) 1—6 tum hög, med trådlig rot; var. ett par tum hög, enkel, med längre fröh. —  $\beta$  *J. insulanus* Reich.?

+++ Blrna samlade i 1—2, säll. 3, hufvudlika gyttningar i stråets topp.

\* Strået bladlöst, vid basen omgifvet af rotblad.

- 17 *J. capitatus* Weig. strået ensamt, enkelt; rotbladen borslika rännformiga; blomhufv. 3—6blommiga, med korta skärm; alla kalkbladen syl-spetsade, n. lika stora, längre än det ovala trubbiga fröhuset; fröen ovingade. ☉ 7. Fig. Fl.D.1690. Reich.f.862. H.N.f.1, n:o 71.

Fukt. sandstr. r. (Hall. Falkenberg; Halmstad; Eldsberga. Sk. hela kusten. Blek. Torsö i Mellby sn; Christianopel; Djupafors och Brantafors etc. Öl. Grankulla. Gottl. Sproge på en åker nära Tjengdarve; Gröttlinge sn, vid Slis och Hallinge; samt Öja sn, vid Stockviken.) 2—5 tum hög, med blomhufvud vanl. kortare än det ena upprättstående skärmbladet. — Anm. *J. pygmaeus* Thuill., ännu mindre, med flere blomhufv. och spetsadt fröh. fanns fordom i Sk. mell. Klagstorp och Hvellinge.

- 18 *J. trifidus* L. stråen flere från samma rotstock, enkla; rotbl. som hos föreg.; blomhufv. 1—3blommiga, mellan 2—3, mycket långa, trådsmla skärm; de yttre kalkbl. spetsade, de inre trubbiga med udd, n. kortare än det aflånga, sprötspetsade fröh.; fröen smalt vingkantade. 2 7. Fig. Sv.B.727. Fl.D.107 och 1691. H.N.f.10, n:o 64.

Fjelltr. a. (Lpl.—Dal. — N.) Strå och blad trådlika, det förra vid basen omgifvet af slidor, som bära korta syl-lika bladämnen; dock är stundom i samma tufva öfversta slidans bladämne utvecklad till ett 2—3 tum långt blad, så att denna karakt. är otillräcklig att skilja *J. Hostii* Tausch.

\*\* Strået bladigt; fröen vid ändarne vingkantade.

a — Blomhufv. mångblommiga; alla kalkbl. spetsiga.

- 19 *J. castaneus* Sm. strået styft, nedtill flerbladigt; bladen rännformiga; blomh. 1—2, vanl. med ett utdraget, upprätt skärmblad; fröhuset äggformigt aflångt, spetsigt, längre än kalkbladen. 2 7. Fig. Fl.D.1332. Reich.f.868. H.N.f.3, n:o 59.

Fjelltr. r. (Jemll. Frostvikens sn flerst.; Snasahögen; Sylfjellen; Åreskutan; Ålsens gåstg. Herjed. Midtåklappen; Malmagen; Skarffjellet m. fl. st. — N. Hardanger och Tellemarken till Nordl. Ost-Finm. vid Persfjorden enl. Th. Fr.) Blomhufv. svartbruna, meränd. kortare än det ena skärmbladet; fröh. stora och svartbruna.

b — Blomhufv. fåblommiga; alla, ell. de inre kalkbl. trubbiga.

- 20 *J. stygius* L. strå och blad *trådsmla*; de sednare vanl. 2, ett ofvan stråets *midt*, det andra nära basen; blomh. *ensamt* ell. 2—3, något långt åtskilda, 2—3blommiga; de yttre kalkbl. *spetsiga*, de inre trubb., kortare än det *spetsiga* fröh. 24 6, 7. Fig. Sv.B.497.f.1. Fl.D.suppl.t.11. H.N.f.3, n:o 60.
- Kärr. r. (Lpl.—ÖG. vest. Ny sn; Kärna mosse och Gusum: Kindb. Ner. Verm. VG. Höfrö i Grolanda, och Ramunde mosse i Sköfvened: J. Hult. Vestra Smål. Hall. — N. Nordl. Österdalen; Tellemarken; Christiania etc.) *Stundom fotshög, ehuru blommande vanl. hälften lägre, alltid spå, med ljusbr. ell. gulakt. blomhufv., korta. syl-lik skärm, stora ljusbruna fröh.*
- 21 *J. triglumis* L. strået *nedtill* bladigt, med *syl-lik* blad; blomhufv. *ensamt*, 2—4-blomm. inom ett kort skärm; *alla* kalkbl. trubbiga, kortare än det upprätta, *något trubbiga. med en kort udd försedd* fröh. 24 6. Fig. Sv.B.497.f.3. Fl.D.132. H. N.f.3, n:o 61.
- Fjelltr. a. (Lpl.—Herjed. — N.) *Fingerhög; mycket sällan med 2 blomhufvud; korta, sällan öfver de gula blrna nående skärm; rödbruna fröh.*
- 22 *J. biglumis* L. strået *som hos föreg.*; blomh. *ensamt*, 1—2blomm., inom ett skärm *längre* än blrna; kalkbl. *som hos föreg.*, kortare än det aflånga, i spetsen *intryckta* fröh. 24 7. Fig. Sv.B.497.f.2. Fl.D.120. H.N.f.3, n:o 62.
- Högre fjelltr. (Lpl.—Herjed. — N.) *Lik föreg., men med blrna något trängda åt sidan af det upprätta skärmbladet, som meränd. når ett stycke öfver dem; fröh. n. klubblika, bruna, med gula kanter.*

452. LützULA DC. Bladtåg. Fryle.

† Knippe af *greniga* blomskaft, med *ensamma*, ell. blott få blr i hvarje gytring.

\* Bladen *långhåriga*; blomknippets grenar *n. raka*, utsperrade.

- \*1 *L. maxima* Desv. bladen *bredt jemnbreda* ell. *n. svärdlika*, i kanten *håriga*; knippets grenar *oliklånga*, flere gånger delade, med 2—5 hopgyttade blr; kalkbladen *borstspetsade*, af det *sprötspetsiga* fröhusets längd. 24 5, 6. Fig. Fl.D.441. Reich.D.Fl. 861. H.N.f.14, n:o 74.
- Skog. r. (N. söd. och vest. delar, från Arendal och Christiansand till Otteröen i Nummedalen. Lofoden och Reinebring.) *Fotshög och mera, med stort blomrikt knippe och stundom fingerbreda rotblad. — L. silvatica Gaud.*
- 2 *L. pilosa* W. bladen *lancettlikt jemnbreda*, *håriga*; knippets grenar *dels enkla enblommiga*, dels 2—3blommiga; kalkbl. *spetsiga*, kortare än det *trubbade* uddspets. fröh. 24 4, 5. Fig. Sv.B.444. Fl.D.2533.
- Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Mindre och med enklare knippe än föreg. — Juncus L. L. vernalis DC.*

\*\* Bladen *glatta*; blomknippets grenar *båglikt* utböjda.

- 3 *L. parviflora* Desv. strået *bladigt ända upp* till blomsaml.; bladen *lancettlika*; knippet med *mångblommiga* grenar och skaftade *ensamma*, ell. 2—3, gyttade blr; skärmfjällen *sargade, hårlösa*. 24 7. Fig. Fl.D.1929. Reich.f.859. H.N.f.3, n:o 63.
- Fjellv. r. (Torn. och Lud. Lpm. Pil. Lpm. nedanför Krappesware och på Käksa; Sartajokk: H. Widm. Herjed. på Rutsdöten. — N. Ost-Finnm.—Dovre; Vaage; Filefjell.) *Blrna mycket små, n. alla med längre ell. kortare skaft; stjelen 1—2 fot hög, ofta med ½ tum breda blad.*
- \*4 *L. glabrata* Hop. blomknippet *vanl. med mer upprätta* grenar; skärmfjällen *hårkantade, knappt sargade*; för öfr. *som föreg.* 24 7? Fig. Fl.D.suppl.t.12. Reich. f.858.
- Fjellv. r. (N. Lomseggen i Gudbrandsdalen: Norman enl. Bl.) *Något mindre och mer smaltbladig än föreg., som den eljest till växten liknar, men till de större och mörkare blrna lik föl.* Bladen 3—4 lin. breda.
- 5 *L. Wahlenbergii* Rupr. strået *ofvan midten bladlöst*, ell. med ett smalt blad närmare blomsaml.; bladen *smalt lancettlika*, stund. vid sliddöppningen *glost* *håriga*; knippet och blrna *som hos föreg.*; skärmfjällen *sargade och hårkantade*. 24 7, 8. Fig. H.N.f.8, n:o 70.

Fjellv. (*Lpl.—Jemtl.* — *N. Finnm. Nordl.*; Valdars, och fjellet Bitihodn i söd. delen.) Vanl.  $\frac{1}{2}$  fot, säll. fotshög, med ännu smalare, och endast nedtill på strådet sittande blad. Blrna stora som hos föreg., svartbruna. Den ulländska *L. spadicea* DC., med hvilken denna förr varit förväxlad, skiljer sig med tydligare hårtofs i slidmynningen och längre ståndarknappar i jemf. med strängarne. — *L. parviflora*  $\beta$  *WG.Fl.Su.* *L. glabrata* och *borealis* *Fr.S.V.Sc.p.219.*

†† Knippe af mångblommiga täta hufvudlika ax; eller ock ett ensamt ax.

6 *L. campestris* DC. bladen platta, mycket håriga; blomknippet med vanl. talrika, mer och mindre utdragna, raka skaft, äggformiga ax; skärmsf. sargade, n. glatta; kalkbladen uddspetsade, längre än det n. klotrunda fröhuset. 2½—6. Fig. Fl.D.1333. Reich.f.831—37. H.N.f.12, n:o 73.

\* *multiflora* *Lej.* kalkbl. mer sylspetsade; ståndarnes sträng slutl. af omkr. knappens längd. —  $\beta$  *congesta*: axen kort skaftade, n. hufvudlikt hopgyttrade. —  $\gamma$  *nigricans*: bladen blott vid basen ell. slidöppningen håriga; axen skaftade, svartbruna. —  $\delta$  *pallescens*: axen smärre, på mer utstående skaft, till färgen ljust brunaktiga. Fig. Reich.f.838.  $\gamma$  Fl.D.1692. H.N.f.15, n:o 73.  $\delta$  Lin.Fl.L.t.10.f.2. Reich.f.839. H.N.f.6, n:o 67.

Ängsback. skog. a. (*Sk.—Lpl.* — *N.* — \* *Sk.—Lpl.* — *N.*) Hufvudarten har de utblommade ståndarknapparne flere g:r längre än strängen. — *Juncus L.*

7 *L. arcuata* *Wg.* bladen smala rännformiga, n. glatta; blomknippet med vanl. 3—5, n. hårfina, båglikt utböjda skaft, rundade ax; skärmsfjällen mot spetsen långhåriga; kalkbl. och fröh. som hos föreg. 2½ 7, 8. Fig. Wg.Fl.L.t.4. Reich.f.840. H.N.f.7, n:o 74.

\* *confusa* *Lindeb.* örtbl. och slid. mer håriga; axen 1—4, på mindre böjda skaft; kalkbl. af fröhusets längd. Fig. Reich.f.841.842.

Fjellv. (*Lpl.—Herjed.* — *N. Finnm.* till Valdars. — \* *Lpl.—Jemtl.* Snasahögen. — *N. Ost-Finm.* till Hardanger och öfre Tellemarken.) Mycket spädare och med smärre blr än föreg.; bladen stundom med några få hår i kanten. Den i *Jemtl.* växande formen, som något liknar *L. Wahlenb.*, är ännu spädare med flere, mer glesblommiga ax: var. *subspadicea* *Beurl.* — \* *Juncus arcuat.*  $\beta$  *Wg.Fl.L.*, som af *Blytt* anses vara den rätta *L. hyperborea* *Br.*, är en medelform till följ. art.

8 *L. hyperborea* *Br.* bladen platta, glatta; axet ensamt; klot- ell. äggformigt, säll. 2—3 på upprätta skaft; skärmsf. n. bladlika, glatta; kalkbl. spetsiga af det n. klotrunda fröhus längd. 2½ 7, 8. Fig. H.N.f.10, n:o 65.

Hög fjellv. r. (*Lul. Lpm.* på fjellet Jägnafo. — *N. Finnm.* Dovre, på de högsta topparne, t. ex. Finnsbøe vid Drivstuen, Knudshøe, Storhøe etc.) Qvartershög och styf, mest utmärkt från föreg. genom sin glatthet och de breda, icke rännformiga, bladen, hvari den något liknar smärre former af *L. camp.*, för hvars fjellform:  $\beta$  *nivalis*, den anses af *Læst.* och *Wg.* — *L. nivalis* *Beurl.* *L. arctica* *Bl.*

9 *L. spicata* DC. bladen rännformiga, gleshåriga; blrna gyttrade i ett grenigt lutande ax; skärmsf. sargade, vanl. håriga; kalkbladen hinnspetsade med en nål-lik udd, längre än fröhuset. 2½ 7. Fig. L.Fl.L.t.10.f.4. Reich.f.844.845. H.N.f.3, n:o 64.

Fjellv. a. (*Lpl.—Herjed.* *Dal.* Idre sn, på Städdjan. — *N.*) Axet tumslångt, slakt; bladen smala. Var. med kort, hopträngd och upprätt ax: *L. conglomerata* *Mielichh.* — *Juncus L.*

## 15 KLASSEN

### SPADICIFLORÆ.

94 Fam. **AROIDEÆ Juss.** Blr gytttrade utan skaft, på en köttig kolf, med ell. utan hölster; hos 3:dje flocken insänkta inom den bladlika stammens kant. Frukt: fröhus ell. bär, affallande oöppnade.

1 Flocken **Aroidesæ versæ.** Blomkolfven inom hölster; kalk 0; frukt bär.

453. **ARUM Lin.** Munkmössa.

1 **A. maculatum L.** bladen pil-lika; blomkolfven rak klubblik, omkr. hälften så lång som det strutlikt hopvikna hölstret. 2½ 5, 6. Fig. Fl.D.505. Reich.f.8.  
Skugg. st. r. (Sk. på ön Lybeck i Krageholmssjön; Lund; Borlunda sn; Ellinge i v. Sallerup; Engelholm. Hall. Halmstad.) *Hölstret grönt; kolfvens öfre, klubblika del utan blr, svartröd; bären röda; bladen rent gröna ell. brunfläckiga.*

454. **CALLA Lin.** Missne.

1 **C. palustris L.** bladen bjertlika; blomkolfven cylindrisk, inom ett platt hölster. 2½ 6. Fig. Sv.B.39. Fl.D.422.

Kärr. (Sk.—VB. och Lpm. Boh. — N. Aggerhus och Christianss. st. Nordl. enl. Gunn.) *Hölstret på insidan hvitt; bären röda.*

2 Flocken **Acoroidesæ Endl.** Blomhölster 0; kalkblad 6; frukt bärlik.

455. **ACORUS Lin.** Kalmus.

1 **A. Calamus L.** stängeln ofvan blomkolfven bladlik, ganska lång; bladen svärdlika. 2½ 7, 8, gröng. blr. Fig. Sv.B.100. Fl.D.1158.

Stränd. (Sk.—Uppl. Dal. Norr- och Söderbärke. Vestml. Ner. Verml. Boh. Oroust, Henån. Hall. — N. Christianss. och Aggerhus st., nordligast i Hedemarken.) *Kolfven fingerlång. Hela örten, särđ. rotstocken, med skarp kryddsmak.*

3 Flocken **Lemnesæ.** Blr inom den på vattnet flytande bladlika stammens [stambladens] kant, med enbladig kalk.

456. **LEMNA Lin.** Andmat.

† Stambladen rundade, mer och mindre tjocka.

1 **L. polyrrhiza L.** rottråderne knippevisa; stambladen på båda sidor *platta*, ofvan *mörkgröna*, under *röda*. ☉ Fig. Sv.B.324. Fl.D.1589.

Vatten. (Sk.—Uppl. Helsl. Delsbo i Långsbo-ån. Angml. Bjerträ sn, Kungsgården. Vestml. Ner. Verml. Hall. Öl. — N. södra delen.) *Dubb. större än de 2 följ.; mycket sällsynt i Sv. med blr. — Spirodela Schleid.*

2 **L. gibba L.** rottråden *ensam*; stambladen ofvanpå *platta*, *ljusgröna*, under *skålformigt uppevållida*, *blekare*. ☉ 6—8. Fig. Sv.B.324. Fl.D.1588.

Vatt. (Sk. Smål. vid Kalmar enl. Sjöstr. ÖG.—Uppl. Vestml. Kungsör. Ner. Hall. Öl. Strandskogen. Goutl. Visby: Vestö; Roma myr: G. v. Ced. — N. sydl. delen.) *Telmatophace Schleid.*

3 *L. minor* L. rottråd. ensam; stambladen på båda sidor platta och ljusgröna. ☉  
6—8. Fig. Sv.B.324. Fl.D.1587.

Vatt. a. (Sk.—Ängml. VB. nära Sangiselfvens utlopp. Öl. Goutl. — N. till Trondhj. st.) *Har oftare blr än de öfriga.*

†† Stambladen aflångt lancettlika, tunna: *Staurogeton Schleid.*

4 *L. trisulca* L. rottråd. ensam; stambladen skaftade, vanl. 3, korsvis förenade. 2, 6, 7.  
Fig. Sv.B.324. Fl.D.1586.

Vatt. (Sk.—Um. Lpm. VB. med föreg. Öl. Goutl. — N. till Hedemarken.) *Ligger större delen af året under vattnet.*

95 Fam. **POTAMOGETONEÆ** Fr. Blr i ax ell. på en platt kolf: hos *Zannich.* ensamma i bladvecken. Stånd. 1—4. Fruktämn. 3—6, säll. 1, hvarje med sitt märke; slutl. nöt- ell. stenfruktlika.

1 Flocken **Potameæ.** Fruktämnen flere.

457. **POTAMOGETON.** Lín. Nate.

† Bladen lancettlika ell. bredare [3 lin.—2 tum; största bredden ungefär på midten].

\* Alla bladen tydligt skaftade, de öfre flytande.

a — Bladen utdraget skaftade; de flyt. läderartade.

1 *P. natans* L. de nedre bladen snart utan skifva, med kvarlemnande af de långa skaften; de öfre ovala ell. elliptiska, säll. lancettlika; axskaften jemntjocka; nötterna med trubbig rygg \*). 2, 7. Fig. Fl.D.1025. H.N.f.5, n:o 73.

\* *sparganifolius* Læst. öfre bl. smalt lancettlika; de nedres flere fot långa skaft jemnbreda, hinnaktiga [fyllodier]. Fig. H.N.f.14, n:o 75.

Stillast. vatt. a. \* i rinn. (Sk.—Lpl. — N. till Finn. Tromsøe. — \* Torn. och Lul. Lpm. i elfvarne. VB. flerst. i Pite-elf enl. G. v. Ced. — N. Dovre.) De nedre, snart bortruftade bladen smalare, men n. lika fasta som de öfre, ej så tunna som hos följ. Saknar på uttorkade ställen n. all stjekl: var. *acaulis* Fr. — \*, ansedd för egen art af Læst., blommar sällan, och är aldrig funnen med mogen frukt; hvarför den sannolikt endast är en af lokalen i fjellvattnen beroende form, analog med den smalblad. formen af *Alisma Plant.* och nordl. former af *Sagittaria*.

2 *P. fluitans* Roth: alla bladen lancettlika, åt båda ändar spetsade, de nedre hinnaktiga, qvarsittande; axskaften upptill tjockare; nöt. med något hvass rygg. 2, 7. Fig. Fl.D.2105. Reich.D.Fl.f.87, 88. H.N.f.9, n:o 72.

Rinn. vatt. r. (Sk. Helgeå vid Nymylla i Emislöf sn enl. F. Aresch.; förr äfven i Rönneå. Uppl. Svartsjölandet. Väntholmen i ett floddike vester om Norrskog. Goutl. Avanäs på Färö: Vestö enl. G. v. Ced.) Lik föreg., men med längre och tunnare blad; de öfversta dock stundom ovala. — *P. natans* β Wg.

3 *P. polygonifolius* Pourr. de nedre bladen lancettlika, qvarsittande; de öfre aflånga ell. något ägrunda; axskaften jemntjocka; nöt. med trubbig rygg. 2, 7. Fig. Reich.f.79—81. H.N.f.5, n:o 74, 75.

Bäck., diken etc. r. (Sk.—ÖG. och VG. Hall. Boh. Dalsl. Verml. Carlstad i Sandbäcken. Dal. Grangårde sn, Råfvåla. — N. sydl. del. af Aggerhus st., samt Christians.

\*) Näml. innan de hunnit torka, hvilket alltid förstås, så ofta de icke beskrivas torra, i hvilket tillstånd de stundom äfven gifva karakterer.

st. till Stavanger.) *Var. mycket; stundom med kort, krypande stjeln, då blott de öfre, bredare bladen återstå. Närmar sig stundom nog mycket till följ. — P. oblongus Vio.*

b — Bladen kort skaftade, alla tunna, genomskinliga.

- 4 *P. coloratus* Vahl: de nedre bladen n. elliptiska, de öfre bredt äggrunda, allas skifva längre än skaftet; axskaften n. jemntjocka; nött. med trubbig rygg. 24 7. Fig. Fl.D. 1449. Reich. 82—85. H.N.f.13, n:o 77.

Stillastående vatt. r. (Sk. i Arrie torfmosse. *Blek.* vid Ekeberg, 1 mil från Carlshamn. Götll. vid Erikskällan och Sjötebrunn i Båhl sn; Etelhem sn, i en bäck till Tenglingsmyr; Klintehamn; Fleringe sn, Lunderhage m. fl. st.) *Skiljd från föreg. med föga annat än de korta bladskäften. — P. plantagineus. Ducroz.*  
(*P. rufescens* β; *lucens*.)

\*\* De öfre flytande bladen skaftade, vanl. läderartade; de nedre oskaftade, hinnaktiga.

a — Axskaften jemntjocka.

- 5 *P. salicifolius* Wolfg. de nedre bladen *omfattande*, bredt och långt lancettlika *spetsiga*, de flytande ovala med *afrundad* bas; nött. plattade, med *trubbig* rygg. 24 7, 8. — β *lanceolatus*: flyt. bladen 0; axskaften långa. Fig. Reich.f.55 [β].

Vatt. r. (VB. Tornioelf vid Kengis. — β *Torn. Lpm.* Karesuando och Muonioniska. Pit. *Lpm.* Arjeplog. Jemt. Åre sn. i Jäfsjön. Ångml. — N. söd. del. af Aggerh. st.) *De flyt. bladen, som sällan utbildas, likna dem hos P. natans, ehuru mycket tunnare; de nedre hinnaktiga fingerbreda och 3—8 tum långa, liknande P. prölongi. — P. gramin. var. lanceolatum Læst. P. lanceolatus Reich.*

- 6 *P. rufescens* Schrad. de nedre bladen från *smal* bas utdraget lancettlika, *trubbade*, de flyt. *aflånga*, trubbade, med *afsmalnande* bas; pötterna plattade med *hvas* rygg. 24 7. — β *spathulatus*: alla bladen skaftade och flytande. — γ *minor*: till alla delar hälften mindre; de flyt. bladen smalt lancettlika. Fig. H.N.f.5, n:o 76. Fl.D.1450 och 1635. Reich.f.56; β f.86. γ E.B.1985.

\* *nigrescens* Fr. alla bladen hinnaktiga, de öfre något bredare. H.N.f.16, n:o 66.

Sjöar och rinn. vatt. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl. — β i bäcker. — γ i fjelltr. Lpl. Jemt. — \* *Torn. Lpm.* Karesuando. Pit. *Lpm.* Arjeplog. Älven uppgifven för Smål. i Hosmo-å; samt Hall. Harplinge.) *Bladen ½ till ¾ tum breda och 3—6 tum långa, snart rodnande, särdeles de öfre, hos \* snarare svartnande. — P. fluviat. Sm. β P. spathul. Reich. γ P. lanceolatus Sm., enl. fig. i E.B. \* P. nigrescens Fr. anses af Prof. Fries vara Smiths P. lanceol. och är måhända icke skiljd från γ.*

b — Axskaften uppåt tjockare.

- 7 *P. gramineus* L. de nedre bladen från *smal* bas smalt lancettlika spetsiga; de flyt. läderaktiga, *äggrundt* ovala, med *trubbig* bas; nött. med *trubbig* rygg. 24 7. Fig. Fl.D.222 och 1263. Reich.f.71—80. H.N.f.5, n:o 77 och f.9, n:o 73.

Diken och grundare vatt. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Stundom saknas de flyt. bladen; stundom återstå på uttorkade ställen endast dessa; då båda slagen finnas, är det P. heterophyllus Schreb. [H.N.f.12, n:o 75]. — Anm. Finnes icke i Linnés Herb., der under detta namn P. zosterifol. och mucronat. ligga.*

- 8 *P. nitens* Web. de nedre bladen från *bred, halft omfattande* bas lancettlika spetsiga, meränd. rännformiga och *båglik* tillbakaböjda; de flyt. *åt båda ändar* spetsade; nött. med *något hvas* rygg. 24 7. Fig. Fl.D.1807. Reich.f.60—62. H.N.f.8, n:o 67. Sjöar och rinn. vatt. (Sk. Smål. n. del.: Scheutz.—Um. *Lpm.* Öl. Götll. — N. till Trondhj. och Näröen. Finn. Thronenäs: Norm.) *Skull. mycket grenig, mörkgrön; vanl. mer bredbladig än föreg.; de flyt. bladen, som ofta saknas, längre och smälare än hos denna. — P. gramineum Wg.Fl.Su. P. curvisolius Hn. Ed.4.*

\*\*\* Alla bladen hinnaktiga, oskaftade ell. nästan oskaftade.

a — Axskaften uppåt tjockare.

- 9 *P. lucens* L. bladen *kort* skaftade, från *smal* bas bredt lancettlika, *uddspetsiga*, i Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).



kanten mycket *fin* *uddsågade*; nötl. trubbigt kölade. 24 7, 8. Fig. Fl.D.195 och 1384. Reich.f.64 och 69.

\* *Zizit* M.K. öfre bl. mycket smärre, skäftade, flytande. Fig. Reich.f.66.

Djupare sjöar. (Sk.—Uppl. Medelp. Torp sn i Torpsjön. Dal. Vestml. Ner. Dalsl. Hall. — N. till Söndmøer. — \* *Stockh.* i Mälaren, kring ön Fläsklösan och trol. flerestäd.) *Bladen från 1—1½ tum breda, stundom trubbiga med en liten udd, eller utlöper medelnerven till en kortare ell. längre, syl-lik udd; stundom finnes på höstgrenarne bladskifvan så litet utvecklad, att föga mer än nerven bildar bladet.*

10 *P. decipiens* Nolte: bladen *oskäftade*, från n. *afrundad* bas ovala ell. bredt *afånga* *trubbiga* med omärklig udd, *helbräddade*; nötl. trubbigt kölade. 24 7. Fig. Reich.f.63. H.N.f.14, n:o 76.

Sjöar, r. (*Stockh.* i Brunnsviken, och i Trehörningen i Brännkyrka sn. *Uppsala* i Fyrisån.) *Lik, men något mindre än föreg. med tunnare och mindre glänsande blad, som sitta nästan omedelbart vid stjelken, dock utan att omfatta den.*

#### b — Axskäften jemntjocka.

11 *P. praelongus* Wulf. bladen *stjelkomfatt.*, något lancettlikt jemnbreda [de yngre höstgrenarnes *afånga*] *trubbiga* platta *helbräddade*; nötterna halft cirkelrunda, n. tillhopastående med den raka insidan, *hväst kölade*, med kort spröt. 24 7, 8. Fig. Fl.D.1687. Reich.f.59. H.N.f.9, n:o 74.

Djupare sjöar. (Sk.—Lpl. Verm. Dalsl. Hall. — N. Christiania, i Asker: Ax. Bl.; Nordl. Fiskevaagvandet i Salten. Ost-Finnm. Jarfjorden: E. Hensch. enl. Th. Fr.) *Stor med ofta tumsbreda, 6—10 tum långa blad, vanligen i spetsen huftlikt hopdragna, rundadt trubbiga; axskäft långa; ax och nötter stora. — P. gramineus var. borealis* Læst. *synes vara en smalbladig form häraf.*

12 *P. perfoliatus* L. bladen med hjertlik bas *stjelkomfattande*, äggrunda—lancettlika *helbräddade* platta; nötl. äggrunda plattade med *trubbig* rygg och kort spröt. 24 7. Fig. Sv.B.580. Fl.D.196. Reich.f.53, 54.

Sjöar, a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Bladen vanl. äggrundt afånga, stund. n. runda: v. rotundifolius, ell. i rinnande vatten lancettlika, alltid med hjertlik bas.*

13 *P. crispus* L. bladen *halft omfattande*, *afångt* jemnbreda *vågiga finsågade*; nötl. med ett långt hornlikt spröt. 24 7. Fig. Fl.D.927. Reich.f.50, 51. H.N.f.8, n:o 68.

Sjöar, r. (Sk.—Uppl. Vestml. Ner. Dalsl. i sjön Kålungen. Boh. Kongelfs fästning. Hall. — N. vid Stavanger.) *Axen korta och fåblommiga; bladen tydligt sågade. Var. med tätt sittande blad, mellan hvilka stjelken är något zig-zag-böjd: v. sinuatus.*

(*P. coloratus, salicifol., ruf. \* nigr., gramin., nilens.*)

†† Bladen ganska smala, utdraget jemnbreda—hårfin.

\* Bladen fastade utan slida vid stjelken, fria från ledstiplerna.

a — Stjelken platt, bladlik; bladen strimmadt mångnerviga.

14 *P. zosterifolius* Schum. bladen smalt jemnbreda, spetsiga; axskäften jemntjocka, *dubb.* — *flere gånger längre än axen; dessa (vid fruktmogn.) cylindrisk, mång-(10—12-) blommiga; nötternas inre kant jemn.* 24 7. Fig. Fl.D.1865 och 2046. Reich.f.45. H.N.f.5, n:o 78.

Sjöar. (Sk.—Medelp. Vestml. Ner. Örebro; Löcknasjön i Lerbäck etc. Boh. — N. Christiania.) *Stjelken föga smalare än bladen; dessa en god linie breda, 4—7 l. långa, med 3—5 gröfre, och talrika finare, mellanligg. nerver; axen tumslång. — P. laticaule* Wg. *P. compressus* Fr.

15 *P. acutifolius* Link: bladen som hos föreg.; axskäften jemntjocka, *icke längre än axen; dessa äggformiga, få-(4—6-)blommiga; nötternas inre kant med en hög knöl nedtill.* 24 7. Fig. Fl.D.1747. Reich.f.44. H.N.f.5, n:o 79.

Sjöar, damm., vattengräv. r. (Sk. flerest. ÖG. mångenstäd. enl. Kindb. *Stockh.* i Klara sjö; Hillersjö. Uppl. sjön Hederviken. Ner. Örebro, flerest. norr och öst. om staden ymn. VG. Göteborg. Hall. Hasslöf. — N. vid Skien.) *Till blad och stjelk*

*ej olik föreg., men något spådare och med knappt  $\frac{1}{2}$  tum långa ax och axskäft. Nötterna med längre och mera krökt spröt.*

b — Stjelken obetydligt plattad, ell. trind; bladen få- (högst 5-) nerviga.

a — Axskäften uppåt tjockare.

- 16 *P. mucronatus* Schrad. stjelen något plattad; bladen smalt jemnbreda, trubbiga med kort udd, 5nerviga; axskäften något plattade, slutl. mycket längre än de cylindriska, glesl få-(4-6-)blommiga axen; nött. släta. 24 7. Fig. Fl.D.203. Reich.f.42.  
Vatten. (Sk. allm. Blek. Ronneby enl. Gosselm. ÖG.—Gestr. sjön Trösken; Gefle. Vestm. Vesteråstrakten. — N.?) Till örten lik följ. med ännu plattare stjelt; axen alltid smala,  $\frac{1}{2}$ —1 tum långa, vid blomn. n. af skäftens längd, sedan vanl. hälften kortare. — *P. pusillus*  $\beta$  major Fr. *P. Friesii* Rupr. *P. Oederi* Mey. och Beurl. *P. compressus* Ed.9, ett namn som väl måste bortläggas, då det aldrig torde kunna säkert utredas, hvilken art Linné afsett med detsamma.

$\beta$  — Axskäften jemntjocka.

- 17 *P. obtusifolius* MK. stjelen något plattadt trind; bladen smalt jemnbreda, trubbiga, 3-5nerviga; axskäften något plattade, slutl. icke längre än de n. ovala, till 6-8blomm. axen; nött. på ytan ojemna. 24 7. Fig. Fl.D.2107. H.N.f.5, n:o 80, 81. Sjöar, damm. (Sk.—Uppl. Uppsala; Ramsjön i Tibble enl. Lem. Ängml. Bjertrå, i Strinnefjärden. Dal. Vestm. vid Ranskär i Mälaren. Ner. Verm. Boh. — N. Drammen; i Romerige; i Asker: Ax. Bl.) Bladen nära en lin. breda, 5nerviga, de 2 nerverna närmast kanten ofta knappt märkbara. — *P. gramineus* Sm. *P. compressus* Wg.

- 18 *P. pusillus* L. stjelen trådläk, n. trind; bladen mycket smalt jemnbreda—n. trådsmla, uddspetsiga, 3-5nerviga; axskäften n. trinda, slutl. dubb.—flere gånger längre än de rundade ell. ovala, till 4-8blomm. axen; nött. släta. Fig. Fl.D.1451. Reich.f.38. H.N.f.12, n:o 76.

Vattenpöl. diken. (Sk.—Ängml. och Jeml. Lul. Lpm. nära Qvikkjokks kyrka: Ands. Boh. Öl. Gottl. — N. till Ost-Finnm.) Mycket spådare än de föreg.; bladen högst  $\frac{1}{2}$  lin. breda, stjelen n. tagelsmal; axen små, yngre mer aflånga men låta, vid fruktmogn. knappt större än arter. — Anm. *P. gracilis* Fr. med trind stjelt och trådsmla, en-nerviga blad, funnen af gammalt sällsynt i Sk., vid Stockh. och i Gestr., har på alla dessa ställen åter försvunnit.

- 19 *P. rutilus* Wolfg. stjelen styf, halftind; bladen styfva, n. upprätta, trådsmla syl- lika, 3nerviga; axskäften dubb. längre än de cylindriska, glesl 6-7blommiga axen; nött. släta. 24 7. Fig. Reich.f.40, 41. H.N.f.15, n:o 74.

Vatt. r. (ÖG. Linköping, vid Hunnebergstullen. Uppl. Fasterna sn, i Metsjön vid Len- nelsunds garveri.) Fin som föreg., men med mycket styfware och mer tätst. blad, hvilkas 2 sidonerver äro märkbart gröfre och vanl. belägna längre från kanten än hos pusill.; nött. små med rundad rygg och smal, n. spetsig bas.

\*\* Bladen med en stipeibärande slida omfattande stjelen. [Åxen med mycket långa skäft och långt åtskildja blomkransar.]

- 20 *P. zosteraceus* Fr. bladen jemnbreda ända till den i en kort udd sammändragna spets- sen, 5nerviga; de öfre och yngre mycket smalare och spetsade, 3-ell. en-nerviga; axen vanl. långt uppskjutande öfver bladen. 24 7, 8. Fig. Reich.f.33.

Hafvet, r. (Blek. Brömseback, nära utloppet: Gosselm. Smål. i Lofa skärgård; Gell- lerskulla i Vesterum. Södm. i sunden mell. Utön och närliggande öar; Stäket m. fl. st. Rosl. Norrtelge skärgård; Singön etc. Ängml. Hernösand: Arn.; vid Grönsvik och Eden i Nora sn. Gottl. Kyllgärdssåns utlopp vid Storugns i Lärbro.) Bladen en linie breda, med 3 gröfre nerver. Är sannolikt en form med årgamla blad af följ., som ofta får de gamla bladen lika breda; de yngre grenarnes äro alldeles lika dennes.

- 21 *P. pectinatus* L. bladen jemnbreda—tagelsmla, spetsade, meränd. en-nerviga; axen vanl. föga uppskjut. öfver bladen; nötterna släta, med rundadt trubbig, i torrt till- stånd kölad rygg. 24 7. —  $\beta$  *setaceus*: bladen n. hårfina. Fig. Fl.D.186 och 1746. Reich.f.30, 31. H.N.f.5, n:o 82.

Sjöar, dik. helst i salt vatt. (Sk.—Helsl. Ängml. Hernösand: Arn.; Nora och Själevad snr. Jemtl. Kallsjön i Åre sn; Sundsjön i Refsunds sn, m. fl. st. Vestml. i Engssund. VG. Barnesjön vid Vartofta, samt Aspösjön nära Sköfde: Nordst. Boh. Öl. Götll. — N. till Salten.) Äldre bladen ofta nog breda, 3nerviga; nött. mogna stora som mindre arter. Blommar ofvan vattnet. — *β var. scoparius* Wallr.

- 22 *P. marinus* L. bladen tagelsmala spetsiga, *en-nerviga*; axen vanl. mycket långt uppskjut. öfver bl.; nötterna som hos föreg., *hälften smärre, torra rynkiga*. 24 7. Fig. Fl.D.2106. Reich.f.27—29. H.N.f.3, n:o 65.

Renare vatt. särd. i hafvet. (Sk.—Helsl. Ängml. Nora och Själevad m. fl. snr. VB. Neder-Kalix skärg.: Reuterm. Boh. Otterö. Öl. Götll. Inuti landet i ÖG. Vettern och Motala ström. — N. till Ost-Finnm. Fjellsjöar på Dovre.) Kan svårigen med karakterer skiljas från föreg., ehuru till utseende och växtsätt alldeles olik denna. Är lika fin som dennes *β*, med nötter mindre än hampfrön, i vattnet släta, torra rynkiga. Blommar alltid under vattnet, så att den aldrig når ytan.

#### 438. RUPPIA Lin. Hårnate.

- 1 *R. spiralis* L. herb. ståndarknappar *aflånga*; allm. fruktskaftet mycket långt, vanl. *spiralformigt* hoprulladt; de enskilda skaften *många gånger* längre än de äggformiga, *föga sneda* nötterna. 24 7, 8. Fig. Sv.B.650, n:o 2. Fl.D.364. Reich.D.Fl.f.26. H.N.f.12, n:o 77.

Hafvet. (Sk.—Boh. Blek. Carlskrona-skären. Smål. Kalmar. ÖG. Djurö kanal; Jonberg; samt mell. Engelholm och Vindbåtsön enl. Kindb. Södm. Hummelsvik nära Nyköping; Dalarön; Ornöen etc.: Thed. Öl. Götll. — N.) Bladen hos alla arterna *borstlika, slidomfallande*. I djupare vatten *förlänger sig det allmänna fruktskaftet till ytan, men drager sig vid fruktmogningen spiralformigt tillsammans*. — *R. maritima* Ed.6, samt de flesta förf.

- 2 *R. rostellata* Koch: knapp. n. *runda*; allm. fruktskaftet *knappt* längre än de enskilda, *icke spiralformiga*; de enskilda fruktsk. *som hos föreg.*; nötterna vid hasen bukiga, tvärt sammandragna i en vanl. *mycket sned* spets. 24 7, 8. Fig. Sv.B.650, n:o 3. Reich.f.25. H.N.f.6, n:o 68.

Hafsvik. (Sk.—Gefte. Helsl. Hudiksvall, vid Gackerön. Hall. vid Särövik. VG. Göteborg. Boh. Uddevalla, i Byfjorden; Lysekil; Grebbestad; kring Strömstad. Öl. Götll. — N. till Trondhj.) Något mindre än föreg.; nött. *smalare*. — *R. maritima* L. herb.

- 3 *R. brachypus* Gay: knapp. elliptiskt *rundade*; allm. fruktskaftet *mycket kort*, icke spiralform.; de enskilda *inga* ell. *korta* [högst 4 gr nötens längd]; nött. äggformiga, *tvått sneda*. 24 7, 8. Fig. Sv.B.650, n:o 1. H.N.f.15, n:o 75.

Grunda hafsvik. r. (Sk. Malmö; Lomma; Landskrona enl. F. Aresch. Hall. Halmstad; Särö etc. Boh. söd. del. t. ex. Tjörn och Torö. VG. Göteborg. Blek. Kungshall. Sjuhallaviken etc. enl. Gosselm. ÖG. Axelsö i Gryt sn. Götll.) Nötterna, *större och med vida hårdare skal än hos föreg.*, äro vanl. *längre än deras skaf*.

#### 459. ZANNICHELLIA Lin. Hårserf.

- 1 *Z. major* Bönn. nötterna *oskaftade* ell. *kort skaftade*, med *ojemn rygg*; stiftet n. *af nötens längd*. ☉ 7. Fig. Sv.B.630, f.a. och f. Fl.D.67. Reich.D.Fl.f.24. H.N.f.15, n:o 76.

Vattengrop. (Sk. allm. vid både öst. och vest. kusten enl. F. Aresch. Blek. enl. Gosselm. Smål. Kalmar, i Malmfjärden; Lindö i Vesterum sn; Bjursund i Loftahammar enl. Scheutz. Hall. Halmstad. Öl. allm. Götll. Kapellhamnsvik; Slitehamn; Ljugarns hamn.) Dubb. *gröfre än följ. Bladen hos alla arterna småt jemnbreda—trådmala, kransställda, 3 i hvarje krans*. — *Z. palustris* L., trol. *äfvän innefallande följ.*

- 2 *Z. polycarpa* Nolte: nött. *oskaftade*, med mer och mindre *tandad rygg*; stiftet *kortare än halfta* nöten. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.630, f.i. Fl.D.2609. Reich.f.20, 23. H.N.f.6, n:o 69, och f.10, n:o 66.

Grundt vatt. vanl. i ell. nära hafvet. (Sk.—Ängml. Hernösand och Nora sn. VB. Neder-Kalix skärg. Hall. Öl. Götll. I sött vatten: VG. i Mellby sn. Vestml. Kungsör. Södm. Thorsbällatrakten. Uppl. vid Uppsala och Vassunda. — N. Porsgrund; Fredrikstad; Christiania; Bærum. Ost-Finnm. Elvenæs: Norm. och Th. Fr.)

Dubbelt snare än föreg. med smärre nöttler, kortare stift, stund. ej utgörande  $\frac{1}{2}$  af nöten. Var. krypande och rotslände; afven nöternas antal och landning varierar. — Anm. *Z. Rosenii* Wallm. fr. Gottl. torde blott vara en tillfällig form af denna ell. föreg., då den på de sista 30 åren icke synes hafva af någon blifvit återfunnen på de angifna lokalerna.

- 3 *Z. pedicellata* Fr. nött. i kort skafstad flock, sjelfva med tydliga skaft, hinnaktig tandad rygg; stiftet n. af nöten längd. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.2610. Reich.f.21. H. N.f.3, n:o 66.

Hafvet. (Blek.—Ångm. Hernösand: Arn.; Eden i Nora sn. Öl. Ottenby. Gottl. Visby och Kapellhamnsvik; Klintehamn. — N. Christiania.) Nött. större än hos föreg., utmärkt af sina leml. långa skaft och stift. — *Z. pedunculata* Reich. *Z. palustris*  $\beta$  *pedic.* Wg.

- 2 Flocken *Zosterææ*. Blir på platt kolf, inom hölster, bildadt af bladet. Fruktämne 1. Blomkalk 0.

#### 460. ZOSTERA Lin. Bändling.

- 1 *Z. marina* L. bladen tydligt stjernerviga, lika breda som det jemnbreda blomhölstret; dettas båda klaffar upptill tvärhuggna; nöterna tydl. strimmiga. 2 7. Fig. Sv.B. 186. Fl.D.15. Reich.D.Fl.f.4. H.N.f.15, n:o 83.

Hafvet, a. (Sk.—Södm. och Stockh.-skären. Hall. Boh. Öl. Gottl. — N. till Lofoden.) Bladen långa gräslika, omkr. 2 lin. breda.

- 2 *Z. angustifolia* Horn. bladen med otydl. sidonerver; slidklaffarne upptill rundade; för öfr. som föreg. 2 7. Fig. Fl.D.1501. Reich.f.3. H.N.f.6, n:o 70.

Hafvet. (Sk. Blek. Verkö. Smål. Kalmar m. fl. st. ÖG. Fredriksnäs i Gryt sn. Södm. Nyköpings-skären: C. Ind. Stockh.-skären. Hall. Boh. Öl. Gottl. — N. Christiania; Trondhj.: Lofoden; Ost-Finnm. Varanger; trol. utefter hela kusten.) Mindre och med n. hälften smalarä blad än föreg. — *Z. marina*  $\beta$  Fl.D.

- 3 *Z. minor* Nolte: bladen en-nerviga; hölstret slutl. bredare än bladet, n. lancettlikt; nött. n. släta. 2 7. Fig. Fl.D.2041. Reich.f.2. H.N.f.11, n:o 69.

Grundt hafsvatt. r. (Boh. vid Torön och andra holmar i söd. delen. Hall. Kongsbackaviken vid Tjölöholm enl. Lem.) Bladen säll. mer än fingerlånga,  $\frac{1}{2}$  linie breda. — *Z. nana* Roth enl. Koch, hvilket motsäges af Reich. *Z. Nollei* Horn. i Fl.D.

- 96 Fam. TYPHACEÆ Juss. Blir i cylindriskt ell. klotrundt ax. Kalk af flere fjäll ell. borst. Frukt nött, med hängande frö.

#### 461. TYPHA Lin. Kafveldun.

- 1 *T. latifolia* L. bladen bredt svärdlika, af stråets längd; han- och honaxet till närmade. 2 7. Fig. Sv.B.520. Fl.D.645.

Vatten. (Sk.—Helsl. Söderhamn, Stugsundet. VB. Neder-Kalix, i Småträsk. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. Christianiafjorden; Lier; Langesund etc.) 4—5 fot hög med tumsbreda platta blad; axen dubb. tjockare än hos följande.

- 2 *T. angustifolia* L. bladen smalt svärdlika, något rännformiga, af stråets längd; axen åtskiljda. 2 7. Fig. Sv.B.234. Fl.D.815.

Vatt. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Hall. Öl. Gottl. Lokrumemyr enl. G. v. Ced. — Södra N.) Hög som föreg.; bladen 2—3 lin. breda; afståndet mell. axen 1—2 tum, säll. mindre.

#### 462. SPARGANIUM Lin. Igelknopp.

† Bladen mot basen 3sidiga: *S. erectum* L.

- 1 *S. ramosum* Huds. bladen mot basen 3eggade; axfästet grenigt; grenarne med

- oskaftade bonax nedtill och talrika hanax i toppen. 24 7. Fig. Sv.B.464. Fl.D.1282. H.N.f.15, n:o 77, 78.
- Vattengrafvar. (Sk.—Ångml. Bjertrå. Dal. Verm. Boh. Öl. Göt. — N. till Stör-dalen i Trondhj. st.) *Gröfre än de följ.* — *S. erectum a L.*
- 2 *S. simplex* Huds. bladen mot basen 3kantiga; axfästet enkelt, med ensamma skaftade bonax nedtill, och 3—6 hanax i toppen; frukterna tvärt sammandragna till ett långt spröt. 24 7. — *β longissimum* Fr. bladen långt utdragna, flytande. Fig. Sv.B.342. Fl.D.932. H.N.f.15, n:o 79.
- Vatt. (Sk.—Ångml. VB. Kalix; Kengis. Pit. Lpm. i Svärdsfven. Jeml. Oviken. Boh. Öl. Göt. — N. till Trondhj. st. — *β* i djupare, strömmande vatten.) *S. erectum β L. S. erectum* Wg. — *β*, som i sin mest utvecklade form mycket er-inrar om *S. natans*, är tydligen en af lokalen beroende form, samt öfvergår enl. ex. fr. Vimmerby, meddelade af Dr Lund, utan gräns till *hufvudformen*.
- 3 *S. fluitans* Fr. bladen som hos föreg.; axfästet enkelt, nedtill med 1 ell. 2 skaftade, derofvan flere tät sittande oskaftade bonax, och vanl. ett enda hanax i toppen; frukt. jemnt afsmalnande till ett kort spröt. 24 7. Fig. Bot.Not.1852,t.1,f.3. H.N. f.15, n:r 80.
- Skogskärr. (Um. Lpm. Betsele. och VB. Skellefteå.—Smål. — N. nära Elstad i Gud-brandsdalen.) *Icke upprätt som de föreg., utan uppstigande, med stadig stjelk, breda, efter olika lokal, upprätta eller slaka och flytande blad.* — *S. glomeratum* Læst.
- †† Bladen ända till basen platta: *S. natans L.*
- \* Frukt. vanl. tydligt, ehuru kort skaftade, med utdraget syl-lik spröt.
- 4 *S. natans L.* bladen långt utdragna, gräslika flytande; axfästet vanl. något grenigt; honaxen åtskiljda oskaftade [utom de 1—2 nedersta]; hanaxen i toppen, talrika (4—12); frukt. *nerolösa, kortare* än sprötet. 24 7. Fig. Bot.Not.1852,t.1,f.1, A. H.N. f.13, n:o 76; f.16, n:o 67, var.
- Sjöar och djupa kärr. (Sk. sjöar i nor. del. Blek. vid Fuhrs gästgg.; Elmtasjön: Goss. —Hels. Ångml. Skog sn, Storsjön etc. Ner. Verm. Dalsl. Hall. — N. till Ost-Finnm.) *Bladen i djupare vatten ofta flere oft långa, 1—2 lin. breda.* — Var. [H.N.f.16] *med enkelt axfäste och misslages då ofta för följ.* — *S. natans* Lin. Fl. Lapp. och Herb. samt Fr. S.V.Sc. *S. longifolium* Turcz. enl. Fr. *S. Friesii* Beurl.
- 5 *S. affine* Schnitzl. bladen utdragna flytande; axfästet enkelt; honaxen 2—4, åtskiljda, de 1 ell. 2 nedersta skaftade, de öfre oskaftade; hanax vanl. ensamt; frukt. starkt nerviga, kortare än sprötet. 24 7. Fig. Bot.Not.1852,t.1,f.1, B. Reich.f.925. H.N. f.14, n:o 78.
- Sjöar och rinn. vatt. (Torn. Lpm.—Smål. Verm. Dalsl. Boh. Oroust. Hall. Knä-red: Theor. — N. till Ost-Finnm.) *Lägre växt än föreg., med något kortare och bredare blad. Har enl. Læst. stundom talrika hanax.* — *S. boreale* Læst.?
- 6 *S. oligocarpon* Ångstr. rotbl. utdragna, vanl. flytande; stjelkbl. korta, med bredare, hinnkantad bas; axfästet enkelt; honaxen som hos föreg.; hanax 1—2; frukt. mer och mindre nerviga, längre än sprötet. 24 7. Fig. H.N.f.15, n:o 81.
- \* *vaginatum* Larss.: bladslid. långa; frukt. tydligare nerviga och skaftade.
- Sanka st. r. (Um. Lpm. Lycksele; Betsele. Jeml. mell. gästgg. Grimnäs och Bräcke, vid Refsundssjön. VB. Piteå sn enl. G. v. Ced. Ångml. Hernösand. Hels. Hem-stanäs, vid Hemsjön. Wistr. Uppl. mell. Elfskarleby och Vessland. Vestml. Nora sn. Skärmafhyet. Verm. Finnskoga, nära Långlön. VG. Djursåtra i Vårsås sn. — N. Ost-Finnm.—Bergens. st. och Gudbrandsdalen. Christiania, i Nordmarken: Ax. Bl. — \* Um. Lpm. bland a. Verm. Liljendal i bergsl.) 1—2 qv. hög, spenslig, med en mängd felslående frukter i hvarje ax.
- \*\* Frukt. oskaftade, utan ell. med kort spröt.

- 7 *S. minimum* Fr. bladen dels kortare upprätta, dels längre och flyt.; axfästet enkelt, med de 2—3 nedre honaxen skaftade, de öfre åtskiljda oskaftade, hanax ensamt i toppen; frukt. *trubbiga*, med kort ell. intet spröt. 24 7, 8. Fig. Bot.N.1852,t.1,f.2. Fl.D.260. Reich.f.749. H.N.f.12, n:o 78.

Sjöstränd, grundt vatt. a. (Sk.—Pit. Lpm. och VB. Pajala sn. Boh. Strömstad. Öl. Gottl. Klinte. — N. till Bergen st.) Ligger jemte n:o 4 under namnet *S. natans* i Linnés Herb.

- 8 *S. hyperboreum* Læst. bladen som hos föreg.; axfästet enkelt; nedersta honaxet vanl. långt skafadt, de öfre 2—3 oskafade, *tållsittande*; hanaxet ensamt; frukt. *trubbigt 3kantiga, trubbiga med omärkl. spröt.* 24. 7. Fig. H.N.f.15, n:o 82.

Vattengrop. och kärr i fjelltr. (Torn. Lpm. Karesuando, Jukkasjärvi etc. — Herjed. och Angml. Helsl. nära Kårböle i Färila. — N. Ost-Finm. kring Varangersfjorden; Tanasfjord: Norm. Vest-Finm. Maasöe och Mageröe enl. Th. Fr.; Alten: Norm. Nordl. Salten i Junkersdalen. Dovre flerstädes.) *Späd och spenslig, men var. likasom föreg. efter lokalens beskaffenhet med smalare och längre eller kortare och breda blad.* — *S. natans*  $\beta$  *submuticum* Hn. ed.5. *S. angustifolium* Michx. enl. Fr.

- 97 Fam. CYPERACEÆ Juss. Blr i ax af ensamma tegellagda skärmfjäll. Pistill bar, ell. omgifven af inre fjäll, borst, hår ell. dyl. Frukt nöt, med upprätt frö.

1 Flocken **Cyperæ.** Blr 2könade. Skärmfjäll 2sidigt tegellagda.

463. CYPÉRUS Lin. Cypergräs.

- 1 *C. fuscus* L. sträet 3sidigt; svepet mest 3bladigt, längre än axsamlingen; axen gytttrade i ett 3—6grenigt knippe, lancettlika, af spetsiga fjäll. ☉ 6. Fig. Fl.D.179. Reich. D.Fl.f.667. Anderss. Cyp.t.1, f.2. H.N.f.12, n:o 79.

Kärr, r. (Sk. Krageholm; Roslätt; Balsberg vid Råbelöfssjön. Gottl. Vamlingbo i Thorsbrya, vid vägen mell. Bonsarfe och Roflins; af gammalt åfven funnen vid vägen från kyrkan till Svalståde.) *Fingerhögt halvgräs med svartbruna ax.*

464. SCHOENUS Lin. Knapp-agh.

- 1 *S. nigricans* L. axet äggformigt, af 5—10 småax; kalkborst 0, ell. någon enda kort och otydlig. 24. 6, 7. Fig. Sv.B.515. Fl.D.2281. Ands. Cyp.t.1, f.4. H.N.f.4, n:o 89.

Kärr, r. (Öl. Högby sn flerstädes; i en bäck mell. byarne Ekelunda och Fröslunda. Gottl. i Aghkärren. — N. mellan Svinesund och Sponvigen.) *Bladen 1—2, nående öfver halfva strdet; axet tjockt, n. svart.* — *Streblidia* Beurl.

- 2 *S. ferrugineus* L. axet aflångt, af 2—5 småax; kalkborst flere, längre än nöten. 24. 6, 7. Fig. Sv.B.569. Fl.D.1503. Ands.t.1, f.3. H.N.f.1, n:o 72.

Kärräng, r. (VB. och Jeml.—Smål. Vimmerby; Scheutz. Sk. Hall. söd. del.: Theor. Gottl. Öl. — N. Drammen; Börsvolden och Blili på Toten; Kimerud på Modum.) *Bladen mycket kortare än strdet; axet svartbrunt.* — *Streblidia* Link. *Chato-spora* Reich.

2 Flocken **Scirpæ.** Blr 2könade. Skärmfjäll på alla sidor tegellagda.

465. CLADIUM Patr. Br. Agh.

- 1 *C. Mariscus* R. Br. bladen kölade, i kanten och på ryggkolen taggiga; knippet dubbelt sammansatt af gytttrade ax. 24. 7, 8. Fig. Sv.B.275. Fl.D.1202. Ands. Cyp.t.1, f.5. H.N.f.4, n:o 88.

Kärr, r. (Sk. vid Lefrasjön; Vejlesjön enl. F. Aresch.: Skartofta; Arrie. Blek. Asarum, i Aborragöl nära Ekeberg; Bastasjö. Smål. Paulström i Karlstorps sn; Göberg i Linderås sn. ÖG. Omberg, Dagsmossen; Svanhals sn, Kramphemmet: Kindb.; Vinnerstad\* sn, vid Staffantorpssjön; Bersbo grufva i Värna sn enl. Scheutz. VG. Uricehamn, samt i sjöar nedom Billingen. Boh. Oroust, vid Krokvattnet i Tegneby. Öl. norra delen. Gottl. ymnig.) *C. germanicum* Schrad. *Schoenus* Mar. L.

466. RHYNCHOSPORA M. Vahl. Myr-agh.

- 1 *R. alba* Vahl: bladen smala kölade; axknippet föga kortare än svepet; kalkborst. ä-

minstone 9, af nödens längd, sträflva af nedåt vända taggar. 2 6. Fig. Fl.D.320. Ands.Cyp.t.1,f.6.

Kärr. (Sk.—Um. Lpm. Boh. Öl. Gottl. — N. till söd. del. af Trondhj. st.) *Azen* yngre hvita, föräldrade något brunaktiga. — *Schoenus L.*

2 *R. fusca* RS. bladen smala rånsformiga; knippet mycket kortare än svepet; kalkborst. högst 5—6, n. dubbelt längre än nöten, sträflva af uppåt vända taggar. 2 6. Fig. Fl.D.1562. Ands.t.1,f.7. H.N.f.14, n:o 80.

Kärr. r. (Sk.—Gestr. Oslättfors. Helsl. Forssa och Rogsta snr: Wistr. Dal. Boh. i Foss sn; Uddevalla; Kynnesfjell. Hall. Gottl. — N. Christiansand; Arendel; Laurvig; Rennisöe etc. upp till Nordfjord.) *Azen* bruna. — *Schoenus L.* *R. alba* β Vahl.

#### 467. SCIRPUS Lin. Saf.

† Strået enkelt, med flere gytttrade ax.

\* Axen bildande ett sammansatt, 2sidigt ax: *Blysmus* Panz.

1 *S. compressus* Pers. bladen platta, något kölade; småaxen 8, eller flere, mångblommiga; kalkborsten sträflva af nedvända taggar, längre än nöterna; dessa plattade, bredt ovala, med sprötlrik spets. 2 6. Fig. Fl.D.1622. Ands.Cyp.t.1,f.9.

Fukt. gräsväxta st. (Sk.—Gestr. och Dal. Boh. Öl. Gottl. — N. högst sälls., Näsön vid Christiania.) *Azen* ljusbruna. — *S. Caricis* Retz. *Schoenus compressus* och *Carex uliginosa* L. [Jemf. *Carex chordorrh.*]

2 *S. rufus* Schrad. bladen trinda, ofvanpå kölade; småax. 3—8, fåblomm.; borst uppåt sträflva, kortare än nött., stund. felsande; nött. aflånga spetsade. 2 6, 7. Fig. Fl.D. 1504. Ands.t.1,f.8. H.N.f.12, n:o 80 [v. *balticus* Fr.].

Hafsstr. r. (Sk.—Uppl. Ångskär i Hollnäs sn. Boh. söd. Koster; Henån och Svane-sund på Orust m. fl. st. Hall. nor. Brandshult i Slap sn. Öl. Gottl. — N. hela kusten till Ost-Finnm.) *Azet* rödbrunt. — *Schoenus* Huds.

\*\* Axen talrika, knippvis gytttrade.

a — Strået ända nedifrån 3kantigt, bladigt.

3 *S. silvaticus* L. strået upprätt, trubbigt 3kantigt; knippet mycket sammansatt, af ax gytttrade i skaftade hufvud; axfjällen trubbiga, n. utan udd. 2 7. Fig. Fl.D.307. Reich.f.731. Ands.t.1,f.10.

Våta äng. diken. (Sk.—Ångml. VB. Umeå sn. Dal. Verml. Boh. — N. till Trondhj.; Världsören.) *Alnshög*, med stort, utbredt blomknippe; bladen n. fingerbreda. — *Nemocharis* Beurl.

4 *S. maritimus* L. strået 3sidigt, hvasskantigt; axen äggformiga i gytttringar, än med, än utan gemensamma skaft; axfjällen 3uddiga. 2 7. Fig. Sv.B.240. Fl.D.937 och 2702, var. Ands.t.1,f.11. H.N.f.16, n:o 68.

Hafsstr. i vattnet. (Sk.—Medelp. Sundsvall. Boh. Öl. Gottl. — N. till Stördalen i Trondhj:s stift.) *Alnshög*, med krypande, meränd. knölig rotstock. Var. *encl.* Nordst. i Sk. på uttorkade st. vid Malmö hamn med ett enda ax: *monostachys* Lge.

b — Strået åt. nedtill trindt, med ofullkoml. bladämnen vid basen.

5 *S. carinatus* Sm. strået nedtill trindt, upptill trubbigt 3kantigt; axen i gytttringar, med och utan skaft; axfjällen urnupna med trubbadel flikar och udd af ryggnerven. 2 7, 8. Fig. Fl.D.1743. Reich.f.724. Ands.t.1,f.14.

Stränd. r. (Gottl. Visby, vid gamla hamnen.) Strået 2—4 fot högt med 2 kullriga och en platt sida från dess midt uppåt; märken 2. — *S. Duvalii* Hop.

6 *S. lacustris* L. strået överallt trindt; axen som hos föreg.; axfjällen urnupna med spetsiga flikar och ryggnerven utlöpande i en udd. 2 7. — β *glauus*: spåtare och af mer blågrön färg, oftare med 2 märken. Fig. Sv.B.150. Fl.D.1142; β 1922. Ands.t.1,f.12, 13. H.N.f.2, n:o 65.

Sjöstr. i vatt. a., β helst i hafsvatt. (Sk.—Lpl. — N. till söd. delen af Trondhj:s stift.) 4—6 fot hög ell. högre; β vanl. mindre, med smärre axgytttringar, af mörkare färg: *S. glaucus* Sm. *S. Tabernaemontani* Gmel.

\*\*\* Axen få, högst 3, med i spetsen hela fjäll: *Isolepis* Br.

- 7 *S. setaceus* L. strået tagelsmalt, trindt, med slidor och outvecklade blad vid basen; axen 1—3, gytttrade utan skaft, tät under stråets topp; nötterna på längden strimliga.  $\odot$  6, 7. Fig. Fl.D.311. Reich.f.711, 712. Andst.1.f.17. H.N.f.1, n:o 73.
- Stränd. r. (Sk. Hall. VG. Göteborg; Kinna sn, mell. Salgutsered och Berg. Boh. Kallfö, Oroust m. fl. öar. Blek. vid Hörby. Smål. Jönköping, vid Husqvarna-åns utlopp samt Munk- ell. Lillsjön. ÖG. vid Motalaån, mellan Boren och Dufvedal. — N. nära Stavanger.) 1—4 tum hög, med linielånga ax, som riglas åt sidan af strået, hvors fortsättning oöfvan axet egentl. är ett af skärmladen. *S. supinus* i Swartz' Sum.Veg.Sc. lärar väl vara en större form häraf.

†† Strået grenigt, med ensamt ax i grenarnes topp: *Heleogiton* Link.

- 8 *S. fluitans* L. strået slakt, nedliggande eller flytande, bladigt; axen 3—7blommiga; märken 2. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1082. Reich.f.705. Andst.1.f.18. H.N.f.2, n:o 70.
- Vatten. i åar etc. r. (Hall. Vessige vid Lia och Hukared. Smål. Femsjö, Unnaryd m. fl. socknar i Vestbo härad; Götheryd i ån vid kyrkan. ÖG. Grebo sn. Verml. Långseruds, sn.)

††† Strået enkelt, med ett enkelt ax i toppen: *Limnochloa* Reich.

- 9 *S. pauciflorus* Lightf. strået ogenomskinligt bart, med tydlig, tvärhuggen och bladlös slida vid basen; axet äggformigt, med de yttre fjällen större, nående öfver halfva axet; märken 3. 2 6, 7. Fig. Sv.B.563,f.2. Fl.D.1862. Andst.1.f.21. H.N.f.2, n:o 66.
- Fukt. st. stränd. (Sk.—Ångml. och Jemtl. VB. nor. del. vid Seivitz gästgg. Boh. Öl. Gottl. — N. till Finnm.) 2—6 tum hög. — *S. Baethryon* Ehrh.
- \*10 *S. parvulus* Röm. strået något genomskinligt, visande längdnervar och tvärvägg; slidan mycket tunn och otydlig; axet aflångt äggformigt, med de yttre fjällen kortare än halfva axet; märken 3. 2. Fig. Fl.D.2161. Reich.f.706. Andst.1.f.20. H.N.f.10, n:o 68.
- Fukt. st. stränd. r. (N. Holmestrand, på stranden af en liten sjö. — Fordom äfven sunnen i Sv. i Verml. vid Sundbro i Fryksdalen.) 1—1½ tum hög, tufvad af talrika strån, med och utan ax; strået något groft i jemf. med storleken och det linielånga, 3—5blommiga axet. — *S. nanus* Wallr.

#### 468. HELECHARIS R. Br. Knapp-säf.

† Märken 2; nöten linsformigt plattad.

- 1 *H. palustris* Br. rotstocken lång krypande; strået vanl. trindt; axet aflångt, af ägg-rundt lancettlika fjäll, de nedersta 1—2 kortare och könlösa; nötensbihang äggformigt. 2 5, 6. —  $\beta$  *gracilis* Fr. strået smalt, plattadt, blågrått. Fig. Sv.B.257. Fl.D.273. Andst.1.2.f.22. H.N.f.2, n:o 68.
- \* *uniglumis* Link: nedersta axfjället tomt, omfattande hela axets bas. Fig. Andst.1.2, f.23. H.N.f.2, n:o 69.
- Våta st. stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.. — \* Sk.—Ångml. Verml. Gottl. — N. till Ost-Finm.) Var. från ½—2 fot hög;  $\alpha$  har vanl. de 2 nedersta axfjällen motsatta och i förening omfattande axets bas. \* vanl. mindre och med svartbrunt ax. — *Scirpus* L.

†† Märken 3; nöten 3kantig ell. trind.

- 2 *H. multicaulis* Lindl. roten tufvad, trådig; rotstocken kort; strået trindt; axet aflångt, med nedersta fjället tomt; nöten 3sidig med bihangets bas nedplattad öfver nötenstopp. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1923. Andst.1.2.f.24. H.N.f.2, n:o 67.
- Sjöstr. r. (Sk. vid Ousby-sjön. Hall. vid Tommareds sjö i Knäred: Theor.; Lia, samt i ån ned mot Vessige; Gunnarp sn enl. Scheutz. Boh. vid Rammsjön norr om Jonsered. Blek. Niklastorps göl enl. Gosselm. Smål. vid Bastesjön i Femsjö sn; Sand-sjö i Konga här. ymn.; Vilstad, vid Arnäsholm; Vexjö. Uppl. Rinkeby i Sponga sn.) Något lik föreg.; stråen i vattnet upprätta, men på det torra båglikl. uppblöjda, bildande fasta tufvor. — *Scirpus* Sm.
- 3 *H. acicularis* Br. rotstocken lång krypande; strået nålfint, kantigt; axet äggformigt



ell. aflångt, med de nedre fjällen större; nöten *n. trind* med upphöjda ränder och äggformigt bihang. ☉ 5—8. Fig. Fl.D.287. Andst.2,f.26. H.N.f.15, n:o 90.  
Stränd. a. (Sk.—VB. nor. del. och Um. Lpm. — N. till Trondhj. st. Ost-Finnm.)  
1—3 tum hög, n. hårfin.

469. TRICHOPHORUM Pers. Mossatof, Ramme (1).

- 1 *T. caespitosum* Hn. strået trindt, eldt; axet äggformigt; kalkborsten längre än nöten, men kortare än axet. 2 6, 7. Fig. Sv.B.563,f.1. Fl.D.1861. Ands.Cyp.t.1,f.19. H.N.f.15, n:o 89.

Kärr. (Lpl.—Sk. och Hall. söd. del. Gotl. Mest i de vestra prov. — N. från Ost-Finnm.—sydl. N.) Axet yngre *n. aflångt*, moget ofta klotrundt. — *Scirpus L. Limnochloa Reich.* — Anm. En form ell. *ari.* som synes bestämd dels med föreg., dels med *Sc. pauciflorus*, är af Norm. i ofullständ. ex. funnen i Finnm. vid Börselvans ullopp och af honom benämnd *T. emergens*.

- 2 *T. alpinum* Pers. strået 3kantigt, stråft; axet aflångt; kalkborsten hårlig, slutt. flere gånger längre än axet. 2 6, 7. Fig. Sv.B.426,f.2. Fl.D.620. Andst.2,f.33.

Kärräng. (Lpl.—Sk. och Hall. mell. del. Öl. i Borgaträsk. Gotl. i Fardumeträsk; Thorsborg etc. — N. Ost-Finnm.—sydl. N.) Axet med de fullväxta håren tillhopa *n. tums långt*, liknande ett spädd *Eriophorum*, till hvilket släkte denna art föres af Linné och andra förf. — *Limnochloa Drej.*

470. ERIOPHORUM Lin. Ängsull.

† Axen flere.

- 1 *E. angustifolium* Roth: bladen jemnbreda kölade, meränd. längre än stråets mellanleder; axskaften glatta. 2 5, 6. —  $\beta$  *triquetrum*: bladen korta, *n. till basen 3-kantiga*. Fig. Sv.B.490,f.1. Fl.D.1442. Ands.Cyp.t.2,f.27.

Kärräng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Var. med smalare och bredare blad, flere och färre, ända till ett ax.  $\beta$  mycket lik *E. gracile*, men skiljbar af de brunsfjälliga axen på alldeles glatta skaf. Är ofta tvåbyggare. — *E. polystachion a L.Fl.Su. E. polyst. Wg. En storväxt form är  $\gamma$  E. latifol. Sm.*

- 2 *E. latifolium* Hop. bladen plattade, smalt lancetlika, de öfre kortare än stråets mellanleder; axskaften sträfvade. 2 6. Fig. Sv.B.180. Fl.D.1381. Andst.2,f.28.

Kärräng. (Sk.—Jemtl. och Ängml. Öl. Gotl. — N. till Ost-Finnm.: Norm.) Högre och mera rent grön växt, med kortare och bredare blad än föreg. — *E. polyst.  $\beta$  L. E. polyst. Sv.B. E. pubescens Sm.*

- 3 *E. gracile* Koch: bladen 3kantiga, kortare än stråets mellanleder; axskaften något sträfvade. 2 6. Fig. Sv.B.490,f.2. Fl.D.1441. Andst.2,f.29. H.N.f.14, n:o 79.

Kärr. (Sk. Blek. Valjö: Vesterl.; Dannemark: Goss.—Lpl. — N. sällsynt; Christiania-trakten; Stördalen vid Kirkeby.) Mycket späddare än de föreg. med smärre och mer grönaktiga ax. — *E. triquetrum Hoppe.*

†† Axet alltid ensamt.

\* Roten trädig; stråen tufvade.

- 4 *E. vaginatum* L. stråets öfre slidor upplåsta; axet äggformigt, af hinnaktigt genomskinnliga sylspetsade, *n. likformiga fjäll*; ståndarknapparne jemnbreda; ullen hvit. 2 4, 5. Fig. Sv.B.781. Fl.D.236. Andst.2,f.30.

Skogskärr. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) Axet vanl. tums långt af svartgrå fjäll; endast slidorna vid stråets bas bära blad.

- 5 *E. callithrix* Cham. slidorna knappt upplåsta; axet rundadt, af ogenomskinniga trubbad *n. likformiga fjäll*; knapp. jemnbreda; ullen svagt rödaktig. 2 5, 6. Fig. H.N.f.15, n:o 87.

Kärr i fjelltr. (Lul. Lpm. Nammats vid Qvikkjokk; flerst. på sluttn. af Walli: Andst. Pil. Lpm. nedanför fjellet Walliwe, vid Laiselfven. Jemtl. vid Tännforsen. Herjed. Midtskogen och vid Funnedalssjön enl. G. v. Ced. VB. Kengis; Edelfors vid Lul. elf. Ängml. Fjellsjö och Helgum snr enl. Lessl.; Långsele sn, vid Ledinge gästg. — N. Ost-Finnm.,  $\frac{1}{2}$  mil n. om Mortensnæs. Vest-Finnm. Tromsö: Th. Fr.; Maab-elven, flerst. vid Istinderne: Norm.) Axet mycket mindre än hos föreg., med

svartaktiga fjäll och qvastlikt vidgad, tvärhuggen ull; strån vanl. sårre tillsammans än hos föreg. — *E. vaginatum* \* *opacum* Björnstr.

\*\* Krypande rotstock, med spridda strån och nyskott.

- 6 *E. russeolum* Fr. slid. icke uppblåsta; axet *af långt*, af endast i kanten *genomskinl.*, kortspetsade fjäll; knapp. jemnbreda; ullen vanl. *rödaktig*. 24 5, 6. Fig. Fl.D. suppl. t. 8. Andst. 2, f. 32.

Kärr i fjelltr. (Torn. Lpm. Karesuando, Kedkesuando, Muonioniska, Wittangi. Tarra-koski etc. Lul. Lpm. mell. sjön Puolaure och Kerkeware; Kaissats vid Wirihauere. VB. Kengis. — N. Finnm. mest i de inre delarne: Norm.; äfven vid Alten, i Eibydalen.) Axet likt *E. vaginati*, men mindre, mer *af långt* och med *rödaktig* ell. brandgul ull, i hvilket sednare fall det är *E. rufescens* Andst. Var. i Finnm. äfven med snöhvitt ull enl. Th. Fr., och är då var. *candidum* Norm. — *E. Chamissonis* Mey.

- 7 *E. Scheuchzeri* Hop. slid. som hos föreg.; axet n. *klotrundt*, med *ogenomskinl.*, *spetsade* fjäll, de nedersta 1—3 *mycket större* skärmlika; knapp. *af långa*; ullen vanl. *hvit*. 24 5, 6. Fig. Sv.B. 426. f. 1. Fl.D. 1502. Andst. 2, f. 31. H.N.f. 3, n:o 68.

Fjelltr. (Lpt.—Dal. Angml. Fjellsjö och Ledinge sur enl. Lem.; Liden: Arn.; Tåsjöberget; Ramsle sn. Helsl. Arbrå sn. Verml. vid Klarellvens öfre lopp. — N. Ost-Finm.—nor. del af Christiansands st.) Axet *yngre något äggformigt*, *svartbrunt*; ullen *hvit*, ell. *svagt rödaktig*: *E. medium* Andst. — *E. capitatum* Host. (*E. angustifol.*)

### 3 Flocken Cariceæ. Blir skiljddönade.

#### 471. CAREX Lin. Starr.

I. *Heterostachyæ*: Axen flere, enkönade: hanax i toppen, honax nedom dessa \*).

† Märken 3 [undant. *C. palud.* och *saxat.*]: *Tristigmaticæ*.

\* Hanaxen meränd. flere än ett; fruktgömmen glatta.

a — Fruktg. uppräta ell. utstående, äggformiga ell. ovala.

- 1 *C. riparia* Curt. strået 3sidigt; bladen kölade; skärmen breda, bladlika; honaxen *skafade*, cylindriska; axfjällen sylspetsade, *meränd. längre* än det *äggformiga* kortspetsade *lättnerviga* fruktgömmet; dettas mynning gaffel-lik. 24 6. Fig. Fl.D. 1118. Andst. Cyp. t. 8, f. 110. H.N.f. 9, n:o 78.

\* *gracilescens* Hn. bladen n. hälften smalare [2 lin.]; fruktg. smalt ägggrunda, spetsade till ett smalt spröt med djupt 2spetsad mynning, längre än fjällen.

Stränd. r. (Sk.—Gestr. Kubbo, i Råfmuren. Vestml. Björkskog sn. Ner. Boh. Öl. — N. Christiania, Östensöe och Brändsrudskjærn. — \* Vestml. Kungsåra sn, i en mosse tillhörig Kihlsta under Ångsö.) *Gröfst af alla nordens starrarter. C. nutans* Fr. Mant. 1 är en form med korta, men tjocka ax. — *C. crassa* Ehrh.

- 2 *C. paludosa* Good. strået skarpt 3sidigt; bladen och skärm. som hos föreg.; honax cylindr., de nedre kort skafade; axfjällen sylspetsade, n. kortare än det ovala, kort sprötspetsiga, *grofnerviga* fruktg.; mynn. 2tandad. 24 6. — *β spadicea*: axfjällen långt och strått borstuddiga; märken oftare 2. Fig. Fl.D. 1767. Andst. t. 8, f. 109. H. N.f. 9, n:o 77. *β* Reich. f. 651.

Väta st. r. (Sk.—Uppl. och Vestml. Medelp. Torp sn, vid Glipsjön. Ner. Brändåsbäcken i Hardemo: O. G. Blomb. VG. Boh. Hall. Askim. Öl. Gottl. Fleringe. — N. Christiania, Östensöe etc. Kläcken på Ringerige.) 3—4 fot hög, blågrön, lik en stor *C. acuta*; bladslidorna upprispa i spindelväfslika trådar, då de dragas från strået. — *C. acutiformis* Ehrh. *β C. Kochiana* Sturm. *C. spadicea* Roth.

- 3 *C. vesicaria* L. strået, bl. och skärm. som hos föreg.; honax. cylindr., de nedre skafade; axfjällen *spetsiga*, kortare än det uppblåst äggformiga, småningom till ett kort

\*) Hos några, i synnerhet afd. \*\*\*\*\*, får topp- ell. hanaxet honblir och sedan fruktgömmen i toppen; hos andra kunna honaxen variera med hanblir i spetsen.

spröt *afsmalnande glemnerviga* fruktgömmet; mynn. 2spetsad. 24 6. Fig. Sv.B.216. Fl.D.647. Andst.8.f.107. H.N.f.14, n:o 81.

\* *lacustris* Th. Fr. strået högre och spensligare; bl. platta; honaxen n. oskaftade, upprätta; fruktg. med längre och smalt spröt.

Våta st. a. (Sk.—Lpl. — N. — \* N. Ost-Finnm. i sjön Colmejavre. Christiania, Bogstadvand.) *Stort bredbladigt starrgräs; fruktgömmena gröna, slutt, ljusbruna, i fjelltr. ännu mörkare. C. stenolepis* Less. är en form med smalare, svartbruna fjäll. *C. Friesii* Bl. Norg. Fl., ell. *C. ves.* \* *dientia* H.N.f.15, n:o 84, synes svårt kunna skiljas från \* *lacustr.*

b — Fruktg. utsperrade, n. klotrunda, alltid starkt uppblåsta.

4 *C. lævirostris* Fr. strået upptill stråkantigt; bladen kölade; skärm. och honax. som hos föreg.; axfjällen lancelllika; fruktgömm. tvärt hopdragna till ett uldraget spröt med djupt gaffel-lik mynning, nerviga. 24 6. Fig. Fl.D.suppl.t.36. Andst.8.f.108. H.N.f.6, n:o 74.

Våta st. stränd. r. (Lul. Lpm. Storbacken: C. Ind. V.B. Hedenfors: Ned. Luleå sn, på Sävastön i Lul. elf. 1½ mil från Luleå, samt vid Storsand; Skellefteå, på Brännängen enl. Lem. — N. Dovre, vid Kallvillån; Christiania vid bäcken i Mærradalen m. fl. st.; Asker; Holmestrand; Laurvig.) *Bland de största starrgräs, med ½ tum breda, n. platta blad, tjocka honax; fruktgömm. stora och tunna, blåslika, n. döljande de smala fjällen, som ofta hafva ett par fina borst i spetsen. — C. ampull. v. robusta* Weinm. *C. bullata v. lævirostris* Fr. Mant. 2. *C. rhyncho-physa* Mey.

5 *C. ampullacea* Good. strået trubbkantigt, slätt; bladen rännformiga; skärm. och honaxen som hos föreg.; axfjällen syl-lika [hos γ och \* bredare]; fruktg. tvärt hopdragna till spröt med gaffel-lik mynn., nerviga. 24 6. — β *obesa*: axen mycket stora; fruktg. större, mer uppblåsta, med kort spröt. — γ *borealis*: axen aflånga, oskaftade; fjäll n. ågrunda, kortare än det kortsprötade fruktg. Fig. Fl.D.2248. Andst.8.f.106. H.N.f.10, n:o 73.

\* *rotundata* Wg. skärmen smala; axen oskaft. aflånga, upprätta; fjällen breda trubbiga, kortare än det n. klotrundt uppblåsta kortspetsade fruktg. Fig. Sv.B.755. Andst.8, f.105. H.N.f.3, n:o 76.

Stränd. \* fjelltr. (Sk.—Lpl. — N. — β Verml. — γ Lpl.—Gestr. — \* Lpl.—Herjed. — N.) *Skiljd från C. vesic. med det släta strået, de rännformiga bladen och det till spröt tvärt hopdragna fruktgömmet; närmare slägt med föreg., hvartill β är en öfvergång. — γ C. rotund. v. inferalpina* Beurl. — \* är till alla delar spädare än hufvudf. och habituellt olik denna, men sammanflyter dermed utan all gräns genom γ.

6 *C. saxatilis* L. strået 3sidigt, strävt; bladen platta kölade; skärmen bladlika; hanaxet meränd. ensamt; honaxen äggformiga—aflånga, upprätta, det nedersta skafadt; fruktg. kortspetsade, otydligt nerviga, ofäst med 2 märken. 24 6. 7. — β *Grahami*: fruktg. mer aflånga, med djupare klufven mynning. Fig. Andst.8.f.104. H.N.f.3, n:o 74 och f.11, n:o 76.

Fjelltr. på fukt. st. (Lpl.—Herjed. — N. — β Lul. Lpm.) *Skiljd från föreg.: \* med de platta och bredare bladen. Var. högst sällan med långskaftade honax. — C. saxatilis* Lin. herb. *C. pulla* Good. *C. fusca* Schk. *C. vesicaria v. alpigena* Fr. i H.N.f.8, n:o 71, tillhör tydligt denna art, hvilken Prof. Andersson anser som en fjellform af *C. vesicaria*.

\*\* Hanaxen flere; fruktgömmen småludna.

a — Honaxen upprätta; skärmen n. utan slidor.

7 *C. evoluta* Hn. strået hvasst 3kantigt; bladen platta kölade; skärmen platta bladlika; honaxen något lancettlikt cylindriska; fruktgömmen äggformiga spetsade, med gaffel-lik mynning, småludna. 24 6. 7. Fig. Fl.D.suppl.t.30. Andst.8.f.102. H.N.f.6, n:o 75. Sanka sjöstr. r. (Smål. vid Gråfsjön i Tryserum. ÖG. Gusum. Stockholm vid Brännkyrkesjön; Flaten, Ösby- och Ekebyträsk; ford. vid Gångsätra på Lidingön. Vestml. i samma mosse som *C. riparia* \*. Fordom äfven i Sk.) *Mycket grofre än följ. med ett par linier breda blad.*

8 *C. filiformis* L. strået n. *trindt*; bladen och skärmen *rännformiga*, trådlika; fruktg. *långt ludna*; för öfr. som föreg. 24 6, 7. Fig. Fl.D.1344. Andst.8,f.103. H.N.f.9, n:o 79.

Stränd. kärräng. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. Varanger.) *Alnshögt, trådmallt, tufvadt starrgräs, med mer än tumslånga bruna ax.* — *C. lasiocarpa* Ehrh.

b — Honaxen uppräta; de nedre skärmen med långa slidor.

9 *C. hirta* L. strået trubbkantigt; bladen och skärmen platta, kölade; honaxen lancettl. cylindriska, *långt åtskiljda*, skaftade; fruktg. äggformiga spetsade, med *djupt* klufven 2spetsad mynning, *öfverallt* håriga. 24 6. —  $\beta$  *hirtiformis*: blad och bladslidor glatta, endast fruktgömmena håriga. Fig. Fl.D.425. Andst.8,f.101. H.N.f.13, n:o 81.  $\beta$  Fl.D.1711.

Ler- och sandjord. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. Bärön i Venern. Boh. Öl. Goutl. — N. i Christianss. och Aggerbus st. —  $\beta$  Sk. Malmö etc. Blek. Lyckeby slott. ÖG. flerst. enl. Kindb. Goutl. Fleringe sn. Lunderhage; Visborgs kungsladug.: G. v. Ced.) Var. från  $\frac{1}{2}$  till  $1\frac{1}{2}$  fot hög, med långt krypande rotstock och ofta håriga blad, särdeles slidan.

\*10 *C. orthostachya* Mey. strået, bl. och skärm. som hos föreg.; honaxen som hos föreg., *närmade*; fruktg. äggform., 3kantiga. nerviga spetsade med *gaffel-lik* mynning, *långa* nerverna *glest* finhåriga. 24 6, 7. Fig. H.N.f.13, n:o 80.

Fjelltr. r. (Norge, enl. Fr., funnen och meddelad utan angifvet växtställe af N. Lund, som enl. Blytt möjl. sunnit den i trakten af Drammen.) *Något lik föreg., men gröfre, med omärkligt håriga fruktgömmen, och glatta blad med ludna slidor, långa skärm.*

c — Honaxen lutande, slutt. hängande.

11 *C. glauca* Scop. strået trubbkantigt; bladen platta; skärmen bladlika, det nedersta stundom med lång slida; honaxen cylindriska skaftade; fruktg. omv. äggformiga trubbiga med hel mynning, i kanten, särd. upptill, kort styfåriga. 24 6. Fig. Fl.D.1051. Andst.7,f.79. H.N.f.9, n:o 76.

Fukt. äng. (Sk.—Gestr. Ängml. Nyland enl. Lem. Um. Lpm. Vestml. Ner. Dalsl. Boh. Öl. Goutl. — N. till Nordl.) *Fotshögt, ljus blågrönt, något bredbladigt starrgräs; med slutt. svartbruna, 1—2 tum långa ax, som stundom blifva greniga.* — *C. flacca* Schreb. *C. recurva* Fl.D.

\*\*\* Hanaxet ensamt, af blott hanbl. [undant. *C. fulig.*]; honaxen slutt. lutande ell. hängande; skärm med gröna slidor. [Fruktg. glatta.]

a — Skärmen bladlika, öfverstående axen, med mycket korta slidor.

12 *C. pseudocyperus* L. honaxen *låtsillande*, cylindriska tätblommiga, hängande; axfjällen syl-lika; fruktg. *utsperrade* ell. *nedböjda*, äggformiga, *starkt* nerviga och *långsprödade*, med 2spetsad mynning. 24 6, 7. Fig. Fl.D.1117. Andst.8,f.111. H.N.f.11, n:o 75.

Stränd. kärr. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. Boh. Öl. Hornsviken. Goutl. — N. i Christianstrakten.) *Stort, bredbladigt starrgräs, ofta med 2 tum långa gröna ax, taggiga af de utsperrade fruktg:s sprö. Har någongång honbl. i hanaxets topp: v. acrogyna.*

13 *C. pallescens* L. honaxen *åtskiljda*, aflånga, tätblommiga, slutt. lutande; axfjällen spetsiga; fruktg. *uppräta*, omv. äggformiga, *nervlösa*, *trubbiga* med hel mynning. 24 6. Fig. Fl.D.1050. Andst.7,f.78. H.N.f.12, n:o 84 [var. undul.].

Äng. a. (Sk.—Um. Lpm. Lul. Lpm. Njuonjes enl. Andst. — N. till Ost-Finnm.) *Fotshög; bladen finhåriga; axen gröna. slutt. brunaktiga. C. undulata* Kunze, med skärmens nedre del på tvären vågig, är en vanlig, helt och hållet tillfallig form.

b — Skärmen bladlika, icke öfverstående axen, med långa slidor.

14 *C. silvatica* Huds. honaxen långt skaftade och åtskiljda, jemnbreda, *glest* mångblommiga, lutande; axfjällen *spetsade*, af fruktg:s längd; dessa 3kantiga, ovala nervlösa,

med långt spröt och 2spetsad mynning. 2 6. Fig. Fl.D.404. Andst.8,f.100. H.N. f.7, n:o 81.

Löfskog. (Sk.—Ög. Ner. flerst. i Tysslinge sn. VG. Boh. Christinedal. Hall. Hallandsås: Theor. Öl. Goull. — N. Aggerh., Christianss. och Bergens st.) *Fotshög och deröfver; honaxen mer än tumslånga, med 12—dubb. så många blr, gröna, med tunna hvitaktiga fjäll.* — C. Drymeja Ehrh.

- 15 C. capillaris L. honaxen som hos föreg., gles 6—10blommiga; axfjällen trubbiga, kortare än fruktg.; dessa otydligt 3kantiga, ovala nervlösa, med syl-lik spets, otydligt 2flikig mynning. 2 6. Fig. Fl.D.168 och 2374. Andst.7,f.77.

Fukt. äng. (Sk.—Lpl. — N. fr. nor. del. af Christianss. st. till Ost-Finnm.) *Yngre en half fot högt, spensligt starrgräs, med ½ tum långa gröna ax och hvitaktiga fjäll.*

- 16 C. laxa Wg. honaxen som hos föreg., n. lancettlika, tätblommiga; axfjällen trubbiga, af fruktg. längd; dessa aflånga, svagt nerviga, trubbiga med framstående, n. hel mynning. 2 6, 7. Fig. Sv.B.718. Fl.D.suppl.107. Wg.Fl.L.15,f.1. Andst.6,f.69. H.N.f.3, n:o 73.

Sanka kärr i fjelltr. r. (Torn. Lpm. Karesuando; Wittangi; Jukkasjärvi. Lul. Lpm. Jokkmokk. Jemll. Oviken och Berg. Herjed. Sveg sn, nedanför gästg. Nilsvallen. — N. Finnm. Sjuosjåvre: Norm.) ½—1 fot högt och spensligt starrgräs, med mycket smala blad; nära slägt med C. limosa, men utmärkt af de ½ tum långa skärm-slidorerna och det båglikn nedböjda strået.

c — Skärmen korta, syl-lik, med långa slidor.

- 17 C. ustulata Wg. skärmen säll. längre än sina slidor; honaxen närsittande, n. ovala, tätblommiga, hängande; axfj. spetsiga, af fruktg. längd; dessa aflånga spetsiga plattade, med urnupen mynning. 2 7. Fig. Sv.B.717. Fl.D.1590. Andst.6,f.68. H.N.f.5, n:o 88.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) *Axen ½ tum långa; fjällen och fruktg. svartbruna, de sednare med ljusare kanter. Hanaxet säll. med honbl. — C. atrata Lin. Herb.*

- 18 C. fuliginosa Hop. skärmen och honaxen som hos föreg., de sednare mer lancettlika, det nedersta ofta långt fränskildt; axfjäll. trubbade, kortare än fruktg.; dessa n. lancettlika, 3kantiga, med lång sprötluk, i kanten stråfsågad spets, 2tandad mynning; hanaxet med honbl. i toppen. 2 7. Fig. Fl.D.2373. Andst.7,f.90. H. N.f.5, n:o 89.

Fjellv. r. (Torn. Lpm. Kåbdåvanka; Kassepakte. — N. Finnm. Tsatsa; Tromsdelstind; Salangdalen, Sör-Reisen och Maalselv flerst.: Norm. Dovre, på Finnhöe, Knudshöe, Gjederyggen, Blåhöe etc.) *Något lik föreg., men med smalare och ljusare ax, af hvilka det öfversta n. alltid är sambyggare. Stråden hårdt tufsade, med ulböjda blad, n. alla vid roten. — C. frigida Wg.Fl.Su. C. misandra Br.*

\*\*\*\* Hanax ensamt af blott hanbl.; honax slutl. hängande; skärm. med mycket korta, brun- ell. svartkantade slidor. [Frukt glatta.]

- 19 C. limosa L. strået 3sidigt, stråft; bladen gråaktigt gröna, smala och kölade, knappt dubb. bredare än strået; skärmen syl-lik, med mycket korta slidor; honaxen n. lancettlika tätblommiga; axfjällen något smalare än det ovala trubbiga plattade fruktgömmet. 2 6, 7. Fig. Fl.D.646. Andst.7,f.73. H.N.f.10, n:o 71.

Sanka kärr. (Sk.—Lpl. Goull. — N.) *Omkr. fotshög, med ½—¾ linie breda blad, bruna axfjäll med blåhvita fruktgömmen. Får icke sällan hanbl. i spetsen af honaxen.*

- 20 C. irrigua Sm. bladen rent gröna, platta, 2—3 gånger bredare än strået; skärmen bladlika, med slid. som hos föreg.; fruktg. mer konvexa, meränd. kortare än fjällens utdragna spets; för öfr. som föreg. 2 6. Fig. Wg.Fl.L.15. Fl.D.suppl.106. Andst.7,f.72. H.N.f.2, n:o 71.

Kärr och våta äng. (Sk. Blek. nor. del.—Lpl. — N.) *Vanl. mer lågväxt och stadig än föreg.; axfjällen vanl. mer svartbruna och längre än fruktg. Har ofta honbl. i hanaxets spets.*

- 21 *C. rariflora* Sm. strålet trubbkantigt, glatt; bladen smala, platta; skärmen korta, n. syl-rika, med slidor 3 gånger så långa som vida; honaxen aflånga, gles (åblommiga; axfjållen trubbiga, stora, insvepande det ovala trubbiga fruktg. 2 6, 7. Fig. E.B. 2516. Andst. 6, f. 70. H.N.f. 7, n:o 80.

\* *stygia* Fr. honaxen mer åtblommiga; fjållen n. svarta.

Fjell-kårr och sump. hafstr. (Torn. Lpm. Karesuando. Lul. Lpm. Wiribaure etc. Pit. Lpm. vid sjån Waimokjaure: H. Widm.; Tjiddjakk. Um. Lpm. Gitsfjellen. Jeml. Snasahågen, och i Lisselåfå-dalen. Herjed. Helagsfjellen; Axhågen; Ramansberget etc. — N. Finnm. Nordl. Trondhjem, Stuedal; Dovre; Lom; Åserald i Nedenås amt. — \* N. Finnm.) *Quartershåg med smårre ax ån fõreg. vanl. af 6 blr med svartbruna, stund. brungula fjåll.* — *C. limosa*  $\beta$  Wg. \* *C. stygia* Fr. år mer ån fõlshåg.

\*\*\*\*\* Hanax ensamt, af blott hanblr; honax uppråta; fruktgõmmen glatta. [Skårmen med slidor.]

$\alpha$  — Fruktg: mynning tydligt 2spetsad; honax [vanl. långt] åtskiljda.

$\alpha$  — Strålet trubbkantigt, glatt; axfjållen med stråf, ofta borstlik udd.

- \*22 *C. binervis* Sm. honaxen cylindriska, de nedre med ur slidan utskjutande skaft; axfjållen trubbede, med udd; fruktgõmmen åggformiga, afsmålnande mot mynningen, med 2 grofva nerver långa kanten. 2 6. Fig. Reich.f. 621. Andst. 8, f. 98. H.N. f. 5, n:o 87.

Ljunghed. r. (N. fråån sydv. del. af Christianss. st. långa kusten genom Bergens st. teml. allm. upp till Molde.) 2—3 fot høg, med vål tumslånga mårkbruna ax; fruktg. lancelllikt afsmålnande, mårka, med 2 grånaktiga nerver nåra kanten.

- 23 *C. punctata* Gaud. honaxen cylindr. aflånga, med något utskjutande skaft; axfjållen afsmålnande i udd; fruktg. ovala, med kort språllik, glatt spets, fnt punkterade, utan tydliga nerver. 2 6. Fig. Fl.D.suppl.t.108. Andst. 8, f. 97. H.N.f. 7, n:o 77.

Ång. r. (Boh. Nordkoster, nåra Lotsstugan, funnen 1861 af S. F. Ekman enl. Leffl. — N. Arendal, Sandvigen.) 7—10 tum høg, med tumslånga gråna ax, mycket glånsande fruktgõm., som knappt visa spår till nerver.

- 24 *C. distans* L. honaxen aflånga, med inneslutna ell. fõga utskjutande skaft; axfjållen trubbede med udd; fruktg. brådt ovala, med kort stråft sprått, tyd. mångnerviga. 2 6. Fig. Fl.D.2434. Andst. 8, f. 96. H.N.f. 7, n:o 76.

Gråsvåxta hafstr. r. (Sk.—Uppl. Sõderån vid Kafveråske m. fl. st. Boh. Gottl. — N. sõdra del. af Aggerhus och Christianss. st.) Axen långt skiljda, vanl. ånda ned till stråets bas, med gråna fruktgõmmen och ljusbruna fjåll, samt grån, i en stråf udd ullåpande ryggnerv, hvarmed denna art skiljes fråån de 2 fõlj.

$\beta$  — Strålet 3sidigt, upptill vanl. stråft; axfjållen utan udd.

- 25 *C. Hornschuchiana* Hop. skårmen smala, det nedersta icke nående hanaxet; honaxen ovala—aflånga, med utskjut. skaft; axfjållen spetsiga [utan udd]; fruktg. ovala och n. trinda, med rakt, stråft sprått, tyd. nerviga. 2 6. Fig. Fl.D.1049 och 2249. Andst. 8, f. 95. H.N.f. 6, n:o 73.

Fukt. ång. (Sk. Blek. Berntorp; Sissesjõ: Goss.—Gestr. Jeml. Fråsån. Vestml. Ner. Verm. Dalsl. Boh. Ål. Gottl. — N. vest. delen upp till Trondhj.) 1—2 fot høg, ofta med ett ax ned mot stråets midt, men inga vid basen; fruktg. gulgråna glånsande. — *C. speirostachya* Sm. *C. fulva*  $\beta$  Wg.Fl.Su. ed.2.

- 26 *C. fulva* Good. skårmen platta, breda, det nedersta nående till ell. õfver hanaxet; honaxen åggrundt eller ovalt aflånga, med n. inneslutna skaft; fõr õfrigt som fõreg. 2 6. Fig. Fl.D.1768 och 2435. Reich.f. 620. Andst. 8, f. 94. H.N.f. 5, n:o 86.

Fukt. ång. r. (Sk.—Gestr. Jeml. Østersund och Fråsån, nåra Storsjån. Ner. VG. Boh. Ål. Gottl. — N. till Trondhj.) Lik fõreg., men tyd. skiljd med n. dubb. bredare blad och skårn, mindre åtskiljda, till toppen nårmade ax och mer gulaktig fõrg. Fruktg. vanl. uppblåsta och lått hoptryckta, med feldående nõt, hvarfõr denna art torde bõra anses som en abortierande form af fõreg.

b — Fruktg. som i afd. a—; honax. närsittande.

α — Skärmen mycket långa, bladlika.

- 27 *C. extensa* Good. bladen och skärmen *hoprulladt rännformiga*, de sednare med korta slidor; honaxen kort aflånga. med inneslutna skaft; axfjällen *trubbiga med kort add*; fruktg. *ovala*, med sprötlilik spets. 2 6. Fig. Fl.D.1709. Andst.7.f.91. H.N. f.3, n:o 72.

Hafsstr. r. (Sk. Valjö; Landskrona enl. F. Aresch. Blek. Saxaviken.—Uppl. Ängskär i Holmås sn. *Helsl. fleret.*: C. O. Berg. Öl. Borgholm: G. v. Ced.; på ön Norman. Goull.) 1—1½ fot högt, *tufvadt starrgräs*, med *smala blad och skärm*, som *vanl. dro krökta och mycket längre än den korta axsamlingen*.

- 28 *C. flava* L. bladen och skärmen *platta*, kölade; honaxen *ovala*, med inneslutna skaft; axfjällen *trubbiga*; fruktg. *omv. äggformiga*, med *syl-lik, nedböjdt* spröt. 2 6. — β *lepidocarpa*: strået *vanl. något strått*; honax och fruktg. *smärre*; hanaxet *meränd. skaftadt*. Fig. Fl.D.1047. H.N.f.13, n:o 82. Reich.f.654; β 653. Andst.7.f.93. H.N. f.10, n:o 69.

Kärräng. a. (Sk.—Lpl. Öl. — N. till Ost-Finm.) *Gulgrönt starrgräs med vanl. fotshögt, stund. blott 3—4 tum högt strå, skull. n. gula ax, af hvilka hanaxet vanl. har intet ell. kort skaft, men hos β ½—1 tum långt, något som dock varierar. Så väl denna som följ. art har en var. acrogyna med honbl. i hanaxets topp.* — β *C. lepidocarpa* Tausch.

- 29 *C. Oederi* Ehrh. bladen och skärmen *platta*, ell. med inböjda kanter; honax. *rundade—aflånga*, med inneslutna skaft; axf. *trubbiga*; fruktg. *utsperrade, omv. äggformiga*, med *kort sprötlilik, rak* spets. 2 6. — β *oedocarpa* Andst. honaxen *något åtskiljda*; fruktg. med tydligare spröt; hanaxet *långt skaftadt*. Fig. Fl.D.371. Andst.7.f.92. H.N.f.5, n:o 85; β f.13, n:o 83.

Hafsstr. och kärr. (Sk.—V.B. och Lul. Lpm. Boh. Öl. Goull. — N. till Finm. — β Sk. Gladsaxhallar enl. Leml.; Söfvestad m. fl. st. enl. F. Ar. Hall. Knäred enl. Theor. Boh. Foss sn: Leml. Rosl. vid Rånäs. Öl. Kastlösa: G. v. Ced. Goull. Blåse i Fleringe sn. — N. till Trondhj. st.) *Vanl. lågväxt, men stundom hög som föreg., ehuru med smärre ax, stund. föga större än en ärt, skull. n. gula; hanaxet meränd. utan märkligt skaft.* — *C. divisa* Fl.D. *C. flava* var. *Beurl.*

β — Skärmen mycket korta, syl-lika.

- 30 *C. pedata* Wg. bladen *trådlika*; skärmen n. utan slidor; honax. *kortskaftade, gles 3—6blommiga*; axfjällen *rundade, hinnkantade*; fruktg. n. *klotrunda* med spröt. 2 6. 7. Fig. Sv.B.684. Wg.Fl.Lt.14. Andst.7.f.89. H.N.f.5, n:o 84.

Fjellr. r. (Torn. Lpm. på fjellet Opisäwa. Lul. Lpm. Wirihære, Unna Toki, Kaisats etc. Pil. Lpm. Akarishjell. Jemtl. Tälgestensberget enl. Leml. Herjed. sydost om Helagsfjellen. — N. Finm. Salten. Trondhj. på Dalvolafjellet; Stuedalen på Knalarne vid Lövdén.) 1—3 tum hög, med 2—3 lin. långa n. *jembreda, uppröta ax af lätt affallande fjäll och fruktig.* — Anm. *C. pedata* L. synes af beskr. i Sp.Pl. tillhöra *C. globul.*, ehuru *synon. till en del antyder C. ornithopoda.*

c — Fruktg:s mynning hel ell. snedt urnupen.

- 31 *C. panicea* L. strået *trubbkantigt, glatt, jemte bladen blågrönt*; skärmen *platta och korta*, med *långa slidor*; honaxen *åtskiljda, gles mångblomm.*, med *utskjutande skaft*; fruktg. *upplåsta n. klotrunda* ell. något elliptiska, med *kort, utböjd, snedskuren*, men *hel* spets. 2 6. — β *sublivida*: blad och skärm *dubb. smalare*, de sednare 2—3 gr. längre än axskafet; ax och fruktg. *halften smärre*. Fig. Fl.D.261. Andst.7.f.76. H.N.f.9, n:o 75.

Fukt. äng. a. (Sk.—Lpl. — N. — β Sk. vid Helgeå enl. F. Ar. Södm. Öst. Vingåker. Stockh. i Orhemsviken. — N. Christiania.) *Något blåaktigt, fotshögt starrgräs, med rundadt ell. elliptiskt äggformiga fruktgömmen, utan märkl. spets.* — β *C. pelia* O. F. Lang. *C. Langii* Steud. och Bl. Norg. Fl.

- 32 *C. vaginata* Tausch: strået och bladen *rent gröna*; fruktg. *äggformiga, otydligt 3-kantiga*, med *något utdraget och utböjdt, snedt urnupet* spröt; i öfr. som föreg. 2 6. Fig. Fl.D.suppl.27. Andst.7.f.75. H.N.f.7, n:o 78; f.10, n:o 70; f.11, n:o 73 [var.].

Fukt. skogsmark. (Lpl.—Sk. nor. del. — N.) *Lik föreg., men med längre och spädare strå, något bredare och längre blad, mer spetsadt och kantigt fruktg., som*

*stund. har ett teml. långt, uddt krökt spröt: C. curvirostra* ed.3. — *C. sparsiflora* Fr. *C. panicea*  $\beta$  *sparsifl.* Wg.

- \*33 *C. stylosa* C. A. Mey. strået och bladen som hos föreg.; skärmen platta, det nedersta mycket långt, med mycket korta, bruna slidor; honaxen något närsitt., tillblommiga, aflånga, med utskjutande skaft; fruktg. n. skaftade, 3kantigt ovala, punkterade, med mycket kort och sned, n. hel spets. 24 7. Fig.

Hälsstr. r. (N. Nordl. vid Saltensfjord nedom Bodø kyrka.) Ungefär fotslåg, habituell lik *C. glauca*, men skiljd med örtens färg, de kortare och upprätt azen på kortare skaft, glatta fruktg. — *C. nigritella* Drej.?

- 34 *C. livida* Wg. strået 3sidigt, upptill strått, jemte de smala bladen gröngrått; skärmen smala, med tydliga, stund. långa slidor; honaxen något närsitt., jernbreda ell. aflånga, med utskjut. skaft; fruktg. aflånga, på båda sidor plattadt konvexa, trubbiga, med rundade släta kanter och hel mynning. 24 6, 7. Fig. Fl.D. suppl. 34. Ands. t. 7, f. 74. H.N.f. 7, n:o 79.

Dyga kärr, r. (Lpl.—Smål. Vexjö. — N. Christiania—Alten i Finn.) Skiljd från *C. panicea* med sin starkt ljusgrå färg, hvormed den på långt håll urskiljes i kärren, de smala bladen och plattare, n. hvita fruktgömmena.  
(*C. Buxbaumii*.)

\*\*\*\*\* Hanax ensamt, af blott hanbl; fruktgömmen småludna.

a — Honaxen tjocka; skärmen n. utan slidor.

$\alpha$  — Skärmen [åtm. det nedersta] smalt bladlika [gröna].

- 35 *C. tomentosa* L. honaxen något närsittande, vanl. kort skaftade, cylindriskt aflånga; axfjällen spetsiga, kortare än fruktg.; dessa omv. äggformiga — n. klotrunda, trubbiga ulliga. 24 5. Fig. Fl.D. suppl. 109. Ands. t. 7, f. 80. H.N.f. 4, n:o 90.

Ång. r. (Smål. Ilingetorp i Thorsås sn: Stud. P. Peterson enl. Ekstr. Öl. Gottl.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot högt, spensligt starrgräs; axen stund. n. cylindriska, vanligen kortare än skärmen; fruktg. hvittulliga.

- 36 *C. globularis* L. honaxen åtskiljda, oskaftade äggformiga; axfjällen trubbad, kortare än fruktg.; dessa äggformiga spetsiga ludna. 24 6. Fig. Fl.D. 1404. Ands. t. 7, f. 81. H.N.f. 3, n:o 71.

Fukt. och tulfvig skogsmark. (Lpl.—Gestr. Vestml. Ner. nor. och vest. del. Verm. Dalst. Lästviksdyfveln i Steneby sn; norra Onsön i Eds sn enl. Lem. VG. Hofva sn: Reuterm. Smål. Skareda-moen i Lommaryd sn. — N. Ost-Finn. Molde, samt Gudbrandsdalen. Rommerige etc. ned till Christiania.)  $1\frac{1}{2}$  fot högt, spensligt och mjukt starrgräs, strået vid basen högt uddt med rödbruna fjäll; bladen mycket smala; nedersta skärmbudet alltid längre än sitt ax, vanligen flere gånger så långt, de öfre syl-lika, ofta hinnaktiga. — *C. tomentosa* Fl.D.

- 37 *C. pilulifera* L. honaxen något närsittande, oskaftade klotrunda; axfjällen uddspetsiga. icke kortare än fruktg.; dessa klotrunda med spröt, finludna. 24 6. Fig. Fl.D. 1048. Ands. t. 7, f. 82. H.N.f. 12, n:o 83.

Stenbackar. (Sk.—Medelp. Jeml. Oviken. Herjed. Öl. Gottl. — N. till söd. Finn. : Norm.) Strået uppböjdt med teml. breda platta blad; de öfre skärmen vanl. mycket små syl-lika och hinnaktiga; honax af ärters storlek. — *C. Oederi* Retz. *C. filiformis* Fl.D.

$\beta$  — Alla skärmen hinnaktiga [färgade].

- 38 *C. montana* L. honaxen närsittande, äggformiga; skärmen syl-lika, med å ömse sidor vidgad, hinnaktig bas; axfj. trubbiga med udd, kortare än fruktg.; dessa från den smalare basen omv. äggformiga, spetsiga 3kantiga ludna. 24 5. Fig. Fl.D. 1769. Ands. t. 7, f. 85. H.N.f. 6, n:o 72.

Lundar, r. (Sk.—Uppl. och Vestml. Dal. vid Avestad; Garpenberg sn flerst. Verm. Rudsherget vid Carlstad. Boh. Gottl.) Qvartershögt, mjukt starrgräs, med svartbruna glänsande fjäll vid basen af strået; axen svart. — *C. collina* Willd.

- 39 *C. præcox* Jacq. honaxen något närsittande, kort skaftade aflånga; skärmen syl-lika, meränd. med korta slidor; axfjällen spetsiga, af det nästan klotrunda, något spetsiga ludna fruktgömmets längd. 24 5. Fig. Fl.D. 1527. Ands. t. 7, f. 84. H.N.f. 11, n:o 72.

Hartman, Skandinavien Flora (10:de uppl.).



Backar. (Sk.—Gestr. *Hels.* Tuna sn. Wistr. *Herjed. Dal. Boh.* Strömstad. *Hall. Öl. Gottl.* — N. i södra delen.) Skärmslid. och axfjällen grönaktigt ljusbruna.

- 40 *C. ericetorum* Poll. honaxen närsittande, oskaftade, aflångt rundade, med fjäll-lika eller något sylspetsade skärm, n. utan slidor; axfjällen rundadt trubbiga, hinnkantade, af det trinda, omv. äggformiga ludna fruktgömmets längd. 2 5. —  $\beta$  membranacea: mjukare gräs, med mer aflånga, mindre trubbiga, helbräddade axfjäll. Fig. Fl.D.1765. Andst.7.f.83. Reich.f.636;  $\beta$  637. H.N.f.7, n:o 75.

Back. a. (Sk.—*Hels.* Ångml. Junsele sn. och Jeml. Näs sn. *Öl. Gottl.* — N. till Trondhj. —  $\beta$  i fjelltrakter.) Mörkbruna ax,  $\sigma$ axel n. klubblikt; skärmen med mycket korta, stund. omärkliga, svartröda slidor vid basen; axfjällen vanligen fint hårkantade. — *C. ciliata* Willd.  $\beta$  *C. membranacea* Hoppe.

b — Honaxen utdragna, mycket smala; skärmen med tyd. slidor.

- 41 *C. pediformis* Mey. stråen från en krypande rotstock, vid basen bladiga; skärmslid. med ett syl-likt bladämne; honaxen 2—3, långt åtskiljda, jemnbreda mångblommiga, med skaft dubbelt längre än slidorna, det öfversta knappt öfverstående det långskaftade hanaxet; axfj. uddspetsiga, n. af frukt:s längd; dessa omv. äggformiga med kort spröt, finludna. 2 5. Fig. Fl.D.suppl.35. Andst.7.f.86. H.N.f.6, n:o 71.

Bergstrakt. r. (Jeml. Östersund, vid Björnmyran; Frösön och Åbs; Liths sn, ymn. — N. Christiania flerst. l. ex. Fröen, Ladugårdsöe, Mærradalen, Krogklefven, Ringeboe.) Fotskög vid frömgöringen; nära slägt med följ., men tyd. skiljd af det nedtill bladiga strået, de mer åtskiljda honaxen och de mindre tvärhuggna axfjällen.

- 42 *C. digitata* L. stråen vid basen omgifna af bladlösa slidor; skärmslid. utan bladämne; honaxen något närsittande, jemnbreda, glesl mångblommiga, med skaft längre än slidorna, öfverstående det oskaftade hanaxet; axfj. tvärhuggna, af frukt:s längd; dessa omv. äggformiga 3kantiga spetsiga finhåriga. 2 6. —  $\beta$  pallens Frist. hela växten blekgrön; axen mer kortskaftade. Fig. Fl.D.1466. Andst.7.f.88. H.N.f.11, n:o 71;  $\beta$  f.16, n:o 69.

Skuggiga back. (Sk.—Um. Lpm. Boh. *Öl. Gottl.* — N. till Nordl. —  $\beta$  Ångml. Gransjö gästg. Medelp. Selånger. Jeml. Frösön, Oviken och Lith. *Herjed.* på Ulfberget.)  $\sigma$ axen tumslånga mörka, 7—10blommiga; stråets bas klädd med bruna bladslidor.

- 43 *C. ornithopoda* Willd. honaxen närsittande, med inneslutna skaft, fåblommiga; axfj. spetsade, kortare än fruktig; för öfr. som föreg. 2 5. Fig. Fl.D.1405. Andst.7.f.87. H.N.f.3, n:o 70.

Fukt. äng. vid bergsrött. r. (Lpl. Ångml. Jeml. *Herjed. Dal.* Osmundsberget. Verm. Ner. ÖG. Smål. Jönköping. *Öl. Tveta* och Högby. *Gottl.* allm. — N. Nordl. ned till nor. del af Christianss. st.) Axen af ljus färg, en knapp half tum långa, 3—6blommiga; stråslidorna n. gröna, med ett kort, borslikt bladämne. — *C. digitata*  $\beta$  Wg. *Gottl. Fl. C. pedata* All.

\*\*\*\*\* Hanaxet ensamt, meränd. med honblir i toppen.

- 44 *C. Buxbaumii* Wg. axen n. oskaftade, något åtskiljda, upprätta, aflånga—omv. äggformiga; axfjällen uddspetsiga, af fruktig:s längd; dessa 3kantigt ovala trubbiga nerviga, fint stråprickiga. 2 6. —  $\beta$  heterostachya: toppaxet af blott hanblir, ell. med honblir vid basen. —  $\gamma$  macrostachya: axen cylindriska, tumslånga, det nedersta vanl. skaftadt; toppaxet af n. blott honblir. Fig. Fl.D.1406. Andst.6.f.65. H.N.f.8, n:o 79.

Våta äng. r. (Lpl.—Sk. Boh. Krokholmen. *Öl. Gottl.* — N. Ost-Finnm.—Christiania. —  $\beta$  i fjelltr. —  $\gamma$  Blek. Berntorp. Boh. Sydoster. VG. Göteborgstrakten; Kinnekulle. Ner. Örebro; Hökerkulla etc. Södm. Vallby sn. Trol. den i hela söd. Sv. allmännare formen af *C. Buxb.*) 1—2 fot hög, med upptill vanl. stråst strå, smala blad, korta och tjocka ax. Det hos  $\gamma$  långa cylindr. toppaxet, som fullkoml. liknar sidoaxen, ger denna form ett från de nordligare betydl. afrikande utseende. — *C. canescens* Lin. herb. [trol. genom misstag].

- 45 *C. atrata* L. axen skaftade, närsittande, lancetlika, meränd. lutande; axfj. spetsiga, af fruktig:s längd; dessa ovala trubbiga med kort spets, nervlösa fint stråf-

- prickiga. 24 6, 7. — *β aterrima*: strået mycket stråft; fruktgömm. till större delen svart. Fig. Sv.B.754. Fl.D.158. Andst.6.f.67. H.N.f.3, n:o 75. *β Reich.f.591*.
- Fjellv. (Lpl.—Herjed.—N.) Fotshögt bredbladigt starrgräs, med något stora i toppen sittande svarisfälliga ax, slutt. af tyngden lutande. Var. med glatt ell. upptill stråft strå, samt med smalare strå och blad, uppräta ax, närmande sig till *C. Vahlil*: *C. atrata* *γ rectiuscula* Ed.4.
- 46 *C. nigra* All. axen med inga ell. korta skaft, gylltrade i toppen, ovala; axfj. kortare än fruktg.; dessa omv. äggformiga, rundadt trubbiga, med kort spröt; för öfr. som föreg. 24 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.104. Reich.f.590. Andst.2.f.39. H.N.f.14, n:o 83.
- Fjellv. r. (Lpl.: Læst. enl. Fr. Jemtl. Åreskutan.—N. Dovre.) *Det Jemtl. ex., som utg. eger, öfverensstämmer till alla delar fullkoml. med Schweitz. och Tyrol. ex., samt är fingerhögt [andra enl. Beurl. mer än quartershöga], likt en förkrumpt form af föreg., dock skiljbar af de upptill bredare, mycket mer trubbiga fruktg., som på nämnda ex. äro helt och hållet svarta; strået icke stråft som hos föreg.*
- 47 *C. Vahlil* Schk. axen som hos föreg., klotrunda, ell. något aflånga; axfj. spetsade, mycket kortare än fruktg.; dessa ovala med spets, fint stråfprickiga, nervlösa. 24 6. Fig. Fl.D.403. Andst.6.f.66. H.N.f.3, n:o 78.
- Fjelltr. (Lpl.—Dal.—Idre. Ångml. Medelp.—N.) Strået  $\frac{1}{2}$ —1 fot högt, med 2—3, i toppen gylltrade ax, föga större än ärtier; fjällen svarta. — *C. alpina* Sw. (*C. fuliginosa*; varr. af *flava*, Oederi m. fl.)

†† Märken 2 [undantagsvis någongång 3]: *Distigmaticæ*.

\* Honax med skaft af halfva axets längd eller längre (und. *C. sal. subspath.*); axfjällen 3nerviga.

a — Honaxen slutt. hängande.

- 48 *C. maritima* Müll. honaxen långskaftade cylindriska; axfjällen tvärt öfvergående i en stråf borst, flere gånger längre än sjelfva fjällen och de omv. äggformiga, otydl. nerviga fruktgömmena; hanaxen 2 ell. flere. 24 6. Fig. Fl.D.703. H.N.f.6, n:o 76. Andst.6.f.64.

Steniga hafsstr. r. (VB. Neder-Kalix skärg., på Börskår (ell. Vattungen). VG. Göteborg. Boh. nära Marstrand; Henån på Oroust; Uddevalla; Strömstad flerst. — N. uester hela kusten från Boh. gränsen till Ost-Finnm.)  $1\frac{1}{2}$  fot högt starrgräs, med bleka ax och snart affallande fruktg., 2, 3 g:r kortare än fjällens borst.

- \*49 *C. cryptocarpa* C. A. Mey. honaxen cylindriska, de nedre kortare än de långa och fina glatta skaften; axfjällen spetsiga, längre än de ovala ell. omv. äggformiga, otydl. nerviga trubbiga fruktgömmena; dessas mynn. kort utstående, hel; hanaxen 2 ell. flere. 24 6, 7. Fig. Mey.Cyp.t.14. Andst.6.f.61. H.N.f.15, n:o 85.

Hafsstr. r. (N. Finnm. Vadsöe. Trondhj. på Strand under Lexvigen mell. Axnæs och Storvig; Bergen och Christiania enl. Bl.) Strået nära  $1\frac{1}{2}$  fot högt, med 2 han- och 3, 4 honax, alla långt åtskiljda och öfver en tum långa, med skaft af 1—3 tumns längd och bladlika skärm utan slidor, långa som strået; fjällen variera i längd. — *C. filispendula* Drej.

b — Honaxen uppräta \*).

- \*50 *C. halophila* Nyl. honaxen cylindriska, vanl. mot spetsen tjockare, åtskiljda, något längre än de n. glatta skaften; axfjällen lancettlika, långspetsade, dubb. längre än de omv. äggformiga fruktg.; dessas mynn. kort utstående hel; hanaxen 2 ell. flere. 24 7, 8. Fig. Andst.5.f.51. H.N.f.12, n:o 86.

Hafsstr. r. (N. Ost-Finnm. nor. stranden af Varangersfjorden.) Nära alnshög med glatt strå, platta breda blad och stora bladlika skärm af axsamlingens höjd, samt nära 2 t. långa smala ax, liknar denna mer *C. aquatilis* än följ., hvilken den dock genom karakterer står närmast och med hvilken den anses identisk i Ledeb. Fl.Ross.

- \*51 *C. salina* Wg. honaxen lancettlikt cylindriska, af de glatta skaftens längd; axfjällen

\*) Alla arter i denna afd. anses af Blytt, trol. med rätta, för former af en enda art *salina* i vidstr. mening.

äggrunda med lång syl-lik spets ell. trubbiga, ungefär af de aflångt ovala fruktigslängd; dessas mynn. urnupen; hanaxen som hos föreg. 24.7.8. Fig. Sv.B.756. Andst.5.f.50.b. H.N.f.16, n:o 71.

\* *subspathacea* Wormskj. honax med korta, stund. inga skaft; fruktigsl. mynn. mer utdragen; hanax vanl. ensamt. —  $\beta$  *nardifolia*: lågväxt, med smala hoprullade blad. Fig. Andst.5.f.49. Fl.D.1530. H.N.f.10, n:o 80.

Hafsstr. (N. Ost-Finnm.—Trondhj.) Omkring  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  fot hög, med glatt strå, tumslånga ax och lika långa skaft. Skiljd från föreg. mera genom mindre storlek och utseende, än genom verkliga karakterer. — *C. cuspidata* Wg. i Vet.Ac.H.1803 [formen med sylspetsade fjäll]. *C. salina* a *cuspid.* och  $\beta$  *mutica* Wg. Fl.L. — \*, som i vissa former synes vida skiljd från sal., sammanflyter dock genom andra tydl. dermed.

52 *C. hamatolepis* Drej. honaxen som hos föreg., längre än de glatta skaften; axfjällen med en kort syl-lik mycket sträff udd, ell. trubbiga, längre än de omv. äggformiga fruktigsl.; dessas mynn. kort utstående. hel. 24.6.7. —  $\beta$  *mutica*: strået sträff; axfjällen trubbiga ell. med omärkl. udd. Fig. Fl.D.2370. Andst.2.f.37. H.N.f.14, n:o 82;  $\beta$  f.8, n:o 72. Andst.5.f.50?

Hafsstr. r. (Hall. vid Särö. Boh. mångenstädes, t. ex. på Hisingen, Instön etc.; Marstrand; Oroust, vid Henån; Gustafsberg; Strömstad, Holkedalskilen och söd. Koster. — N. Christiania; Bergen; Trondhjem; Finnmark. Lyngen. —  $\beta$  N. Christiania.) Nära fotshög, med dels glatt, dels något sträff strå, samt mer än tumslånga ax af rödbruna fjäll och gulaktiga fruktigsl.; hanaxen ell., men med ämne till ett andra; axfjällen till en del utan den sträffa borsten i spetsen, likasom den vore afbruten. — *C. Kallegatenensis* Fr., som icke anser denna växt vara Drejers art. —  $\beta$  är *C. salinoides* Beurl.

(*C. acuta* och *vulg.* varr.)

\*\* Honax 3 till många gånger längre än skaftet, då sådant finnes; axfjäll oftast ennerviga.

a — Bladen breda; skärmen långa, nående öfver ell. till hanaxen; dessa oftast flere, af blott hanblir.

$\alpha$  — Strået trubbkantigt, glatt; fruktigsl. nervlösa.

53 *C. aquatilis* Wg. bladen rännformiga; skärmen bladlika, det nedersta med en mycket kort, ringformig slida; honaxen med inga ell. korta skaft, uppråta, cylindriska, vanl. mot spetsen tjockare; fruktigsl. rundadt ovala, plattade, med kort utstående, hel mynning, längre än axfjällen; hanaxen 2 ell. flere. 24.6. Fig. Fl.D.suppl.33. Andst.5.f.54. H.N.f.3, n:o 77; f.16, n:o 70 [typisk].

Stränd. (Lpl.—ÖG. och Verml. Smål. vid Vinäs i Eds sn enl. Ekstr. — N. från Ost-Finnm. till Christiania.) Åtshög, af blågrön färg, med 2—3 tum långa, meränd. något klubblika ax af bleka fruktigsl. och korta bruna fjäll. Fruktigsl. utan tydliga nerver, ell. med en gröfre, lågt vid kanten.

54 *C. borealis* Lang: bladen platta; skärmen som hos föreg.; honaxen cylindriska uppråta, de nedre skaftade; fruktigsl. aflångt ovala, trubbiga med kort framstående, n. hel mynning, något längre än axfjällen; hanax meränd. ensamt. 24.6. Fig. Andst.4.f.45.

Fukt. st. r. (Torn. Lpm. Karesuando. Lul. Lpm. Puolaure; Siteluohte vid Wirehaure. Herjed. Grufvålen enl. G. v. Ced. VB. vid Seivitz gästg. Ängml. Heröön. — N. Ost-Finnm.) Fotshög, med mer än tumslånga smala ax, teml. lik föreg., för hvars afart den anses af Læstadius. — *C. eptgejos* Læst. [icke Fr., hvars art af detta namn, H.N.f.12, n:o 87, är *C. discolor* Nyl.]. *C. arctophila* Nyl. enl. Th. Fr.

$\beta$  — Strået hvasskantigt, sträff; fruktigsl. [mer ell. mindre tydligt] nerviga.

55 *C. vacillans* Drej. bladen platta; skärmen bladlika, föga bredare än strået, med skiljda bladöron; honax oskaftade uppråta, utdraget lancettlika; fruktigsl. bredt omv. äggrunda, med kort och hel mynn., plattade, prickade, otydl. nerviga, mycket kortare än axfjällen; hanax. 1 ell. 2. 24.6. Fig. Andst.2.f.36.

Fukt. st. r. (Lpl. enl. ex. af Læst. Pit. Lpm. vid en bäck nära toppen af Tjiddjakk,

samt i en myr nära Brakajokk. *Jeml.* Kallsjöns strand nedom Åreskutan — *N. Christiania*.) *Fotshög*, med mycket strävt strå, korta blad och skärm, som icke nå öfver hanaxet; fjällen äggrundt lancettl., spetsiga ell. med en omärkl. udd, n. svarta med en smal gul rand efter midten. Märken 2—3.

- 56 *C. acuta* L. bladen platta; skärmen bladlika, vanl. långa och breda, med skiljda bladöron; honaxen med inga ell. korta skaft lutande, cylindriska; fruktg. rundadt ovala, på båda sidor konvexa, otydl. nerviga, något spetsiga, af axfjällens längd; hanaxen 2 ell. flere. 24 6. —  $\beta$  *fluvialis*: skärmen längre än axsamlingen; axfjällen kortare än fruktg. —  $\gamma$  *personata*: strået n. slätt; axen bleka smala, slakt lutande, 2—4 tum långa och längre skaftade. Fig. Fl.D.2247. Andst.5,f.56. H.N.f.8, n:o 74.  $\beta$  Sv.B.408. H.N.f.9, n:o 80.  $\gamma$  H.N.f.8, n:o 75.

Stränd. a. (Sk.—Lpl. — *N. till Trondhj.*) Omkr. 2 fot högt, tufvadt starrgräs, varierande i hög grad. Bladslid. låta ej upprispa sig i spindelväfslika trådar, såsom hos *C. stricta*, utan i sammanhängande hinnor.

- 57 *C. proliza* Fr. bladen och skärmen som hos föreg., de sednare längre än axsaml.; honaxen som hos föreg., slakt lutande; fruktg. bredt ovala, plattade, med kort utstående hel mynn., tydl. nerviga, mycket kortare än de lancettl. långspetsade axfjällen; hanax. som hos föreg. 24 6. Fig. Andst.5,f.57. H.N.f.10, n:o 74.

Stränd. (Sk. flerst. enl. F. Ar. Sk. Fl. *Blek.* Lyckeby m. fl. st. enl. Goss. ÖG. i Landeryd och vid Söderköping. Södm. Thorshälla. Stockh. Danvikskrok: G. v. Ced. Uppl. Ekolsund; Uppsala-trakten. *Gestr.* Kubbo. *Helsl.* Njutånger och Forssa snr. Wistr. Medelp. Hafverö sn, Östavall. Ängml. Törna-ån i Ulånger: Arn. Vestml. Kärrbo sn, Springsta äng; Hjelmare kanal. Ner. vid Svartån och Hjelmaren. Hall. Knäred, vid Lagaån enl. Theor. — *N. Christiania*.) Medelform mell. föreg. och *C. stricta*; lik den förra till bladen, den sedn. till frukten; vanl. grofve än bägge, med stora och tjocka ax, svartröda fjäll. Var. med glesa och mer slaka ändra till hängande honax: var. *protensa* Fr. — *C. acuta* L. herb.

- 58 *C. tricostata* Fr. bl. och skärm. som hos föreg., de sednare af axsamts längd; honaxen n. oskaftade uppräta cylindriska; fruktg. bredt ovala trubbiga, upphöjdt 3-nerviga, längre än de trubbiga fjällen; hanax. som hos föreg. 24 6. Fig. Andst.5, f.55. H.N.f.10, n:o 75 [var.].

Stränd. r. (Smål. norra del. ÖG. Norrköp., vid Himmelstalund och Korshagen: Kindb. Stockh. Svartsjö och på Däfvensön; Gåsberget i Jerfälla. Uppl. Uppsala etc. Vestml. Molnebo bruk. — *N. Holsfjorden* i Ringerige.) Mer lik *C. stricta* än *acuta*, mellan hvilka afven denna art synes vara en medelform.

b — Blad breda; hanax oftast ensamt, af blott hanblir.

- 59 *C. Limula* Fr. strået hvasskantigt, mycket strävt; skärmen smala, med skiljda bladöron; honaxen uppräta, n. cylindriska, det nedersta vanl. med kort skaft; fruktg. aflånga spetsiga plattade, med omärkligt utstående, n. hel mynn., otydl. nerviga, n. af de trubbiga axfjällens längd. 24 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.105. Andst.5,f.53. H. N.f.16, n:o 72.

Fukt. st. r. (Torn. Lpm. Karesuando etc. Lul. Lpm. Siteluokte vid Wirihauere. VB. mell. Palajoki och Muonioniska; nära Parkajoenun; vid Muonio- och Tornio-elfvars förening. Herjed. Ljusnestöten enl. G. v. Ced. — *N. Ost-Finnm.* vid Klösterelfven. Vest-Finnm. Alten.) *Fotshög* med 1½ tum långa svarsfjälliga ax; hanaxet ensamt; rotstocken krypande med grofva skott. — *C. acuta*  $\beta$  *ripensis* Læst. skriftl.

- 60 *C. hyperborea* Drej. strået hvasskantigt, glatt; skärmen som hos föreg.; honaxen närmade till hanaxet, n. oskaftade, uppräta, aflånga ell. lancettlika; fruktg. elliptiskt ovala, plattade med mynn. som hos föreg., otydl. nerviga, kortare än de trubbiga axfjällen. 24 6, 7. Fig. Andst.5,f.47. H.N.f.12, n:o 89.

Stränd. r. (Torn. Lpm. Kedkesuando. Herjed. på Grönfjellet norr om Helagsån. — *N. Ost-Finnm.* Seidafjellen. Vest-Finnm. Magerö och Maasöe: Th. Fr. Alten, St. Rajpas. Dovre. nära Kongsvold. Söd. N. Goustafjell.) Lik föreg., men med kortare och tjockare ax, slätt strå. — *C. acuta*  $\beta$  *ripensis* Læst. [ett annat ex.] — Anm. Af *C. hyperb.* har Drejer 2 olika former, en mindre med smälare och skaftade ax, mest öfverensstämmande med hans beskrifning, och en större alldeles lik vår.

- 61 *C. clytroides* Fr. strået hvasskantigt, något strävt; skärmen breda, längre än axaml., med sammanflytande bladöron; honaxen som hos föreg.; fruktg. bredt ovala, n. nervlösa, tydl. prickade, med mynn. som hos föreg., af de trubbiga, ell. kort uddspetsiga axfjällens längd. 2 6, 7. Fig. Andst. 5, f. 48. H.N.f. 10, n: 77?

Fukt. st. r. (Torn. Lpm. Karesuando. VB. vid Torn. Uppsala och Hall. enl. Fries.) Lik de föreg., men med bredare skärm och fruktg. samt fjäll, hvilkas ryggner ofta ullöper i en kort syl-lik udd. — *C. saxatilis* v. *flacciformis* Læst.

- 62 *C. rigida* Good. strået något trubbkantigt, mer och mindre strävt; skärmen smala och korta, med skilda bladöron; honaxen som hos föreg., ovala ell. klubblikt af långa, det nedersta meränd. skåradt; fruktg. ovala, på båda sidor upphöjdt konvexa, med något utböjd hel spets, nervlösa, längre än de trubade axfjällen. 2 6, 7. Fig. Fl.D. 159. Andst. 5, f. 46. H.N.f. 8, n: 77.

Fjelltr. a. (Lpl.—Sveg i Herjed. Dal. Idre och Särna. — N.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med stadigt strå, långa och breda blad i låta knippen från den krypande, af bladlemningar fjälliga rotstocken. Var. med honaxen mer och mindre närslittande, det nedersta stundom långt aflägsnadt från de öfriga. Fruktg. skadas ofta af en svart svamp och blifva då stora och klotrunda. — *C. saxatilis* Wg. Fl.L.

(*C. saxatilis*, *vulgaris*  $\beta$ .)

c — Blad smala [obetydl. bredare än strået], kölade ell. snart hoprullade; skärmen korta; honaxen af blott hanbl.

$\alpha$  — Fruktgömmen tydligt nerviga.

- 63 *C. stricta* Good. strået strävt; bladen platta, kölade; skärmen syl-lik, kortare än axaml., det nedersta bladlikt; honaxen n. oskåfada, uppräta, aflångt cylindriska; fruktg. ovala, plattade, med kort utstående, hel mynning, upphöjdt nerviga, något längre än axfjällen; hanaxen 2 ell. flere. 2 6. Fig. Fl.D. 2548. Andst. 7, f. 60. H.N.f. 8, n: 73.

Stränd. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. Laurvig; Christiania.) Afhögt, i stora tufvor växande starrgräs med låta ax af plattade, i tydlig spiral ordnade fruktg., som tidigt affalla, och med slidor, som, då de dragas från strået, på insidan upprispa i ett nät, liknande spindelväf. Var. med  $\frac{1}{2}$ —2 tum långa ax.

- 64 *C. vulgaris* Fr. strået strävt; bladen vanl. rännformiga, n. utan köl; skärmen bladlika, vanl. kortare än axaml.; honaxen n. oskåfada, närslittande, uppräta, cylindriska; fruktg. ovala trubade konvexa, meränd. längre än de trub. axfjällen; hanax. 1 ell. 2. 2 5, 6. Fig. Fl.D. 1281 och 2478. Andst. 5, f. 52. H.N.f. 8, n: 76; f. 9, n: 81.

Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl.  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med talrika former, som närma sig så väl till flere af de föreg. som till de följ.; ofta knappt skiljbar från smärre varr. af *C. acuta*. — *C. cæspitosa* Lin. herb. *C. Goodenovii* Gay. och *Beurl.* — Anm. *C. bolina* Lang. från Kongsvold på Dovre, med platta och breda, okölade blad, samt bladlika skärm af det mycket sträfvä stråets längd, men endast funnen med omogen frukt, har förgäfvets blifvit eftersökt af Blytt och torde behöfva närmare granskning.

- 65 *C. juncella* Fr. strået strävt; bladen slutl. trådlikt hoprullade; skärmen n. borstlika, kortare än axaml., det nedersta bladlikt; honaxen aflägsnade uppräta, smalt cylindriska; fruktg. aflångt ovala med kort, utböjd spets, längre än de trub. axfjällen; hanaxen 1 ell. 2. 2 5, 6. Fig. H.N.f. 10, n: 76.

Kärr. (Lpl.—Sk. nor. del. enl. F. Aresch. Hall. Öl. Kastlösa, Bredinge etc. — N. Finnm. till söd. N.) Växer i tufvor, och är utmärkt genom stråets, bladens och axens spenslighet. Är likasom följ. en medelform mell. *C. vulg.* och *cæspitosa*.

$\beta$  — Fruktgömm. nervlösa ell. n. nervlösa.

- 66 *C. turfosa* Fr. strået glatt ell. föga strävt; bladen kölade, med platta kanter; skärmen bladlika, vanl. kortare än axaml.; honaxen som hos föreg.; fruktg. ovala med spets af den framskjutande mynningen. otydl. nerviga, meränd. längre än de spetsiga axfjällen; hanaxen 1 ell. 2. 2 5, 6. Fig. Andst. 6, f. 58. H.N.f. 10, n: 79.

Kärr. (Ängml. Bjerträ, i Råmmedalen; Gransjö, vid Helgumssjön. Medelp. Torps prestg. Helsl. Bollnäs och Alfta. Wistr. Kubbotrakten flerst. Uppl. Läby kärr vid Uppsala m. fl. st.; Tibble och Giresta snr enl. Lemm. Stockh. Södm. År-

dala prestg.; Nyköping: C. Ind. etc. ÖG. Ryd i St. Lars; Kärna etc. Dal. Grycksbo Bruk. Ner. Boh. Hall. Onne torfmosse. — N. Christiania; Finden i Torpen, och i Lom.) 1½—2 fot högt starrgräs, med smala blad och strån, dels växande i tufvor, dels mera spridd från rotskott.

- 67 *C. cespitosa* L. strået sträfft; bladen köhlade, med utvikna kanter; skärmen vanl. n. omärkliga, syl-lika; honaxen oskaftade, närsittande, vanl. upprätta aflånga; fruktg. ovala trubbiga med omärklig udd af den knappt framskjut. mynningen, nervlösa, föga längre än axfjällen; hanaxet ensamt. 2½, 5, 6. Fig. Sv.B.222. Fl.D.2547. Ands. t.6.f.59. H.N.f.8, n:o 78; β f.10, n:o 78.

Fukt. äng. a. (Sk.—Lpl. — N. Aggerhus och Christianss. st.) Bildar tufvorna på sidlända ängar och blommor tidigt ännu blott ½ fot hög, men blir sedan ända till alnshög, ehuru spenslig och smalbladig, med 3—4, i förhåll. till strået små [knappt tumslånga] ax i öfversta toppen, sällan 1 tum åtskiljda. — *C. pacifica* Drej. *C. Drejeri* Lang.

d — Hanaxet ensamt, med honbl. i toppen.

- 68 *C. bicolor* All. strået längre än de korta bladen; skärmen kortare än axsaml.; axen närsittande, ovala, något skaftade; fruktg. från smal bas omv. äggformiga, mycket trubbiga, nervlösa, längre än de trubbiga axfjällen. 2½, 6, 7. Fig. Sv.B.701. Fl.D. 2122. Ands.t.4.f.43. H.N.f.11, n:o 79.

Fjellv. r. (Lul. Lpm. mell. Kerkeware och Tuoddarats, vid sjön Puolaure, nedom berget Kerkeware. Herjed. vid Ljusneff midtför Vallarne: J. Hult. enl. G. v. Ced.) 2—4 tum hög, med vid fruktmogn. båglik böjdt ell. lutande strå; de 2—4 axen 2—3 lin. långa, med svartbruna fjäll och n. hvita fruktgömmen.

- 69 *C. rufoa* Drej. strået kortare än de långa bladen; nedersta skärmet längre än axsaml.; axen som hos föreg., n. aflånga; fruktg. omv. äggformiga, med kort spets, otydl. 3nerviga, af de omv. äggrunda trubbiga axfjällens längd. 2½, 6, 7. Fig. Ands.t.4.f.44. H.N.f.13, n:o 84.

Fjellv. r. (Lul. Lpm. vid stränderna af Wirihure, nedanför Stuor-Toki. — N. Synishorn.) Liten som föreg. och nedliggande, tätt tufvad, med vanl. 4—5 ax; det öfversta var. med honbl. i toppen och vid basen, stundom består det af blott han- ell. honbl.

(*C. lagopina*, norvegica, glareosa, microstachya, helvola.)

## II. Homostachyæ: Axet ensamt, sammansatt af likformiga småax; märken 2.

† Småax med honbl. vid basen, ell. de nedre med blott honbl. [Undant. *C. tenella* och *Schreberi* \*.]

\* Fruktgömm. utan hinnkant, sträffa i öfre kanterna.

a — Skärmen mycket långa, bladlika.

- 70 *C. remota* L. axet af flere, långt åtskiljda, enkla småax; fruktg. ovalt äggformiga med sträbbräddadt spröt, något längre än axfjällen. 2½, 5, 6. Fig. Fl.D.370. Ands. t.4.f.40. H.N.f.7, n:o 82.

Lund. r. (Sk.—Upl. Ner. i Hardemo och Viby snr. Verml. i Östmark sn. Dalsl. VG. Boh. Öl. — N. Christiania; Dröbak; Holmestrand; Arendal; Christiansand.) 1—2 fot högt, spensligt starrgräs med isynnerhet de nedre småaxen långt åtskiljda och försedda med 3—6 tum långa skärm. — Anm. *C. Bönninghausiana* Weib., skiljd med sammansatta nedre småax, janss ford. i Sk. vid Slehang.

b — Skärmen små hinnaktiga, ofta omärkliga.

a — Småaxen klotrunda, med utsperrade fruktg.

- 71 *C. stellulata* Schreb. axet af 3—5, något åtskiljda småax; fruktg. äggformiga, med utdraget spröt, dubb. längre än fjällen. 2½, 6. — β *grypus*: småaxen 3, större, och mer tätsittande med mindre utsperrade fruktg. Fig. Fl.D.284. Reich.f.560; β f.540 [mager form]. Ands.t.4.f.37. H.N.f.10, n:o 84.

Fukt. äng. kärr, a. (Sk.—Um. Lpm. och VB. nor. del. — N. till Finnm. Skjervö: Norm. — β N. Vang i Valders på Grindfjell.) ½—1 fot hög, med småaxen taggiga af de utsperrade fruktg. — β har tycke af *C. lagopina*; fruktg:s spröt på insidan

köladt likasom hopviket på längden, ej platt som hos *a*, härigenom Jeggadt, med mycket sträfvä kanter. Strået hos båda 3kantigt. — *C. echinata* Murr.

$\beta$  — Småaxen mer långsträckt, med upprätta fruktg.

- 72 *C. microstachya* Ehrh. axet af 3—5, närrillande småax; det öfversta med hanblir vid basen och 2—3 gånger längre än de aflånga honaxen; fruktg. äggformiga sprötspetsade, nerviga, längre än axfjällen. 24 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.28. Andst.3. f.11. H.N.f.6, n:o 77.

\* *Gaudiniana* Guhn. strået glatt; öfversta axet af mest ell. blott hanblir.

Kärr, r. (*Torn. Lpm.*—*Helsl.* och *Dal.* Spridd i de sydligare prov. ända till *Skåne*. — *N. Tellem.* Grundsæt i Elverum; Christiania; Fjærestrand; Skien. Lom vid Sollemssætern; Dovre, nedom Gjederyggen vid Jerkind. — \* *N. Lomseggen*, ofvan gården Hoft i Bälverdalen.) *Folshögt, spensligt starrgräs med stråft strå, tumslångt ax, utan tydl. skärm; toppaxet skull. klubblikt.* — \*, hvaraf *Bl. förmodar C. brevirostr.* *Cederstr.* vara en forma depauperata, har fruktg:s spröt tydligare stråft än denna.

- 73 *C. helvola* Blytt. axet af omkring 5 tållsittande, jemnbreda småax; det öfversta med hanblir vid basen, af honaxens längd; fruktg. äggformigt aflånga, sprötspetsade, nervlösa, af axfjällens längd. 24 7. Fig. Fl.D.suppl.32. H.N.f.13, n:o 85.

Fjelltr. och kärr, r. (*Um. Lpm.* Gitsfjellen. *VB.* nor. del. i kärr mell. Sangis och Lappbäcken. *Stockh.* Isbladkärret. *Södml.* Tveta sn. *Boh.* Foss sn, mell. Saltkällan och Qvistrum. — *N. Ost-Finnm.* Havningsberg; samt Vest-Finnm. Maasöe enl. Th. Fr.; Porsanger och Skjervö; Norm.; Havörsund. Dovre, nära Fogstuen; på Hundsjöfjellet; Romsdalen, på Langefeld, samt Lom, vid Sollemssætern; Valdres; Goustafjell; Christiania m. fl. st.) *Till storlek och utseende lik föreg.; men växer mer tufvad, med bredare blad, korta hinnaktiga skärm. En del ex. närma sig dock öfven i ut. C. canescens.*

- 74 *C. elongata* L. axet af 6—12, något skiljda, aflånga småax; fruktg. aflånga spetsade, på båda sidor konvexa och starkt nerviga, något utböjda, längre än axfjällen. 24 7. Fig. Fl.D.1236. Andst.1.4.f.32. H.N.f.10, n:o 83.

Fukt. äng. (*Sk.*—*VB.* Umeå sn. och *Jemll.* Oviken. *Boh.* Öl. *Gottl.* Martebo myr enl. Lem. — *N. Christianss.* och *Aggerh.* st.; Stördalen; *Bl.*) *Växer i tufvor med talrika, höga, skull. lutande strån, med bruna fruktg.* — *C. multiculmis* Ehrh.

- 75 *C. Persoonii* Sieb. axet af 3—8, något diskiljda, ovala småax; fruktg. tätt liggande, ovala med utstående spröt, fint nerviga, på utsidan från mynningen med en fin, icke genomträngande spricka [långdveck]; för öfr. konvexa med n. platt insida. 24 6, 7. Fig. Andst.1.4.f.38. H.N.f.7, n:o 85.

Fukt. st. i bergstrakt. (*Lpl.* och *VB.*—*Verm.* och *Gestr.* i Ugglebo sn vid Gnupberget. *Smål.* vid Lannaskede helsobrunn. *Dalsl.* i Hasselskog. *Boh.* vid Bullaren. — *N. Finn.*—*Aggerhus* st.) *Lik följ., men med smärre småax, mogna med bruna fjäll, samt ofta försedda med ett ½—1 tum långt skärmbblad; fruktg. med längre och mer utstående spets.* — *C. Gebhardi* Hop. i Sturm. *C. vitilis* Fr. *C. canesc.*  $\beta$  *alpicola* Wg.

- 76 *C. canescens* L. axet som hos föreg.; småaxen aflånga; fruktg. tätt liggande ovala spetsiga, med trubbiga, föga sträfvä kanter, utan spricka; för öfr. som föreg. 24 5, 6. —  $\beta$  *sublobiacea*: med smärre, mer åtskiljda och rundade småax; fruktg. med n. släta kanter. Fig. Fl.D.285. Andst.1.4.f.39. H.N.f.7, n:o 83 och f.11, n:o 80.

Fukt. st. stränd. a. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* —  $\beta$  *Lpl.* — *N. Christiania*: Bogstadås.) *Omkr. folshög i stora tufvor; axet 1—2 tum långt, gul- ell. grågrönt, säll. mörkare ell. med skärm och då helt korta borslika.* — Både denna och *C. elongata* förvaras i *Lín. herb.* under namnet *C. brizoides*. *C. curta* Good.  $\beta$  *C. lapponica* Lang, till hvilken, såsom Prof. Fries själf anmärkt, *C. macilentia* Fr. rättast torde höra.

\*\* Fruktg. utan hinnkant, släta i kanterna.

a — Småaxen rundade, med trubbad fruktg.

- 7 *C. tenuiflora* Wg. axet af omkr. 3, tållsittande, 8—12blomm. småax; fruktg. föga

- längre än axfjällen, *aggr. aflånga*, trubbad, *hvasstantiga*, *svagt glesnerviga*. 2 6, 7. Fig. Andst. 4, f. 36. H.N.f.3, n:o 80 och f. 7, n:o 84.
- Fukt. st. i fjelltr. r. (Lpl.—Herjed. Dal. mell. Vikarbyn och Garsås: R. Hn. Verml. Veststj. i öfra Ullerud sn. Ångml. Helgum sn. Helsl. Hogdal, Färila och Jerfsö snr. — N. Haarsæt i Rendalen.) Lik *följ.*, men med *större*, *långt till stråets topp samlade småax*, bildande ett *knappt ½ tum långt*, n. *äggformigt*, *alltid blekgrönt ax*. Strået *likasom hos de 2 följ. upprätt*.
- 78 *C. loliacea* L. axet af 3—5, *åtskiljda*, 5—12blommiga småax; fruktg. n. *dubb. längre* än axfjällen, *aggr. aflånga*, *trubbiga* och *trubbkantade*, slutl. *utsperrade*, *mångnerviga*. 2 6. Fig. Sv.B.664. Fl.D.1403. Andst. 4, f. 34. H.N.f.3, n:o 79.
- Fukt. skogsäng. (Lpl.—Smål. Kalm. län; Alsheda och Barkeryd i Jönk. län enl. Scheutz. Dalst. Backa i Gunnarsnäs enl. Leml. Hall. — N. Ost-Finm.—söd. del af Aggerhus st.) *Spådt och smalbladigt starrgräs*, med *axet äfven moget, ljusgrönt*.
- 79 *C. tenella* Schk. axet af 3—6, *åtskiljda*, 2—3blommiga småax, med *hanbl. ofvan fruktgömmena*; dessa *längre* än fjällen, n. *omv. aggrunda* ell. *elliptiska*, *rundadt trubbiga* med kort udd, *trubbkantade*, *mångnerviga*. 2 6, 7. Fig. Andst. 4, f. 33. H.N.f.10, n:o 85.
- Fukt. skogsäng. kärr, r. (Torn. och Lul. Lpm. samt VB.—Dal. Verml. och Gestr. — N. Christiania, vid Bokstadås, Vold m. fl. st.) Lik *föreg.*, men *mycket spådere*, med *trådmala blad och småax af 1—2 han- och n. lika så hanbl.*, *stundom af en blomma af hvarådera slaget*. *Då flere hanbl. finnas, sitta alltid hanbl. i midten, således i toppen af småaxet*. Förf. har funnit *blott 2 ståndare*. — *C. gracilis* Ehrh. *C. disperma* Desv. enl. Beurl.
- b — Småaxen *ovala—aflånga*, med n. sprötspetsade fruktg.
- 80 *C. norvegica* Willd. axet af 3—6, *något skiljda*, *äggformigt aflånga* eller *oval*, *mångblomm. småax*, det öfversta *klubblikt*, med *hanbl. vid basen*, de nedre utan; fruktg. n. *halfklotformiga* med kort spets, *otyd. nerviga*, *af de breda trubbad axfjällens längd*. 2 6. Fig. Fl.D.suppl.103. Wg.FLL.t.15, f. 3. Andst. 4, f. 29. H.N.f.4, n:o 92.
- Kärr nära hafsstr. r. (VB. vid Kalix och Piteå. Ångml. Själevad och Arnäs snr; Säbrå sn m. fl. st.: Arn. Geste. Stockh. Södm. Högholmen i Bälunge sn: C. Ind. ÖG. Lönö i Häradsåmmar; Djurö och Beteby i Dagsberg. Smål. Kalmar län, vid Påskallavik etc. Blek. Lyckeby slott; vid viken mell. Knösö och Ringö; Sölvißborg. Boh. på Lipdholmen utanför Göteborg; söd. Koster. Öl. vid Runsten. — N. Finm. — Christianiafjorden.) Strået *½—1 fot högt, upprätt, trubbkantigt*; axet *1—1½ tum långt, moget ljusbrunt*.
- 81 *C. lagopina* Wg. axet *äggformigt* ell. *ovalt*, af omkr. 3, *tåtsittande*, *oval* *mångblomm. småax*, de nedre af *blott hanbl.*; fruktg. *oval* *spetsiga* *trubbkantade*, *otyd. nerviga*, *längre än de trubbiga axfjällen*. — *β gracilescens* Th. Fr. strået *högre*, *spensligt*, *strått*; småaxen 3, små och *tätt gytttrade*, alla med både han- och hanbl. 2 6, 7. Fig. Fl.D.294. Andst. 4, f. 28. H.N.f.3, n:o 83.
- Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N. Finm.—Dovre. Filefjell, Norfjellet i Buskeruds amt. — *β* N. Finm. Kaveringtind vid Lyngensfjord. Ost-Finm. Renö i Syd-Varanger.) Omkr. *½ fot hög*, med *upprätt*, hos *kustvuds. ofta glatt strå*, *sällan mer än half-tumslångt*, *brunt ax*. Fruktg. hos denna *och de 2 följ. med ett långdveck på sprötets utsida*. *β är en utmärkt, men måhända af lokalen [fukt. st. i närheten af snödrifvorna] beroende form*, i öfr. lik *Grönländska ex. af var. plejostachya* Dr., men *skiljd med de färre och smärre småaxen*. — *C. leporina* Fl.D. och L.Fl. Lapp. enl. dess Herb.
- 82 *C. heleonastes* Ehrh. axet *afångt*, af 3—5, *nårsittande n. likformiga*, *oval* *småax*; fruktg. *lancelllikt ovala*, *spetsiga* *trubbkantade* *utstående*, *nedtill fin-nerviga*, *något längre än de spetsade axfjällen*. 2 6. Fig. Fl.D.suppl.31. Andst. 4, f. 30. H.N.f.3, n:o 81.
- Kärr, r. (Lpl.—Uppl. Södm. öst. Vingåker; vid sjön Gölen. Dal. Vestml. Ner. Götunda: O. G. Blomb.; Leke bergslag; östra Mark. Verml. — N. i Aggerhus st. Finm. mell. Masi och Lappojavre: Norm.) *½—1 fot hög*, med *upprätt, strått strå*, *tumslångt, brunt ax*.



- 83 *C. glareosa* Wg. axet äggformigt ell. aflångt, af omkr. 3, närsittl. ovala småax, det öfversta klubblikt, med hanblir vid basen, de nedre af blott honblir; fruktg. lancetlika smalspetsiga, upphöjdt mångnerviga, af de spetsade axfjällens längd. 2 6, 7. Fig. Sv.B.645. Ands.t.4.f.31. H.N.f.3, n:o 82.  
 Grusiga hafsstr. r. (VB.—Rosl. Hargs bruk; Grisslehamn på Storkubben. — N. Ost-Finnm.—Trondhjem.) Stråen  $\frac{1}{2}$  fot långa, spensliga, uppböjda, vid fruktmogn. nedlyngda af det sällan tumslånga bruna axet och slakt lutande.  
 (C. canescens och bicolor.)

\*\*\* Fruktg. med breda hinnaktiga, långt ned stråfsågade kanter.

- 84 *C. leporina* L. stråen tätt tufvade; axet aflångt ell. ovalt, af 4—6, närsittande, ovala småax, alla med hanblir vid basen; fruktg. äggformiga, ända till basen bredt hinnkantade, af de smalspetsade axfjällens längd. 2 5, 6. —  $\beta$  argyroglochis: axet blekt, af n. hvita fjäll med grön ryggnerf. Fig. Fl.D.1115;  $\beta$  1710. Ands.t.4,f.26. H.N.f.8, n:o 80.

Fukt. äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Lofoden. —  $\beta$  i skugga.) Fotshög ell. mera med 1—1 $\frac{1}{2}$  tum långt och något tjockt ax af ljusbruna fjäll med hvitakt. kanter. — *C. leporina* L.Fl.Su. *C. ovalis* Good.

- 85 *C. festiva* Dew. axet äggformigt, af 4—6, tätt gytttrade, äggrunda småax; fruktg. längre än de äggrunda, föga spetsiga axfjällen; för öfr. som föreg. 2 6, 7. Fig. Fl.D.2367. Ands.t.4.f.27. H.N.f.8, n:o 82.

Fjelltr. (Torn.—Um. Lpm. — N. Finn. Tromsadalstind. Sogn på Leierdalsören. Romsdalen.) Mycket lik föreg. och knappt skiljd med annat än det dubbell kortare, tätare och tjocka axet, mörkt af de svartbruna hinnkantade fjällen.

- 86 *C. Schreberi* Schrank: stråen spridda, från en kryp. rotstock; axet aflångt ell. äggformigt, af 3—6, aflånga, närsitt. småax; fruktg. äggformiga, med nedtill upphörande, sågad hinnkant, af de smalspetsade axfjällens längd. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1829. Ands.t.4.f.25. H.N.f.16, n:o 73.

\* *ligerica* Gay: småax med hanblir dels vid basen, dels annorstäd. i axet. Fig. Reich. f.550. H.N.f.4, n:o 91.

Sand. st. r. (Blek. Pukavik. Öl. Sandby sn vid Åby väderqvarnar; vester om Köpings kyrka; Thorslunda kyrka. — \* Öl. mell. nor. Möckleby och Runsten vid Loperstad.) Rotst. långt krypande, med ett ell. annat 4—8 tum högt, strå i de 1—2 tum aflågsnade lederna; axet vid blomn. knappt tumslångt, brunt. — \* är en tydlig medelform till *C. arenaria*.

†† Småax med hanblir i toppen, eller en del af blott hanblir.

\* Arter med krypande rotstock.

a — Axet långsträckt, med en del småax enkönade; fruktg. med ett längdveck.

- 87 *C. arenaria* L. axet aflångt, af n. enkla småax, de nedre till större delen af honblir, de öfversta af hanblir; fruktg. aflångt äggformiga långspetsade, med bred hinnkant från midten, upphöjdt mångnerviga, af de smalspetsade axfjällens längd. 2 5, 6. Fig. Sv.B.156. Fl.D.1766. Ands.t.3.f.16. H.N.f.13, n:o 86.

Sand. stränd. helst hafsstr. (Sk.—Rosl. Boh. Öl. Gottl. I det inre landet: Vid Vellern och Venern. Smål. Vilstads prestg., vid Nissa-ån. Verml. vid Klarelfven. — N. till Söndmör.) Rotst. kryp. vidt omkring i sanden, uppskjutande n. enstaka, 6—10 tum höga strån från lederna; axet teml. tätt, 1—1 $\frac{1}{2}$  tum långt, slutt. ljusbrunt.

- 88 *C. disticha* Huds. axet äggformigt aflångt—cylindriskt, af n. enkla småax, de nedersta och öfversta sambyggare ell. honax, de mellersta af endast hanblir; fruktg. med mycket smal hinnkant ofvan midten, något längre än de spetsiga axfjällen, för öfr. som hos föreg. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1343. Ands.t.3.f.15. H.N.f.11, n:o 81.

Fukt. äng. vid diken etc. a. (Sk.—Helsl. och Dal. Hall. Öl. Gottl. — N. längs kusten till Trondhj. st., och inuti landet till Gudbrandsd.) 1—2 fot högt slarrgräs med kort krypande rotstock, vanl. med nedtill glesare och lutande ax; var. dock med tätare och upprätt, från 1 $\frac{1}{2}$  till 3 tum långt; stundom äro alla öfre småaxen honax, mer sällan blifva alla sambyggare. — *C. intermedia* Good.

b — Axet kort, rundadt; alla småax sambyggare; fruktg. utan längdveck.

- 89 *C. incurva* Lightf. axet klot- ell. äggformigt, af tätt gytt. småax; fruktg. äggrundt halfklotformiga med sprödlig, glatt spets, otydl. nerviga, längre än de trubbiga axfjällen. 24 6. —  $\beta$  *pratensis*: strået mer än quartershögt upprätt, jemte bladen blågrönt. Fig. Fl.D.432. Andst.3.f.12. H.N.f.14, n:o 85.

\* *arctica* Deind. axet n. aflångt, af färre småax, och mer plattade fruktg. Fig. Andst.3.f.13. H.N.f.14, n:o 86.

Hafstr. och fjelltr. r. (Hall. och Boh. — N. längs kusten från Christianiafjorden till Ost-Finm. Dovre. Lomsfjellen. —  $\beta$  Sk. vid Båstad. Hall. Karup sn, vid Allarps by: Theor. — N. Trondhjem. Levanger. Nordl. Bodøe. Finm. till Varanger. — \* N. Finm. Nordl. Saltdalen.) Rotstocken lång, krypande; strået 2—6 tum högt, trubbkantigt, hos hufvudf. krökt, med axel stort som en hasselnöt. — \* *C. arctica* Fr. *C. Deinboelliana* Gay.

- 90 *C. chordorhiza* Ehrh. axet äggformigt, af tätt gytt. småax; fruktg. ovakt halfklotformiga, med kort, glatt spets, starkt nerviga, af de spetsade axfjällens längd. 24 6. —  $\beta$  *sphagnicola* Læst. låg och spenslig, med n. enkla fåblommiga ax. Fig. Fl.D.1408. Andst.3.f.14. H.N.f.9, n:o 85.

Dyga kärr. (Sk.—Lpl. Götll. — N. till Ost-Finm. —  $\beta$  Torn. Lpm. — N. Ost-Finm.) Utmärkt af den i dyn liggande rotstocken, som liknar greniga, ofta alnslånga strån, från hvilkas leder axbärande  $\frac{1}{2}$  fot höga grenar utgå. — *C. uliginosa* L. Herb., ehuru beskrifn. i Fl.Su. uppenbart tillhör *Scirpus compressus*, som saknas i detta verk.

(*C. teretiuscula*, *brevirostris*.)

\*\* Arter med tufvadt gräs och rot.

a — Axen yngre grönaaktiga, oftast med utsperrade fruktg.

- 91 *C. vulpina* L. axet cylindr. aflångt, dubb. sammansatt af rundade oskaftade småaxgyttingar; fruktg. äggformiga spetsade, upphöjdt nerviga, med smal hinnkant, längre än de borstspetsade axfjällen. 24 6. —  $\beta$  *nemorosa*: axgytt. med långa borstlika skärm. Fig. Fl.D.308. Andst.1.3.f.17. H.N.f.9, n:o 83.  $\beta$  Reich.f.563.

Kärr, diken. (Sk.—Helsl. Ängml. Mo sn. Dal. Verm. och Dalsl. Boh. Öl. Götll. —  $\beta$  sälls. Sk. Lund; Malmö; Älnarp. Boh. Strömstad. Öl. och Götll. — N. Fredriksværn, Kragerøe, Christianss. m. fl. st. i söd. del. Hufvudf. lär i N. saknas.) Alnshög grof starr, med skarpt 3eggade strån, 2 tum långt, n. fingertjockt, slutt. brunt ax, hvilket hos  $\beta$ , som af flere anses för egen art, behåller sin gröna färg.

- 92 *C. muricata* L. axet cyl. aflångt, af meränd. enkla rundade närsittande och oskaftade småax; fruktg. äggform. med kort spets, smala hinnkanter, utan tydl. nerver; för öfr. som föreg. 24 5.6. Fig. Fl.D.1526. Andst.3.f.19. H.N.f.9, n:o 84.

Torra äng. etc. a. (Sk.—Ängml. och Jemll. Boh. Öl. Götll. — N. till Trondhj.) Vanl. fotshög, med en god tum långt, n. allid grönt ax; de nedre småaxen föga fränksiljda.

- 93 *C. divulsa* Good. axet utdraget cylindriskt, af rundade småax; de nedersta långt disksiljda och meränd. sammansatta, stund. kort skaftade; fruktg. utdraget äggformiga, föga utsperrade; för öfr. som föreg. 24 5.6. Fig. Fl.D.1280. Andst.3.f.20.

Lundar, r. (Sk. vid Ringsjön; Krageholmssjön, etc. Blek. Ronneby. Smål. vid Eds kyrka. ÖG. Omberg; Stämna i Askeby och nära Stegeborg: Kindb. Södm. Strenghus på Segersön. Vestml. Aggarön i Granfjärden, och vid Vickhus i Ryttern. Boh. Hjertö i Qville sn. Öl. Götll. — N. Christiania; Skien; Porsgrund etc.) Lik föreg. med dubbelt så långt ax af de  $\frac{1}{2}$ —1 tum aflägsnade nedre småaxen, som ofta hafva ett utdraget, borslikt skärm. Synes genom medelformer öfvergå i föreg.; en sådan torde *C. virens* Andst.3.f.18 varu.

b — Axen brunaktiga, med upprätta ell. utstående fruktgömmen.

- 94 *C. paniculata* L. axet deladt i mer och mindre utdragna grenar af gyttrade småax; fruktg. äggformigt kägellika, med korta nerver vid den uppsvålda basen och ett längdveck upptill, för öfr. släta, af de spetsiga ell. något trubbad axfjällens längd. 24 5.6. Fig. Fl.D.1116. Andst.3.f.21. H.N.f.10, n:o 81; f.6, n:o 80 [en mager form].

Kärrakt. st. r. (Sk. Köpinge-ådalens flerst.; mell. Skabersjö och Anderslöv; vid Lefräsjön i Ivetofsa etc. Smål. Landsjön i Skärstad sn enl. Scheutz. ÖG. Vinnerstad vid Staffanstorps-sjön m. fl. st. Stockh. vid Ryssviken och Brunnsviken. VG. vid Billingen. Boh. Vinga södra inholme. Öl. Borgaträsket; Breddinge. — N. Christianssand.) *Alnshög, ell. mer, med skarpkantigt strå, breda blad, fingerlångt ax, groadt i  $\frac{1}{4}$ —1 tum långa småaxgyttringar. De bladlösa, mer än tumslånga svarta fjällen vid stråets bas klyfva sig icke i trådar som hos C. paradoxa.*

- 95 *C. teretiuscula* Good. axet upprätt, cylindriskt ell. äggformigt, dubb. sammansatt af oskaftade gytttrade närsittande småax; fruktg. äggformiga, n. nervlösa, med ett längdveck och utdraget spröt, n. längre än de trubbadell. uddspetsiga axfjällen. 2 5, 6. —  $\beta$  *crassior*: axet elliptiskt ell. äggformigt, mer sammansatt. Fig. Fl.D. 1886. Andst. 3, f. 22. H.N.f. 6, n:o 79.  $\beta$  Schk. t. T. f. 69.

Kärr. (Sk.—Pit. Lpm. och VB. nor. del. — N. till Ost-Finnm: Th. Fr.) 1—2 fot hög, med n. trubbkantigt strå och n. trådmala blad; axet föga mer än tumslångt och tjockt som en gåspenna, hos  $\beta$  dubbelt tjockare; fjällen vid stråets bas som hos föreg. art. — *C. panicul.*  $\beta$  Wg. Fl. Su.  $\beta$  *C. Ehrhartiana* Hop. enl. Beurl.

- 96 *C. paradoxa* W. axet slakt, grenigt af utdragna småax-gytttringar; fruktg. äggformiga med utdraget spröt, på båda sidor till hela längden upphöjdt nerviga, n. kortare än de smalspetsade axfjällen. 2 6. Fig. Fl.D. 1887. Andst. 3, f. 23. H.N. f. 6, n:o 78.

Kärr. r. (Sk.—Gestr. Medelp. Torp sn: Reuterm. Jemtl. Frösön vid Ströms kyrka. Dal. Vestml. Ner. Öl. Gottl. — N. till Helgeland; Ofoten: Norm.) Lik *C. paniculata*, men till alla delar spädare, med strå och blad som föreg.; mest utmärkt af de nerviga fruktg., samt af fjällen vid stråets bas, som hos denna art upplösas i svarta, tagellika trådar.

(*C. tenella*, Schreberi \* *ligerica*.)

### III. Monostachyæ: Arter med ett enda, enkelt ax.

† Hanblir i axets topp, honblir nedtill; märken 3.

\* Fruktg. vid mogn. upprätta ell. utstående.

- 97 *C. obtusata* Liljeb. axet yngre aflångt, moget äggformigt; fruktg. utstående, ovala trinda, spetsiga, groft nerviga, mycket glänsande, längre än de hinnaktiga axfjällen. 2 5, 6. Fig. Sv.B. 533, f. 2. Fl.D. suppl. 100. Vet. Ac. H. 1793, t. 4. Andst. 3, f. 4. H.N. f. 4, n:o 93.

Sandfält, r. (Öl. Köping, Runsten. Borgholm etc.) Rotstocken horisontalt och långt krypande, med nästan enstaka 2—6 tum långa strån från lederna; fruktg. 3—5, af tjocka bruna skal, som lätt spricka för den stora nöten.

- 98 *C. rupestris* All. axet aflångt; fruktg. upprätta, aflångt omv. äggformiga, trinda, med kort spets, fint nerviga, kortare än de stora hinnkantade fjällen. 2 6, 7. Fig. Fl.D. 1401. Reich. f. 531. Andst. 3, f. 3. H.N. f. 3, n:o 84.

Högre fjellv. (Lpl.—Herjed. — N.) Rotstocken krypande med fingerhöga strån; axet jemnbredt, eller moget n. lancettlikt.

\*\* Fruktg. vid mogn. nedböjda.

- 99 *C. microglochin* Wg. axet 5—10blommigt; fruktg. lancettlikt syl-lik, inneslutande en genom mynningen framskjutande, nål-lik borst. 2 6, 7. Fig. Sv.B. 539, B. Fl. D. 1402. Andst. 3, f. 1. H.N. f. 3, n:o 85.

Kärr. i fjelltr. r. (Torn. Lpm.—Herjed. — N. Finn. — Dovre. Tronsfjell. Gudbrandsdalen. Valders etc.) Fingerhög och lik följ., men med långt flere fruktg. och en genom fruktg:s mynning bredvid märkena utskjut. strålik borst. — *Uncinia Spreng.*

- 100 *C. pauciflora* Lightf. axet 3—5blomm.; fruktg. som hos föreg., utan borst. 2 6. Fig. Sv.B. 539, A. Fl.D. 1279. Andst. 3, f. 2. H.N. f. 11, n:o 82.

Dyga kärr. (Lpl.—Sk. Hall. söd. del: Theor. — N. Ost-Finn. — Christiania.) 3—6 tum hög, med 2—4, nedböjda, gröngula fruktg., som hafva en spets af det tjocka utskjutande stiftet, hvilket ej bör misstagas för borsten hos föreg. — *C. leucoglochin* Ehrh.

†† Hanblir i axets topp, honblir nedtill; märken 2.

\* Fruktg. vid mognaden nedböjda.

- 101 *C. pulicaris* L. axet jemnbredt ell. lancettlikt; fruktg. slutl. utsperrade ell. nedböjda, glest sittande, bredt lancettlika, spetsiga, nervlösa. 2 6, 7. Fig. Sv.B.533. Fl.D. 2546. Ands.3.f.7. H.N.f.13, n:o 87.

Fukt. äng. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. VG. Dalsl. Boh. söd. Långö; Koster. Hall. Öl. Gottl. — N. till Trondhj. Ost-Finm. Vadsöe: Deinb.) Yngre fingerhög; äldre 6—8 tum, med tumslångt ax, bruna fruktg. och affallande axfjäll; bladen korta, borstlika. — *C. psyllophora* Ehrh.

\*\* Fruktg. vid mogn. uppräta ell. utstående.

- 102 *C. capitata* L. axet ägg- ell. klotrundt, af tätt liggande, äggrunda plattade nervlösa, glatta fruktgömmen; axfjällen korta trubbiga. 2 6. Fig. Fl.D.2060. Ands.t.3.f.6. H.N.f.6, n:o 82.

Fukt. äng. i fjelltr. (Lpl.—Dal. ned till Boda Kapell. Helsl. Loos sn, kring Kyrkjärn. — N. Ost-Finm.—söd. Norges fjelltrakter.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med ax af en ärts storlek; bladen smala rännformiga.

- 103 *C. nardina* Fr. axet ovalt; fruktg. tätt ligg., ovala spetsade konvexa, på ryggen glest nerviga, i kanten stråfva; axfjällen trubbiga. 2 6, 7. Fig. Fl.D.2365. Ands. t.3.f.5. H.N.f.9, n:o 86.

Fjellv. r. (Lul. Lpm. Wirihauere på Kaissatsnjuonje: Sirkasluokte; Puolaure. — N. Finm. Tromsöe, på Ramsfjellet; Sör-Rejsen: Norm. Nordl. Salten på Båtsfjellet.) Omkr. 2 tum hög, med tätt tufvade strån och knippen af båglikt krökta blad, som endast vid basen äro rännformiga, sedan n. trinda, n. jemnhöga med strået; axel 2—3 linier långt, döljande de få hanblirna i toppen.

- \*104 *C. brevirostris* Cederstr. axet jemnbredt ell. aflångt; fruktg. få, äggrundt lancettlika, på insidan platta, med kort spröt, glatta, n. insvepta i de rundadt trubbiga hinnkantade axfjällen. 2 7, 8. Fig. Fl.D.suppl.102.

Hafsstr. r. (N. Trondhj. st. nära Ryssvik vid Foldersjord, på den gräsbevuxna hafsstr. Nordl. vid Saltenevls utlopp. Finm. Mageröe, vid Skarsvaag: Th. Fr.) Mörkgrön, med 7—10 tum höga strån från krypande rotstock, vid basen rännformiga, upptät n. trinda blad, och 5—6 lin. långt ax, som än är enkelt, af blott hanblir ell. af hanblir i toppen och 2—4 honblir vid basen, än nedtill något sammansatt. (*C. dioica* var.)

††† Tvåbyggare, med han- och honax på olika stånd.

- \*105 *C. scirpoidea* Michx. honaxet n. klubblikt, tätblommigt; axfjällen än spetsiga, än trubbiga, hårbräddade; fruktg. ovalt aflånga, stråfludna, sprötspetsade; märken 3. 2 7. Fig. Fl.D.1528. H.N.f.16, n:o 74.

Fjellv. r. (N. Saltalen, på den mot Junkersdalen belägna sidan af Solvaagtind 1854; »på den mot Solvaagvandet belägna sid. af Solvaagtind» 1859.) Tufvig, med krypande rotstock, och 4—8 tum, stund. mer än fotshöga, nedtill rikbladiga, stråfva strån; honaxen  $\frac{1}{2}$ —1 tum långa. — *C. Wormskjoldiana* Horn.

- 106 *C. parallela* Somst. honaxet jemnbredt, något glesblommigt; axfjällen spetsiga; fruktg. äggr. aflånga, uppräta, nerviga, glatta med släta kanter och något utstående spröt; märken 2. 2 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.29. Ands.t.3.f.9. H.N.f.7, n:o 86.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. Lul. Lpm. på Kerkeware, Kappa, Toki etc. Pil. Lpm. Walläwe, Tjiddjakk. Um. Lpm. Lycksele vid Umenäs och Nydal. — N. Finm. Salten; Stuedalen. Dovre på Gjederdyggen vid Jerkind; Kongsvold; Finnshöe etc. Gudbrandsdalen och Valdres.) 5—10 tum högt, glatt, ell. upptill något stråft, bågformigt uppböjdt strå; honaxet  $\frac{1}{2}$ —1 tum långt, smalt cylindriskt, mörkbrunt. — *C. dioica*  $\beta$  parallel. Läst.

- 107 *C. dioica* L. honaxet ovalt, tätblomm.; axfjällen trubbiga; fruktg. bredt äggrunda nerviga uböjda, glatta med stråfva kanter och spröt; märken 2. 2 5, 6. —  $\beta$  *scabriuscula*: strå längre, mer tufvadt, stråft. —  $\gamma$  *isogyna*: n. halva axet af honblir. Fig. Sv.B.551. Fl.D.369. Ands.t.3.f.10. H.N.f.10, n:o 86;  $\gamma$  f.15, n:o 86.

Våta äng. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Sk. —  $\gamma$  Lul. och Um. Lpm. Verml. bergslag, vid

Saxån. Stockh. — N. Ön Senjen: Norm.) Strå som hos föreg., men rakt och upprätt, n. alltid glatt; honaxet  $\frac{1}{2}$  tum långt, ljusbrunt. —  $\beta$  C. Davalliana Retz. Suppl.

472. KOBRESIA Willd. Säfstarr.

1 K. caricina W. strået 3kantigt; axgyttringen aflång, slutt. oval; axen sammansatta af honblommiga småax nedtill och hanblomm. i toppen. 24 7. Fig. Sv.B.527,f.2. Andst.2,f.35. H.N.f.3, n:o 69.

Fjellv. r. (Jemt. Åreskutan; Snasahögen; Skäker- och Helagsfjellen. Herjed. Midtdalen; Skarffjellen etc. — N. Fondsfjellet i Merager; Kälahögen vid Jemtiska gränsen; Dovre; Gudbrandsdalen etc.) 3—8 tum hög och tuffvad; axen af 3—6, enkönade småax.

2 K. scirpina W. strået trindt; axet ensamt, jemnbredt; småaxen sammansatta af en han- och en derunder sittande honblomma. 24 7. Fig. Sv.B.527,f.1. Andst.2,f.34. H.N.f.5, n:o 83.

Fjellv. (Torn. Lpm. fjellet Nuljalaki. Lul. Lpm. Pit. Lpm. Jemt. Getvalen och Helagsfjellen. Herjed. stora Midtdåkläppen; Åxhögen. — N. Finnm.—Hardanger och Gudbrandsdalen.) Spådare, men ofta högre än föreg. — Elyna spicata Schrad. Scirpus Bellardi Wg.Fl.L.

## 16 KLASSEN

### GLUMIFLORÆ.

98 Fam. **GRAMINEÆ Juss.** Gräs. Blomning i småax med 2, sällan 1, skärmsjäll, inneslutande blrna, som bestå af 2 skiftevisa blomfsjäll och 2 små, ofta otydliga kronfsjäll närmast befruktningsdelarne. Stånd. vanl. 3, säll. 2. Pist. med 2 stift ell. märken, säll. 1. Frukt enförgig hinnfrukt.

1 Afdeln. **EURYANTHÆ.** Blomman under blomningen öppen. Stift korta, med vid blomfsjällens bas framskjutande märken.

1 Flocken **Hordeaceæ.** Gräs med ledadt ax, sammansatt af merändels oskafade, i axfästets leder skiftevis fästade ell. insänkta småax.

#### 473. **TRITICUM Lin.** Vild-hvete.

† Öfre bladytans nerver starkt upphöjda, breda och tättsittande [med omärkliga mellanrum]; rotstock lång krypande.

\* Bladnerverna mjukhåriga [bladen säll. icke sträfvä].

1 *T. junceum L.* bladen rännformiga hoprullade; axfästet *mycket* bräckligt; skärmsf. längre än halfva småaxet, *minst 9nerviga, omärkligt* kölade, *tvårhuggna*; yttre blomfsj. *glatt*, trubbigt, utan borst. 2 6, 7. Fig. Sv.B.269. Fl.D.916. Ands.Gram. t.1.f.1. H.N.f.6, n:o 91, 92.

Sand. hafsstr. (Sk. Hall. mell. Kärrby och Eldsberga. Boh. Vrångö; S. Koster; Styrö. Öl. Böda. Gottl. Lummelund; Sproge, Vestergarn och Eikelhem snr enl. G. v. Ced. — N. Hvalöarne; Mandal; Lister.) *Axel hos pressade ex. ytterst bräckligt, glatt; småaxen hos den mest utvecklade formen: megastachyum, n. tumslånga och 1 t. breda, till färgen hvitgula. — Agropyrum PB.*

2 *T. strictum Deth.* bladen som hos föreg.; axfästet *något* bräckligt; skärmsf. längre än halfva småaxet, 5—9nerviga, *starkt* kölade, *spetsiga*; yttre blomfsj. *nedom midten finludet, spetsigt*, med ämne till borst. 2 6, 7. Fig. Fl.D.2705. Reich.D.Fl. Gram.f.268. H.N.f.11, n:o 92.

Sand. hafsstr. r. (Sk. öst. kust. vid Åhus; mell. Cimbritshamn och Vik; Köpingsåns utlopp enl. F. Aresch.) *Axel ej så bräckligt som hos föreg., med smala småax, tät tryckta till fästet. Lär enl. S. Almqv., som i Bot. Not. 1865 lemnat en upplysande utredning af detta släktes svenska hafsstrandformer, likasom föreg. och de närmast följ. hafva både en storaxig och en småaxig form. — T. hebestachyum ß megastach. ed.9. Agropyry. Reich.*

\*\* Bladnerverna sträpprickiga ell. borstbärande [bladen derigenom på öfre sidan sträfvä].

3 *T. acutum DC. enl. Godr.* strået *uppsittigande*, jemte de i början platta, slutl. hoprullade bladen *slakt*; axfästet *segt*; skärmsf. *längre* än halfva småaxet, 7nerviga, *spetsiga*; yttre blomfsj. *spetsigt*, n. utan borstämne. 2 6, 7. Fig. Reich.264. Ands. t.1.f.3. H.N.f.6, n:o 94.

Sand. hafsstr. (Sk. ej sälls. *Hall.* Halmstad: Theor.; vid Storåns utlopp. *Boh.* *Blek.* Ronneby enl. *Almqv. Smål. Kalmar. Gottl. Lummelund.*) *Ljust blågrönt, ledadt och slakt gräs, i hög grad varierande efter lokalens beskaffenhet. Sannolikt är, såsom Almqv. visat, att Godrons art af detta namn innefaller flere former jemte vår, men, sålänge det ännu är oafgjordt om dessa former äro till arten skiljda, kan man svårligen tvertemot Godrons på orig. ex. grundade åsigt om vår arts identitet med T. acutum DC. utbyta detta namn mot det visserligen mycket passande, men vida yngre namnet T. laxum Fr. — T. affine ed.7. Agropyrr. RS.*

- 4 *T. obtusiusculum* Lge. strået upprätt, jemte de i börj. platta, snart hoprullade bladen styft; axfästet något bräckligt; skärmfj. föga längre än halva småaxet, 7nerviga, trubbase; yttre blomfj. trubbigt, vanl. med borstämne. 2 6, 7. Fig. Reich.f.266. Ands.t.1.f.2. H.N.f.6, n:o 93.

\* *campestre* Godr.? gröfre; bladen mycket stråfva; småaxen tatrikare, med 7—9nerv. skärmfj. af halva småaxets längd.

Sand. hafsstr. r. (Sk. söd. och öst. kust. enl. F. Aresch. och *Almqv. Hall.* Halmstad enl. *Almqv. Boh. Koster; Strömstad etc. Blek. Ronneby samt Gottl. Lummelund* enl. *Almqv. — N. Christiania,* och på öar i fjorden: *Bl. — \* Sk. Malmö, vest. hamnbryggan enl. Almqv.*) *Gråaktigt grön, hufvudf. med enstaka, \* med något tufvade, 1—4 fot höga strån, alltid styfva och upprätta. — T. acutum Fr. S.V.Sc. T. hebestachyum Fr., Hn ed.9, ett något yngre namn. Agropyrr. RS.*

- 5 *T. pungens* Pers. strået och bladen som hos föreg., de sednare med lång stickande styf spets; axfästet segt; skärmfj. af halva småaxets längd, 7nerviga, spetsiga; yttre blomfj. spetsigt, ofta med borst. 2 6, 7. Fig. Fl.D.2704.

Hafsstr. r. (*Hall.* Varbergstrakten; samt *VG. Göteborg: Prof. Fries enl. Almqv. — N.* enl. *Bl.*, men osäker såsom afvikande fr. utl. ex. och beskrifn.) *Grågrön, slutt. gulglänsande, med tufvade, 2—4 fot höga strån enl. Almqv. Svenska ex. osedda af utg. — Agropyrr. RS.*

†† Bladens nerver föga upphöjda, smala, vanl. mjukhåriga, med mycket breda, stråsprickiga mellanrum [bladen derigenom stråfva].

- 6 *T. repens* L. rotstocken långt krypande, med spridda strån; bladen platta, slaka, vanl. med en enkel rad fina hår längs nerverna, mellan dessa på öfre sidan mycket stråfva; axfästet segt, med tatrika, tätsittande småax; skärmfj. 5nerviga, vanl. borstspetsade; yttre blomfj. trubbadt ell. spetsigt, utan ell. med rak borst. 2 6, 7. — *β littorale:* mer lågväxt, blågrön, med korta och smala, slutt. hoprullade blad. Fig. Sv.B.38. Fl.D.748. Ands.t.1.f.4. *β* H.N.f.6, n:o 96.

Odl. st. a., *β* hafsstr. (Sk.—*Lpl. — N.* till Finnm. — *β* *Sk. Hall. Boh. ÖG.* enl. *Kindb. Södm. Nyköpingsskären: C. Ind. Gottl. — N.) Var. i högsta grad. — β mucronat. edd. 5—9 är enl. ett äldre ex. i förf:s herb. en till β närsittande form. — Agropyrr. PB.*

- 7 *T. violaceum* Horn. roten tufvad och trådig; rotstocken n. omärklig, med tufvade strån; bladen som hos föreg.; axet styft, med småax som hos föreg.; skärmfj. omkr. 5nerviga, n. tvärhuggna, med kort borst; yttre blomfj. spetsigt, med något längre borst. 2 6, 7. Fig. Fl.D.2044. Ands.t.1.f.6. H.N.f.5, n:o 99.

Fjelltr. r. (*Torn. Lpm. Nuljalaki; Karesuando. Lul. Lpm.* enl. *Ands. Jeml. fjell vid Herjed. gränsen, t. ex. Syltopparne. Herjed. Axhögen. VB. Pajala. — N. Finnm.; Nordl. Bejeren: Norm.; Dovre, Drivstuen och Vaarstien, samt omkring Kongsvold och Jerkind; Gudbrandsdalen. Vindhøllen i Lejerdal. Bergens st.) *Rotstocken icke ell. blott ett par tum krypande; dessutom skiljd från föreg. med sitt violetta ax och nedom borsten tvärhuggna, ej, såsom hos föreg., småningom till borsten afsmalnande skärmfj.**

- 8 *T. caninum* L. roten, rotstocken och stråen som hos föreg.; bladen som hos föreg., på båda sidor stråfva; axet slakt och meränd. lutande, med närsittande småax; skärmfj. 3—5nerviga borstspetsade; yttre blomfj. med lång fterböjd borst. 2 6. Fig. Fl.D.1447. Ands.t.1.f.5. H.N.f.6, n:o 97 och f.11, n:o 93.

Lundar. (Sk.—*Lpl. Boh. — N.* till Ost-Finnm.) *Högt tufvadt, ljusgrönt gräs, meränd. med lutande strå och ax; blomfj:s borst oftast längre än hela småaxen. En mager form: v. biflorum, med 2blomm. småax, är lemnad i H.N.f.11, n:o 93. — Elymus L.Fl.Su. och Herb. Agropyrum RS.*

474. *ÉLYMUS* Lin. Klm, Strandråg.

1 *E. arenarius* L. hela gräset *blåaktigt*; bladen *rännformiga*, *snart hoprullade*, *stylspetsade*, med *glatta* slidor; småaxen 3—4blommiga; skärmfj. smalt lancettlika uddspetsade; blomfj. trubbiga, *borstlösa*. 2 7. Fig. Sv.B.60. Fl.D.847. Andst.1,f.7. H.N.f.4, n:o 99.

\* *geniculatus* Curt. axet glesare; skärmfj. smalare,  $\frac{1}{2}$  längre än småaxet. Fig. Linn. Fund.Agr.t.1,f.5. H.N.f.7, n:o 98.

Sand. stränd. särd. hafsstr. (Sk.—Um. Lpm. vid Vindelelfven. VB. vid Luleå stad och skärg. upp till Haparanda; vid Sangis- och Kalix-elf. Hall. Boh. Öl. Gottl. I det inre landet: Smål. Lagans strand vid Ösle i Berga. Vettern vid Jönköping, Medhamra i ÖG. samt i trakten af Carlsborg i VG. Dalsl. Bäckefors bruk: Stud. Thorstenson. — N. till Finn. Gudbrandsdalen, vid Vaagevandet. — \* *Halmstad* bland a, endast ett par tuvor funna: Fr.) 2 *alnar högt gräs med hvetelikt ax, som hos \* kan blifva n. 1 fot långt och ofta vid nedre småaxen tvärt omböjdt, likasom afbrutet.*

2 *E. europæus* L. gräset *grönt*; bladen *platta*, med *stråfhåriga* slidor; småaxen 1—2blommiga; skärm- och blomfjällen med *lång borst*. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1631. Andst.1,f.8. H.N.f.4, n:o 93.

Skogsback. r. (Sk. Röddinge. Smål. Eds sn, Djurnäs. Öl. Tveta och Halltorp. Gottl. Mickelsängen vid Vängemyr; Sjonhem och Viklou snr enl. G. v. Ced.) *Liknar mer följ. släkte; småaxen mest enblommiga med ett borstlikt ämne till den andra blomman.*

475. *HORDEUM* Lin. Slö-korn.

1 *H. murinum* L. bladen i kanten *stråfva*, med *glatta* slidor; mellersta småaxet 2-könadt, med *hårbraddade* skärmfjäll; sidoaxen af hanbl., med *ena* skärmfjället *hårigt*, *det andra stråft*; alla blrna med borst. 6. Fig. Fl.D.629. Andst.1,f.9. H.N.f.16, n:o 75.

Jordvall. vid byar och städ. (Sk. Christianstad; Ystad enl. F. Aresch.; vest. kust. från Skanör till Hall. Laholm. Gottl. Visby: G. v. Ced.) *Stråen bladiga ända upp mot axel.*

2 *H. pratense* Huds. bladen *öfverallt* stråfva, de nedre med *håriga* slidor; *alla* skärmfjällen *borstlika stråfva*, *utan hår*; för öfr. som föreg. 2 6, 7. Fig. Fl.D.630. Andst.1,f.10. H.N.f.6, n:o 98.

Fukt. äng. r. (Sk. teml. allm. i sydv. del.; Öfvedskloster enl. F. Aresch.) *Strået högre och spensligare än hos föreg., upptill utan blad; axen hälften smalare.* — *H. murinum*  $\beta$  L.Fl.Su. *H. secalinum* Schreb. — Ann. *H. maritimum* Wüh. lär, enl. de upplysn. utg. numera vunnit, vid Göteborg och i N. endast förekomma på ballastplatser (se Bih.).

476. *LEPTORUS* R. Br. Ormax.

1 *L. filiformis* Trin. axet trindt, utdraget syl-lik; småaxen enblommiga med 2:ne skärmfjäll; blomfjäll föga kortare än skärmfj. 6, 7. Fig. Fl.D.938. Andst.1,f.12. H.N.f.11, n:o 94.

Hafsstr. r. (Sk. Hvellinge och lilla Hammar; Landskrona; Lomma enl. F. Ar.) 3—6 t. långt, *uppböjdt strå med trådlikt, vanl. båglikt böjdt ax, särd. då det torkat. Var. spådare, med n. rakt ax, hvilken form hos oss varit ansedd för L. filif., hvaremot den gröfre med krökt ax tagits för L. incurvatus Trin. Lange har emellertid i sin Haandb. ed.3 bekräftat Kochs och fleres åsigt, att L. incurv. är en blott sydeuropeisk och skild art, samt att båda de hos oss befintliga formerna tillhöra L. filif. — L. incurvatus ed.9. Rottboellia L.*

477. *LOLIUM* Lin. Repe.

Utan rotstock och bladskott vid stråets bas.

1 *L. temulentum* L. skärmfjället af småaxens *längd ell. längre*; yttre blomfj. med *utdragen*, oftast *ganska lång borst*. 6, 7. —  $\beta$  *arvense*: borsten kortare än blomfjället. Fig. Sv.B.192. Fl.D.160. Andst.2,f.13.

Åkrar. (Sk.—Hösl. Dal. och Verm. Boh. Öl. Gottl. — N. till Trondhj. —  $\beta$  mer Hartman, Skandinavien Flora (10:de uppl.).



sällsyn.) 2—3 fot högt gräs med långt och gles ax; borsten vanl. 3—4 lin. lång. — *β L. arvense* With.

2 *L. Linicola* Sond. skärmsf. vanl. kortare än småaxen; ytt. blomf. med mycket kort ell. ingen borst. ☉ 7. Fig. Sv.B.593. Fl.D.1864. Andst.2,f.14. H.N.f.2, n:o 78.

Linåkrar. (Sk.—Ångml. och Jemtl. Ströms sn. Boh. Öl. Gottl. Burs sn. — *N. till* Ranen i Helgeland.) Spensligare än de öfriga arterna, men icke såll. lika högväxt som föreg. — *L. arvense* Schrad.

†† Med krypande rotstock, och bladskott vid stråets bas.

3 *L. perenne* L. skärmsf. kortare än de aflånga—ovala småaxen; blomf. utan borst. 2, 6, 7. Fig. Sv.B.71. Fl.D.747. Andst.2,f.15.

Torra st. åkerren. a. (Sk.—Um. Lpm. och VB. Bondersbyn vid Kalix-elf. Hall. Öl. Gottl. — *N. i* sydl. del. af Aggerh., Christianss. och Bergens st.) Axet plattare än hos de öfriga, meränd. något vridet; småaxen ofta dubb. längre än skärmsfjället. Var. mera spdd, med småax. fåblomm., föga längre än skärmsfj.

4 *L. festucaceum* Link: skärmsf. flere gånger kortare än de jemnbreda småaxen; blomf. utan borst. 2, 6, 7. Fig.

Fukt. st. r. (Sk. Helsingborg på hafstranden; Björka i Kropps sn enl. F. Ar.) Sk. ex. hafva 1—1½ qv. långt ax och alla de tumslånga småaxen fullkomligt oskafade, utan spår till något inre skärmsfjäll, således ett verkligt Lolium. Är sannolikt hybrid af *L. perenne* och *Festuca elatior*. Figg. och synonym. i ed.9 torde rättast böra hänföras till den mycket liknande *Glyc. loliacea*, hvilken af de flesta förf. ansetts vara identisk med ell. ätm. afven innefatta närv. form. — *Festuca loliacea* Huds. och *Brachypodium loliaceum* Fr. (till en del).

#### 478. BRACHYPODIUM Pal. B. Axlosta.

1 *B. pinnatum* PB. bladen korta, håriga och mycket sträflva, med n. glatta slidor; axet styft, af föga åtskiljda småax; blom borsten kortare än sitt fjäll. 2, 6. — *β rupestre*: småaxen fullkomligt glatta. Fig. Sv.B.739. Fl.D.2525. Andst.2,f.18. H.N.f.12, n:o 93.

Torra äng. (Sk. Smål. öst. och mell. del.: Scheutz. — Uppl. Vestml. Verml. VG. Öl. Gottl. — *N. till* Froen i Gudbrandsdal. — *β N.* Christiania, och Valders ofvan gården Rejen.) Småaxen ½—1 tum långa, vanl. småhåriga. — *Bromus L. Festuca* Schrad. *Triticum* Mönch.

2 *B. gracile* PB. bladen långa, håriga och föga sträflva, med håriga slidor; axet slakt, af mer gles sittande småax; blom borsten längre än sitt fjäll. 2, 6, 7. Fig. Fl.D. 164. Andst.2,f.17. H.N.f.12, n:o 94.

Lundar. (Sk. Smål. öst. del., och Grenna: Scheutz.—Uppl. särdeles i skärgården. VG. Öl. Gottl. — *N.* Aggerhus, Christiansands och Bergens st.) Högre, mera slak och hårig än föreg. — *Brom. silvaticus* Sm. *B. pinnatus* Fl.D. *Brach. pinnat.* *β Wg.* *B. silvaticum* RS.

2 Flocken *Festucaceæ*. Småax skaftade [i vipa]. Skärmsfjällen kortare än blomfjällen.

#### 479. CYNOSURUS Lin. Kamm-åxing.

1 *C. cristatus* L. vippan tät, axlik, n. cylindrisk, upprätt och styf, ensidig; småaxen utan märklig borst. 2, 7. Fig. Sv.B.66. Fl.D.238. Andst.2,f.19.

Ångvall. (Sk.—Uppl. Medelp. Sundsvall, vid Marieberg. Ångml. Själevad sn. Ner. Dalsl. VG. Boh. Öl. Gottl. — *N. till* nor. del af Bergens st.; inuti landet till Dröbak.) Bladen small jemnbreda.

#### 480. DACTYLIS Lin. Hund-åxing.

1 *D. glomerata* L. vippan ensidig, med ensidigt gytttrade småax på ensamma, nedtill bara vippgrenar. 2, 6, 7. — *β lævigata*: bladen glatta. — *γ lobata* Drej. småaxen gytttr. i vippgrens spets, vanl. 3blomm. Fig. Sv.B.32. Fl.D.743. Andst.2,f.20.

Öd. st. a. (Sk.—Ångml. och Jemtl. — *N. till* Finn. — *β Sk.* Båstad, Persbög. Hall. Varberg. VG. Kinnekulle, vid Mörkeklef. Dalsl. Lundby i Töftedals n. enl. Lem. ÖG. Stockh. Helsl. Söderhamns skärg. enl. Wistr. Öl. Outenby. Gottl. —

N. Levanger och Trondhj. flerstädes. —  $\gamma$  Sk. i Alnarps skog. *Blek.* Tubbaryd enl. Goss.) *Stort och vanl. stråbladt, ofta blåaktigt gräs.* —  $\gamma$ , ehuru afvikande till uts., är väl knappt annat än en spåhare skuggform.

## 481. FESTUCA Lin. Svingel.

† Alla bladen likformiga platta, med odeladt snärp.

\* Blomfjället mycket kortare än sin borst.

1 *F. gigantea* Vill. bladen mycket breda, glatta, stråsprickiga, med kort snärp; vippan af långa slaka grenar; blomfj. med hårfina borst. 24 6. —  $\beta$  *triflora*: bladen dubb. smälare; axen 3—4blommiga. Fig. Sv.B.120. Fl.D.1630;  $\beta$  440. Andst.2.f.21.

Lundar. r. (Sk.—Uppl. *Vestm. Ner. VG. Dalsl. Boh. Öl. Gottl.* — N. Christiania; Asker etc. —  $\beta$  VG. Halleberg. *Gottl.* i Vänge; — N. Christiania; Ullerud.) *Har vanl. 4—6 lin. breda blad, utbredd, slak och gles vippa af 5—9blommiga småax.* — *Bromus* L.

\*\* Blomfj. med mycket kort ell. ingen borst.

2 *F. silvatica* Vill. strået vid basen omgivet af tjusa, *bladlösa slidor*; bladen *som hos föreg.*, med *uldraget* snärp; vippan mycket grenig *upprät* ell. *ensidigt lutande*; småaxen afånga 3—5blommiga; blomfj. *utan borst.* 24 6. Fig. Fl.D.1145. Andst. 2.f.22. H.N.f.9, n:o 95.

Bergstr. i skugga. r. (*Boh. Christinedal. Bratteröd och Lindesnäs nära Gustafsberg. VG. Halleberg, ofvan Stora Lindås; Hunneberg midt emot Bursle gästg.; Kinnekulle flerstädes. Ner. Gropdalen nära Kroksjön i Lerbäck; Hamrarne i Götunda. ÖG. Omberg, Oxbåset: J. E. Zett. Helsl. Elfåsen i Hassela enl. Wistr. Blek. Carlshamn, i Tubbaryds äng. Sk. Öfvedskloster, på Fruali. — N. Laurvig i Jordfalldalen. Christiansands st. Arendal vid Pusnäs; Tjos; Glomsdal söder om Åsersås k:a etc.; Christiania, i Nordmarken och Asker: Ax. Bl.) *Strået 3—4 fot högt; bladen 3—5 lin. breda, med långt afsmaln. spets.**

3 *F. arundinacea* Schreb. bladen *småla*, jemnbreda, stråfva, med n. *omärkligt* snärp; vippan *utbredd lutande*; småaxen bredt lancettlika, 3—7blommiga; blomfj. med *mycket kort* ell. omärkl. borst. 24 7. —  $\beta$  *pauciflora*: spåhare; småaxen 3blomm., med tydligare borst. Fig. Fl.D.2463. E.B.1593. Andst.2.f.23. H.N.f.9, n:o 94.

Hafsstr. (Sk.—Gestr. *Medelp. Sundsvall. Hall. Boh. Lysekil. VG. Göteborg. Öl. Gottl.* — N. Christiania, Dröbak, Porsgrund, etc.) 4—5 fot hög, *med större vippa och de brungröna småaxen bredare än hos följ.*  $\beta$  *har fåblommiga och glesa småax med en linie långa borst.* — *F. elatior* E.B. [på grund af Lin. herb.] *F. litorea* Wg.

4 *F. elatior* L. bladen *som hos föreg.*, föga stråfva; vippan yngre sammandragen, vid blomm. *utstående, lutande*; småaxen jemnbreda 6—10blomm., *utan borst.* 24 6. —  $\beta$  *subuloticea*: vippan ax- ell. klaselik, med n. ensamma, skiftevisa och föga ell. icke skafade småax. Fig. Sv.B.54. Fl.D.1323. Andst.2.f.24.

Äng. a. (Sk.—VB. Haparanda. *Jemtl.* — N. till Bodö.) *Småaxen hälften smälare än hos föreg. n. alltid gröna, hos  $\beta$ , som mycket liknar ett Lolium, oftare brunell. grågröna.* — *F. pratensis* Huds.

†† Alla bladen eller rotbl. borstlika ell. trådsååla, med 26radt snärp.

5 *F. rubra* L. stråen jemte *nedliggande* grenskott från en *krypande* rotstock, något *enstaka*, de förra *trinda*; rotbl. hoprullade trådsååla, de öfre bladen bredare, *platta*; vippans grenar *upprätta* ell. *utstående*, med lancettlika 5—9blomm. småax; blom-borsten hälften kortare än sitt fjäll, stundom omärklig. 24 6. Fig. Reich.f.321. Andst. 2.f.25.a. H.N.f.12, n:o 92 [var.].

Skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.: Bl.) *Stråen mer enstaka än hos de följ. med bredare och plattare blad. Var. i fjelltr. med sammetsludna småax, hvilkas blr n. sakna borst: var. alpestris ed.9. En form med ludna småax, som växer på sandiga lokaler, är F. arenaria Osb.*

6 *F. duriuscula* Fr. stråen och grenskotten från en *trådig* rot, *upprätta, tuffade*, de förra *trinda*; bladen *trådsååla, rännformiga*, ell. *platta* och snart hoprullade, de öfre något bredare; vippan *ensidig*, med lancettlika, 3—5blomm. småax; för öfr. som

föreg. 2, 6, 7. —  $\beta$  *cæsia*: blad korta blåaktiga, håglikrökt. —  $\gamma$  *glauca*: bl. utdragna blåaktiga, något styfva. —  $\delta$  *fusca*: vippan smal och n. enkel, mörkt violett. Fig. Fl.D.1628. Reich.f.302—311 [varr.]. Andst.3.f.26. H.N.f.8, n:o 94;  $\beta$  f.5, n:o 98.

\* *dumetorum* L. högväxt, med hoptufvade strån och bladskott; rotbladen långa trådlika. Fig. H.N.f.5, n:o 97.

Torra st. varr. på sand. (Sk.—Uppl. Helsl. Bollnäs prestg. enl. Wistr. *Vestml. Verm.* och *Dalsl.* i Venerstrakten. *Hall. Öl.* — N. till Ost-Finm. enl. Bl. — \* på steniga hafsstr. Sk.—Helsl. *Ängml. Boh.* — N. från Christiania till Finm. Lyngseidet.) *Skiljd från föreg. med sin tätt tufvade växt, utan märkligt krypande rotskott; från följ. med större och slakare vippa, större småax och bredare, strax de utslå, platta stråblad.* *F. dumet.* är en medelform till föregående, och troligen samma form som *F. nemorum* Leys. och *F. heterophylla* Hænke.

7 *F. ovina* L. strånen och grenskotten som hos föreg., de förre upptill kantiga; alla bladen likformiga borstlika; vippan smal ensidig upprät, med aflånga, 4—6blomm. glesa småax; blomfjällen meränd. med kort borst. 2, 6. —  $\beta$  *tenuifolia*: blrna n. borstlösa; bladen tagelsmala. —  $\gamma$  *vivipara*: bl. något rännformiga; blrna borstlösa, ångroende. —  $\delta$  *vaginata*: strået högt upp beklädt med bladlösa halmgula slidor från fjälåret. Fig. Sv.B.78. Fl.D.2462. Andst.3.f.27. H.N.f.8, n:o 93.  $\gamma$  Fl.D.2043. H.N.f.5, n:o 96 [ena ex.].

Torra st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm. —  $\beta$  Sk. —  $\gamma$  i fjellen. —  $\delta$  Öland, på Alfvarén.)  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, med smal, endast under blomn. öppen vippa af 2 lin. långa småax, som vanl. äro gröna ell. gråaktiga, i fjelltrakter ofta violetta: *F. violacea* Gaud. —  $\delta$  *F. glauca* Fr.

#### 482. VULPIA Gmel.

1 *V. sciuroides* Gm. strånen från en trådig rot, tufvade; alla bladen borstlika; vippan ensidig, upprät, axlikt sammandragen, med omkr. 6blommiga, plattade småax på uppåt vidgade skaft; blomfj. med lång borst. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.1445. Andst.3.f.28. H.N.f.13, n:o 93.

Torra st. r. (Sk. öst. kusten vid Stenshufvud, i branterna mot hafvet; Alnarp; Dybeck enl. Leffl. *Blek.* på strandklipp. vid Mörrum.) Nära fotshög med gles och kort [ $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$  t. lång] vippa af nära halftumslånga gröna småax. — *V. Myuros* v. *bromoides* Parl. *Festuca* Roth. *F. bromoides* ed.9.

#### 483. SCHEDONORUS PB. Fr. Svingellosta.

† Blomborsten kortare än sitt fjäll, stund. n. ingen.

†1 *S. inermis* RS. bladen flere gånger bredare än strået, i kanten sträfv, eljest glatta, med glatta slidor; vippan upprät; småaxen jemnbredt lancettlika, 5—9blommiga; blomfj:s borst omärklig ell. 5—6 gång. kortare än fjället. 2, 6, 7. Fig. Fl.D.1805. Andst.3.f.29. H.N.f.7, n:o 94; f.11, n:o 90.

Äng. r. (Uppl. Uppsala, Marielund; Vallox-Säby; Rosersberg.) Stort gräs, med tumslånga småax. — *Bromus* L. *Festuca* DC.

2 *S. erectus* Fr. bladen föga bredare än strået, hårbräddade, de nedre med håriga, de öfre med glatta slidor; vippan och småaxen som hos föreg.; blomfj:s borst rak, omkr. hälften kortare än sitt fjäll. 2, 6, 7. —  $\beta$  *laxus*: bladen ofvanpå håriga, bredare än strået; småaxen n. dubbelt större, 8—11blomm. Fig. Fl.D.1383. Andst.3.f.31. Reich.f.360;  $\beta$  359. H.N.f.9, n:o 96.

Torra äng. åkerren. etc. r. (ÖG. Marmorbruket; Karstorp i Slaka: Kindb. *Stockh.* Gröndals park. Uppl. *Vestml.* Ryd i Granhammars äng; Kageholm på Lillön i Mälaren; Frötuna. *Boh.* Gullmarsfjorden. *Gottl.* Visby i Snäckgårdet. Fordom äfven i Sk. vid Rörm. — N. Frydenberg nära Christiania. —  $\beta$  Sk. enl. ex. ford. lemnadt af Fries. *Rosl. Gottl.*) Utmärkt af de knappt  $\frac{1}{2}$  lin. breda, långa och håriga rotbladen, något smal och sammandragen vippa.  $\beta$ , som är *Bromus suberectus* Fr., är bestämd efter Reich., som anser den vara en skuggform af a. — *Bromus* Huds. *Festuca* Wallr.

3 *S. asper* Fr. bladen flere gånger bredare än strået, sträfv och håriga, ätm. de nedre med sträfhåriga slidor; vippan utbredd, ensidigt lutande; småaxen som hos föreg.; blomfj:s borst något kortare än sitt fjäll. 2, 6, 7. Fig. Sv.B.473? Fl.D.1382. Andst.3.f.30. H.N.f.4, n:o 97.

\* *serotinus* (Ben.), alla bladslid. håriga; småaxen större, med inre skärmsf. glatt; yttre blomfj. mot spetsen glatt.

Lundar, r. (Sk. Smål. vid Husqvarna. ÖG. Omberg; Klefberget; Kindb. Stockh. Svartsjö slott; Vermdön; Viksberg. Rosl. Norrtelge, Sessö. VG. Kinnekulle; Halle och Hunneberg. Boh. Christinedal. Öl. Goull. — N. Langesund på hafsklipporna. Åserald i Christiansands st. Findö vid Stavanger. — \* Sk. vid Rönneå enl. A. Falck; Stenbyhallar enl. Lem. Öl. Borgholm enl. A. Falck. Goull. Klinte enl. Lem.) *Stort gräs med slak vippa och ofta nära ½ tum breda blad; de öfres slidor hos S. asp. dels finludna, dels glatta; ytt. blomfj. vanl. hårbräddadt ända upp, men stund. äfven i spetsen glatt, såsom S. serot. beskrifves, hvars karakterer ej synas nog konstanta. — Bromus Murr. Festuca Mert. Br. erectus Sv.B. en tvetydig, ell. dålig figur.*

†† Borst af blomfjällets längd ell. längre.

4 *S. sterilis* Fr. bladen finludna; vippan med lutande topp och långa åt alla sidor utsperrade slaka grenar, 1—3 tillhoppa; småaxen jemnbredt lancettlika, slutt platta och mot spetsen bredare; borsten längre än sitt fjäll. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.467. Fl.D. 1325. Andst.3,f.32. H.N.f.1, n:o 80.

Torra st. r. (Sk. Lund; Helsingborg; Landskrona etc. Hall. Stockh. Goull. Visby; G. v. Ced.; Lilla Carlsön. — N. Christianiafjorden, på Sandö en gång.) *Ålnshög och mera, med gles, men yfvig vippa af 1½—2 tum långa småax. — Bromus L.*

5 *S. tectorum* Fr. bladen mjukhåriga; vippan med åt en sida lutande grenar, 5—7 tillhoppa; småax. som hos föreg.; borsten af fjällets längd. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.1806. Andst.3,f.33. H.N.f.11, n:o 91.

Torra st. (Sk.—Uppl. Vestml. Köping. Ner. Verml. Dalsl. Boh. Öl. Goull. — N. Bergens st. Lerdal och Leganger; sällsynt.) *Sällan öfver fotshögt gräs, med smälare och mer ensidig vippa än föreg.; småaxen vanl. smäludna, säll. glatta. — Bromus L.*

#### 484. BROMUS Lin. \*) Losta.

† Inre och yttre blomfjället lika långa.

1 *B. secalinus* L. strået och bladslid. glatta; bladen håriga; vippan slutt. lutande, med talrika udragna grenar i samma led; småaxen åggründt aflånga meränd. glatta; blrna vid mognaden åtskiljda, med inga ell. något krokiga borst, kortare än det strax nedom midten bredare, yttre fjället. ☉ 6, 7. Fig. Sv.B.204. Fl.D.293 och 1446. Andst.3,f.35.

Åkr. a. (Sk.—Lpl. — N. till Trondhj. st.) *Högt gräs med tjocka, gröna ax, af tyngden slutt. lutande. Var. med stora, mer än tumslånga, mångblomm. småax: v. grossus, och den allmänna med smärre ax.*

2 *B. arvensis* L. stråen glatta; slid. och bladen håriga; vippan utbredd, slutt. lutande, med 3—8, udragna grenar tillhoppa; småaxen jemnbredt lancettlika plattade glatta; blrna iättliggande med rak borst, längre än det ofvan midten bredare yttre fjället. ☉ 6. — *β oliganthus*: småaxen flere g:r mindre, 5—6blommiga. Fig. Fl.D.2527. Reich.f.343. H.N.f.6, n:o 88.

\* *patulus* MK. vippan lutande; småaxen med mer utstående blr och borst. Fig. Reich. f.344. H.N.f.15, n:o 95.

Odl. st. åkerren. (Sk.—söd. Lpl. och VB. nor. del. — N. Christiania; Tvedestrand; Mandal. Finnm. Talvig. — *β* Uppl. Löfsta bruk; Lennartsnäs i Näs sn. — \* Sk. Lund; Malmö; samt Hven enl. F. Åresch.) *Vippan vanl. stor, utbredd; småaxen smala, tumslånga, meränd. bruna; ståndarknapp. guldgula. \* B. pat. har lika stora småax som α, men blrna något mer skiljda och utstående med spetsen, samt med mer och mindre utböjd borst.*

†† Inre blomfj. märkbart kortare än det yttre.

3 *B. commutatus* Schrad. bladen och slid. mjukhåriga; vippan lutande, med 2—7 gre-

\*) Babington äfvenom Godr. & Gren. hafva efter Parlatore autagit namnet *Serrafalcus* för detta slägte, med bibehållande af namnet *Bromus* för *Schedonorus*.

nar *tillhoppa*, de flesta kortare än småaxen; dessa *utdraget lancettlika*, 9—11blomm., omärkligt sträfvä; blrna tätt tegellagda, med yttre fjället *ofvan* midten bredare; borsten n. af fjällets längd.  $\textcircled{D}$  6, 7. —  $\beta$  *simplex*: vipp. upprät enkel, med uppräta, finludna småax. Fig. Fl.D.2526. Reich.f.347. Andst.4.f.37. H.N.f.6, n:o 89.

Åker- och ångsren. r. (Sk.—Boh. och VG. ÖG. Gistads prestg. Uppl. Uppsala. Öl. Borgholm; Näsby i Åhs sn enl. Lemf. Gotl. ymn. i ången vid Kams gästg.) *Yppiga former likna mest B. secal., men hafva tätare vippra af ofta helt korta grenar, endast en ell. annan längre utdragen; magra former, med n. klaselik vippra, äro knappt skiljbara från följ. — B. pratensis Ehrh. enl. Fries.*

4 *B. racemosus* L. vippan upprät, n. klaselik, gles, med korta, *ensamma ell. parvisa* grenar; småaxen lancettlika 7—9blomm.; det yttre blomfjället bredast vid midten; för öfr. som föreg.  $\textcircled{D}$  6. Fig. Fl.D.2644. Reich.f.348. Andst.4.f.36. H.N.f.6, n:o 90.

Fukt. ång. r. (Sk. Hall. vid Kärup; i nor. del, vid Algussered. Boh. upp till Uddevalla. VG. Rackeby sn, Degeberg; Göteborg. Blek. Ronneby. Smål.?) *Småaxen oflast helt kort skafade gröna, lika föreg.; men, då yttre blomfjället hos denna har kanten vidgad till en trubbig, ehuru rundad vinkel, har den hos B. racem. en jemn böjning. — B. pratensis Ehrh. enl. Koch.*

5 *B. mollis* L. vipp. aflångt äggrund, *tät*, upprät, med 2—4 mycket korta grenar *tillhoppa*; småaxen *äggrundt aflånga*, vanl. *mjukhåriga*; blrna tätt tegellagda, med yttre fjället bredast ofvan midten; för öfr. som föreg.  $\textcircled{C}$  6, 7. —  $\beta$  *glabratus*: ax glatta, n. utan glans. Fig. Sv.B.456. Fl.D.1324. Andst.4.f.38. H.N.f.7, n:o 96;  $\beta$  f.8, n:o 95.

\* *hordeaceus* Wg. lågväxt och mer tufvad, med tätare vippra af glatta glänsande ax. Fig. Andst.4.f.39. H.N.f.7, n:o 97.

Od. st. back. (Sk.—Ängml. och Dal. Öl. Gotl. — N. till Trondhj. st.)  $\alpha$ , med *mjukhåriga ax*, var. från *alnshög* med rik vippra, till *fingerhög* med 1—2 småax: *B. nanus* Weig.

#### 485. BRIZA Lin. Darrgräs.

1 *B. media* L. vippan upprät, med utsperrade grenar; småaxen hängande, slutl. hjertlika, 7—11blommiga; skärmfjällen kortare än de nedre blomfjällen.  $\textcircled{A}$  6, 7. Fig. Sv.B.300. Fl.D.258. Andst.5.f.52.

Äng. a. (Sk.—VB. och Jeml. — N. till Trondhj. st. Ost-Finnm.: Deinb. enl. Bl.) Var. till storlek och blrns antal i småaxet, samt dellas färg.

#### 486. POA Lin. Ängsgröe.

† Rotstocken med vidlyftigt krypande skott.

1 *P. pratensis* L. sträet och slidorna *trinda, glatta*; bladen på sträet vanl. korta, något breda, med kort, tvärhugget snärp; vippan *utbredd*, med 3—6, utstående grenar *tillhoppa*; småaxen äggrunda 3—5blommiga, med ludd mell. blrna.  $\textcircled{A}$  6, 7. —  $\beta$  *humilis*: lågväxt och mjuk, med 3—4blomm., violetta småax. —  $\gamma$  *rigens*: något styft gräs; bladen korta; vippan af utsperrade grenar, med ett litet antal silkesludna småax. —  $\delta$  *costata*: vipp. smal af korta grenar; småax af 3, upphöjdt nerviga blr. —  $\epsilon$  *angustifolia*: högväxt, med långa trådsmla rot- och rotskottsblad. Fig. Sv.B. 88.f.1. Fl.D.1444. Andst.4.f.40. H.N.f.9, n:o 93 [varr.].  $\delta$  Fl.D.2402.

Äng. etc. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\gamma$  i fjelltr.) Vanl. *högt, glatt och rikblommigt gräs*. Blir i fjellrakter stundom späd och smalbladig med hälften mindre småax: var. *alpestris* Fr. H.N.f.9, n:o 93.A. —  $\gamma$  närmar sig mycket följ. art, likasom  $\delta$  till *P. compressa*. — *P. angustifol.* L. herb.

2 *P. cenisia* All. sträet och slid. n. *trinda, glatta*; bladen på sträet 2—3, *smala*, med något utdraget snärp; vipp. *utbredd*, af *ensamma ell. parvisa, glatta* grenar, med 1—3, ovala, 2—5blomm. småax och lancettlika blr med ludd.  $\textcircled{A}$  6, 7. —  $\beta$  *flexuosa*: n. fots hög; vippan liten, upprät, gles, med slutl. horisontala grenar, de nedersta längst. —  $\gamma$  *abbreviata*: lågväxt, strå och slidor något plattade; vippan äggrund. Fig. Sv.B.704. Andst.4.f.41. H.N.f.6, n:o 84;  $\beta$  f.3, n:o 94;  $\gamma$  f.7, n:o 93.

Fjelltr. (Torn. och Lul. Lpm. — N. Ost-Finnm.—Dovre; Goustaß. etc.) *Fotshögt, spensligt, men teml. styft gräs med smala blad och gles axfattig, vanl. violetbrun vippra.  $\gamma$  3—6 tum hög, skiljd från P. laza med söga annal än något krypande rotskott och mer utbredd vippra: P. arctica Br. — Anm. P. disitiflora*

*RS.*, kvartill Blytt i Norg. Fl. med ? förer en af honom funnen blekare form, lorde afven, om man kan döma af de sinsemellan nog stridiga beskrifningarne, höra hit.

- 3 *P. compressa* L. det styfva strået och slidorna plattade; bladen smala, med kort snärp; vippan vanl. smal och upprät, ensidig, med 2 ell. flere sträfva grenar tillhopa; småaxen 3—9blommiga, utan ludd mell. blrna. 24 6. —  $\beta$  *Langeana*; mer grön, alnshög; vippan stor och slak. Fig. Fl.D.742. Reich.D.Fl.f.401,  $\beta$  f. 402. Andst.4.f.42. H.N.f.13, n:o 92.

Torra st. mur. (Sk.—Hels. och Dal. Boh. Öl. Gotl. — N. söd. och vestra del.; nordligast vid Trondhj. och Stördalen. —  $\beta$  N. Christiania flerst.; Toten.) Blåaktigt, smalbladigt gräs med platt strå, knappt tumsbred vippa, vanl. smala mångblomm. småax. —  $\beta$ , som af Blytt upptages som egen art, är väl icke annat än en luxurierande lokalform.

(*P. sudetica*.)

†† Rotstocken utan längre kryp. skott [stråen tufvade]; skärnf. n. liklånga.

\* Vippan med 3 ell. flere grenar i de nedre lederna.

a — Bladskotten och slid. mer ell. mindre [alltid tydligt] plattade.

- 4 *P. sudetica* Hænke: bladskott. och slid. plattadt Zeggade, sträfva; bladen flere gånger bredare än strået, med kort, trubbigt snärp; vippan öppen ell. utbredd, mer och mindre slak; småaxen ovala 3blommiga, utan ludd mell. de nerviga blrna. 24 6, 7. Fig. Sv.B.614. Fl.D.1924. Andst.4.f.43. H.N.f.7, n:o 91.

Fukt. lund. särdeles i bergstr. r. (Lpl.—Gestr. och Verm. Uppl. vid Mellsjön i Tibble, och i Ålands sn enl. Lem. Vestml. Sätra brunn. Ner. Hamrarna i Götlanda. ÖG. Kinda, vid Borgberget. Smål. Husqvarna: Zett.; Gärdsrum sn: Scheutz. Blek. mell. Mörrum och Elleholm. Sk. Gudmundtorp i Pinelierna. — N. Från Ranen i Trondhj. st. på spridda st. ned till Christiania och Laurvig.) 2—4 fot högt, mjukt och bredbladigt gräs.

- 5 *P. trivialis* L. bladskott. och slid. något plattade, sträfva; bladen knappt dubb. bredare än strået, med utdraget, spetsigt snärp; vipp. utbredd och något slak; småaxen som hos föreg., med ett fint ludd mell. de nerviga blrna. 24 6, 7. Fig. Sv.B.88, f.2. Fl.D.1685. Andst.4.f.44. H.N.f.7, n:o 92.

Äng. fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) Strået vanl. sträff, dock stund. glatt, vippan meränd. grön, stundom mer färgad.

b — Bladskotten och slidorna trinda.

- 6 *P. serotina* Ehrh. strået utan lökformiga sidoskott nedtill; bladen smala, med utdraget snärp; vippan yfvtigt utbredd med sträfva grenar; småaxen äggrundt lancettlika, 2—6blomm., tvåfärgade; blrna med ludd. 24 7, 8. Fig. Sv.B.502. Fl.D.2166. Andst.4.f.45. H.N.f.6, n:o 83.

Fukt. st. stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl.) Växer mest i tufvor af talrika strån, hvilkas leder vanl. äro täckta af bladslidorna. Vippan rikblommig, yngre sammmandragen; småaxens blr gröna med brun ell. gul spets. — *P. angustifolia* Wg. *P. fertilis* Host.

- 7 *P. nemoralis* L. strået som hos föreg.; bladen smala, med omärkligt snärp; vipp. smal slak, med sträfva grenar; småax. lancettlika, 2—5blomm.; blrna utan ludd. 24 6, 7. —  $\beta$  *micrantha*; med små, knappt en lin. långa, 2blommiga småax. —  $\gamma$  *glauantha*; blåaktig; vippan tät gråbrun, med stora 4—5blomm. småax. Fig. Fl. D.749 och 750. Andst.4.f.46.

Lund. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\gamma$  i fjelltr.) Spådt, men ofta högt gräs, hvars svarta ell. bruna leder sällan täckas af bladslidorna.

- 8 *P. bulbosa* L. strået med lökformiga sidoskott vid hasen; bladen korta och mycket smala, med utdraget snärp; vipp. upprät, jemnt spridd, n. alltid axgroende; småaxen aflånga 5—7blomm.; blrna lancettlika, tätt liggande, med ludd. 24 5, 6. Fig. Fl.D.2606. Andst.5.f.50. H.N.f.2, n:o 77.

Torra st. r. (Sk. Brösärps gästgg.; Käseberga enl. F. Aresch. — Stockh. Endast i de öst.

prov. Öl. Gottl.) 1—1½ qv. hög, med liten, men blomrik gråaktig vippa; de icke groende småaxen lika dem hos *P. compressa*. — *P. alpina* var. Wg. (*P. cæsia*.)

\*\* Vippan med mest parvisa grenar [1—3].

- 9 *P. alpina* L. strået och de korta, breda bladen glatta; de öfre bladens snärp utdraget, spetsigt; vippan upprät, styft äggrund tättblommig, med utspärade grenar; småaxen bredt äggrunda, 3—6blommiga, med ludd mell. de äggrunda blrna. 2½ 6, 7. —  $\beta$  *nodosa*: strået lågt, vid roten knöl-likt tufvadt; småaxen 3—4blomm. Fig. Sv.B.757. Fl.D.807. Andst.5.f.49.  $\beta$  Reich.f.390. H.N.f.4, n:o 96.

Fjelltr. a. (*Lpl.*—Held. Uppl. Godtsunda. Stockh. Danviksbergen: G. v. Ced. Dal. Boh. Hamnholmen vid s. Koster. Öl. Resmo; Thorslunda etc. — N. Finnm.—söd. delen. —  $\beta$  *Jemll.* Frösön. VG. Mösseberg. Smål. Kråkerum i Mönsterås sn enl. Ekstr. Gottl. Öl. — N.) *Har vippa af stora rödlätta, stundom axgroende småax; bladen vanl. 1—2, säll. 3 tum långa.  $\beta$  är omkring quartershög, med hårdt gytttrade bladlemningar vid roten, dock icke lökformiga som hos föreg.; dr P. badensis Gmel.*

- 10 *P. cæsia* Sm. strået styft, vanl. stråft; bladen styfva, korta och smala, med något utdraget, tvärhuggel snärp; vippan vanl. utbredd, med stråfva grenar; småaxen aflånga, omkr. 3blommiga, med lancetl. blr, n. utan ludd. 2½ 6, 7. Fig. Andst.4, f.47. H.N.f.3, n:o 95.

\* *Balfourii* Parn. grön; strået slätt; vippan mer utbredd; blrnas ludd tydligare.

\* *glauca* Vahl: bl. och strå blågrå; snärpet kortare; vipp. smal, af fåaxiga grenar. —  $\beta$  *firma*: blr smärre. Fig. Fl.D.964.

Fjelltr. (*Lpl.*—Dal. — N. Finnm.—Christiania. — \* *Balf.* N. Valdres, Dovre och Lomsfj. enl. Bl. — \* *glauca*: *Lpl.*—*Jemll.* — N. Ost-Finnm.—Christianss. st. enl. Bl. —  $\beta$  *Lul. Lpm.* Qvikkjokk. Boh. Strömstad enl. Beurl. — N. Salten.) *Strået omkr. fotshögt, vanl. med ett par skarpa linier, jemte bladen blågrönt; vippan efter blomn. hopdragen, grågrön ell. violett. Var. i hög grad. — P. aspera Gaud. — Anm. P. conferta Bl. från Kongsvold, som Blytt sjelf anser möjl. vara en form af P. Balfourii, är för utg. bekant endast af beskr. i Norg. Fl.*

- 11 *P. laxa* Hænke: strået och de utdragna, smala bladen mjuka och glatta; snärpet utdraget; vippan liten, meränd. smal klaselik, med lutande topp, glatta grenar; småaxen äggrunda 3—4blomm. med ludd. 2½ 7, 8. Fig. Fl.D.2342. Andst.5.f.48. H.N.f.6, n:o 85.

\* *stricta* Lindeb. med korta rotskott, inrullade blad och oftast axgroende vippa, smala, 2—3blomm. småax. Fig. Fl.D.suppl.65. H.N.f.15, n:o 94.

Fjellklipp. (*Lpl.*—Herjed. på Helagsfj. — N. från Finnm. till Goustafjell i Christianss. st. — \* *Jemll.* Åreskutan. — N. Merager; Dovre, på Knuds- och Nystuehue.) *Mjukt, tufvadt, quartershögt gräs, med smal, rödviolett, säll. grön vippa. \* är en medelform till P. cenisia.*

+++ Utan rotstock, enårig; skärmfj. mycket olikstora. -

- 12 *P. annua* L. strået något plattadt, jemte de n. dubbelvikna bladen mjukt; de öfre bladens snärp utdraget; vippan vidt utbredd, med vanl. parvisa grenar; småaxen äggrundt aflånga, 3—7blommiga med föga ludd. ☉ 4—9. Fig. Sv.B.126. Fl.D. 1686. Andst.5.f.51.

Allmän. (Sk.—*Lpl.* — N. till Ost-Finnm.) *Quartershögt mjukt gräs, mest med grön vippa; i fjelltr. mycket lågre, med smal, mera färgad vippa.*

#### 487. ARCTOPHILA Rupr.

- 1 *A. pendulina* Ands. strået nedtill rotsläende; bladen något styfva, glatta, med utdraget snärp; vippans grenar glatta, n. hårfina och slakt hängande; småaxen aflånga, 3—6blommiga. 2½ 7. Fig. Fl.D.2343. Andst.5.f.59. H.N.f.9, n:o 92.

Stränd. r. (VB. vid Tornioelf från Hietaniemi till Turtula; Tornio; sstr. vid Salminanti och Seivitz gästg.) *Åtshögt, teml. groft, glatt gräs; blomfj. hinnaktiga med grön medelnerv, inga ell. mycket otydl. sidonerver. — Glyceria Læst. och ed 9. A. Læstadii Rupr. A. fulva \* pendul. Ands. Gram.*

## 488. GLYCERIA R. Br. Vatten-Gröe.

† Yttre blomfjället 7nervigt: *Hydrochloa* Hn.\* Strået nedtill kull-liggande; vipp. med n. glatta grenar och stora [mer än  $\frac{1}{2}$  tum långa] småax.

- 1 *G. plicata* Fr. bladen dubb. bredare än strået, med kort snärp; vippan något ensidig, gles; de nedre grenarne 4—5 tillhoppa; småaxen jemnbreda, n. cylindriska, 8—13-blommiga; yttre blomfj. äggrundt aflånga, rundadt trubbiga. 2 7. Fig. Fl.D.2465. Andst.5.f.55. H.N.f.5, n:o 91.

Vattengrop. dik. (Sk. allm. *Blek*. Sissebäck: Goss. Smål. Kalmar; Jönköping. ÖG. VG. Kinnekulle; Hunneberg, vid Bursle. Verml. Venerstrakten. Hall. Boh. Gottl.) Mycket lik följ., med kortare, churu bredare och trubbigare blr, med högre nerver.

- 2 *G. fluitans* Br. bladen föga bredare än strået, med udraget snärp; vippan ensidig, gles; grenarne 1—3 tillhoppa; småax som hos föreg.; yttre blomfj. lancetl., trubbiga med kort spets. 2 6, 7. Fig. Sv.B.102. Fl.D.2403. Andst.5.f.54. H.N.f.5, n:o 92 och 93 [var.].

Stränd. dik. a. (Sk.—VB. — N. till Senjen.) Vanl. alnshögt gräs, med gles, stund. klaselik vippa af tumslånga smala, alltid gröna småax. — *Festuca* L.

- X *G. loliacea* Godr. bladen som hos föreg., med kort snärp; vippan smal axlik, af enstaka, oskaftade, ell. [de nedre] kort skaftade småax, en del stund. sammansatta; skärmfj. mycket olikstora, det yttre långt, smalt och spetsigt; blomfj. med hinnaktig spets. 2 6, 7. Fig. Reich.f.236. Andst.2.f.16. H.N.f.8, n:o 96.

Fukt. st. r. (Sk. Christianstad och Lund enl. F. Aresch.) Omkr. 2 fot hög, med utseende på en gång af föreg. och *Lolium perenne*, af hvilka den säkerligen är hybrid. Med sina, ädm. hos några småax, 2 skärmfj. skild från *Lol. festucae*, med hvilken den oftast plågat förenas. — *Festuca* Huds. *Brachypodium* Fr. (till en del).

\*\* Strået upprätt; vippan med stråfva grenar och talrika, små [2—3 lin. långa] småax.

- 3 *G. spectabilis* MK. bladen styfva, breda, med kort snärp; vipp. stor, jemnt utbredd, med 5 ell. flere grenar tillhoppa; småaxen aflånga, 5—9blomm.; blomfj. upphöjdt nerviga trubblade. 2 7, 8. Fig. Sv.B.30. Fl.D.920. Andst.5.f.56. H.N.f.9, n:o 91.

Vatten, r. (Sk.—Uppl. Norrtelge, Björnö, Os, Mellingsholm; Håtuna sn, i kanalen vid Nyborg. Medelp. Sundsvall. Dal. Grycksbo. Vestml. Stora Ekeby. Ner. Hjelmarsnäs; Villingsberg etc. Verml. och Dalal. i Venerstrakten allm. m. fl. st. Hall. Hasslöf: Theor. — N. Porsgrund; på Kragerö vid Fredrikstad; Christiania; Romerige.) Stort gräs med rik vippa, n. fingerbreda blad. — *Poa aquatica* L. Gl. aquat. Wahlb. *Molinia maxima* Hn ed.4

- 4 *G. remota* Fr. bladen mjuka, breda, med kort snärp; vippan gles, något lutande, med 3—5 grenar tillhoppa; småaxen aflångt jemnbreda, 4—6blommiga; blomfj. upphöjdt nerviga, sargadt trubbiga. 2 7. Fig. Fl.D.suppl.4. Fors.Lin.Inst.Skr. Andst.5.f.57. H.N.f.6, n:o 86.

Fukt. st. r. (Ängml. Bjertå, norr om Öster-Strinns vid Svartbäckens utlopp i Stormyren. Medelp. Sättna, nära Näsavattnet. — N. Asker vid Stockerelv, mellan Vöjen och Bjerke; Lillehammar vid Mesneelv; Maridalen; Ringeboe på Örsanden vid Laugen; Österdalen i Åmødt.) 3—4 fot högt, men spådt gräs; blrna starkt nerviga och vanl. mer färgade än hos föreg. — *G. norvegica* Somfl. *Poa* af Fors.

†† Yttre blomfjället 5nervigt: *Heleochloa* Fr.

- 5 *G. maritima* Wahlb. stråen uppstigande ell. upprätta; vippans nedre grenar parvisa, något ensidigt utstående, föga stråfva; småaxen aflånga, 5—8blommiga; blomfj. lancetlika med snedskuren, något spetsig topp. 2 7. Fig. Andst.6.f.60. H.N.f.5, n:o 94.

\* *festuciformis* Heynh. bladen trådsmla; vippan smal, af få och korta grenar. Fig. H.N.f.5, n:o 95.

Hafsstr. Blek. Smål. Kalmar; Vestervik. ÖG. Ekö i Norrköp. skärg. m. fl. st. enl. Kindb. Hall. Boh. Öl. Borgholm. — N. Christiania; Kragerö; Langöen; Arendal etc.; till Ost-Finm. enl. Bl. — \* Hall. Varberg. Boh. Koön. Öl. Ouenby och Näsby i Ås sn.) Vippans grenar mindre utsperrade än hos *G. distans*, vid



mogn. meränd. hopdragna, dock stund. en eller annan nedböjd; småaxen dubb. större, violetta, hos \* [som är en föga utmärkt form] blekgröna. — *Poa Huds. Puccinellia* [jemte de öfr. i afd.] Parlat.

- 6 *G. conferta* Fr. stråen tufvade, uppstigande; den jemnt spridda, tätta vippans nedre grenar omkr. 5 tillhopa korta uppstående och mycket sträfvä; småaxen jemnbreda, af 4—8, aflångt jemnbreda, otydl. 3flikiga blr. 24. Fig. Bot.Not.1851, n:o 6. Ands. Gram.t.6,f.61.

Fet dyjord, r. (Vid vestra kusten enl. Fr. Fordom i Sk. nära Ingelstorp i Broby sn. på ruten tång.) En medelform mell. föreg. och följ. Vippan åggrund. med trind, icke vid lederna platt ell. fårad blomspindel [rachis]; småax smärre än hos föreg. — *Sclerochloa Borreri* Bab. År, enl. Beurl., blott en lokalform af föreg.

- 7 *G. distans* Wg. stråen som hos föreg.; vippans nedre grenar utdragna, 3—5 tillhopa, slutl. nedböjda, något sträfvä; småaxen aflånga, 2—7blommiga; blomfj. äggr. aflånga med trubbig ell. n. tvärhuggen spets. 24 6, 7. —  $\beta$  *pukvinata*: 1—3 tum hög, med korta parvisa, föga utstående grenar. Fig. Fl.D.251 och 2222. Ands.t.6, f.62. H.N.f.6, n:o 87;  $\beta$  f.5, n:o 90.

Stränd. rännsten. etc. (Sk.—Ångml. VB. nor. delen. Vestml. Verml. Boh. Öl. Goull. — N. till Trondhj.) Var. i hög grad; vippan än tät och hopdragen, än gles med ut- och nedsperrade grenar, 2- till 7blommiga, gröna ell. bruna småax o. s. v. — *Poa distans* L. *P. salina* Poll. *P. arenaria* Retz.

#### 489. CATABROSA PB. Närvgräs.

- 1 *C. aquatica* PB. strået nedtill kryp. och rotslående; bladen platta, med kort snärp; vippans grenar 4—7 tillhopa, jemnt spridda och utstående, n. glatta; småaxen 1—3-blommiga, med sargadt trubbiga, upphöjdt nerviga blomfj. 24 6, 8. Fig. Sv.B.587. Fl.D.381. Ands.t.6,f.64. H.N.f.9, n:o 89.

Våta st. (Sk. Smål. i Kalm. län, och vid Jönköp. — Uppl. Ångml. Dal. Ner. VG. Göteborg. Boh. Grebbestad, och Nordkoster: Lem. Hall. Öl. Goull. — N. till Ost-Finnm.) Mjukt, bredbladigt, ofta flytande gräs. — *Aira L. Molinia* Wib. *Glyceria* Presl.

- 2 *C. algida* Fr. strået uppstig.—upprätt; bladen som hos föreg.; vippan tät, oftast axlikt hopdragen, grenarne 1—5 tillhopa, upprätta ell. utstående, glatta; småaxen enblommiga, med mycket små, ofta felsläende skärmfjäll; blomfj. otydl. nerviga. 24 7, 8. Fig. Wg.Fl.L.t.1. Sv.B.545. Fl.D.1505. Ands.Bot.Not.1849, n:o 3; Gram.t.6,f.65. H.N.f.9, n:o 90.

Fjellbäck. r. (Torn. Lpm. Kåbdåvanka. Lul. Lpm. vid Wassajokk; mell. Walle och Kaskaiwo vid Qvikkjokk etc. Pit. Lpm. Um. Lpm. Skeblefjell. — N. Ost-Finnm. —Hardanger, på alla högre fjell.) 1—2 tum högt gräs med 1 lin. breda platta blad, mycket små småax, tät gyllr. i en enkel axlikt ell. grenig vippa. — *Agrostis* Wg. *Phippsia* Br. *Glyceria* Hn. ed.5.

#### 490. COLPODIUM Trin. Finn-tåtel.

- \*1 *C. latifolium* Br. strået n. upprätt; bladen smalt lancettlika, med utdraget hinnaktigt snärp; vippan smal, hopdragen. 24 7, 8. Fig. Fl.D.2341. Ands.t.6,f.63. H.N.f.11, n:o 89.

Fjelltr. r. (N. Ost-Finnm. i Birkelierna mell. Wadsöe och Nyborg flerst.; Seidafljellen; Lebesbyfljellen vid Laggo.) Ej olik *Mol. caerulea*, med hvilken detta gräs är närmast beslägtadt, men med bredare blad, 2—3ledadt, alsnhögt strå. Småaxen vanl. med en enda blomma af n. lika bildade, gröna, ofstare brunvioletta trubbiga fjäll; varierar dock i samma vippa med 2 blr. — *Catabrosa* Fr. *Cinna Brownii* Rupr.

#### 491. MOLINIA Schrank. Senegräs.

- 1 *M. caerulea* Mönch: strået upprätt, styft, utan flere leder än en ned vid basen; vippan meränd. hopdragen, med 2—3blomm. borstlösa småax. 24 7, 8. Fig. Sv.B.401. Fl.D.239. Ands.t.5,f.53.

Fukt. skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) 1—3 fot hög med blå vippa af vanl. korta grenar, men stundom flere tum långa. — *Melica* L. *Enodium* Gaud.

3 Flocken **Avenaceæ**. Småax skaftade [i vippe]. Skärmfjällen stora som blomfjällen ell. större.

## 492. FLUMINIA Fr. Kase.

1 *F. arundinacea* Fr. strået upprätt, i nedre lederna rotsläande; vippan stor, med utstående grenar; småaxen 3—5blommiga; blomfj. i spetsen uddtandade. 2 7, 8. Fig. Sv.B.370. Andst. 6, f. 66. H.N.f.3, n:o 93.

År, r. (ÖG. omkr. sjöarne Roxen, Dälfvern och Glan, från Kungsbro i Vreta sn till Johannisborg vid Norrköping enl. Kindb.) *Strået manshögt, likt vanlig Vass, men blekare och med smalare blad.* — *Festuca arund.* Liljebl. *F. donacina* Wg. *F. borealis* MK. *Scolochloa festucea* Lk.

## 493. TRIODIA R. Br. Knägräs.

1 *T. decumbens* PB. strået uppstigande; vippan n. enkel, sammandragen kleselik, af 4—8, 3—4blommiga småax. 2 6, 7. Fig. Fl.D.162. Andst. 6, f. 67. H.N.f.9, n:o 97. Skog. och betesm. (Sk.—Helsl. Dal. och Verm. Dalsl. Boh. Öl. Gottl. — N. till Trondhj.) *Strået i början nedliggande, slutl. n. upprätt; bladslid:s mynning långhårig.* — *Festuca* L. *Poa Schrad.* *Danthonia* DC.

## 494. KOELERIA Pers. Tofs-äxing.

1 *K. glauca* DC. bladen smala, rännformiga, ytterst fint småludna; vippan före och efter blomn. axformigt hopdragen, smalt cylindrisk; småaxen 2—3blomm. med trubade blomfjäll. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1566. Andst. 7, f. 83. H.N.f.1, n:o 78. Sandfält, r. (Sk. hela öst. kusten från Ystad till Blek. gränsen; flest, i mell. del.; i vest. del. vid Engelholm enl. F. Aresch. Hall. Laholm. Öl. Gårdslösa; Runsten; Gårdby.) *Fotshög, gråaktig, vanl. sträf af omärkl. hår; vippan under blomn. mera öppen.* — *Dact. crist.* β Wg. *K. intermedia* Ahlqu. Fl. Runst.

## 495. AVENA Lin. Hafre.

† Enåriga arter, med slutl. hängande småax och mångnerviga skärmfjäll.

1 *A. fatua* L. vippan med utbredda slaka grenar; småaxen 2—3blommiga, kortare än skärmfjällen; alla blrna med borst; yttre blomfjället spetsadt med 2klufven topp, håromgifven bas. 6, 7. Fig. Sv.B.144. Fl.D.1629. Andst. 7, f. 72.

\* *intermedia* Lindgr. blomfjällen glatta ell. med mycket få hår. Fig. Fl.D.2642. Andst. 7, f. 72, b\*. H.N.f.7, n:o 89.

Åkr. (Sk.—Um. Lpm. — N. till Trondhj.) *Axen tumslånga, med långa borst; blomfj. beströdda med borstlika hår, som hos A. intermed., hvilken trol. är A. hybrida Peterm., blifva få ell. inga.*

2 *A. strigosa* Schreb. vippan rigtad åt en sida; småaxen 2—3blomm., af skärmfj:s längd; alla blrna med borst; yttre fjället i spetsen 2syadt, glatt; axfästets hår omärkliga. 6, 7. Fig. Fl.D.2528. Andst. 7, f. 73. H.N.f.2, n:o 76.

Åkr. r. (Sk.—Boh. Verm. Christinehamn; Carlstad på Örsholmen; Gullsjö i Långserud sn. Smål. Ryhof. Torpa i Jönköpingstrakten; i vest. del. ymnig. ÖG. Järstad; V. Ny sn etc.) *Lik föreg.; småaxen mest 2blommiga.*

†† Fleråriga, med bladskott vid stråets bas, upprätta småax, 1—3nerviga skärmfjäll.

3 *A. elatior* L. bladslid. glatta ell. sträfva; vippan sammansatt grenig; småaxen 2blommiga; den nedre blomman meränd. med endast ståndare, utan pistill och med lång borst fästad nedom blomfjällets midt. 2 6, 7. Fig. Sv.B.48. Fl.D.165. Andst. 7, f. 74. H.N.f.9, n:o 88.

Häfsstr. äng. (Sk.—Helsl. Vestml. Ner. VG. Boh. Öl. Gottl. — N. till Lofoden.) 2—3 fot högt gräs med teml. breda platta blad, något slak vippe. Det yttre skärmfjället meränd. ennervigt. — *Arrhenatherum avenaceum* PB.

4 *A. pubescens* L. de nedre bladslid. vanl. mjukhåriga; vippan smal, grenig; småaxen 2—3blomm., föga längre än skärmfjällen; alla blrna med borst, fästade öfvan fjällets midt. 2 6, 7. — β *alpestris*: dubb. större; slidorna 2sidigt hoptryckta; jemte alla blad mjukhåriga. Fig. Sv.B.263. Fl.D.1203. Andst. 7, f. 75.

Äng. a. (Sk.—Um. Lpm. — N. till Ost-Finnm. — β N. Dovre, i birkelierna vid

Kongsvold och Drivstuen. Trol. i flere fjelltr.) *Vippan mer sammansatt än hos följ., gräset mjukare och nedtill finkludet, säll. glatt; det nedre skärmsfj. än ennervigt, än med 2 fina sidonerver. — A. pratensis Sv.B.*

- 5 *A. pratensis* L. blädsliid. *glatta ell. stråfva* [ej håriga]; småaxen i *smal*, nästan axlik klase, 4—5blommiga, betyd. längre än de båda 3nerviga skärmfjällen; *alla blrna med borst fäst vid ell. strax ofvan fjällets midt.* 24 6, 7. Fig. Fl.D.1083. Reich. f.207. Ands.t.7,f.76.

Äng. (Sk.—Ängml. och Dal. — N. till Helgel.) *Något styft, alnshögt gräs med mycket smala rotskottsblad; vippan klaselik, ell. med en eller annan längre, 1—2-axig gren nedtill.*

#### 496. TRISETUM Pers. Hafreäxing.

- 1 *T. flavescens* PB. strået och de öfre blädsliid. *glatta; vippan utbredd tidblommig med stråfva skaft; småaxen omkr. 3blommiga, med ena skärmfjället dubb. längre än det andra; yttre blomfjället med 2sylad spets.* 24 6, 7. Fig. Fl.D.1507. Ands. t.7,f.79. H.N.f.3, n:o 91.

Äng. r. (Sk. Smål. Vestervik, kyrkogården: Dr Lund, och vid Rödse; Misterhult, vid Virbo; Vexjö, vid Kampen. ÖG. Solberga i Herrberga sn; Åleryd i St. Lars sn; Adelsnäs m. fl. st. Södm. i Thorshällatrakten etc. Stockholm, vid Rörstrand m. fl. st. Uppl. Uppsala; Halvved i Funbo sn; Ellgarn i Mälaren; Österby bruk; Norrtelge på Frötuna kyrkog. Gottl. — N. Eger vid Fiskumvandet. Christiania.) 2—3 fot hög med *platta blad, rik och gulglänsande vippan. — Avena L.*

- 2 *T. agrostideum* Fr. strået upptill och de öfre blädsliid. *glatta; vippan utbredd gles, med n. glatta skaft, efter blomn. n. axlikt sammandragen; småaxen 2—3blomm., med ena skärmfjället något längre än det andra; yttre blomfj. med 2flikig spets.* 24 7. Fig. Ands.t.7,f.80. H.N.f.3, n:o 92 och f.7, n:o 90.

Fjellv. r. (Torn. Lpm. Karesuando vid Maunu; Torn. träsk, vid bäcken Nagerijoki.) *Fötsög, med habitus af föreg., karakterer mer af följ., och utgör en mellanform till båda; bladen dock smalare än hos någondera, stund. n. trådlila. — Avena subalpestris Hn Ed.3.*

- 3 *T. subspicatum* PB. strået och blädsliid. *mjukhåriga; vippan alltid smal axformig med småhåriga skaft; småaxen som hos föreg.* 24 7. Fig. Sv.B.722. Fl.D.228. Ands.t.7,f.81. H.N.f.11, n:o 88.

Fjellv. (Lpl.—Herjed. — N. Ost-Finnm.—Filefjeld.) 1—nära 1 fot högt, *mjukkludet gräs, med platta blad, 1—1½ tum lång, vanl. gråbrun vippan. — Avena L.*

#### 497. AIROPSIS Fr. Smile.

- 1 *A. caryophylla* Fr. vippan *utbredd, med utdragna och utstående grenar; småaxen 2blomm., kortare än skärmfjällen, med i spetsen 2sylade yttre blomfjäll.* 5, 6. Fig. Sv.B.508. Fl.D.382. Ands.t.7,f.77. H.N.f.2, n:o 74.

Sandfält. r. (Sk. mångenstädes i söd. och vest. del; i den östra vid Rörum, Gladsax och Käseberga enl. F. Aresch.) 3—8 tum högt, *spådt gräs, med borslika blad, silfverglänsande småax. — Avena L. och Parlat. Avena Web.*

- 2 *A. præcox* Fr. vippan *smal, n. axformig, med korta uppräta grenar; småaxen knappt kortare än skärmfj.; för öfr. som föreg.* 5, 6. Fig. Sv.B.508. Fl.D.383. Ands.t.7,f.78. H.N.f.2, n:o 75.

Torra st. (Sk. Blek. Smål. Kalm. län vid kusten; Jönköpingstrakten; syd-öst. del af Kronob. län, samt i Götheryd sn: Scheutz. ÖG. Lönö i Häradsdhammar; Åxelsö och Rövik i St. Annæ. Södm. Landsort: C. Ind. VG. Kollands-ö på stranden. Boh. Hall. Öl. Gottl. — N. från Arendal och Christiansand upp till norra delen af Bergens st.) 2—4 tum hög, *med borslika blad, slutt. blekgul, knappt tumslång, n. lancetlik vippan. — Avena L. Avena PB.*

#### 498. CORYNEPHORUS Pal. B. Sandborst.

- 1 *C. canescens* PB. bladen borslika stråfva; vippan *tät, aflång ell. äggrund; skärmfjällen nående öfver blrna.* 24 6, 7. Fig. Sv.B.450. Fl.D.1023. Ands.t.8,f.84. H.N. f.1, n:o 77.

Sandfält. (Sk. allm. Hall. Blek. Smål. Kalmar och Åby; Skäggenäs, samt Refsudden i Ryssby sn; Misterhult, mell. Virbo och Fieholm m. fl. st. i Kalm. län;

Sandsjö i Konga enl. Scheutz. *Öl. Grotl.* — *N.* uppgifven för Bergen och Söndmøer, men aldrig sedd af Blytt.) *Tufvadt, gråaktigt gräs, ½—1 fot högt.* — *Aira L.*

499. *AIRA Lin.* Ängståtel.

† Småax 3blommiga ell. med ämne [skaft] till 3:dje blomman; borsten n. rak: *Deschampsia PB.*

- 1 *A. alpina L.* bladen *hoprullade, glatta*; vippan upprätt, öppen med *glatta* grenar; småaxets *nedre* blomma med borst, fästad nära blomfjällets *midt* och *föga* längre än detta; den öfre med en kort borst nära spetsen. 2 7. Fig. Wg.Fl.L.t.3. Fl.D.1625. Andst.6.f.70. H.N.f.8, n:o 91 [äxgroende].

Fjellv. (*Lpl.—Jemll.* Åreskutan; Snasahögen; Sylfjellen. *Herjed.* på gränsfjell. — *N.* från Ost-Finnm. till nor. del. af Christianss. st.) ½—1 fot högt, *glatt gräs, med of-tast äxgroende vippan.*

- 2 *A. bottnica Wg.* bladen *snart hoprullade*, på öfre sidan *något sträfvä*; vippan som hos föreg. med *glatta* ell. *omärkl. sträfvä* grenar; småaxets båda blr med borst fästad närmare *basen*, *dubbelt längre* än fjället. 2 7, 8. Fig. Wg.Fl.L.t.4. Fl.D. suppl.64. Andst.6.f.68. H.N.f.3, n:o 88.

Hafstr. (*VB.—ÖG.* vid Bråviken enl. Kindb. *Smål.* på ön Jungfrun.) 2—3 fot högt, *tufvadt, snart gulnande gräs, med gulglänsande vippan; småaxen dubb. större än hos följ.* Var. med mer utbredd vippan, *smärre småax:* var. *micrantha Malmgr.* i H.N.f.16, n:o 78.

- 3 *A. caespitosa L.* bladen *platta*, på öfre sidan *mycket sträfvä*; vippan slakt utbredd, med *sträfvä* grenar; småaxets båda blr med borst fästad närmare *basen*, af *fjällets längd*. 2 6, 7. Fig. Sv.B.132. Fl.D.240. Andst.6.f.69.

\* *brevifolia Hn.* bladen korta och *platta*; vippan smal upprätt violett, småaxen med utskjutande, något krökt borst.

\* *glauca:* vippan grågrön lat, med glattare grenar; borsten från blomfjällets midt.

Äng. a. (*Sk.—Lpl.* — *N.* — Underarterna i *Jemll.* på Frösön etc. \* *brevif.* äfven i *N.* på Norfjellet; och \* *glauca* vid Elstad i Gudbrandsdalen: Doc. P. Olsson.) *Högt, mycket tufvadt gräs, vanl. med stor, yfvig, grå ell. brun, stund. gulglänsande vippan. A. brevifolia har alldeles utseende och färg af A. flexuosa β; rotbl. platta, 2 tum långa.*

†† Småax 2blomm., utan ämne till en 3:dje; borsten med knä och dernedom vriden: *Avenella Koch.*

- 4 *A. flexuosa L.* bladen trådlika, med utdraget *tvärhugget* snärp; vippan meränd. utbredd och *lutande* med *flerböjda, föga sträfvä* grenar; småaxen knappt längre än de olikstora skärmfjällen, med *långt utskjutande* borst. 2 6, 7. — *β montana:* vippan smal, meränd. hopdragen, med större, rödvioletta småax. Fig. Fl.D.157. Andst.6.f.71. *β* Fl.D.1322.

Torra äng. back. a. (*Sk.—Lpl.* — *N.* — *β* i fjelltr. ned till *Helsl.* Boh. på bergen vid Strömsd. — *N.*) *Vippan vanligen stor och glänsande blekgul, stundom med vid basen violetta småax; rotskottens blad glatta.*

- 5 *A. uliginosa Weihe:* bladen trådlika, med utdraget, *spetsadt* snärp; vipp. upprätt, med utstående, något *flerböjda* och *sträfvä* grenar; småaxen af de *föga* oliklånga skärmfjällens längd, med *utskjut.* borst. 2 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.t.3. Reich.f.184. Andst.12.f.143. H.N.f.2, n:o 73.

Dyga sjöstränd. samt sand och stenrös i sjöar, r. (*Smål.* Femsjö vid Bastesjö, Halle-sjö. — *N.* Møllevand nära Christianssand, samt vid Stavanger.) *Lik föreg., men vippan upprätt, brun, med tydligare sträfvä grenar; rotskottsbladen finare och ofta n. hårmala, mycket sträfvä, då de strykas uppifrån och ned. Anses af Fries som afart af föreg. — A. discolor Thuill.*

500. *VAHLÖDEA Fr.* Fjellståtel.

- 1 *V. atropurpurea Fr.* bladen *platta*; vippan gles, af utdragna slaka grenar; blomfjällens borst icke utskjutande öfver skärmfjällen. 2 6, 7. Fig. Sv.B.687. Fl.D.961. Andst.18.f.87. H.N.f.3, n:o 89.

Fjellmossar, r. *lLpl.—Jemll.* vid elfvarne Handölan och Herrbågnan. *Herjed.* Storå-

dörren och Valösjön, samt Håstorsstöten och Rutstöten. — *N. Ost-Finnm.* ned till Johnsknuden vid Mjösen. Norrfjellet i Buskeruds amt. Hofhelderen i Ouse past. Christiansands st. Gousta fj. etc. allmän.) *Folshögt gräs med slak vippa af brunviolett småax.* — *Aira Wg. Fl.L. Holcus Wg. Sv.B.*

#### 501. HOLCUS Lin. Mjuktåtel.

- 1 *H. lanatus* L. strået och bladslid. *finludna*; bladen platta, breda, gråludna; skärmfjällen *trubbiga*, meränd. *med kort udd*; blomborsten rak ell. *kroklikt böjd, icke nående öfver skärmfjällen.* 2 6, 7. Fig. Sv.B.84. Fl.D.1181. Andst.8,f.85.  
Fukt. äng. (Sk.—Uppl. Gestr. Oslättfors. Ängml. Själevad sn. Ner. Verm. Åräs nära Marviken. VG. Dalsl. Boh. Öl. Götll. — N. söd. och vest. delar upp till Romsdalen och Molde.) *Vippan tät, vanl. rödlätt, stund. n. hvit; hela gräset mjukt.*
- 2 *H. mollis* L. strået och de öfre bladslid. *glatta*; bladen som hos föreg., *finludna*; skärmfj. *smalspetsade*; borsten *utskjutande, med knä* nedtill. 2 7. Fig. Sv.B.198. Fl.D.1059. Andst.8,f.86. H.N.f.13, n:o 91.  
Lund. r. (Sk. Blek. Smål. Dörby och Hosmo m. fl. st.; Kalmar; Vestervik; Vexjö, och i Lenhofsda sn: Scheutz. Södm. Utön, Edenäs; Ornö, i Hesselmaras äng. Hall. Boh. Öl. Götll. Spröge. — N. Christiansand upp till Romsdalen.) *Med krypande rotstock; vippan gulaktig; borsten sträf.*

#### 502. MELICA Lin. Stokgräs.

- 1 *M. ciliata* L. bladen *hoprullade*, med *utdraget* snärp; vippan *axlikt* hopdragen; småaxen *enblommiga*, med ämne till andra blomman; den fullständiga blommans yttre fjäll nära kanten *långhårigt.* 2 6, 7. Fig. Sv.B.365. Fl.D.suppl.t.7. Andst.8, f.88. H.N.f.4, n:o 98.  
Torra berg. r. (Smål. Eds kyrka. ÖG. Alvastra; Omberg etc.; här och der i skärg. från Börrum upp till Kolmården enl. Kindb. Södm. Tullgarn på Fridön; Mörkö; Utön etc. Stockh. Danviksbergen; Norsborg; Kungshatt; klippor vid Bergianska trädg. Endast i de öst. prov. Öl. Götll.) *Axet brunt, efter blomn. hvittudet af de långhåriga blrna.*
- 2 *M. nulans* L. bladen *platta*, med *omärkligt* snärp; vippan *ensidig, lutande, klase-lik*; småaxen 2blommiga, med ämne till en tredje blomma; de fullständiga blrnas yttre fjäll *glatt.* 2 5, 6. Fig. Sv.B.354,f.1. Fl.D.962. Andst.8,f.90.  
Stenback, a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Småaxen ensam, på korta skaft, n. hängande, af brunviolett färg.*
- 3 *M. uniflora* Retz. bladen *platta*, med *hinnaktigt* snärp och *midt emot detta ett borstlikt bihang*; vippan *mycket gles långgrenig* lutande; småaxen *enblommiga* med ämne till andra blomman; den fullständiga blns yttre fjäll *glatt.* 2 6, 7. Fig. Sv.B. 354,f.2. Fl.D.1144. Andst.8,f.89. H.N.f.14, n:o 89.  
Lund. r. (Sk.—Södm. t. ex. Tjustvik på Vermdön; Kappeberget vid Södertelge VG. Boh. Öl. Götll. — N. på öar i Christiania-fjorden; Arendal; Christiansand etc.: söd. del. af Bergens st.) *Småaxen lika föreg:s, men upprätta, i en fåblommig vippa af 1—2 tum långa, hårfinna grenar.*

#### 4 Flocken AGROSTIDES. Småaxen enblommiga [undant. Phragmites].

#### 503. PHRAGMITES Trin. Vass.

- 1 *P. communis* Trin. bladen n. lancettlika; vippan stor, utstående ell. utbredd; småaxen 2—6blommiga. 2 7, 8. Fig. Sv.B.114. Fl.D.2464. Andst.8,f.91.  
Stränd. stund. i fukt. åkr. a. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl. Bejeren. Norm.) 3—4 alnar högt gräs med fingerbredda blad. *Blir på det torra mycket lågre.* — *Arundo Phragmites* L.

#### 504. PSAMMA Pal. B. Marehalm.

- 1 *P. arenaria* RS. bladen inrullade; vippan cylindriskt *axlik*; skärmfjällen *spetsiga*; håren kring blrnas bas *icke nående* blomfj:s midt; det yttre blomfjället med ett synligt borstämne *tätt under och icke längre än fjällets spets.* 2 7, 8. Fig. Sv.B.138. Fl.D.917. Andst.8,f.92. H.N.f.13, n:o 90.

Hafsstr. på flygsand. (Sk. Hall. Boh. på Koster; Lysekil. Smål. Kalmar. Öl. Gottl. — N. Hvalöarne och vestra kusten upp till Nordfjord i Bergens st.) *Azet tall*, 3—6 tum långt, halmfärgadt. — *Arundo L. Ammophila arundinacea Host. Calamagrostis Fr.*

2 *P. baltica RS.* bladen snart inrullade; vippan grenig sammandragen spetsad; skärmsf. sylspetsade; håren kring blrns bas nående blomf:s midt; yttre blomf. med en härlik borst under och något längre än fjällets spets. 2 7, 8. Fig. Fl.D.1684. Andst.8,f.93. H.N.f.1, n:o 74.

Som föreg. r. (Sk. Ystad vid Köpingeåns utlopp; Kåseberga och Sandhammar m. fl. st. — N. Sandösund i Christianiafjorden.) *Snarlik Calam. epigejos*, men med låtare, n. lancettlik vippa; blrna stora violetta med grön bas. — *Arundo maritima Ag. Calamagr. Fr.*

### 503. CALAMAGROSTIS Roth. Rör.

† Blomborsten fästad närmare fjällets bas och krökt vid midten: *Dejeuxia PB.*

\* Blomf:s borst mycket längre än skärmsf.

1 *C. arundinacea Roth:* vippan upprät öppen; skärmsfjällen lancettlika spetsade; håren kring bln kortare än halfva blomf. 2 6. Fig. Sv.B.96. Fl.D.1683. Andst.9,f.104. H.N.f.8, n:o 90.

Steniga back. a. (Sk.—söd. Lpm. — N. till Trondhj. i Stördalen.) 3—4 fot högt, styft, bredbladigt gräs. — *Agrostis L. C. silvatica DC.* ett yngre namn än både Linnés och Roths.

\*\* Blomf:s borst icke längre än skärmsf.

2 *C. acutiflora DC.* vipp. upprät, öppen; skärmsf. smalt lancettlika, utdraget sylspetsade, mycket längre än blomf. och lika långa som dettas borst; håren föga kortare än blomfjällen. 2 7. Fig. Fl.D.suppl.62. Andst.9,f.105. H.N.f.10, n:o 96.

Bergstr. r. (Hall. norra delen, vid Onne torfmosse och i Klefbergen. Boh. på vest. sidan af Koön. — N. Christiania, på Langöe; mell. Kongshavn och Bäckelaget; vid Sandvigen etc.) Omkr. 3 fot högt gräs, med tät och rikblommig, violett vippa; skärmsfjällens spets hoptryckt och nålsmall utdragen. — *C. subuliglumis Exc. Fl. ed.1.*

3 *C. varia PB.* vippan som hos föreg.; skärmsf. lancettlika, spetsade, mycket längre än blomf.; borst och hår som hos föreg. 2 6, 7. Fig. Reich.f.146. Andst.9,f.106. H.N.f.8, n:o 89.

Torra st. r. (Gottl. teml. allmän i norra delen, t. ex. vid Hau i Fläringe; Vestö gård i Hall sn, etc.; i mell. och söd. del. sällsyntare, t. ex. på Thorsborg och i Løjsta sn.) Omkr. 2 fot hög; vippan glesare än hos föreg. med mer bredfjälliga, viol. småax; bladen bredare, n. lancettlika. — *C. montana Host. Arundo varia Schrad.*

4 *C. chalybea Fr.* vipp. som hos föreg.; skärmsf. bredt lancettlika spetsiga, föga längre än blomf. och lika långa som dettas borst; håren kortare än blomf. 2 6, 7. Fig. Andst.9,f.103. H.N.f.15, n:o 93.

Torra st. r. (Ängml. Tåsjöberget samt vid Tåsjön och Hotingsjön; Liden och Ramseke snr ned till gränsen af Ed sn. Verml. vid Tabergs grufvor.) Har grön- och brunbrokiga småax, af mindre storlek än de öfr. i denna afdeln., med ena skärmsfjället något längre, det andra något kortare än blomf., båda spetsiga, utan udd. — *Ar. lapp. β Læst. Ar. silval. β Wg.*

5 *C. lapponica Hn.* vippan upprät, meränd. smal, n. axformig [hos β mer yfvig]; skärmsf. lancettlika trubbad ell. kortspetsiga, längre än blomf. med dess hår; borsten och håren af blomf:s längd ell. något längre. 2 7, 8. — *β opima:* hela gräset större och gröfre; vippan af 1—2 tum långa utstående grenar. Fig. Wg.Fl.L.t.1. Sv.B.649. Fl.D.suppl.t.5, β t.6. Andst.9,f.102. H.N.f.3, n:o 86.

Fjelltr. (Lpl.—Jeml. Brunflo och Ragunda snr. VB. Lul. skärgård; Umeå sn. Ängml. Medelp. Borgsjö sn, Randklöven. — N. Finn.) Vippan knappt fingertjock, violett, af n. dubb. större småax än hos föreg. Borsten mindre krökt än hos de öfr. i afdeln. — *β C. chalybea Bl.N.Fl.*

†† Borsten rak, fästad vid ell. ofvan midten af blomfjällets rygg.

\* Småaxen gytttrade på vippgrenarnes utsida; strået alltid enkelt.

- 6 *C. epigejos* Roth: vippan upprät, med styfva grenar; skärmfjällen *jembredt* lancettlika, *långt* sylspetsade; borsten fästad ned på blomfjällets rygg, kortare än de blomfjällets håren. 24 7. —  $\beta$  *riparia*: strået föga stråft; vippan smal, n. cylindrisk. —  $\gamma$  *glauca*: spådare och blåaktig, med utbredd och glesare vippa. Fig. Fl.D.2165. Reich.f.154—56. Andst.8.f.94. H.N.f.8, n:o 83, 84 [varr.].

Torra st. (Sk.—Lpl. — N. till Salten. —  $\beta$  Lpl. Karesuando vid stränd. —  $\gamma$  VG. på Räfholmen i Venern nära Degeberga. — N. Christiansand; Christiania.) *Styft gräs med vanl. mycket stråft strå, brun- ell. gråbrokig vippa.*  $\gamma$  *C. rigens* Lindgr. i Fr. S.Veg.Sc.

\*\* Småaxen jemnt fördelade på vippgrs alla sidor.

a — Vippan efter blomn. utbredd ell. något ensidigt, sammandragen, med vanl. öppna skärmfjäll; strået slutl. grenigt.

- 7 *C. elata* Blytt: vipp. stor, med utdragna *utstående, slaka* grenar; skärmfj. lancettlika *spetsade*, mycket längre än blomfjällen; borsten från blomfjällets *midt, lika lång* som detta; håren kring bln *längre* än blomfj., *lika långa* som skärmfjällen. 24 7, 8. Fig. Fl.D.suppl.63. H.N.f.14, n:o 91.

Våta st. stränd. r. (Ängml. flerst. i norra ådalen ymnig. VB. vid Sangis- och Korpikelfvar. — N. Christiania, vid Ellingsrud.) *Stort gräs med glatt strå, blåaktiga, 2—3 lin. breda, snart hoprullade blad, och rik vippa af 2—3 tum långa grenar; småaxens hår mycket längre än blomfjällen.*

- 8 *C. Langsdorffii* Trin. vipp. upprät, med *utstående, styfva* grenar, slutl. *något ensidigt* sammandragen; skärmfj. lancettlika, *spetsiga*, längre än blomfj.; borsten från blomfjällets *midt ell. högre upp, något längre* än fjället; håren *längre* än blomfj., *något kortare* än skärmfj. 24 7, 8. Fig. H.N.f.13, n:o 89.

Stränd. r. (Verml. Långserud sn, Kolsäter vid Knappersbäcken: mell. Gullsjö och Kastensbol; i Ekshärad, vid sjön Jangen. — N. Christiania, i Långmossen vid Abildsöe, nära Voxen etc.) *2—3 fot högt gräs, med glatt strå, styfva, 3—4 lin. breda, platta blad och blekröd, slutl. gråaktig vippa.* — *C. rubicunda* Blytt. — Anm. *C. nutans* Saul. anföres ofven af Blytt, ehuru med någon osäkerhet, såsom funnen nära Christiania.

- 9 *C. phragmitoides* Hn. vippan *utbredd* med lutande topp; skärmfj. lancettlika *långspetsade*; borsten från blomfjällets *midt, än högre upp* ända till från dess spets, *lika lång* som blomfj. *ell. något längre*; håren *af blomfjällets längd, kortare* än skärmfjällen. 24 7, 8. —  $\beta$  *breviaristata*: borsten utgående i toppen mell. blomfj. *likar* ell. något längre ned. Fig. Reich.f.149? Andst.9.f.97. H.N.f.10, n:o 91; f.14 [varr.].

Bergstr. etc. (Lpl.—Herjed. och Ängml. allm. Medelp. Indals prestg. Helsl. Loos sn, Tenberget; Hassela, vid Elfåsen; Wistr. Uppl. Järlåsa sn, Lingonbacka; Tibble sn, vid Metsjön enl. Leffl. Vestml. Sätra brunn. Ner. mell. Stjernsund och Aspa. ÖG. Gopö och Sjöholmen i Vettern. Smål. vid Husqvarna-åns nedre lopp; Gärdsrum. Verml. Finnskoga, vid elfven Tåsen m. fl. st. Dalsl. Boh. — N. Finnm.—Christiania.) *Stort gräs, med mer och mindre stråft strå, 3—5 lin. breda blad, rik brunviolett vippa af n. 2 lin. långa småax, som, då det tillika är bredbladigt, icke är oliskt Phragmites.* — *C. latifolia* Blytt.

- 10 *C. Halleriana* DC. vippan *utbredd*, något *slak* och gles; skärmfj. lancettl., *spetsade*; borsten från blomfjällets *midt, lika lång* som fjället *ell. något längre*; håren *som hos föreg.* 24 7. —  $\beta$  *pulchella*: bladen 3 lin. breda; småaxen större. —  $\gamma$  *gracilescens*: strået lägre, med mindre och smalare vippa, smärre småax. Fig. Fl.D.2524. Andst.9.f.98. Reich.f.147;  $\beta$  148. H.N.f.8, n:o 85 och f.10, n:o 93;  $\gamma$  94;  $\beta$  f.14, n:o 92.

Fukt. äng. vid stränd. etc. (Lpl.—Smål. Jönköp. vid Storån; Gärdsrum och VG. Degeberga. Boh. Strömstad. — N. Ost-Finm. till söd. delen. —  $\beta$  Uppl. Funbo sn. — N. Christiania. —  $\gamma$  N. Christiania, vid Ellingsrud.) *Föga skild från föreg. med annat än mindre vippa och småax samt smalare [14—3 lin. breda] blad; stund. [såsom ex. i H.N.f.10, n:o 93] närmar den sig C. lanceolata, så att de knappt kunna skiljas af annat än borsten.* — *C. pseudophragmites* Reich. och Bl. Norges Fl.

b — Vippan smal, efter blomn. axlikt sammandragen, med slutna skärmsfj.

- 11 *C. Hartmanniana* Fr. strået upptill och vid lederna stråft; vippan upprät, öppen, efter blomn. hopdragen; skärmsf. lancettlika smalspetsade; borsten fästad vid ell. något nedom yttre blomfj:s midt, något längre än fjället; håren kortare än detta. 247. Fig. Andst.9.f.101. H.N.f.10, n:o 95.

Fukt. äng. stränd. (Smål. i Hvena sn enl. Ekstr. Södm. Forssa pappersbruk; Thorsberga i Stenqvista sn. Dal. Thorsås sn enl. G. v. Ced. Verml. vid Knappersbäcken nära Kolsäter i Långserud sn. Boh. — N. Christiania vid Kjenskjær nära Ellingsrud, Tattremyr i Maridalen, Gåslungen. Liggeren etc. Brufladt i Valders.) Lik föreg:s spåddare former, men med smalare, violett vippa, mer långspetsade skärmsfjäll, kortare blomhår. — *C. ambigua* Hn. ed.6. *C. intermedia* Lindb.

- \*12 *C. strigosa* Hn. strået upptill stråft; vippan upprät smal och tät, med upprätta grenar; skärmsf. långspetsade; borsten som hos föreg., af blomfjällets längd ell. något längre; håren kortare än blomfj. 247, 8. Fig. Wg.Fl.Lt.2. Andst.9.f.99. H. N.f.8, n:o 86.

Stränd. r. (N. Finnm. Lyngen; Tana- och Altenelv. Trondhj. vid Namsenelv i Överhalden, nedom gårdarne Grande och Valskræ m. fl. st.) Liknar följ., men har mycket stråfvare vippgrenar och mer spetsade skärmsfjäll; håren nående öfver halfta blomman, stundom högre upp. Strået likasom hos alla de följ. slutt. grenigt i de nedre bladvecken.

- 13 *C. stricta* Hn. strået vanl. glatt; vippan upprät, med vid blomn. n. utsperrade, korta grenar; skärmsf. lancettlika kortspetsiga; borsten och håren som hos föreg. 246, 7. Fig. Sv.B.301. Fl.D.1803. Andst.9.f.100. H.N.f.8, n:o 87, 88 [var.].

Fukt. äng. (Lpl.—Sk. Öl. Kastlösa sn. — N. till Ost-Finm.) 1—2 fot högt gräs med smal gråbrun vippa, smala, vanl. snart hoprullade blad; strået stund. upptill stråft. Var. efter olika lokaler dubb. högre, samt dels med stor vippa, dels med ett par lin. breda platta blad, och stund. med nedtill knåböjd strå. — *Arundo stricta* Timm. *C. neglecta* Ehrh. *Fries*.  
(*C. acutiflora*, Langsdorffii.)

+++ Borsten fästad i blomfjällets spets.

- 14 *C. litorea* DC. vipp. upprät, med utstående och utdragna grenar; skärmsf. lancettlikt syl-lika; borsten utgående i yttre blomfjällets spets och hälften så lång som detta; håren längre än blomfj. 247, 8. Fig. Reich.f.152. Andst.9.f.107.

Fjelltr. (Jeml. Herjed. mell. Ljusnedals bruk och Vallarne. Helsl. Elfåsen i Hassela enl. Wistr. Verml. Smøtern vid Pershöjd.) Högt gräs, utmärkt af de mycket smala n. syl-lika skärmsfjällen, som af Reich. afbildas allt för breda. Äfven hos denna art kan borsten utgå nedom spetsen. Är måhända närmast beslägtad med *C. epigejos*. — *C. laxa* Host.

- 15 *C. lanceolata* Roth: vipp. utbredd lutande; skärmsf. lancettlika spetsade; borsten fästad i blomfj:s spets mell. sikarne eller strax nedom dessa, flere gånger kortare än fjället; håren längre än både blomfj. och borsten. 247. Fig. Sv.B.312. Fl.D. 1624. Andst.9.f.96. H.N.f.10, n:o 92.

Fukt. st. stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. i Aggerhus och Christianss. st.) Mjukt gräs med vanl. brun ell. gråbrokig, mera sällan grön vippa. Borsten än kortare än fjällets sikar, än längre och tydligare, dock aldrig öfver  $\frac{1}{2}$  så lång som sjelfva fjället. Jemf. *C. Halleriana*. — *Arundo Calamagrostis* L.  
(*C. phragmitoides*, Langsdorffii.)

506. *APERA* Adans. Kjösa.

- 1 *A. Spica venti* PB. vippan yfvigt utbredd lutande; blomfj:s borst flere gånger längre än fjället. 7. Fig. Sv.B.286. Fl.D.853. Andst.10.f.108. H.N.f.14, n:o 93 [var.]. Åkrar, a. (Sk.—Ängml. och Jeml. VB. nor. delen. — N. till Finm.) Var. från ett par fot till ett par tum [Öl. på Alfvaren] hög. Vippan stor ljusgrön, sällan rödbrun. — *Agrostis* L.

507. *AGROSTIS* Lin. Hven.

† Blomman af 2 fullkomliga fjäll: Vilfa PB.

- 1 *A. stolonifera* L. bladen platta, med utdraget, aflångt snärp; vippan genom de långt Hartman, Skandinaviens Flora (10:de uppl.).



*utdragna nedre grenarne pyramidformig; efter blomn. hopdragen.* 2 6, 7. —  $\beta$  *maritima*: strået nedtill kull-liggande, ofta rotsläande; vippan lätt gyttad af smårrer småax. Fig. Fl.D.1623. Reich.D.Fl.f.133—37. Andst.10.f.109.

Fukt. äng., hafsstr. a. (Sk.—V.B. nor. del. Lpl. — N. till Ost-Finm. —  $\beta$  på hafsstr.) *Vippans grenar vanl. sträfvä. Var. i hög grad; ofta alnshög med stor och yfvig vippa: v. gigantea, samt än med, än utan borst på blomfj.;  $\beta$  stund. quartershög med tumsläng vippa. Enl. Läst. skall denna art i Lpl. sammanflyta med följ. — A. alba L.Sp.Pl. A. stolonif.  $\beta$  L.Fl.Su.*

2 *A. vulgaris* With. bladen platta, med kort, tvärhugget snärp; vippan glest utbredd, genom de längre mellangrenarne äggformig, efter blomn. lika öppen. 2 6, 7. Fig. Sv.B.581. Fl.D.163. Andst.10.f.110. H.N.f.11, n:o 85.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) *Vippan vanl. yfvig af utsperrade, glatta eller något sträfvä grenar och smågrenar, med mycket små småax; blomfj. dels med, dels utan borst. Både denna och föreg. hafva vanl. krypande bladskott vid basen. — A. stolonifera a. L.Fl.Su. A. rubra Wg.Fl.Su.*

†† Blomman af blott det yttre fjället; det inre söga ell. icke utveckladt: *Trichodium Mich.*

3 *A. canina* L. rotbl. trådsmla, hoprullade; de öfre bl. platta med utdraget snärp; vippan yngre slak, n. lancettformig, före och efter blomningen hopdragen, med utdragna mångblommiga och sträfvä grenar; blrna meränd, med krökt ryggborst. 2 6, 7. Fig. Fl.D.1443. Reich.f.128, 29. Andst.10.f.112. H.N.f.9, n:o 87.

Fukt. äng. och betesm. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finm. Havöund.) *Vippan brun, i skugga stund. gul: var. pallida. Var. mycket till storleken [vanl. 1—2 fot hög] och med mer ell. mindre låt vippa, större ell. mindre småax. Blomfj. stund. utan borst.*

4 *A. borealis* Hn. rotbl. smala, n. platta; de öfre bl. bredare, platta med utdraget snärp; vippan upprät, pyramidformig, efter blomn. icke hopdragen, med meränd. sträfvä grenar; blrna med krökt ryggborst. 2 7, 8. —  $\beta$  *minor*: 3—7 tum hög, med smal vippa af glattare grenar. Fig. Sv.B.668;  $\beta$  545. Fl.D.2581. Andst.10.f.111. H.N.f.3, n:o 87;  $\beta$  f.11, n:o 86, 87.

\* *hyperborea* Läst. fotshög, med vippa som  $\beta$ , alla bl. platta, men smala. Fig. H.N. f.16, n:o 80.

Fjelltr. på fukt. st.,  $\beta$  på torrare, klipp. etc. (Lpl.—Herjed. Ängml. — N. Ost-Finm. — nor. delen af Christiansands st. — \* Torn. Lpm.) *Fotshög, med öppen gråbrun vippa, bredare och plattare rotblad än föreg. Var. lika som denna med större och mindre småax.  $\beta$  är var. angustata Bl., A. alpestris Läst., A. rupestris ed.4 och Fr. S.V.Sc. samt A. alpina Wg.Fl.L., en form, som härrör af lokalen och tydl. öfvergår i a. — A. rubra Wg. och Fr. Jemf. Bot.Not.1840.*

#### 508. CINNA Lin. Sötgräs.

1 *C. pendula* Trin. bladen breda med trinda slidor och utdraget snärp; vippan med utdragna ensidigt lutande grenar. 2 7, 8. Fig. Fl.D.suppl.1. Andst.10.f.113. H.N. f.7, n:o 87 [fr. N.]; f.16, n:o 81 [fr. Sv.].

Skugg. st. r. (Häls. Hassela sn, på Elfåsen nära Fagnäs. — N. Christiania, i Nordmarken: Ax. Bl. Österdalen, Björnstad i Åmodt vid Getån etc. Ringeboe vid Herri-sjö-elv, nedanför Stulsbroen; vid Finden i Torpen, annex till Land; Valders vid bergs-elfven nära Brufadt och vid Frydenlund.) 2—5 fot högt gräs, med  $\frac{1}{2}$ —1 fot lång, blekgrön vippa, 5—7 lin. breda blad, vålluktande. — *Agrostis succeolens* Blytt. Blyttia Fr. Manf. Cinna arundinac. var. pendula Bl. N.Fl. Mühlenbergia ed.9.

#### 509. MILIUM Lin. Håselebrodd.

1 *M. effusum* L. strået och bladslidorna glatta; vippan stor utbredd, med slaka glesblommiga glatta grenar; småaxen äggrunda. 2 7. Fig. Sv.B.162. Fl.D.1143. Andst.10.f.115.

Lundar. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) 3—4 fot högt och bredbladigt, vålluktande gräs.

#### 510. STIPA Lin. Fjäderborstgräs.

1 *S. pennata* L. vippans bas innesluten i öfversta bladslidan; blom borsten ganska lång.

nedtill glatt och vriden, den öfre, mycket längre delen fjunhårig. 2½ 5, 6. Fig. FLD. suppl.61. Andst.10,f.114. H.N.f.7, n:o 88.

Åkerren. torra äng. r. (VG. nära Stenåsen ½ mil fr. Dala kyrka: Stud. N. S. Linnarsson. Förr äfven i Åsaka sn, i Vartofta härad; helt nära Hvaltorps kyrka, ½ mil från byn Segerstad, men numera genom odlingar utrotad.) *Bladen genom hoprullning tagel-lika, särdeles rotbladen; borsten 6—10 tum lång.*

### 5 Flocken *Oryzæ*. Skärmsjäll 0.

#### 511. COLEANTHUS Seidel. Slidgräs.

\*1 *C. subtilis* Seid. öfversta bladslidan stor och vid; vippans grenar n. flocklika, i skiftevisa gyttringar. ☉ 8. Fig. FLD. suppl.2. Reich.D.Fl.f.467. Andst.10,f.117. H.N. f.10, n:o 87.

Öfversvåm. stränd. r. (N. vid Nitsundelv nedanför gården Braanaas i Skydsmoe sn, 2 mil från Christiania.) *Roten fñtråddig, bärande flere, 1—2 tum höga strån, med så små blr ell. småax (½ lin.), att stark förstoring behöfves att urskilja delarne. Hinnfrukten stull. nära dubbelt så lång som blomfjället utom borsten, som är af fjällets längd. — Schmidia Tratt.*

2 *Ardeln. CLISANTHÆ*. Blomman under blomningen tillsluten. Stift utdragna, med i blommans spets utskjutande märken.

6 Flocken *Panicæ*. Småax hoptryckta från ryggen, på ena sidan konvexa, på den andra n. platta; af en fullständig och en vanl. felsläende ell. ofullständ. blomma.

#### 512. PANICUM Lin. Hönshirs.

1 *P. Crus galli* L. bladen breda och platta, vanl. i kanten vågiga, utan snärp; vippan med ensidiga skiftevisa axlika grenar; blrna med borst. ☉ 7, 8. Fig. FLD.1564. Reich.D.Fl.f.516. Andst.11,f.119. H.N.f.1, n:o 75.

Od. st. r. (Sk. Christianstad; Ystad; Skanör; Helsingborg m. fl. st. Hall. vid Hasselöf; Vindrarp och Karup, helst bland hampa: Theor.; Hvalinge prestg. Blek. Sturkö; Thorhamn m. fl. st.) *Den 2kånade blommans fjäll benhvita. — Echinochloa PB. Opismenus Kunth.*

#### 513. DIGITARIA Scop. Blodhirs.

1 *D. humifusa* Pers. bladen och slidorna glatta; vippan n. fingerlikt delad i 3—5 ensidiga ax; småaxen åggrunda finludna borstlösa. ☉ 7, 8. Fig. FLD.2641. Reich. f.506. Andst.11,f.120. H.N.f.1, n:o 76.

Åkrar. r. (Sk. här och der. Hall. allm. i söd. del: Theor. Blek. Ronneby; Hoby; Carlshamn enl. Goss.; Norge gästg. m. fl. st.) *Stråden nedligg. ell. uppstig.; vippans nedre grenar vanl. något fränksiljda; småaxen bruna. — D. filiformis Reich. Panicum glabrum Gaud. P. sanguinale L. Fauna ed.2.*

#### 514. SETARIA Pal. B. Kafvelhirs.

1 *S. viridis* PB. bladen breda, stråfva, med i fina hår upplöst snärp; vippan axlik, n. cylindrisk; svepeborsten stråfva af uppåt rigtade taggar. ☉ 7, 8. Fig. FLD.852. Andst.11,f.123. H.N.f.15, n:o 92.

Od. st. back. r. (Sk.—Uppl. Norrtelge, Beateberg i parken. Vestml. Ferna. Verm. Thorsby i Fryksände; Råda sn enl. Leffl. VG. Mariestadstrakten flerst. Dalsl. Boh. Hall. Öl. Gottl. Roma etc. — N. söd. del: Laurvig och Hvalöarne upp till Gudbrandsdalen.) *Axet grönt. — Cynosurus panicæus L.Fl.Su. Panicum viride L.Sp.Pl.*

7 Flocken *Sesleriacæ*. Småax hoptryckta från sidorna, flerblommiga, föga kortare än de stora skärmsjällen.

#### 515. SESLERIA Scop. Elfäxing.

1 *S. cærulea* Ard. bladen platta, smala; axet äggformigt—n. aflångt; småaxen 2—3-blommiga; yttre blomfjället med 2—4, korta borst i spetsen. 2½ 4, 5. Fig. Sv.B.210. FLD.1506. Andst.11,f.124. H.N.f.12, n:o 96.

Fukt. äng. (Sk. Småll. öst. delen.—Gestr. Jemll. Vestml. Ner. Vinteråsa sn. Hall.

söd. del.: Theor. *Öl. Gottl.* — *N.* Tellemarken enl. Hornem. Osäker enl. Bl.)  
*Axel stort som en mindre nöt, af blå, säll. blekgul färg.* — *Cynosurus L.*

- 8 Flocken **Alopecuress.** Småax som i föreg. flock, af en enda blomma innesluten i skärmfjällen.

516. **ALOPECURUS Lin.** Ängkaffe.

- 1 *A. pratensis L.* strået upprätt, från en rotstock; axet cylindriskt, trubbigt; skärmfjällen hopväxta till midten, spetsiga, ludna, längre än blomfj. 2 6, 7. —  $\beta$  *alpestris*: strået och bl. glatta; öfversta bladsliidan 3 gånger längre än bladet. Fig. Sv.B.14. Fl.D.1985. Andst.11.f.127.  $\beta$  H.N.f.11, n:o 83.
- \* *nigricans Horn.* rotstocken vidt krypande och skjutande aflågsnade bladskott; axet slutl. svartnande; skärmfj:s spetsar utböjda; blomfj:s borst innesluten. Fig. Reich. D.Fl.f.477. Andst.11.f.126. H.N.f.4, n:o 94.
- Fukt. äng. a., \* nära strand. r. (Sk.—Jeml. och Ängml. — *N.* söd. om fjellryggen. —  $\beta$  Lwl. och Pt. Lpm. — *N.* Ost-Finnm. Lebesbyfjällen. — \* Blek.—Uppl. och Vestml. VB. Tornio, vid elfven. *Öl.* — *N.* till Ost-Finnm. Varanger.) *Axel mjuk-ludet, ofta fingerlångt, hos  $\beta$  n. hälften kortare.*
- 2 *A. geniculatus L.* strået vid basen upptigande ell. nedliggande, från en trådig rot; axet cylindr., något trubbigt; skärmfj. blott vid basen hopväxta, trubbiga, på ryggen håriga, af blomfj:s längd. 2 6, 7. Fig. Sv.B.333. Fl.D.861. Andst.11.f.128. H.N.f.10, n:o 89.
- \* *fulvus Sm.* bladslid. vidgade; ståndarknapp. brandgula; borsten innesluten. Fig. Fl.D. 1804. Reich.f.476. Andst.11.f.129. H.N.f.10, n:o 90.
- Fukt. st. allmän, \* vanl. i vatt. (Sk.—Lpl. — *N.* till Ost-Finnm. — \* Sk.—Lpl. — *N.* till Trondhj.) *Hufvudformen har meränd. gråbrunt ax, med hvitgula stull. bruna ståndarknappar; A. fulvus har grönligt ax och strået mer nedliggande. Var. 2—4 tum hög, med litet ax och n. trådsmla blad.*

- 3 *A. agrestis L.* strået upprätt, från en trådig rot; axet cylindr., spetsadt åt ändarne; skärmfj. hopväxta till midten, spetsiga, n. glatta, kortare än blomfj. 6, 7. Fig. Sv.B.432. Fl.D.697. Andst.11.f.125. H.N.f.4, n:o 95.
- Sandåkr. r. (ÖG. Slaka sn m. fl. st., men endast tillfälligt: Kindb. Stockh. Biskopsudden. Uppsala. VG. Göteborg. Gottl. Visby; Roma och Klinte socknar m. fl. st. — *N.* Christiania flerst.) *Axel 2—3 tum långt, blåaktigt, med långa krökta borst.*

517. **PHLEUM Lin.** Ängkampe.

† Skärmfjällen tvärhuggna, med utdragen borst.

- 1 *P. pratense L.* öfversta bladsliidan tilltryckt; axet cylindriskt; skärmfjällen hårryggade, med borsten mer än hälften kortare än själva fjället. 2 6, 7. —  $\beta$  *nodosum*: strået vid roten lökformigt uppsväldt. Fig. Sv.B.23. Fl.D.1984. Andst.11, f.130.  $\beta$  Fl.D.380.
- Äng. a. (Sk.—Lpl. — *N.* till Finn.) 1—3 fot högt gräs, med grönt, n. fingerlångt ax; men får på torra ställen längre strå, med 1—1½ tum långt ax, samt då oftare rotnöd: *P. nodosum Willd.* — Skärmfjällens borst stundom nog lång.
- 2 *P. alpinum L.* öfversta bladslid. uppblåst vidgad; axet ovalt—af långt cylindriskt; skärmfj:s borst n. så lång som själva fjället. 2 7. Fig. Sv.B.414. Fl.D.213. Andst.12.f.131. H.N.f.14, n:o 94.
- Fjelltr. a. (Lpl.—Hels. Dal. Vestml. på Hampängen vid Högby i Vestanforss. Verm. — *N.* Ost-Finnm.—Christianss. och Aggerhus st.) Vanl. fotshög. *Axel kortare, men tjockare än hos föreg., varierande utan gräns mell. klotrundt och cylindriskt; till färgen mer violett. Borsten alltid något sträf.*

†† Skärmfj. tvärt spetsade i en kort udd: *Chilochloa PB.*

- 3 *P. Böhméri Wib.* axet cylindr., uppåt afsmalnande; skärmfj. med något sträf rygg, lancettlika, tvärt öfvergående i en kort udd. 2 6, 7. Fig. Sv.B.396. Fl.D.531. Andst.12.f.132. H.N.f.11, n:o 84.
- Torra back. (Sk. Smål. Kalm. län enl. Scheutz. — Geste och Vestml. Hall. *Öl. Gottl.* — *N.* Aggerhus st.) Fotshög ell. mer, tufvad, grågrön. *Axel 2—3 tum långt, stundom med axgroende blr.* — *P. phalaroides Kål. Phalaris phleoides L.*

- 4 *P. arenarium* L. axet *af långt*, uppåt *vidgad*; skärmf. lancettlika *hårryggade*, spetsiga med ganska kort udd. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.915. Reich.f.481. Ands.t.12.f.133. H.N.f.2, n:o 72.

Sand. hafsstr. r. (Sk. mell. Kåseberga och Christianstad, såsom vid Raflunda, Åhus etc. Boh. Öl. Gottl. Visby på Snäckgårdet; Öster- och Vestergarn m. fl. st. — N. uppgifven för Tellemarken, men osäker enl. Blytt.) *Stråden 2—6 tum höga, oftast tufvade; axet omkring tumslångt.* — *Phalaris* Huds.

- 9 Flocken **Phalaridese**. Småax hoptryckta från sidorna, af en fullständig och en eller 2 ofullständ. blommor [antingen könlösa eller enkönade].

#### 518. BALDINGERA Fl. Wett. Flen.

- 1 *B. arundinacea* Dum. vippan under blomn. öppen, med tätblomm. grenar; de könlösa blrna fjäll-lika, långhåriga. 2 7, 8. — *β colorata*: bladen hvitrandiga. Fig. Sv.B.107. Fl.D.259. Ands.t.12.f.135.

Stränd. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm. — *β Jemtl.* Ströms sn, på Öhns skog. — N. vid Örkedalselveu nedom gården Fanremmen i Trondhjs st.) *2—3 alnar högt, bredbladigt gräs med rödlätt vippa.* — *Phalaris* L. *Arundo colorata* Sv.B. *Diagraphis* Trin. och Fr.

#### 519. HIERÓCHLOA J. G. Gmel. Myskegräs.

- 1 *H. borealis* RS. bladen *platta, dubb. bredare* än strået; vippan *utbredd*, med glatta grenar; småaxen äggrunda; blomfjällen *hårkantade*, med *ingen*, ell. *mycket kort* borst i spetsen. 2 5—7. — *β microstachya*: strået omgifvet af långbladiga uppåtråta rotskott; småaxen n. hälften mindre. — *γ firma*: bladslid. stråfva; blrna med kort borst tät under spetsen. Fig. Sv.B.168. Fl.D.963. Ands.t.12.f.137. H.N.f.8, n:o 92.

\* *fragrans* RS. småaxen betydligt större, mörkbruna, med skärmf. mycket längre än blrna.

Fukt. äng., \* i fjelltr. (Sk. Smål.—Lpl. — N. till Ost-Finm. — *β Sk.* Lund på Kungsmarken samt vid Fogelsång. VG. Skara och Lidköp. — *γ Gesle*, på Rönnmaren. — \* *Jemtl.* Åreskutan nedom Blå-sten. Stockh. vid Mofjärd på Svartsjölandet. — N. Gudbrandsdalen, Dovre etc.) *Valluktande gräs med brungula glänssande, 2 lin. långa småax, kryppande rotstock.* — *H. odorata* Wg. *Holcus* od. L.

- 2 *H. alpina* RS. rotskottsbladen *trådlikt hoprullade, icke bredare* än strået; vippan *hopdragen* med glatta grenar; småaxen yngre aflånga, de båda nedra blrna *hårkantade* och med *utskjutande knäböjd* ryggborst. 2 7, 8. Fig. Wg.Fll.t.2. Sv.B. 438. Fl.D.1508. Ands.t.12.f.139. H.N.f.3, n:o 90.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. vid Tornio träsk; Karesuando. — N. Finm. Alten, Goske-vare; Lyngen på Tsatsa.) *Rotstocken kort; stråden vanl. tufvade; slid. på strået med blott ämmen till blad.* — *Aira Liljebl. Holcus* Sv.B.

#### 520. ANTHOXANTHUM Lin. Vårbrodd.

- 1 *A. odoratum* L. bladen *platta*; vippan *smal axlik* ell. lancettformig; de könlösa sidoblrnas fjäll rundadt trubbiga, med lång ryggborst. 2 5, 6. Fig. Sv.B.11. Fl.D.666. Ands.t.12.f.136.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) *Tufvad, valluktande gräs med slutt. gulglänssande vippa, som stund. är större och ojemnt ell. afbrutet gyllträd.*

- 10 Flocken **Nardese**. Småaxen oskaftade, i ax, utan skärmfjäll.

#### 521. NARDUS Lin. Stagg.

- 1 *N. stricta* L. bladen *trådlika*; axet *borstsmalt, glatt, ensidigt*. 2 7. Fig. Sv.B.174. Fl.D.1022. Ands.t.12.f.141.

Fukt. äng. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm.) *Styft och segt gräs med kort rotstock och hårdt tufvade bladskott kring stråens bas.*

# III. HETERONEMEAÆ.

## 17 KLASSEN

### FILICES *Lin.*

- 99 Fam. **POLYPODIACEEÆ** *R. Br.* Stambladen i knoppen inrullade; slutl. bärande sporgömmena gyttrade på baksidan, mer sällan i kanten, omgifna af en elastisk ring [hos *Osmunda* endast antydd af en knöl på baksidan].

#### 522. POLYPODIUM *Lin.* Stensöta.

- 1 *P. vulgare* *L.* stambladet *af långt, glatt, engång pardeladt*; flikarne *skiftevisa, af långt jemnbreda* trubbiga, mot spetsen sågnaggade, de öfre mindre; fruktplättarne ä ömse sidor om bladflikarnes ryggner. 2 6, 7 \*). Fig. Sv.B.37. Fl.D.1060.

Berg och sten, a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) 6—8 tum hög; rotstocken *långt krypande, tjock*.

- 2 *P. Phegopteris* *L.* stambladet *n. triangulärt, hårigt, en gång parbladigt*, med n. motsatta oskaftade parblad, *de 2 nedersta nedböjda*, de öfre sammanflytande, alla djupt delade i n. *helbräddade* motsatta flikar; fruktpl. nära flikarnes kant. 2 8, 9. Fig. Fl.D.1241.

Skog. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) *Omkring fotshög*.

- 3 *P. Dryopteris* *L.* stambl. *triangulärt, vanl. glatt, dubbelt parbladigt*; parbladen *motsatta*, de 2 nedersta skaftade, med pardelade småblad \*\*); flik. *naggade* och trubbiga; fruktpl. som hos föreg. 2 7, 8. Fig. Fl.D.1943.

\* *Robertianum* *Hoffm.* småbladen under glandelhåriga; plättarne slutl. sammanflytande. Fig. Fl.D.suppl.41. H.N.f.14, n:o 96 [var.].

Skog. mur. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. — \* ÖG. Motala flerst., och nära Skenninge. Dal. Osmundsberget. Öl. Gottl. — N. Christiania och Porsgrund till Nordl.: Norm.) *Fotshög, mjuk ormbunke. \* blir, äldre, mera styf och kopdragen, med plättar, som slutl. betäcka bladens hela rygg sida: P. calcareum* Sm.

- 4 *P. alpestre* *Hoppe*: stambladet *bredt lancelllikt, glatt, 2—3dubbelt parbladigt*; parbladen *skiftevisa*; småbladens flikar *af långa sågtandade*; fr.plättar runda åtskilda. 2 8. Fig. Schk.Cr.Gew.80. H.N.f.14, n:r 95.

Fjellv. r. (Lpl.—Herjed. — N. Ost-Finnm. Lebesbyfjellen.—Hecke- och Byggefjell.) *Lik Asplenium* Fil. fem.; *alnhög och quartersbred, men med runda svepelösa plättar och likformiga bladflikar.* — *P. rheticum* *L.* och Fr. S.V.Sc.

\*) Hos Kryptogamerna antyder månadsnummern den tid, då fröredningen är mest utvecklad, ell. då sporgömmena äro färdiga att släppa groddkornen, emedan de då böra examineras.

\*\*) Då stambladet är sammansatt, delas det först i parblad, parbladen i småblad, och dessa i flikar.

523. *ASPIDIUM* Sw. Taggbråken.

- 1 *A. Lonchitis* Sw. stambladets skaft fjälligt, glatt; stambladet n. jemnbredt, en gång parbladigt; parbladen hela, månlíkt böjda taggsågade, glatta. 2/7, 8. Fig. Fl.D. 497. H.N.f.13, n:o 95.
- Bergsrött. r. (Torn. Lpm. Tornioträsk. Lul. Lpm. vid Sähkök etc. Um. Lpm. i de högsta fjellen. Jeml. Portfjellet; flerst. i Frostviken; Snasabögen; Åreskutan. Herjed. Dal. vid Porfyrverket. Vestml. Sala mellan Kolarehagen och Stumpers-torp. Dalsl. Ullgrund; Hafsåsberget. Södra Hall. — N. Finnm.—Christiansand och Christiania.) Stambladen tufvade, 1—1½ fot höga, 2 tum breda. — *Polystichum Roth.*
- 2 *A. angulare* Kt. stambladets skaft fjälligt och hårigt; stambl. lancettlikt, dubbelt parbladigt; parbladens småblad månlíkt böjda, grundt och taggigt stikade, håriga. 2/8. Fig. Fl.D.2559. H.N.f.13, n:o 96.
- \* *aculeatum* Sw. mindre; stambl. blågrönt, mindre hårigt, men styfvare.
- Skog. r. (Sk. Skärall, Onsö börad. — N. Christiania; Holmestrand; Tellemarken; Christiansand; Bergen upp till Bedstad i Trondhj. st. — \* Gøttl. Thorsborg.) *Ålnshög, till fjällig af bruna glänsande fjäll. — Polyst. Presl.*

524. *POLYSTICHUM* Roth. Ormkagge.

† Stambladet en gång parbladigt.

\* Flikarne helbräddade ell. glest och omärklígt naggade.

- 1 *P. Thelypteris* Roth: stambladskaflet n. af bladets längd ell. längre; parbladen utdraget lancettlika pardelade, icke kådprickade; flikarne n. helbräddade, kortspetsiga, de fruktbarandes kanter tillbakavikna; fruktplättarne nära kanten, sammanflytande. 2/7—9. Fig. Fl.D.760.
- Stränd. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. Verml. Boh. Hogdal sn, Sundby. Öl. Gøttl. Klinte. — N. till Nummedalen i Trondhj. st.; mest allm. i Aggerhus st. enl. Bl.) Mycket bräcklig; af ljusgrön färg. Rotstocken lång, krypande och grenig. — *Aspidium Sw. Lastrea Presl.*
- 2 *P. Oreopteris* DC. stambladskaflet flere gånger kortare än bladet; parbladen utdraget lancettlika pardelade, under fint kådprickade; flikarne n. helbräddade, trubbiga, de fruktbarandes kanter platta; fruktplättar som hos föreg., knappt sammanflytande. 2/7, 8. Fig. Fl.D.1121. H.N.f.16, n:o 82.
- Bergsrött. r. (Sk. Skärall; Klöfvaballar; Hallandsås, vid Svartebäck. Hall. Kitterhall i Voxtorp; H. N.; Vallen; Theor. — N. från Christiansand längs kusten upp till Helgeland.) *Ålnshög och deröfver. Rotstocken kort, grof, med gylltrade stamblad. — Aspid. Sw. Lastrea Presl.*
- \*\* Flikarne djupt naggade ell. sågade.
- 3 *P. Filix mas* Roth: stambladskaflet som hos föreg.; parbladen lancettlika långspetsade, djupt pardelade, med aflånga, rundadt trubbiga, trubbnaggade, stundom inskurna flikar; fruktplättarne talrika runda, närmade till flikarnes medelnerv. 2/7, 8. Fig. Sv.B.51. Fl.D.2740; 2741, var. Somf.Crypt.ess.103.
- Skog. a. (Sk.—Pit. Lpm. — N. till Finnm.) Stambl. 2—3 fot höga, vanl. talrika från rotstockens spets. Var. med halfvägs till medelnerven inskurna, och med n. rundtomkring sågade flikar. — *Aspid. Sw. Lastrea Presl.*
- 4 *P. cristatum* Roth: stambladskaflet vanl. långt, ofta n. af bladets längd; parbladen åggrunda, pardelade; flikarne merändels hela åggrunda, rundadt trubbiga, hvasst naggågade, med få (2—8) fruktplättar. 2/7—9. Fig. Sv.B.390. Fl.D.1591. H. N.f.9, n:o 98.
- Mossar och tufviga skogsäng. (Sk.—Gestr. Vestml. Ner. Hall. Gøttl. — N. söd. del. af Aggerhus st.) Har fastare byggnad än *P. spinulosum*, från hvars enklare former den knappt är tillräckligt skild, och hvarmed den af flere förf. förenas. — *Polypod. Callipteris Ehrh. Aspid. Sw. Lastrea Presl.*

†† Stambladet 2—3dubb. parbladigt.

- 5 *P. spinulosum* DC. stambl. 2—3dubbelt parbladigt; parbladens småblad parklufna eller pardelade med aflånga taggsågade flikar. 2/7, 8. —  $\beta$  dilatatum: fjellen på

stambladets skaft talrika, längs midten mörkbruna; stambl. bredt äggrundt, mörkgrönt, glandelprickigt, genom de n. till basen delade likarne 3dubbelt parbladigt. Fig. Fl.D.707,  $\beta$  1346 enl. Lge. H.N.f.13, n:o 97,  $\beta$  f.16, n:o 83.

Skogsmark, a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm. vid Alten- och Tanaelv. —  $\beta$  Sk.—VG. och Ner. Stockh. Jeml. Mest i de vest. prov. — N. Finnm.: Th. Fr.) Var. i hög grad.  $\beta$ , ell. *Aspid. dilatatum* Sw., är på mycket skuggiga ställen vid bergsrötter ganska utmärkt, men medelformer till den vanliga saknas icke. — *Aspid. Sw. Lastrea Presl.*

6 *P. rigidum* DC. stambl. dubb. parbladigt, under glandelprickigt; parbladens småblad n. lancettlika, parflikade med i spetsen hvasstandade likar. 2, 7, 8. Fig. Sturm 2 Afd. 11 häft. H.N.f.16, n:o 84.

Bergstr. r. (Stockh. Vermdön, i en skogsbacke nära kyrkan. Jeml. Åreskutan? — N. enl. ex. i Ahnfelts herb.: Kindb.; Christianss. st. Sogendal enl. ex. i ett äldre herb.: Bl.) Stambl. omkr. 1 $\frac{1}{2}$  fot högt, small lancettlikt, med skifvevisa parblad; småbl. lancettlikt aflånga trubbiga; likarne ej näende medelnerven, spetsigt, men ej taggigt tandade som hos föreg. enl. utländska ex. — Ett exemplar från N. Kirko, Vahlöarne instämmer nogga med Alex. Brauns ex. af dess  $\beta$  remotum, som dock allt för mycket närmar sig föreg. art. — *Lastrea Presl.*

## 525. CYSTOPTERIS Bernh. Stenbräken.

1 *C. fragilis* Bernh. stambladskafet vanl. icke längre än bladet; detta lancettlikt, en gång—dubb. parbladigt; parbladen parklufna ell. pardelade, med tandade, likade ell. å nyo delade småblad och trubbtandade likar. 2, 7, 8. Fig. Fl.D.401. —  $\beta$  *dentata*: parbl. en gång parklufna ell. pardelade, med rundadt trubbiga likar.

\* *alpina* Desv. parbl. dubbelt pardelade, med i spetsen 2—3tandade likar.

Berg, murar etc. a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. — \* Herjed. på Ljungdalsberget.) 3—10 tum hög, spåd och bräcklig; till fördelningen högst oöfverlande, från en gång till n. 3dubbelt parbladigt. \* den mest delade formen synes genom mellanliggande varr. öfvergå i den vanliga och är, ehuru finare än denna, mycket gröfre än den utländska. — *Polypod L. Aspid. Sw. Cyathea Roth. \* C. regia v. alpina Koch och Fr. S.V.Sc.*

2 *C. montana* Bernh. stambladskafet vanl. längre, ofta dubb. längre än bladet; detta triangulärt, 3dubbelt parbladigt; småbladen [3:dje ordningens] djupt inskurna i aflånga tandade likar. 2, 7, 8. Fig. Sv.B.666. Fl.D.2250. H.N.f.3, n:o 96. Somf. Crypt.exs.4.

Bergsrött. r. (Torn. Lpm. Kurravaara, samt på Waiwanen- och Nulja-laki. Lul. Lpm. Jälle; Särjusjaure; Öviksjöck. Åsele Lpm. Jeml. allm. i Ströms och Frostvikens snr; Åreskutan; Hofverberget och vid Östberget på Frösön. Herjed. Funnesdalsberget och stora Midtåkläppen etc. Ångml. kring Täsjön. — N. Ost-Finnm.—Christiania. Krokkliefven etc.) Stambl. 4—6 tum långt och n. lika bredt, med ofta fotshögt skaft. — *Aspid Sw. Polypodium Sv.B.*

## 526. WOODSIA R. Br. Hällebräken.

1 *W. ilvensis* Br. stambladskafet 2—3 gånger kortare än bladet; detta aflångt—jemnbredt, med tvär bas, parbladigt; parbl. likformiga, alla pardelade ell. parklufna, med likiga ell. tandade, på baksidan håriga och fjälliga småbl. 2, 7. Fig. Fl.D. 391 och 2186. H.N.f.11, n:o 95. Somf.Cr.exs.102.

\* *hyperborea* Br. parbladen bredare, blott parklufna, med färre, n. helbräddade, på baksidan håriga, icke fjälliga likar. Fig. V.A.H.1793, t.8. H.N.f.12, n:o 97.

Bergsprick., \* i fjelltr. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm. — \* Lpl.—Herjed. Dal. Osmundsberget enl. Frist. — N. Finnm. mångenst.; samt Nordl. Gildeskaal: Norm.; Langsvand enl. Frist. Dovre. Christiania, Hovedöen: Bl.) Bladets baksida hos hufvudformen bär talrika smala fjäll jemte håren. Ex., som utg. samlat vid Meelhuus nära Trondhj., sakna alla fjäll, likt hyperbor., men hafva parbl. smala och djupt pardelade, likt ilv., och synas sål. sammanbinda bägge formerna. — *Acrostichum L. Polypodium Sw.*

2 *W. glabella* Br. stambladskafet många gånger kortare än bladet; detta jemnbredt lancettlikt, afsmalnande vid basen, parbladigt; de nedre parbl. n. njurlika, 3-

flikiga, de öfre triangulärt äggrunda, parklufna, alla jemte skaftet glatta [utan hår och fjäll]. 2½ 7. Fig. Hook. Fl. bor. am. t. 237 enl. Frist.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. Kurravaara och vid Suttajoki. Lul. Lpm. Wiribaure; Jälle; Nammats. Pit. Lpm. Kalkisbuit m. fl. st. Allt enl. Frist. — N. Finnm. Porsanger, Alten, Rostafield etc.: Norm.; Tsatsa enl. ex. af Læst. Nordl. Langsvand och Solvaagtind enl. Frist.) Fullkomligt glatt, utom svepehåren. De ex., utg. sett, äro 1—3 tum höga, omkr. 3 lin. breda. Hos oss i sednare tider först igenkänd och utredd af R. F. Fristedt (se Bot. Not. 1865). — *Polypodium hyperbor. a* Wg. Fl. Lapp. W. ilv. \* *lapponica* (Angstr.) ed. 9.

## 527. ASPLENIUM Lin. Bergsspring.

† Fruktplätt. aflånga, krökta; bladen mycket sammansatta, med nedtill fjälligt skaft: *Athyrium* Roth.

\*1 *A. crenatum* Fr. stambladskafte n. af bladets längd ell. längre; stambladet 3ängulärt, 3dubbelt parbladigt; alla parbladen skiftevisa; slutflikarne bredt aflånga, rundadt trubbiga ell. n. tvärhuggna, trubbnaggade. 2½ 8. Fig. Fl. D. suppl. 40. H. N. f. 8, n:o 97.

Fjelltr. r. (N. här och der i Sells Annex i Gudbrandsd. t. ex. mellan Kyrkan och Kringelen, vid vägen; Ringeboe, vid Lougens strand midtför Elstad; vid Storstenuren ¼ mil söd. om Vig.) Bladet omkr. 10 tum bredt och långt utom skaftet; flikarne något lika dem hos följ., fruktbärande bladens djupare, något inskuret naggade. — *A. sibiricum* Turcz. *Aspidium* Somf.

2 *A. Filix femina* Bernh. stambladskafte flere gånger kortare än bladet; detta lancelliskt, dubb. parbladigt; de nedersta parbladen motsatta; småbladen djupt parklufna, med sågade ell. tandade flikar, de nedersta olikformiga, den främre större. 2½ 7, 8. —  $\beta$  *complicatum*; parbladen S-formigt krökta, med nedböjda, mindre djupt sågade småblad. —  $\gamma$  *molle*: mycket mjuk; parbladen endast pardelade, i sammanflytande småblad. Fig. Fl. D. 2436.

Skogsmark, a. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finm. —  $\gamma$  Sk. vid Bosarp. Ångml. Nora sn, Grönsvik.) Omkring alnshög;  $\beta$  hälften mindre. — *Polypod. L. Aspid. Sw. \gamma* *Polypod. molle* Schreb. enl. Fr.

†† Fruktplättarne aflånga, raka; stambladskafte icke fjälligt.

\* Parbladen bredast vid basen ell. midten, med tydlig medelnerv.

a — Stambladet dubb. parbladigt.

3 *A. Adiantum nigrum* L. stambladskafte af bladets längd ell. längre; stambl. utdraget äggrundt; parbladen skiftevisa pardelade, med aflånga, inskurna eller hvass-sågade flikar; fruktplättarne yngre jemnbreda, slutl. sammanflytande. 2½ 7—9. Fig. Fl. D. 250. H. N. f. 10, n:o 98.

Skugg. st. r. (Sk. Kullaberg, på klippan Bärkull m. fl. st. särdeles frodig i bokskogen; Hallandsås, strax norr om Rysjöholm på Trollehallar; Skäråli och Gladsaxhallar enl. F. Aresch. Fordom funnen mellan Dybeck och Everslöf. — N. på Findöe och Rennisöe i Stavangerfjorden; flerstädes i Bergens st., såsom Bogöen, på Goustalien; Leganger; Svanöe. Trondhj. st. Valdershoug.) Hela ormbunken från ¼ till 1 fot hög, med äggrundt lancellitlik omkrets, glatt bladskafte.

b — Stambladet en gång parbladigt [parbladen odelade].

\*4 *A. marinum* L. parbladen kort skafade, nedlöpande på det derigenom vingkantade gemensamma skaftet [rachis], smedt rundadt ell. rutligt äggrunda, groft naggade, de öfre sammanflytande. 2½ 7. Fig. E. B. 392.

Strandklipp. r. (N. Møsterhavn på Møsteröen i söd. delen af Bergens st. 1864: Cand. F. Hoch.) Stambladet lancellitlik, på Norska ex. knappt ½ fot högt, tumsbredd, med ½ tum långa och lika breda parbl. [Eng. ex. vanl. mer än dubb. större, med mer långsträckt parbl.] Skaftet nedom och uti bladet glänsande mörkbrunt, med smala ljusgröna vingkanter af de nedlöp. parbl., mellan de öfversta parbl. grönt.

5 *A. Trichomanes* L. parbladen oskafade, icke nedlöp., rundadt äggrunda, grundt naggade. 2½ 7. Fig. Sv. B. 131. Fl. D. 119. Somf. Cr. exs. 6.



- Bergsprick. (Sk.—*Ängml.* och *Jeml.* *Öl. Gottl.* — *N.* till Salten och Bejeren: *Norm.*) *Hela bladskaflet till bladspetsen svartbrunt; bladet jemnbredt,  $\frac{1}{2}$  fot högt, knappt  $\frac{1}{2}$  tum bredt.*
- 6 *A. viride* Huds. parbladen ganska kort skaftade, icke nedlöp., *äggrunda*, inskuret naggade. 2 7, 8. Fig. Sv.B.462 och 774. Fl.D.1289. H.N.f.3, n:o 97. Somf. Cr.exs.5.
- Bergsprick. r. (*Lpl.*—*Herjed.* Midtåklappen; Ljungdalsberget etc. *Ängml.* Ytter-Lännsås, Borgen. *Medelp.* Randklöfven. *Dal.* Norrbärke sn, vid torpet Jätturvallen. *Verm.* Elgå socken, Gräns-sjötorp. *Smål.* Taberg. J. E. Zett. Djupskuran i Ökna sn enl. Scheutz. — *N.* Finnm.—Christiania; Skien och Porsgrund.) *Bladskaflet grönt, endast nedtill brunt; eljest mycket lik föregående.*
- \*\* Parbladen och småbl. bredast mot spetsen, omv. äggr.—vigglika ell. n. jemnbreda, utan märkbar medelnerv.
- 7 *A. Ruta muraria* L. stambladet n. *triangulärt* och *dubb.* parbladigt. med de nedre parbl. delade i flere, omv. *äggrunda*, hela eller likiga, naggade småblad. 2 6, 7. —  $\beta$  *tripinnatum*: stambl. bredt triangulärt, 3dubb. parbladigt; slutflik. omv. äggr., trubbigt 2—3tand. Fig. Sv.B.306. Fl.D.190. H.N.f.14, n:o 97.
- Bergsprick. murar. r. (Sk. t. ex. Lunds domkyrka; Landskrona enl. F. Ar.—*Södm.* Utön; Nämndö; Vårdinge sn, m. fl. st. *Stockh.* i Danviksbergen. *Gefle* på Gråberget. *Herjed.* på Ulfberget. *Dal.* *Vestml.* Norberg vid Klacken. *Verm.* Boh. *Christine-dal.* *Öl. Gottl.* — *N.* till Finnm. —  $\beta$  *Gottl.* Thorsborgens norra sida; Visby kalkugn; samt Rosl. Singö enl. G. v. Ced.) *Småbladen bredare i jemförelse med långden och mer naggade än hos följ. 2 arter.*
- 8 *A. Breynii* Retz. stambl. *smått lancetlikt*, en gång parbladigt; småbladen skiftevisa, *lancetlikt vigglika*, oregelbundet inskurna; de nedersta något sammansatta. 2 6, 7. Fig. Sv.B.534,f.2. H.N.f.9, n:o 99.
- Bergsprick. r. (Sk.—*Helsl.* Hudiksvall, Getberget. *Ängml.* Skuluberget; Säbrå sn, Grofellsberget; Arn. *Vestml.* Björnön; Köping, Gallberget etc. *Ner.* Lillkyrka sn; Tarstaborg i Sköllersta. *VG.* Falbergs by. *Dalsl.* Boh. *Hall.* Valås i Vallda: Leffl. — *N.* Dröbak; Christiania; Laurvig—Trondhj.; Levanger, på Borgsöen.) 3—4 tum hög. — *A. alternifolium* Wulf. *A. germanicum* Weiss.
- 9 *A. septentrionale* Hoffm. stambl. i toppen flikadt i 2—3, n. *jemnbreda* ell. smått vigglika, något inskurna, *spetsade* småblad. 2 6, 7. Fig. Sv.B.534,f.1. Fl.D.60.
- Bergsprick. (Sk.—*Ängml.* och *Jeml.* upp till Frostviken. — *N.*) *Quartershög.* — *Acrostichum* L.

## 528. SCOLOPENDRIUM Smith. Mjeltbräken.

- 1 *S. Phyllitis* Roth: stambladet odeladt, lancetlikt, med hjerlik bas; medelnerven fjällig. 2 7. Fig. Sv.B.143. H.N.f.10, n:o 99.
- Bergsklyft. r. (*Gottl.* Lilla Carlsons nordöstra del. Af gammalt äfven uppgifven för Sk. Ofvedskloster.) *Asplen. Scolopendrium* L. *Scolopendrium vulgare* Sm. *Sc. officinarum* Sw. *Sc. Lingua* Sv.B..

## 529. PTERIS Lin. Bräken.

- 1 *P. aquilina* L. stambladet triangelformigt, 3dubbelt parbladigt; slutflikarne aflånga trubbiga, de yttersta sammanflytande till en odelad uddflik. 2 8, 9. Fig. Sv.B.90. Fl.D.2303. H.N.f.8, n:o 98 [en hårig var.].
- Skogar, vägar etc. a. (Sk.—*Åsele Lpm.* och *Ängml.* *Öl. Gottl.* — *N.* till Finnm.) *Stor ormbunke*, med långt skaft. *Stambl. stundom hårigt, särdeles på undre sidan: v. pubescens* P. C. Afz. *Stundom bildar en svamp [Dothidea Pteridis Fr.] svarita linier på bladflikarnes undre sida, alldeles liknande smala fruktpåttar.*

## 530. STRUTHIOPTERIS Willd. Foderbräken.

- 1 *S. germanica* Willd. de ofruktsamma stambladen lancetlika, parbladiga, med par-delade parblad, helbräddade likformiga flikar; de frukt bärande enklare och smalare, n. jemnbreda. 2 8, 9. Fig. Fl.D.169. Fl.N.1,t.1.

Bäckdalar. (Sk. Smål.—Lul. Lpm. Torn. Lpm. Tornioträsk, vid Lalmolakti. Boh. — N. till Finnm.) 2—3 fot hög. De fruktbärande bladen äro mycket mindre, satta i midten af de struformigt samstående ofrukt samma stambladen. — *Osmunda Struth. L. Onoclea Sw.*

## 531. BLECHNUM Lin. Kambräken.

1 B. *Spicans* Roth: stambladet utdraget lancettlikt, en gång pardeladt; likarne skiftevisa, utdraget aflånga. n. trubbiga parallela; de fruktbärande bladens likar smalare, spetsade. 2½ 7, 8. Fig. Fl.D.99.

Bergsrött. r. (Sk. mångenstädes. Blek. Gredby; Augerum etc. Smål. mest i vest. del. ÖG. vid Gusum. Uppl. Elfkarleby sn, Ytterboda. Helsl. Norrbo, Bastvallen. Ängml. Bjertrå sn, Österstrinns skog: Ärn. Jemtl. Herjed. Ner. i Lerbäck sn. Verm. vid Carlstad. Dalsl. Ör sn. VG. Broholm i Sandhem sn; Göteborg. Boh. Hall. Öl. Rälla. Götth. — N. till Ost-Finm.) Stambl. omkr. fotshöga, 1½ tum breda, de fruktbärande längre skafade och derigenom högre än de ofrukt samma, samt med gleare flikar. — *Osmunda L. Bl. boreale Sw.*

## 532. ALLOSORUS Bernh. Krusbräken.

1 A. *crispus* Bernh. stambladet äggrundt, 3dubbelt parbladigt; småbladen skiftevisa; slutlikarne aflånga—omv. äggrunda, inskurna; de fruktbärande bladens smalt lancettlika, helbräddade. 2½ 7, 8. Fig. Fl.D.496. H.N.f.3, n:o 98. Somf.Cr.exs.104.

Fjellv. (Torn. Lpm. Ylistunturi; Kälsepkte. Lul. Lpm. Qvikkjokk; Næmmats: And. Pit. Lpm. Örfjellet etc. Jemtl. Åreskutan. Herjed. ned till Storsjö-fjellen. Dal. eml. Retz. Obs.f.1. — N. Ost-Finm. Varanger; samt Vest-Finm. på spridda st. Nordl. Ofoten och Bejeren: Norm. ned till Stavanger, Österdalen, Trysil- och Sölen-fjeld.) 3—9 tum hög. — *Osmunda L. Pteris Sm. Onoclea Sw. Cryptogramma Br.*

## 533. HYMENOPHYLLUM Smith. Hinnblad.

\*1 H. *Wilsoni* Hook. krypande; de uppstigande grenarne med skiftevisa, mest 2—3-delade, något ensidiga parblad, aflångt jemnbreda, uddsågade flikar eller småblad; bladbärande skafet smalvingadt; svepefjällen äggrunda, uppblåsta. 2½ 5, 6. Fig. Fl.D. 954. H.N.f.11, n:o 96.

Fukt. st. på mossar, r. (N. Bergens st. Sognefæste, Tysnäs vid Kuppelvighave; vid Sandviggselfven; Hardangerfjordens öar. Christiansands st. Lysefjord vid Andrewsån.) Från en i mossan krypande tagellik rotstock uppstiga 2 tum höga, hinnaktiga, bladbärande grenar, än omärkligt, än temligen bredt vingade, särdeles upp emot bladen. Parbladen än raka, än tillbakaböjda; flikarne med en stark brun nerv, mycket liknande bladen af *Mnium undulatum*. Svepefjällen otydligt naggade. — *H. tunbridgense* Fl.D.

## 534. OSMUNDA Lin. Safsa.

1 O. *regalis* L. stambladet dubbelt parbladigt, med lancettlika glatta, vid basen snedt tvärhuggna småblad; de öfversta parbladen mycket smärre, fruktbärande och förenade till en vipplik samling. 2½ 7. Fig. Sv.B.366. Fl.D.217. H.N.f.12, n:o 98.

Skugg. stränd. och holmar i åar, r. (Sk. flerst. i nor. delen. Blek. vid Nettraby, Ronneby och Lyckeby åar. Hall. Laholm; Tvååker. VG. Baggeqvärn, i Åtran. Smål. Femsjö, Viresta etc.; Barkeryd i Jönk. län; samt i de flesta åar inom Kalmar län. Gestr. mellan Åbyggeby och Oslättfors.) En skön, 1—2 alnar hög, n. busklik ormbunke.

- 100 Fam. **OPHIOGLOSSÆ** R. Br. Stamladet i knoppen rakt. Fröredningen i enkelt ell. sammansatt ex af sporgömmen utan ring.

535. **BOTRYCHIUM** Sw. Lågräs.

† Stammans [det gemens. skaflets] nedersta, mot rotstocken något vidgade del på alla sidor slutet omkring den deruti befintliga knopp, och n. trind; bladet \*) högst dubb. paradeladt: *Eubotrychium* Milde.

\* Bladet fästadt vid ell. ofvan stammans midt, n. oskaftadt.

- 1 *B. Lunaria* Sw. bladet vid stammans midt, vanl. hjertlikt aflångt, en gång paradeladt, med månlikt halfstrunda, helbrädd., tandade ell. inskurna småbl. 2/7, 8. Fig. Sv.B. 372, f. 1. Fl.D. 18, f. till venst.

\* *boreale* Milde \*\*): bladet hjertlikt äggrundt—triangulärt; småbl. hjertlikt äggrunda, parflikiga ell. inskurna, med vanl. mot spetsen bredare likar. Fig. Fl.D. suppl. 113. H.N.f. 16, n:o 85.

Betesm. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm. — \* *Lul. Lpm.* Qvikkjokk; Njuonjes vid Tarre-jokk; Sähkok enl. Ands. *Jemtl.* Fogelberget i Frostviken. VB. Umeå sn flerst.; Vännäs sn: Dr Håk. Ängml. Tåsjöberget; Grisslands fiskläge; Hernösand. — N. Ost-Finnm. Renöe i Syd-Varanger. Dovre, Drivstuen och Kongsvold.) Från ett par till 6 tum hög. — *Osmunda* L. \* *innesfallar* B. Lun. *β adianthifol.* ed. 9, ett namn som enl. Milde redan förut är tilldeladt en annan form. — *B. crassinervium* Rupr., en föga känd form, med äggr. småbl. och grofva medelnerver, lär enl. Milde och Ängstr. äfven finnas hos oss. Ex. i Dr Håkanssons herb. godkännas dock icke numera af Milde, som hänför dem till *boreale*; dit äfven *B. brevifol.* Ängstr. enl. Dr Håk:s ex. utan tvifvel hörer.

- 2 *B. matricariifolium* Al. Br. bladet ofvan stammans midt, äggrundt, dubb. paradeladt; småbl. äggrunda, trubbiga, med aflånga, tvärhuggna, n. helbräddade likar. 2/6, 7. Fig.

Betesm. r. (Sk. Hörje sn, v. om Magleby enl. G. v. Ced. Smål. Femsjö; Odensjö; Mjöhult i Sandvik sn, och Hjelmärd i Blädinge enl. Scheutz; Kalmar, på Engö och vid Thorsbo i Mortorp enl. Ekstr. ÖG. Omberg enl. Kindb. Rosl. Gestr. Gefle, vid Stenbäcken. Medelp. Bykullen i Sättna. Ängml. Hernösand enl. ex af Ängstr. VB. Umeå sn, Koddäs. Datzl. Öl.) 3—6 tum hög. Synes genom det från axet mer aflågsnade, tjocka och fastare bladets smalare omkrets, samt småbladens och stikarnes trubbighet väl skild från följ. Af denna art lär *B. tenellum* Ängstr. vara spädare plantor. Var. någongång med de nedersta småbl. aflånga, jemte de öfre till rundflikade: var. *rotundilobum* Ängstr.

- 3 *B. lanceolatum* Ängstr. bladet ofvan stammans midt, tillt invid axet, dubb. paradeladt; småbl. lancetlika, spetsade, med jemnbreda, spetsade ell. snedt trubbadade [icke tvärhuggna], vanl. sågade likar. 2/6, 7. Fig. Fl.D. 18, f. till hög. H.N.f. 16, n:o 86.

Betesm. r. (Torn. och Um. Lpm. samt VB.—Hels. och Verml. VG. Kinne sn, Furubäck nedom Gillsberg. — N. Dovre; Slidre.) Stor som föreg.; bladet på väl utvecklade ex. en god tum bredt och lika långt, af tunn byggnad med långa och smala småblad. — Rupprechts art af detta namn *innesfallar* enl. Milde både näre art och *B. Lun.* \* bor.

\*\* Bladet fästadt långt ned, närmare stammans bas, utdraget skaftadt.

- 4 *B. simplex* Hitchc. bladet ensamt, rundadt ell. hjertlikt äggrundt, odeladt, ell. en

\*) För korthetens skull benämnas här den ofruktsamma blads kifvan blott bladet, och det för denna och den fruktbar. skifvan ell. axet gemensamma skaflet stammen.

\*\*) Mellan denna, i sina bäst utvecklade ex. onekligen ganska afvikande form och vanlig *B. Lunaria* har Utg. på Dovrefjeld och Dr C. P. Læst. vid Umeå (se Bot. Not. 1863, p. 11) funnit tydliga öfvergångar, och Milde sjelf har i bref till Utg. yttrat: »su lägnen ist allerdings nicht, dass *B. boreale* in *B. Lunaria* übergeht». Den kan därför, ehuru af många ansedd för en utmärkt art, här icke upptagas som egen art, på sin höjd som underart. Sjelfva de för olika former begagnade namnen »*evolutum*», »*intermedium*», »*affine*» synas vittna mot växtens arträtt.

gång parflikigt—pardeladt, med få [vanl. 3—5], smeda och olikformiga, rundadt trubbiga, hela ell. inskurna likar. 24. 6. 7? Fig.

Betesm. r. (Sk. enl. ex. fordom funna vid Silfåkra. Verml. Nors sn. vid ett kärr nära Malma herrgård enl. Ångstr. Medelp. Söråker i Hässjö sn enl. ex. i Dr Håkanssons herb.) 1—3 tum hög, mycket spåd och spenslig, med bladets spets icke nående upp till det enkla ell. kort pargreniga axels bas. Har varit ansedd för dels en ung form af följ., dels en var. af *B. Lun.* [var. *cordata* Fr.], men skall enl. Milde, Ångstr. med fl. vara en fullkomligt själsständig art. Utg., som endast sett några få pressade ex. och sål. icke i detta fall kan hafva något eget omdöme, upplager den på de nämnde förf:s auktoritet, för att bättre vända uppmärksamheten på denna sällsynta form.

5 *B. rutaceum* Sw. blad ett ell. tvenne, triangulära, dubb. pardelade; småbladen bredt äggrunda, pardelade, med äggrunda, ofta tandade ell. inskurna likar. 24. 8. 9. Fig. Sv.B.372.f.2. Fl.D.18, f. upptill. H.N.f.3, n:o 99.

Betesm. r. (Sk. Tossjö sn; Ystad. Smål.—Torn. Lpm. Karesuando. — N. till Salten.) 3—8 tum hög, med 1—2 tum breda blad. Det nedre, som anses vara kvarstående från föreg. året, är ofta halfvisnad, men stund. afven lika friskt och grönt som årsbladet. — *B. matricarioides* W. *B. rutae-folium* Al. Br. *B. ternatum* Sw. och Milde. *Osmunda* Lun. i Lin. Fl.Su.

†† Stammens nedersta, knoppfysande del längs ena sidan öppen, derig. djupt rännformig; bladet 3dubb. pardeladt: *Osmundopteris* Milde.

6 *B. virginianum* Sw. bladet fästadt vid ell. ofvan stammens midt, bredt triangulärt; slutlikarne trubbadade, tandade. 24. 7. Fig. Sv.B.665. Fl.D.suppl.112. H.N.f.10, n:o 100.

Gräsbeväxta st. r. (Ängml. Tåsjöberget. Medelp. Hässjö sn, Söråker: Dr Håk.; Borgsjö sn, vid byn Ön. Jemtl. Strånäset i Stugu sn. Dal. Osmundsberget. Gestr. Gefle skärg., på ön Rönnmaren.) Omkring foltshög, med 2—4 tum bredt och n. lika långt, kort skafadt blad; de nedre småbl. af första ordn. tydligt skafade, n. äggrunda, de af andra ordn. aflånga; sporgömmena smärre än hos alla de föreg. arterna.

### 536. OPHIOGLOSSUM Lin. Låketunga.

1 *O. vulgatum* L. bladet odeladt, äggrundt—aflångt. 24. 7. 8. —  $\beta$  *microstichum*: mindre, bladet spetsigare. Fig. Sv.B.378. Fl.D.147.

Äng. och betesm. r. (Sk.—Gefle. Helsl. Hudiksv., på Tjufskär och Saltvik. VB. Umeå skärg., på Kasskäret. Dal. Boda kapell. Ner. Åkerstäd. Dalst. Fröskog och Hesselkog snr. Ölg. Götll. Visby och Hallbros i Vesterhejde enl. Lemm. — N. Kongsberg, Drammen; Åresund vid Christianiafjorden. Toten etc. till Nordl. —  $\beta$  ÖG. Lärketorp i Mölby sn.) Bladet ensam, midt på stammen; rotstocken upprätt, med talrika birötter. —  $\beta$  ansågs för egen art af Acharius och Swartz; en medelform är funnen på Götll. i Hall sn, och i VB. Umeå skärg. af Dr Håkansson.

101 Fam. EQUISETACEÆ DC. Växter utan blad, blott med slidor. Fruktsättning i toppax af kransvisa sköldlika fjäll, med sporgömmen på sin undersida, innehållande talrika groddkorn, som äro försedda med 2 spiralvridna springtrådar.

### 537. EQUISETUM Lin. Fräken.

† Den axbärande stjelen ogrenad, ell. med kransvisa grenar, icke öfverlevande vintern.

\* Axstjelen grenlös och snart förvissnande, eller med grenar utväxande vid och efter fruktsättningen. Vårväxter.

1 *E. arvense* L. axstjelen grenlös, snart förvissnande, med vida hvitaktiga slidor, djupt klufna i svartbruna lancellika tänder; den ofruktsamma med mest enkla, 4- eller

3fårade kransgrenar. 24 4, 5. —  $\beta$  *alpestre*: mycket spåre; de ofruktssamma stjelkarne nedliggande. Fig. Sv.B.474. Fl.D.2001.  $\beta$  H.N.f.8, n:o 99.  
 Lerjord, a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) *Axstjelken* tidigare än den ofruktss., som ofta blir nedliggande och då får de nedre grenarne å nyo delade. Var. tillfalligt, på tidlals öfversvåmmade ställen, med mycket lågväxt och spåd axstjolk, som i de nedersta lederna bår långa och fina kransgrenar: *E. riparium* Fr. [H.N.f.7, n:o 99].

2 *E. pratense* Ehrh. axstjelken merändels utskjutande enkla, 3—4fårade, horizontala grenar; slidorna något vida och bleka, med hinnaktiga ljusbruna smalspeltade tånder; den ofruktss. stj. som hos föreg. 24 4, 5. Fig. Fl.D.1770. H.N.f.6, n:o 99.

Äng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) Är till alla delar spåre än föreg.; vid första fruktsått. n. utan spår till kransgrenar, hvilka småningom utvecklas, dock åfven stundom saknas; någongång åro de redan vid fruktsått. fullt utbildade: var. *serotina*. — *E. amphibolium* Retz. *E. umbrosum* W.

3 *E. silvaticum* L. axstjelkens kransgrenar ånyo delade i kransvisa 3—5fårade smågrenar; slidorna klufna i n. ågggrunda trubade tånder. 24 5, 6. Fig. Fl.D.1182. Somf.Crypt.exs. n:o 1. H.N.f.14, n:o 98 [var.].

Skogsäng. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) Grenarne vanligen bågligt nedböjda sammansatta, utvåxande efter fruktsåttningen; blifva på mycket skuggiga st. jemte smågren. mycket fina och långa:  $\beta$  *capillare* ed.9.

\*\* Axstjelken kransgrenig [stund. enkel] med grenarne fullt utvåxta vid fruktsåttningen. Sommarväxter.

4 *E. palustre* L. stjelken inuti *stjerpig*, merändels grenig, 6—8fårad; grenarne enkla 4—5fårade, n. uppräta; slidorna n. cylindriska [tilltryckta], med dubb. större längd än vidd; deras tånder syl-rika svartbruna, med bred, hvit hinnkant. 24 6, 7. —  $\beta$  *polystachion*: alla kransgrenarne utdragna, n. jemnhöga och axbårande. —  $\gamma$  *tenellum*: stjekarne tufvade enkla trådliska 4kantiga. Fig. Sv.B.402. Fl.D.1183. Somf.Cr.exs. n:o 2. H.N.f.13, n:o 98.

Fukt. äng. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) En del stjekar sakna ofta kransgrenar; andra förgrenas vid basen i axbårande sidostjekar.

5 *E. litorale* Kuhl. stj. som hos föreg., 10—15fårad; gren. som hos föreg., utstående; slid. vanl. uppåt vidgade, mer långa än vida; deras tånder som hos föreg., med smal hvit kant. 24 6, 7. Fig. H.N.f.13, n:o 99.

Fukt. st. r. (Uppl. Valloken i Östuna sn: Ångstr. enl. Doc. P. Olsson.) Omkring fotshög, med utseende af *E. arvensis* ofruktssamma stånd, men lätt skiljd derifrån med stjelhens vida ihållighet [centralkavitet]. Anses af flere förf. vara hybrid af *E. arv.* och följ. art. Svenska ex. osedda af utg.

6 *E. fluviatile* L. stjelken inuti *enpipig*, mångstrimmig eller refflad, enkel eller med mest 5kantiga utstående, enkla grenar; slid. cylindriska, n. lika långa som vida; deras tånder syl-rika svarta, n. utan hinnkant. 24 6, 7. —  $\beta$  *limosum*: stj. enkel eller med några få korta kransgrenar. Fig. Fl.D.1184. E.B.929. H.N.f.11, n:o 97;  $\beta$  n:o 98.

Vatt. a. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) Stj. tjock, alnshög, med stort svart ax; hos hufvudl., hvilken växer i djupare, ofta rinnande vallen, blifva grenarne vanligen trikika, 3—5 tum långa och smala; hos  $\beta$ , som växer i diken och dyiga ställen, framskjuta alls inga, eller blott 1—6, kortare och tjockare grenar. — *E. verticillatum* Döll.  $\beta$  *E. limosum* L., *E. Linnaeanum* Döll.

†† Stjelken endast grenad nedtill, eller vid roten, utan kransgrenar, fortvarande öfver vintern.

7 *E. hiemale* L. stjelken inuti *enpipig*, mångreflad, skarp; slidorna cylindriska med snart affallande, hinnaktiga tånder, härigenom tårhuggna och naggade. 24 5, 6. Fig. Sv.B.330. Fl.D.1409. Somf.Cr.exs.101.

Skog. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.: Norm.) Stjelken hård, 1—2 fot hög, tjock som en skrifpena, med hvita slidor, vid basen tecknade med en svart ring.

8 *E. variegatum* Schleich. stj. inuti *stjerpig*, 6—8fårad; slid. uppåt vidgade, svarta,

med 6—8 *hvitkantade* tänder. i början försedda med en syl-lik. affallande spets. 24 7, 8. Fig. Sv.B.702. Fl.D.2490. H.N.f.4, n:o 100. Somf.Cr. n:o 3.

\* *scirpoides* Michx. stj. hälften smalare, trådläk, 6kantig, oftast nedliggande ell. upp-böjd; slid. vanl. med 3 tänder.

Kärräng. str., \* i skogskärr, r. (*Lpl.*—*Rosl.* Hargs bruk, vid ån. *Vestml.* Sala i Gröna gången. *Verm.* bergslag. Hyttsjöns stränder, och vid sjön Långban. *VG.* Mösseberg: J. Hult. *Gottl.* — *N. Finnm.*—Dovre; Gudbrandsdalen. — \* *Lpl.*—*Gestr.* Kubbo. *Uppl.* Vitulfsberg enl. P. Olsson. *Dal.* Osmundsberget enl. Olss.; Moränget i Öhre enl. ex. af C. G. Clason. — *N.*) *Grenad* vid basen i talrika, 3—10 tum långa, ofta, nedligg. stjekar; *hufvudarten* stundom grof som *E. palustre*, ofta smalare, knappt skiljbar från underarten, hvilken icke har andra karakterer än de, af groflekten beroende, färre kanterna.

102 Fam. **MARSILEACEÆ** R. Br. Växter med enkla trinda blad. Sporgömmen af 2-ne slag, finare och gröfre, i egna klotrunda fruktgömmen vid bladens bas.

538. *PILULARIA* Lin. Furgräs.

1 *P. globulifera* L. trådläk krypande och rotsläende, med borstlika upprätta blad. 24 6, 7. Fig. Sv.B.599. Fl.D.223. H.N.f.15, n:o 98.

Öfversvåmm. stränd. r. (Sk. särdeles i nor. och mell. del. *Blek.* Ronneby vid Skär-sjön; Lyckeby-å och Bastasjö; Gredby vid Nettraby å; Thorhamn m. fl. st. *Smål.* vest. del. t. ex. Femsjö; Pjetteryd; Ljuder; Braås i Dref sn; Grenna, mell. Bunn och Ör. *ÖG.* Motala: Kindb. *Södm.* Öst. Vingåker, vid sjöarne Viren och Gölen. *Verm.* Karlskoga, i Möckeln: Reuterm. *VG.* Göteborg, vid Delsjön etc. *Hall.* Vålås i Vallda: Lem. *Gottl.* Fröjel; Martebo myr. — *N.* Bergen; Möllevand nära Christiansand.) *Fruktg.* stora som pepparkorn, brunludna.

103 Fam. **ISOËTEÆ** Rich. Växter med ett enda knippe af syl-rika blad. Sporgömmen inneslutna uti bladens bas, hysande sporer af tvenne slag, större [makrosporer] och mindre [mikrosporer].

539. *ISOËTES* Lin. Braxengräs.

1 *I. lacustris* L. (och Dur.) bladen styfva, svartgröna och ogenomskinliga; de större sporerne med låga, ås-rika, ofta sammanflyt. ojemnheter på ytan, gulaktiga. 24 7, 8. Fig. Sv.B.600 [i ans. till sporerne storlek]. Fl.D.2742. H.N.f.11, n:o 99 [?, spor. för unga].

Sjöbott. alltid under vatten. (Sk.—Stockh. *Helsl.* Skog sn; Tåfsjön i Undersvik. *Vestml.* Stjernfors. *Ner.* *VG.* Boh. *Hall.* Hasslöf. *Gottl.*? — *N.* Bergens st. Ost-Finnm. Sydvaranger: Norm.) Bladen 2—7 tum långa, vanl. utböjda, hvilken ställning de, upptagna ur vattnet, i ans. till sin styfhet bibehålla; makrosporer märkbart större än hos följ. — *I. atrovirens* Th. Fr. i *Bot.Not.* 1863.

2 *I. echinospora* Dur. bl. föga styfva, ljusgröna, något genomskinliga; de större sporerne med talrika, fina och spröda, utstående bors, kritkvita. 24 7, 8. Fig. Fl. D.2743.

Sjöar som föreg. (Sk.—VB. Kalix och Torn. *Lpm.* Boh. Uddevalla, i Ris-ån. — *N.* Vest-Finnm. Skjervö; samt Ost-Finnm. Sydvaranger, Pasvigelv m. fl. st.: Norm.) Bladen variera i längd som hos föreg., men äro mer smalspetsade, och hopfalla gerna i flere raka knippor, när växten lages ur vattnet; äro stund. gulaktiga. Bäst skiljas dock de bägge arterna på makrosporerne storlek och färg.

104 Fam. LYCOPODIACEÆ Sw. Växter med stielk, täckt af enkla platta blad. Sporgömmen i bladens ell. axfjällens vinkel, oftast uppbristande med en tvärremna.

#### 540. LYCOPODIUM Lin. Lummer.

† Sporgömmen i bladvecken.

1 *L. Selago* L. stielken klynnedelad, med uppräta, n. jemnhöga grenar; bladen jemnt spridda, utstående åt alla sidor, lancettlika, vanl. helbräddade. 2 6—10. Fig. Sv.B. 119. Fl.D.104.

Skogar, berg. (Sk.—Lpl. Öl. Thorslunda. — N. till Finnm.) *Har idla, n. fingerljocka och styfva grenar. Var. i fjelltr. med uppräta, mer tilltryckta blad.*

†† Sporgömmen i egna ax.

\* Bladen spridda, något ensidigt böjda ell. i 5 rader.

2 *L. inundatum* L. stielken nedliggande, rotsläende, med de axbärande grenarne uppräta; bladen på de ofrukts. grenarne böjda åt en sida uppåt, smalt lancettlika helbräddade; axen ensamma, oskaftade. 2 7—9. Fig. Sv.B.612,f.1. Fl.D.336. H. N.f.15, n:o 97.

Dyga kärräng. (Sk.—Helsl. Ängml. Ulånger, vid Lidsjön: Arn. Dal. Ore och Elfdalen. Vestml. Nor. Verm. Dalsl. Boh. Uddevalla. Hall. flerst. mell. Lagan och Nissan: Theor. — N. Aggerhus och Christiansands st.) 2—4 tum lång, med korta uppräta axgrenar i de rotsläende lederna; bladen n. jemnbreda.

3 *L. annotinum* L. stielken som hos föreg., med alla gren. uppräta ell. uppstig.; bladen spridda i omkring 5 rader, utstående, smalt lancettlika med udd. mot spetsen naggsågade; axen ensamma, oskaftade. 2 6—8. —  $\beta$  alpestre: bladen n. tegelagda, utan märklig nerv. Fig. Sv.B.570. Fl.D.127.

Skog. (Sk.—Lpl. Öl. Gottl. — N. till Ost-Finm. —  $\beta$  Lpl.—Herjed. — N. Finm.—Dovre.) Stielken vanl. flere fot lång, med  $\frac{1}{2}$ —1 fot höga, enkla ell. gaffel-tiaktade grenar.

4 *L. clavatum* L. stielken och gren. som hos föreg.; bladen på stj. något ensidigt böjda, alla hårspetsade, helbräddade ell. sågade; axen parvisa, stund. flere tillsammans, vanl. långt skaftade. 2 7, 8. —  $\beta$  lagopus Læst. gren. korta, med tät tegelagda blad; axen kort skaftade. Fig. Sv.B.59. Fl.D.126.

Skog. (Sk.—Lpl. Öl. Gottl. — N. till Finm. —  $\beta$  Torn. Lpm. Karesuando.) Stj. vanl. flere fot lång, med 3—4 t. höga grenar, som oftast bära flere små utstående sidogrenar; axskaftet hos  $\alpha$  2—3 tum, hos  $\beta$  knappt  $\frac{1}{2}$  tum långt.

\*\* Bladen, ätm. på de yngre grenarne, tydligt 4radiga.

5 *L. complanatum* L. stielken krypande; de uppstigande grenarne klynnedelade, platta; bladen på grenarnes platta sidor tilltryckta, små och otydliga, de i kanten större kölade; axen långt skaftade, merändels parvisa, ell. flere tillsammans. 2 8. Fig. Sv. B.95. Fl.D.2671.

\* *Chamaecyparissus* Al. Br. blågrön; gren. mer täta och uppräta, n. jemnhöga; alla bl. tilltryckta. Fig. Fl.D.2672. H.N.f.13, n:o 100.

Skog., \* ljunghed. (Lpl. och VB.—Sk. nor. del. Öl. nor. del. Gottl. Mästerby sn. — N. Ost-Finm.—Christiania. — \* Sk. Hjelmåljung i Hörja sn, Drakelia i Finja m. fl. st. enl. F. Aresch. Smål. Hjelmård i Blådinge sn; Ljunga och Ljungby; samt Stenhöga i Lidhult sn: Scheutz; Ingebo nära Vimmerby: Dr Lund. Hall. flerst i Knäred sn: Theor.; Thorup sn. VG. vid Göteborg. Boh. Uddevalla. Verm. nära Carlstad. VB. vid Kengis.) Bladen växa tillsammans och bilda de platta grenarne. Var. med 1, 2 och 4 ax på det 2—3 tum långa skaftet. Har de större ell. kantbladen bredare, och grenarne n. dubb. bredare än hos \*, som är *L. sabinaefolium* Rupr., mindre säkert Willd:s art af samma namn.

6 *L. alpinum* L. stielken krypande; de uppräta grenarne tydligt 4kantiga; alla bladen likformiga, okölade, spetsiga; axen oskaftade, merändels ensamma, trinda. 2 8. Fig. Fl.D.79.

Fjellv. (Lpl.—Dal. VB. Umeå sn, Kläberget. Ängml. Ramsele prestg. Medelp. Torp sn: Reuterm. — N. från Finm. till nor. del. af Christianss. st.) Axen sällsynt, stundom parvisa.

541. *SELAGINELLA* Spring. Dvergglummer.

1 *S. spinulosa* Al. Br. stjelken nedligg., nedtill delad i n. upprätta grenar; bladen spridda utstående, lancettlika spetsade, uddtandade; sporgömm. i oskaftade ensamma ax, med större, n. fliktandade skärblad. 24, 7, 8. Fig. Sv.B.612,f.2. Fl.D.70. H.N. f.11, n:o 100.

Fukt. äng. (Lpl.—Rosl. ÖG. Kärna mosse enl. Kindb.; Gålstad i Slaka sn. Ner. vid Guntjuga i Leke bergslag. Verml. Boh. Skaftö och Koster. — N. Finnm. ned till Stavanger.) 2—6 tum hög, mjuk, med ofta gulröda ax. — *Lycopod. selaginoides* L.

---



# BIHANG,

upptagande sådana växter, som dels äro tvifvelaktiga, dels stundom funnits förvildade, inkommit utifrån med andra frön, ballast o. s. v., men icke hittills spridt eller naturaliserat sig.

## I FAM. SYNANTHEREÆ.

- 1 COTULA *L.* Blomholken halft klotrund, med rörformiga blr; honblrna i kanten, kronlösa; de 2könade blrna 4flikiga; skalfr. vingkantade, nakna. — *C. coronopifolia L.* glatt, med smala, parflikigt tandade ell. hela bl., gula blr. Införd med ballast till Kasens Nabb nära Uddevalla; men nu försvunnen. Fig. Fl.D.341. H.N.f.14, n:o 6.
- SENECIO *saracenicus L.* bladen bredt lancettlika [ $1\frac{1}{2}$ —2 tum breda], hvass-sågade; blomk. i qvastlik samling. Stjelken mot 2 alnar hög med gula blr. Finnes stundom förvildad i och vid trädgårdar. Fig. Fl.D.2059. Reich.Corymb.t.970.
- 3 *S. crassifolius W.* bladen köttiga, jembreda, bugtiga ell. flktandade; blomk. med tillbakarullade strålblr. Fanns 1848 på Gefle Brobänk. Fig. Reich.t.962,f.3.
- 4 ERIGERON *canadensis L.* bladen smalt lancettlika, hårbräddade, de nedre sågade; blomk. mycket små, men talrika, med hvitgula blr. Fanns förr vid Ystad; vid flere sjöstäder (t. ex. Kalmar, Stockh., Gefle m. fl.) införd med ballast. Fig. Fl.D.1274.
- 5 CALENDULA *L.* Holkfjäll jembhøga. Skalfrukt krökta, båtlika, utan fjun; diskblommornas felsläende. — *C. arvensis L.* med nedligg. stielk och n. lancettl. blad, upptages af Linné i Fl.Su. under namn af *C. officinalis*, såsom funnen i Uppl. vid Malma gästg.
- 6 *C. officinalis L.* med upprät stielk, aflånga ell. omv. ågrunda blad, finnes stundom flyktad ur trädgårdstäpporna. Båda arterna hafva gula blr.
- 7 CENTAUREA *Calcitrapa L.* bladen pardelade; holkfj. i spetsen bärande styfva och stickande tornar; blr röda. På ballast vid Visby. Fig. Reich.Cynaroceph.t.798.
- 8 *C. solstitialis L.* rotbl. lyrförmiga; holkfj. som hos föreg.; blr gula. Gottl. vid Kopparvik i Vesterhøjde enl. G. v. Ced. Fig. Reich.t.795.f.1.
- 9 CARDUUS *temuiflorus Curt.* med nedlöpande, bugtbräddade och taggiga blad, cylindrisk holk, röda blr, är funnen vid Göteborg och Gefle på ballast. Fig. Fl.D.2058.
- 10 CIRSIIUM *tuberosum All.* rotknölar tapplika; stielken med lancettlika, parklufna ludna blad, 1—3 blomk.; röda blr; skall fördom af Leche vara funnen vid Krageholm eller Simonstorp i Skåne. Fig. Reich.t.108.
- 11 LACTUCA *quercina L.* lik *L. Scariola*, men bladen med slät, oväpnad ryggner, finnes nu icke mer på Lilla Carlsön vid Gottland, der Linné fördom tagit den. Fig. Reich.Cichoriac.t.1419,f.2.

- 12 *SCORZONERA hispanica* L. med flerbladig, ofta mångblomstrig stielk, triangulärt äggrunda holkfj. Stundom förvildad i och omkring trädgårdar. Fig. Reich.t.1384.
- 13 *HELMINTHIA* Juss. skiljd från *Picris*, med blomholken omgifven af 5, stora, n. hjertlika foderholksblad. — *H. echiioides* Gært. med stielkomfattande, i kanten taggiga blad, gula blr, fanns sordom förvildad i Paradislyckan vid Lund. Fig. E.B.972. Reich.t.1378.
- 14 *CREPIS sibirica* L. med luden stielk, ojemna, bredt aflånga, tandade blad, gula blr och omkr. 30strimmiga skalfr., anføres som förvildad i mell. Sv. af Prof. Fries i S.V.Sc. Fig. Reich.t.1458.
- 15 *PICRIDIVM* Desf. från *Crepis* skiljdt slägte med blomholk af tegel-lagda [ägg.] fjäll utan foderholk, samt 4kantiga skalfr. — *P. vulgare* Desf. med gula blr, hinnkantade holkfjäll och parklufna blad, fanns 1841 på Gefle nya Brobänk.

### AMBROSIACEÆ.

- Fam. skiljd från Dipsaceæ med ♂ och ♀blr i serskilda blomkorgar. Ståndare 5, fria. Honblrnas holk slutl. nötlit tillhårdnande kring frukten, groftaggig.
- 16 *XANTHIUM* L. Sambyggare, med enkla rörformiga hanblr inom holk, honblr utan kalk. — *X. strumarium* L. stielken och de hjertlika bladen utan taggar; blrna gröna. Fordom funnen flerst. i Sk. samt vid Göteborg. Tillfällig och strax försvinnande har den i sista åren träffats vid Örebro, Nyköping m. fl. st. Fig. Fl. D.970.
- 17 *X. spinosum* L. bladen 3klufna, med utdragen mellanflik, och långa, 2—3gafflade tornar vid basen; blrna gröna: fanns 1846 vid Gefle Lazarett, 1865 vid Malmö slott, 1866 vid Nyköping. Fig. Reich.t.1575.

### 3 FAM. VALERIANEÆ.

- 18 *SAMBUCUS racemosa* L. buske, med parbladiga blad, hvita blr i äggrundt knippe; bären röda. Förvildad på Experimentalfältet vid Stockh.; enl. C. Ind. vild vid Oppehy nära Nyköping.

### 4 FAM. RUBIACEÆ.

- 19 *GALIUM murale* DC. späd och slak, med parvisa, kortskafade blr i bladveckan, fanns i Kammar-rätts-Rådet Billbergs saml. med påskrift: Gottland.
- 20 *G. tricornis* With. bladen 8 i krans jemnbreda; blomskaften i bladveckan, 1—4blommiga, slutl. tillbakaböjda. Fanns år 1818 vid Halmstad och Femsjö af Prof. Fries. Fig. E.B.1641.

### 7 FAM. CAMPANULACEÆ.

- 21 *CAMPANULA bononiensis* L. stielken trind; bladen trubbsågade, under gråludna, de nedre skafade hjertlika, de öfre något omfattande, äggrunda—lancetl.; blr som *C. rapunculoides*. Skåne, som ogräs i trädgårdar i Billinge, samt Smål. i Högsby sn. Förvildad vid Uppsala enl. Fr. i H.N.f.10, n:o 12. Fig. Reich.t.1598, f.3.

### 9 FAM. CONV OLVULACEÆ.

- 22 *CUSCUTA Epithymum* L. hårfin, röd, med kronpipen tillsluten af fjäll så långa som sjelfva pipen. Växer på Ljung, *Thymus Serp.* m. m. och uppgifves som Svensk af Reiz. m. fl. Fig. Fl.D.427.

### 10 FAM. BORAGINEÆ.

- 23 *SYMPHYTUM asperrimum* MB. borsstaggig; bladen hjertligt äggrunda, nedlöpande på skafet, de öfversta n. oskafade. Förvildad vid Uppsala och Stockholm m. fl. st.

### 11 FAM. LABIATÆ.

- 24 *MENTHA nepetoides* Lej. [*M. pubescens* W.] bladen skafade äggrunda; blrna i aflånga, nedtill gleskransiga, mjukludna ax, med jemnbredt syl-rika fodertänder; uppgifves af Hr Lilja i Bot.Not.1846 växa förvildad i kryddgårdar vid Ekeröd i Skåne.

- 25 *SALVIA verticillata* L. med tät, 20—30blommiga blomkransar, hjertlika blad, fanns i Liljeblads tid förvildad vid Linköping.
- 26 *SATUREJA* L. skiljd från *Calamintha* endast med regelbundet 5klufvet blomfoder. — *S. hortensis* L. stj. upprät,  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  fot hög, mycket grenig med jemnbredt lancetlika n. helbräddade spetsiga, men uddlösa blad; små hvitlösa blr i korta klasar i bladvecken. Fanns 1853 af Dr Lokrantz förvildad i Uppl. på nyodlingar vid Untra nära Söderfors.
- 27 *BALLOTA foetida* Lam. skiljd från *B. ruder.* endast med halfrunda, kort uddspetsiga fodertänder. Fanns fordom i Sk. vid Åhus och Rastunda; äfven införd med ballast till några sjöstäder. Fig. Fl.D.673. H.N.f.11, n:o 18.
- 28 *STACHYS alpina* L. något lik *St. silvatica*, men skiljd med trubbigare blad, tät-sittande, mångblommiga blomkransar. Uppgafs af Ol. Celsius vara funnen i Uppl.; men är aldrig återfunnen. Fig. Reich.t.1209,f.2.
- 29 *LAMIUM maculatum* L. med alla bladen skafade, hjertlika, spetsade; blomkrans. omkr. 10blommiga, med stora röda blr. Fordom funnen vid Kälinge i Skåne. Fig. Fl.D.1649. H.N.f.15, n:o 18.

### 17 FAM. GENTIANÆ.

- 30 *GENTIANA acaulis* L. med en enda stor klocklik blå blomma, högre än sjelfva stjelen, uppgifves af Vilse vara funnen i N. vid Grötten i Romsdalen, hvilket aldrig torde komma att bekräfta sig. Fig. E.B.1594.
- 31 *G. germanica* Willd. skiljd från *G. Amarella* med mycket större blr, och foderlik. kortare än kronans pip. Af gammalt funnen vid Ignaberga i Sk., och i ÖG., men på många år icke återfunnen. Fig. Fl.D.suppl.t.67. H.N.f.14, n:o 17.
- 32 *SWERTIA* L. [*Pleurogyne* Eschh.] skiljd från *Gentiana* med hjulformig 5delad blomkrona. — *S. sulcata* [Pleur. rotata Griseb.] med n. jemnbreda blad och blomfoder af den blå kronans längd; uppgifves af Gunner växa i Gudbrandsdalen, men förmodas af Prof. Blytt vara *Gent. tenella*. På Island är arten icke sällsynt. Fig. Fl.D.343.

### 18 FAM. SOLANACEÆ.

- 33 *SOLANUM tuberosum* L. med stora knölar på rotstockens grenar, bladen ojemnt parbladiga, blrna flockvisa i de öfre bladvecken. Potatesväxten träffas ofta förvildad, men fortvarar icke.
- 34 *ATROPA* L. Blomkronan bärlik, 5standad; frukten ett bär. — *A. belladonna* L. med stora äggrunda helbräddade blad, violettbruna blr, stora svarta bär, ej olika kersbär. En mycket giftig växt, som uppgifves af Hornem. växa i sydl. Norge, hvilket ej är troligt. Fig. Fl.D.758.

### 19 FAM. PERSONATÆ.

- 35 *SCROPHULARIA alata* Gil. [*S. Ehrharti* Stev.] stj. vingadt 4kantig, glatt; bladen äggrunda, likformigt hvass-sågade, glatta; blomkr. mörkröda, öppna. Fordom i Sk. vid Storkällebacken i Billinge. Fig. Fl.D.507. H.N.f.14, n:o 19.
- 36 *MIMULUS* L. Fodret bärlik, kronan n. klocklik, med något olikformigt 5klufvet bräm; märket 2klufvet. — *M. guttatus* DC. glatt, kronan stor, gul, med en blodröd fläck på de nedreflikarne; uppgifves af Hr Lilja i Bot.Not.1846 hafva blifvit förvildad i Skåne vid kalkällor i Billinge.
- 37 *LINARIA Cymbalaria* W. [E.B.502] glatt med slak stielk, hjertlika 5flikiga blad, och
- 38 *L. spuria* W. med slak stielk och rundadt äggform., helbräddade blad, funnos båda på Gelle nya Brobänk 1841. Fig. E.B.691.
- 39 *VERONICA arguta* Schrad. i Sw. Summ.Veg.Scand. med luden stielk, glest och likformigt sågade, mot spetsen helbräddade blad, talrika blomax. Sannolikt har någon afart af *V. spicata* blifvit ansedd för denna syd-europeiska art. Fig. Schrad. Ver.t.2,f.2.

- 40 *V. peregrina* L. blrna oskaftade, i bladvecken; bladen aflånga, mot basen afsmalnande, glest naggade; fanns i Linnés tid förvildad vid Uppsala enl. Fl.Su.ed.1.
- 41 *V. præcox* All. de öfre bladen jemnbreda, de nedre hjertlikt åggrunda; blomfoderlikarne åggrunda spetsiga glandelbräddade; Skåne, Torup på en sandbacke: Rosén. Obs.Bot.p.59, enl. Fries. Fig. Sturm 58 häft.
- 42 *OROBANCHE minor* Sutt. liten, 6—7 tum hög, med 2:ne hela ell. olikformigt flikiga foderbl., nedtill håriga ståndarstrångar; funnen en gång för många år sedan på Hallands Väderö. Fig. Fl.D.1219.
- 43 *O. epithymum* DC.? liten, med sambladigt, 4klufvet foder, upptill håriga ståndarstrångar; en enda gång funnen på Gottl. vid Thorsborg. Fig. Reich.t.1784.

### 23 FAM. PLANTAGINEÆ.

- 44 *PLANTAGO arenaria* WK. stjelen grenig, med smalt jemnbreda blad, n. flockvis ordnade, långskaftade åggformiga ax; främre foderlikar trubbiga. Funnen af L. J. Wahlstedt i Skåne, nära Malmö slott; förmodl. inkommen med ballast.

### 28 FAM. UMBELLIFERÆ.

- 45 *CHEROPHYLLUM bulbosum* L. med tjock, rundad ell. kägellik rot; nedtill stråfhårig, upptill glatt och under lederna uppsvåld stielk, 3dubb. parbl. delade bl., med jemnbredt lancetlika flikar, glatta enskilda svepen, stift af stiftfötternas [diskens] längd. Fordom funnen i Norge, vid Christiansand, Stavanger och Bergen; men knappt på de sista 50 åren enl. Ax. Blytt. Fig. Fl.D.1868. H.N.f.8, n:o 16.
- 46 *TORILIS infesta* Hoffm. liknar *T. Anthriscus*, men är mindre och skiljd med utsperrade grenar ända nedifrån, hvarjemte den saknar eller har blott en-bladiga allm. svepen. Anförd af Retzius efter Afzelius. Fig. E.B.1314.
- 47 *CAUCALIS daucoïdes* L. skiljd till slägtet från *Torilis* med stora groftåggiga frukter, samt utmärkt af 3stråliga blomflockar och findelade blad, hv. blr; har funnits vid Fjälkinge i Skåne bland säden. Fig. Fl.D.2346.
- 48 *PEUCEDANUM salinum* Pall.? bladen 2—3 r: r pardelade, på långa slidor, samt med mer utsperrade grenar, långa, n. trådsmla flikar; allm. svepe 0, eller 1—3bladigt och affallande; hv. blr. Meddelad af Håradsh. Kröningsvärd, som tagit växten »i vattendraget, hvilket nedlöper till Sælbo hytta i Norge». *Cenoloph. Fischeri* Bot. Not.1846, n:o 12. Förf., som blott eger ett blommande ex. från Norge, är oviss, om detta hörer till denna art eller till *P. salinum*, hvars af Ledebour citerade fig. i Gmel.Fl.Sib.1,t.41 det Norska ex. fullkomligt liknar.

### 31 FAM. RESEDACEÆ.

- 49 *RESEDA lutea* L. bladen pardelade; blomfod. 6deladt; funnen på ballastplatser vid Göteborg, Stockh., Gefle, Gottl.
- 50 *R. phyteuma* L. bladen hela, de mellersta 3flikiga, blomfod. 6klufna; funnen på Gefle Brobänk.

### 33 FAM. RANUNCULACEÆ.

- 51 *RANUNCULUS lanuginosus* L. bladskäften utsperradt brunhåriga; rot- och stielkbl. likformiga, 3—5klufna, med rutformiga, inskurna flikar. En möjligen hit hörande form har funnits på Gottl.
- 52 *BATRACHIUM Rionii* Nym. något lik *B. Drouetii*, men med stånd. kortare än pist., och fruktfästet n. kägellik, är oppgifven såsom funnen på Gottl., men aldrig återfunnen.
- 53 *CERATOCEPHALUS Mönch.* Skiljd från *Ranunculus* med 2knöliga och groft långsprötade karpeller. — *C. falcatus* (Pers.) 3—4 tum hög, med axlikt gytttrade karp., hvilkas spröt är böjdt, findelade blad. Nyköping, dit den inkommit med utländsk ull: C. Ind.
- 54 *HELLEBORUS* L. Foderbl. 5, kronlika; kronbl. strutlika. — *H. viridis* L. med bladen födligt klufna i flere sågade flikar, gröna kalkblad, skall enl. Hr Lilja växa som ogräs i trädgårdar vid Billinge prestg. i Skåne.

## 36 FAM. FUMARIACEÆ.

- 55 *CORYDALIS rutacea* Th. Fr. med lökformig knölstam; blrna få, i tät klase, kort skaftade, med urnupna yttre kronblad. Uppsala i gamla Bot. trädg., samt vid Linnés Hammarby, der den enl. Th. Fr. årligen skall förekomma i ymnighet.
- 56 *C. nobilis* Pers. grof grenig rotstock; bladen pardelade ochflikiga; blomklasen tät, af talrika gula blr; träffas ofta förvildad i trädgårdar ända upp till Gestr. [Hammarby].
- 57 *FUMARIA capreolata* L. bladen med klängelikt vridna skaft, aflånga flikar; fodr. af halfva kronans längd; frukt. klotrunda, släta. Tillfälligt förvildad vid Lund. Fig. FL.D.2359. H.N.f.13, n:o 47.
- 58 *F. micrantha* Lag. bladen med jemnbreda flikar; fodr. något kortare än halfva kronan; frukt. klotrunda. Träffades 1849 i åkrar nära Uppsala, men har sedan försvunnit. Fig. H.N.f.13, n:o 48.

## 37 FAM. CRUCIFERÆ.

- 59 *ERUCA* DC. skiljd från *Brassica* med 2radiga frön. — *E. sativa* Lam. med parflikade blad, hvitgula blåådriga blr på mycket korta skaft, finnes stundom på Gefle Brobänk. Fig. Reich.Tetrad.f.4421.
- 60 *DIPLTAXIS muralis* DC. med endast ned mot roten bladig stielk, djupt bugtandade blad, smärre blr; eljest lik *D. tenuif.* På ballastpl. Fig. Reich.4417. H.N.f.15, n:o 32.
- 61 *MORICANDIA* DC. fod. slutet; skida fyrkantig, med 2radiga frön, i öfr. som *Diplotaxis*. — *M. arvensis* DC. med hjertlika, stielkomsfatt., blåakt. blad, gredel. blr; skall enl. Fries i Bot.Not.1843 vara funnen i en åker  $\frac{1}{4}$  mil från Skara. Fig. Reich.4431.
- 62 *SISYMBRIUM Irio* L. med lyrformiga, nedåt parflikiga blad, n. uppräta skidor, 4—5 gånger längre än skaften. I äldre tider funnen i Sk. och vid Uppsala, samt på ballastplatser.
- 63 *ERYSIMUM Cheiranthus* Pers. lik *E. hieracifol.*, men med silkeslik hårlighet af parallela hår och mycket större blr; fanns 1842 på Gefle Brobänk. Fig. Reich.4393.
- 64 *CARDAMINE trifolia* L. med långt skaftade 3fingradt delade rotblad, hvilkas småblad äro rundade och trubbigt tandade, med småuddiga tänder, hvita blr i knippe. Upptages i äldre Svenska florer; men, såsom icke i sednare tider funnen, tros *C. amara* var. *trisecta* vara därför misstagen. Fig. Reich.4298.
- 65 *RAPHANUS sativus* L. roten köttig; bladen vid basen pardelade med stor ändflik; blrna violettröda; skid. knöliga oledade. Förekommer stundom förvildad i och utom plantager. Fig. Reich.4175.
- 66 *R. maritimus* Sm. bl. lyrformiga, med små parvisa flikar, omvexlande med de större; skid. som hos *R. Raphanistr.*, hvaraf den i Sv. funna torde vara en form. Fordom vid Varberg funnen af Fries.
- 67 *EUCLIDIUM* Br. Skidan rundad, med spröt, 2rummig, affall. öppnad. — *E. syriacum* Br. med skaftade, lancettlika, glest sågade blad, borsttaggiga skidor. Nyköping, inkommen med utländsk ull: C. Ind. Fig. Reich.4157.
- 68 *VELLA annua* L. [*Carrihtera Vellæ* DC.] bladen dubbelt pardelade; skidorna ägg-runda, borsthåriga, med bladlikt stift, slutl. nedböjda; blrna blekgula; fanns på Gefle nya Brobänk 1841.
- 69 *LUNARIA annua* L. lik *L. rediviva*, men med elliptiska, d. v. s. i ändarne rundade skidor; skall stundom träffas förvildad i och vid trädgårdar, enl. Sv.B.478.
- 70 *LEPIDIUM virginicum* L. med smalt lancettlika, inskuret sågade, glatta blad, cirkelrunda urnupna skidor, hvita blr med 2—4 stånd., fanns 1845 på Gefle nya Brobänk. Fig. Reich.4216.

## 41 FAM. MALVACEÆ.

- 71 *MALVA litoralis* Deth. en medelform mell. *M. rotundifol.* och *silvestris*, med upp-

stlg. stielk, hjertlika blad, med 5—7, spetsade och sågade likar, medelstora violettblå blr, skall enl. Fries i S.V.Sc. vara funnen i Norge.

#### 42 FAM. GRUINALES.

- 72 *GERANIUM viscidulum* Fr. skiljd från *G. pusill.* med borstuddiga foderbl., i spetsen hela kronbl. och gropiga karpeller; finnes numera enl. F. Aresch. endast förvild. i Lunds Bot. trädg. H.N.f.13, n:o 52.
- 73 *ERODIUM moschatum* Ait. bladen parblad. delade, med äggrunda, grundt likade småbl.; de knappbärande stånd.sträng. tandade på den vidgade basen. Tillfälligt förvildad.
- 74 *OXALIS corniculata* L. skiljd från *O. stricta* med nedligg. stielk och vid bladskäften fastväxta stipler. Tillfälligt förvildad vid Lund. Fig. Fl.D.1753.
- 75 *LINUM usitatissimum* L. med spridda, smalt lancettlika blad; foderflik. af frö:h längd; blrna blå. Ofta sjelfsädd af spildt linfrö, men icke fortvarande.

#### 47 FAM. SILENACEÆ.

- 76 *SILENE gallica* L. luden, med n. jemnbreda blad, ensamma och skiftevisa blr i enkel klase, cylindriskt foder, tandade ell. urnupna blekröda kronbl. Fordom funnen i Sk. vid Malmö och Lund. Fig. Fl.D.1643. H.N.f.7, n:o 32.
- 77 *S. Armeria* L. glatt, med äggr. hjertlika blad, blr i täta jemnhöga knippen, uppåt vidgad foder, odelade röda kronbl. Tillfälligt förvildad i gamla trädgårdar. Fig. Fl.D.559. H.N.f.10, n:o 39.
- 78 *DIANTHUS barbatus* L. med r. ell. hv. blr i tätt jemnhögt knippe och lancettlika blad, förvildas stundom med trädgårdsafskräden.

#### FRANKENIACEÆ.

Fam. skiljd från *Silenaceæ* med ett enda stift, och fröen fästade i kanten af frö:h väggar.

- 79 *FRANKENIA* L. fod. och kr. 4—5bladiga; stånd. 6. — *F. pulverulenta* L. med omv. äggrunda motsatta, under mjöliga blad, har funnits förvildad på Djurgården vid Stockholm, i grannskapet af Bellmans byst.

#### 53 FAM. SAXIFRAGEÆ.

- 80 *SAXIFRAGA umbrosa* L. stäng. bladlös; alla bl. vid roten, omv. äggrunda, rundnaggade, med hvit, broskaktig kant; blrna hvita, rödprickiga. Fanns några år på Billingen, nära Sköfde; efter all anledning, såsom sedan visat sig, ditplanterad; nu utgången.

#### 54 FAM. CRASSULACEÆ.

- 81 *SEDUM hybridum* L. bladen platta spadlika; blrna gula. Förvildad på Egeberget vid Christiania.
- 82 *S. dasyphyllum* L. *β glanduliferum* hela växten glandelhårig; bladen rundadt elliptiska; blrna hvita. Lär endast finnas odlad i Visby, der den förr uppgifvits växa på stadsmuren.

#### 56 FAM. ONAGRARIEÆ.

- 83 *ISNARDIA palustris* L. (*Ludwigia nitida* Spreng.) blrna små, med 4 ståndare, 1 pist., utan krona, klocklika gröna oskaftade, i de äggrunda spetsiga motsatta bladens veck; fr. fröhus. Uppgifves vara funnen i ån vid Hemmeslöf i Karup sn i Hall.; vid Alingsås och Nohlbaga (Norrhaga?); ÖG. i Ringskällan vid Öfverstad i Askeby sn. På sistnämnda ställe finnes en ovanligt stor *Montia*, som torde blifvit misstagen för *Isnardia*. — Fl.D.1745.
- 84 *TRAPA* L. Fod. 4deladt. Krona af 4, fria blad. Stånd. 4. Frukt groftaggig nöt. — *T. natans* L. vattenväxt med findelade nedsänkta, rutformiga flytande blad. Ford. uppgifven för en mängd sjöar i mellersta Smål., samt för Svanö i VG. Ej funnen sedan förra århundradet.

## 59 FAM. SENTICOSÆ.

- 85 *ROSA laxa* Retz. taggarne på stammen raka, de vid stiplerna krokiga; småbladen 3—4pariga, enkelt sågade glatta; nyp. aflånga, på tillbakaböjda skaft; blirna hvita. Vid Linnés Hammarby och annorstädes fordom odlad enl. Fries, som anser denna söga kända art för Linnés i Mant. 2 som svensk anförda *R. arvensis*. H.N.f.8, n:o 46.
- 86 *POTENTILLA inclinata* Vill. lik *P. argent.*, men med i kanten långhåriga, under gråhudna småblad. Tillfälligt förvildad på några få ställen.

## 61 FAM. PAPILIONACEÆ.

- 87 *LATHYRUS Aphaca* L. egentl. blad 0, endast stora spjutlika stipler och klängen; blomskåften enblommiga; blirna gula; förekom 1841 på Gefle Brobänk. Fig. E.B. 1167.
- 88 *MEDICAGO denticulata* W. baljan 2—3 gr snäckvriden, glatt, nätådrig, med i spetsen kroklika taggar, n. så långa som halfva baljans diam.; finnes stundom införd med ballast på Gefle Brobänk, samt med utl. ull vid Nyköping.
- 89 *M. apiculata* W. lik föreg., men med mycket korta, n. raka taggar, fanns 1843 jemte föreg. vid Gefle.
- 90 *TRIGONELLA* L. skiljd från *Melilotus* med mångfröiga baljor. — *T. ornithopodioides* DC. stjelen utbredd 3—6 tum lång, med rödaktiga blir i 2—4blommiga klasar, har blifvit uppgifven för Gottl. på en äng vid Nygård i Etelhem. Fig. F.I.D.368.
- 91 *MELILOTUS cœrulea* Lam. med ovala hufvudlika ljusblå blomklasor, skall stundom träffas förvildad i Skåne, t. ex. vid Vegeholm. Fig. Sturm 15 häft.
- 92 *TRIFOLIUM incarnatum* L. med omv. åggrunda småblad; långt skaftade äggformiga, slutl. cylindriska blomhufvud; röda blir. Är i sednare åren funnen i Verm. vid Carlberg i Grums sn, och Motorp i Ekshärad; Vestml. i nya Kopparberget och i Små. vid Vexjö i Dörby sn, troligen införd med utländskt klöfverfrö.
- 93 *GENISTA anglica* L. taggig; blirna gula, i öfre bladvecken; bladen lancettlika glatta; införd med ballast till Vestervik. Fig. F.I.D.619. H.N.f.13, n:o 63.
- 94 *ULEX* L. Skiljd från *Genista* med ända till basen 2deladt foder, båtlik kronköl. — *U. europæus* L. högväst taggig buske, med fårade taggar, syl-lika blad, gula blir. Fordom i Sk. vid Torup, samt införd med ballast till Vestervik och Gottl.

## 62 FAM. ERICINEÆ.

- 95 *CASSANDRA* Don. Fod. 3deladt, inom en 2bladig holk. Kronan bagarlik. Stånd. 10, utan sporrar på knapparne. Fr.: 5rumm. fröhus. — *C. calyculata* Don: buske, med skiftevisa, aflånga blad, blekgula blir i ensidig klase. Enl. gammal uppgift funnen vid Skellefteå i VB. och vid Tornio elf; åtm. på 40 år icke anträffad.

## 64 FAM. EUPHORBIACEÆ.

- 96 *MERCURIALIS Ladanum* C. Hn. stj. enkel, ell. med korta grenar upptill; blirna 1, säll. 2 i bladvecken, oskaftade. Fanns 1848, med *annua*, vid Gefle. Bot.Not.1849.

## 68 FAM. POLYGONEÆ.

- 97 *RUMEX Patientia* L. örthl. åggrundt aflånga, något vågiga; kalkbladen hjertlikt rundade småtandade nätådriga, ett enda grynbarande. Hufvudsakligen med bladen skiljd från *R. conspersus*. Förvildas stundom ur plantager, särdeles i södra Sv.
- 98 *RHEUM* L. Lik *Rumex*, men med 9 ståndare. — *R. Rhaponticum* L. bladen mycket stora, hjertlika trubbiga, med ofvan fårade skaft. Förvildas stundom ur trädgårdar.

## 70 FAM. SANTALACEÆ.

- 99 *THESIIUM Linophyllum* L. lik *Th. alpinum*, men med horisontala fruktgrenar, mer

sammansatt blomklase och 5taliga blomdelar. Skall enligt Retz. och Lilj. vara funnen på ängsbackar i Skåne. Fig. Reich.Deutschl.Fl.f.1160.

#### 74 FAM. URTICACEÆ.

- 100 *PARIETARIA diffusa* Koch: nedliggande och grenig med äggrunda blad; kalken slutl. dubbelt längre än ståndarne; fanns 1843 på Gefle nya Brobänk. Fig. E. B.879.

#### 75 FAM. AMARANTACEÆ.

- 101 *AMARANTUS retroflexus* L. blr med 5 ståndare, i axlika gyttningar; stjelken upprät, med äggrunda spetsade, i spetsen trubbad blad. Gefle Brobänk 1848. Fig. Reich.Icon.f.668.

#### 76 FAM. CHENOPODIACEÆ.

- 102 *ATRIPLEX nitens* Reb. skiljd från *A. hortensis* med på undre sidan hvitmjölīga blad, äggrunda och spetsiga kalkblad. Funnen på ballast vid Malmö, Kalmar och Stockh.

- 103 *HALIMUS portulacoides* Wallr. foishög, med vedartad stam; bladen n. tunglika; kalkbl. oskaftade. Enl. L.Fl.Su. fordom funnen af Leche vid Helsingborg och på ön Hven. H.N.f.14, n:o 61.

- 104 *CHENOPODIUM scifolium* Sm. bladen aflånga olikformigt bugttandade; frön punkterade. År funnen, införd utifrån, vid Carlshamn af Fries, på Gefle Brobänk af förf. Fig. E.B.1724.

- 105 *C. ambrosioides* L. bladen lancettlika, glest tandade; blrna gytttrade i toppen och grenarnes bladveck, hvarför de bilda liksom bladiga ax. Fanns fordom förvildad på Halmstads gator.

- 106 *C. opulifolium* Schrad. skiljd från *C. album* med kortare och bredare, oftast rundtrubbade blad, mycket grenig blomställning. Uppgifven för Uppsala, samt Carlskrona och Ronneby. H.N.f.14, n:o 62.

- 107 *BETA maritima* L. karakterer af *Chenopod.*, men märket utan stift och kalken slutl. tillhårdnande. Stjelken utbredd, blrna mest parvisa i de rutformiga bladens veck. Fanns 1810 och 1841 på Gefle Brobänk. Fig. Fl.D.1571. H.N.f.13, n:o 68.

- 108 *XYRIS prostrata* L. Sambyggare. Blomkalk foderlik, 4—5delad; stift 2. Frö ett, inom fröblåsa. Stjelken fotslång, utbredd med långskaftade, omv. äggrunda blad, och blr gytttrade i hufvud. Uppgifves af Gunner vara funnen i Norge på ett fuktigt ställe vid gården Backe nära Trondhj., troligen införd utifrån, sedermera utgången. Fanns på Gefle nya Brobänk 1843. Fig. Gmel.Fl.Sib.3, tab.4, f.2.

#### 79 FAM. BETULINEÆ.

- 109 *BETULA fruticosa* Pall. Lik *B. humilis*, med mer runda blad och mer framåt rigtade stikar på frukthänganens fjäll. En ostasiatisk, möjl. från *B. humilis* icke skiljd form, som för 20 år sedan ansågs vara funnen i Smål. vid Mjöhult i Fryeled sn, men sedan aldrig återfunnits. Ex. under detta namn från Herjed. synas knappt skiljbara från *B. alpestris*.

#### 84 FAM. ORCHIDEÆ.

- 110 *ORCHIS pallens* L. stjelknölarne odelade; kalken gul, med 3flikig belbräddad läpp, konisk sporre af fruktämnets längd; blomskärmen ennerviga. Upptages af Retzius, men har icke blifvit bestyrkt som inhemsk; trol. har någon storblommig *O. sambucina* blifvit ansedd för denna. Fig. Reich.Orch.t.34.

#### 85 FAM. IRIDEÆ.

- 111 *IRIS squalens* L. kalkbladen vid basen håriga, de yttre blå, de inre smutsgula; örtbladen breda svärdlika, kortare än stjelken, lærer finnas förvildad i plantager i söd. Sverige. Fig. Reich.D.Fl.763.

- 112 *CROCUS luteus* Lam. lik *C. vernus*, men med gula blr och hårlikade märken, fanns fordom förvildad på gräsplanerna i Löfsta trädgård i Uppl. Fig. Reich.D.Fl.793.



## 87 FAM. HYDROCHARIDÆ.

- 113 VALLISNERIA L. Tvåbyggare. ♂ blr gyttade på blomkolf inom hølster; ♀ blomma ensam. Foder och krona 3bladiga. — *V. spiralis* L. vattenväxt, med jemnbreda gräslika, i spetsen tandade blad; honblomman vit, med långt trådligt, spiralvridet skaft från roten. Uppgifves för flere sjöar i VG., ursprungl. anförd af Prof. A. Afzelius såsom tagen i en graf, som går genom Nohlhagas [Nordhagas] egor vid Alingsås. Trol. ha *Sagittaria* jemnbreda rotblad blifvit misstagna för denna fullkomligt Syd-Europeiska växt. Se ed.4,p.330. Fig. Reich.D.Fl.108—10.

## 89 FAM. LILIACEÆ.

- 114 FRITILLARIA montana Hop. meränd. enblommig; bladen lancettlikt jemnbreda, de öfversta och nedersta motsatta. Lik *F. Meleag.*, men med smärre blr, något mer lancettlika blad. Fordom förvildad på gräsplanerna i Ulriksdals trädgård. Fig. Reich.D.Fl.978, 79. [*F. tenella*].
- 115 ALLIUM fistulosum L. flock klotrund, utan knopplökar; ståndarne enkla, längre än kalken; stj. och de trinda bl. uppblåst ihåliga. Ymnig på torflak i Gudbrandsdalen i Norge; trol. sedan äldre tider der odlad, emedan den ej upptages af Blytt i Norg. Fl. Fig. Reich.f.1084.
- 116 A. odorum L. fotsbög, med skaftade blr i flock, utan knopplökar; blr hvita, väl-luktande; stånd. enkla, kortare än kalken; bl. smala, 3kantigt kölade; i st. för lök en lång krypande, af hinnaktiga fjäll beklädd rotstock. Funnen 1862 af Lindb. på Observatorii-backen i Stockh., dit denna Sibiriska art förmodl. blifvit planterad. Fig. Gmel.Fl.Sib.I,t,x,f.2.
- 117 ASPHODELUS L. Lik *Anthericum*, men ståndarsträngarnes bas bred och betäckande fruktämnet. — *A. fistulosus* L. med syl-lika haftrinda ihåliga blad från roten, hvita blr med en rödbrun rand efter midten; fanns temligen ymnigt på Gessle Brobänk 1843. Fig. Reich.f.1117.
- 118 SCILLA L. Skiljd från *Ornithogalum* med blr i klase och smala syl-lika ståndarsträngar. — *S. verna* Huds. klasen fåblommig, halfrund, Uppgifven af gammalt för Norges vestkust, men ej bekräftad. Fig. Fl.D.562.
- 119 S. italica L. klasen mångblommig, slutl. cylindrisk. Tillfälligt förvildad i Skåne.
- 120 MUSCARI racemosum Mill. lik *M. botr.*, men med, mer cylindriska blr, slakare blad, anföras af Retzius i Fl.Oecon. och Prof. Fries i Fl.Scan. såsom stundom förvildad på gräsplaner i Lund. Fig. Reich.f.999.

## 91 FAM. ALISMACEÆ.

- 121 ALISMA natans L. stj. flytande ell. nedliggande, med äggrunda flytande blad, enblommiga blomskafv från lederna. Af Lin. uppgifven att växa vid vägen mell. Stockh. och Uppsala, samt af Retz. för Skåne vid Ramsjö by i Karup; på ingendera stället sedan funnen. Fig. Fl.D.1573.

## 93 FAM. JUNCACEÆ.

- 122 JUNCUS Tenageja Ehrh. är granne till *J. bufonius*, men har kortare knippe med bruna blr, och kalkblad icke längre än det klotrunda fröhuset. Anförd af Retz. och växer möjligtvis i Skånes torfsmossar; finnes åtminstone i Danmark och norra Tyskl. Fig. Fl.D.1160.

## 97 FAM. CYPERACEÆ.

- 123 HELEOCHARIS ovata Br. axet äggrundt; nöten's bihang koniskt, nedplattadt med basen öfver nöten's topp; roten trådig, tufvad. Är af gammalt uppgifven att vara funnen i Norge, men detta är sannolikt ett misstag. Fig. Andst.2,f.25.
- 124 CAREX gynocrates Wormskj. med enkelt ax, glesa, uppräta, mångstrimmiga fruktg. 2 märken. Af Somf. uppgifven för Saltdalen i Norge, men sedan icke återfunnen. Fig. Fl.D.1529.

## 98 FAM. GRAMINEÆ.

- 125 *TRITICUM rigidum* Schrad. Lik *T. acutum* DC., men har bredt tvärhuggna skärmsfjäll, hälften kortare än småaxen, och bladen slutt. hoprullade med en rad korta borst längs nerverna. Fordom funnen i Skåne enl. Prof. Fries, men trol. tillfälligtvis dit införd. Fig. Reich.f.271. H.N.f.6, n:o 95.
- 126 *T. vulgare* Vill. (Hvete) med tät, n. 4kantigt ax; skärmsf. breda, äggrunda, kupigt hvällda. Träffas ofta sjelfsådt, men fortvarar icke.
- 127 *SECALE L.* Skiljd från *Triticum* med 2blommiga småax och syl-rika, ennerviga skärmsf. — *S. cereale L.* (Råg) axet tät af tegellagda småax; blomf. med lång borst. Uppväxer ofta sjelfsådd, men fortvarar icke.
- 128 *HORDEUM distichon L.* småaxen i 2 rader; sidosmåaxen med blott handlr utan borst.
- 129 *H. polystichon* Doll. småaxen i 6 rader, alla 2kånade, med lång borst. Denna och föreg. art af Korn ofta sjelfsådda, men icke fortvarande.
- 130 *H. maritimum* With. skiljd från *H. pratense* med ända upp till axet bladigt strå och sidoaxens inre skärmsf. vid basen hinnkantadt. Vid Göteborg, samt i N. vid Mandal och Christiansand på ballastplatser. Fig. Fl.D.1632. H.N.f.12, n:o 95.
- 131 *LOLIUM multiflorum* Lam. lik *L. perenne*, men med upptill stråft strå, flere och mer mångblommiga småax, kortare skärmsf. Stundom förvildad i Skåne. H.N.f.16, n:o 76.
- 132 *VULPIA myuros (L.)* vippan smal, fingerlång och lutande; det nedre skärmsfjället 2 ell. flere gånger kortare än det öfre; blomf. kortare än borsten; bladen smala 2örade; roten trådig enårig. Funnen på Gefle Brobänk, samt vid Göteborg af Kamphövener, trol. äfven på ballast. Fig. Reich.D.Fl.f.270. [Fest. *pseudo-myuros*.]
- 133 *SCHEDONORUS longiflorus* Fr. [*Bromus W.*] vippan långgrenig slak; småaxen lancettlika, omkr. 10blommiga, med borst; bladen stråfva och håriga, med utdraget, sargadt snärp. Skall enl. Fr.S.V.Sc. vara funnen förvildad någonstades i södra Sverige. Fig. H.N.f.13, n:o 94 (från Kinnekulle).
- 134 *KOELERIA cristata* Pers. skiljd från *K. glauca* med håriga blad, spetsiga blomf. Fordom funnen vid Oppmanna i Sk.; och enl. Liljebl. i Stockh.-skären, men der aldrig återfunnen. Fig. Fl.D.2223. H.N.f.14, n:o 88.
- 135 *AVENA brevis* Roth: enårig, med stora, vanl. 2blommiga småax af de mångnerviga skärmsfjällens längd; yttre blomfjället kort 2syladt, med håromgifven bas. Införd med utländsk säd till Småland. Fig. Ands.Gram.t.12,f.142.
- 136 *A. sativa L.* lik *A. fatua*, men med blott en borstbärande blomma i hvarje småax. Hafren träffas oftast af våra sädesslag sjelfsådd.
- 137 *LEERSIA Sol.* småax enblomm., utan skärmsfjäll; blomf. utan borst. — *L. oryzoides Sw.* vippan öppen, med håriga småax. Har af Prof. Fries blifvit funnen i Hall. vid Dahla bland buskar; misstänkes dock att vara diplanterad. Fig. Fl.D. 1744. Reich.f.494. Ands.Gram.t.10,f.116.
- 138 *PANICUM miliaceum L.* med stor utbredd lutande vipa; lancettlika, tillika med slidorna håriga blad; sanns 1846 på Gefle Brobänk. Fig. Reich.f.519.
- 139 *DIGITARIA ciliaris* Koel. lik *D. humifusa*, men skiljd med mycket håriga bladslidor, mer lancettlika småax. Stund. förvildad i trädg. i Skåne. H.N.f.13, n:o 88.
- 140 *SETARIA verticillata* PB. skiljd från *S. viridis* med nedåt vända småtaggar på svepeborsten. Tillfälligt förvild. i trädg. i Sk. och Hall. Fordom äfven vid Hargs bruk i Rosl. H.N.f.15, n:o 91.
- 141 *PHALARIS L.* vippan tät, axlik; skärmsf. med vingad rygg. — *P. canariensis L.* med oval ell. äggformig vipa, förekommer stundom förvildad vid husen af utkastadt Canariefrö. Fig. Reich.f.491. Ands.t.12,f.134.
- 142 *HIEROCHLOA australis* RS. med platta bl., något utbredd vipa, n. glatta grenar, mell. blomman med krökt ryggborst, den nedersta med kort borst under spet-

sen. Skall enl. Wessén i Pl.Cot.Kärn. och ett fordom af Fr. meddeladt ex. vara funnen i ÖG. vid Svartån nära Odenfors-bron; men har aldrig återfunnits. Fig. And.s.t.12,f.138.

- 143 *H. setifolia* Hn. bladen tagelsmala; vippan något utbredd, med sträfv, upp emot de äggrunda småaxen glatta grenar; blomfj. i kanten n. hårlösa, med utskjut., knäböjd ryggborst på båda blrna, kort borst nedom spetsen på den 3:dje bln [då sådan finnes]. Funnen 1846 i Vestml. Kärro sn, på berg vid Mälaren; sedan aldrig återfunnen. Är möjl. en egendomlig lokalform af *H. bor*.

### 101 FAM. EQUISETACEÆ.

- 144 *EQUISETUM Telmateja* Ehrh. axbär. stjelken enkel, grenlös; den ofruktsamma med mycket talrika, åttkantiga, slutl. kvarterslånga grenar i krans, invändigt mångpiptg, alnshög eller mer. Anförd som Svensk af Retzius, men har icke blifvit bestyrkt. Fig. Fl.D.1469.
-

# REGISTER

öfver Phanerogamernas och Ormbunkarnes Familjer, Släkten och  
Arter samt dessas Synonymer.

Den cursiva stilen utmärker synonymerna; vid släktnamnen angifver den första siffran det nummer, hvarunder de upptagits i Släktöfversigten uti Inledningen, den andra deremot afser den sida, hvarpå de återfinnas i Floran.

## A.

*Abies excelsa* DC. 197.  
    *obovata* Loud. 197.  
*Abrotanum* Fr. 4.  
*Absinthium vulgare* Lam. 3.  
*Acer* L. 521, 84.  
    *campestre* L. 84.  
    *platanoides* L. 84.  
    *Pseudoplatanus* L. 84.  
ACERINEÆ DC. 84.  
*Achillea* L. 455, 3.  
    *Millefolium* L. 3.  
    *Ptarmica* L. 3.  
*Achyrophorus maculatus* Scop. 34.  
*Acinos vulgaris* Pers. 50.  
*Aconitum* L. 298, 95.  
    *Cammarum* L. 95.  
    *Lycoctonum* L.Fl.Su. 95.  
    *napelloides* Sw. 95.  
    *Napellus* L. 95.  
    *neomontanum* Fl.D. 95.  
    *neubergense* Reich. 95.  
    *septentrionale* Köll. 95.  
    *Störckianum* Reich. 95.  
*Acorus* L. 210, 223.  
    *Calamus* L. 223.  
- *Acrostichum ilvense* L. 280.  
-   *septentrionale* L. 282.  
*Actæa* L. 292, 96.  
    *spicata* L. 96.  
*Adonis* L. 308, 94.  
    *vernalis* L. 94.

*Adoxa* L. 238, 84.  
    *Moschatellina* L. 84.  
ADOXÆÆ E. Mey. 84.  
*Ægopodium* L. 164, 82.  
    *Podagraria* L. 82.  
*Æsculus* L. 224, 84.  
    *Hippocastanum* L. 84.  
*Æthusa* L. 171, 81.  
    *Cynapium* L. 81.  
*Agrimonia* L. 272, 148.  
    *Eupatoria* L. 148.  
    *odorata* Mill. 148.  
    *procera* Wallr. 148.  
*Agropyrum acutum* RS. 256.  
-   *caninum* RS. 256.  
-   *hebestachyum* Fr. 256.  
    *juncum* PB. 255.  
    *pungens* RS. 256.  
    *repens* PB. 256.  
-   *strictum* Reich. 255.  
*Agrostemma* L. 260, 123.  
    *Githago* L. 123.  
*Agrostis* L. 34, 273.  
    *alba* L. 274.  
    *algida* Wg. 266.  
    *alpestris* Læst. 274.  
    *alpina* Wg. 274.  
-   *arundinacea* L. 271.  
    *borealis* Hn. 274.  
    *canina* L. 274.  
    *hyperborea* Læst. 274.

- rubra* Wg. 274.  
*rupestris* Hn. 274.  
*Spica venti* L. 273.  
 — *stolonifera* L. 273.  
*suaveolens* Bl. 274.  
*vulgaris* With. 274.  
**Aira** L. 50, 269.  
   *alpina* L. 269.  
   *alpina* Lilj. 277.  
 — *aquatica* L. 266.  
*airopurpurea* Wg. 270.  
*bottnica* Wg. 269.  
*brevifolia* Hn. 269.  
*cæspitosa* L. 269.  
*canescens* L. 269.  
*caryophyllea* L. 268.  
*discolor* Thuill. 269.  
*flexuosa* L. 269.  
*glauca* Hn. 269.  
 — *præcox* L. 268.  
   *subspicata* L. 268.  
*uliginosa* Weihe 269.  
**Airopsis** Fr. 47, 268.  
   *caryophyllea* Fr. 268.  
*præcox* Fr. 268.  
**Ajuga** L. 313, 53.  
   *alpina* L. Herb. Fr. Nov. 54.  
   *alpina* Fr. S. V. Sc. 54.  
   *genevensis* L. 54.  
   *pyramidalis* L. 54.  
   *reptans* L. 53.  
**Alberia** *Blitum* Kunth. 181.  
**Albucca** *nulans* Reich. 213.  
**Alchemilla** L. 85, 148.  
   *alpina* L. 148.  
   *Aphanes* Leers 149.  
   *arvensis* Scop. 149.  
   *vulgaris* L. 148.  
**Alisma** L. 222, 216.  
   *natans* L. 298.  
   *Plantago* L. 216.  
   *ranunculoides* L. 216.  
**ALISMACEÆ** Juss. 216, 298.  
**Alliaria** Adans. 366, 101  
 — *officinalis* Andr. 101.  
**Allium** L. 197, 212.  
   *angulosum* L. herb. 212.  
   *arenarium* L. 212.  
   *arenarium* L. herb. 212.  
   *carinatum* L. 212.  
   *fallax* R. & S. 212.  
   *fistulosum* L. 298.  
   *montanum* Schmidt 212.  
   *odorum* L. 298.  
   *oleraceum* L. 212.  
   *Schoenoprasum* L. 212.  
   *Scorodoprasum* L. 212.  
   *sibiricum* L. 212.  
   *ursinum* L. 212.  
   *vineale* L. 212.  
**Allosorus** Bernh. 536, 283.  
   *crispus* Bernh. 283.  
**Alnus** Gært. 489, 196.  
   *barbata* Mey. 196.  
   *glutinosa* W. 196.  
   *hybrida* Al. Br. 196.  
   *incana* Tausch. 196.  
   *pubescens* Tausch. 196  
**Alopecurus** L. 28, 276.  
   *agrestis* L. 276.  
   *fulvus* Sm. 276.  
   *geniculatus* L. 276.  
   *nigricans* Horn. 276.  
   *pratensis* L. 276.  
**ALSINACEÆ** Bartl. 125.  
**Alsine** Wg. 259, 129.  
   *biflora* Wg. 130.  
   *hirta* Hn. 130.  
   *media* L. 125.  
 — *peplodes* Wg. 129.  
   *rubella* Wg. 130.  
 — *rubra* Wg. 132.  
   *stricta* Wg. 130.  
   *tenuifolia viscosa* Schreb. 129.  
   *verna* Led. 130.  
**Alsinella** *biflora* Sw. 130.  
**Althæa** L. 388, 113.  
   *officinalis* L. 113.  
**Alyssum** L. 360, 108  
   *calycinum* L. 108.  
   *incanum* L. 108.  
   *sativum* Sv. B. 108.  
**AMBROSIACEÆ** Link. 291.  
**AMARANTACEÆ** Juss. 181, 297.  
**Amarantus** L. 490, 181.  
   *Blitum* L. 181.  
   *retroflexus* L. 297.  
**Ammadenia** *peplodes* Gm. 129.  
**Ammophila** *arundinacea* Host. 271.  
**Anacamptis** Rich. 461, 203.  
   *pyramidalis* Rich. 203.  
**Anagallis** L. 109, 71.  
   *arvensis* L. 71.  
   *cærulea* Koch. 71.  
**Anchusa** L. 105, 44.  
   *arvensis* MB. 45.  
   *officinalis* L. 44.  
**Andromeda** L. 242, 169.  
   *cærulea* L. 169.  
   *hypnoides* L. 169.  
   *polifolia* L. 169.  
   *tetragona* L. 169.  
**Androsace** L. 113, 72.  
   *septentrionalis* L. 72.  
**Anemone** L. 392, 93.  
   *Hepatica* L. 94.

- nemorosa* L. 93.  
*patens* L. 94.  
 — *pratensis* L. 94.  
 — *Pulsatilla* L. 94.  
*ranunculoides* L. 93.\*  
*silvestris* L. 93.  
 — *vernalis* L. 94.  
*Anethum* L. 156, 79.  
*graveolens* L. 79.  
*Angelica* L. 162, 80.  
 — *Archangelica* L. 80.  
 — *litoralis* Fr. 80.  
*silvestris* L. 80.  
*Antennaria* Gært. 443, 7.  
*alpina* [L.] 7.  
*alpina* Gært. 7.  
*carpatica* Bl. & Fing. 7.  
*dioica* Gært. 7.  
*Anthemis* L. 456, 2.  
*agrestis* Wallr. 3.  
*arvensis* L. 3.  
*Cotula* L. 3.  
*maritima* Retz. 3.  
*tinctoria* L. 2.  
*Anthericum* L. 207, 213.  
*calyculatum* L. 217.  
*Liliago* L. 213.  
*ossiifragum* L. 217.  
*ramosum* L. 213.  
*Anthoxanthum* L. 40, 277.  
*odoratum* L. 277.  
*Anthriscus* Pers. 181, 78.  
*Cereseifolium* Hoffm. 78.  
*silvestris* Hoffm. 78.  
*vulgaris* Pers. 78.  
*Anthyllis* L. 395, 167.  
*Vulneraria* L. 167.  
*Antiphylla oppositifolia* Haw. 136.  
*Antirrhinum* L. 343, 61.  
*Elatine* L. 62.  
 — *Linaria* L. 61.  
 — *minus* L. 62.  
*Orontium* L. 61.  
*repens* L. 62.  
*supinum* L. 62.  
*Apargia alpina* Sw. 35.  
*autumnalis* Hoffm. 34.  
*hastilis* Hoffm. 34.  
*Apera* Adans. 35, 273.  
*Spica venti* PB. 273.  
*Aphanes arvensis* L. 149.  
*Apium* L. 163, 82.  
*graveolens* L. 82.  
*Aquilegia* L. 299, 95.  
*vulgaris* L. 95.  
*Arabis* L. 376, 102.  
*alpina* L. 103.  
*arenosa* Scop.  $\beta$  borealis Fr. 103.  
*Gerardi* Bess. 103.  
*glastifolia* H.N. 103.  
*hirsuta* Scop. 102.  
*persoliata* Lam. 103.  
*petraea* Lam. 103.  
*sagittata* DC. 103.  
*suecica* Fr. 103.  
*Thaliana* L. 103.  
 — *Aracium paludosum* Less. 17.  
 ARAIACEÆ Juss. 77.  
*Arbutus alpina* L. 169.  
 — *uva ursi* L. 169.  
*Archangelica officinalis* Fr. 80.  
 — *Arctium Bardana* W. 14.  
 — *Lappa* L. 14.  
*Arctophila* Rupr. 63, 264.  
*fulva* \* *pendul.* Ands. 264.  
*Læstadii* Rupr. 264.  
*pendulina* Ands. 264.  
*Arctostaphylos* Adans. 241, 168.  
*alpina* Spr. 169.  
*officinalis* W. & Gr. 168.  
*Arenaria* L. 257, 129.  
*ciliata* L. 129.  
*Gieseckii* Fl.D. 130.  
*gothica* Fr. 129.  
*hirta* Fl.D. 130.  
*lateriflora* L. 129.  
*marginata* DC. 133.  
*media* L. 132.  
*media* Wallr. 133.  
*norvegica* Gunn. 129.  
 — *peploides* L. 129.  
 — *rubra* L. 132.  
*serpyllifolia* L. 129.  
*tenuifolia* L. 130.  
*trinervia* L. 129.  
 ARISTOLOCHIACEÆ 179.  
*Aristolochia* L. 480, 179.  
*Clematidis* L. 179.  
*Armeria* W. 189, 74.  
*elongata* Koch. 74.  
*maritima* W. 74.  
*pubescens* Lk. 75.  
*sibirica* Turcz. 75.  
 — *vulgaris* W. 74.  
 — *A Armoracia rusticana* Koch. 104.  
*Arnica* L. 445, 4.  
*alpina* Murr. 4.  
*angustifolia* Fl.D. 5.  
*montana* L. 4.  
*Arnoseris* Gært. 424, 35.  
*pusilla* Gært. 35.  
 AROIDEÆ Juss. 223.  
 — *Arrhenatherum avenaceum* PB. 267.  
*Artemisia* L. 440, 3.  
*Absinthium* L. 3.

campestris L. 4.  
 laciniata W. 4.  
 maritima L. 4.  
 norvegica Fr. 4.  
 rupestris Fl.D. 4.  
 rupestris L. 3.  
 salina Liljebl. 4.  
 tanacetifolia Retz. 4.  
 vulgaris L. 4.

Arum L. 495, 223.

maculatum L. 223.

Arundo arenaria L. 271.

Calamagrostis L. 273.

colorata Sv.B. 277.

maritima Ag. 271.

Phragmites L. 270.

stricta Timm. 273.

varia Schrad. 271.

Asarum L. 270, 179.

europæum L. 179.

ASCLEPIADEÆ Juss. 57.

Asclepias Vincetoxicum L. 57.

Asparagus L. 206, 214.

officinalis L. 214.

Asperugo L. 108, 47.

procumbens L. 47.

Asperula L. 88, 37.

odorata L. 37.

tinctoria L. 37.

Asphodelus fistulosus L. 298.

Aspidium Sw. 528, 279.

aculeatum Sw. 279.

angulare Kit. 279.

crenatum Somf. 281.

cristatum Sw. 279.

dilatatum Sw. 280.

— Filix femina Sw. 281.

Filix mas Sw. 279.

— fragile Sw. 280.

Lonchitis Sw. 279.

— montanum Sw. 280.

Oreopteris Sw. 279.

spinulosum Sw. 280.

Thelypteris Sw. 279.

Asplenium L. 532, 281.

Adiantum nigrum L. 281.

— alternifolium Wulf. 282.

Breynii Retz. 282.

crenatum Fr. 281.

Filix femina Bernh. 281.

germanicum Weis. 282.

marinum L. 281.

Ruta muraria L. 282.

Scolopendrium L. 282.

septentrionale Hoffm. 282.

sibiricum Turcz. 281.

Trichomanes L. 281.

viride Huds. 282.

Aster L. 453, 9.

Tripolium L. 9.

Asterocephalus Columbaria Hn. 36.

suaveolens Hn. 36.

Astragalus L. 399, 161.

alpinus L. 161.

arenarius L. 161.

arenarius Fl.D. 161.

danicus Retz. 161.

glycyphyllus L. 161.

Hypoglottis L. 161.

leontinus Wg. 161.

oroboides Horn. 161.

— pilosus L. 162.

sordidus W. 162.

uralensis L. 162.

— Athamanta Libanotis L. 81.

Oreoselinum L. 80.

Athyrium Roth. 281.

Atriplex L. 518, 181.

angustifolia Sm. 182.

Babingtonii Woods. 182.

calotheca Fr. 182.

crassifolia Fr. 182.

deltoides Bab. 182.

depressa Hn. 182.

hastata L. 182.

hastata L. herb. 182.

hortensis L. 181.

laciniata L. Su. 182.

laciniata Wg. 182.

— latifolia Wg. 182.

litoralis L. 182.

longipes Drej. 182.

marina L. 183.

microsperma Kit. 182.

nitens Reb. 297.

patula L. 182.

patula Sm. 182.

pedunculata L. 183.

prostrata Bouch. 182.

rosea L. 182.

Atropa Belladonna L. 292.

Avena L. 45, 267.

brevis Roth. 299.

caryophyllæa Web. 268.

elatior L. 267.

fatua L. 267.

— flavescens L. 268.

hybrida Peterm. 267.

intermedia Lindgr. 267.

— præcox PB. 268.

pratensis L. 268.

pratensis Sv.B. 268.

pubescens L. 267.

sativa L. 299.

strigosa Schreb. 267.

subalpestris Hn. 268.

Avenella flexuosa Koch 269.

uliginosa Koch 269.

*Axyris prostrata* L. 297.  
*Azalea* L. 126, 169.  
     *lapponica* L. 170.  
     *procumbens* L. 169.

**B.**

*Baldingera* Fl. Wett. 29, 277.  
 — *arundinacea* Dum. 277.  
*Ballota* L. 317, 51.  
     *fœtida* Lam. 292.  
     *nigra* L. 51.  
     *ruderalis* Sw. 51.

**BALSAMINEÆ** DC. 111.

*Barbarea* Br. 367, 103.  
     *arcuata* Reich. 104.  
     *parviflora* Fr. 104.  
     *præcox* Br. 104.  
     *stricta* Fr. 104.  
     *vulgaris* Br. 103.  
     *vulgaris* Wg. 104.

*Bartsia* L. 335, 65.

*alpina* L. 65.  
     *Odontites* Huds. 65.

*Batrachium* Wimm. 307, 90.

*admixtum* W. Nyl. 91.  
     *aquatile* Wimm. 90.  
     *circinatum* Fr. 90.  
     *confervoides* Fr. 91.  
 — *confusum* Schultz. 91.  
     *crassicaule* Fr. 91.  
     *Drouetii* Nym. 90.  
     *hederaceum* Fr. 91.  
     *heterophyllum* Fr. 91.  
     *Lenormandii* Schulz. 91.  
     *marinum* Fr. 90.  
 — *pantothrix* DC. 90.  
     *peltatum* Fr. 91.  
     *Petiveri* Koch. 91.  
     *Rionii* Nym. 293.  
 — *sceleratum* Th. Fr. 90.  
     *setigerum* Fr. 91.  
     *trichophyllum* Chaix. 90.  
     *tripartitum* Fr. 91.

*Bellis* L. 457, 8.  
     *perennis* L. 8.

**BERBERIDEÆ** Juss. 96.

*Berberis* L. 213, 96.  
     *vulgaris* L. 96.  
 — *Berteroa incana* DC. 108.  
 — *Berula angustifolia* Koch. 83.  
*Beta maritima* L. 297.

*Betonica* L. 318, 51.  
     *officinalis* L. 51.  
     *stricta* Ait. 51.

*Betula* L. 500, 195.

*alba* Fl.D. 195.  
 — *alba* L. 195.  
 — *Alnus* L. 196.  
     *alpestris* Fr. 196.  
     *carpatica* W. 195.  
     *dalecarlica* L. 195.  
     *fruticosa* Pall. 297.  
     *fruticosa* W. och Reich. 196.  
     *glutinosa* Wallr. 195.  
     *humilis* Hn. 196.  
     *humilis* Schrank. 196.  
     *hybrida* Blom. 195.  
     *intermedia* Thom. 195.  
     *laciniata* Thunb. 196.  
     *nana* L. 196.  
     *odorata* Bechst. 195.  
     *odorata* Reich. 195.  
     *oycowiensis* Larsson 196.  
     *pallescent* Larss. 196.  
     *pinnata* Lundm. 197.  
     *pubescens* Ehrh. 195.  
     *subalpina* Larss. 196.  
     *verrucosa* Ehrh. 195.

**BETULINEÆ** Reich. 195, 297.

*Bidens* L. 437, 1.

*cernua* L. 1.  
     *frondosa* Retz. 1.  
     *minima* L. 1.  
 — *platycephala* Oerst. 1.  
     *tripartita* L. 1.

*Blechnum* L. 535, 283.

*boreale* Sw. 283.  
     *Spicant* Roth. 283.

*Blitum* L. 141, 183.

— *Bonus Henricus* C. A. M. 183.  
     *capitatum* L. 183.  
 — *glaucum* Koch. 183.  
 — *rubrum* Reich. 183.  
     *virgatum* L. 183.

— *Blysmas compressus* Panz. 232.  
 — *rufus* Lk. 232.

*Bylltia suaveolens* Fr. 274.

**BORAGINEÆ** Juss. 44, 291.

*Botrychium* Sw. 540, 284.

*boreale* Milde. 284.  
     *brevifolium* Ångstr. 284.  
     *crassinervium* Rupr. 284.  
     *lanceolatum* Rupr. 284.  
     *lanceolatum* Ångstr. 284.  
     *Lunaria* Sw. 284.  
     *matricariifolium* Al. Br. 284.  
 — *matricarioides* Willd. 285.  
     *rutaceum* Sw. 285.  
     *rutæfolium* Al. Br. 285.  
     *simplex* Hjtchc. 284.  
     *tenellum* Ångstr. 284.  
     *ternatum* Sw. Milde 285.  
     *virginianum* Sw. 285.



*Brachypodium* PB. 72, 258.

*gracile* PB. 258.  
*loliaceum* Fr. 258, 265.  
*pinnatum* PB. 258.  
*silvaticum* RS. 258.

*Brassica* L. 372, 99.

*campestris* L. 99.  
*Napus* L. 99.  
*nigra* Koch. 99.  
*Rapa* L. 99.

*Braya* Sternb. et Hop. 377, 101.

*alpina* Sternb. & Hop. 101.  
*supina* Koch. 100.

*Breca arvensis* Less. 14.

*Briza* L. 64, 262.

*media* L. 262.

*Bromus* L. 55, 261.

*arvensis* L. 261.  
*asper* Murr. 261.  
*commutatus* Schrad. 261.  
*erectus* Huds. 260.  
*erectus* Sv.B. 261.  
*giganteus* L. 259.  
*hordeaceus* Wg. 262.  
*inermis* L. 260.  
*mollis* L. 262.  
*nanus* Weig. 262.  
*patulus* MK. 261.  
*pinnatus* FLD. 258.  
*pinnatus* L. 258.  
*pratensis* Ehrh. 262.  
*racemosus* L. 262.  
*secalinus* L. 261.  
*silvaticus* Sm. 258.  
*sterilis* L. 261.  
*suberectus* Fr. 260.  
*lectorum* L. 261.

*Bryonia* L. 502, 134.

*alba* L. 134.

*Bulliarda* DC. 93, 140.

*aquatica* DC. 140.

*Bunias* L. 347, 105.

*Cakile* L. 105.  
*orientalis* L. 105.

*Bunium* L. 177, 82.

*Carvi* Godr. & Gren. 82.  
*flexuosum* With. 82.

*Bupleurum* L. 151, 83.

*Odontites* Spreng. 83.  
*tenuissimum* L. 83.

*Butomus* L. 240, 216.

*umbellatus* L. 216.

## C.

*Cakile* Scop. 351, 105.

*maritima* Scop. 105.

*Calamagrostis* Roth. 31, 271.

*acutiflora* DC. 271.  
*ambigua* Hn. 273.  
*arenaria* Fr. 271.  
*arundinacea* Roth. 271.  
*baltica* Hn. Fr. 271.  
*chalybea* Bl. 271.  
*chalybea* Fr. 271.  
*elata* Bl. 272.  
*epigejos* Roth. 272.  
*Halleriana* DC. 272.  
*Hartmanniana* Fr. 273.  
*intermedia* Lindeb. 273.  
*lanceolata* Roth. 273.  
*Langsdorffii* Trin. 272.  
*lapponica* Hn. 271.  
*latifolia* Bl. 272.  
*laxa* Host. 273.  
*litorea* DC. 273.  
*montana* Host. 271.  
*neglecta* Ehrh. 273.  
*nulans* Saut. 272.  
*phragmitoides* Hn. 272.  
*pseudo-phragmites* Reich. 272.  
*rigens* Lindgr. 272.  
*rubicunda* Bl. 272.  
*silvatica* DC. 271.  
*stricta* Hn. 273.  
*strigosa* Hn. 273.  
*subuliglumis* Hn. 271.  
*varia* PB. 271.

*Calamintha* Mönch. 329, 49.

*Acinos* Clairv. 49.

*Calendula arvensis* L. 290.

*officinalis* L. 290.

*Calla* L. 209, 223.

*palustris* L. 223.

*Callitriche* L. 482, 199.

*autumnalis* Kütz. 200.  
*autumnalis* L. 200.  
*hamulata* Kütz. 199.  
*platycarpa* Kütz. 199.  
*polymorpha* Lönrr. 199.  
*stagnalis* Scop. 199.  
*tenuifolia* Fr. 200.  
*verna* L. 199.  
*virens* Goldb. 200.

CALLITRICHINEÆ Link. 199.

*Calluna* Salisb. 227, 169.

*Erica* DC. 169.  
*vulgaris* Salisb. 169.

*Caltha* L. 303, 95.

*palustris* L. 95.

*Calypso* Salisb. 469, 207.

*borealis* Salisb. 207.

— *Calystegia sepium* Br. 43.

*Camelina* Crantz. 359, 107.

*dentata* Fr. 108.

*foetida* Fr. 108.

*microcarpa* Reich. 108.

*sativa* Fr. 108.

*silvestris* Wallr. 107.

*Campanula* L. 128, 41.

*barbata* L. 41.

*bononiensis* L. 201.

*Cervicaria* L. 41.

*glomerata* L. 41.

*latifolia* L. 42.

*patula* L. 42.

*persicifolia* L. 42.

*rapunculoides* L. 42.

*Rapunculus* L. 42.

*rotundifolia* L. 42.

*Trachelium* L. 41.

*uniflora* L. 42.

*urticifolia* Schmidt. 41.

CAMPANULACEÆ Juss. 41, 291.

CAPRIFOLIACEÆ Juss. 40.

*Capsella* Mönch. 355, 106.

*Bursa pastoris* Mönch. 106.

*petraea* Fr. 107.

*Cardamine* L. 370, 101.

*æquiloba* C. Hn. 101.

*amara* L. 101.

*bellidifolia* L. 102.

*hirsuta* Fl.D. 101.

*hirsuta* L. 102.

*impatiens* L. 102.

*intermedia* Horn. 102.

*parviflora* L. 102.

*petraea* L. 103.

*pratensis* L. 101.

*silvatica* Hoffm. 101.

*silvatica* Link. 102.

*trifolia* L. 294.

*Cardaria Draba* Reich. 106.

*Carduus* L. 430, 12.

*acanthoides* L. 12.

— *acaulis* L. 14.

*canus* L. Jacq. 13.

*crispus* L. 13.

— *heterophyllus* L. 12.

— *lanceolatus* L. 12.

*nutans* L. 12.

— *palustris* L. 13.

*polyacanthos* Schreb. 13.

*tenuiflorus* Curt. 290.

*Carex* L. 484, 235.

*acuta* L. 245.

— *acutiformis* Ehrh. 235.

*alpina* Sw. 243.

*ampullacea* Good. 236.

*aquatilis* Wg. 244.

*arctica* Deimb. 251.

*arctophila* Nyl. 244.

*arenaria* L. 250.

*atrata* L. 242.

*atrata* L. herb. 238.

*bicolor* All. 247.

*binervis* Sm. 239.

*Banninghausiana* Weih. 247.

*bolina* Lang. 246.

*borealis* Lang. 244.

*brevirostris* Cederstr. 253.

*brizoides* L. herb. 248.

*bullata* v. Fr. 236.

*Buxbaumii* Wg. 242.

*caespitosa* L. 247.

*caespitosa* L. herb. 246.

*canescens* L. 248.

*canescens* L. herb. 242.

*capillaris* L. 238.

*capitata* L. 253.

*chordorhiza* Ehrh. 251.

*ciliata* W. 242.

*collina* W. 241.

*crassa* Ehrh. 235.

*cryptocarpa* Mey. 243.

*curta* Good. 248.

*curvirostra* Hn. 241.

*cuspidata* Wg. 244.

*Davalliana* Reiz. 253.

*Deinballiana* Gay. 251.

*digitata* L. 242.

*dioica* L. 253.

*discolor* Nyl. 244.

*disperma* Dew. 249.

*distans* L. 239.

*disticha* Huds. 250.

*divisa* Fl.D. 240.

*divulsa* Good. 251.

— *Drejeri* Lang. 247.

— *Drymeja* Ehrh. 238.

*echinata* Murr. 248.

*Ehrhartiana* Hop. 252.

*elongata* L. 248.

*elytroides* Fr. 246.

*epigejos* Fr. 244.

*epigejos* Læst. 244.

*ericetorum* Poll. 242.

*evoluta* Hn. 236.

*extensa* Good. 240.

*festiva* Dew. 250.

*filiformis* Fl.D. 241.

*filiformis* L. 237.

*filipendula* Drej. 243.

— *flacca* Schreb. 237.

*flava* L. 240.



*Friesii* Bl. 236.

*frigida* Wg. 238.

*fuliginosa* Hop. 238.

- *fulva* Good. 239.
- fusca* Schk. 236.
- Gaudiniana* Guthn. 248.
- Gebhardi* Hop. 248.
- glareosa* Wg. 250.
- glauca* Scop. 237.
- globularis* L. 241.
- *Goodenowii* Gay. 246.
- gracilescens* Hn. 235.
- gracilis* Ehrh. 249.
- gynocrates* Wormsk. 298.
- hæmatolepis* Drej. 244.
- halophila* Nyl. 243.
- heleonastes* Ehrh. 249.
- helvola* Bl. 248.
- hirta* L. 237.
- *Hornschuchiana* Hop. 239.
- hyperborea* Drej. 245.
- incurva* Lightf. 251.
- *intermedia* Good. 250.
- irrigua* Sm. 238.
- *juncella* Fr. 246.
- Kallegatensis* Fr. 244.
- Kochiana* Sturm. 235.
- lacustris* Th. Fr. 236.
- lævirostris* Fr. 236.
- lagopina* Wg. 249.
- Langii* Steud. Bl. 240.
- lapponica* Lang. 248.
- lastocarpa* Ehrh. 237.
- laxa* Wg. 238.
- lepidocarpa* Tausch. 240.
- leporina* Fl.D. 249.
- leporina* L. 250.
- *leucoglochin* Ehrh. 252.
- ligerica* Gay. 250.
- limosa* L. 238.
- Limula* Fr. 245.
- livida* Wg. 241.
- lollacea* L. 249.
- macilenta* Fr. 248.
- maritima* Müll. 243.
- membranacea* Hop. 242.
- microglochin* Wg. 252.
- microstachya* Ehrh. 248.
- misandra* Br. Bl. 238.
- montana* L. 241.
- multiculmis* Ehrh. 248.
- muricata* L. 251.
- nardina* Fr. 253.
- nigra* All. 243.
- nigritella* Drej.? 241.
- norvegica* W. 249.
- *nulans* Fr. 235.
- obtusata* Lilj. 252.
- Oederi* Ehrh. 240.
- Oederi* Retz. 1, 241.
- *ornithopoda* W. 242.
- orthostachya* Mey. 237.
- ovalis* Good. 250.
- *pacifica* Drej. 247.
- pallascens* L. 237.
- paludosa* Good. 235.
- panicea* L. 240.
- paniculata* L. 251.
- paradoxa* W. 252.
- parallela* Somf. 253.
- pauciflora* Lightf. 252.
- pedata* All. 242.
- pedata* L. 240.
- pedata* Wg. 240.
- pediformis* Mey. 242.
- petia* Lang. 240.
- Persoonii* Sleb. 248.
- pilulifera* L. 241.
- præcox* Jacq. 241.
- *prolixa* Fr. 245.
- pseudo-Cyperus* L. 237.
- psyllophora* Ehrh. 253.
- pulcaris* L. 253.
- pulla* Good. 236.
- punctata* Gaud. 239.
- rariflora* Sm. 239.
- recurva* Fl.D. 237.
- remota* L. 247.
- rhynchophysa* Mey. 236.
- rigida* Good. 246.
- riparia* Curt. 235.
- rotundata* Wg. 236.
- rufina* Drej. 247.
- rupestris* All. 252.
- salina* Wg. 243.
- salinoides* Beurl. 244.
- saxatilis* L. 236.
- saxatilis* Wg. 246.
- Schreberi* Schrank. 250.
- scirpoides* Michx. 253.
- silvatica* Huds. 237.
- *spadicea* Roth. 235.
- sparsiflora* Fr. 241.
- speirotachya* Sm. 239.
- *stellulata* Schreb. 247.
- stenolepis* Less. 236.
- stricta* Good. 246.
- stygia* Fr. 239.
- stylosa* Mey. 241.
- subspathacea* Wormsk. 244.
- tenella* Schk. 249.
- tenuiflora* Wg. 248.
- teretiuscula* Good. 252.
- tomentosa* Fl.D. 241.
- tomentosa* L. 241.
- *tricostata* Fr. 245.
- *turfosa* Fr. 246.
- uliginosa* L. 251, 232.
- undulata* Kunze 237.
- ustulata* Wg. 238.
- vacillans* Drej. 244.
- *vaginata* Tausch. 240.
- VahlIIi* Schk. 243.
- vesicaria* L. 235.
- *virens* Lam. Hn. 251.

- vitis* Fr. 248.  
*Wormskjoldiana* Horn. 253.  
*vulgaris* Fr. 246.  
*vulpina* L. 251.  
*Carlina* L. 432, 12.  
   *vulgaris* L. 12.  
*Carpinus* L. 499, 186.  
   *Baculus* L. 186.  
*Carrichena Fella* DC. 294.  
*Carum* L. 165, 82.  
   *Carvi* L. 82.  
   *flexuosum* Fr. 82.  
*Cassandra calyculata* Don. 296.  
*Cassiope hypnoides* Don. 169.  
   *tetragona* Don. 169.  
*Catabrosa* PB. 61, 266.  
   *algida* Fr. 266.  
   *aquatica* PB. 266.  
   *latifolia* Fr. 266.  
*Caucalis Anthriscus* Liljebl. 79.  
   *daucoides* L. 293.  
*Caulinia flexilis* Willd. 210.  
**CELASTRINEÆ** R. Br. 76.  
*Cenolophium Fischeri* Bot. Not. 293.  
*Centaurea* L. 438, 11.  
   *austriaca* W. 11.  
   *Calcitrapa* L. 290.  
   *Cyanus* L. 11.  
   *Jacea* L. 12.  
   *nigra* L. 11.  
   *phrygia* L. 11.  
   *Scabiosa* L. 10.  
   *solstitialis* L. 290.  
*Centunculus* L. 83, 71.  
   *minimus* L. 71.  
   *simplex* Fl.D. 71.  
*Cephalanthera* Rich. 471, 205.  
   *ensifolia* Rich. 205.  
   *Lonchophyllum* Reich. y. 206.  
   *pallens* Rich. 205.  
   *rubra* Rich. 205.  
   *Xiphophyllum* Reich. y. 205.  
*Cerastium* L. 266, 127.  
   *alpestre* Hn. 127.  
   *alpinum* L. 127.  
 — *aquaticum* L. 125.  
   *arvense* L. 127.  
   *atrovirens* Bab. 128.  
 — *brachypetalum* Desp. 128.  
 — *glomeratum* Thuill. 128.  
   *glutinosum* Fr. 128.  
   *latifolium* L. 127.  
   *macilentum* Aspeg. 128.  
   *ovale* Pers. 128.  
 — *pumilum* Koch. 128. *Carl.*  
   *semidecandrum* L. 128.  
   *stellarioides* Hn. 127.  
   *strigosum* Fr. 128.  
   *tetrandrum* Curt. 128.  
   *trigynum* Vill. 127.  
   *triviale* Link. 127.  
   *viscosum* L. 128.  
   *viscorum* Sm. Wg. 127.  
   *vulgare* Hn. 127.  
   *vulgatum* L. 127.  
   *vulgatum* Sm. 128.  
*Cerasus acida* Barkh. 156.  
   *avium* Mönch. 157.  
   *vulgaris* Mill. 156.  
*Ceratocephalus falcatus* (Pers.) 293.  
**CERATOPHYLLÆE** DC. 200.  
*Ceratophyllum* L. 493, 200.  
   *demersum* L. 200.  
   *muticum* Cham. 200.  
   *oxyacanthum* Cham. 200.  
   *submersum* L. 200.  
*Cerefolium* Hall. 182, 78.  
 — *sativum* Bess. 78.  
 — *silvestre* Bess. 78.  
*Chærophyllum* L. 183, 78.  
 — *Anthriscus* Wg. 78.  
   *aureum* L. 78.  
   *bulbosum* L. 293.  
   *maculatum* W. 78.  
 — *sativum* Wg. 78.  
 — *silvestre* L. 78.  
   *temulum* L. 78.  
*Chatospora ferruginea* Reich. 231.  
*Chamaledon procumbens* Link. 169.  
*Chamamelum inodorum* Vis. 2.  
*Chamænerion* Scop. 232, 140.  
   *angustifolium* Scop. 140.  
*Chamæorchis* Rich. 467, 205.  
   *alpina* Rich. 205.  
 — *Chamaepium officinale* Wallr. 100.  
   *supinum* Wallr. 100.  
*Cheiranthus alpinus* Wg. 101.  
*Chelidonium* L. 291, 97.  
   *Glaucium* L. 97.  
   *majus* L. 97.  
**CHENOPODIACEÆ** Juss. 181, 297.  
*Chenopodium* L. 140, 184.  
   *album* L. 184.  
   *ambrosioides* L. 297.  
   *Bonus Henricus* L. 183.  
   *sicifolium* Sm. 297.  
   *glaucum* L. 183.  
   *glomerulosum* Reich. 184.  
   *hirsutum* Wg. 184.  
   *hybridum* L. 184.  
   *maritimum* L. 185.

- murale L. 184.  
 — *olidum* Curt. 184.  
*opulifolium* Dr. 184.  
*opulifolium* Schrad. 297.  
*paganum* Reich. 184.  
*polyspermum* L. 184.  
*rubrum* L. 183.  
*urbicum* L. 184.  
 — *viride* L. 184.  
*Vulvaria* L. 184.  
*Chimaphila umbellata* Nutt. 171.  
*uniflora* Fr. 170.  
*Chondrosea Aizoon* Haw. 136.  
*Cotyledon* Haw. 135.  
*Chrysanthemum* L. 459, 2.  
*Leucanthemum* L. 2.  
*Parthenium* Pers. 2.  
*segetum* L. 2.  
*Chrysocoma Linosyris* L. 10.  
*Chrysosplenium* L. 234, 138.  
*alternifolium* L. 138.  
*oppositifolium* L. 138.  
*tetrandrum* Th. Fr. 138.  
*Cichorium* L. 426, 15.  
*Intybus* L. 15.  
*Cicuta* L. 167, 82.  
*virosa* L. 82.  
*Cineraria* L. 446, 5.  
*alpina* L. herb. 5.  
*campestris* Retz. 5.  
*integrifolia* E.B. 5.  
*palustris* L. 5.  
*Cinna* L. 33, 274.  
*arundinacea* var. Bl. 274.  
*Brownii* Rupr. 266.  
*pendula* Trin. 274.  
*Circæa* L. 12, 142.  
*alpina* L. 142.  
*intermedia* Ehrh. 142.  
*lutetiana* L. 142.  
*Cirsium* Hall. 431, 13.  
*acaule* All. 14.  
*acauli-oleraceum* Näg. 14.  
*arvense* Scop. 14.  
*canum* MB. 13.  
*decoloratum* Koch. 14.  
*heterophyllum* All. 13.  
*heterophyllo-acaule* Näg. 13.  
*lanceolatum* Scop. 13.  
*nemorale* Reich. 13.  
*oleraceum* Scop. 14.  
*oleraceo-heterophyllum* Näg. 13.  
*palustre* Scop. 13.  
*rigens* Wallr. 14.  
*tuberosum* All. 290.  
**CISTINEÆ** DC. 118.  
*Cistus Canus* L. 118.  
*Fumana* L. 118.  
 — *Helianthemum* L. 118.  
*marifolius* E.B. 118.  
*olandicus* L. 118.  
*Cladium* P.Br. 21, 231.  
*germanicum* Schrad. 231.  
*Mariscus* P.Br. 231.  
*Clinopodium* L. 330, 50.   
*vulgare* L. 50.  
 — *Cnicus acaulis* Roth. 14.  
*acauli-oleraceus* Schiede. 14.  
*arvensis* Sm. 14.  
*heterophyllum* W. 13.  
*lanceolatus* W. 13.  
*oleraceus* L. 14.  
*palustris* Roth. 13.  
*Onidium pratense* Sm. 81.  
*venosum* Koch. 81.  
*Cochlearia* L. 358, 108.  
*anglica* L. 109.  
*arctica* Fr. 108.  
*arctica* (Schlecht.) 108.  
 — *Armoracia* L. 104.  
 — *Coronopus* L. 107.  
*danica* L. 108.  
*officinalis* L. 108.  
*Coeloglossum* Hn. 464, 204.  
 — *albidum* Hn. 204.  
*viride* Hn. 204.  
**COLCHICACEÆ** DC. 215.  
*Colethicum* L. 215.  
*autumnale* L.   
*Coleanthus* Seid. 26, 275.  
*subtilis* Seid. 275.  
*Colpodium* Trin. 60, 266.  
*latifolium* Br. 266.  
*Comarum* L. 286, 152.  
*palustre* L. 152.  
**CONIFERÆ** Juss. 197.  
*Conioselinum* Fisch. 160, 81.  
*Fischeri* Wimm. 81.  
*Gmelini* Bray. 81.  
*Sibiricum* Fisch. 81.  
*Conium* L. 172, 77.  
*maculatum* L. 77.  
*Conopodium denudatum* Koch och Fr. 82.  
*Conringia Thaliana* Reich. 103.  
*Gonvallaria* L. 204, 214.  
 — *bifolia* L. 215.  
*bracteata* Thom. 215.  
*majalis* L. 214.  
*multiflora* L. 215.  
*Polygonatum* L. 214.

*stellata* L. 215.  
*verticillata* L. 214.

**CONVOLVULACEÆ Juss. 43, 291.**

*Convolvulus* L. 118, 43.  
*arvensis* L. 43.  
*sepium* L. 43.

*Conyza* *serotina* L. 8.  
*Coptidion* *repens* L. 88.  
*Coreopsis* *floribunda* L. 2.  
*Corallorhiza* Hall. 478, 208.  
*innata* Br. 208.  
*nemorialis* Sw. 208.  
*virescens* Drej. 208.

*Coriandrum* L. 168, 77.  
*sativum* L. 77.

**CORNEÆ DC. 76.**

*Cornus* L. 90, 76.  
*sanguinea* L. 76.  
*suecica* L. 76.

*Coronilla* L. 39, 160.  
*Emerus* L. 160.

*Coronopus* *depressus* Mönch. 107.  
*didymus* Sm. 107.

*Corvisartia* *Helenium* Mer. 8.

*Corydalis* Pers. 390, 97.  
*bulbosa* Pers. 98.  
*cava* Schw. & K. 98.  
*sabacea* Pers. 97.  
*laxa* Fr. 97.  
*Lobellii* Tausch. 97.  
*nobilis* L. 294.  
*pumila* Host. 97.  
*rutacea* Th. Fr. 294.  
*solida* Sm. 97.

*Corylus* L. 498, 186.  
*Avellana* L. 186.

*Corynephorus* P.B. 48, 268.  
*canescens* P.B. 268.

*Cota* *tinctoria* Gay. 3.

*Cotoneaster* Med. 277, 145.  
*melanocarpa* Blytt. 145.  
*nigra* Wahlb. 145.  
*vulgaris* Lindl. 145.

*Cotula* *coronopifolia* L. 290.  
*matricarioides* Bong. 2.

— *Cracca* *major* Godr. & Gren. 159.  
*minor* Godr. & Gren. 160.

*Crambe* L. 350, 105.  
*maritima* L. 105.

**CRASSULACEÆ Juss. 138, 295.**

*Cratægus* L. 278, 145.  
*Aria* L. 144.

*kyrtostyla* Fingerh. 145.  
*monogyna* Fingerh. 145.  
*monogyna* Jacq. 145.  
*Oxyacantha* L. 145.  
*oxyacanthoides* Thuill. 145.

*Crepis* L. 423, 17.

*biennis* L. 17.  
*multicaulis* Led. 18.  
*nicænsis* Balb. 17.  
*paludosa* Mönch. 17.  
*præmorsa* Tausch. 18.  
*sibirica* L. 291.  
*tectorum* L. 17.  
*virens* L. 17.

*Critamus* *Falcaria* Reich. 83.

*Crocus* L. 16, 209.  
*luteus* Lam. 297.  
*vernus* All. 209.

**CRUCIFERÆ Juss. 99, 294.**

*Cryptogramma* *crispa* Br. 283.  
*Cucubalus* *Behen* L. 122.  
*viscosus* L. 122.

**CUCURBITACEÆ Juss. 134.**

**CUPULIFERÆ Rich. 186.**

*Cuscuta* L. 147, 43.  
*Epilinum* Weihe. 44.  
*Epithymum* L. 291.  
*europæa* L. 43.  
*halophila* Aresch. 44.  
*halophyta* Fr. 44.  
*Ligustri* Aresch. 44.  
*Schkuhriana* Pfeif. 44.  
*Trifolii* Bab. 44.

*Cyathea* *fragilis* Roth. 280.

*Cynanchum* Br. 146, 57.  
*Vincetoxicum* Br. 57.

*Cynoglossum* L. 102, 47.  
*officinale* L. 47.

*Cynosurus* L. 67, 258.

— *cæruleus* L. 276.  
*cristatus* L. 258.  
— *panicus* L. 275.

**CYPERACEÆ Juss. 231, 298.**

*Cyperus* L. 17, 231.  
*fuscus* L. 231.

*Cypripedium* L. 479, 208.  
*bulbosum* L. 207.  
*Calceolus* L. 208.

*Cystopteris* Bernh. 530, 280.  
*alpina* Desv. 280.  
*fragilis* Bernh. 280.  
*montana* Bernh. 280.  
*regia* var. *alpina* Koch. 280.

**D.**

*Dactylis* L. 51, 258.  
*cristata* var.  $\beta$  Wg. 267.  
*glomerata* L. 258.

— *Danthonia decumbens* DC. 267.

*Daphne* L. 225, 180.  
*Mezereum* L. 180.

*Datura* L. 119, 59.  
*Stramonium* L. 59.

*Daucus* L. 178, 79.  
*Carota* L. 79.

*Delphinium* L. 297, 95.  
*Consolida* L. 95.

*Dentaria* L. 369, 101.  
*bulbifera* L. 101.

*Dermasea nivalis* Haw. 136.

*Dianthus* L. 251, 124.  
*arenarius* L. 124.  
*Armeria* L. 124.  
*barbatus* L. 295.  
*deltoides* L. 124.  
*glaucus* L. 124.  
*plumarius* Gunn. 124.  
*prolifer* L. 124.  
*superbus* L. 124.

*Diapensia* L. 125, 55.  
*lapponica* L. 55.

*Digitalis* L. 340, 61.  
*purpurea* L. 61.

*Digitaria* Scop. 39, 275.  
*ciliaris* Koel. 299.  
*filiformis* Reich. 275.  
*humifusa* Pers. 275.

*Digraphis arundinacea* Trin. 277.

*Diploaxis* DC. 374, 99.  
*bracteata* Godr. & Gr. 99.  
*muralis* DC. 294.  
*tenuifolia* DC. 99.

**DIPSACEÆ** Juss. 35.

*Dipsacus* L. 81, 35.  
*pilosus* L. 35.

*Draba* L. 362, 109.  
*alpina* L. 110.  
*androsacea* Wg. 110.  
*brachycarpa* Zett. 110.  
*contorta* Ehrh. 109.  
*dovrensis* Fr. 109.  
*glacialis* Ad. 110.  
*hirta* Lindbl. 110.  
*hirta* L. 109.  
*hirta* Sm. 110.  
*hirta* Wg. 110.  
*incana* L. 109.

*incano-hirta* Hn. 109.  
*lactea* Adams. 110.  
*lapponica* DC. 110.  
*laxa* Lindbl. 110.  
*Liljebladii* Wallm. 110.  
*lutea* Gillib. 109.  
*lutescens* Hn. 110.  
*muralis* L. 109.  
*muricella* Wg. 110.  
*nemorosa* L. 109.  
*nivalis* Liljebl. 110.  
*ochroleuca* Bunge & Led. 110.  
*oxycarpa* Somf. 110.  
*rupestris* Bab. 110.  
*rupestris* Br. 110.  
*scandinavica* Lindbl. 110.  
*stellata* Fl.D. 110.  
*trichella* Fr. 110.  
*Wahlenbergii* Hn. 110.  
*verna* L. 109.

*Dracocephalum* L. 327, 51.  
*Ruyschiana* L. 51.  
*thymiflorum* L. 51.

*Drosera* L. 191, 124.  
*anglica* Sm. 121.  
*intermedia* Hayne 121.  
*longifolia* L. 121.  
*obovata* Koch. 121.  
*rotundifolia* L. 121.

**DROSERACEÆ** DC. 121.

**DRUPACEÆ** L. 156.

*Dryas* L. 288, 155.  
*octopetala* L. 155.

**E.**

*Echinochloa Crus galli* P.B. 275.

*Echinops* L. 427, 11.  
*sphaerocephalus* L. 11.

*Echinosperrum* Sw. 103, 47.  
*deflexum* Lehm. 47.  
*Lappula* Lehm. 47.

*Echium* L. 98, 46.  
*ulgare* L. 46.

**ELEAGNEÆ** Br. 180.

*Elatine* L. 239, 133.  
*callitrichoides* Rupr. 133.  
*hexandra* DC. 133.  
*Hydropiper* L. 133.  
*orthosperma* v. Dub. 133.  
*paludosa* var. Godr. 133.  
*spatulata* Gorsk. 133.  
*triandra* Schk. 133.

**ELATINEÆ** Juss. 133.

*Elsholtzia* Willd. 311, 47.  
*cristata* L. 47.

*Elymus* L. 70, 257.  
*arenarius* L. 257.  
*caninus* L. 256.  
*europæus* L. 257.  
*geniculatus* Curt. 257.

*Elyna spicata* Schrad. 254.

EMPETREÆ Nutt. 171.

*Empetrum* L. 505, 171.  
*nigrum* L. 171.

*Enodium coeruleum* Gaud. 266.

*Epilobium* L. 231, 140.  
*alpinum* L. 141.  
*alsinifolium* Vill. 141.  
*angustifolium* L. 140.  
*Gesneri* Vill. 140.  
*hirsutum* L. 140.  
*Hornemannii* Reichenb. 141.  
*intermedium* Reichenb. 140.  
*lineare* Mühl. 142.  
*montanum* L. 142.  
*nulans* Schmidt. 141.  
*organifolium* Lam. 141.  
*palustre* L. 142.  
*parviflorum* Schreb. 141.  
*pubescens* Roth. 141.  
*purpureum* Fr. 141.  
*rivulare* Wg. 141.  
*roseum* Schreb. 141.  
*spicatum* Lam. 140.  
*sudeticum* Beurl. 141.  
*tetragonum* L. 141.  
*virgatum* Fr. 141.

*Epipactis* Crantz. 472, 206.

*strorubens* Hoffm. 206.  
*cordata* Sw. 206.  
*ensifolia* Sw. 205.  
*Helleborine* Cr. 206.  
*latifolia* Sw. 206.  
*longifolia* Reich. 206.  
*media* Fr. 206.  
*microphylla* Sw. 206.  
*Nidus avis* Sw. 207.  
*ovata* Sw. 206.  
*pallens* Sw. 206.  
*palustris* Cr. 206.  
*rubiginosa* Gaud. 206.  
*rubra* Wg. 205.

*Epipogium* Gmel. 470, 207.

*aphyllum* Sw. 207.  
*Gmelini* Rich. 207.

EQUISETACEÆ DC. 285.

*Equisetum* L. 522, 285.  
*amphibolium* Retz. 286.  
*arvense* L. 285.

*fluviatile* L. 286.  
*hiemale* L. 286.  
*limosum* L. 286.  
*Linnaeanum* Döll. 286.  
*litorale* Kuhl. 286.  
*palustre* L. 286.  
*pratense* Ehrh. 286.  
*riparium* Fr. 286.  
*scirpoides* Michx. 287.  
*silvaticum* L. 286.  
*Telmateja* Ehrh. 300.  
*umbrosum* W. 286.  
*variegatum* All. 286.  
*verticillatum* Döll. 286.

*Erica* L. 226, 169.

*cinerea* L. 169.  
*Tetralix* L. 169.  
*vulgaris* L. 169.

ERICINEÆ Juss. 168, 296.

*Erigeron* L. 454, 9.

*acris* L. 9.  
*alpinus* L. 9.  
*canadensis* L. 290.  
*dröbachiensis* Fr. 9.  
*elongatus* Led. 9.  
*elongatus* Fr. 9.  
*Mülleri* Lund. 9.  
*politus* Fr. 9.  
*rigidus* Fr. 9.  
*uniflorus* L. 10.

*Eriophorum* L. 19, 234.

*alpinum* L. 234.  
*angustifolium* Roth. 234.  
*callitrich* Cham. 234.  
*capitatum* Host. 235.  
*Chamissonis* Mey. 235.  
*gracile* Koch. 234.  
*latifolium* Hop. 234.  
*latifolium* Sm. 234.  
*medium* Ands. 235.  
*opacum* Björnstr. 235.  
*polystachion* L. 234.  
*polystachion* Sv.B. 234.  
*pubescens* Sm. 234.  
*rufescens* Ands. 235.  
*russeolum* Fr. 235.  
*Scheuchzeri* Hop. 235.  
*triquetrum* Hop. 234.  
*vaginatum* L. 234.

*Erodium* l'Her. 382, 116.

*cicutarium* l'Her. 116.  
*moschatum* Ait. 295.

*Erophila vulgaris* DC. 109.

*Eruca sativa* Lam. 294.

*Erucastrum* Sch. et Spen. 373, 99.

*Pollichii* Sch. & Sp. 99.



*Ervum* L. 406, 160.

*hirsutum* L. 160.

*Lens* L. 160.

*tetraspermum* L. 160.

*Eryngium* L. 148, 84.

*maritimum* L. 84.

*Erysimum* L. 365, 100.

*Alliaria* L. 101.

*Barbarea* L. 104.

*cheirantoides* L. 100.

*Cheiranthus* Pers. 294.

*hieracifolium* Fr. S.V. 101.

*hieracifolium* L. 100.

*officinale* L. 100.

*strictum* Koch. 101.

*Erythraea* Pers. 117, 58.

*angustifolia* Wg. 58.

*Centaureum* Pers. 58.

*linariifolia* Pers. 58.

*litoralis* Fr. 58.

*pulchella* Fr. 58.

*Euclidium syriacum* Br. 294.

*Euonymus* L. 135, 76.

*europæus* L. 76.

*Eupatorium* L. 435, 10.

*cannabinum* L. 10.

*Euphorbia* L. 274, 171.

*Cyparissias* L. 172.

*Esula* L. 171.

*exigua* L. 172.

*Helioscopia* L. 172.

*palustris* L. 171.

*Peplus* L. 172.

**EUPHORBIACEÆ** Juss. 171, 296.

*Euphrasia* L. 333, 63.

*alpina* DC. 66.

*gracilis* Fr. 66.

*Odontites* L. 65.

*officinalis* L. 66.

*parviflora* Fr. 66.

*salisburgensis* Funk. 66.

*Eurythalia Amarella* Ren. 58.

*campestris* Ren. 58.

*tenella* Ren. 58.

## F.

*Fagopyrum* Gært. 235, 173.

*emarginatum* Gært. 174.

*esculentum* Gært. 173.

*Fagus* L. 497, 186.

*silvatica* L. 186.

*Falcaria* Host. 176, 83.

*Rivini* Host. 83.

*Farsetia* R.Br. 361, 108.

*incana* Br. 108.

*Fedia dasycarpa* Stev. 37.

*mixta* Wg. 37.

*olitioria* Vahl. 37.

*Festuca* L. 53, 259.

*arenaria* Osb. 259.

*arundinacea* Schreb. 259.

*arundinacea* Lilj. 267.

*aspera* MK. 261.

*borealis* MK. 267.

*bromoides* L. 260.

*decumbens* L. 267.

*donacina* Wg. 267.

*dumetorum* L. 260.

*duriuscula* Fr. 259.

*elatior* L. 259.

*elatior* E.B. 259.

*erecta* Wallr. 260.

*fluitans* L. 265.

*gigantea* Vill. 259.

*glauca* Fr. 260.

*heterophylla* Hænke. 260.

*inermis* DC. 260.

*litorea* Wg. 259.

*loliacea* Huds. 258, 265.

*myuros* L. 299.

*nemorum* Leys. 260.

*ovina* L. 260.

*pinnata* Schrad. 258.

*pratensis* Huds. 259.

*rubra* L. 259.

*sciuroides* Kun. 260.

*silvatica* Vill. 259.

*violacea* Gaud. 260.

*Ficaria* Hall. 305, 91.

*ranunculoides* Mönch. 92.

*Filago* L. 444, 7.

*apiculata* Sm. 7.

*arvensis* L. 7.

*arvensis* Wg. 8.

*germanica* L. 7.

*minima* Fr. 8.

*montana* L. 7.

*pyramidalis* L. 7.

*Flumina* Fr. 57, 267.

*arundinacea* Fr. 267.

*Fragearia* L. 284, 152.

*collina* Ehrh. 152.

*elatior* Ehrh. 152.

*magna* Thuill. 152.

*vesca* L. 152.

*Frangula vulgaris* Reich. 135.

**Frankeniaceæ** L. 295.

*Frankenia pulverulenta* L. 295.

*Fraxinus* L. 520, 56.

*excelsior* L. 56.

*Fritillaria* L. 200, 211.

*Meleagris* L. 211.

*montana* Hop. 298.

*Fumana procumbens* Godr. & Gren. 118.

*Fumaria* L. 389, 98.

- *bulbosa* L. 97.

*capreolata* L. 294.

*media* Lois. 98.

*micrantha* Lag. 294.

*muralis* Sond. 98.

*officinalis* L. 98.

*tenuiflora* Fr. 98.

*Vaillantii* Lois. 98.

*Wirtgeni* Koch. 98.

FUMARIACEÆ DC. 97, 294.

## G.

*Gagea* Salisb. 203, 214.

*arvensis* Schult. 214.

*lutea* Ker. 213.

*minima* Schult. 213.

*polymorpha* Schult. 213.

*spathacea* Schult. 214.

*stenopetala* Reich. 213.

*villosa* Dub. 214.

*Galanthus* L. 194, 209.

*nivalis* L. 209.

*Galatella Linosyris* Reich. 9.

*Galeobdolon* Huds. 322, 52.

*luteum* Huds. 52.

*Galeopsis* L. 320, 53.

*bifida* Bönn. 53.

- *cannabina* Roth. 53.

*Galeobdolon* L. 52.

*Ladanum* L. 53.

*pubescens* Bess. 53.

*Tetrahit* L. 53.

*versicolor* Curt. 53.

*Galium* L. 89, 38.

*Aparine* L. 39.

*austriacum* Hn. 39.

*boreale* L. 38.

*elatum* Thuill. 39.

*elongatum* Presl. 38.

*erectum* Huds. 39.

*hercynicum* Weig. 38.

*infestum* Kit. 39.

- *Mollugo* L. 39.

*murale* DC. 291.

*multicaule* Wallr. 39.

*palustre* L. 38.

*pusillum* Wg. 39.

*rotundifolium* L. 38.

*saxatile* L. 38.

*spurium* L. 39.

*suaveolens* Wg. 38.

*silvestre* Poll. 39.

*tricornis* With. 291.

*trifidum* L. 38.

*triflorum* Mich. 38.

*verum* L. 39.

*uliginosum* L. 38.

*Genista* L. 393, 166.

*anglica* L. 296.

*germanica* L. 166.

*pilosa* L. 166.

*tinctoria* L. 166.

*Gentiana* L. 116, 57.

*acaulis* L. 292.

*Amarella* L. 58.

*aurea* L. 57.

*campestris* L. 58.

- *Centaureum* L. 58.

*ciliata* Gunn. 57.

*detonsa* Rottb. 57.

*germanica* W. 292.

*glacialis* Vill. 58.

*involuta* Rottb. 57.

*Koenigii* Gunn. 58.

*lingulata* Ag. 58.

*lutea* L. Fl.Su. 57.

*nivalis* L. 57.

*Pneumonanthe* L. 57.

- *pulchella* Sw. 58.

*purpurea* L. 57.

*quinquefolia* Fl.D. 57.

*serrata* Gunn. 57.

*tenella* Rottb. 58.

*umbellata* MB. 57.

GENTIANEÆ Juss. 57, 292.

- *Geracium paludosum* Reich. 17.

- *praemorsum* Reich. 18.

*Geranium* L. 383, 114.

*bohemicum* L. 115.

- *cicutarium* L. 116.

*columbinum* L. 116.

*dissectum* L. 115.

*lucidum* L. 115.

*macrorrhizum* L. 114.

*molle* L. 115.

*palustre* L. 114.

*pneum* L. 114.

*pratense* L. 114.

*purpureum* Willd. 115.

- *pusillum* L. 115.

*pyrenaicum* L. 115.

*Robertianum* L. 115.

*rotundifolium* L. Fl.Su. 115.

*sanguineum* L. 114.

- silvaticum L. 114.  
*umbrosum* Kit. 115.  
 viscidulum Fr. 295.  
*Geum* L. 287, 155.  
   *hirtum* Wahlb. 155.  
   *hispidum* Fr. 155.  
   *hybridum* Wulf. 155.  
   *intermedium* Ehrh. 155.  
   *rivale* L. 155.  
   *urbanum* L. 155.  
*Gifola germanica* Cass. 7.  
*Gilthago segetum* Ledeb. 124.  
*Glaucium* Scop. 290, 97.  
   *luteum* Scop. 97.  
*Glaux* L. 96, 71.  
   *maritima* L. 71.  
*Glechoma* L. 314, 50.  
   *hederacea* L. 50.  
*Globularia* L. 77, 73.  
   *spinosa* Lam. 73.  
   *suecica* Nym. 73.  
   *Willkommii* Nym. 73.  
   *vulgaris* L. 73.  
 GLOBULARIÆ DC. 73.  
*Glyceria* R.Br. 62, 265.  
   *algida* Hn. 266.  
   *aquatica* Wahlb. 265.  
   *aquatica* Presl. 266.  
   *conferta* Fr. 266.  
   *distans* Wg. 266.  
   *festuciformis* Heynh. 265.  
   *fluitans* Br. 265.  
   *loliacea* Godr. 265.  
   *maritima* Wg. 265.  
   *norvegica* Somf. 265.  
   *pendulina* Læst. 264.  
   *plicata* Fr. 265.  
   *remota* Fr. 265.  
   *spectabilis* MK. 265.  
*Gnaphalium* L. 442, 6.  
   *alpinum* Fl.D. 7.  
   *alpinum* L. 7.  
   *arenarium* L. 6.  
   *carpathicum* Wg. 7.  
   *dioicum* L. 7.  
   *fuscum* W. 7.  
   *germanicum* W. 7.  
   *hyperboreum* Don. 7.  
   *luteo-album* L. 6.  
   *montanum* Fl.D. 8.  
   *norvegicum* Gunn. 7.  
   *nudum* Hoffm. 6.  
   *pillulare* Wg. 6.  
   *procumbens* L. Herb. 7.  
   *supinum* L. 6.  
   *silvaticum* L. 7.  
   *uliginosum* L. 6.

- Goodyera* R. Br. 475, 205.  
   *repens* Br. 205.  
 GRAMINEÆ Juss. 255, 299.  
 GRUINALES L. 114, 295.  
*Gymnadenia* Br. 462, 203.  
   *albida* Rich. 203.  
   *Conopsea* Br. 203.  
   *odoratissima* Br. 203.  
*Gypsophila* L. 253, 124.  
   *arenaria* Kit. 125.  
   *fastigiata* L. 124.  
   *muralis* L. 125.  
   *serotina* Hayne 125.

## H.

- *Habenaria alba* Br. 204.  
 — *viridis* Br. 204.  
*Halianthus* Fr. 256, 129.  
 — *peploides* Fr. 129.  
*Halimus* Wallr. 519, 183.  
   *pedunculatus* Wallr. 183.  
   *portulacoides* Wallr. 297.  
 HALORAGÆ Br. 142.  
*Haloscias* Fr. 174, 81.  
   *scoticum* Fr. 81.  
*Hedera* L. 136, 77.  
   *Helix* L. 77.  
 — *Hedysarum Onobrychis* L. 161.  
 — *Heleocharis* R.Br. 23, 233.  
   *acicularis* Br. 233.  
   *multicaulis* Lindl. 233.  
   *ovata* Br. 298.  
   *palustris* Br. 233.  
   *uniglumis* Lk. 233.  
 — *Heleogiton fluitans* Lk. 233.  
*Helianthemum* Juss. 293, 118.  
   *Fumana* Mill. 118.  
   *obcurum* Pers. 118.  
   *olandicum* Pers. 118.  
   *vulgare* Gärtn. 118.  
*Helichrysum* Gärtn. 441, 6.  
   *arenarium* DC. 6.  
*Helleborus viridis* L. 293.  
*Helminthia echioides* Gärtn. 91.  
*Helosciadium* Koch. 170, 83.  
   *inundatum* Koch. 83.  
 — *Hepatica triloba* DC. 94.  
*Heracleum* L. 153, 79.  
   *angustifolium* L. 79.  
 — *australe* Hn. 79.

- sibiricum* L. 79.  
 — *Sphondylium* L. och Fr. 79.  
*suecicum* Fr. 79.  
*Herninium* L. 468, 205.  
*alpinum* Sw. 205.  
*Monorchis* Br. 205.  
*Herniaria* L. 139, 173.  
*glabra* L. 173.  
*Hesperis* L. 364, 100.  
*matronalis* L. 100.  
*inodora* L. 100.  
*Heterotrichum alpinum* Link. 12.  
*Hieracium* L. 422, 18.  
 — *æstivum* Fr. 34.  
*alpinum* L. 23.  
 — *anfractum* Fr. 29.  
*argenteum* Fr. 26.  
*atratum* Fr. 24.  
*aurantiacum* L. 21.  
*auratum* Fr. 34.  
*Auricula* L. 19.  
 — *auriculæforme* Fr. 19.  
 — *bifidum* Kit. 28.  
*bifidum* Koch. 25.  
*bifurcum* MB. 19.  
*Blyttianum* Fr. 20.  
*boreale* Fr. 30, 33.  
*cæsius* Fr. 27.  
 — *canescens* Schleich. ? 25.  
*cernuum* Fr. 19.  
*commutatum* Lindeb. 24.  
*corymbosum* Fr. 33.  
*crocatum* Fr. 33.  
*cymosum* L. 22.  
*decolorans* Fr. 20.  
*diaphanum* Fr. 28.  
*dovreense* Fr. 31.  
 — *dubium* L. 22.  
*elatum* Fr. 32.  
*eximium* Backh. 23.  
*fasciculare* Fr. 27.  
*filiforme* Lindeb. 31.  
*flammeum* Fr. 20.  
*floribundum* Fr. Hn. 20.  
 — *floribundum* Wimm. 19.  
 — *Friesii* Hn. 30.  
*fuliginosum* Læst. 23.  
*furcatum* Hn. 19.  
*fuscum* Fr. 20.  
*glaucellum* Lindeb. 27.  
 — *glomeratum* Fr. 22.  
 — *gothicum* Fr. 30.  
*hyperboreum* Fr. 21.  
*lævigatum* Fr. 30.  
*lapponicum* Fr. 29.  
*Leontodontis* L. Faun. 34.  
*lingulatum* Backh. 25.  
*macranthum* Lindeb. 29.  
*melanocephalum* Fr. 23.  
*murorum* L. 26.  
 — *Nestleri* Vill. 23.  
*nigrescens* Fr. 24.  
*nigrescens* W. 24.  
*norvegicum* Fr. 29.  
*onosmoides* Fr. 26.  
*Oreades* Fr. 26.  
*pallidum* Biv. 25.  
 — *paludosum* L. 17.  
*personatum* Fr. 24.  
*Pilosella* L. 18.  
*plumbicum* Fr. 28.  
*præaltum* Vill. 21.  
*prælongum* Lindeb. 32.  
 — *præmorsum* L. 18.  
*pratense* Tausch. 19.  
*prenanthoides* Vill. 32.  
*protractum* Fr. 31.  
*ramosum* Kit. 34.  
*rhæticum* Fr. 23.  
 — *rigidum* Hn. 30.  
*rigidum* Fr. 30.  
*rupicolum* Fr. 25.  
*sabaudum* L. 33.  
*saxifragum* Fr. 26.  
*Schmidtii* Tausch. 25.  
 — *setigerum* Fr. 23.  
*setigerum* Tausch. 23.  
*sparsifolium* Lindeb. 33.  
*stellatum* Lindeb. 20.  
*stoloniflorum* Kit. 19.  
*strictum* Fr. 32.  
 — *subcæsius* Fr. 28.  
*subpræaltum* Lindeb. 22.  
*sudeticum* Sternb. 24.  
*suecicum* Fr. Hn. 20.  
*Taraxaci* L. 34.  
*tridentatum* Fr. 30.  
*truncatum* Lindeb. 31.  
*umbellatum* L. 33.  
*vulgatum* Fr. 28.  
*Hierochloa* L. G. Gmel. 41, 277.  
*alpina* R.S. 277.  
*australis* R.S. 299.  
*borealis* R.S. 277.  
*fragrans* R.S. 277.  
 — *odorata* Wg. 277.  
*setifolia* Hn. 300.  
*Hippoglossum maritimum* Hn. 46.  
 • *Hippophaë* L. 507, 180.  
*rhamnoides* L. 180.  
*Hippuris* L. 2, 143.  
 • *vulgaris* L. 143.  
*Holcus* L. 44, 270.  
*alpinus* Sv.B. 277.  
*atropurpureus* Wg. 270.  
*lanatus* L. 270.  
*mollis* L. 270.  
 — *odoratus* L. 277.

- Holosteum L. 76, 128.  
   umbellatum L. 128.  
   *sperguloides* Lehm. 132.  
 — *Honkenya peploides* Ehrh. 129.  
 Hordeum L. 69, 257.  
   distichon L. 299.  
   *maritimum* With. 257, 299.  
   murinum L. 257.  
   polystichon Döll. 299.  
   pratense Huds. 257.  
   *secalinum* Schreb. 257.  
 Hottonia L. 112, 72.  
   palustris L. 72.  
 Humulus L. 508, 181.  
   Lupulus L. 181.  
 Hutchinsia R.Br. 353, 107.  
   petræa Br. 107.  
 — *Hyacinthus botryoides* L. 214.  
 HYDROCHARIDEE Juss. 209, 298.  
 Hydrocharis L. 514, 209.  
   morsus ranæ L. 209.  
 Hydrocotyle L. 150, 84.  
   vulgaris L. 84.  
 Hymenophyllum Sm. 538, 283.  
   *tunbridgense* F.L.D. 283.  
   Wilsonii Hook. 283.  
 Hyoscyamus L. 121, 59.  
   niger L. 59.  
*Hyoseris minima* L. 35.  
 HYPERICINEE DC. 117.  
 Hypericum L. 412, 117.  
   *dubium* Willd. Sm. 117.  
   hirsutum L. 117.  
   humifusum L. 117.  
   montanum L. 117.  
   perforatum L. 117.  
   pulchrum L. 117.  
   quadrangulum L. 117.  
   *quadrangulum* Sm. 117.  
   *quadrialatum* Wg. 117.  
   tetrapterum Fr. 117.  
 Hypochaeris L. 414, 34.  
   glabra L. 35.  
   maculata L. 34.  
   radicata L. 35.  
*Hypopitys glabra* Bernh. 171.  
   *multiflora* Scop. 171.  
  
**L. J.**  
 Jasione L. 130, 43.  
   montana L. 43.  
   perennis Fr. 43.  
 — *Iberis nudicaulis* L. 107.  
   *petræa* Wg. 107.  
 Ilex L. 91, 76.  
   Aquifolium L. 76.  
 Impatiens L. 134, 111.  
   Noli tangere L. 111.  
 Imperatoria L. 159, 80.  
   Ostruthium L. 80.  
*Intybus multicaulis* Fr. 18.  
 — *præmorsa* Fr. 18.  
 Inula L. 451, 8.  
   Britannica L. 8.  
   Conyza DC. 8.  
   ensifolia L. 8.  
   Helenium L. 8.  
   *Pulicaria* L. 8.  
   salicina L. 8.  
 IRIDEÆ Juss. 208, 297.  
 Iris L. 15, 208.  
   Pseudacorus L. 208.  
   sibirica L. 208.  
   squalens L. 297.  
 Isatis L. 348, 105.  
   tinctoria L. 105.  
 Isnardia palustris L. 295.  
 ISOETEE Rich. 287.  
 Isoetes L. 524, 287.  
   *atrovirens* Th. Fr. 287.  
   echinospora Dur. 287..  
   lacustris L. Dur. 287.  
*Isolepis setaceus* Br. 233.  
 JUNCACEÆ DC. 217, 298.  
 Juncus L. 211, 217.  
 — *acutiflorus* Ehrh. 219.  
   *alpestris* Hn. 219.  
   alpinus Vill. 219.  
   arcticus W. 218.  
   articulatus L. 219.  
 — *atratu*s Fr. 219.  
   balticus W. 218.  
   biglumis L. 221.  
 — *boltnicus* Wg. 220.  
   bufonius L. 220.  
   *bulbosus* L. 220.  
 — *campestris* L. 222.  
   capitatus Weig. 220.  
   castaneus Sm. 220.  
   compressus Jacq. 220.  
   conglomeratus L. 217.  
   diffusus Hop. 218.  
 — *effusus* L. 218.  
   filiformis L. 218.  
   Gerardi Lois. 220.  
   glaucus Ehrh. 218.  
   *glaucus* Wg. 218.

*Hostii* Tausch. 220.  
*inflexus* Retz. 218.  
*insularis* Reich. 220.  
 — *lamprocarpus* Ehrh. 219.  
*maritimus* Lam. 218.  
*nigritellus* Koch. 219.  
 — *nodulosus* Wg. 219.  
*obtusiflorus* Ehrh. 219.  
 — *pilosus* L. 221.  
*pygmaeus* Thuill. 220.  
 — *silvaticus* L. 219.  
 — *spicatus* L. 222.  
*squarrosus* L. 220.  
*stygius* L. 221.  
*subuliflorus* Dr. 218.  
*subverticillatus* Wulf. 219.  
*supinus* Mönch. 219.  
*Tenageja* Ehrh. 298.  
*trifidus* L. 220.  
*triglumis* L. 221.  
*uliginosus* Roth. 219.  
*ustulatus* Hoppe. 219.  
*Juniperus* L. 515, 198.  
*communis* L. 198.  
*nana* Willd. 198.

**K.**

*Knautia arvensis* Coult. 35.  
*Kobresia* Willd. 483, 254.  
*caricina* W. 254.  
*scirpina* W. 254.  
*Kochia* Roth. 143, 184.  
*hirsuta* Nolte 184.  
*Koeleria* Pers. 58, 267.  
*cristata* P. 299.  
*glauca* DC. 267.  
*intermedia* Ablqu. 267.  
*Koenigia* L. 74, 178.  
*islandica* L. 178.

**L.**

**LABIATÆ** Juss. 47, 291.  
*Lactuca* L. 419, 16.  
*murialis* Don. 16.  
*quercina* L. 290.  
*Scariola* L. 16.  
*virosa* Liljebl. 16.  
*Lælia orientalis* Reich. 105.  
*Lamium* L. 323, 52.  
*album* L. 52.

*amplexicaule* L. 52.  
*confertum* Fr. 52.  
 — *incisum* W. 52.  
*intermedium* Fr. 52.  
*maculatum* L. 292.  
*purpureum* L. 52.

*Lappa* Adans. 428, 14.  
*intermedia* Lange. 15.  
*major* Gärtn. 14.  
*minor* DC. 14.  
*officinalis* Wallr. 14.  
*tomentosa* Lam. 14.

*Lapsana* L. 425, 16.  
*communis* L. 16.  
*pusilla* Willd. 35.

*Larrea aquatica* DC. 125.

*Larix europæa* DC. 198.

*Laserpitium* L. 152, 79.  
*latifolium* L. 79.

— *Lastrea cristata* Presl. 279.  
*Filix mas* Roth. 279.  
*Oreopteris* Roth. 279.  
*rigida* Presl. 280.  
*spinulosa* Presl. 279.  
*Thelypteris* Presl. 279.

*Lathræa* L. 332, 68.  
*Squamaria* L. 68.

*Lathyrus* L. 403, 157.  
*Aphaca* L. 296.  
*heterophyllus* L. 157.  
*latifolius* L. 157.  
*macrorrhizus* Wimm. 158.  
*maritimus* Big. 158.  
*niger* Wimm. 158.  
*palustris* L. 157.  
*platyphyllus* Retz. 157.  
*pratensis* L. 158.  
*silvestris* L. 157.  
*tuberosus* L. 157.  
*vernus* Wimm. 158.

*Lavatera* L. 386, 112.  
*thuringiaca* L. 112.

*Ledum* L. 245, 170.  
*grönlandicum* Retz. 170.  
*palustre* L. 170.

*Leersia oryzoides* Sw. 299.  
*Lejogyne aizoides* Don. 136.  
*Hirculus* Don 136.

*Lemna* L. 4, 233.  
*gibba* L. 223.  
*minor* L. 224.  
*polyrhiza* L. 223.  
*trisulca* L. 224.

*Lens esculenta* Mönch. 166.

**LENTIBULARIÆ** Reich. 69.

- Leontodon* L. 416, 34.  
*autumnalis* L. 34.  
*autumnalis* Fl.D. 17.  
 — *hastilis* L. 34.  
*hispidus* L. 34.  
*lividus* Kit. 34.  
*salinus* Poll. 34.  
 — *Taraxacum* L. 34.  
*Leonurus* L. 321, 51.  
*Cardiaca* L. 51.  
*Galeobdolon* W. 52.  
*Lepidium* L. 354, 106.  
*campestre* Br. 106.  
*didymum* L. 107.  
*Draba* L. 106.  
*latifolium* L. 106.  
 — *petraeum* L. 107.  
*ruderales* L. 106.  
*virginicum* L. 294.  
*Lepigonum* Fr. 258, 132.  
 — *caninum* Lem. 132.  
*fasciculare* Lonn. 133.  
*leiospermum* Kindb. 132.  
 — *marginatum* Koch. 133.  
*marinum* Wahlb. 133.  
*medium* Fr. 132.  
*medium* Wahlb. 132.  
*neglectum* Kindb. 132.  
*rubrum* Fr. 132.  
*salinum* Fr. 132.  
*salinum* Hn. 132.  
*salinum* Kindb. 132.  
*sperguloides* Lehm. 132.  
*Lepturus* R.Br. 68, 257.  
*filiformis* Trin. 257.  
*incurvatus* Trin. 257.  
 — *Leucanthemum Parthenium* Godr. & Gren. 2.  
 — *vulgare* Lam. 2.  
*Leucojum* L. 195, 209.  
*vernum* L. 209.  
*Levisticum* L. 157, 79.  
*officinale* Koch. 79.  
*paludapifolium* Reich. 79.  
*Libanotis* Crantz. 179, 81.  
*montana* All. 81.  
*Ligusticum austriacum* L. 77.  
 — *Levisticum* L. 79.  
*scolicum* L. 81.  
*Ligustrum* L. 6, 56.  
*vulgare* L. 56.  
**LILIACEÆ** Juss. 211, 298.  
*Lilium* L. 199, 211.  
*bulbiferum* L. 211.  
*Martagon* L. 211.  
*Limnochloa alpina* Dr. 234.  
*caespitosa* Reich. 234.  
*parvula* Reich. 233.  
*pauciflora* Reich. 233.  
*Limosella* L. 341, 65.  
*aquatica* L. 65.  
*borealis* Less. 65.  
*Linaria* Mill. 342, 61.  
*Cymbalaria* W. 292.  
*Elatine* Desf. 62.  
*minor* Mill. 62.  
*spuria* W. 292.  
*striata* DC. 62.  
*supina* Desf. 62.  
*vulgaris* Mill. 61.  
*Linnaea* L. 345, 40.  
*borealis* L. 40.  
*Linosyris* Cass. 436, 10.  
*vulgaris* Less. 10.  
*Linum* L. 381, 116.  
*catbarticum* L. 116.  
 — *Radiola* L. 116.  
*usitatissimum* L. 295.  
*Listera* R.Br. 473, 206.  
*cordata* Br. 206.  
*ovata* Br. 206.  
*Lithospermum* L. 99, 46.  
*arvense* L. 46.  
*maritimum* Lehm. 46.  
*officinale* L. 46.  
*Litorella* L. 488, 74.  
*lacustris* L. 74.  
*Lobelia* L. 131, 43.  
*Dortmanna* L. 43.  
**LOBELIACEÆ** Juss. 43.  
*Loiseleuria procumbens* Desv. 169.  
*Lolium* L. 71, 257.  
 — *arvense* With. 258.  
 — *arvense* Schrad. 258.  
*festucaceum* Lk. 258.  
*Linicola* Sond. 258.  
*multiflorum* Lam. 299.  
*perenne* L. 258.  
*temulentum* L. 257.  
*Lonicera* L. 132, 40.  
*coerulea* L. 40.  
*Periclymenum* L. 40.  
*Xylosteum* L. 40.  
**LORANTHACEÆ** Don. 39.  
*Lotus* L. 410, 162.  
*corniculatus* L. 163.  
 — *major* Sm. 163.  
*maritimus* L. 162.  
*siliquosus* L. 162.

- tenuifolius* Reich. 163.  
*tenuis* Kit. 163.  
*uliginosus* Schk. 162.  
*Ludwigia nitida* Spreng. 295.  
*Lunaria* L. 363, 107.  
   *annua* L. 294.  
   *rediviva* L. 107.  
*Luzula* DC. 212, 221.  
   *arctica* Bl. 222.  
   *arcuata* Wg. 222.  
   *borealis* Fr. 222.  
   *campestris* DC. 222.  
   *confusa* Lindeb. 222.  
   *conglomerata* Mielichh. 222.  
   *glabrata* Fr. 222.  
   *glabrata* Hop. 221.  
   *hyperborea* Br. 222.  
   *maxima* Desv. 221.  
   *multiflora* Lej. 222.  
   *nivalis* Spreng. Beurl. 222.  
   *parviflora* Desv. 221.  
   *pilosa* W. 221.  
   *silvatica* Gaud. 221.  
   *spadicea* DC. 222.  
   *spicata* DC. 222.  
   *Wahlenbergii* Rupr. 221.  
   — *vernalis* DC. 221.  
*Lychnis* L. 264, 123.  
   *affinis* J. Vahl. 123.  
   *alpina* L. 123.  
   *apetala* L. 123.  
   — *dioica* L. 123.  
   *Flos Cuculi* L. 123.  
   — *Githago* Koch. 124.  
   — *pratensis* Schk. 123.  
   — *silvestris* Schk. 123.  
   *triflora* Fl.D. 123.  
   — *vespertina* Sibth. 123.  
   — *Viscaria* L. 123.  
*Lycium* L. 122, 58.  
   *barbarum* L. 58.  
 LYCOPODIACEÆ Sw. 288.  
*Lycopodium* L. 525, 288.  
   *alpinum* L. 288.  
   *annotinum* L. 288.  
   *Chamæcyparissus* Al. Br. 288.  
   *clavatum* L. 288.  
   *complanatum* L. 288.  
   *inundatum* L. 288.  
   — *sabinsifolium* Rupr. 288.  
   — *selaginoides* L. 289.  
   *Selago* L. 288.  
*Lycopsis* L. 106, 45.  
   — *arvensis* L. 45.  
*Lycopus* L. 10, 49.  
   *europæus* L. 49.

- Lysimachiu* L. 110, 70.  
   *nemorum* L. 70.  
   *Numularia* L. 70.  
   *thyrsiflora* L. 71.  
   *vulgaris* L. 70.  
 LYTHRARIÆ Juss. 140.  
*Lythrum* L. 271, 140.  
   *Salicaria* L. 140.

## M.

- Majanthemum* Web. 86, 215.  
   *bifolium* DC. 215.  
   — *Convallaria* Web. 215.  
   *stellatum* Link. 215.  
*Malachium* Fr. 265, 125.  
   *aquaticum* Fr. 125.  
*Malaxis* Sw. 476, 207.  
   *Loeselii* Sw. 207.  
   *monophyllos* Sw. 207.  
   *paludosa* Sw. 207.  
*Malva* L. 387, 113.  
   *Alcea* L. 113.  
   *borealis* Wallm. 113.  
   *fastigiata* Cav. 113.  
   *litoralis* Deth. 294.  
   *moschata* L. 113.  
   — *rotundifolia* L. 113.  
   *silvestris* L. 113.  
   *vulgaris* Fr. 113.  
 MALVACEÆ Juss. 112, 294.  
*Marrubium* L. 324, 53.  
   *vulgare* L. 53.  
 MARSILEACEÆ R. Br. 287.  
*Marula foetida* Cass. 3.  
*Matricaria* L. 458, 2.  
   *Chamomilla* L. 2.  
   *discoidea* DC. 2.  
   *inodora* L. 2.  
   *maritima* L. 2.  
   — *Parthenium* L. 2.  
   *suaveolens* L. 2.  
*Medicago* L. 409, 163.  
   *apiculata* W. 296.  
   *denticulata* W. 296.  
   *falcata* L. 163.  
   *lupulina* L. 163.  
   *media* Pers. 163.  
   *minima* Lam. 163.  
   *polymorpha* L. 163.  
   *sativa* L. 163.  
   *silvestris* Fr. 163.



**Melampyrum** L. 337, 67.

- arvense L. 68.
- cristatum L. 67.
- nemorosum L. 68.
- pratense L. 68.
- silvaticum L. 68.

**Melandrium** Röhl. 262, 123.

- affine* Hn. 123..
- apetalum* Fenzl. 123.
- crassifolium* Fr. 123.
- diurnum* Fr. 123.
- *noctiflorum* Fr. 122.
- *pratense* Röhl. 123.
- *silvestre* Röhl. 123.
- vespertinum* Fr. 123.

**Melanosinapis** DC. 368, 99.

- *communis* DC. 99.

**Melica** L. 43, 270.

- ciliata* L. 270.
- *coerulea* L. 266.
- nutans* L. 270.
- uniflora* L. 270.

**Melilotus** Adans. 407, 163.

- alba* Lam. 164.
- arvensis* Wallr. 164.
- cœrulea* Lam. 296.
- dentata* Pers. 164.
- *macrorrhiza* Pers. 164.
- officinalis* L. W. 163.
- officinalis* Lam. 164.
- Petitpierreana* W. 164.
- *vulgaris* W. 164.

**Mentha** L. 310, 47.

- Agardhiana* Fr. 48.
- Agardhiana* Hn. 48.
- agrestis* Sole 49.
- arvensis* L. 48.
- aquatica* L. 48.
- gentilis* L. 48.
- hirsuta* E.B. 48.
- lapponica* Wg. 49.
- litoralis* Hn. 48.
- nemorosa* W. 48.
- nepetoides* Lej. 291.
- odorata* Fr. 48.
- *pratensis* Sole. 48.
- pubescens* W. 291.
- rubra* Fr. 48.
- sativa* L. Hn. 48.
- sativa* Fr. 48.
- silvestris* L. 47.
- villosa* Hn. 48.
- viridis* L. 48.

**MENYANTHÉE** Mart. 54.**Menyanthes** L. 115, 54.

- trifoliata* L. 54.

**Menziesia** *cœrulea* Sm. 169.**Mercurialis** L. 512, 172.

- annua* L. 172.
- Ladanum* C. Hn. 296.
- perennis* L. 172.

**Mertensia** *maritima* Don. 46.✦ **Mespilus** *Coloneaster* L. 145.**Micranthes** *hieracifolia* Don. 136.

- nivalis* Don. 136.

✦ **Microstylis** *monophyllos* Lindl. 208.**Milium** L. 32, 274.

- effusum* L. 274.

**Mimulus** *moschatus* DC. 292.✦ **Moehringia** *lateriflora* Koch. 129.

- trinervia* Koch. 129.

**Molinia** Schrank. 59, 266.

- *aquatica* Wib. 266.
- *cœrulea* Mönch. 266.
- *maxima* Hn. 265.

✦ **Moneses** *grandiflora* Salisb. 170.**Monotropa** L. 247, 171.

- hirsuta* Nolte. 171.
- Hypophegea* Wallr. 171.
- Hypopitys* L. 171.

**Montia** L. 75, 173.

- fontana* L. 173.
- minor* Gm. 173.
- reticularis* Gm. 173.

**Moricandia** *arvensis* DC. 294.**Mulgedium** Less. 421, 15.

- alpinum* Less. 15.
- sibiricum* Less. 15.

**Muscari** Mill. 198, 214.

- botryoides* Mill. 214.
- racemosum* Mill. 298.

— **Myagrum** *paniculatum* L. 105.

- sativum* L. 108.

**Muhlenbergia** *pendula* Trin. 274.**Myosotis** L. 107, 45.

- alpestris* Schmidt. 45.
- arvensis* Hoffm. 45.
- arvensis* Reich. 45.
- arvensis* β Wg. 45.
- arvensis* γ Wg. 46.
- cæspitosa* Schultz. 45.
- collina* Reich. 46.
- deflexa* Wg. 47.
- *hispida* Schlecht. 46.
- *intermedia* Lk. 45.
- *Lappula* L. 47.
- *lingulata* Schultz. 45.
- palustris* L. 45.
- *scorpioides* L. 45.
- silvatica* Hoffm. 45.
- stricta* Lk. 45.
- stricta* β Wg. 46.
- versicolor* Sm. 45.

*Myosurus* L. 193, 92.  
     *minimus* L. 92.  
*Myrica* L. 509, 197.  
     *Gale* L. 197.  
*Myricaria* Desv. 385, 172.  
     *germanica* Desv. 172.  
**MYRICEE** Reich. 197.  
*Myriophyllum* L. 492, 142.  
     *alterniflorum* DC. 143.  
     *pectinatum* DC. 142.  
     *spicatum* L. 143.  
     *squamosum* Læst. 143.  
     *verticillatum* L. 142.  
*Myrrhis* Scop. 185, 77.  
     *odorata* Scop. 77.  
*Myrtillus* Gilib. 230, 168.  
 — *nigra* Gilib. 168.  
 — *uliginosa* Drej. 168.

## N.

**NAJADEE** Lk. 210.  
*Najas* L. 503, 210.  
     *flexilis* Rostk. 210.  
     *major* Roth. 210.  
     *marina* L. 210.  
**NARCISSINEE** Juss. 209.  
*Narcissus* L. 196, 209.  
     *poeticus* L. 209.  
     *Pseudo-narcissus* L. 209.  
*Nardosmia frigida* Cass. 11.  
     *spuria* Less. 11.  
*Nardus* L. 25, 277.  
     *stricta* L. 277.  
**NARTHECIACEE** Fr. 217.  
*Narthecium Möhr.* 208, 217.  
     *ossifragum* Huds. 217.  
*Nasturtium* Br. 371, 104.  
     *amphibium* Br. 104.  
     *anceps* Wg. 104.  
     *aquaticum* Wg. 104.  
     *aquaticum* Wallr. 104.  
     *Armoracia* Fr. 104.  
     *officinale* Br. 104.  
     *palustre* DC. 105.  
     *Sisifolium* Reich. 104.  
     *silvestre* Br. 104.  
*Naumburgia Mönch.* 111, 71.  
 — *thyrsiflora* Reich. 71.  
*Nemocharis silvatica* Beurl. 232.  
*Neottia* L. 474, 206.  
 + *latifolia* Reich. 206.

*Nidus avis* Reich. 206.  
 — *repens* Sw. 205.  
*Nepeta* L. 315, 50.  
     *Cataria* L. 50.  
*Neslia* Desv. 346, 105.  
     *paniculata* Desv. 105.  
*Nigritella* Rich. 465, 204.  
     *angustifolia* Rich. 204.  
     *nigra* Reich. 204.  
*Norna borealis* Wg. 207.  
*Nuphar* Sm. 296, 86.  
     *intermedium* Led. 86.  
     *luteum* Sm. 86.  
     *minimum* Sm. 87.  
     *pumilum* DC. 86.  
*Nymphæa* L. 295, 86.  
     *alba* L. 86.  
     *biradiata* Somm. 86.  
 — *lutea* L. 86.  
**NYMPHEACEE** DC. 86.

## O.

*Odontites* Pers. 334, 65.  
     *litoralis* Fr. 65.  
     *rubra* Pers. 65.  
 + *serotina* Drej. 65.  
 + *verna* Drej. 65.  
*Oenanthe* L. 169, 81.  
 + *crocata* L.Su. 83.  
     *fistulosa* L. 81.  
     *Phellandrium* Lam. 82.  
*Oenothera* L. 233, 140.  
     *biennis* L. 140.  
*Oglifa montana* Cass. 7.  
**OLEINEE** Link. 56.  
**ONAGRARIEE** Juss. 140, 295.  
*Onobrychis* Lam. 396, 160.  
     *sativa* Gärtn. 160.  
 + *Onoclea crispa* Sw. 283.  
 + *Struthiopteris* Sw. 283.  
*Ononis* L. 394, 167.  
     *antiquorum* L. herb. 167.  
 — *arvensis* L. 167.  
     *campestris* Koch. 167.  
     *hircina* Jacq. 167.  
     *procurrens* Wallr. 167.  
 + *repens* L. 167.  
     *spinosa* L. 167.  
     *spinosa* Koch. 167.  
*Onopordon* L. 429, 12.  
     *Acanthium* L. 12.

## OPHIOGLOSSEÆ R. Br. 284.

- Ophioglossum L. 541, 285.  
*microstichum* Ach. 285.  
*vulgatum* L. 285.

## Ophtys L. 466, 204.

- alpina* L. 205.  
 + *Corallorhiza* L. 208.  
 — *cordata* L. 206.  
 + *Herminium* L. 205.  
*latifolia*? L. 208.  
*lilifolia* Gunn. 208.  
 — *Loeselii* L. 207.  
 — *monophyllos* L. 208.  
 + *muscifera* Huds. 205.  
*myodes* L. 204.  
 — *Nidus avis* L. 207.  
 — *ovata* L. 206.  
 — *paludosa* L. 208.  
*paludosa* Fl.D. 207.

Opismenus *Crus galli* Kunth. 275.

## ORCHIDEÆ Juss. 201, 297.

## Orchidium arcticum Sw. 207.

## Orchis L. 460, 201.

- *albida* Sw. 204.  
*angustifolia* Reich. 203.  
 — *angustifolia* Wimm. 202.  
*antropophora* Fl.D. 202.  
 — *bifolia* L. 204.  
*bifolia* E.B. 204.  
 — *Conopsea* L. 203.  
*cruenta* Moll. 202.  
*elata* Hn. 202.  
*incarnata* L. 202.  
*incarnata* Fr. 203.  
*incarnata* Hn. 203.  
*lapponica* Læst. 203.  
*latifolia* L. 202.  
*latifolia* Reich. 203.  
*laxiflora* Lam. 202.  
*maculata* L. 203.  
*majalis* Reich. 202.  
*mascula* L. 201.  
*militaris* L. 201.  
*Morio* L. 202.  
*nigra* Sw. 204.  
*obtusata* Pursh. 204.  
 — *odoratissima* L. 203.  
*pallens* L. 297.  
*palustris* Jacq. 202.  
*pyramidalis* L. 203.  
*Rivini* Gouan. 201.  
*sambucina* L. 202.  
 — *Traunsteineri* Saut. 203.  
*ustulata* L. 201.  
 — *viridis* Sw. 204.  
 Origanum L. 316, 49.  
*vulgare* Fl.D. 48.  
*vulgare* L. 49.

## Ornithogalum L. 201, 213.

- arvense* Pers. 214.  
 — *luteum* L. 213.  
 + *minimum* L. 214.  
*minimum*  $\beta$  Wg. 214.  
*nutans* L. 213.  
 + *stenopetalum* Fr. 213.  
*umbellatum* L. 213.

## Ornithopus L. 398, 160.

*perpusillus* L. 160.

## Orobanch L. 331, 68.

- Cirsii* Fr. 68.  
*clatior* Sutt. 68.  
*Epithymum* DC. 293.  
*major* L. 68.  
*minor* Sutt. 293.

## Orobis L. 402, 158.

- *niger* L. 158.  
 — *silvaticus* L. 159.  
 — *tuberosus* L. 158.  
 — *vernus* L. 158.

Orontium *arvense* Pers. 61.

## Osmunda L. 539, 283.

- > *crispa* L. 283.  
 — *Lunaria* L. 284.  
*regalis* L. 283.  
 — *Spicant* L. 283.  
 + *Struthiopteris* L. 283.

Othonna *palustris* L.Fl.Su. 5.

- Oxalis L. 384, 116.  
*Acetosella* L. 116.  
*corniculata* L. 295.  
*corniculata* Fl.D. 116.  
*stricta* L. 116.

## Oxycoccus Pers. 229, 168.

- microcarpus* Turcz. 168.  
 — *palustris* Pers. 168.

## Oxyria Hill. 215, 178.

- digyna* Campd. 178.  
*reniformis* Hook. 178.

## Oxytropis DC. 401, 162.

- campestris* DC. 162.  
*lapponica* Gaud. 162.  
*pilosa* DC. 162.

## P.

## Panicum L. 38, 275.

- Crus galli* L. 275.  
*glabrum* Gaud. 275.  
*millaceum* L. 299.  
*sanguinale* L. 275.  
 — *viride* L. 275.

## Papaver L. 289, 96.

- alpinum* Fr. 96.

Argemone L. 96.  
 dubium L. 96.  
 nudicaule L. 96.  
*radicatum* Rothb. 96.  
 Rhoeas L. 96.  
 somniferum L. 96.

## PAPAVERACEÆ Juss. 96.

## PAPILIONACEÆ L. 157, 296.

Parietaria L. 517, 181.  
   *diffusa* Koch. 297.  
   *erecta* Mert. 181.  
   *officinalis* L. 181.

Paris L. 237, 215.  
   *quadrifolia* L. 215.

Parnassia L. 188, 121.  
   *palustris* L. 121.

## PARONYCHIEÆ St. Hil. 173.

Pastinaca L. 155, 79.  
   *opaca* Bernh. 79.  
   *sativa* L. 79.

## Pedicularis L. 339, 67.

*flammea* L. 67.  
   *flammea* Fl.D. 67.  
   *foliosa* Gunn. 67.  
   *hirsuta* L. 67.  
   *lapponica* L. 67.  
   *Oederi* Vahl. 67.  
   *palustris* L. 67.  
   *Sceptum Carolinum* L. 67.  
   *silvatica* L. 67.  
   *versicolor* Wg. 67.  
   *virescens* Wg. 67.

Peplis L. 214, 140.

*Portula* L. 140.

† *Peristylis viridis* Lindl. 204.

## PERSONATE L. 60, 292.

Petasites Neck. 449, 10.  
   *alba* Gærtn. 10.  
   *frigida* L. 11.  
   — *officinalis* Mönch. 10.  
   *spuria* Reich. 11.  
   *vulgaris* Desf. 10.

Peucedanum L. 154, 80.  
   *Oreoselinum* Mönch. 80.  
   *palustre* Mönch. 80.  
   *selinum* Pall.? 293.  
   *Silau* L. 81.

Phaca L. 400, 161.

*alpina* L. 162.  
   *astragalina* DC. 161.  
   *campestris* Wg. 162.  
   *frigida* L. 161.  
   *lapponica* Wg. 162.  
   *minima* Less. 161.  
   *montana* Wg. 162.

*oroboides* DC. 161.

— *pilosa* Wg. 162.

*Phalaris arenaria* Huds. 277.

— *arundinacea* L. 277.

*canariensis* L. 299.

— *phleoides* L. 276.

— *Phellandrium aquaticum* L. 82.

*Hippisia algida* Br. 266.

Phleum L. 27, 276.

*alpinum* L. 276.

*arenarium* L. 277.

— *Böhmeri* Wib. 276.

*nodosum* Willd. 276.

*phalaroides* Kôl. 276.

*pratense* L. 276.

Phragmites Trin. 42, 270.

*communis* Fr. 270.

Phyllodoce Salisb. 243, 169.

*cærulea* Salisb. 169.

Phyteuma L. 129, 43.

*spicatum* L. 43.

Picridium vulgare Desf. 291.

Picris L. 417, 17.

*hieracioides* L. 17.

Pilularia L. 523, 287.

*globulifera* L. 287.

Pimpinella L. 166, 82.

*magna* L. 82.

*nigra* W. 82.

*Saxifraga* L. 82.

Pinguicula L. 8, 70.

*alpina* L. 70.

*flavescens* Flörke. 70.

*villosa* L. 70.

*vulgaris* L. 70.

Pinus L. 501, 197.

† *Abies* L. 197.

*Larix* L. 197.

*obovata* Ant. 197.

*orientalis* Ed.9. 197.

† *Picea* Parl. 197.

*silvestris* L. 197.

Pisum L. 404, 157.

*arvense* L. 157.

*maritimum* L. 158.

## PLANTAGINEÆ Juss. 73, 293.

Plantago L. 82, 73.

*arenaria* WK. 293

*Coronopus* L. 74.

*dubia* L. 73.

*lanceolata* L. 73.

*major* L. 73.

*maritima* L. 73.

*media* L. 73.

minor Fr. 73.  
*serraria* Retz. ? 74.

*Platanthera* Rich. 463, 204.  
*bifolia* Rich. 204.  
*brachyglossa* Reich. 204.  
*chlorantha* Cust. 204.  
 — *montana* Reich. 204.  
*obtusata* Lindl. 204.  
*solstitialis* Bönn. 204.  
*viridis* Reich. y. 204.

*Pleurospyrne rotata* Griseb. 292.

*Pleurospermum* Hoffm. 173, 77.  
*austriacum* Hoffm. 77.

**PLUMBAGINEÆ** Juss. 74.

*Poa* L. 65, 262.  
*alpina* L. 264.  
*angustifolia* L. herb. 262.  
*angustifolia* Wg. 263.  
*annua* L. 264.  
 — *aquatica* L. 265.  
*arctica* Br. 262.  
*arenaria* Retz. 266.  
*aspera* Gaud. 264.  
*badensis* Gmel. 264.  
*Balfourii* Parn. 264.  
*bulbosa* L. 263.  
*cenisia* All. 262.  
*coesia* Sm. 264.  
*compressa* L. 263.  
*conferta* Bl. 264.  
 — *decumbens* Schrad. 267.  
*dissitiflora* RS. 262.  
 — *distans* L. 266.  
*fertilis* Host. 263.  
*glauca* Vahl. 264.  
*Langeana* Bl. 263.  
*laxa* Hænke 264.  
 — *maritima* Huds. 266.  
*memoralis* L. 263.  
*pratensis* L. 262.  
 ✧ *remota* af Fors. 265.  
*salina* Poll. 266.  
*serotina* Ehrh. 263.  
*stricta* Lindeb. 264.  
*sudetica* Hænke 263.  
*trivialis* L. 263.

**POLEMONIACEÆ** Juss. 54.

*Polemonium* L. 124, 54.  
*campanulatum* Th. Fr. 54.  
*cæruleum* L. 54.  
*pulchellum* Bunge. 55.

*Polygala* L. 391, 110.  
 — *amara* L. 111.  
*comosa* Schk. 111.  
*depressa* Wend. 110.  
*uliginosa* Reich. 111.  
*vulgaris* L. 110.

**POLYGALÆÆ** Juss. 110.

✧ *Polygonatum multiflorum* All. 215.  
*officinale* All. 214.  
*verticillatum* All. 214.

**POLYGONEÆ** Juss. 173, 296.

*Polygonum* L. 236, 174.  
*amphibium* L. 174.  
*aviculare* L. 175.  
 — *biforme* Wg. 174.  
*Bistorta* L. 174.  
*Convolvulus* L. 175.  
*dumetorum* L. 175.  
*Fagopyrum* L. 174.  
*Hydropiper* L. 175.  
*incanum* Schmidt. 174.  
*lapathifolium* L. 174.  
 — *laxiflorum* Weihe. 175.  
 — *minus* Huds. 174.  
*mite* Schr. 174.  
*nodosum* Pers. 174.  
*Persicaria* L. 174.  
*Raji* Bab. 175.  
*Robertii* Lois. 175.  
*tataricum* L. 174.  
*viviparum* L. 174.

**POLYPODIACEÆ** R. Br. 278.

*Polypodium* L. 527, 278.  
*alpestre* Hop. 278.  
 — *calcareum* Sm. 278.  
*Callipteris* Ehrh. 279.  
*Dryopteris* L. 278.  
 — *Filix femina* L. 281.  
 — *fragile* L. 280.  
 — *ilvense* Sw. 280.  
*molle* Schreb. 281.  
*montanum* Sv.B. 280.  
*Phegopteris* L. 278.  
*rhæticum* L. Fr. 278.  
*Robertianum* Hoffm. 278.  
*vulgare* L. 278.

— *Polystichum* Roth. 529, 279.

*angulare* Presl. 279.  
 ✧ *cristatum* Roth. 279.  
 ✧ *Filix mas* Roth. 279.  
*Lonchitis* Roth. 279.  
*Oreopteris* DC. 279.  
 ✧ *rigidum* DC. 280.  
*spinulosum* DC. 279.  
*Thelypteris* Roth. 279.

**POMACEÆ** L. 144.

*Populus* L. 510, 187.  
*alba* L. 187.  
*alba* W. 187.  
*balsamifera* L. 187.  
*canescens* Sm. 187.  
*dilatata* Ait. 187.  
*hybrida* MB. 187.  
*monilifera* Ait. 187.  
*nigra* L. 187.

*nivea* W. 187.  
*pyramidalis* Roz. 187.  
*tremula* L. 187.  
*villosa* Lang. 187.

# PORTULACACEÆ Juss. 173.

*Potamogeton* L. 94, 224.  
*acutifolius* Lk. 226.  
*coloratus* Vahl. 225.  
 ✧ *compressus* L. 227.  
*compressus* Wg. 227.  
*compressus* Hn. 227.  
*compressus* Fr. 226.  
*crispus* L. 226.  
*curvifolius* Hn. 225.  
*decipiens* Nolte. 226.  
*fluitans* Roth. 224.  
*fluitans* Sm. 225.  
 — *Friesii* Rupr. 227.  
*gracilis* Fr. 227.  
*gramineus* L. 225.  
*gramineus* Wg. 225.  
*gramineus* Sm. 227.  
*heterophyllus* Schreb. 225.  
*lanceolatus* Reich. 225.  
*lanceolatus* Sm. 225.  
 — *laticaulis* Wg. 226.  
*lucens* L. 225.  
*marinus* L. 228.  
*mucronatus* Schrad. 227.  
*natans* L. 224.  
*nigrescens* Fr. 225.  
*nitens* Web. 225.  
 — *oblongus* Viv. 225.  
*obtusifolius* MK. 227.  
*Oederi* Mey. Beurl. 227.  
*pectinatus* L. 227.  
*perfoliatus* L. 226.  
*plantagineus* Ducroz. 225.  
*polygonifolius* Pourr. 224.  
*prælongus* Wulf. 226.  
*pusillus* L. 227.  
*rufescens* Schrad. 225.  
*rutilus* Wolfg. 227.  
*salicifolius* Wolfg. 225.  
*sparganifolius* Læst. 224.  
*spathulatus* Reich. 225.  
*Zizii* MK. 226.  
*zosteraceus* Fr. 227.  
 — *zosterifolius* Schum. 226.

# POTAMOGETONÆ Fr. 224.

*Potentilla* L. 285, 152.  
*alpestris* Hall. γ. 154.  
*ambigua* Gaud. 154.  
*Anserina* L. 153.  
*argentea* L. 153.  
*cinerea* Chaix. 154.  
*collina* Wib. 153.  
*collina* Lehm. Fr. 154.  
*fruticosa* L. 152.

*gelida* C. A. Mey. 154.  
*Gåntheri* Pohl. 154.  
 — *incana* Mönch. 154.  
*inclinata* Vill. 296.  
*intermedia* L. herb. och Fr. 154.  
 — *maculata* Pourr. 154.  
*mixta* Nolte. 154.  
*memoralis* Nestl. 154.  
*nivea* L. 153.  
*norvegica* L. 153.  
*opaca* L. 154.  
*pallescens* Hn. 153.  
*procumbens* Sibth. 154.  
*reptans* L. 153.  
*rupestris* L. 153.  
 — *salisburgensis* Hænk. 154.  
*Tormentilla* Scop. 154.  
*verna* L. 154.  
*Wiemannia* Günth. 154.

*Poterium* L. 494, 148.  
*dictyocarpum* Spach. 148.  
*Sanguisorba* L. 148.

# — *Prenanthes muralis* L. 16.

*Primula* L. 114, 71.  
*acualis* Jacq. 72.  
*elatior* Jacq. 71.  
*farinosa* L. 72.  
*finnmarchica* Hn. 4, 72.  
*grandiflora* Fr. 72.  
*integrifolia* Gunn. 72.  
*norvegica* Retz. 72.  
 — *officinalis* Jacq. 71.  
*scotica* Hook. 72.  
*sibirica* Jacq. 72.  
*stricta* Horn. 72.  
*silvestris* Scop. 72.  
*veris* L. 71.  
*veris* β L. 72.  
*veris* γ L. 72.  
*vulgaris* Bab. 72.

# PRIMULACEÆ L. 70.

*Prunella* L. 326, 50.  
*grandiflora* L. 50.  
*vulgaris* L. 50.

*Prunus* L. 276, 156.

— *avium* L. 156.  
*Cerasus* L. 156.  
 ✧ *domestica* L. 156.  
*insititia* L. 156.  
 — *Padus* L. 157.  
*spinosa* L. 156.

*Psamma* P.B. 30, 70.  
*arenaria* R.S. 270.  
*baltica* R.S. 271.

*Pteris* L. 534, 282.  
*aquilina* L. 282.  
*crispa* Sm. 283.

- Puccinellia distans* Parl. 266.  
*maritima* Parl. 266.  
*Pulicaria* Gärtn. 450, 8.  
*vulgaris* Gärtn. 8.  
*Pulmonaria* L. 101, 46.  
*angustifolia* L. 46.  
*asurea* Bess. 46.  
*maritima* L. 46.  
*officinalis* L. 46.  
*Pulsatilla* Mill. 301, 94.  
*Hackelii* Bot. N. 94.  
*nigricans* Störk. 94.  
*patens* Mill. 94.  
*pratensis* Mill. 94.  
*vernalis* Mill. 94.  
*Wolfgangiana* Bess. 94.  
*vulgaris* Mill. 94.  
+ *Pyrethrum inodorum* Sm. 2.  
— *Parthenium* Sm. 2.  
*Pyrola* L. 246, 170.  
*chlorantha* Sw. 170.  
*media* Sw. 170.  
*minor* L. 170.  
*rosea* Sm. 170.  
*rotundifolia* Fl.D. 170.  
*rotundifolia* L. 170.  
*secunda* L. 170.  
*umbellata* L. 171.  
*uniflora* L. 170.  
*Pyrus* L. 280, 144.  
*Aria* Sv.B. 144.  
*Aria* Willd. 144.  
*communis* L. 144.  
*Malus* L. 144.  
  
Q.  
*Quercus* L. 496, 186.  
*intermedia* Don. 186.  
*pedunculata* Ehrh. 186.  
*Robur* L. 186.  
*sessiliflora* Salisb. 186.  
  
R.  
*Radiola* Roth. 92, 116.  
*linoides* Roth. 116.  
*millegrana* Sm. 116.  
RANUNCULACEÆ Juss. 87, 293.  
*Ranunculus* L. 306, 87.  
*aconitifolius* L. 87.  
*acris* L. 89.  
*altaicus* Lax. 88.  
— *aquatilis* L. 90.  
*arvensis* L. 90.  
*auricomus* L. 88.  
*bulbosus* L. 89.  
*caespitosus* Thuill. 90.  
*cassubicus* L. 88.  
*divaricatus* Schrank. 90.  
*Drouetii* Schultz. 91.  
+ *Ficaria* L. 91.  
*Flammula* L. 87.  
*Friesii* Godr. & Gren. 89.  
*Friesii* Beurl. 91.  
*glacialis* L. 87.  
*hederaceus* L. 91.  
*hirsutus* Curt. 89.  
*hyperboreus* Roth. 88.  
*illyricus* L. 90.  
*Kochii* Beurl. 91.  
*lanuginosus* L.? 293.  
*lapponicus* L. 87.  
*Lingua* L. 87.  
*nemorosus* DC. 89.  
*nivalis* L. 88.  
*ophioglossifolius* Vill. 87.  
— *paucistamineus* Tausch. 90.  
— *pellatus* Schrank. 91.  
*Philonotis* Ehrh. 89.  
*platensifolius* Godr. 87.  
*polyanthemus* L. 89.  
*pygmaeus* Wg. 88.  
*repens* L. 89.  
*reptans* L. 87.  
*sceleratus* L. 90.  
*silvaticus* Thuill. 89.  
*Stevensi* Andr. 89.  
*sulphureus* Fr. 88.  
*tripartitus* Nolte 91.  
*Raphanistrum innocuum* Mönch. 105.  
*segetum* Reich. 105.  
*Raphanus* L. 380, 105.  
*maritimus* Sm. 294.  
*Raphanistrum* L. 105.  
*sativus* L. 294.  
*Rapistrum paniculatum* Gärtn. 105.  
*Reseda* L. 273, 85.  
*lutea* L. 293.  
*Luteola* L. 85.  
*phyteuma* L. 293.  
RESEDACEÆ DC. 85, 293.  
RHAMNEÆ R.Br. 135.  
*Rhamnus* L. 137, 135.  
*cathartica* L. 135.  
*Frangula* L. 135.  
*Rheum* L. 296.  
*digynum* Wg. 178.  
*Rhaponticum* L. 296.  
*Rhinanthus* L. 336, 66.  
*Alectrolophus* Poll. 66.

- alpinus* Baumg. 66.  
*Crista Galli* L. 66.  
*hirsutus* Lam. 66.  
 major Ehrh. 66.  
 minor Ehrh. 66.  
*Rhodiola* L. 511, 138.  
   *rosea* L. 138.  
*Rhododendrum* L. 244, 169.  
   *lapponicum* Wg. 169.  
*Rhynchospora* M. Vahl. 22, 231.  
   *alba* Vahl. 231.  
   *fusca* Vahl. 232.  
*Rhytispermum arvense* Lk. 46.  
*Ribes* L. 138, 134.  
   *alpinum* L. 135.  
   *Grossularia* L. 134.  
   *nigrum* L. 134.  
   *petraeum* Wulf. 135.  
   *rubrum* L. 135.  
**RIBESIACEÆ** Reich. 134.  
*Rochelia Lappula* Röm. 147.  
*Roripa amphibia* Bess. 104.  
   *palustris* Bess. 105.  
*Rosa* L. 282, 146.  
   *Acharii* Billb. 146.  
   *alpina* L. 148.  
   *arvensis* L. 296.  
   *canina* L. 146.  
   *carelica* Fr. 147.  
   *cinerea* Sw. 147.  
   *cinnamomea* L. 147.  
   *collina* Fr. 146.  
   *collina* Wg. 146.  
   *coriifolia* Fr. 146.  
   *crassifolia* Wallm. 147.  
   *dumetorum* Thuill. 146.  
   *Eglanteria* L. 146.  
   *foetida* FLD. 147.  
   *inermis* Mill. 148.  
   *inodora* Fr. 146.  
   *laxa* Retz. 296.  
   *majalis* Retz. 147.  
   *mollissima* Fr. 147.  
   *pimpinellifolia* L. 147.  
   *pomifera* Fr. 147.  
   *rubiginosa* L. 146.  
   *sarmentacea* Sw. 146.  
   *senticosa* Achar. 146.  
   — *spinosissima* L. & Wg. 147.  
   *spinosissima* Sm. 148.  
   *suavisolia* Lightf. 146.  
   *Swartzii* Sv.B. 146.  
   *tomentosa* Sm. 147.  
   *venosa* Sw. 146.  
   *villosa* L. 147.  
   *villosa* Ed. 9. 147.  
*Rottboellia incurvata* L. 257.

**RUBIACEÆ** Juss. 37, 291.

- Rubus* L. 283, 149.  
   *affinis* Weih. 149.  
   *arcticus* L. 152.  
   *cæsius* L. 151.  
   *castoreus* Læst. 152.  
   *Chamæmorus* L. 152.  
   *corylifolius* Sm. 151.  
   *discolor* Weih. 150.  
   *fruticosus* L. 149.  
   *glandulosus* Bell. 150.  
   *horridus* Hn. 150.  
   *idæus* L. 149.  
   *infestus* Hn. 150.  
   *nemorosus* Hay. 151.  
   — *plicatus* Weihe. 149.  
   *pruinosis* Arrh. 151.  
   *Radula* Weih. 150.  
   *saxatilis* L. 151.  
   *suberectus* Anders. 149.  
   *tæniarum* Lindeb. 150.  
   *thyrsoides* Wimm. 150.  
   *triflorus* Hook. 152.  
   *umbrosus* Weih. 150.  
   *vulgaris* Arrh. 150.  
   *Wahlbergii* Arrh. 151.  
*Rumex* L. 216, 175.  
   *Acetosa* L. 178.  
   *Acetosella* L. 178.  
   *acutus* L. 176.  
   *acutus* Sv.B. 178.  
   *acutus* Wg. 178.  
   *aquaticus* Fr. 178.  
   *aquaticus* L. herb. 177.  
   *Arisfolius* All. 178.  
   *aureus* With. 176.  
   *conglomeratus* Murr. 176.  
   *conspersus* Hn. 177.  
   *crispus* L. 177.  
   — *cristatus* Wallr. 176.  
   *digynus* L. 178.  
   — *divaricatus* Fr. 176.  
   *domesticus* Hn. 177.  
   *Friesii* Aresch. 177.  
   — *Friesii* Godr. & Gren. 176.  
   *gentilis* Lönrr. 176, 177.  
   *Hippolapathum* Fr. 177.  
   *Hydrolapathum* Huds. 178.  
   *longifolius* DC. 177.  
   *maritimus* L. 175.  
   *maximus* Schreb. 177.  
   *Nemolapathum* Ehrh. 176.  
   *Nemolapathum* Wg. Fr. 176.  
   *nemorosus* Schrad. 176.  
   *obtusifolius* L. 176.  
   *obtusifolius* Wallr. 176.  
   *palustris* Sm. 176.  
   *Patientia* L. 296.  
   *platyphyllus* F. Aresch. 177.  
   *propinquus* Aresch. 177.



- sanguineus L. 176.
- scutatus L. 178.
- *silvestris* Wallr. 176.
- Steinii Beck. 176.
- subhastatus* Lindgr. 178.
- thyrsiflorus* Fr. 178.
- thyrsoides* Desf. 178.

- Ruppia* L. 95, 228.
- brachypus* Gay. 228.
- maritima* Hn. 228.
- maritima* L. 228.
- *rostellata* Koch. 228.
- spiralis* L. herb. 228.

## S.

- Sabulina viscosa* Reich. 130.

- Sagina* L. 268, 130.
- apetala* L. v. *cæspitosa* Aresch. 131.
- apetala* Wg. 131.
- ciliata* Fr. 131.
- maritima* Don. 131.
- nivalis* Lindbl. 130.
- nodosa* Fenzl. 130.
- procumbens* L. 131.
- saxatilis* Wimm. 131.
- stricta* Fr. 131.
- subulata* Presl. 130.

- Sagittaria* L. 491, 216.
- sagittifolia* L. 216.

## SALICINEÆ 187.

- Salicornia* L. 1, 185.
- biennis* Afz. 185.
- fruticosa* Retz. 185.
- herbacea* L. 185.
- prostrata* Osb. 185.

- Salix* L. 504, 188.
- acutifolia* Horn. 189.
- acutifolia* W. 189.
- alba* L. 188.
- alpestris* Ands. 194.
- Amandæ* Ands. 190.
- ambigua* Ehrh. 191.
- amygdalina* L. 189.
- angustifolia* Ed. 9. 192.
- appendiculata* Vahl. 190.
- arbuscula* L. 194.
- arenaria* L. 190, 192.
- aurita* L. 191.
- aurora* Læst. 192.
- bicolor* Fr. 192.
- bicolor* Koch. 193.
- borealis* Fr. 193.
- canescens* Fr. 190.
- caprea* L. 191.
- chrysantha* Vahl. 190.

- cinerea* L. 191.
- cinerea* Sv. B. 191.
- cuspidata* Schultz. 188.
- daphnoides* Vill. 189.
- *depressa* L. och Ed. 9. 192.
- finnmarchica* Fr. 191.
- fragilis* L. 188.
- Friesiana* Ands. 192.
- fusca* Fr. 193.
- fusca* L. 192.
- glauca* L. 190.
- grandifolia* Ser. 191.
- Hartmaniana* Ands. 190.
- hastata* L. 193.
- herbacea* Liljebl. 194.
- herbacea* L. 194.
- hirtula* Ands. 192.
- hyperborea* Fr. 193.
- incubacea* Fr. 191.
- incubacea* L. 192.
- Læstadiana* Hn. 190.
- lanata* L. 190.
- lanceolata* Fr. 190.
- Lapponum* L. 190.
- latifolia* Forb. 193.
- laurina* Sm. 193.
- limosa* Wg. 190.
- *livida* Wg. 192.
- majalis* Wg. 193.
- malifolia* Sm. 193.
- mollissima* Ehrh. 189.
- mollissima* Sm. 190.
- myrsinites* L. 193.
- myrsinitoides* Fr. 193.
- myrtilloides* L. 192.
- myrtoides* Fr. 193.
- nigricans* Sm. 193.
- Normani* Ands. 194.
- ovata* Ser. 194.
- paludosa* Hn. 191.
- pentandra* L. 188.
- phaephylla* Ands. 190.
- phylicifolia* L. 193.
- plicata* Fr. 191.
- polaris* Wg. 194.
- punctata* Wg. 193.
- purpurea* L. 189.
- pyrenaica* \* *norv.* Fr. 194.
- repens* L. 192.
- reticulata* L. 194.
- reticuloides* Ands. 193.
- retusa* \* *sarm.* Fr. 194.
- rosmarinifolia* L. 192.
- rubra* Huds. 189.
- rugulosa* Ands. 191.
- sarmentacea* Fr. 194.
- silesiaca* Fr. 193.
- Smithiana* W. 189.
- Sommerfeltii* Ands. 194.
- spathulata* W. 191.
- sphacelata* Somft. 192.

*lenitifolia* Fr. 193.  
*triandra* L. 188.  
*undulata* Ehrh. 189.  
*vagans* Ands. 191.  
*Wahlenbergii* Ands. 193.  
*versifolia* Wg. 192.  
*Wichurae* Ands. 193.  
*viminalis* L. 189.  
*viridis* Fr. 188.  
*Ångströmiana* Ands. 190.

*Salsola* L. 144, 185.  
*hirsuta* L. 184.  
*Kali* L. 185.

*Salvia* L. 11, 49.  
*pratensis* L. 49.  
*verticillata* L. 292.

*Sambucus* L. 187, 36.  
*Ebulus* L. 36.  
*nigra* L. 36.  
*racemosa* L. 291.

*Samolus* L. 127, 71.  
*Valerandi* L. 71.

*Sanguisorba* L. 84, 148.  
*officinalis* L. 148.

*Sanicula* L. 149, 83.  
*europæa* L. 83.

SANTALACEÆ Br. 179, 296.

*Saponaria* L. 252, 124.  
*officinalis* L. 124.

*Sarothamnus* Wimm. 392, 166.  
*scoparius* Koch. 166.  
*vulgaris* Wimm. 166.

*Satureja hortensis* L. 292.

— *Satyrion albidum* L. 204.  
 — *bifolium* Wg. 204.  
 — *conopseum* Wg. 203.  
 + *Epipogium* L. 207.  
*nigrum* L. 204.  
 — *odoratissimum* Wg. 203.  
 — *repens* L. 205.  
 — *viride* L. 204.

*Saussurea* DC. 434, 12.  
*alpina* DC. 12.

*Saxifraga* L. 249, 135.  
*adscendens* L. 137.  
*aizoides* L. 136.  
*Aizoon* Jacq. 136.  
*autumnalis* L. 136.  
*bulbifera* Gunn. 137.  
*cæspitosa* L. 137.  
*cernua* L. 137.  
 + *controversa* Sternb. 137.  
*Cotyledon* L. 135.  
*decipiens* Ehrh. 137.  
*granulata* L. 137.

*hieracifolia* Kit. 136.  
*Hirculus* L. 136.  
*hypnoides* Hn. 137.  
*nivalis* L. 136.  
*oppositifolia* L. 136.  
*petræa* Gunn. 137.  
*rivularis* L. 137.  
*stellaris* L. 136.  
*stricta* Chr. Sm. 136.  
*tridactylites* L. 137.  
*umbrosa* L. 295.

SAXIFRAGEÆ Juss. 135, 295.

*Scabiosa* L. 80, 36.  
 — *arvensis* L. 35.  
*Columbaria* L. 36.  
*suaveolens* Desf. 36.  
*Succisa* L. 35.

*Scandix* L. 184, 78.  
 — *Anthriscus* L. 78.  
 — *Ceræfolium* L. 78.  
 — *odorata* L. 78.  
*Pecten* L. 78.  
 — *temulenta* Wg. 78.

*Sceptrum* Rudb. 338, 66.  
 — *Carolinum* Rudb. 66.

*Schedonorus* PB. Fr. 52, 260.  
*asper* Fr. 260.  
*erectus* Fr. 260.  
*inermis* RS. 260.  
*longiflorus* Fr. 299.  
*serotinus* (Ben.) 261.  
*sterilis* Fr. 261.  
*suberectus* Fr. 260.  
*tectorum* Fr. 261.

*Scheuchzeria* L. 219, 216.  
*palustris* L. 216.

*Schmidtia subtilis* Tratt. 275.

*Schoberia* C. A. M. 142, 185.  
*maritima* Mey. 185.

*Schoenus* L. 18, 231.  
 — *albus* L. 232.  
 — *compressus* L. 232.  
*ferrugineus* L. 231.  
 — *fuscus* L. 232.  
 — *Mariæcus* L. 231.  
*nigricans* L. 231.  
 — *rufus* Huds. 232.

*Schollera Oxycoccus* Roth. 168.

*Scilla italica* L. 298.  
*verna* Huds. 298.

*Scirpus* L. 24, 232.  
*acicularis* L. 234.  
 — *Bæothryon* Ehrh. 233.  
*Bellardi* Wg. 254.  
*cæspitosus* L. 234.  
*Caricis* Hn. 232.

- carinatus* Sm. 232.  
*compressus* Pers. 232.  
*Duvallii* Hop. 232.  
*fluitans* L. 233.  
 — *glaucus* Sm. 232.  
*lacustris* L. 232.  
*maritimus* L. 232.  
*multicaulis* Sm. 233.  
*nanus* Wallr. 233.  
*palustris* L. 233.  
*parvulus* Röm. 233.  
*pauciflorus* Lightf. 233.  
*rufus* Schrad. 232.  
*setaceus* L. 233.  
*silvaticus* L. 232.  
*supinus* Sw. 233.  
*Tabernamontani* Gmel. 232.
- Scleranthus* L. 248, 173.  
*annuus* L. 173.  
*biennis* Fr. 173.  
*perennis* L. 173.  
*verticillatus* Tausch. 173.
- + *Sclerochloa Borreri* Bab. 266.  
 + *Scolochloa festuacea* Lk. 267.
- Scolopendrium* Sm. 533, 282.  
*Lingua* Sv.B. 282.  
*officinatum* Sw. 282.  
*Phyllitis* Roth. 282.  
*vulgare* Sm. 282.
- Scorzonera* L. 414, 16.  
*hispanica* L. 291.  
*humilis* L. 16.  
*plantaginea* Schleich. 17.
- Scrophularia* L. 344, 61.  
*alata* Gil. 292.  
*Ehrharti* Stev. 292.  
*nodosa* L. 61.  
*vernalis* L. 61.
- Scutellaria* L. 325, 50.  
*galericulata* L. 50.  
*hastifolia* L. 50.
- Socale cereale* L. 299.
- Sedum* L. 269, 138.  
*acre* L. 139.  
*album* L. 139.  
*anglicum* Huds. 139.  
*annuum* L. 139.  
*balticum* C. Hn. 139.  
 + *boloniense* Godr. & Gr. 139.  
*dasyphyllum* L. 295.  
*hybridum* L. 295.  
 + *maximum* Koch. 138.  
*purpurascens* Koch. 138.  
*purpureum* Fr. 138.  
 — *reflexum* Koch. 139.  
*Rhodiola* DC. 138.  
*rubens* Fl.D. 139.
- rupestre* Fl.D. 139.  
*rupestre* L. 139.  
*sexangulare* L. 139.  
*Telephium* L. 138.  
*villosum* L. 139.
- Selaginella* Spring. 526, 289.  
*spinulosa* Al. Br. 289.
- Selinum* L. 161, 80.  
*Carvifolia* L. 80.  
*Gmelini* Bray. 81.  
*lineare* Schum. 81.  
*Oreoselinum* L. 80.  
 — *palustre* L. 80.
- Sempervivum* L. 275, 138.  
*tectorum* L. 138.
- Senebiera* Poir. 349, 107.  
 + *Coronopus* Poir. 107.  
*didyma* Pers. 107.
- Senecio* L. 447, 5.  
*aquaticus* Murr. 5.  
*campestris* DC. 5.  
*crassifolius* W. 290.  
*erraticus* Bert. 5.  
*erucifolius* L. 5.  
*Jacobæa* L. 5.  
*paludosus* L. 5.  
*palustris* DC. 5.  
*saracenicus* L. 290.  
*silvaticus* L. 6.  
*tenuifolius* Retz. Jacq. 5.  
*vernalis* WK. 6.  
*viscosus* L. 6.  
*vulgaris* L. 6.
- SENTICOSE L. 146, 296.
- + *Scirpius ensifolia* Wg. 205.  
 — *grandiflora* L. 205.  
*grandiflora* Scop. 206.  
 — *Helleborine* L. 206.  
*Helleborine*  $\beta$  L. 205.  
*latifolia* Fl.D. 206.  
 — *latifolia* L. 206.  
*longifolia* L. 206.  
 — *rubra* L. 205.
- Serratula* L. 433, 12.  
*alpina* L. 12.  
 — *arvensis* L. 14.  
*tinctoria* L. 12.
- Sesleria* Scop. 66, 275.  
*coerulea* Ard. 275.
- Setaria* PB. 37, 275.  
*verticillata* PB. 299.  
*viridis* PB. 275.
- Sherardia* L. 87, 37.  
*arvensis* L. 37.
- Sibbaldia* L. 192, 155.  
*procumbens* L. 155.

- Silaua* Bess. 158, 81.  
*pratensis* Bess. 81.
- SILENACEÆ** Br. 122, 295.
- Silene* L. 254, 122.  
*acaulis* L. 122.  
*Armeria* L. 295.  
*gallica* L. 295.  
*inflata* Sm. 122.  
*infracta* Kit. 122.  
*maritima* With. 122.  
*noctiflora* L. 122.  
*nutans* L. 122.  
*rupestris* L. 122.  
*viscosa* Pers. 122.
- Sinapis* L. 378, 99.  
*alba* L. 99.  
*arvensis* Fl.D. 105.  
*arvensis* L. 99.  
*nigra* L. 99.  
*lenuifolia* Sv.B. 100.
- Sison inundatum* L. 83.
- Sisymbrium* L. 379, 100.  
*Alliaria* Koch. 101.  
*amphibium* L. 104.  
*anceps* Wg. 105.  
*arenosum* L. 103.  
*Erucastrum* Poll. 99.  
*Irio* L. 294.  
*islandicum* Fl. D. 105.  
*Loeselii* L. 100.  
*Nasturtium* L. 104. *subor.*  
*officinale* Scop. 100.  
*Sophia* L. 100.  
*supinum* L. 100.  
*silvestre* L. 104.  
*lenuifolium* L. 100.  
*Thalianum* Koch. 103.
- Sium* L. 175, 83.  
*angustifolium* L. 83.  
*Falcaria* L. 83.  
*latifolium* L. 83.  
*nodiflorum* L. 83.
- Smilacina* Desf. 205, 215.  
*stellata* Desf. 215.
- SOLANACEÆ** Juss. 58, 292.
- Solanum* L. 123, 59.  
*Dulcamara* L. 59.  
*nigrum* L. 59.  
*humile* Bernh. 59.  
*miniatum* W. 59.  
*tuberosum* L. 292.  
*villosum* Lam. 59.
- Solidago* L. 452, 10.  
*virgaurea* L. 10.
- Sonchus* L. 420, 15.  
*alpinus* L. 15.
- arvensis* L. 15.  
*asper* Vill. 15.  
*coeruleus* Sm. 15.  
*fallax* Wallr. 16.  
*oleraceus* L. 15.  
 —  $\gamma$  &  $\delta$  L. Fl.Su. 16.  
*palustris* L. 15.  
*sibiricus* L. 15.
- Sorbus* L. 279, 144.  
*ambigua* L. herb. 145.  
*Aria* Cr. 144.  
*Aucuparia* L. 145.  
*fennica* Kalm. 145.  
 — *hybrida* L. 144.  
*scandica* Fr. 144.
- Soyeria paludosa* Godr. 17.
- Sparganium* L. 486, 229.  
*affine* Schnitzl. 230.  
*angustifolium* Mich. 231.  
 — *boreale* Læst. 230.  
 — *erectum* L. 229.  
*erectum* Wg. 230.  
 — *fluitans* Fr. 230.  
*Friesii* Beurl. 230.  
*glomeratum* Læst. 230.  
*hyperboreum* Læst. 231.  
*longifolium* Turcz. 230.  
*minimum* Fr. 230.  
*natans* L. 230.  
*oligocarpon* Angstr. 230.  
*ramosum* Huds. 229.  
*simplex* Huds. 230.  
*vaginatum* Larsson. 230.
- Spartium scoparium* L. 166.
- Spathularia stellaris* Haw. 136.
- Spergella* Reich. 130.
- Spergula* L. 267, 131.  
*arvensis* L. 131.  
*arvensis* Sv.B. 132.  
*laricina* Fl.D. 130.  
*Linnei* Ledeb. 131.  
*Morisonii* Bor. 132.  
 — *nodosa* L. 130.  
 — *pentandra* L. 132.  
 — *Sagina* Sw. 131.  
*saginoides* Blytt. 131.  
*saginoides* Osb. 130.  
*saginoides* Sw. 131.  
 — *stricta* Sw. 130.  
*subulata* Sw. 130.  
*vernalis* W. 132.
- Spergularia media* Pers. Hn. 133.  
*rubra* Pers. 132.  
*salina* Presl. 132.
- Spiræa* L. 281, 155.  
*Filipendula* L. 155.  
*salicifolia* L. 155.  
*Ulmaria* L. 155.

*Spirodela polyrhiza* Schleid. 223.

*Stachys* L. 319, 51.

*alpina* L. 292.

*ambigua* Sm. 51.

*arvensis* L. 52.

*palustris* L. 52.

*palustri-silvatica* Schiede. 52.

*silvatica* L. 51.

*Statice* L. 190, 74.

*Armeria* E.B. 75.

+ *Armeria* L. 74.

*Bahusiensis* Fr. 74.

*Behen* Drej. 74.

*Limonium* L. & Hn. 74.

*maritima* Mill. 75.

*rariflora* Drej. 74.

*Staurogeton trisulcus* Schleid. 224.

*Stellaria* L. 255, 125.

*alpestris* Fr. 126.

*biflora* L. 130.

*borealis* Big. 126.

*cerastioides* L. 127.

*crassifolia* Ehrh. 126.

*Dilleniana* Mönch. 126.

*Edwardsii* Br. 126.

*Friesiana* Ser. 126.

— *glauca* With. 126.

*graminea* L. 126.

*Holostea* L. 125.

*humifusa* Rottb. 127.

— *longifolia* Fr. 126.

*longipes* Gold. 125.

*media* With. 125.

*neglecta* Weih. 125.

*nemorum* L. 125.

*palustris* Retz. 126.

*uliginosa* Murr. 126.

*Stenhammaria* Reich. 100, 46.

*maritima* Reich. 46.

*Stipa* L. 36, 274.

*pennata* L. 274.

*Stratiotes* L. 513, 209.

*aloides* L. 209.

*Streblidia ferruginea* Lk. 231.

*nigricans* Beurl. 231.

*Struthiopteris* Willd. 537, 282.

*germanica* W. 282.

*Sturmia* Reich. 477, 207.

— *Loeselii* Reich. 207.

*Subularia* L. 357, 107.

*aquatica* L. 107.

*Succisa* Mönch. 79, 35.

— *pratensis* Mönch. 35.

*Sueda hirsuta* Reich. 84.

*Swertia sulcata* L. 292.

*Symphytum* L. 104, 44.

*asperrimum* MB. 291.

*officinale* L. 44.

*orientale* L. 44.

*palens* Fr. 44.

*palens* Sibth. 44.

*uplandicum* Nym. 44.

SYNANTHEREÆ Rich. 1, 290.

*Syringa* L. 5, 56.

*vulgaris* L. 56.

## T.

TAMARISCINÆ Desf. 172.

*Tamarix germanica* L. 173.

*Tanacetum* L. 439, 3.

*boreale* Fisch. 3.

*vulgare* L. 3.

*Taraxacum* L. 418, 34.

*corniculatum* Kit. 34.

*lævigatum* Fr. 34.

*obliquum* Fr. 34.

*officinale* Web. 34.

*palustre* Sm. 34.

*Taxus* L. 516, 198.

*baccata* L. 198.

*Teesdalia* Br. 352, 107.

*nudicaulis* Br. 107.

*Telmatophace gibba* Schl. 224.

*Tetragonolobus* Roth. 411, 162.

*siliquosus* Roth. 162.

*Teucrium* L. 312, 53.

*Scordium* L. 53.

*Scorodonia* L. 53.

*Thalictrum* L. 300, 92.

*alpinum* L. 92.

*angustifolium* Jacq. 92.

*aquilegifolium* L. 92.

*collinum* Fr. H.N. 93.

*flavum* L. 92.

*flexuosum* Reich. 93.

*Friesii* Rupr. 92.

*kemense* Fr. 92.

*Kochii* Fr. 93.

*majus* Wg. 92.

*minus* L. 93.

*minus* L. Gottl. Res. 93.

— *rariflorum* Fr. 92.

*simplex* L. 93.

*strictum* \* *boreale* Nyl. 93.

*vulgatum* Schultz, Beurl. 93.

*Thesium* L. 97, 179.

*alpinum* L. 179.

*linophyllum* L. Fl.Su. 179, 296.

- Thlaspi* L. 356, 106.  
   *alpestre* L. 106.  
   *arvense* L. 106.  
   *brachypetalum* Jord. 107.  
   — *Bursa Pastoris* L. 106.  
   — *campestre* L. 106.  
   *perfoliatum* L. 106.  
   *suecicum* Fl.D. 107.  
**THYMELEÆ** Juss. 180.  
*Thymus* L. 328, 49.  
   — *Acinos* L. 50.  
   *Chamædrys* Fr. 49.  
   *Serpyllum* L. 49.  
 + *Thysseelinum palustre* Hoffm. 80.  
*Tilia* L. 294, 112.  
   — *europæa* L. 112.  
   *grandifolia* Ehrh. 112.  
   *intermedia* DC. 112.  
   *parvifolia* Ehrh. 112.  
   *platyphylla* Scop. 112.  
   *silvestris* Desf. 112.  
   *ulmifolia* Scop. 112.  
   *vulgaris* Hay. 112.  
**TILIACEÆ** Juss. 112.  
 — *Tillæa aquatica* L. 140.  
   *prostrata* Willd. 140.  
*Tofieldia* Huds. 220, 217.  
   *alpina* Sternb. 217.  
   *borealis* Wg. 217.  
   *calyculata* Wg. 217.  
   *palustris* DC. 217.  
   *palustris* Huds. 217.  
 + *Tordylium Anthriscus* L. 79.  
*Torilis* L. 180, 78.  
   *Anthriscus* Gmel. 78.  
   *infesta* Hoffm. 293.  
 — *Tormentilla erecta* L. 154.  
   *repens* L. 154.  
*Tragopogon* L. 413, 16.  
   *crocifolius* L. 16.  
   *minor* Fr. 16.  
   *porrifolius* L. 16.  
   *pratensis* L. 16.  
*Trapa natans* L. 295.  
*Trichera* Schrad. 78, 35.  
 — *arvensis* Schrad. 35.  
*Trichophorum* Pers. 20, 234.  
   — *alpinum* Pers. 234.  
   — *cæspitosum* Hn. 234.  
   *emergens* Norm. 234.  
*Trientalis* L. 223, 70.  
   *europæa* L. 70.  
*Trifolium* L. 408, 164.  
   *agrarium* Godr. & Gren. 165.  
   *agrarium* L. 164.  
   *alpestre* L. 166.  
   *arvense* L. 165.  
   *aureum* Poll. 164.  
   *campestre* Schreb. 165.  
   *filiforme* L. 165.  
   *filiforme* Raj. 165.  
   *flexuosum* Jacq. 166.  
   *fragiferum* L. 165.  
   *hybridum* L. 165.  
   *incarnatum* L. 296.  
   *medium* L. 166.  
 + *Melilotus* L. 164.  
   *minus* Smith. 165.  
   *montanum* L. 165.  
   *pratense* L. 166.  
   *procumbens* Godr. & Gren. 165.  
   *procumbens* L. 164.  
   *procumbens* Schreb. 165.  
   *repens* L. 165.  
   *spadiceum* L. 164.  
   *striatum* L. 165.  
*Triglochin* L. 218, 217.  
   *maritimum* L. 217.  
   *palustre* L. 217.  
*Trigonella ornithopodioides* DC. 296.  
*Triodia* R.Br. 56, 267.  
   *decumbens* PB. 267.  
 — *Tripleurospermum inodorum* Schç 2.  
*Trisetum* Pers. 46, 268.  
   *agrostideum* Fr. 268.  
   *flavescens* PB. 268.  
   *subspicatum* PB. 268.  
*Triticum* L. 73, 255.  
   *acutum* DC. 255.  
   *acutum* Fr. 256.  
   *affine* Hn. 256.  
   *campestre* Godr. 256.  
   *caninum* L. 256.  
   *hebestachyum* Fr. 255, 256.  
   *juncum* L. 255.  
   *laxum* Fr. 256.  
   *obtusiusculum* Lge. 256.  
   *pinnatum* Mönch. 258.  
   *pungens* Pers. 256.  
   *repens* L. 256.  
   *rigidum* Schrad. 299.  
   *strictum* Deth. 255.  
   *violaceum* Horn. 256.  
   *vulgare* Vill. 299.  
*Trollius* L. 304, 95.  
   *europæus* L. 95.  
*Tulipa* L. 202, 211.  
   *silvestris* L. 211.  
*Tunica* Scop. 250, 124.  
   — *prolifera* Scop. 124.  
 — *Turritis* L. 375, 103.

- alpina* Retz. 103.  
 — *glabra* L. 103.  
 — *hirsuta* L. 103.  
*Tussilago* L. 448, 11.  
   *alba* L. 10.  
   *Farfara* L. 11.  
   *frigida* L. 11.  
   *hybrida* L. 10.  
 + *Pelastites* L. 10.  
   *spuria* Retz. 11.  
*Typha* L. 485, 229.  
   *angustifolia* L. 229.  
   *latifolia* L. 229.  
**TYPHACEÆ** Juss. 229.

## U.

- Ulex europæus* L. 296.  
**ULMACEÆ** Ag. 180.  
*Ulmus* L. 145, 180.  
   *campestris* Sm. 180.  
   *ciliata* Ehrh. 180.  
   *effusa* W. 180.  
   *glabra* Mill. 180.  
   *major* Sm. 180.  
   *montana* Sm. 180.  
   *pedunculata* Lam. 180.  
   *suberosa* Ehrh. 180.  
**UMBELLIFERÆ** Juss. 77, 293.  
*Uncinia microglochin* Spr. 252.  
*Urtica* L. 487, 181.  
   *dioica* L. 181.  
   *urens* L. 181.

**URTICACEÆ** Juss. 181, 297.

- Utricularia* L. 9, 69.  
   *Bremii* Heer. 69.  
   *Grafiana* Koch. 69.  
   *intermedia* Hay. 69.  
   *minor* L. 69.  
   *neglecta* Lehm. 69.  
   *ochroleuca* R. Hn. 69.  
   *pulchella* Fr. 69.  
   *vulgaris* L. 69.

## V.

- Vaccinium* L. 228, 168.  
   *Myrtillus* L. 168.  
   *Oxycoccus* L. 168.  
   *uliginosum* L. 168.  
   *Vitis idæa* L. 168.

- Vahlbergella* Fr. 263, 123.  
   *affinis* Fr. 123.  
   *apetala* Fr. 123.  
*Vahlodea* Fr. 49, 269.  
   *atropurpurea* Fr. 269.  
*Valeriana* L. 13, 36.  
   *dioica* L. 36.  
 — *Locusta* L. 37.  
   *officinalis* L. 36.  
   *sambucifolia* Mik. 36.  
**VALERIANEÆ** Fr. 36, 291.  
*Valerianella* Mönch. 14, 37.  
   *dentata* Poll. 37.  
   *Morisonii* Koch. 37.  
   *olitoria* Mönch. 37.  
*Vallisneria spiralis* L. 298.  
*Vella annua* L. 294.  
*Veratrum* L. 221, 215.  
   *album* L.  $\beta$  *Lobelianum* Bernh. 215.  
*Verbascum* L. 120, 60.  
   *bracteatum* Ag. 60.  
 — *collinum* Schrad. 60.  
   *cuspidatum* Fl.D. 60.  
   *Lychnitis* L. 61.  
   *nigro-thapsiforme* Fr. 60.  
   *nigrum* L. 60.  
   *phlomoideis* L. 60.  
   *Schraderi* Koch. 60.  
   *seminigrum* Fr. 60.  
   *thapsiforme* Schrad. 60.  
   *thapso-nigrum* Schied. 60.  
   *Thapsus* L. 60.  
*Verbena* L. 309, 56.  
   *officinalis* L. 56.  
**VERBENACEÆ** Juss. 56.  
*Veronica* L. 7, 62.  
   *agrestis* Fl.D. 65.  
   *agrestis* L. 64.  
   *alpina* L. 63.  
   *Anagallis* L. 64.  
   *arguta* Bl. 62.  
   *arguta* Schrad. 292.  
   *arvensis* L. 64.  
   *australis* Schrad. 63.  
   *Beccabunga* L. 63.  
   *Buxbaumii* Ten. 65.  
   *Chamædrys* L. 63.  
   *fruticulosa* Fl.D. 63.  
   *hederifolia* L. 65.  
   *hybrida* L. 62.  
   *Linnæi* Hn. 62.  
   *longifolia* L. 62.  
   *maritima* L. 62.  
   *media* Schrad. 62.  
   *montana* L. 63.  
   *neglecta* Bl. 63.

- officinalis* L. 63.  
*opaca* Fr. 64.  
*peregrina* L. 293.  
*persica* Poir. 65.  
*polita* Fr. 65.  
*præcox* All. 293.  
*saxatilis* L. jun. 63.  
*scutellata* L. 64.  
*serpyllifolia* L. 63.  
*serrulata* Hn. 62.  
*spicata* L. 62.  
*triphyllus* L. 64.  
*verna* L. 64.  
*vulgaris* K. 62.  
**Viburnum** L. 186, 36.  
*Opulus* L. 36.  
**Vicia** L. 405, 158.  
*angustifolia* Roth. 159.  
*cassubica* Fl.D. 159.  
*cassubica* L. 159.  
*Cracca* L. 159.  
*Cracca* Sv.B. 159.  
*dumetorum* L. 158.  
*hirsuta* Fr. 160.  
*lathyroides* L. 160.  
*Orobis* DC. 159.  
*pisiformis* L. 158.  
*sativa* L. 159.  
*segetalis* Thuill. 160.  
*sepium* L. 159.  
*silvatica* L. 159.  
*tenuifolia* Roth. 159.  
*— tetrasperma* Fr. 160.  
*villosa* Roth. 159.  
**Vincetoxicum officinale** Mönch. 57.  
**Viola** L. 133, 118.  
*Allioni* Pio. 120.  
*arenaria* DC. 120.  
*arvensis* Murr. 121.  
*biflora* L. 120.  
*borealis* Weinm. 119.  
*canina* L. 120.  
*elatio* Fr. 120.  
*epipsila* Ledeb. 119.  
*fennica* Nyl. 119.  
*hirta* L. 118.  
*lactea* Fr. 120.  
*lanceifolia* Thor. 120.  
*mirabilis* L. 119.  
*montana* L. 120.  
*nemoralis* Kütz. 120.  
*odorata* L. 118.  
*palustris* L. 119.  
*persicifolia* Fr. 120.

- persicifolia* Wg. 120.  
*pratensis* MK. 120.  
*scanica* Fr. 119.  
*silvatica* Fr. 119.  
*silvestris* Reich. 120.  
*— stagnina* Kit. 120.  
*stricta* Horn. 120.  
*suecica* Fr. 119.  
*tricolor* L. 121.  
*uliginosa* Schrad. 119.  
*umbrosa* Fr. 118.  
*Wahlenbergii* Beurl. 120.  
**VIOLARIEÆ** DC. 118.  
**Viscaria** Röhl. 261, 123.  
*alpina* Fr. 123.  
*purpurea* Fr. 123.  
*— vulgaris* Röhl. 123.  
**Viscum** L. 506, 39.  
*album* L. 39.  
**Woodsia** R.Br. 531, 280.  
*glabella* Br. 280.  
*hyperborea* Br. 280.  
*ilvensis* Br. 280.  
*lapponica* Ångstr. 281.  
**Vulpia** Gm. 54, 260.  
*bromoides* Lk. 260.  
*myuros* (L.) 299.  
*myuros* var. Parl. 260.  
*sciuroides* Gm. 260.

**X.**

- Xanthium spinosum** L. 291.  
*strumarium* L. 91.

**Z.**

- Zannichellia** L. 481, 228.  
*major* Bönn. 228.  
*palustris* L. 228.  
*pedicellata* Fr. 229.  
*pedunculata* Reich. 229.  
*polycarpa* Nolt. 228.  
*Rosenii* Wallm. 229.  
**Zostera** L. 3, 229.  
*angustifolia* Horn. 229.  
*marina* L. 229.  
*minor* Nolt. 229.  
*nana* Roth. 229.  
*Noltei* Horn. 229.



# REGISTER

## ÖFVER DE SVENSKA SLÄGTNAMNEN.

Agh 231.  
 Akleja 95.  
 Al 196.  
 Alant 8.  
 Alder 197.  
 Alm 180.  
 Alpros 169.  
 Alté-rot 113.  
 Amarant 181.  
 Amur 163.  
 Andmat 223.  
 Andorn 53.  
 Anis 82.  
 Annbok 186.  
 Apel 144.  
 Arun 58.  
 Ask 56.  
 Asp 187.  
 Axlost 258.  
 Backbränna 102.  
 Backsöta 161.  
 Baldursbrå 2.  
 Benved 76.  
 Berberis 96.  
 Bergskrabba 73.  
 Bergspring 281.  
 Bingel 172.  
 Binka 9.  
 Bittermjölke 17.  
 Björk 195.  
 Björnbrodd 217.  
 Björnbårsbuske 149.  
 Björnsloka 79.  
 Bladtåg 221.  
 Blindnässa 181.  
 Blindnässa 53.  
 Blodhirs 275.  
 Blodtopp 148.  
 Blomvass 216.  
 Blåbårsbuske 168.  
 Blågull 54.

Blåklocka 41.  
 Blåkunt 46.  
 Blåsuga 53.  
 Blås-ört 69.  
 Bläcken 54.  
 Bockrot 82.  
 Bocktörne 58.  
 Bok 186.  
 Bokhvete 173.  
 Bolltistel 11.  
 Bolmört 59.  
 Bonässla 51.  
 Braxengräs 287.  
 Brudsporre 203.  
 Brunkulla 204.  
 Brunskära 1.  
 Brunört 50.  
 Bräcka 135.  
 Bräken 282.  
 Bräsm 101.  
 Bullerblomster 95.  
 Buna-ris 105.  
 Bunarot 82.  
 Bändling 229.

Cypergräs 231.

Daggkäpa 148.  
 Daggört 121.  
 Darrgräs 262.  
 Desmeknopp 84.  
 Dill 79.  
 Dosta 50.  
 Drakblomma 51.  
 Dufkulla 70.  
 Dunört 140.  
 Dvergglummer 289.  
 Dyblad 209.  
 Dyborre 209.  
 Dyört 65.  
 Dån 53.

Ek 186.  
 Ekorrbar 215.  
 Elfaxing 275.  
 Elnaträd 36.  
 Elm 257.  
 En 198.

Fackelblomster 140.  
 Fetknopp 138.  
 Fingerhatt 61.  
 Fingerört 152.  
 Finnbär 180.  
 Finnkarv 81.  
 Finntåtel 266.  
 Fjellklint 123.  
 Fjellskära 12.  
 Fjellsyra 178.  
 Fjelltåtel 269.  
 Fjellvicker 161.  
 Fjellvipa 155.  
 Fjäderborstgräs 274.  
 Fjällnarv 132.  
 Fjällrot 68.  
 Fjärva 46.  
 Flen 277.  
 Flenört 61.  
 Floksblomster 10.  
 Flugblomma 204.  
 Foderbräken 282.  
 Fogelav 128.  
 Fogelört 110.  
 Frier 67.  
 Fross-ört 50.  
 Fryle 221.  
 Fräken 285.  
 Furgräs 287.  
 Furu 197.  
 Fyrting 140.  
 Färpimpinell 148.  
 Fänting 124.  
 Förgät-mig-ej 45.

Getväpling 167.  
 Gigelsärt 162.  
 Ginst 166.  
 Glasört 185.  
 Glim 122.  
 Glis 81.  
 Gran 197.  
 Groblad 73.  
 Grodnate 90.  
 Gråbo 3.  
 Grådådra 108.  
 Gråmålla 181.  
 Grönkulla 204.  
 Guckuskor 208.  
 Guldborste 10.  
 Guldpuåra 138.  
 Guldris 10.  
 Gulsuga 52.  
 Gultopp 171.  
 Gultraf 140.  
 Gyllen 100.  
 Göckblomma 123.  
  
 Hafre 267, 299.  
 Hafre-rot 16.  
 Hafre-åxing 268.  
 Haftorn 180.  
 Hagtorn 145.  
 Hallonbuske 149.  
 Hare-ria 166.  
 Harfoka 83.  
 Harkål 16.  
 Harsyra 116.  
 Hartimjan 49.  
 Hassel 186.  
 Hasselört 179.  
 Hedblomster 6.  
 Helghö 160.  
 Hexört 142.  
 Hillsko 72.  
 Hinnblad 283.  
 Hjertstilla 51.  
 Hjortron 149, 152.  
 Honungsblomma 205.  
 Hornserf 200.  
 Humle 181.  
 Humlesuga 51.  
 Hundloka 78.  
 Hundrofa 134.  
 Hundåxing 258.  
 Hven 273.  
 Hvete 299.  
 Hvitlöksört 101.  
 Hyll 36.  
 Hållrot 179.  
 Hårnate 228.  
 Hårserf 228.  
 Hägg 156, 7.  
 Hållebråken 280.  
 Hållebrodd 274.  
 Håstfibla 4.

Håstboscört 11.  
 Håstkastanie 84.  
 Höckblomster 18.  
 Hölsnejlika 124.  
 Hönsarv 127.  
 Hönsbet 130.  
 Hönshirs 275.  
 Hör 116.  
 Höskallra 66.  
 Höstfibla 34.

Idgran 198.  
 Igelknopp 229.

Jernört 56.  
 Johannisört 117.  
 Jordknöple 116.  
 Jordnöt 82.  
 Jordrefva 50.  
 Jordrök 98.  
 Jungfrulin 110.

Kabbelök 95.  
 Kafveldun 229.  
 Kafvelhirs 275.  
 Kallgräs 216.  
 Kalmus 223.  
 Kardborre 14.  
 Kartistel 35.  
 Kambråken 283.  
 Kam-åxing 258.  
 Kase 267.  
 Kassöta 155.  
 Kastlöser 94.  
 Katifoscört 7.  
 Kattmynta 50.  
 Kattost 113.  
 Kax 78.  
 Kirs 156.  
 Kirskaål 82.  
 Kjåsa 273.  
 Klint 11.  
 Klintblåra 123.  
 Klockljung 169.  
 Klofibla 17.  
 Klovicka 160.  
 Kloärt 162.  
 Klubbfibla 35.  
 Klådris 172.  
 Klätt 123.  
 Klöfver 164.  
 Klöfverört 162.  
 Knafvel 173.  
 Knapp-agh 231.  
 Knappsåf 233.  
 Knappvådd 35.  
 Knipprot 206.  
 Knoppört 11.  
 Knutarv 71.  
 Knyttling 173.  
 Knågräs 267.

Knårot 205.  
 Konig 49.  
 Konvalje 214.  
 Korallrot 208.  
 Koriander 77.  
 Korn 299.  
 Korndådra 105.  
 Kornell 76.  
 Kornfibla 16.  
 Korsört 5, 6.  
 Kovall 67.  
 Krasse 106.  
 Krepling 169.  
 Krislogräs 8.  
 Kristtorn 76.  
 Kronlija 211.  
 Kronärt 160.  
 Kropp 140.  
 Krufrö 80.  
 Krusbråken 283.  
 Kryddmynta 47.  
 Kråkklöfver 152.  
 Kråkkrasse 107.  
 Kråkris 171.  
 Kummer 155.  
 Kummil 82.  
 Kungsljus 60.  
 Kungsspira 66.  
 Kål 99.  
 Kålsenap 99.  
 Kärrfoka 83.  
 Königsört 178.  
 Körvelfoka 78.

Laktuk 16.  
 Lappljung 169.  
 Ledgräs 143.  
 Libsticka 79.  
 Liguster 56.  
 Lilja 211.  
 Lin 295.  
 Lind 112.  
 Lindådra 107.  
 Lingonris 168.  
 Linnéa 40.  
 Ljung 169.  
 Lomme 106.  
 Lonke 199.  
 Lonkeserf 133.  
 Loppört 8.  
 Losta 261.  
 Lummer 288.  
 Lungört 46.  
 Lunk 173.  
 Luzern 163.  
 Läketunga 285.  
 Läkeört 83.  
 Lärktråd 197.  
 Lök 212.  
 Löksuga 53.  
 Lönn 84.

Madd 37.  
 Madra 37.  
 Melört 3.  
 Mansblodknopp 117.  
 Manskraft 84.  
 Marebalm 270.  
 Marrip 74.  
 Martorn 84.  
 Marviol 105.  
 Meff 184.  
 Missne 223.  
 Mistel 39.  
 Mjeltbråken 282.  
 Mjuktåtel 270.  
 Mjölktistel 15.  
 Mjolonris 168.  
 Monke 43.  
 Morot 79.  
 Mossatof 234.  
 Mossrot 80.  
 Munkfnat 47.  
 Munkmossa 223.  
 Murgrön 77.  
 Mustippa 92.  
 Musört 7.  
 Myggblomster 207.  
 Mynta 47.  
 Myr-agh 231.  
 Myskegräs 277.  
 Målla 184.  
 Månviol 107.  
 Måra 38.  
 Märke 83.  
 Mästerrot 80.  
 Möblomma 97.

Nagelört 109.  
 Narciss 209.  
 Narvgräs 266.  
 Nate 224.  
 Nateserf 210.  
 Natviol 100.  
 Nejlika 124.  
 Nocka 5.  
 Noppa 6.  
 Nosserot 204.  
 Notblomma 43.  
 Nunneört 97.  
 Nyckelblomster 201.  
 Nyponbuske 146.  
 Nysört 3.  
 Nälkörvel 78.  
 Näckblad 86.  
 Näckros 86.  
 Näfva 114.  
 Nässla 181.  
 Nästrot 206.  
 Nörel 129.

Odört 77.  
 Olvonbuske 36.

Ormax 257.  
 Ormbär 215.  
 Ormkagge 279.  
 Oxbärsbuske 145.  
 Oxel 144.

Palsternacka 79.  
 Perldruvfa 214.  
 Piggfrö 47.  
 Pil 188.  
 Plister 52.  
 Polört 55.  
 Poppel 187.  
 Pors 197.  
 Potates 292.  
 Prestkrage 2.  
 Prustrot 215.  
 Punge 71.  
 Påsklija 209.  
 Pärönträd 144.

Qvaller 82.  
 Ramme 234.  
 Rapunkel 43.  
 Rast 44.  
 Renfana 3.  
 Repe 257.  
 Ribs 134.  
 Riddarsporre 95.  
 Rifva 47.  
 Ripört 205.  
 Rocka 105.  
 Rosenrot 138.  
 Rosling 169.  
 Råg 299.  
 Räckentraf 103.  
 Rödarv 71.  
 Rödfloka 78.  
 Rödkulla 65.  
 Rödlonke 140.  
 Rödmålla 183.  
 Rölleka 3.  
 Rönn 144.  
 Rör 271.

Saffran 209.  
 Salsa 283.  
 Salepsrot 203.  
 Saltarv 129.  
 Saltmålla 183.  
 Saltört 184, 5.  
 Salvia 49.  
 Sandborst 268.  
 Sandhvita 108.  
 Sandlija 213.  
 Sandnarv 129.  
 Sandsenap 99.  
 Selleri 82.  
 Senap 99.  
 Senegräs 266.

Sileshår 121.  
 Sippa 93.  
 Skalleblomma 61.  
 Skatnäfva 116.  
 Skelört 97.  
 Skogsfrublomma 207.  
 Skogsviol 204.  
 Skräp 10.  
 Skakta 216.  
 Skärfrö 106.  
 Skärfloka 83.  
 Skörbjuggsört 108.  
 Slideknä 174.  
 Slidgräs 275.  
 Slokgräs 270.  
 Slån 156.  
 Slätterfibla 34.  
 Slökesticka 77.  
 Slökorn 257.  
 Smile 268.  
 Sminkbär 183.  
 Sminkrot 46.  
 Smultron 152.  
 Småborre 148.  
 Smäre 163.  
 Smörblomster 34.  
 Snarrefva 43.  
 Snyltrot 68.  
 Snödroppe 209.  
 Snöklöcka 209.  
 Sodaört 185.  
 Solvanda 118.  
 Solögon 87.  
 Sommargyllen 103.  
 Spansk Körvel 77.  
 Sparris 214.  
 Spenört 79.  
 Spergel 131.  
 Spikblad 84.  
 Spikkubba 59.  
 Spindelört 179.  
 Sporreblomma 61.  
 Sprengört 82.  
 Springkorn 111.  
 Squatram 170.  
 Stagg 277.  
 Stallört 167.  
 Starr 235.  
 Stenbråken 280.  
 Stenfrö 46.  
 Stenkrasse 101.  
 Stensöta 278.  
 Stingsel 12.  
 Stjernblomma 125.  
 Stjernlök 213.  
 Stjertistel 12.  
 Stjernvädd 36.  
 Stockros 112.  
 Stormhatt 95.  
 Strandkil 9.  
 Stråndklo 49.

Strandkål 105.  
 Strandlilja 217.  
 Strandling 71.  
 Strandpryl 74.  
 Strandråg 257.  
 Strandsticka 81.  
 Strätta 80.  
 Stållört 57.  
 Stånds 5.  
 Ståkra 81.  
 Surtorn 96.  
 Svalting 216.  
 Svalört 91.  
 Svarthö 65.  
 Svartsenap 99.  
 Svingel 259.  
 Svingellosta 260.  
 Svärblilja 208.  
 Sylört 107.  
 Syra 175.  
 Syren 56.  
 Syska 51.  
 Sysla 205.  
 Såprot 124.  
 Såpört 124.  
 Säf 232.  
 Safferot 81.  
 Säfstarr 254.  
 Säl 188, 191.  
 Sälting 217.  
 Sötblomster 2.  
 Sötgräs 274.

Taggbräken 279.  
 Taklök 138.  
 Tall 197.  
 Tallört 171.  
 Tandört 101.  
 Tibast 180.  
 Tidlösa 215.  
 Timjam 49.  
 Tistel 13.

Tistelborre 12.  
 Tjärblomma 123.  
 Toffelblomma 207.  
 Tofs-axing 267.  
 Tolta 15.  
 Tomt-tistel 12.  
 Topplösa 71.  
 Toste 135.  
 Tranbär 168.  
 Trefingerört 155.  
 Trift 74.  
 Trollbär 59.  
 Trolldrufva 96.  
 Try 40.  
 Tulkört 57.  
 Tulpan 211.  
 Tungört 45.  
 Tusenskön 8.  
 Tväblad 206.  
 Tåg 217.  
 Tätört 70.  
 Törel 171.  
 Törne 146.

Vallkrasse 107.  
 Vallmo 96.  
 Vallört 44.  
 Vass 270.  
 Vatten-ärv 125.  
 Vattenblink 72.  
 Vattengröe 265.  
 Vattenklöfver 54.  
 Vattenkrasse 104.  
 Vattenslinga 142.  
 Vejde 105.  
 Vendelrot 36.  
 Vetteljus 8.  
 Vetteros 68.  
 Vial 157.  
 Vicker 158.  
 Vide 188.  
 Videört 70.

Vifva 71.  
 Vildhvete 255.  
 Vildpersilja 81.  
 Vinda 43.  
 Vintergrön 170.  
 Viol 118.  
 Vippa 94.  
 Vippärt 158.  
 Visil 121.  
 Vårbrodd 277.  
 Vårlok 213.  
 Vårsallat 37.  
 Vägsenap 100.  
 Vägvrda 15.  
 Väpling 164.

Wau 85.

Zymbel 206.

Åkerkullor 2.  
 Åkervädd 35.

Åfjebrodd 65.  
 Ångkaffe 276.  
 Ångkampe 276.  
 Ångsgröe 262.  
 Ångskrasse 101.  
 Ångsruta 92.  
 Ångsskära 12.  
 Ångsticka 81.  
 Ångståtel 269.  
 Ångsull 234.  
 Årenpris 62.  
 Årter 157.

Ögonblomma 45.  
 Ögontröst 66.

## TILLÄGG OCH RÄTTELSE.

Pag. xx, efter r. 38 tilläggas:

158 $\frac{1}{2}$  MEUM. Kronbl. *ovala*. Delfr. *högt konvexa, aflånga*, med upphöjda *breda* åsar, samt oljeränder. Allm. svepe 0 ell. snart affallande. — Pag. 81.

Pag. 65. r. 37 står: 579 läs: 573.

Pag. 81, efter r. 20 tilläggas:

172 $\frac{1}{2}$  MEUM Tourn. Björnrot.

\*1 *M. athamanticum* Jacq. stj. trind, strimmig, glatt; bladen 2—3dubb. parbl. delade, med trådmala flikar; det enskilda svepet af 3—8, n. syl-likade blad. 2, 7, 8, hvitg. ell. rödakt. blr. — Fig. Reich. t. 91, f. 1.

Fjeldalar. r. (N. Bergens stift, vid Tysnes: Amtmand Meinich, enl. uppg. af Prof. Fries och Ax. Blytt.) *Omkring fotshög, till alla delar glatt växt, med n. bladlös stjeln; bladen, jemte slidor tillhör. föreg. årets blad, samlade vid rotstockens spets; blrna vålduktande.* — *Athamanta Meum* L.

Pag. 81, r. 24 står: hv. blr	läs: blekg. blr.
» 102, r. 32 » Hörn.	» Horn.
» 132, r. 36 » Leipzig.	» Lepig.
» 138, r. 2 » CHRYSOSPENIUM	» CHRYSOSPENIUM.
» 139, r. 40 » Hallonskär	» Halleskär.
» 155, r. 11 » eggrunda	» äggrunda.

Pag. 155, efter r. 37 införes:

\*4 *G. pallidum* C. A. Mey. kort glandelhårig ell. n. glatt; stjelnbl. 3delade; blrna lutande; kronbl. n. kortare än fodret, hvita, med n. njurformig skifva och utdragen klo; fruktsprötets nedre del dubb. längre än den quarsittande öfre. 2, 6. Fig.

Tor. st. r. (N. Abildsøe vid Christiania, funnen i Juni 1869 af Med. Stud. N. Wulfsberg.) *Spådare än föreg.; hela örten, äfven fodret, blekgrön. Allt enl. meddelande af Scheutz; osedd af utg.*

Pag. 184, r. 3 står: *peganum* läs: *paganum*.

Pag. 232, r. 29 läs: *nedtill* trubb. 3kantig.

Pag. 232, efter r. 34 införes:

\*3 $\frac{1}{2}$  *S. radicans* Schk. sträket som hos föreg.; axen i knippet skaflade, icke hufvudlikt gytttrade; axfjällen trubbiga, utan udd; kalkborsten flerböjda, mycket längre än nöten. 2, 7. Fig. Reich. f. 732.

Våta st. r. (N. Hitterdal i Tellemarken: Stud. Grönstad, enl. uppg. af Prof. Fries och Ax. Bl.) *Stor som föreg., hvarifrån den måhända ej är nog skiljd. Stråden flere tillsammans, en del nedligg. och rotslående; axen mer åtskiljda, längre och smälare än hos S. silv. Norska ex. osedda af utg.*

Pag. 248, r. 39 står: Hasselskog läs: Hesselkog.

Pag. 266, efter r. 21 införes:

\*8 *G. procumbens* Sm. strån tufvade, nedligg. ell. uppstigande; den *låta* och n. *ensidiga* vippans nedre grenar *ensamma* ell. *parvisa*, *korta* och *upprätta*, sträfvä; småaxen smalt aflånga, omkr. 4blommiga; blomfj. aflånga, *starkt* nerviga, med trubbig ell. tvärhuggen spets. ☉ 6, 7. Fig. E.B.532. Reich.Gram.369.

Hafsstr. r. (*N. Grejs* Fiskevær utanför Christianssund: Kateket Greve enl. uppgift af Ax. Bl.) Omkr. *quartershög*, med *breda* *platta* blad; utmärkt af de *alltid styfva* och *upprätta*, n. *ända till basen småaxbärande vippgrenarne*. — *Sclerochloa* P.B.

Pag. 298, r. 30 tillägges:

Denna art (*Sc. verna*) har enl. uppgift af Prof. Fries och Ax. Blytt verkligen förledet år blifvit funnen i Norge på ön Alden utanför kusten af Sandfjord.





HANDBOK  
I  
SKANDINAVIENS FLORA,

INNEFATTANDE  
SVERIGES OCH NORGES VÄXTER

TILL OCH MED  
MOSSORNA

AF  
C. J. HARTMAN.

---

TIONDE UPPLAGAN,  
UTGIFVEN MED  
RÄTTELSE OCH TILLÄGG

AF  
CARL HARTMAN.

---

SEDNARE DELEN:  
MOSSOR.

---

STOCKHOLM,  
Zacharias Hæggströms förlag.

---

Ivar Hæggströms Boktryckeri 1871.





## Förord till sednare delen.

Redan i åttonde upplagan (af 1861) uttryckte utg. sin önskan att antaga Schimpers kort förut gjorda slägtindelning för de pleurokarpiska bladmossorna, men angaf tillika skälen för sitt uraktlåtande häraf. Dessa skäl voro dels att de nyuppställda släktena då ännu icke vunnit nog säker begränsning, såsom Schimpers egna i Synopsis redan vidtagna ändringar vittnade, dels att utg. ansåg nämnde indelnings antagande skola medföra oöfvervinneliga svårigheter för nybörjare i moss-studiet. Till dessa skäl kunde med fog hafva lagts det, att tiden för den åttonde upplagans redigerande hade varit allt för knapp att tillåta en så genomgripande förändring i mossdelen. För vinnande af likformighet borde nämligen samtidigt en mängd nyare släkten för de akrokarpiska bladmossorna antagas, och för att motväga de härigenom uppstående, ofvannämnde svårigheterna fanns intet annat medel än att fördela alla bladmossornas genera i Ordningar och Flockar samt att göra dessas såväl som släktenas och arternas diagnoser vida fullständigare än i de äldre upplagorna, med ett ord att helt och hållet omarbета hela mossdelen. Till en dylik omarbetning gjorde utg. ock början i och för den följande, ell. nionde uppl.; men då på förläggarens anfordran dennas tryckning måste påbörjas oväntadt snart, ell. redan 1863, och hennes förra del äfven kräfde åtskilligt arbete, utom att utg:s tid samtidigt var af andra göromål hårdt aulitad, blef det utg. omöjligt att redan då fullborda den påtänkta omarbetningen, helst som utg. då ännu hyste stora betänkligheter i afseende på densammas ändamålsenlighet. \*)

\*) Observeras må, att utg. i den polemik, som sedan fördes mellan honom och hans gamle vän Dr Ångström i Bot. Notiser, endast hade till syfte att förklara sina åtgöranden vid mossornas behandling i 9:nde uppl. och dervid endast redogjorde för de skäl och åsikter, som hos honom hade gjort sig gällande i och för nämnda upplagas bearbetande, men dermed ingalunda förband sig att i all framtid och under andra förhållanden låta sig ledas af desamma. Å andra sidan kunde utg. då icke heller meddela, att han redan påtänkt och hade under arbete en omarbetning, då han icke var säker om att kunna genomföra den till egen, än mindre andras belåtenhet och således icke vågade dertill förbinda sig.

Först under de sedan nionde upplagans färdigtryckande (1864) gångna åren har utg. egt tillräcklig tid både att i detta fall stadga sitt omdöme och genomföra hela mossdelens fullständiga omarbetning.

I afseende på de af utg. för 10 år sedan hysta betänkligheter och befarade svårigheter äro ock omständigheterna nu väsendtligt förändrade, då dels de Schimperska släktena nu blifvit alltmera allmänt antagna och säkrare begränsade, dels man i utlandet börjat med framgång införa dem äfven i arbeten, som icke äro afsedda endast för redan försigkomna mosskännare.

Utan anspråk på att hafva fullständigt lyckats, fastmera såsom ett försök, att uppställa de Skandinaviska mossorna på ett tidsenligare sätt, framlägger utg. nu resultatet af sitt fleråriga arbete. Uppställningen följer i det hufvudsakliga Schimpers method i *Synopsis Musc. eur.*, om ock utg. i åtskilliga detaljer funnit sig nödsakad att något derifrån afvika. Dels sjelfva denna uppställning, dels de utförligare diagnoserna, dels ock den stora tillväxt i arter som vår Flora vunnit sedan förra upplagan utgafs, hafva icke obetydligt ökat mossdelens arktal; utg. har likväl sökt hushålla med utrymmet så mycket som möjligt, hvilket i icke så ringa grad försvårat hans arbete.

För rikhaltiga och värderika uppgifter om nyupptäckta arter och lokaler står utg. i största förbindelse hos alla vårt lands och Norges nu lefvande, i en eller annan föreg. upplaga så väl som i den närvarandes förra del namngifna mosskännare, men har dessutom, sedan nyssnämnde del utgafs, haft nöjet emottaga liknande bidrag af numera Prof. i Corduba, Dr P. G. LORENTZ, från dennes resa i Norge 1868, samt af Philos. Kandidaten Hr HJ. MOSÉN och Studeranden Hr A. T. BJÖRKMAN, hvilka alla utg. härmed betygar sin tacksamhet.

Slutligen må nämnas, att bland de i förra delen anförda författarnamn saknas några få, som i mossdelen förekomma under följande förkortningar:

Carr. — B. Carrington.

Girg. — G. K. Girgensohn.

Mdo. — G. Molendo.

Mos. — Hj. Mosén.

Russ. — Edm. Russow.

Wulfsb. — N. Wulfsberg.

Örebro i Maj 1871.

*Carl Hartman.*

# MOSSOR

## (*Musci*).

---

Oftast små, mera sällan utdragna spörväxter, som gro med en förgrödd. Stammen enkel eller grenig, vanligen mångbladig, hos ett mindre antal Lefvermossor plattad, bål-[thallus-]lik. Bladen odelade ellerflikiga, med en enkel ell. dubbel nerv, eller nervlösa, glatta ell. papillösa, hos många Bladmossor åtföljda af findelade biblad, s. k. parafyllier, hos många lefvermossor af s. k. stipler. Befruktningsdelar på stammen, af 2 slag: hanorganer (Antheridier) och honorganer (Arkegonier), oftast åtföljda af safttrådar (parafyser). Skärm- ell. svepebladen, mer och mindre olika de öfr. bladen, benämnas perigonialblad (som omgifva antheridierna) och perichætialblad (som omgifva arkegonierna); hos de flesta lefvermossor omgifvas arkegonierna inom svepebladen af ett särskildt hylle, en s. k. honkalk. Fukt en längre ell. kortare skaftad, sällan oskaftad kapsel, yngre innesluten inom en s. k. mössa, som hos Bladmossorna upplystes med kapseln och qvarsitter till fruktens mognad, samt slutl. affaller hel, hos de öfr. sönderspränges vid kapselns uppskjutande. Kapseln innesluter groddkorn (sporer), endast hos Lefvermossorna blandade med elastiska spiralvridna springtrådar (elateres), och öppnar sig antingen med ett lock eller i flikar; sällan affaller han öppnad. Då kapseln öppnar sig med lock, är mynningen vanl. försedd med en enkel ell. dubbel tandkrans (peristom) samt ofta tätt under lockets kant omgifven af en elastisk ring.

Mossorna delas i tre hufvudfamiljer:

- 1 Fam. **BRYACEÆ** *Bardl.* (i vidstr. mening) ell. *Musci frondosi* (Bladmossor). Stammen aldrig bål-lik. Bladen alltid odelade, oftast med nerv; bladcellerna af ett enda slag [utom hos *Leucobryum*]. Kapseln oftast öppnande sig med lock (*M. stegocarpi*), eller hos *M. cleistocarpi* affallande öppnad, och hos *M. schizocarpi* uppspringande i 4, upptill sammanhängande flikar. Mössan åtföljande kapseln och affallande hel [utom hos *Archidium*]. Sporerne aldrig blandade med springtrådar.
- 2 Fam. **SPHAGNACEÆ** *Endl.* (Hvitmossor). Stammen aldrig bål-lik. Bladen alltid odelade och nervlösa; bladcellerna af 2 olika slag, likasom inkilade mellan hvarandra. Kapseln öppnande sig med lock, alltid utan peristom. Mössan oordentligt bristande vid kapselns framskjutande. Sporerne aldrig blandade med springtrådar.
- 3 Fam. **HEPATICÆ** *Juss.* (Lefvermossor). Stammen stundom bål-lik. Bladen oftast flikiga, alltid nervlösa; bladcellerna af ett enda slag. Arkegonierna omgifna af en meränd. sambladig kalk, och derutom af svepeblad. Kapseln öppnande sig i 4, sällan i flere ell. blott 2 flikar [hos några få *Marchantiaceæ* med lock]. Mössan oordentligt bristande i toppen och qvarsittande vid fästet. Sporerne blandade med springtrådar [utom hos *Ricciaceæ*].

# ÖFVERSIGT

AF

## ORDNINGAR OCH FLOCKAR.

### I Fam. BRYACEÆ.

#### + *Musci pleurocarpi*.

Frukten utgående från stjelkens ell. grenarnes sidor, alltid öppnande sig med ett af-fallande lock. Peristomet dubbelt [utom hos *Leucodon*].

#### A. Ordn. HYPNACEÆ.

Dels större, dels smärre, i hög grad föränderliga, på berg, träd ell. i kärr växande mossor, med oftast trinda, mer sällan plattade grenar af all-, två- ell. ensidigt vända, *glatta* [undant. *Hypn. rugosum* och *Hylocom. triquetrum*] blad, hvilkas cellväf oftast är prosenkymatisk \*)—jembred, meränd med kvadratiska, *ofta uppblåst vidgade* bashörn-celler. Kapseln utdraget skaftad. Mössan ensidig.

a — *Camptocarpæ*: kaps. *med* och lutande, *oftast krökt*, alltid med dubbelt peristom; det inre perist. *med* fina, hårlika mellanflikar (cilier) mellan de 16 bredare tänderna.

1 Flocken *Hypnæ*: kapselns lock koniskt, med *intet ell. kort* spröt.

1. Hylocomium. 2. Hypnum. 3. Brachythecium. 4. Camptothecium. 5. Amblystegium. 6. Plagiothecium.

2 Flocken *Eurhynchieæ*: kapselns lock *långt sprötspetsadt*.

7. Rhynchostegium. 8. Eurhynchium. 9. Thamnium.

b — *Orthocarpæ*: stjolk och grenar alltid trinda af all-, säll. ensidiga blad; kaps. upprät, *rak och regelbunden*, med dubb. peristom [endast hos *Leucodon* enkelt]; det inre perist. *ofta utan* cilier.

3 Flocken *Pylaisieæ*: inre peristomets tänder nedtill förenade medelst en *ganska bred*, veckig hinna, vanl. med mellanliggande cilier.

10. Homalothecium. 11. Isothecium. 12. Orthothecium. 13. Pylaisia. 14. Thedenia.

4 Flocken *Cylindrothecieæ*: inre peristomets tänder ända till basen *åtskiljda* ell. förenade medelst en *mycket smal* hinna, *alltid utan* cilier.

15. Cylindrothecium. 16. Platygyrium. 17. Leucodon. 18. Climacium. 19. Lescuræa. 20. Antitrichia.

\*) Med *prosenkymatisk* cellväf förstås här den, hvars särskilda celler äro långsträckta, vidast på midten och med de afsmalnande, tilspetsade ändarne fogade intill hvarandra; med *parenkymatisk* åter den, hvars celler äro jemförelsevis vida, sexkantiga eller rektangulära och med afplattade ändar stöta intill de ofvan och nedom dem belägna.

## B. Ordn. NECKERACEÆ.

Teml. stora, vanl. mattvis växande, pargreniga sten- ell. trädmossor, *plattade af 2-sidigt riktade, glatta* blad af upptill rhombiska, nedtill smala, långsträckta, *aldrig vid bashörnen upplåsta* celler. Kapseln dels n. oskaftad, dels utdraget skaftad, *rak och regelbunden*; det inre perist. med inga ell. korta cilier. Mössan [hos de Skand.] ensidig.

5 Flocken *Neckereæ*: karakt. som Ordn.

21. Neckera. 22. Homalia.

## C. Ordn. FABRONIACEÆ.

Små, mjuka och tufviga, oordentligt förgrenade trädmossor, med *nervlösa, glatta* blad af lös cellväf; cell. upptill rhombiska, *vid bladens kanter och bas* *kvadratiske*, klorofyllrika. Kapseln skaftad, regelbunden ell. föga krökt. Mössan ensidig.

6 Flocken *Habrodontæ*: *bladen långspetsade*; tvåbyggare; kaps. regelbunden; inre perist. oordentligt slikt, *hinnaktigt och ofärgadt*.

23. Habrodon.

7 Flocken *Myrinieæ*: *bladen trubbiga*; sambyggare; kaps. ofta något krökt; inre peristometsänder *fasta, färgade* [n. brandgula].

24. Myrinia.

## D. Ordn. PTEROGONIACEÆ.

Smärre, tufvadt ell. mattlikt växande sten- och trädmossor, med vanl. knippevisa, något bågbojda grenar, glänsande, *starkt papillösa* blad af upptill prosenkymatiska celler utan klorofyll, *med kort nerv*. Kaps. skaftad, upprät och *regelbunden*. Mössan ensidig.

8 Flocken *Pterogonieæ*: karakt. som Ordn.

25. Pterogonium. 26. Pterigynandrum.

## E. Ordn. LESKEACEÆ.

Dels smärre, dels större, tufvade ell. mattlika, ofta pargreniga, träd- och stenmossor [några så arter växande i kärr], *med talrika parafyllier* på stjelken, flerradiga, all-, stund. något ensidiga, glanslösa, oftast nervförsedda, *papillösa* [undant. *Pseudolesk. tect.*] blad, af upptill tät, *parenkymatisk* och klorofyllrik cellväf. Kapseln skaftad, regelbunden och upprät [hos *Leskea* och *Anomodon*] ell. sned och lutande, ofta krökt. Mössan ensidig.

9 Flocken *Thujidieæ*: *plattade, engång—3dubb. pargreniga*. Stjelkbladens celler i *spetsen och längs kanterna rundade, längs midten smala, långsträckta*. Kaps. *lutande och krökt*, oval ell. cylindrisk; inre perist. med cilier.

27. Thujidium. 28. Heterocladium.

10 Flocken *Pseudoleskeæ*: stj. oordentligt förgrenad—n. pargrenig. Bladens *alla celler n. likformiga*, rundade ell. kvadratiske. Tvåbyggare. Kaps. *lutande, n. äggformig*; inre perist. dels med, dels utan cilier.

29. Pseudoleskea.

11 Flocken *Leskeæ*: stjelken och bladcell. *som i föreg. flock*. Kaps. *upprät, cylindriskt aflång*; inre perist. utan cilier.

30. Anomodon. 31. Leskea. 32. Myurella.

## F. Ordn. HOOKERIACEÆ.

Teml. stora, oordentligt förgrenade, *plattade*, jord- eller klippmossor, med *2sidiga, starkt oljeglänsande*, breda och *nervlösa, glatta* blad, af *mycket lös* cellväf; cell. rhombiskt sexsidiga. Sambyggare. Kaps. utdraget skaftad, sned och starkt lutande. Mössan *håttelik*.

12 Flocken *Hookerieæ*: karakt. som Ordn.

33. Hookeria.

## G. Ordn. FONTINALACEÆ.

Större, ända till mycket långt utdragna, oordentligt förgrenade *vattenmossor*, med *oftast 3radiga, glatta* blad af prosenkymatisk cellväf. Tvåbyggare. Kapseln *n. oskaftad* ell. *tydligt* skaftad, meränd. regelbunden; det inre peristomets länder medelst sina tvär-  
lister öfverallt, ell. endast upptill, *förenade till en gallerlik, hög kägla*. Mössan hättelik  
ell. ensidig.

13 Flokken *Dichelymeæ*: bladen *med* nerv; kaps. längre ell. kortare, dock *tydligt*  
*skaftad*; mössan ensidig.

34. Dichelyma.

14 Flokken *Fontinaleæ*: bladen *utan* nerv; kaps. *n. oskaftad*; mössan hättelik.

35. Fontinalis.

†† *Musci acrocarpi.*

Frukten i stjelkens eller grenarnes spets [undantag. *Anoetangium*, *Cinclidotus*, *Tortula squarrosa*, några *Fissidens*-arter och *Octodiceris*], med dubbelt, enkelt ell. intet  
peristom.

## I. M. stegocarpi.

Kapseln öppnande sig regelbundet med ett tydligt och affallande lock [undantag.  
*Systegium*].

## H. Ordn. BUXBAUMIACEÆ.

Vanl. spriddt växande jordmossor, med *ingen* ell. *mycket kort* stjolk. Bladen dels  
tjocka och fasta, dels [perichæt.bl.] tunna och genomskinliga, af parenkymatisk cellväf  
[hos *Buxbaumia* försvunna före fruktens utbildning]. Tvåbyggare. Kapseln på ett ut-  
draget, *tjockt och strävt skaft*, ell. *oskaftad*, *stor*, *snedt äggformig*, med *dubb. peristom*;  
det inre af en *kägelformig*, *veckig hinna*; det yttre mycket litet, otydligt, ell. af 3—4  
tandrader. Mössan ytterst liten, hätt- ell. kägellik.

Floksen *Buxbaumieæ*: karakt. som Ordn.

36. Buxbaumia. 37. Diphyscium.

## I. Ordn. GEORGIACEÆ.

Smärre, tufvade ell. spridda jord- ell. klippmossor. Bladens cellväf parenkymatisk, af  
sexsidigt rundade ell. rektangulära, sparsamt klorofyllförande celler. Sambyggare. Kap-  
seln skaftad, *upprätt och regelbunden*, med *enkel peristom af 4 länder*. Mössan hättelik.

16 Flokken *Tetraphideæ*: karakt. som Ordn.

38. Tetraphis. 39. Tetrodontium.

## K. Ordn. POLYTRICHACEÆ.

Oftast ganska stora, vanl. tufvade kärr- och jordmossor, med vanl. enkel stjolk och  
*tjocka* [undantag. *Catharinea*] blad, af parenkymatisk, vid basen något genomskinlig cell-  
väf. Tvåbyggare [utom *Cath. undulata*]. Kapseln utdraget skaftad, regelbunden, upprätt  
ell. lutande, *trind* ell. *4—6kantig*, *ofta med bihang vid basen*. Perist. *enkelt af 32—64*  
*länder*, *upptill sammanbundna af en mynn. tillslutande hinna*. Mössan ensidig, vanl.  
*kärg*, omslutande hela kaps.

17 Flokken *Polytricheæ*: karakt. som Ordn.

40. Polytrichum. 41. Pogonatum. 42. Oligotrichum. 43. Catharinea.

## L. Ord. BRYACEÆ [i eg. men.].

För det mesta teml. stora, oftast tufvade och greniga mossor, väx. på högst olik-artade lokaler, med dels glatta, dels papillösa blad, af öfverallt parenkymatisk ell. i bladens öfre del prosenkymatisk cellväf. Kapseln vanl. långt skaftad och *mot spetsen tjockast*, regelbunden ell. sned, oftast lutande—hängande, mer säll. upprät, vanl. *med dubbell peristom* [enkelt blott hos *Mielichhof.*, *Conostom.* och *Bartr. breviseta*]. Mössan ensidig [end. hos *Cinclidium* kägellik].

18 Flocken *Timmieæ*: tufvade bergmossor, med på öfre sidan *papillösa* blad, af upptill tät parenkymatisk, vid basen lösare och genomskinlig cellväf. Kaps. långt skaftad, n. regelbunden, *aflång, slät*, lutande med *dubb.* peristom.

44. *Timmia*.

19 Flocken *Bartramieæ*: tufvade sten- ell. jordmossor, med blad *som föreg. flock* [endast hos *B. Oederi* glatta]. Kapseln långt, mer säll. kort skaftad, *snedt rundad, refflad*, med *dubb.* peristom [undant. *Conostomum* och *Bartr. breviseta*].

45. *Breutelia*. 46. *Philonotis*. 47. *Conostomum*. 48. *Bartramia*.

20 Flocken *Aulacomnieæ*: tufvade kärr- ell. jordmossor, med *papillösa* blad af öfverallt ell. blott i deras öfre del tät och rundad cellväf. Kapseln långt skaftad, *aflång ell. cylindrisk, sned* och böjd åt sidan, *refflad*, med *dubb.* peristom.

49. *Gymnocybe*. 50. *Aulacomnium*.

21 Flocken *Meesieæ*: tufvade, till en del ganska stora kärrmossor, med de *oftast glatta* bladens cellväf *öfverallt tät* [hos *Amblyodon* öfverallt lös] och parenkymatisk. Kaps. vanl. *mycket långt skaftad, sned* och n. upprät, *slät*, med *dubb.* peristom.

51. *Paludella*. 52. *Meesia*. 53. *Amblyodon*. 54. *Catoscopium*.

22 Flocken *Mnieæ*: tufvade, vanl. stora kärr- ell. skogsmossor, med *glatta* blad, af *öfverallt vid, parenkymatisk* cellväf [undant. *Mn. cinclidioides*]. Hanblirna *skiflika*. Kaps. långt skaftad, *regelbunden, vanl. nedböjd, slät*, med *dubb.* peristom.

55. *Cinclidium*. 56. *Mnium*.

23 Flocken *Bryeæ*: tufvade kärr- ell. jord- [mer säll. sten-] mossor, med glatta blad af *prosenkymatisk cellväf i deras öfre del*. Hanblirna *knopplika*. Kaps. långt skaftad, regelbunden ell. sned, oftast lutande ell. hängande, med *dubb.* peristom.

57. *Zieria*. 58. *Anomobryum*. 59. *Bryum*. 60. *Webera*. 61. *Leptobryum*.

24 Flocken *Pleurobryeæ*: tufviga, greniga, glänsande klippmossor, med *glatta* blad af ända från spetsen till basen *likformig* cellväf. Kaps. teml. långt skaftad, *från stjeltens sidor, regelbunden, påronlik*, med *enkelt* peristom af 16, hela och n. jemnbreda tänder.

62. *Mielichhoferia*.

## M. Ord. FUNARIACEÆ.

Meränd. små jordmossor, med *kort, enkel stielk och breda, glatta* blad af stora, rhombiskt sexsidiga celler, med söga klorofyll och förenade till en *mycket lös* cellväf. Kaps. långt skaftad, regelbundet ell. snedt *påronlik*, med *enkelt* [*Discelium*], dubbelt [*Funaria*] ell. *intet* peristom. Mössan oftast slutl. ensidig.

25 Flocken *Physcomitrieæ*: bladen *med nerv*. Sambyggare. Kaps. n. *påronlik*, vanl. upprät, med *dubbel ell. inet* perist.

63. *Funaria*. 64. *Physcomitrium*. 65. *Pyramidula*.

26 Flocken *Discelieæ*: mycket små, strödda jordmossor med *nervlösa* blad. Tvåbyggare. Kaps. n. *klotrund*, lutande, med *enkelt* peristom af 16 långa, spetsade, längs midten sprickfulla tänder.

66. *Discelium*.



## N. Ordn. SPLACHNACEÆ.

Tufvade kärr- ell. bergmossor, de flesta växande i spillning efter växtätande djur. Bladen som i föreg. Ordn. Kaps. ofta mycket långt skaftad, regelbunden, vid basen försedd med ett omv. koniskt, klot- ell. skärmformigt, ofta stort och färgadt bihang ell. en lång hals; peristomet enkelt af 16—32 tänder, sällan [hos *Oedipod.*] felande. Mössan hälle- ell. kägellik, end. hos *Oedipod.* ensidig.

27 Flocken *Splachneæ*: kapselns bihang af annan färg än kaps. och, oftast betydligt, vidare än denna.

67. *Splachnum*. 68. *Tetraplodon*.

28 Flocken *Tayloriæ*: kapselns bihang af samma färg som kaps., smalare än denna, halslikt.

69. *Tayloria*. 70. *Dissodon*. 71. *Oedipodium*.

## O. Ordn. SCHISTOSTEGACEÆ.

Mycket små jordmossor, med 2:ne slag af stjelkar: sterila, som äro ormbunklika af på kant fästade och vid basen sammanflytande blad, samt fruktbärande med på vanl. sätt fästade (horizontela) blad. Alla bl. nervlösa, med mycket lös väf af rhombodiska celler. Tvåbyggare. Kapseln ytterst liten, skaftad, klotrund, utan peristom. Mössan kägellik.

29 Flocken *Schistostegæ*: kar. som Ordn.

72. *Schistostega*.

## P. Ordn. GRIMMIACEÆ.

Vanl. greniga och tufvade sten- och trädmossor, med oftast papillösa blad, hvilkas cellväf är parenkymatisk, upptill af små, rundadt sexkantiga, klorofyllrika celler, vid basen vanl. genomskinlig. Kapseln dels n. oskaftad, dels med mer och mindre utdraget skaft, regelbunden, med dubbelt [de flesta arter i flocken *Orthotricheæ*], enkelt ell. stundom [*Hedwigieæ* och *Zygodonteæ*] intet peristom. Mössan hälle- ell. kägellik [utom hos *Zygodont.* och en del *Grimmieæ*].

30 Flocken *Encalypteæ*: mer och mindre greniga klipp- och jordmossor, med tunglika, upptill tjocka och papillösa, vid basen glatta och genomskinliga blad. Kaps. långt skaftad, upprät, regelbunden, cylindrisk, med enkelt peristom af 16 tänder [någon gång felande; hos ett par arter omgifvande en inre, tandlikt likad hinna]. Mössan kägellik cylindrisk, glatt, omslutande hela kaps.

73. *Encalypta*.

31 Flocken *Orthotricheæ*: tufvade och greniga träd- ell. stenmossor, med nervförsedda, papillösa, vid basen mer genomskinliga blad. Kapseln kort skaftad—oskaftad, oftast reftad ell. strimmig, med dubbelt ell. enkelt [hos *O. gymnost.* intet] peristom. Mössan stor och vid, hälletik, oftast hårig.

74. *Orthotrichum*. 75. *Ulota*.

32 Flocken *Zygodonteæ*: som föreg. Flock. Kaps. kort skaftad, regelbunden, reftad, utan peristom [de Skand. arterna]. Mössan ensidig, glatt.

76. *Zygodon*. 77. *Amphoridium*.

33 Flocken *Ptychomitriæ*: tufvade och greniga stenmossor, med nervförsedda, svaga ell. icke papillösa, vid basen genomskinliga blad. Kapseln långt ell. kort skaftad, regelbunden, med enkelt peristom af 16, 2delade ell. gallerlikt håliga tänder. Mössan stor, på längden starkt veckig, hälletik, glatt.

78. *Ptychomitrium*. 79. *Coscinodon*.

- 34 Flocken *Hedwigieæ*: tufvade och greniga klipp-, stund. trådmossor, med *nervlösa, papillösa*, teml. breda blad. Sambyggare. Kaps. *n. oskaftad, klotrund, utan peristom*. Mössan *hättelik*, slät, vid basen *flikig* ell. ensidigt uppbristande.  
80. Hedwigia. 81. Hedwigidum.
- 35 Flocken *Grimmieæ*: tufvade, vanl. klynnegreniga klippmossor, oftast af mörk, brun ell. svartaktig färg, *med blad som Flock. Ptychomit.* Kaps. *oftast tydligt skaftad, regelbunden, med enkelt peristom af 16, hela ell. 2—3delade tänder* [undant. *Gr. anodon.*, som saknar peristom]. Mössan *som i föreg. Flock.*  
82. Grimmia. 83. Racomitrium.
- 36 Flocken *Cinclidoteæ*: oordentligt förgrenade vattenmossor, med nervförsedda, *föga papillösa* blad af *ända till basen* tät cellväf. Kaps. *på mycket kort skaft från korta sidogrenar*, med *enkelt peristom af 16 långa, uppräta, oordentligt spruckna*. flikiga och håliga tänder, nedtill förenade medelst en hinna. Mössan *kägliskt ensidig*.  
84. Cinclidotus.

#### Q. Ordn. POTTIACEÆ.

Meränd, teml. små, enkla ell. greniga mossor, med dels papillösa, dels glatta blad af parenkymatisk cellväf, som vid bladspetsen är tät och klorofyllrik, vid basen lös och vattenklar. Kapseln *skaftad, n. alltid regelbunden*, med *enkelt peristom af 16, n. till basen 2delade*, eller 32 tänder, mer sällan [inom släktet *Pottia*] utan perist. Mössan *ensidig*.

- 37 Flocken *Trichostomeæ*: bladen *allsidiga*, mer säll. ensidiga. Kaps. *oftast regelbunden och upprät, med 32 odelade, hårfinna tänder*, vid basen förenade medelst en *tydlig*, stund. ganska bred hinna.  
85. Tortula. 86. Desmatodon. 87. Trichostomum. 88. Leptotrichum.
- 38 Flocken *Ceratodonteæ*: jordmossor, med *allsidiga* blad. Tvåbyggare. Kaps. *något sned och krökt, lutande, med 16, nedtill tät ledade, n. ända till basen regelbundet 2delade tänder*.  
89. Trichodon. 90. Ceratodon.
- 39 Flocken *Distichieæ*: berg- och kärrmossor, *plattade af 2sidigt vända*, glänsande blad. Sambyggare. Kaps. *upprät ell. lutande, med 16, ända till basen åtskiljda*, djupt 2delade, ofta oordentligt sprickfulla tänder.  
91. Distichium.
- 40 Flocken *Pottieæ*: jordmossor [utom *Euclad.*], med *allsidigt vända* blad. Kaps. *regelbunden, upprät, utan peristom ell. med 16—32, n. till basen åtskiljda tänder*.  
92. Eucladium. 93. Didymodon. 94. Pottia.

#### R. Ordn. SELIGERIACEÆ.

Vanl. *mycket små* [1—3 lin., säll. tumshöga] klippmossor, med spridda, smala, *glatta*, nervförsedda blad, hvilkas cellväf är tät, af upptill kvadratiska, vid basen rektangulära ell. öfverallt jembreda celler. Kaps. vanl. skaftad, *regelbunden*, med *enkelt peristom af 16 odelade tänder*, stund. utan peristom. Mössan *ensidig* [hos de Skand. arterna].

- 41 Flocken *Blindieæ*:  $\frac{1}{2}$ —2 tum höga, tufvade fjellmossor. Bladbasens hörnceller *starkt vidgade ell. uppblåsta*, vanl. af brun färg. Kaps. med 16 tänder ell. [hos *Stylosteg.*] utan peristom.  
95. Blindia. 96. Stylostegium.
- 42 Flocken *Seligerieæ*: *yttre små, en ell. par lin. höga*, gruppvis växande stenmossor. Bladbasens hörnceller *icke större än de öfr.* Kaps. med 16 tänder, säll. [hos *Selig. Donniana*] utan peristom.  
97. Seligeria.

## S. Ordn. FISSIDENTACEÆ.

Plattade mossor, med *2sidigt och på kant fästade* nervförsedda blad, hvilkas nedre del synes *dubbel af ett vinglikt bihang*. Cellväfven tät, parenkymatisk. Kapseln regelbunden ell. omärkligt sned, på skaft dels från stjelkens spets, dels från dess sida, med *enkel* peristom af 16, vanl. *till midten* 2klufna tänder. Mössan ensidig ell. hättelik.

43 Flocken *Fissidentæ*: karakt. som Ordn.

98. Octodiceras. 99. Fissidens.

## T. Ordn. LEUCOBRYACEÆ.

Tätt tufvade mossor, med *hvitblå, i torrt tillstånd mycket spröda, allsidiga, nervlösa* blad, hvilkas cellväf består *af flere lager*, dels smala klorofyllrika, dels större 4kantiga, tomma och genomskinliga celler. Tvåbyggare. Kapseln skaftad, sned, med peristom som i *föreg. Ordn.* Mössan ensidig.

44 Flocken *Leucobryæ*: karakt. som Ordn.

100. Leucobryum.

## U. Ordn. WEISIIACEÆ.

Dels större, dels små och spåda, oftast tufvade mossor. Bladens cellväf parenkymatisk, mot bladbasen lösare och genomskinlig, mot spetsen tätare och rik på klorofyll, *vanl. papillös*. Kaps. oftast utdraget skaftad, dels regelbunden, dels sned, med *enkel* peristom af 16, *meränd. till midten* 2klufna tänder, mer. sällan utan peristom. Mössan *ensidig*.

45 Flocken *Dicranæ*: bladen *dels breda, dels smala*. Kaps. oftast sned och krökt, med *16, till midten ell. djupare regelbundet* 2klufna tänder [undantag. *Ångströmia* och *Trematod. brevicollis*].

101. Campylopus. 102. Dicranodontium. 103. Dicranum. 104. Dicranella. 105. Ångströmia. 106. Trematodon. 107. Dichodontium. 108. Cynodontium.

46 Flocken *Weisia*: bladen *smala*, n. jernnbreda. Kaps. regelbunden, *utan* peristom ell. [hos *Weisia*] med *16, hela ell. oordenligt sprickfulla och grundt* klufna tänder.

109. Weisia. 110. Anoetangium. 111. Gymnostomum. 112. Systegium.

## II. M. cleistocarpi.\*)

Kapseln utan tydligt lock, affallande öppnad ell. oregelbundet uppbristande.

## V. Ordn. ARCHIDIACEÆ.

Knappt 2—3 lin. höga jordmossor. Kapseln *oskaftad, insänkt mell. bladen*. Mössan *ofullständig, oordenligt sönderbristande och delvis affallande*, delvis qvarsittande vid kapseln.

47 Flocken *Archidiæ*: karakt. som Ordn.

113. Archidium.

\*) Denna hufvudgrupp, som innefattar de af det gamla släktet *Phascum* bildade nyare släktena, har i senaste åren börjat anses icke utgöra en grupp för sig, i följd hvaraf man fördelat hithörande släkten på de särskilda Flockarne inom *M. stegocarpi*; sålunda föras *Archidium* och *Pleuridium* till *Trichostomeæ*, *Sporledera* till *Dicranæ*, *Phascum*, *Sphæragium*, *Microbryum* och *Ephemerella* till *Pottiæ*, samt *Physcomitrella* och *Ephemerum* till *Physcomitriæ*. Vid en dylik anordning, som utan tvifvel torde vara den naturligaste, men i närv. arbete skulle på det högsta öka svårigheten att någorlunda kort och säkert begränsa Ordningarne och därför icke nu af utg. följes, måste man utbyta de begge afdelningsnamnen *M. stegocarpi* och *M. cleistocarpi* mot det gemensamma *M. holocarpi*.

## X. Ord. PHASCEÆ.

*Som föreg. Ord.* Kapseln oskaftad ell. säll. på ett kort utskjutande skaft. Mössan fullständig, affallande hel.

48 Flocken *Bruchieæ*: bladen mycket smala, lancettlikt jemnbreda—syllika, med utlöpande nerv, n. helbräddade. Mössan hättelik, vid basenflikig.

114. Sporledera.

49 Flocken *Pleuridieæ*: bladen som i föreg. Flock, mot spetsen vanl. otydligt sågade. Mössan ensidig.

115. Pleuridium.

50 Flocken *Phasceæ*: bladen bredt lancettlika—aggrunda [end. hos *Ephemerella* jemnbreda], af lös cellväf vid basen, tätare vid spetsen, åtminstone de öfre med utlöpande nerv, vanl. helbräddade. Mössan dels hättelik, dels ensidig.

116. Phascum. 117. Sphærangium. 118. Microbryum. 119. Ephemerella.

51 Flocken *Ephemereæ*: bladen af ända upp till spetsen mycket lös cellväf, med ingen ell. nedom spetsen försvinnande nerv, tydligt ell. groft sågade. Mössan hättelik.

120. Physcomitrella. 121. Ephemerum.

## III. M. schizocarpi.

Kapseln öppnande sig regelbundet i 4, upptill sammanhängande flikar, mellan hvilka sporerna utsläppas.

## Y. Ord. ANDREÆACEÆ.

Svartaktiga ell. mörkbruna, tufvade och klynnegreniga bergmossor, med papillösa blad, med ell. utan nerv, af mot bladspetsen tätsittande, rundade celler. Kapseln kort skaftad, rund ell. äggformig. Mössan mycket liten och flygtig, hättelik.

52 Flocken *Andreææ*: karakt. som Ord.

122. Andreæa.

## 2 Fam. SPHAGNACEÆ.

123. Sphagnum.

## 3 Fam. HEPATICÆ.

## A. Ord. JUNGERMANNIACEÆ.

Stjelken oftast bladig, mer säll. bål-lik. Kapseln skaftad, upprät, ensam i skaftets spets och regelbundet öppnande sig i 4 flikar [undantag. *Fossombronia*]. Sporerna blandade med springtrådar. *Jungermannia* L.

a — *Foliosæ*: med tydligt skiljd stielk och 2sidiga blad.

α — Bladen underliggande \*); kaps. regelbundet öppnande sig i 4 fläkar.

- 1 Flocken *Gymnomitriæ*: bladen hela ell. i spetsen 2flikiga, med inga ell. mycket små stipler. Honbl. i *stielkens spets*; kalken *ingen ell. hopväxt med svepebladen*.  
124. *Gymnomitrium*. 125. *Sarcoscyphus*. 126. *Alicularia*. 127. *Southbya*.
- 2 Flocken *Jungermanniæ*: bladen hela ell. flikiga, med inga eller mycket små stipler [undantag. *Jungerm. æquisoliæ*]. Honbl. i *spetsen af stielken ell. en egen sidogren*; honkalken *fri*, merändels framskjutande mellan svepebladen.  
128. *Plagiochila*. 129. *Scapania*. 130. *Jungermannia*. 131. *Trigonanthus*. 132. *Sphagnoecetis*. 133. *Lophocolea*. 134. *Harpanthus*. 135. *Chiloscyphus*.
- 3 Flocken *Geocalyceæ*: bladen 2flikiga, med små stipler. Honkalken [ell. egentl. ett densamma oskiljaktigt omslutande fruktfäste] *omedelbart från stielkens baksida, på- likt nedhängande, köttig*, utan svepeblad, öppnande sig *breddvid sin fästpunkt*.  
136. *Geocalyx*.

β — Bladen öfverliggande \*); kaps. som i afd. — α.

- 4 Flocken *Trichomanoideæ*: bladen oftast *grundt flikiga ell. i spetsen fästade*; stipl. stora och breda, säll. lilla. Honkalken som i föreg. Flock ell. på en egen kort, småbladig gren från stielkens baksida.  
137. *Calypogeja*. 138. *Lepidozia*. 139. *Mastigobryum*. 140. *Physotium*.
- 5 Flocken *Ptilidiæ*: bladen jemte de mycket stora stiplerna *hårfint mångflikiga* [hos de Skand.]. Honbl. i stielkens spets ell. på en kort sidogren; honkalken i förra stillet sammanflytande med svepet, i det sednare fri och tydlig, med svepeblad vid basen.  
141. *Trichocolea*. 142. *Ptilidium*.
- 6 Flocken *Platyphylleæ*: bladen bestående af en stor öfre och en liten undre fläk. vanl. helbräddade. Stipl. inga ell. stora. Honkalken vanl. i spetsen af en kort sidogren, mer och mindre *plattad, upptill tvärhuggen, 2läppig*.  
143. *Radula*. 144. *Madotheca*.
- 7 Flocken *Jubuleæ*: bladen som i föreg. Flock. Stipl. tydliga, breda. Honkalken som i föreg. Flock, men *trind och uppblåst ell. 4—5kantigt veckad*.  
145. *Frullania*. 146. *Lejeunia*.

γ — Bladen underliggande; kaps. oregelbundet uppbristande.

- 8 Flocken *Codonieæ* \*\*): bladen grundt flerflikiga; utan stipler. Honkalken i stielkens spets. slutl. från sidan, *stor, vidgad klocklik*, med flikig mynning.  
147. *Fossombronina*.

b — *Frondosæ*: utan särskilda blad; stielken själf blad- ell. bål-lik, bildande ett plattadt och tunnt, mer ell. mindre flikigt stamblad.

- 9 Flocken *Diplomitriæ*: stambladet i kanten bugtigt ell. flikigt, med tydlig nerv på undre sidan. Svepet utgående från nervens öfre sida, flikigt. Kalken *stor, rör- ell. bägarlik*, inneslutande mössan.  
148. *Mörckia*.
- 10 Flocken *Haplolanææ*: stambl. i spetsen 2flikigt ell. strålförmigt, med mer och mindre tydlig nerv. Svepet från nervens öfre sida, kort och bägarlikt ell. felande. *Kalk O*.  
149. *Pellia*. 150. *Blasia*.

\*) Så kallas bladen, när de, sedda från stielkens öfre sida, hafva sin öfre kant dold under det närmast högre sittande bladets nedre kant; öfverliggande åter, då hvarje blad med sin öfre kant täcker det närmast högre sittande bladets nedre kant.

\*\*) Räkñas eg. och rätteligen till nästa afd. (*Frondosæ*), men då den enda hos oss förekommande arten alltid har tydl. skiljda blad, återfinnes den lättast bland *Foliosæ*.

- 11 Flocken *Aneureæ*: stambl. odeladt ell. mycket slikt—n. regelbundet perdeladt, utan nerv ell. [hos en art] med spår dertill. Svepet litet, utgående från stambladets kant och hopväxt med den n. cylindriska, fasta, vanl. håriga ell. knottiga mössan. Kalk 0.  
151. Aneura.
- 12 Flocken *Metzgeriæ*: stambl. klynnegrenigt deladt i jemnbreda stikar, med smal, tydlig nerv. Svepet stort, utgående från nervens baksida, omgifvande den klubblika, fasta och taggiga mössan. Kalk 0.  
152. Metzgeria.

#### B. Ordn. MARCHANTIA CÆ.

Stjelen alltid bål-lik, vanl. läderartad med porer på öfre sidan, fjäll på den undre. Kapslarne flere, i spelsen af ett gemensamt skaft, oftast på undre sidan af ett gemensamt, af skaftet uppburet fruktfäste, och öppnande sig oregelbundet i stikar ell. länder, säll. med lock. Sporerna blandade med springtrådar.

- 13 Flocken *Jecorariæ*: frukterna med sina svepen på undersidan af ett gemensamt skaftadt fruktfäste.  
153. Marchantia. 154. Fegatella. 155. Preissia. 156. Fimbriaria. 157. Duvalia. 158. Reboulia. 159. Sauteria.
- 14 Flocken *Lunulariæ*: frukterna utan gemensamt fäste, inom enskilda, fria, i spetsen af det gemensamma skaftet strål- ell. korsformigt ordnade svepen.  
160. Clevea.

#### C. Ordn. ANTHOCEROTACEÆ.

Stambladet (den bål-lik st.) strålformigt slikt, mjukt, nervöst, utan porer och fjäll. Kapseln kort skaftad från stambladets öfre sida, nåt- ell. smalt skidlik, öppnande sig från spetsen nedåt i 2:ne valvler, med ett hårfint centralstift. Sporerna blandade med springtrådar.

- 15 Flocken *Anthocerotæ*: karakt. som Ordn.  
161. Anthoceros.

#### D. Ordn. RICCIACEÆ.

Stambladet strålformigt slikt ell. klynnevis deladt i smalt jemnbreda stikar. Kapslarne [hos de Skand.] oskaftade, inneslutna i stambl., klotrunda, oordentligt uppbristande och uttömmande sporerne genom stambl:s öfre ell. undre yta. Sporerna utan springtrådar.

- 16 Flocken *Ricciæ*: karakt. som Ordn.  
162. Riccia.

# ÖFVERSIGT AF SLÄGTEN.

## I Fam. BRYACEÆ.

### A. HYPNACEÆ.

#### 1 Flokken *Hypnææ*.

- 1 HYLOCOMIUM. Stjelken mer och mindre regelbundet *pargrenig*, ofta med talrika parafyllier. Bladen *allsidigt utsperrade*, vid basen *svagt dubbelnerviga*, af mycket smala, jemnbreda, äfven i bashörnen *n. likformiga* celler. Tvåbyggare. Kapseln *kort och tjock*, ofta *n. rundad*, på *slätt* fruktskaft. — Pag. 1.
- 2 HYPNUM. Stjelken *oregelbundet* förgrenad, säll. *pargrenig*, *oftast utan* parafyllier. Bladen *all- ell. ensidiga*, med *ell. utan* nerv; cellerna smala, jemnbreda, slingriga. bashörncellerna *olikformiga* med de öfr. och *vanl. uppblåst vidgade*, *n. ensamma* klorofyllförande. Kaps. *cyindr.-afång*, på *slätt* skaft. — Pag. 2.
- 3 BRACHYTHECIUM. Grenarne *trinda* af *allsidigt* utstående ell. tilltrykta, säll. *svagt* ensidiga, *alltid med enkel nerv* försedda blad. Cellväfven *tät*, af *smakt rhomboidiskt* sexsidiga, klorofyllförande, *vid bashörnen* *vanl. quadratiska* celler. Fruktskaftet *dels sträft, dels slätt*. — Pag. 14.
- 4 CAMPTOTHECIUM. Grenarne *som hos föreg., gulaktiga och glänsande*. Bladen *starkt strimmiga*, med *enkel nerv*; cellerna mycket smala, jemnbreda, *vid bashörnen små, quadratiska*. Fruktskaftet *dels sträft, dels slätt*. — Pag. 18.
- 5 AMBLYSTEGIUM. Gren. *oftast trinda* af *allsidigt*, säll. *svagt ensidigt* [end. hos en art *plattade af 2sidigt*] vända, *enkelnerviga ell. nervlösa* blad. Dessas cellväf *lös och mjuk*, vid basen *alltid*, upptill *oftast parenkymatisk* [cell. *aldrig jemnbreda*], med klorofyll. Fruktskaftet *alltid slätt*. — Pag. 19.
- 6 PLAGIOTHECIUM. Gren. *plattade af 2sidiga raka ell. med spetsarne ensidigt böjda, nervlösa ell. vid basen otydligt dubbelnerviga* blad, utan parafyllier. Bladcellerna *smalt rhomboidiska—jemnbreda*, med klorofyll. Fruktsk. *alltid slätt*. — Pag. 22.

#### 2 Flokken *Eurhynchieæ*.

- 7 RHYNCHOSTEGIUM. Stj. *oregelbundet* förgrenad ell. *oordentligt pargrenig*. Bladen *oftast med nerv, helbräddade ell. otydligt* [undant. *R. ruscif.*] *sågade*; cellväfven till största delen af *långa och smala, rhomboidiskt sexsidiga—n. jemnbreda* celler. *Sambbyggare* [undant. *R. depress.*]. Fruktskaftet *slätt*. — Pag. 24.
- 8 EURHYNCHIUM. Som föreg. Bladen *rundtom tydl. sågade*, af *förtjockade* celler. *Tvåbyggare* [undant. *E. Teesd.*] Fruktskaftet *sträft* [undant. art. 9—12]. — Pag. 25.
- 9 THAMNIUM. Hufvudgrenarne [från en krypande hufvudstam] *upprätta, upptill trädlikt förgrenade*. Bladen med *nerv*; cellväfven *tät, af små quadratiska ell. rundade* celler *upptill*, *smalt aflånga—rektangulära* vid basen. Tvåbyggare. Fruktskaftet *slätt*. — Pag. 28.

### 3 Flocken *Pylaisieæ*.

a — Bladen med tydlig enkel nerv.

- 10 HOMALOTHECIUM. Bladen *starkt strimmiga*, med i *spetsen* försvinnande nerv; cellväfven som hos *Camplothec*. Tvåbyggare. Kaps. på skaft *från stjelken*, med yttre perist. *längre* än det inre, hvilket saknar cilier. — Pag. 28.
- 11 ISOTHECIUM. Bladen *ostrimmade*, med nerv *till ell. något ofvan midten*; cellerna smala, vid bashörnen kvadratiske. Tvåbyggare. Kaps. på skaft *från grenarne*, med yttre och inre perist. *jemnhöga*; det sednare med cilier. — Pag. 28.

b — Bladen nervlösa ell. med otydlig dubbelnerv vid basen.

- 12 ORTHOTHECIUM. Bladen vid basen otyd. dubbelnerviga ell. n. nervlösa, *oftast starkt strimmiga*. Tvåbyggare. Mössan *kilen*. Yttre och inre perist. n. jemnhöga; det sednare med korta ell. inga cilier. — Pag. 29.
- 13 PYLAISIA. Bladen af *mycket lät* cellväf, nervlösa, *ostrimmade*. Sambyggare. Mössan täckande *halfva kaps*. Locket kägellik, *utan spröt*. Perist. som hos föreg. — Pag. 30.
- 14 THEDENIA. Bladen af *lös* cellväf, för öfr. som hos föreg. Sambyggare. Mössan *stor, täckande hela kaps*. Locket koniskt, med spröt. Inre perist. med korta cilier. — Pag. 30.

### 4 Flocken *Cylindrothecieæ*.

a — Bladen nervlösa.

- 15 CYLINDROTHERCIUM. Stj. n. *upprät, pargrenig*. Bladen *ostrimmade*. Kaps. på skaft från stj. och hufvudgrenarne, utdraget cylindrisk, med dubb. peristom. Mössan täckande *hela kaps*. — Pag. 30.
- 16 PLATYGYRIUM. Stj. *krypande, n. pargrenig*, med korta, uppstigande ell. upprätta grenar. Bladen *ostrimmade*. Kaps. på skaft från stj., aflång, med dubb. peristom. Mössan täckande *halfva kaps*. — Pag. 30.
- 17 LEUCODON. Stj. *krypande*, delad i *båglik* uppstigande grenar. Bladen *strimmiga*. Kaps. på skaft från grenarne, aflång, med *enkelt* peristom af 16, djupt 2delade tänder. Mössan täckande *hela kaps*. — Pag. 31.

b — Bladen med tydlig nerv.

- 18 CLIMACIUM. Stj. *krypande*, med *upprätta, upptill trädlikt förgrenade* hufvudgrenar. Kaps. på skaft från grenarne, cylindrisk aflång; inre peristomets tänder n. *fria*, långa och längs midten håliga ell. spruckna. Mössan täckande *hela kaps*. — Pag. 31.
- 19 LESCUREÆ. Oregelbundet *pargrenig*, med talrika parasfyller. Kaps. på skaft från stj., ovalt aflång; inre peristomets tänder 16, vid basen förenade medelst en smal hinna, upptill oordenligt *flikandade*. Mössan täckande *halfva kaps*. — Pag. 31.
- 20 ANTITRICHIA. Oordentligt *pargrenig*. Kaps. på skaft från grenarne, oval; inre peristomets tänder 16, *fria*. Mössan som hos föreg. — Pag. 31.

## B. — NECKERACEÆ.

### 5 Flocken *Neckereæ*.

- 21 NECKERA. Bladen *nervlösa ell. med kort dubbelnerv*. Det inre peristomets tänder 16, hårlika, kortare än de yttre, och vid basen förenade medelst en *smal* hinna, utan cilier. — Pag. 32.
- 22 HOMALIA. Bladen med *utdragen, enkel* nerv. Det inre peristomets tänder 16, *längre* än de yttre, nedtill förenade medelst en *bred*, veckad hinna; cilier korta ell. inga. — Pag. 33.



## C. — FABRONIACEÆ.

6 Flocken *Habrodontææ*.

23 HABRODON. Karakt. som flocken. — Pag. 33.

7 Flocken *Myrinieæ*.

24 MYRINIA. Karakt. som flocken. — Pag. 34.

## D. — PTEROGONIACEÆ.

8 Flocken *Pterogoniææ*.

25 PTEROGONIUM. Stj. krypande, med *upprätta, knippelikt delade* grenar. Bladnerven *dubbel, mycket kort och otydlig*. Kaps. på skaft från *kufvudgrenarne*. Inre peristomets tänder vid basen förenade medelst *en leml. bred hinna*. Mössan gles hårig. — Pag. 34.

26 PTERIGYNANDRUM. Stj. och grenarne *trådlika, nedliggande*. Bladnerven *enkel*, mycket kort, stund. omärklig. Kaps. på skaft från *stjelken*. Inre peristomets tänder *n. utan* hinna vid basen. Mössan glatt. — Pag. 34.

## E. — LESKEACEÆ.

9 Flocken *Thujidieæ*.

27 THUJIDIUM. Stj. *oftast regelbundet engång—3dubb. pargrenig*. Stjelkl. starkt strimmiga; nerven *lång och stark, enkel*; cellerna i bladspetsen rundadt, vid basen utdraget sexsidiga. Inre perist. med cilier. — Pag. 34.

28 HETEROCLADIUM. Stj. *mer och mindre oordentligt pargrenig*. Bladen med *kort och svag, enkel ell. dubbel* nerv; cellerna i bladets *midt smala, jemnbreda*, vid kanten rundade ell. rundadt sexsidiga. Inre perist. med cilier. — Pag. 35.

10 Flocken *Pseudoleskeææ*.

29 PSEUDOLESKEA. Karakt. som flocken. — Pag. 36.

11 Flocken *Leskeææ*.

30 ANOMODON. Bladen med *stark, enkel* nerv, upptill med *rundade* celler. Tvåbyggare. Kaps. på skaft *från grenarne*; inre peristomets tänder 16, *hårlika, fästade* skiftevis vid de yttres kant, dels med, dels utan cilier. — Pag. 37.

31 LESKEA. Bladen *som hos föreg.* Sam- ell. tvåbyggare. Kaps. på skaft *från stjelken*; inre perist. *utan* cilier. — Pag. 38.

MYURELLA. Bladen *tätt tegellagda, vid basen otydligt dubbelnerviga ell. n. nervlösa*, upptill med *rhombiska* celler. Tvåbyggare. Kaps. på skaft *från stjelken*; inre perist. *med korta* cilier. — Pag. 38.

## F. — HOOKERIAACEÆ.

12 Flocken *Hookerieææ*.

33 HOOKERIA. Karakt. som flocken. — Pag. 39.

## G. — FONTINALACEÆ.

13 Flocken *Dichelymeææ*.

34 DICHELYMA. Karakt. som flocken. — Pag. 39.

14 Flocken *Fontinaleææ*.

35 FONTINALIS. Karakt. som flocken. — Pag. 40.

## H. — BUXBAUMIACEÆ.

15 Flocken *Buxbaumieæ*.

- 36 BUXBAUMIA. Bladen tunna, fransigt likiga, vid fruktens utveckling bortdöda. Kapseln på *udraget tjockt skaff*, sned, nedåt buktig; yttre peristomet kort, fastväxt vid det kägelformiga inre, ell. fritt och bestående af 3—4 *kransar* oregelbundna tänder. — Pag. 41.
- 37 DIPHYSCIUM. Kapseln *oskastad*, insänkt mellan tunna borstlika perichætialblad, sned, nedåt buktig, uppåt afsmalnande och trind; yttre peristomet mycket kort, af 16, *otydliga* tänder; det inre kägelformigt. — Pag. 41.

## I. — GEORGIACEÆ.

16 Flocken *Tetraphideæ*.

- 38 TETRAPHIS. Stj. *tydlig, udragen*. Cellväfven i *bladens öfre del tät*, af rundadt sexsidiga celler, *mot basen lösare*, af rektangulära celler. Kaps. *cylindrisk*, till *midten* omgifven af mössan. — Pag. 41.
- 39 TETRODONTIUM. Stj. *mycket kort, knopplik*. Alla bladcellerna *sexsidiga*. Kapseln *oval*, ända till *basen* omsluten af mössan. — Pag. 42.

## K. — POLYTRICHACEÆ.

17 Flocken *Polytricheæ*.

- 40 POLYTRICHUM. Bladen *tjocka och fasta*, på *hela öfre sidan* beklädda med långsgående lameller; basen hinneaktig, omslidande. Tvåbyggare. Kapseln *4—6kantig*, med *bihang* vid basen; peristomets tänder 32—64. Mössan *starkt och tät hårig*. — Pag. 42.
- 41 POGONATUM. Bladen *som hos föreg.* Tvåbyggare. Kapseln *trind*, cylindrisk—klocklik, *utan bihang* vid basen; peristomet af 32 tänder. Mössan *som hos föreg.* — Pag. 43.
- 42 OLIGOTRICHUM. Bladen *som hos föreg.*, med lameller *blott längsefter* nerven. Tvåbyggare. Kapseln *som hos föreg.* Mössan *glatt ell. gleshårig*. — Pag. 44.
- 43 CATHARINEA. Bladen *tunna*, icke slidomfattande, *för öfr. som hos föreg.* Samell. tvåbyggare. Kapseln *som hos föreg.* Mössan *glatt*, endast upptill beströdd med glesa hår. — Pag. 44.

## L. — BRYACEÆ.

18 Flocken *Timmieæ*.

- 44 TIMMIA. Peristomets inre tänder nedtill förenade medelst en bred hinna och till en del, 2—3 tillhopa, sammanhängande upptill. — Pag. 45.

19 Flocken *Bartramieæ*.

- 45 BREUTELIA. Bladen *starkt mångstrimmiga*. Hanblirna *skiflika*, på *egna stånd*. Kaps. *hängande*. Peristomet *dubbelt*; det yttres tänder 16, fria, syllika; det inre af 16 tänder med mellanliggande ciller. — Pag. 46.
- 46 PHILONOTIS. Bladen ågrunda—lancettlika, *ostrimmade ell. vid basen 2strimmiga*. Hanblirna *som hos föreg.* Kaps. *upprät*; perist. *som hos föreg.* — Pag. 46.
- 47 CONOSTOMUM. Stj. *5kantig af i tydliga rader ordnade* blad. Hanblirna *som hos föreg.* Kaps. *upprät*. Perist. *enkelt*, af 16, upptill i kägelform sammanhängande tänder. — Pag. 47.
- 48 BARTRAMIA. Bladen *borst- ell. lancettlikt syllika*. Hanblirna *knopplika*, på *samma stånd* som honblirna [hos de Skand.]. Perist. *dubbelt* [undant. *B. breviseta*]; det yttres tänder 16, fria, syllika; det inre bestående af en i 16 tänder likad hinna, stund. otydligt. — Pag. 47.

20 Flocken *Aulacomnieæ*.

- 49 GYMNOCYBE. Cellväfven i bladens *öfre del* tät, af små rundade celler, mot basen lös, af stora, tunna och tomma, uppblåsta, rektangulära celler i 2 ell. 3 lager. Tvåbyggare. Hanblirna *skiflika*, med *klubblika* safttrådar. Det yttre peristomets tänder 16, spetsiga; det inre 16, med mellanligg. släta cilier. — Pag. 48.
- 50 AULACOMNIUM. Cellväfven i *hela* bladet tät, af små rundade celler. Tvåbyggare. Hanblirna *knopplika*, med *hårlika* safttrådar. Perist. som hos föreg. — Pag. 48.

21 Flocken *Meesieæ*.

- 51 PALUDELLA. Bladen *papillösa*, af *tät* cellväf. Tvåbyggare. Hanblirna *skiflika*, med *klubblika* safttrådar. Kapseln *medt aflång*, n. upprät; yttre peristomets tänder *spetsiga*, *jemnhöga* med det inre. — Pag. 48.
- 52 MEESIA. Bladen *glatta*, af *tät*, finmaskig cellväf. Två- ell. mångbyggare, ell. med 2könade blr. Hanblirna *som hos föreg.* Kaps. *medt päronlik*; yttre peristomets tänder *trubbiga*, *mycket kortare* än det inre, medelst en nättlik flygtig väfnad *förenade* tänder. — Pag. 49.
- 53 AMBLYODON.\*) Bladen *glatta*, af *mycket lös*, grofmaskig cellväf. Mångbyggare. Hanblirna n. *skiflika*, med *klubblika* safttrådar. Kaps. och yttre perist. *som hos föreg.*; det inre peristomets tänder långa, spetsiga, sinsemellan *fria*. — Pag. 49.
- 54 CATOSCOPIUM. Bladen *glatta*, af *tät*, finmaskig cellväf. Tvåbyggare. Hanblirna *knopplika*, med *hårlika* safttrådar. Kaps. *medt rundad*, lutande; peristomets yttre tänder trubbiga, korta och flygtiga, de inre otydliga, ofullständiga. — Pag. 49.

22 Flocken *Mnieæ*.

- 55 CINCLIDIUM. Det yttre peristomets tänder korta, det inre *upptill hopväxta i form af ett hvalf* ell. en *höghvalfd kägla*. Mössan *kägellik*. — Pag. 50.
- 56 MNIUM. Det inre peristomets tänder 16, *upptill fria*, med mellanliggande släta cilier. Mössan *ensidig*. — Pag. 50.

23 Flocken *Bryeæ*.

- 57 ZIERIA. Nyskotten *från stjelkens spets*, trinda. Bladen ovala ell. äggrunda, *tätt tegellagda*, af *mycket lös*, *sexsidigt rhombisk* cellväf. Tvåbyggare. Kapseln *päron-ell. klubblik*, nedböjd ell. lutande; det inre peristomets tänder längre än det yttres, med *mycket korta och släta* ell. *inga* cilier. — Pag. 54.
- 58 ANOMOBRYUM. Nyskotten *som hos föreg.* Bladen som hos föreg., men af *upptill mycket smala*, *jemnbreda* celler. Tvåbyggare. Kapseln *aflång*, nedböjd; det inre peristomets tänder kortare än det yttres; cilierna *med skarpa sidotaggar*. — Pag. 55.
- 59 BRYUM. Nyskotten *som hos föreg.* Bladen *oftast ovala* ell. *bredare*, n. alltid utstående, med *upptill sexsidigt rhombiska*, nedtill utdraget sexsidiga celler. Två- ell. sambyggare, ell. med 2könade blr. Kaps. *klubb-ell. päronlik*, stund. n. *klotrund, lutande—hängande*; det inre peristomets tänder kortare än det yttres, ell. af samma längd; cilierna *med skarpa sidotaggar* ell. i *lederna knutigt vidgade*, säll. *felande*. — Pag. 55.
- 60 WEBERA. Nyskotten *från stjelkens bas* [undant. *W. Ludwigii*]. Bladen *lancettlika*, *säll. bredare*, med *upptill smala*, n. *jemnbreda*, mot basen utdraget sexsidiga celler. Två- ell. sambyggare, säll. med 2könade blr. Kaps. *päronlik*—n. *cylindrisk*, *nedböjd* ell. *lutande*; inre peristomets tänder icke längre än det yttres, med *släta*, *ofta felande* ell. *mycket korta* cilier. — Pag. 62.
- 61 LEPTOBRYUM. Nyskotten *som hos föreg.* Bladen *borstfint syllika*, med mycket bred nerv, *smala*, n. *öfverallt jemnbredt sexsidiga* celler. Blirna 2könade. Kaps. *päronlik*, *nedböjd*; det inre peristomets tänder kortare än det yttres; cilierna *med skarpa sidotaggar*. — Pag. 65.

\*) Föres af flere nyare förf., på grund af bladens cellväf, till *Funariaceæ*.

24 Flocken *Pleurobryæ*.

62 MIELICHHOFERIA. Karakt. som flocken. — Pag. 65.

## M. — FUNARIACEÆ.

25 Flocken *Physcomitriæ*.63 FUNARIA. Kapseln på *smalt* skaft, *snedt påronformig* och med *dubbelt* peristom, eller regelbunden med otydligt peristom. Mössan *ensidig*, omslutande *större delen* af kaps. — Pag. 66.64 PHYSCOMITRIUM. Kapseln på *kort och tjockt* skaft, *upprät och regelbunden, klotrund, utan* peristom. Mössan *hättelek*, vid basen *flikig*, knappt omslutande *halva* kapseln. — Pag. 67.65 PYRAMIDULA. Kaps. *som hos föreg., rundadt påronformig*. Mössan *upplåst skantig*, inneslutande *hela* kaps. och öppnande sig *med en längdspricka på sidan*, men hophängande *upptill och nedtill*. — Pag. 67.26 Flocken *Disceliæ*.

66 DISCELIUM. Karakt. som flocken. — Pag. 67.

## N. — SPLACHNACEÆ.

27 Flocken *Splachneæ*.67 SPLACHNUM. Bladens cellväf *mycket lös och grofmaskig*. Oftast 2byggare. Kapseln *vanl. mycket långt* [2—6 tum] skaftad; bihanget *oftast stort, flere gånger* vidare än kaps. [undant. *S. Wormskj.*]. Mössan *hättelek*. — Pag. 67.68 TETRAPLODON. Bladens cellväf *mindre lös och grofmaskig*. Sambyggare. Kapseln på *föga utdraget* [säll. tumshögt] skaft; det *af långt* ell. omv. äggformiga bihanget *föga vidare* än kaps. Mössan *slutl. ensidigt klufven*. — Pag. 68.28 Flocken *Tayloriæ*.69 TAYLORIA. Bladen *spetsiga*. Sambyggare. Kapseln *teml. långt* skaftad, med omv. kägellik hals, *16 ell. 32 parvisa*, i torrt tillstånd *utåt nedböjda* tänder. Mössan *hättelek*. — Pag. 69.70 DISSODON. Bladen *rundtrubbiga*. Mångbyggare. Kapseln *som hos föreg., med 16*, i torrt tillstånd *upprätta* tänder. Mössan *hättelek*. — Pag. 69.71 OEDIPODIUM. Bladen *rundtrubbiga*. Mångbyggare. Kaps. på ett *tjockt* skaft, *klotrund, med lång hals, utan* peristom. Mössan *ensidig*. — Pag. 70.

## O. — SCHISTOSTEGACEÆ.

29 Flocken *Schistostegeæ*.

72 SCHISTOSTEGA. Karakt. som flocken. — Pag. 70.

## P. — GRIMMIACEÆ.

30 Flocken *Encalypteæ*.

73 ENCALYPTA. Karakt. som flocken. — Pag. 70.

31 Flocken *Orthotricheæ*.74 ORTHOTRICHUM. Bladen *torra n. raka*; cellerna i deras nedre del närmast *nerven breda, rektangulära, vattenklara*, de vid kanten *kvadratiske, mindre tria* än i följd. slägte. Kapseln *dels längre, dels kortare* än skaftet, *slät ell. färad*, med enkelt ell. dubbelt [de inre, oftast härlika tänd. 8 ell. 16], sällan [*O. gymnost.*] utan peristom. Mössan *med raka* hår, *stund. glatt*. — Pag. 72.

- 75 ULOTA. Bladen *krusiga* [undant. *U. Hutchinsiae*]; cellerna i deras nedre del närmast nerven *småll jemnbreda*, *fyllda med klorofyll*, vid kanten stora, *kvadratiske*, *genomskeinliga*. Kapseln *kortare* än sitt skaft, *färad eller strimmig*, med enkelt ell. dubbelt peristom [de inre hårlika tänder, alltid 8]. Mössans bår *krokiga*, vanl. gula. — Pag. 77.

### 32 Flocken *Zygodonteæ*.

- 76 ZYGODON. Stjelkarne *vid basen* förenade medelst rotludd. Kapseln *utdraget* skaftad, *afång*, *något* reffad. — Pag. 79.
- 77 AMPHORIDIUM. Stjelkarne *ända upp till toppen* förenade medelst rotludd. Kapseln *kort* skaftad, *urnelik*, *starkt* reffad. — Pag. 79.

### 33 Flocken *Ptychomitriæ*.

- 78 PTYCHOMITRIUM. Sambyggare. Kapseln *långt* skaftad, med n. till basen *2delade* tänder. Mössan näende ned på *halfta* kapseln. — Pag. 79.
- 79 COSCINODON. Tvåbyggare. Kapseln *mycket kort* skaftad, n. *insänkt mellan bladen*, med *gallerlikt håliga* tänder. Mössan omslutande *hela* kapseln. — Pag. 80.

### 34 Flocken *Hedwigieæ*.

- 80 HEDWIGIA. Utan trådsmla skott. Bladen *starkt* papillösa, med vanl. *genomskeinlig och hvit* spets. Kapseln n. *oskaftad*. Mössan *hättelik*. — Pag. 80.
- 81 HEDWIGIDIUM. Med trådsmla skott. Bladen *omärkligt* papillösa, *icke* *genomskeinliga* i spetsen. Kapseln *tydligt* skaftad. Mössan 2—3klufven ell. ensidig. — Pag. 80.

### 35 Flocken *Grimmieæ*.

- 82 GRIMMIA. Bladbasens celler *kvadratiske—rektangulära*, med raka väggar. Sam- och tvåbyggare. Kaps. vanl. oval, med *hela ell. oordenligt klufna och håliga*, säll. [hos *G. anodon*] *felande* tänder. — Pag. 80.
- 83 RACOMITRIUM. Bladbasens celler *småla, jemnbreda*, med *ojemna, likasom anfrätta* väggar. Tvåbyggare. Kapseln oval—*afång*, med långa, n. till basen 2—3delade tänder. — Pag. 85.

### 36 Flocken *Cinclidoteæ*.

- 84 CINCLIDOTUS. Tvåbyggare. Kapseln *äggformig*, kort skaftad. — Pag. 87.

## Q. — POTTIACEÆ.

### 37 Flocken *Trichostomeæ*.

- 85 TORTULA. Bladen dels breda, dels småla, upptill med *rundade ell. kort sexsidiga* celler, *papillösa*. Två- ell. sambyggare; säll. med 2kånade blr. Kaps. *afång* ell. cylindrisk, stund. något krökt, med 32, långa och hårlika, *skruflikt sammantridna* tänder. — Pag. 88.
- 86 DESMATODON. Bladen *afång*—*ägggrunda*, trubbad med ell. utan udd, *papillösa*. Sambyggare. Kaps. oval ell. *afång*, med 32, parvisa, *raka ell. svagt vridna*, hårlika tänder. — Pag. 93.
- 87 TRICHOSTOMUM. Bladen *lancettlika*—n. jemnbreda, *för öfr. som hos Tortula*. Tvåbyggare [de Skand. arterna]. Kapseln *afång* ell. cylindrisk, med 32, parvisa, *raka* tänder. — Pag. 94.
- 88 LEPTOTRICHUM. Bladen oftast syllika, upptill med *rektangulära—rhomboidiska* celler, *glatta*. Två- och sambyggare. Kapseln *som hos föreg.* — Pag. 95.

### 38 Flocken *Ceratodonteæ*.

- 89 TRICHODON. Bladen småla, upptill med *lång*, *småll jemnbreda* celler, *glatta*. Kapseln cylindrisk, något krökt, *slät*. — Pag. 96.

- 90 CERATODON. Bladen smala, upptill med *rundadt* *kvadratiske* celler, *papillösa*. Kapseln aflång, något krökt, *reflad*. — Pag. 96.

39 Flocken *Distichieæ*.

- 91 DISTICHUM. Karakt. som flocken. — Pag. 96.

40 Flocken *Pottieæ*.

- 92 EUCLADIUM. Bladen *smala*, tydligt *papillösa*. *Tvåbyggare*. Kapseln ovalt aflång, med 16, i *spetsen* 2—3klufna ell. oordentligt *håliga* tänder. — Pag. 97.

- 93 DIDYMODON. Bladen *oftast mycket smala*, *starkt* *papillösa*. *Tvåbyggare*, ell. med 2könade blr. Kapseln aflång—cylindrisk, med 32, *parvisa*, *raka* och *hårliga* tänder. — Pag. 97.

- 94 POTTIA. Bladen *breda*, *något* *papillösa*. *Sambyggare*. Kapseln oval ell. omv. äggformig, *utan peristom* ell. [subg. *Anacalypta*] med 16, *hela* ell. oordentligt *klufna* tänder. — Pag. 98.

R. — SELIGERIAEÆ.

41 Flocken *Blindieæ*.

- 95 BLINDIA. *Tvåbyggare*. Kapseln *utdraget* *skaftad*, med n. odelade, stund. *håliga* tänder. Mössan *stor*, nående ned på *halfva* kapseln. — Pag. 99.

- 96 STYLOSTEGIUM. *Sambyggare*. Kapseln n. *oskaftad*, *insänkt* mellan toppbladen, *utan peristom*. Mössan *yllest liten*. — Pag. 100.

42 Flocken *Seligerieæ*.

- 97 SELIGERIA. *Sambyggare*. Kapseln *rundadt* *päronlik*, med *breda* och *trubbiga* [hos *S. Donn*. inga] tänder. — Pag. 100.

S. — FISSIDENTACEÆ.

43 Flocken *Fissidentææ*.

- 98 OCTODICERAS. Vattenmossa, med *grenig* *stjelk*. *Sambyggare*. Kapseln på *omärkligt* *skaft från stjelkens sida*, mycket *liten*, omv. *kägellik*, med *korta* och *breda*, n. *tvåhuggna*, *oregelbundet* 2—3klufna och *håliga* tänder. Mössan *hättelek*. — Pag. 101.

- 99 FISSIDENS. Sten- ell. *jordmossor*, med *enkel* ell. *föga* *grenig* *stjelk*. *Sam-* ell. *tvåbyggare*. Kapseln *vanl. utdraget* *skaftad*, *dels från stjelkens spets*, *dels från dess sida*, n. *urnelik*, med *till midten regelbundet* 2klufna tänder. Mössan *oftast* *ensidig*. — Pag. 101.

T. — LEUCOBRYACEÆ.

44 Flocken *Leucobryææ*.

- 100 LEUCOBRYUM. Kapseln aflång, *sned* och *lutande*, *äldre* *reflad*, med *sylsprötadt* *lock*. — Pag. 103.

U. — WEISIAEÆ.

45 Flocken *Dicraneæ*.

a — Bladen *glatta*; mössan i kanten *fransig*.

- 101 CAMPYLOPUS. Bladen *syllika*, med *bred* *nerv*, af *rektangulära*, mer *sällan* *kvadratiske* celler. *Tvåbyggare*. Kapseln på *bågligt nedböjdt* *skaft*, *regelbunden*, *oval*, *vanl. strimmig*, med *till midten* 2klufna tänder. — Pag. 103.

b — Bladen *glatta*; mössan i kanten *helbräddad*.

- 102 DICRANODONTIUM. Bladen som hos *Campylopus*. *Tvåbyggare*. Kaps. på *bågligt nedböjdt* *skaft*, *regelbunden*, aflång, *slät*, med n. *till basen* *ojemnt* 2delade tänder. — Pag. 104.

- 103 DICRANUM. Vanl. *stora* mossor, med *ensidiga*, säll. allsidigt utstående blad, af vid basen smalt jemnbreda, i *bashörnen* *kvadratiske* bruna celler. Två- ell. sambyggare. Kaps. n. regelbunden och *upprät*, ell. sned och lutande, med till *midten* 2klufna tänder. — Pag. 104.
- 104 DICRANELLA. Oftast *små* mossor, med *allsidigt* *utsperrade* ell. *ensidigt* *böjda* blad, af vid basen *rektangulära* celler, utan olikbildade bashörnceller. Två- ell. sambyggare. Kapseln lutande, sned, säll. regelbunden, *upprät*, med tänder som hos föreg. — Pag. 110.
- 105 ÅNGSTRÖMIA. Bladen samlade i den vanl. *enkla*, *trådlika* *stjelkens* *spets*, *tegelagda*. Tvåbyggare. Kapseln regelbundet *oval* ell. *n. klotrund*, *upprät*, utan *hals*, med långa, spetsade, *hela* ell. *oordentligt* *sprickiga* och *klufna* tänder. — Pag. 112.
- 106 TREMATODON. Bladen *upprätta* ell. *utstående*. Sambyggare. Kapseln *n. cylindrisk* ell. *smalt päronformig* af en *utdragen* *hals*, något sned och krökt, med tänderna yngre längs midten sprickiga, slutl. *delade* *n. till basen*, eller *alltid* *hela*. — Pag. 112.
- c — Bladen oftast papillösa; mössans kant helbräddad.
- 107 DICHODONTIUM. Bladen *utsperrade*, af *små*, rundadt *kvadratiske* celler längs kanten och i hela öfre delen, *starkt* *papillösa*. Tvåbyggare. Kaps. kort äggformig, lutande, utan *fästknöl* vid basen, *slät*, med till nedom midten 2—3klufna tänder. — Pag. 112.
- 108 CYNODONTIUM. Bladen *utstående*, torra krusiga, mer och mindre papillösa, säll. glatta. Sambyggare. Kaps. aflång—oval, vanl. något krökt och med *fästknöl* vid basen, *ofta* *färdad*, med ojemnt 2klufna tänder. — Pag. 112.

#### 46 Flocken *Weisieæ*.

- 109 WEISIA. Sambyggare, säll. med 2könade blr. Kapseln på *tydligt*, *stund. långt* skaft från *stjelkens* *spets*, aflång ell. päronlik, med längre ell. kortare sylsprötadt lock, 16 tänder. — Pag. 114.
- 110 ANOECTANGIUM. Tvåbyggare. Kapseln på *tydligt* skaft från *stjelkens* *sida*, aflång, med långt sylsprötadt lock, utan peristom. — Pag. 115.
- 111 GYMNOSTOMUM. Sam- ell. tvåbyggare. Kapseln på *tydligt* skaft från *stjelkens* *spets*, aflång—oval, med affallande, vanl. sprötspetsadt lock, utan peristom. — Pag. 116.
- 112 SYSTEGIUM. Sambyggare. Kapseln *n. oskafad*, *insänkt* mellan bladen, *klotrund*, med tydligt, men quarsittande lock utan spröt; peristom 0. — Pag. 117.

### V. — ARCHIDIACEÆ.

#### 47 Flocken *Archidieæ*.

- 113 ARCHIDIUM. Sambyggare. Kapseln klotrund, med få, men jemförelsevis stora sporer. — Pag. 117.

### X. — PHASCACEÆ.

#### 48 Flocken *Bruchieæ*.

- 114 SPORLEDERA. Blrna 2könade. Kapseln glanslös. — Pag. 117.

#### 49 Flocken *Pleuridieæ*.

- 115 PLEURIDIUM. Sambyggare, ell. med 2könade blr. Kapseln starkt glänsande. — Pag. 118.

#### 50 Flocken *Phasceæ*.

- 116 PHASCUM. Förgrödden (bestående af en mängd ytterst fina, greniga, konfervlika trådar) *snart försvinnande*. Sambyggare. Kapseln klotrund med *spets* ell. oval. Mössan *ensidig*. — Pag. 118.

- 117 SPHERANGIUM. Förgrodden *som hos föreg.* Sambyggare. Kapseln klotrund - *utan spets.* Mössan *håttelik*, ytterst liten och flygtig. — Pag. 119.
- 118 MICROBRYUM. Förgrodden *som hos föreg.* Sambyggare. Kapseln n. äggformig *med spets.* Mössan *håttelik*, *stor* (sträckande sig ned på halfva kaps.). — Pag. 119.
- 119 EPHEMERELLA. Förgrodden *fortvarande ännu vid fruktmognaden.* Bladen n. *jembreda.* Tvåbyggare. Kapseln n. klotrund, med sned udd. Mössan *ensidig.* — Pag. 119.

#### 51 Flocken *Ephemereæ.*

- 120 PHYSCOMITRELLA. Förgrodden *snart försvinnande.* Bladen *breda, med under spetsen försvinn. nerv.* Sambyggare. Kapseln n. oskaftad, med en kort spets. — Pag. 119.
- 121 EPHEMERUM. Förgrodden *fortvarande ännu vid fruktmognaden.* Bladen *teml. smala*, [hos den Skand. arten] *nervlösa.* Sambyggare. Kapseln oskaftad, klotrund, med kort, föga sned udd, — Pag. 120.

### Y. — ANDREÆACEÆ.

#### 52 Flocken *Andreææ.*

- 122 ANDREÆA. Karakt. som flocken. — Pag. 120.

## 2 Fam. SPHAGNACEÆ.

- 123 SPHAGNUM. Karakt. som Familjen. — Pag. 123.

## 3 Fam. HEPATICÆ.

### A. — JUNGERMANNIACEÆ.

#### 1 Flocken *Gymnomitriæ.*

- 124 GYMNOMITRIUM. Stj. *tagelsmal, trind ell. något plattad.* Bladen *mycket lått tegellagda, 2flikiga*; utan stipler. Kalk 0. Mössan insänkt i svepet. — Pag. 128.
- 125 SARCOSEYPHUS. Stj. *tagelsmal—flerdubbelt gröfre, trind ell. plattad.* Bladen tydl. 2radiga, *2flikiga*; utan stipler. Kalken *omsloten af och hopväxt i bägarform med svepet*, samt öppnande sig med tänder, dolda i svepets mynning. — Pag. 128.
- 126 ALICULARIA. Stj. *plattad af 2sidigt utbredda ell. mot hvarandra hoplagda, rundade, hela ell. i spetsen urnupna* blad. Stipl. *små, syllika.* Kalken *innesluten i och hopväxt med svepet*, samt öppnande sig med derinom dolda tänder. — Pag. 129.
- 127 SOUTHYA. Stj. och bladen *som hos föreg.*; de sednare cirkelrunda, *hela.* Stipl. 0 ell. sammanväxta med bladen. Kalken *omsloten af och nedtill hopväxt med svepet.* — Pag. 130.

#### 2 Flocken *Jungermannieæ.*

a — Kalken plattad, med tvärhuggen, icke hopdragen mynning.

- 128 PLAGIOCHILA. Bladen *odelade, rundade—vigglika.* Stipl. 0 [hos de Skand. arterna]. Två svepeblad större än de öfriga. Kalken i stjelkens tudelning ell. på en sidogren. — Pag. 130.



- 129 SCAPANIA. Bladen *klufna* i 2, ända från basen *mot hvarandra hopvikna*, oftast olikstora *flikar*. Stipl. 0. Svepebl. 2, lika *stjelkl.* Kalken i *stjelkens spets*, *med* i yngre tillstånd *nedböjd mynn.* — Pag. 131.

b — Kalken *trind* ell. *3kantig*, *vanl.* med *hopdragen mynning*.

a — Kalken i *stjelkens spets* ell. endast genom *nyskotts utväxande sidofästad*.

- 130 JUNGERMANNIA. Bladen *hela*, ell. 2—*flerklufna*, *stund. delade n. till basen*; med ell. utan *stipler*. Svepebl. *flere*, mer ell. *mindre olika stjelkl.* Kalken *ägg-*, *rör-* ell. *påronformig*, mer och *mindre veckig*, med *flikad mynning*. — Pag. 133.

β — Kalken på en *egen*, *vanl.* kort *sidogren* [undant. *Lophocolea*, som *stund. äfven bär kalken i toppen*].

- 131 TRIGONANTHUS. Bladen *2klufna* ell. *2tandade*; med ell. utan *stipl.* Kalken på en *egen*, kort *sidogren*, *afång—cylindrisk*, med *hopdragen*, *vanl. veckig* och *3kantig mynning*. — Pag. 142.

- 132 SPHAGNOECETIS. Bladen *runda* och *hela*, ell. de öfre *olikformiga*, *uddspetsiga* ell. 2—*3tandade*; *stipl.* 0 ell. *otyd.* Kalken på en kort, *småbladig*, *framåt uppböjd* *gren från stjelkens baksida*, *hinnaktig*, *trind*, *mot mynn. 3kantig*, *ofransad*. — Pag. 144.

- 133 LOPHOCOLEA. Bladen *2flikiga*; *stipl. tydliga*, 2—*3flikiga*. Kalken i *stjelkens spets* ell. på en *sidogren*, *mot mynningen vidgad*, *3kantig*, med 3 *franskantade flikar*. — Pag. 144.

- 134 HARPANTHUS. Bladen *rundade*, *grundt urnupna*; med *stipl.* Kalken på en mycket kort *sidogren*, *krökt*, *tappformig*, *n. trind* och *uppåt smalare*, med 3—4 *olikstora*, *helbrädd. flikar*. Mössan *kortare* än kalken och *vidväxt* denne. — Pag. 145.

- 135 CHILOSCYPHUS. Bladen *n. quadratiska*, *tvärhuggna* ell. *urnupna*; *stipl. tydliga*. Kalken *fästad* som hos föreg., 2—*3klufven* ell. *delad*, *bägarlik*. Mössan *oftast längre* än kalken, *fri*, *icke vidväxt* denne. — Pag. 145.

### 3 Flocken *Geocalyceæ*.

- 136 GEOCALYX. Karakt. som *flocken*. — Pag. 145.

### 4 Flocken *Trichomanoideæ*.

a — Kalken [egentl. *fruktfästet*] som i föreg. *flock*.

- 137 CALYPOGEJA. Bladen *rundade*, *hela* ell. i *spetsen intryckta*. Kalken *påflik*, *nedhängande* från *stjelkens baksida*, *hårig*. — Pag. 146.

b — Kalken på en kort, *uppböjd*, *småbladig sidogren* från *stjelkens baksida*.

- 138 LEPIDOZIA. Stj. *pargrenig*. Bladen *jemte* *stipl. breda*, *vanl. 4flikiga*. Kalken *utdraget* *afång*, *mot mynningen något veckig*, *3kantig*, *småtandad*. — Pag. 146.

- 139 MASTIGOBRYUM. Stj. *klynnegrenig* ell. *oordenl. förgrenad*, *längs öfre sidan* mer ell. *mindre konvex*. Bladen *snedt äggrunda*, med *tvärhuggen*, *grundt 2—3tandad spets*; *stipl. flertandade*. Kalken *3kantig*, *3tandad*, på en *sida djupare klufven*. — Pag. 146.

- 140 PHYSIOTIUM. Stj. *utdragen. n. enkel*, *ofvan konvex*. Bladen *delade i en stor*, *2klufven öfre*, och *en liten undre flik*; *stipl. 0*. Kalken *krökt nedåt*, *veckigt färad*, med *flikig mynn*; *nedom den fruktsamma kalken flere sterila*, *cylindriska*, *släta kalkar*, med *hel*, *genomborrade mynn*. — Pag. 147.

### 5 Flocken *Ptilidiæ*.

- 141 TRICHOCOLEA. Stj. *pargrenig*. Bladen och *stipl. delade n. till basen i ämno hårfint delade flikar*. Svepet i *stjelkens topp* mell. de *öfversta grenarne*, *liknande* en *rörformig*, *trind*, *tvärhuggen*, *hårig* *bägar*. Egentl. *kalk 0*. — Pag. 147.

- 142 **PTILIDIUM**. Stj. pargrenig. Bladen och stipl. till midten hårfintflikiga. Kalken på en kort sidogren, längre än svepet, trind och slät, med hopdragen, veckad och tandad mynning. — Pag. 147.

### 6 Flocken *Platyphylleæ*.

- 143 **RADULA**. Bladen klufna i en öfre, rundad och stor, samt en undre, n. *quadratisk*, mindre flik, till midten sammanhängande med den öfre. Stipl. 0. Kalken platt, med tvärhuggen, hel mynning. — Pag. 147.
- 144 **MADOTHECA**. Bladen delade i en öfre, bredt äggrund, stor, och en undre, aflångt äggrund, liten, med den öfre söga sammanhängande, stipelformig flik (bladöra). Stipl. stora, tydliga, hela. Kalken på begge sidor konvex, med tvärhuggen, djupt 2läppig, tandad mynning. — Pag. 148.

### 7 Flocken *Jubuleæ*.

- 145 **FRULLANIA**. Stj. pargrenig. Bladens öfre flik stor, rundad, bel; den undre [blad-örat] liten, konkav, rundad hvalflik—aflång, söga sammanhängande med den öfre. Stipl. rundade, urnupna ell. 2klufna. Kalken omv. hjertlik—äggformig, trind ell. ojemnt färad. — Pag. 149.
- 146 **LEJEUNIA**. Stj. oordentligt förgrenad—n. pargrenig. Bladens öfre flik större, rundad—äggrund; den undre liten, platt, till större delen förenad med den öfres kant. stund. otydlig. Stipl. urnupna, ell. otydliga. Kalken omv. äggformig, veckigt ell. vingadt 5kantig. — Pag. 149.

### 8 Flocken *Codonieæ*.

- 147 **FOSSOMBRONIA**. Karakt. som flocken. — Pag. 150.

### 9 Flocken *Diplomitrieæ*.

- 148 **MÖRCKIA**. Karakt. som flocken. — Pag. 150.

### 10 Flocken *Haploænææ*.

- 149 **PELLIA**. Stambl. stora, långsträckta, flikade ell. bugtiga, med bred, söga begränsad nerv, vid fruktsättningen friska och gröna. Svepet bägarlikt, fliktandadt. Mössan bar, utan kalk, längre ell. kortare än svepet. Kaps. klotrund. — Pag. 150.
- 150 **BLASIA**. Stambl. små vigglika, flikiga, under fjälliga, blågröna, samlade i tumsvida rundade gyttringar, oftast med flere fina, divergerande nerver, vid fruktsättningen gulaktiga, halft boriödöende. Mössan innesluten inom den slutl. rörformiga, mot spetsen öppnade bladnerven. Kaps. aflång. — Pag. 151.

### 11 Flocken *Aneureæ*.

- 151 **ANEURA**. Karakt. som flocken. — Pag. 151.

### 12 Flocken *Metzgerieæ*.

- 152 **METZGERIA**. Karakt. som flocken. — Pag. 152.

## B. — MARCHANTIACEÆ

### 13 Flocken *Jecorarieæ*.

- a — Frukfstäset deladt n. till medelpunkten i 8 ell. flere, smala, strålförmiga flikar.

- 153 **MARCHANTIA**. Stambl. stort, läderartadt, med oskaftade groddknoppskålar på ytan. De med frukfstäsets strålar skiftevisa, hinnaktiga svepena i kanten fransiga, hvar ett ett bysande flere, klocklika, 4—5flikiga kalkar, hvarje kalk omslutande en kaps., som öppnar sig med flere tänder. Hanfstäna skaftade, sköldlika. — Pag. 152.

b — Fruktfästet odeladt, äggformigt kägellik.

- 154 FEGATELLA. Stambl. stort, läderartadt, utan groddknoppsskålar. Svepena 4—8, hvar och ett hysande en enda rörformig kalk och derinom en kapsel, som öppnar sig med flere tänder. Hanfästena oskaftade, skiflika. — Pag. 153.

c — Fruktfästet vanl. grundt 2—5flikadt ell. helt, halfklotformigt ell. konvext.

- 155 PREISSIA. Stambl. *som hos föreg.* Fruktskafstets öfre ända *utan* nedhängande trådlika fjäll. Fruktfästet vanl. halfklotformigt, i kanten grundt 4—5flikadt, med ett svepe under hvarje flik; svepena hysande 1—2, klocklika kalkar, hvaroch en med en kapsel, *som öppnar sig i 3—6 skal.* Hanfästena *skaftade*, sköldlika. — Pag. 153.
- 156 FIMBRIARIA. Stambl. *litet*, läderartadt ell. hinnaktigt. Fruktskafstets öfre ända *dels med, dels utan* nedhäng. smala fjäll. Fruktfästet halfklotf., med *n. hel kant*, hysande på den konkava undersidan 1—6 svepen, hvar och ett med en äggformig, smalt mångflikig kalk med *långt utskjutande, i spetsen länge sammanhängande* flikar, och derinom en kaps., *som öppnar sig vid midten med ett lock.* Hanfästena *oskaftade*, insänkta i stambls nerv. — Pag. 153.
- 157 DUVALIA. Stambl. *litet*, läderartadt, vid kanterna tunnare. Fruktskafstets öfre ända *lätt omgifven af* nedhäng., långa, trådlika, hvita fjäll. Fruktfästet halfklotf., med *grundt 3—4flikad* kant, ett svepe och derinom en kapsel under hvarje flik. Kalk 0. Kaps. öppnande sig *vid midten med ett lock.* Hanfäste *insänkt* i stambl. — Pag. 154.
- 158 REBOULIA. Stambl. *litet*, läderartadt. Fruktskafst. *som hos föreg.* Fruktfästet halfklotf.—konvext, 4—6flikadt, för öfr. *som hos föreg.* Kalk 0. Kaps. öppnande sig *i spetsen med ett lock.* Hanfäste *oskaftadt, skiflikt.* — Pag. 154.
- 159 SAUTERIA. Stambl. *litet, tunnt och hinnaktigt.* Fruktskafstets öfre ända *utan märkbara*, nedhäng. fjäll. Fruktfästet konvext, *djupt 2—6deladt*, med lika många, vid basen hopväxta, omv. äggformiga svepen, hvar och ett hysande en kapsel, *som öppnar sig med flikar.* Kalk 0. Hanfäste skiflikt, *insänkt* i stambl. nära fruktskafstet. — Pag. 154.

#### 14 Flocken *Lunulariæ.*

- 160 CLEVEA. Stambl. *tjockt och köttigt*, med tunna hinnaktiga kanter. Fruktskafstets öfre spets *omgifven af* talrika, trådlika, hvita fjäll. Fruktsamlingen *n. korsformig*; de enskilda svepena omv. äggformiga, hvarje omslutande en kapsel, som öppnar sig *med flikar.* Kalk 0. Hanorg. (enl. Lindb.) *spridda*, radvis insänkta i ett särskildt stambl. — Pag. 154.

### C. — ANTHOCEROTACEÆ.

#### 15 Flocken *Anthoceroteæ.*

- 161 ANTHOCEROS. Karakt. *som flocken.* — Pag. 155.

### D. — RICCIACEÆ.

#### 16 Flocken *Ricciæ.*

- 162 RICCIA. Karakt. *som flocken.* — Pag. 155.

# A R T E R.

## I Fam. BRYACEÆ.

Bladcellerna af ett enda slag. Kapseln öppnande sig med lock, mer sällan i 4 flikar ell. affallande oöppnad. Sporerne icke blandade med springtrådar. Mössan n. alltid affallande hel.

### † *Musci pleurocarpi.*

Frukten från stjolkens ell. grenarnes sidor, alltid öppnande sig med lock. Peristomet n. alltid dubbelt.

## A. — HYPNACEÆ.

### 1 Flocken **Hypnææ.**

#### 1. HYLOCOMIUM Schimp.

† *Pleurozium Sull.* Med stora och talrika parafyllier.

\* Stamgrenarne plattadt dubbelt pargreniga.

- 1 *H. splendens Br. & Sch.* stamgrenarne med skaftade nyskott, *regelbundet* dubb. pargreniga; bladen *äggrunda—aflånga*, de på stj. långspetsade, något veckiga, alla kort dubbelnerviga, sågade; kapseln aflång, krökt, med *smal* ring; locket *högt* kägel- ell. sprötliskt. 24 4—8. Fig. Br.eur. Sv.B.276. Fl.D.2390. R.Hn.Bryac.Scand.exs.27.

Barrskog. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Bildar på berg och jord i skogarne stora och tjocka, men lösa, glänsande brunaktiga mattor. Fruktskafen vanl. flere tillsammans vid nyskottens utgångspunkt. — Hypn. proliferum L. och ed.9. H. parietinum Sv.B.*

- 2 *H. umbratum Br. & Sch.* stamgren. oordentligt dubb. pargreniga; bladen *hjärtlika*, spetsiga, *starkt strimmiga*, med svag dubbelnerv *till midten*, sågade; kaps. äggformig—n. omv. äggform., krökt, *utan* ring; locket *lågt* kägellikt. 24 9—5. Fig. Br.eur. Sv.B.552. Thed.M.exs.102. R.Hn.Bryac.exs.28.

Skugg. skog. (Smål.—Ängml. och Jeml. VB. Falkberget vid Skellefteå. Pit. Lpm. Arvidsjäure; Peljekaisse. — N. till Finnm. Maalselvdalen: Hj. Holmgr.) *Lifligt grön ell. mörkgrön, stund. brunaktig, något styf, i lösa mattor. — Hypnum Ehrh. och ed.9. H. proliferum β Wg.*

\*\* Stamgr. engång pargreniga ell. oordentligt förgrenade.

- 3 *H. Oakesii Sch.* stamgr. *engång pargreniga*, med plattade smågrenar; stj.bladen konkava, *äggrunda*, tvärt kortspetsade, strimmiga, ofvan *midten* sågade, med *olikformiga*, längre och kortare, smala sågtänder, dubb. ell. enkel, *till ell. öfver midten* nående nerv; kaps. rundadt äggformig, med kägellikt lock. 24 9, 10. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.29.

Fjelltr. och skog. r. (Lul. Lpm. Qvikkjokk: Holmgr. Pit. Lpm. Nerest. Jeml. Snasahögen; Åreskutan etc. Herjed. Malmagen; Skarffjellet; Haftorsstöten m. fl. st. Dal. Osmundsberget. Festml. Ramshyttan: Sillén. Ängml. Säbrå, allm.: Arn. Medelp. Norbyknöl; Sundsvall: Holmgr. Helsl. Skog sn, Hemstanäs. Uppl. Dalelvens öar ofvan Elfkarön. — N. Finnm.: Holmgr.—Christianistrakten, Bogstad- och Gräfsenäs: Scheutz.) Omkr. 3 tum lång, *glost pargrenig, lifligt grön; utmärkt af de n. franslikt sågtandade bladen och stora, sammansatt stikiga parafyllierna. — Hypnum Sull. och ed.9. H. fimbriatum Hn.ed.5 och Br.eur. H. pyrenaicum Spruce.*

- 4 *H. brevirostre* Br. & Sch. stamgr. oordentligt förgrenade; stj.bladen konkava, bredt hjertlikt äggrunda, tvärt sammandragna till en smal, krökt spets, strimmiga. n. från basen sågade, med kort och ottydlig dubbelnerv vid basen; kaps. äggformig—oval, med smal ring, högt kägellikt, kort uddspetsigt lock. 24 8, 9. Fig. Br.eur. Fl.D. 2446. R.Hn.Bryac.exs.265.

Skogsmark, r. (Sk. Fogelsång; Bosarp; Heckeberga, Långaved; Linderödsåsen; Broby sn. flerst.; Hamnstr. Funnen m. fr. vid Röddinge, Sätosta och Bosjöklöster. Småll. Elmhult; Berggr.; Husvarna: J. E. Zett. VG. Hunneberg. Stockh. Sicklaön flerst. Öl. Böda park: Zett.) Ofta kvarterslång, meränd. ljusgrön, i stora svallande mattor, med n. knippevisa smågrenar; talrika, men små och olikformiga parafyllier; grenbladen n. ostrimmade, äggrundt lancelllika. — *Hypnum* Ehrh. och ed.9.

++ *Hylocomium* [i eg. men.]. Utan parafyllier.

- 5 *H. loreum* Br. & Sch. stjelen oordentligt delad i oregelbundet pargreniga, tillspetsade stamgrenar; bladen särđ. upptill n. ensidigt krökta, bredt äggrunda, med lång smal, utsperrad, ottydligt sågad spets, nedtill strimmiga, med kort, ottydlig dubbelnerv; kapseln rundadt oval, med smal ring, hvälfdt, vartspetsigt lock. 24 9—4. Fig. Br.eur. Fl.D.2392. Lindgr.M.exs.57. R.Hn.Bryac.exs.267.

Skogs- och bergstr. r. (Sk. och Blek.—Dals. Ner. och Stockh.; mest i de vestra prov. Jeml. Snasahögen. Öl. Böda park: Zett. Gotl. Thorsborg. — N. till Nordl.) Ofta mer än kvarterslång och ganska grof, gulgrön ell. mörkt grågrön, i lösa mattor; kapseln stor och klumpig, långskaftad. — *Hypnum* L. och ed.9.

- 6 *H. triquetrum* Br. & Sch. stj. som hos föreg., med n. pargreniga mot spetsen tjockare stamgrenar; bladen oftast utsperrade, bredt hjertlika, spetsade, sågade, strimmiga, med nerv som hos föreg., baksidan upptill med talrika, små taggar; kaps. afhäng—oval, krökt, med ring och lock som hos föreg. 24 5—9. Fig. Br.eur. Fl.D.2391. R.Hn.Bryac.exs.30.

Skog. a. (Sk.—Lpl. — N.) Gröfst af Skand. Hypnaceæ, med styfva och bräckliga stamgrenar af 4—8 tums längd, vanl. gulaktigt grön; bladen sällan något ensidiga; fr.skaften långa. — *Hypnum* L. och ed.9.

- 7 *H. subpinatum* Lindb. stamgren. n. pargreniga ell. trädlikt förgrenade, med båglikt nedböjda, spetsade smågrenar; bladen från n. lodr. bas bredt äggrunda, plötsligt långt smalspetsade, öfverallt finsågade, något strimmiga, på baksidan glatta; kaps. rundadt äggformig, torr finstrimmig, med något bred ring, stort, lågt kägellikt lock. 24 9, 10. Fig.

Lund. på jord och klipp. r. (Lul. Lym. Pajerim och Stora Sjöfallet; samt Ångml. Hernön; Holmgr.; Säbrå: Arn. Helsl. Hemstanäs. Gestr. Gelle, vid Tolfors m. fr.: R. Hn. Stockh. Dalarön: Holmgr. Vestml. Nora, vid Hagby; samt Ner. vid Garp-hyttan: C. Hn; Örebro, vid Lugnet. VG. Halleberg. Småll. Skärfesfallshåla i Korsberga; samt Ökna och Lemnhult: Scheutz.) Omkr. kvarterslång, teml. grof, lifligt grön ell. grön gul, bildande lösa mattor; fr.skaften korta, knappt tumslånga. Mest beslägtad med följ., hvaraf den möjl. torde vara en skugg- eller bergstraktform. — *Hypnum* ed.9.

- 8 *H. squarrosum* Br. & Sch. stj. oordentligt delad i oliklånga, n. uppräta och tjocka grenar; bladen från bred, n. hjertlikt bas snart afsmalnande i en nedböjd lång finsågad spets, ostrimmade, glatta; kapseln äggformig, med bred ring, lågt kägellikt lock. 24 5—9. Fig. Br.eur. Fl.D.535, f.1. Sill.M.exs.157. R.Hn.Bryac.exs.266.

Skog, diken etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Bildar vidsträckt, lösa och mjuka mattor af ljusgrön ell. gulaktig färg; grenarne 2—3 tum höga, med starkt utsperrade blad; kaps. långt skaftad. — *Hypnum* L. och ed.9.

## 2. HYPNUM Dill.

† *Campylium* Sull. Bladen åt alla sidor utsperrade, utan parafyllier.

\* Bladen vid basen ottydligt dubbelnerviga; sambyggare.

- 1 *H. Halleri* Sw. stjelen krypande och rotslående, tätt pargrenig; bladen tätt sittande, från bred, äggrund bas hastigt smalspetsade, finsågade, utsperrade och tillbakaböjda; kaps. n. cylindrisk, krökt, med lågt koniskt, kortspetsigt lock. 24 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.239.

Berg, r. (*Pil. Lpm. Tjiddjakk. Um. Lpm. Gitsfjellen: Ångstr. Jemll. Åreskutan, vid Ullån: Almqv. Herjed. Gröndörren; Åxbögen; Stora Midtåkläppen; Ramansberget: R. Oldberg. Dal. Osmundsberget. Vestml. Borns kalkbr. nära Nora: Sillén. Ner. Ullaviklint enl. ex. af P. J. Hellbom. Verml. Persbergs grufvor; Konradfors. — N.) Sällan tumshög, i torrt tillstånd brungrön, med talrika, korta, n. uppräta grenar, hvilka så ett lagligt utseende af de nedåt rigtlade bladspetsarne.*

- 2 *H. Sommerfeltii* Myr. stjelken krypande, n. pargrenig ell. oordentligt förgrenad; bladen teml. tättsittande, från bred, n. hjertlik, småsågad bas, tvärt bopdragna till en lång och smal, helbräddad spets, utspärrade, yngre något ensidiga; kaps. aflång, krökt: locket som hos föreg., men med vårtlik, trubbig spets. 2 7, 8. Fig. Br.eur. Rab. Bryoth.eur.396.

Murken ved, kalksten etc. r. (*Smål. Årssets kalkbr.; samt Jönköping och Taberg enl. Scheutz. — Lpl. och VB. Öl.: Zett. — N. mell. Kongsberg och Drammen. Gudbrandsdalen: Berggr. Nordl. Salten. Finnm. Tromsö, Flöjelfeld: Hgn.) Liten som föreg., men späddare, gulglänsande, med korta, ett par lin. höga grenar, tumshöga, fina och upptill krökta, brandgula fruktskaf. — *H. affine* Somf. *H. stellat.* β polymorph. Myr. Coroll.*

\*\* Bladen som i föreg. afd.; tvåbyggare.

- 3 *H. stellatum* Schreb. stj. oordentligt pargrenig, med nedligg. ell. mer uppräta grenar; bladen äggrundt lancettlika, småningom afsmaln. till spets, helbräddade, n. nervlösa, ell. med en ell. 2 fina strimmar vid basen; kaps. aflång, krökt, med koniskt, kortspetsigt lock. 2 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.2500. Lindgr.M.exs.30.

Kärr, sankt äng. a. (*Sk.—VB. och Lul. Lpm. Öl. Goull. — N. till Finnm.: Hgn.) Vanl. mycket gröfre än de begge föreg., stjelken ett par tum lång, med gulgröna grenar, nedtill mörkare, brunaktig. Var. i hög grad till storlek och färg.*

\*\*\* Bladen med utiragen, enkel nerv; tvåbyggare.

- 4 *H. chrysophyllum* Brid. stjelken oordentligt pargrenig; bladen från bred hjertlik bas smalt lancettlika, smalspetsiga, helbräddade, med nerv till midten; kaps. aflångt cylindrisk, krökt, med koniskt, kortspetsigt lock. 2 6—8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac. exs.240.

Murken ved, kalksten etc. (*Sk.—Gestr. Ner. och Verml. Ångml. Tåsjöberget. Pil. Lpm. Öl. Goull. — N.) Ofäst späddare, säll. så grof som föreg., mer gulglänsande, med vanl. färböjd ell. n. krypande stjelk. — H. polymorphum Br.eur.; en finare form är H. Halleri β majus Wg.Fl.L.*

- < 5 *H. elodes* Spruce: stjelken som hos föreg.: bladen lancettlika, långspetsade, mot basen otydl. småsågade, för öfr. helbräddade, med n. ullöpande nerv; kaps. som hos föreg. 2 7, 8. Fig. Rab.Bryoth.395.

Fukt. st., trädrött. etc. r. (*Sk. Höör och Lackalänge. ÖG. Vinnerstad; V. Ny sn flerst. äfv. med fr.: Hgn. Gestr. Edskön: Kubbo. Vestml. Sala grufva, bortåt Nyberg. Ner. Edsberg sn, i kärr nedom Fjögsta kalkbrott: C. Hn. VG. Kinnekulle. Öl. mångenstäd.: Zett. Goull. Vibble.) Till storleken som föreg., gulaktig, med bladen i smågrenarnes spets ofta ensidigt klotlika. — *Amblystegium* Lindb.*

\*\*\*\* Bladen som i föreg. afd.; mångbyggare.

- < 6 *H. polygamum* Wils. stj. nedligg. ell. uppstigande, med spridda grenar; bladen glest sittande, mer och mindre utspärrade, från äggrund bas hastigt utdraget syllika, helbräddade, med mot spetsen försvinnande nerv. 2 7. Fig. Br.eur.

Kärr, r. (*ÖG. V. Ny sn flerst.: Hj. Hgn. Södm. Eskilstuna enl. ex. fordom samlade af C. J. Hn; Gärseholm: Ångstr. Stockh. Vermdön, Tegelnora; Nacka: Dalarö: Hgn. Dal. Grycksbo bruk. Herjed. Ramansberget: Hellb. VB. Umeå: Hgn. Öl. Åhs allvar vid Näsby: Zett.; Böda: Lindb. Goull. Kråklingsbo: Hgn. — N. Finnm. Maalselvålen: Hgn.) Vanl. stor som *H. stellat.*, men mindre grof, grön ell. gulaktig; bladen mindre utspärrade, stund. något ensidiga, med fin, men tydlig nerv, näende långt öfver bladets midt. — *Amblysteg. Br.eur.*, ej Sch.Cor. och Syn.*

†† *Hypnum* [i eg. mening]. Stjelken vanl. upprät och pargrenig ell. med enstaka, enkla grenar, allsidigt utstående [ej sperrade] ell. tegellagda, trubbiga blad; oftast tvåbyggare.

\* Stjelken pargrenig, med vanl. spetsiga grenar.

a — Bladen tydl. enkelnerviga; sambyggare.

- 7 *H. cordifolium* H. stjelken krokig, oftast nedligg., med få och utdragna grenar, n. inga smågrenar, glest rotludd; bladen konkava, hjertlikt äggrunda, nedlöpande, trubbiga, helbräddade, med n. till spetsen nående nerv och lös cellväf af smalt rhomboidiska celler; kaps. på långt skaft, aflång, krökt, med koniskt lock. 24 6, 7. Fig. Br. eur. Fl.D.2441. R.Hn.Bryac.exs.359.

Kärr, diken etc. (Sk.—V.B. och Um. Lpm. Lul. Lpm. Jokkmokk etc.: Hgn; Nam-mats vid Qvikkjokk. Öl. flerest.: Zett. — N.) *Quartershög, renl grön moss, med hanblir i de 2—3 tum långa fruktskafstens närhet.*

b — Bladen tydl. enkelnerviga; tvåbyggare.

- 8 *H. giganteum* Sch. stjelken upprät, tät pargrenig, med glest rotludd; bladen konkava, bredt hjertl. äggrunda, något nedlöp., trubbiga helbrädd., med u. till spetsen nående nerv och fast cellväf af jemnbreda celler; smågrenarnes bl. mycket smala, n. jemnbreda långspetsade; kaps. som hos föreg. 24 6, 7. Fig. Fl.D.2801. R.Hn. Bryac.exs.116 [*H. cordif.*].

Vatten, kärr etc. (Sk.—Lpl. — N. till Ost-Finnm.) *Till alla delar gröfre än föreg., ofta fotslång, samt brunaktig, något platt och n. dubbelt pargrenig.*

- 9 *H. sarmentosum* Wg. stj. lång, nedligg., säll. upprät, med korta, n. 2sidiga grenar, utan rotludd; bladen starkt konkava, bredt aflånga, trubbiga med eller utan kort udd, helbrädd., med n. till spetsen nående nerv och mycket tät cellväf af jemnbreda celler; kaps. aflång—n. cylindrisk, krökt, med konvext, uddspetsigt lock. 24 6, 7. — *β fontinaloides* Berggr. flytande, mörkgrön, med glesare och längre grenar och blad. Fig. Br.eur. Fl.D.2748. Somf.Cr.exs.30. R.Hn.Bryac.exs.117.

Fjelltr. (Lpl.—Herjed. söd. delen. Dal. Ängml. Hernösand; samt Medelp. Sundsvall: Holmgr. — N. Finnm.—Christiania. — *β* N. Dovre, i bäcker från Knuds- och Blåhöe: Berggr.; Finnshöe: Scheutz.) *I vatten, som flyter öfver klippor, 3—6 tum lång, vanl. mycket grenig, glänsande rödbrun, i fjellmyrar mer upprät och mörkbrun, stund. grön. Bladens hörnceller stora, starkt uppblåsta, vattenklara. Fr. teml. sällsynt.*

- 10 *H. purum* L. stj. krokig, vanl. nedliggande, n. klynnegrenig, med pargreniga grenar, utan rotludd; smågren. trinda, de öfre trubbiga; bladen tät tegellagda, starkt konkava, från smal, något nedlöp. bas bredt äggrunda, n. rundadt trubbiga med kort och smal udd, helbräddade och bredt strimmiga, med nerv till omkr. midten; kaps. äggformig—aflång, knappt krökt, med koniskt, smalspetsigt lock. 24 7, 8. Fig. Br. eur. Lindgr.M.exs.51. R.Hn.Bryac.exs.299.

Skogsmark, r. (Sk.—Upl. Uppsala. V.G. Öl.: Lindb. och Zett. Gottl. Funnen m. fr. i Sk. vid Ringsjön; i Broby och Emitslöf snr: Haninstr.: i Smål. och på Gottl. — N. till Nordl.) *Vanl. quartershög, ljusgrön ell. gulaktig, mjuk och glänsande moss. Frukt sällsynt. Bladnerven nångång dubbel.*

c — Bladen nervlösa ell. kort och otydligt dubbelnerviga; tvåbyggare.

- 11 *H. Schreberi* Willd. stj. upprät, styf, n. dubbelt pargrenig, med trinda, vanl. spetsade smågrenar, utan allt rotludd; bladen löst tegellagda, ovala—bredt äggrunda, trubbiga med bred udd, helbräddade, n. nervlösa, af tät cellväf med stora, gula, qvadr. celler i nedre hörnen; kaps. aflång, krökt, med koniskt lock. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D. 2440. Somf.Cr.exs.123. Thed.M.exs.101. R.Hn.Bryac.exs.300.

Skogsm. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Styfvare och grönare, mindre glänsande än föreg., mera än följ. Var. med mer och mindre spetsiga smågrenar, dock aldrig så spetsiga som hos följ. Locket ej så högt som hos föreg. — H. parietinum L. och Wg. H. muticum Sw. M. Succ.*

- 12 *H. cuspidatum* L. stj. som hos föreg., mer och mindre upprät, med trinda sylspetsiga smågrenar, utan rotludd; bladen vanl. utstående, äggrundt aflånga, trubbad ell. med kort udd, helbrädd., n. nervlösa, af mycket tät cellväf med stora, kvadratiske, vattenklara celler i nedre hörnen; kaps. som hos föreg. 24 6, 7. — *β pungens* Sch.

bräcklig; grenarne trinda, syllika af de tätt tilltryckta omfattande bladen. Fig. Br. eur. Fl.D.2501. Sill.M.exs.151. R.Hn.Bryac.exs.119.

Vattengräfv., kärr etc. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  ÖG. V. Ny sn, Näs; samt Motala sn, Lemunda: Holmgr. Öl. Böda: Lindb.) 2—flere tum lång, med tjocka upprätta hufvudgrenar, som höja de ljusgröna spetsiga topparne öfver vallenytan. Fruktskåften 2—3 tum höga.  $\beta$  osedd af utg.; ex. från ÖG. fördes i ed.9 efter uppg. af Lindb. till *Cylindrothec. concinnum*, men lära enl. senare uppgifter höra hit.

\*\* Stj. n. enkel ell. med få och spridda, enkla grenar, tegellagda blad.

a — Bladen enkelnerviga; sambyggare.

13 *H. pseudostramineum* C. Müll. stjelen och hufvudgren. långa trådlika, med inga ell. nedtill med få och korta smågrenar; bladen n. tegellagda, äggrundt lancettlika, i sjelfva spetsen trubbad, glesl och omärkl. smånaggade, med i spetsen försvinn. nerv, stora uppblåsta hörnceller vid basen och i yttersta spetsen några få, vidgade genomskinkl. celler; kaps. aflång, krökt, med konvext, värtspetsadt lock, utan ring; yttre peristis tänder upptill genomskinkl. hinnkantade. 24 6. Fig.

Sanka st. r. (Ner. Örebro. vid Svartån nedom Carlslunds hästhage: C. Hn.) Tätt tuffvad, med 6—8 tum höga, upprätta, nedtill mörkbruna, i topparne ljusgröna stjekar, och habituellt mycket lik följ. art, ehuru med smalare och spetsigare blad, som i sjelfva spetsen, hvars cellväf är olik den öfriga, dro trubbad. Hanblirna högt ofvan honblirna; fr. skåften 2—3 tum långa. Anses i Mildes Bryol. Siles. för var. af *H. fluitans*, från hvilken den dock synes utg. långt skild, ehuru bladen på en del stjekar dro något ensidiga, men icke krökta.

b — Bladen enkelnerviga; tvåbyggare.

14 *H. stramineum* Dicks. stj. och hufvudgrenarne långa trådlika, med inga ell. få och korta smågrenar; bladen n. tegellagda, konkava, äggrundt aflånga, trubbiga, helbrädd., med nerv till ofvan midten och stora vattenklara hörnceller vid basen; kapseln cylindrisk—aflång, krökt, med koniskt, spetsigt lock, utan ring. 24 7, 8. —  $\beta$  obscurum: nedligg. och gröfre, af mörkare färg. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.122. Lindgr.M.exs.5. R.Hn.Bryac.exs.118.

Sanka kärräng. etc. (Sk.—Lpl. — N.) 3—6 tum lång, vanl. växande upprätt bland andra mossor, gulgrön, trind af något glesare och smalare blad än hos följ. Var. på Dovre, enl. ex. af Berggr. och trol. i flere fjelltr., med nedligg., intrasslade, nedtill svartbruna stjekar och är då, såsom Berggr. visat, samt enl. orig.ex. från Lorentz dennes *H. nivale*, hvartill  $\beta$  utgör en öfvergångsform.

15 *H. trifarium* WM. stj. som hos föreg., med de enstaka grenarne från smalare bas uppåt tjockare; bladen tätt tegellagda, femradiga, bredt äggrunda, med nerv till midten och gula hörnceller vid basen, för öfr. som hos föreg.; kaps. som hos föreg., men med ring. 24 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.360.

Sanka kärr, gungmossar, r. (Smål. Jönköping enl. Scheutz. ÖG. Vinnerstad, vid Stafantorpssjön; V. Ny, vid Belleberg. Ner. vid sjön Igeln i Sköllersta; Markkärr vid Örebro; Thorsbo i Tysslinge. Uppl. vid Filmsjön; Uppsala, vid Vitulfsberg. Gestr. flerst. Herjed. Skarffellet; i Ne- och Midtådalen: R. Oldb. Jemll. Snasahögen. Lul. Lpm. Sirkasluokte. — N. till Nordl.) Gröfre än föreg., stund. fotslång, af brungul, glänsande färg; bladen var. någongång med dubbelnerv, som då är vida kortare än den enkla. Kaps. teml. liten, mycket sällsynt.

c — Bladen dubbelnerviga; tvåbyggare.

< 16 *H. turgescens* Sch. till alla delar mjuk och svällande; stj. och grenar som hos föreg., men gröfre och mer klubblika; bladen starkt konkava, bredt äggrundt aflånga, rundtrubbiga med kort och smal, krokig udd, helbräddade, med nedom midten upphör. nerv och gula hörnceller vid basen. 24. —  $\beta$  uliginosum Lindb. mörkt brungrön; stj. mera grenig, med kortare grenar; bladen glesare, mera utstående. Fig. Thed.M. exs.103 [under namn *H. molle*].  $\beta$  R.Hn.Bryac.exs.388.

Kärr. r. (Herjed. i Midtådalen. — N. Dovre, Finnhöe: C. & R. Hn; nära Goverli-värdet vid Kongsvold: Berggr. Nordl. Helgeland, Tomö i Ranen: A. Bl. & Arn. —  $\beta$  Öl. och Goull. flerst.: Lindb.) Hufvudformen ända till quarterslång, guldgul, med från n. trådlik bas klubblikt vidgade grenar. Frukt okänd. —  $\beta$  *H. calcarum* Lindb. i *R.Hn.Bryac.exs.*



+++ *Limnobium* Sch. Stj. nedligg., oordentligt förgrenad, med blad som afd. ++ ell. ock ensidigt böjda, trubbiga ell. föga spetsiga.

\* Samhyggare.

a — Bladen kort och otydligt dubbelnerviga ell. nervlösa.

- 17 *H. molle* Dicks. stjelken krypande, med *n. enkla* uppräta grenar, *utan* rotludd; bladen utstående, *rundadt äggrunda*, kort uddspetsiga, mot spetsen glest sågade, med svag, vanl. dubbel nerv till midten och rektangulära, *föga vidgade* hörnceller vid basen; kapseln äggformig ell. n. båglik, något sned, med konvext lock och bred ring. 24 7, 8. Fig. Sw.M.Su.t.6,f.15. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.236 [ej skild frän *H. alp.*].

Bäck., helst i fjelltr. (*Lpl.*—*Dal.* VB. Krångforsen; Umeå: Holmgr. Ångml. Tåsjö. Medelp. Säuna: Ångstr. Stockh. Sundsta nära Skanstull. Boh. Christinedal. — N. Finnm.—Dovre. Bergen st., Sogn: Wulfsb. Tellemarken etc.) *Brungul*, säll. *ljusgrön*, mjuk *mossa*, med omkr. *tumslånga* grenar; bladnerven var. *kortare* och *långre*, någongång *enkel*; kaps. *n. upprä.*

- 18 *H. eugyrium* Schimp. stjelken nedligg., kort, oordentligt delad i *talrika* grenar och *smågrenar*, *utan* rotludd; bladen tegellagda, isynnerhet grenarnes ensidigt böjda, konkava, *aflånga—lancellika*, spetsade, i öfversta spetsen *finsågade*, *n. nervlösa*, med *hastigt stora*, *uppbåsta* och *bruna* hörnceller vid basen; kaps. äggformigt *af-lång*, med konvext, vårtspetsadt lock och mycket bred ring. 24 5—7. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.324.

N. Fukt. klipp. r. (ÖG. V. Ny sn. Öarne Gopö och Grepträdet i Vettern). *Växer i nedtryckta, glänsande tufvor af grön ell. brunaktig färg. Något lik H. palustre. Ex., samlade af Hellb. i Herjed. och bestämda af Sch. till H. eugyrium var. (se Flora 1868), hafva rundade bl., med lång enkel nerv och föga vidgade hörnceller vid basen, samt höra tydl. till H. arcticum.*

- 19 *H. norvegicum* Br. & Sch. stj. nedligg., *rotsläende*, delad i korta, *n. lagelfina*, uppräta och mjuka grenar; bladen utstående ell. något ensidiga, konkava, *bredt äggrunda*, med kort, vanl. trubbad spets, *helbräddade*, med mycket kort dubbel nerv och *gula*, *något större* has- och hörnceller; kaps. äggformig, något sned, med konvext, vårtspetsadt lock och bred ring. 24 5, 6. Fig. Br.eur.

Klipp. i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Sarkavare; Stora Sjöfallet: Holmgr. — N. Dovre, vid Vårstien: Scheutz. Vid bäckar i Gudbrandsdalen.) *Nära beslågad med följ., men mycket finare. Växer i låta, hoptrasslade, ofvan grönglänsande mattor bland andra mossor. — H. viridulum Hn. ed.5.*

(*H. alpestre, palustre.*)

b — Bladen vanl. enkelnerviga.

- 20 *H. arcticum* Somf. stj. utdragen, nedtill bladlös, *spröd*, med teml. långa grenar, och uppstigande smågrenar; bladen utstående, *fasta*, konkava, *rundadt äggrunda*, med *kort och trubbad* spets, *helbräddade*, med nerv till midten ell. nära spetsen, *utan* vidgade hörnceller vid basen; kaps. med kort hals, oval, lutande, med *lock som hos föreg.* 24 7, 8. Fig. Br.eur. Somf.Supp.l.2. R.Hn.Bryac.exs.235.

Fjellbäck. r. (*Lul. Lpm.* Stora Sjöfallet: Holmgr. *Pit. Lpm.* Peljekaisse. Um. *Lpm.* Laxfjell: Ångstr. *Jemll.* Getvalen och Bunnarfjell. *Herjed.* Malmagen; Ljusneef ned. Funnesdalsberget etc. — N. Finnm. Hammerfest. Nordl. Salten—Goustafield och Christiania.) *Mycket gröfre än föreg.; men spårare, mer nedligg. och glesare förgrenad än följ. Färgen mörkgrön, ofta svartaktig. — H. alpestre β Wg. En mer utdragen och trädlik form dr Leskea Smithii Sw. H. Smithii Lindb.*

- 21 *H. alpestre* Sw. stj. utdragen, nedtill bladlös, med uppstigande grenar och uppräta, korta smågrenar; bladen något ensidigt utstående, konkava, *äggrunda*, trubbad med (ofta vriden och sågad) ell. utan udd, *n. helbräddade*, med meränd. enkel nerv till midten och *vidgade* hörnceller vid basen; kaps. aflång, lutande, med konvext, vårtspetsadt lock och *bred* ring. 24 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.236 [ej skild fr. *H. molle*].

Fjellbäck. (*Lpl.*—*Dal.* och *Helsl.* nor. del. — N. Finnm.—Dovre. Bergen st., Sogn: Wulfsb. Vestfjordalen etc.) *Stjelken krypande flere tum; hufvudsakl. med sin*

större styfhet och de smalare, vanligast enkelnerviga bladen skild från *H. molle*, med hvilken den är alltför nära besläktad.

- 22 *H. palustre* Huds. stjelken mer och mindre utdragen, oordentligt delad i uppstigande ell. nedtryckta grenar och smågrenar; bladen tätt sittande, vanl. ensidigt krökta, konkava, åggrunda—af långt lancettlika, något spetsade, helbräddade, med svag enkel nerv till midten ell. ännu kortare dubbel nerv; och vidgade gula hörnceller vid basen; kaps. aflång, krökt, med koniskt lock, utan ring. 2 5—7. Fig. Br.eur. Lindgr. M.exs.29. Somf.Cr.exs.125. R.Hn.Bryac.exs.237.

Sten. och pålar vid vatt. (Sk.—Ångml. och Herjed. Pit. Lpm. Kåbrenåive. Lul. Lpm. Qvikkjokk. Öl. Köping: Scheutz. — N. till Finnm. Maalselv dalen, samt Tromsö: Holmgr.) Var. i hög grad, vanl. nedliggande, tätgrenig brunaktig, stund. i rinnande vatten mycket långt utdragen och spenslig; bladnerven än ndende upp emot bladets spets än n. alldeles felande; bladen afsmalna småningom till en kort, stund. trubbad spets. — *H. luridum* Sw.

(*H. molle*.)

\*\* Tvåbyggare.

- 23 *H. ochraceum* Wils. stjelken långt utdragen, oordentligt delad i långa upprätta, oftast enkla och jemnhöga, i spetsen krökta grenar; bladen vanl. skärformigt krökta, stund. n. sammanvidna, med vidgade vattenklara hörnceller vid basen, för öfr. som hos föreg.; kaps. aflång, krökt, med konvext, vårtspetsadt lock och bred ring. 2 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.238.

Sten. i fjellbäck. r. (Lul. Lpm. Njuonjes vid Qvikkjokk: Holmgr.; Skjella puolta: H. Widm. Pit. Lpm. Peljekaisse. Um. Lpm. Laxfjället: Marsfjellen: Gitsfjellen: Ångstr. — Herjed. Funnesdalen: Hellb.; vid Ljusnan, mell. Tännäs och Nybygget: Oldb. — N. Finnm., vid Kaasfjord: Dr Lorentz: Maalselv dalen. Aglappen: Hgn. Nedom Sylfjellen. Dovre, vid Drivstuen och i Sprenbäcken; Fogstuen: Hgn. Gudbrandsd., vid Løurgård. Bergen st., Evindvik m. fl. st. i Sogn: Wulfsb.) Växer i stora ofta quarternhöga, mjuka, upptill gröna, nedtill brungula tuftor; bladen var. i hög grad lika som hos föreg. Frukt icke funnen i Skand.

- 24 *H. polare* Lindb. stj. något utdragen, oordentligt delad i upprätta, jemnhöga, i spetsen svagt krökta grenar; bladen tätt sittande, något ensidigt utstående, huflikt konkava, åggrunda, rundadt trubbiga med kort och mycket bred, småtandad udd, n. helbräddade, med grof, enkel, i udden upplöst nerv, och något vidgade, vattenklara hörnceller vid basen. 24. Fig.

Fjelltr. r. (Lul. Lpm. Stora Sjöfallet enl. ex. af Hj. Hgn. — N. Finnm. Lyngen, vid häcker 1867: Norrlin enl. Lindb.) Utmärkt dels af den ovanligt grofva nerven, dels af bladspetsens celler, som äro märkbart kortare och vidare än de i bladens midt. Norska, af Lindb. meddelade ex. omkr. 2 tum höga, med tumshöga, n. enkla grenar, nedtill brungula, endast grenlopparne gröna; Hgns ex. fr. Lpm. idt tufvade något finare, mörkgröna, nedtill bruna. Frukt okänd.

++++ Bladen ensidigt, klo- ell. skärformigt krökta, spetsiga [undant. *H. scorpioides*].

\* Stjelken och hufvudgren. regelbundet och tätt, plattadt pargreniga, vanl. med talrika parafyllier; tvåbyggare.

a — *Clenidium*: Bladen otydl. dubbelnerviga ell. nervlösa.

- 25 *H. Crista castrensis* L. stj. ~~stj.~~ st., mer säll. nedliggande, utan rotludd; bladen från bredare bas småningom lancettlika, med lång skärformigt krökt spets, ofvan midten småågade, starkt strimmiga, n. nervlösa; parafyll. talrika smalt lancettlika; kaps. aflångt cylindrisk, krökt, med koniskt lock och mycket smal ring. 2 6—9. Fig. Br.eur. Fl.D.2502. Somf.Cr.exs.31. Lindgr.M.exs.3. R.Hn.Bryac.exs.298.

Skog. (Lpl.—Sk. norra delen. Öl. Färjestaden och Böda park: Zett. — N.) 3—5 tum hög, n. tumsbred, platt, gulaktig, i låga tuftor ell. mattor växande mossor, med 2—3 i. långa fruktskaft.

- 26 *H. molluscum* H. stj. merändels nedtryckt, rotsläende; bladen från bred nedlöpande bas plössligt hopdragna till en lång, lancettlik, skärformigt krökt spets, i hela kanten småågade, ostrimmade, n. nervlösa; parafyll. åggrunda; kaps. åggformig, lu-

tande, med koniskt lock och bred ring. 2½—8. Fig. Br.eur. Fl.D.2503. Somf. Cr.exs.31. R.Hn.Bryac.exs.297.

Skog. helst i kalktr. r. (Sk. Smål. Djupskuran i Ökna, samt vid Husvarna och Grenna: Scheutz. ÖG. Omberg: Vinnerstad, Motala och V. Ny; Marmorbruket: Mosen. Södm. Vilsta nära Eskilstuna; Nyköping: C. Ind. Gestr. Gefle: Stud. R. Oldb. Dal. Osmundsberget. Ner. Kumla, Sköllersta och Asker spr. Verml. Persberg; samt Dalsl. Hafsås: Kindb. VG. Kinnekulle; Halle- och Hunneberg. Boh. Christinedal. Öl.: Lindb. Götth. — N.) Något lik föreg., men dubb. mindre, mjukare, grönnare och mer grenig, med tumslånga fruktskaft.

b — *Cratoneuron* Sull. Bladen med stark enkel nerv.

- 27 *H. commutatum* H. stj. utdragen, upprät ell. nedliggande, täckt af ymnigt rotludd; stj.bladen från bred, nedlöpande bas hopdragen till en lång, lancettlik, skärformigt krökt spets, smågrenarnes bl. lancettlika, alla långa hela kanten färsågade, starkt strimmiga, med i spetsen försvinn. nerv och stora, kvadratiske, gula bas- och hörnceller; parafyllierna olikformiga; kapseln n. cylindrisk, krökt, med koniskt spetsigt lock. 2½, 6. — *β falcatum* Sch. gröfre, med oordentligare förgrenad stj., tätare grenar och blad. — *γ fluctuans* Sch. lång, flytande, svartgrön, med gytrade, utdragna grenar; utan parafyllier. Fig. Br.eur. Fl.D.2499. Lindgr.M.exs.56. R.Hn. Bryac.exs.328.

Våta st., helst i kalktr. (Sk. Fogelsång; Rönödal; Stockemöllan etc. Smål. Grenna, vid Gerabäcken: Scheutz. ÖG. Omberg; Vinnerstad etc. Uppl. Gottsunda nära Uppsala: Edbo sn i Rosl.: Mosen. Ängml. Tåsjöberget. Pil. Lpm. Kåbrenäive. Um Lpm. Laxfjellet. Jemt. Åreskutan och Frösön. Herjed. flerst. Dal. Boda kapell. Vestml. Norberg: Sillén. VG. Kinnekulle. Öl. Lindb. och Zeu. Götth. — N. Bergen st., Sogn: Wulfsb. Dovre, Kongsvold etc. Nordl. Helgeland, Ranen: A. Bl. & Arn.: Salten; Sulitälma: Lor. Finnm. Tromsø, på Flöjelfeld: Holmgr.: Lyngen och Hammerfest. — *β* har samma utbredning. — *γ* N. Dovre, i små bäckar på Vårstien: Bergrgr.) Hufvudf. och *β* vanl. rödaktigt ell. gulgröna, med ljusgröna toppar; hufvudgren. 3—4 tum långa. — *H. diastrophyllum* Sw. *β* *H. falcatum* Brid.

- 28 *H. sulcatum* Sch. teml. späd, med upprät ell. nedligg. stielk, föga rotludd; bladen mot basen glest sågaggade, upptill n. helbräddade, med nerv till ell. något ofvan midten, för öfr. som hos föreg.; parafyllier 0; kaps. aflång, krökt, med koniskt spetsigt lock. 2½, 8. Fig.

Klipp. i fjelltr. r. (Pil. Lpm. Walläive och Kåbrenäive. — N. Finnm. Maaseldalen flerst. Hj. Hgn. Nordl. Moe, Krogstrand: A. Bl. & Arn. Dovre, vid Kongsvold m. fr. och vid Drivstuen.) Mycket mindre och ej så regelbundet pargrenig som föreg., hvaraf Lindb. anser den vara en var.; 1—2 tum lång och fin, men något styf, ljusbrun med grönaktiga toppar.

(*Amblysteg. filicin.*)

\*\* Stjelken och hufvudgren. oordentligt, glest ell. otydligt pargreniga.

a — *Rhytidium* Sull. Bladen tydligt enkelnerviga, på tvären vågiga; med parafyllier; kapsels lock kort sprötspetsigt; tvåbyggare.

- 29 *H. rugosum* L. (Mant. Pl. 1) stj. och gren. grofva, uppstig. ell. upprätta, glest och oregelb. pargreniga, med ofta ensidiga smågrenar, utan rotludd; bladen tättsittande, tegellagda, något klotlikt böjda, konkava, från ovan bas lancettlika, med tillbakaviken kant, smal sågad spets, nerv till ofvan midten och en stor mängd, små kvadr. celler i de nedre bladhörnen; kaps. aflång—cylindrisk, krökt, med kort sprötspetsigt lock. 2½, 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2803. Somf.Cr.exs.32. Thed.M.exs.107. R.Hn.Bryac. exs.115.

Tor. berg. r. (Lpl.—Ängml. och Herjed. Verml. Jättkänsklätten. VG. Kinnekulle, nära stora Brattfors; Mösseberg, vid Klefva: O. G. Blomb. ÖG. Omberg, Borgsudd. Öl. Södra Allvaret flerst.: Zeit. — N. Nordl.—Christiania. Funnen med frukt i Luk. Lpm. på Nammats vid Qvikkjokk af Hgn, samt i N. Gudbrandsd., vid Ringeboc; Dovre, vid Drivstuen och Kongsvold.) Mjuk gulglänsande, med mer än en linie tjocka, spröda grenar, starkt vågiga och på ryggen papillösa blad. Frukt högst sälls. i Skand. — *H. rugulosum* Wm.

b — *Harpidium* Sull. Bladen tydligt enkelnerviga, icke vågiga, vanl. starkt klotlikt krökta; utan parafyllier; locket utan spröt.

a — Bladbasens hörnceller starkt uppblåsta; sambyggare.

- 30 *H. uncinatum* H. stielken uppstigande ell. nedligg., glest och oordentligt pargrenig; bladen från bredare bas lancettlikt syllika, med n. hårfn, småsågad spets, skårformigt böjda, starkt strimmiga, med till nära spetsen nående nerv; kaps. n. cylindrisk, krökt, med koniskt spetsigt lock och bred ring. 24 6—9. —  $\beta$  abbreviatum Sch. stj. och fruktskaft korta; kaps. aflång, n. rak och upprät. Fig. Br.eur. Fl.D.2344. R.Hn.Bryac.exs.111.

Fukt. st. a.,  $\beta$  fjelltr. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Torn. Lpm. — N. Finnm. Dovre.) Var. i hög grad till storlek och förgrening, bladspetsens längd o. s. v.; färgen vanl. gul- ell. brunaktig.

- 31 *H. fluitans* L. stj. långt utdragen, ofta flytande, oordentligt förgrenad och glest pargrenig; bladen lancettlika, småningom afsmaln. till en hårfn spets, n. helbräddade, de i stielkens topp och på smågrenarne klotlikt krökta, alla ostrimmade, med upp emot spetsen nående nerv; kaps. aflång, krökt, med lågt koniskt vårtspetsadt lock, utan ring. 24 6, 7. —  $\beta$  falcatum Sch. grenar och blad mer tättsittande; bl. skårformigt krökta, med stark nerv. —  $\gamma$  serratum Lindb. bl. smala, med sågad spets. Fig. Br.eur. Fl.D.1291. Sill.M.exs.161. R.Hn.Bryac.exs.390.

Vatten. (Sk.—Lpl. — N.) Från några tum till mer än fotslång, hufvudformen brun- ell. rödaktigt grön.  $\beta$  kortare och gröfre: *Leskea Deinboellii* Sw. enl. Lindb.;  $\gamma$  är *Dichelyma Swartzii* Lindb. i Sch. Syn. och ed.8.

$\beta$  — Bladbasens hörnceller som hos afd. a —; tvåbyggare.

- 32 *H. exannulatum* Gåmb. stielken något fin, mer pargrenig och med mer krökta grenspetsar än hos föreg.; bladen ända från basen finsågade, vanl. alla klotlikt krökta, för öfr. som hos föreg.; kaps. aflångt cylindrisk, krökt, med lock som hos föreg., utan ring. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Sill.M.exs.158. R.Hn.Bryac.exs.269.

Kärr. (Sk.—Lpl. Boh. Öl.: Zett. — N.) Vanl. upprät, 3 å 4 tum hög, till habitus en medelform mell. de två föreg. Fruktskaften likasom hos föreg. mycket långa, ofta 3 tum. — *H. polycarpon* Ahnf. och Sill. exs., som enl. Lindb. hörer hit, är en finare, ofta fotslång form, som växer i uttorkade kärr.

- 33 *H. lycopodioides* Schwægr. stielken utdragen, tjock, slak, oordentligt förgrenad, bladen n. legellagda, klotlikt krökta, åggrundt lancettlika, småspetsiga, helbräddade, starkt strimmiga, med upp emot spetsen nående nerv, blott några få, quadr. större hörnceller vid basen; kapseln aflång, krökt, med konvert, uddspetsigt lock, mycket bred ring. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Sill.M.exs.160. R.Hn.Bryac.exs.358.

Sanka kärr och pölar. (Sk.—Helsl. och Dal. Öl.: Lindb. och Zett.) Mjuk, ofta fotslång mossä, med utseende af *H. scorpioides*, men af lysare, gulaktig färg och olika förgrening, samt lätt skiljd på bladnerven. Fr. teml. sällsynt. — *H. rugosum* Sw.M.Succ.

- 34 *H. Kneiffii* Sch. stielken nedligg., med uppstigande toppar, glest och oordentligt pargrenig; bladen från bred, n. hjertlik bas lancettlika med lång afsmalnande klotlikt ell. oordentligt vriden spets, helbräddade, ostrimmade, med nerv till ofvan midten ell. n. upp emot spetsen, nedtill lös cellväf och stora, vattenklara hörnceller; kaps. aflång—cylindrisk, krökt, med lock som hos föreg. och bred ring. 24 6. Fig. Br.eur. R. Hn.Bryac.exs.356.

Fukt. st., diken etc. (Smål. Jönköping, vid Lillsjön: Scheutz. Södm. Grödinge sn. Snäckgårdet. Stockh. Haga, Orhem, Huddinge, Sandsjön m. fl. st. Uppl. Nerest, vid Uppsala: Mosén. Ängml. Sollefteå; samt VB. Umeå och Luleå: Holmgr. Ner. Örebro, Arnängarne; Ormesta i Almby m. fl. st. VG. Göteborg: Holmgr. Boh. Marstrand, på Kådn: O. G. Blomb. Öl. mångenst. enl. Zett. — N. Dovre, vid Jerkind: Scheutz.) Några tum lång, teml. fin, nedtill brunaktig, upptill grön; bladen mest ensidigt krökta i grenspetsarne, längre ned mer oordentligt böjda hit och dit, utan veck ell. strimmar, med starkt uppblåst vidgade hörnceller och nedlöp. kanter. Frukt mycket sälls. — *Amblystegium* Br.eur. *H. aduncum* H. enl. Lindb., hvilket namn Schimp. anser rätteligen tillhöra en närbesläktad mer smalbladig och mer likformigt krokbladig form (Br.eur. Suppl.fasc.III,IV), hvars var. *H.*

*Kneiffii* skulle vara, hvaremot *Wils.* åter tror, att det tillhör *H. vernicos.* och flere förf. ändl. dermed äfstats *H. intermedium.* Ett så mångtydigt namn, och som trol. innefattat flere af de nämnda arterna, anser utg. helst böra alldeles bortläggas.

- 35 *H. Sendtneri* Sch. stjelken långt utdragen, glest och oordentligt pargrenig; bladen skärformigt krökta, från bredt aflång, nedlöpande bas lancettlika, helbräddade, ostrimmade, med ofvan midten ell. upp emot spetsen nående nerv, och stora brunaktiga hörnceller vid basen; kaps. aflång, krökt, med konvext, uddspetsigt lock och bred ring. 24 6, 7. —  $\beta$  *Wilsoni* Sch. gröfre; bladcell. vanl. något kortare och vidare än hos  $\alpha$ . Fig. Schimp.Br.eur.suppl.

Kärr, r. (*Herjed.* Stora Midtåkläppen och Axhögen: Hellb. Uppl. Björinge i Edbo sn m. fr.: Mosén. Smål. Jönköping, vid Lillsjön: Zett. Sk. Stehag: Hamnstr. Öl. öfver n. hela ön: Zett. — N. Dovre: Scheutz. —  $\beta$  Uppl. Björinge i Edbo sn: Mos. Vestml. Strömsholm: Hamnstr. Öl.: Lindb.) Hela mossan gul- ell. brunaktig. 1—2 qvarter lång, mycket gröfre än föreg., och mest lik följ., från hvilken den skiljer sig med föga annat än kortare och bredare celler, bladbasens mer nedlöpande hörn och dessas med de öfriga bascellerna mer olikformiga celler. — *H. intermed.*  $\gamma$  *Wilsonii* Lindb. Fört. öf. Spitsb. mossor 1866?  
(*H. scorpioides.*)

$\gamma$  — Bladbasens hörnceller n. likformiga med de öfriga bascellerna: tvåbyggare.

- 36 *H. intermedium* Lindb. stj. som hos föreg.; bladen skärf. krökta, från bredt äggrund, knappt nedlöpande bas lancettlika, småningom afsmaln. till spets, helbräddade, ostrimmade, med nerv till ofvan midten; kaps. aflång—n. cylindr., krökt, torr något strimmig, med koniskt, spetsigt lock och bred ring. 24 6, 7. Fig. Schimp.Br.eur.suppl. [*H. Cossoni*]. R.Hn.Bryac.exs.113 [*H. adunc.*].

Kärr och fukt. skogsmark. (Sk.—Ängml. Säbrå, och Jeml. Frösön: Holmgr. Öl. Borgholm: Scheutz. Gotl. Visby; Gothemsån: Storguns: C. Hu. — N. till Dovre, vid Drivstuen. Bergen st., Sogn: Wulfsb.) Storlek som hos föreg.; vanl. något mindre grof, med mycket oföklånga smågrenar, brun- ell. gulaktig, i topparne renare grön. Bladspetsen ofta vridet böjd, och bladbasens alla celler likformiga [hörncell. icke särskildt framstående], något upplåst vidgade. — *H. aduncum* ed.8. *H. Cossoni* Sch.

- 37 *H. vernicosum* Lindb. stj. uppstigande, glest och teml. regelbundet pargrenig; bladen tunnare och genomskinliga, från äggrund, icke nedlöp. bas lancettlika, helbräddade, veckigt strimmiga, med nerv till ofvan midten; kaps. som hos föreg., med konvext, vårtspetsigt lock och bred ring. 24 6, 7. Fig. Schimp.Br.eur.suppl. R.Hn.Bryac.exs.268.

Kärr, r. (Smål. Jönköping, vid Lillsjön; samt i Säby, vid Sommen: Scheutz. ÖG. Vinnerstad sn: Holmgr. Stockh. vid Carlberg och Nacka damsjö. Uppl. Vitulfsberg nära Uppsala; samt Rosl. i Bladåkers och Edbo snr: Mos. Gestr. Kubbo. VB. Umeå: Holmgr. Ner. Örebro vid Markkärr. Hall. Varberg: Scheutz. Öl. Melboda skog: Lindb.) Flere tum lång, och mycket finare än föreg., med uppråta, gröna toppar, korta skiftevisa smågrenar. Toppbladen klotlikt, de öfriga mindre starkt krökta, icke så tydligt ensidiga som hos föreg.; bladens fästpunkt vanl. vackert högröd; bascellerna något vidare än de öfre, eljest med dem och sinsemellan likformiga [utan sersk. hörnceller]. Frukt sällsynt. — *H. pellucidum* Wils. mskr.

$\delta$  — Bladbasens hörnceller som hos afd.  $\gamma$  —; sambyggare.

- 38 *H. revolvens* Sw. stj. n. upprät, oordentligt delad i n. jemnhöga grenar, med glesa smågrenar; bladen tätt sittande skärformigt krökta, lancettlikt syllika, med hårfin utdragen spets, helbräddade, ostrimmade, med nerv till ofvan midten; kaps. aflång, föga krökt, med koniskt lock, bred ring. 24 7—9. Fig. Br.eur. Sw.M.Su.17. Sill. Mex.159. R.Hn.Bryac.exs.112.

Sanka kärr. (Lpl. och VB.—Verm. Ner. och ÖG. Sk. Broby. — N.) Gröfre än *H. intermed.*, churu vanl. kortare; till färgen röd- ell. svartbrun, med något brandgula toppar. Bladens spets ofta vriden, deras basceller som hos föreg.

39 *H. badium* Hn. stj. nedligg. ell. upprät, med utdragna enkla ell. föga delade grenar; bladen klotlikt böjda, konkava, *bredt äggrunda, kortspetsade*, helbräddade, ostrimmade, med nedom spetsen upphörande nerv; kaps. liten, aflång, krökt, med konvext, uddspetsadt lock, *smal ring*. 24 7. Fig. R.Hn.Bryac.exs.114.

Fukt. klipp., kärr, helst i fjelltr. r. (*Lul. Lpm. Ananasse: Sirkasluokte: Njuonjes: Kaskaiwo: Kaddepakte m. fl. st.: Hj. Holmgr. Pit. Lpm. Hundviken vid Käksa: Tärresäwe: Holmgr. Um. Lpm. Lycksele. Jemil. Snasahögen på Getvalen. Herjed. Helagsfjellen: Haftorstöten: Funnedsalsberget etc. Dal. Grycksbo. VB. mell. Långträsk och Svansolet; Skellefteå, Falkberget. — N. Finnm. Maalselvdalen, fj. Aglappen: Hgn. Nordl. Salten: Fjellet Rappisvare nära Sulitälma: Lorentz: Helgel., Ranen flerst.: Bl. & Arn. Ronisdalen, Stigfeld: Kindb.: Aalesund: Hgn. Bergen st., Sogn: Wulfsb. Dovre, vid alla fjellstugorna. Gudbrandsd., Ringeboe.) Nästan så grof som föreg. Grenarne 1—3 l. långa, styfva, enkla ell. med några få,  $\frac{1}{2}$  l. långa smågrenar, glänsande kastanjebruna med ljusare topp; bladspetsen kort och hvass, stund. mer syltlik. Bladhörnen med några få, små qvadr. celler. Kaps. på mycket fnt skaf, ovanligt liten. Endast på ex. fr. Um. Lpm. af Ångstr. har utg. sett lock.*

c — Bladen nervlösa ell. vid basen otydl. dubbelnerviga [hos *H. scorpi.* stund. kort och svagt enkelnerv.], *rundtom tegellagda*.

a — *Scorpidium* Sch. Stjelkbladen trubbiga ell. kortspetsiga; utan parafyllier; tvåbygg.

40 *H. scorpioides* L. stj. utdragen, grof, med långa, jemnhöga grenar, och spridda smågrenar; stjelk- och grenbl. tegellagda, klotlikt böjda, särd. de öfre, konkava, äggrunda—afhänga, kortspetsiga, helbräddade, ostrimmade, vanl. med kort och otydl. dubb. nerv och något vidgade basceller; smågrenarnes blad mer krökta och smalspetsade; kaps. aflång, krökt, med koniskt, spetsadt lock, bred ring. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.2504.f.1. Lindgr.M.exs.4. R.Hn.Bryac.exs.357.

Kärr och pölar. (*Sk.—Lpl. — N*)  $\frac{1}{2}$ —1 fot lång och mycket grof. 1—2 lin. tjock, brunglänsande ell. svartgrön, mest lik *H. lycopodioid.*, men lätt skiljd med de ostrimmade, n. nervlösa bladen.

β — *Homomallium* Sch. Bladen smalspetsiga, starkast krökta i grenarnes spets; utan parafyllier; sambyggare.

41 *H. incurvatum* Schrad. stj. glest och oordentligt pargrenig, med tråds mala, upptill krökta grenar; bladen något ensidigt böjda uppåt, lancettlika sylspetsade helbräddade ell. i spetsen glest småsågade, ostrimmade, n. nervlösa, af teml. lös cellväf och med qvadr. hörnceller vid basen; kaps. aflång, krökt, med konvext, kort sprötspetsadt lock och bred ring. 24 5, 6. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.27. R.Hn.Bryac.exs.325. Sten. r. (*Sk.—Gestr. och Dal. Ångml. Grofell i Säbrå: Holmgr. Dalsl. Hedeberget: Kindb. Öl.: Lindb. Gottl. Thorsborgen. — N. till Salten.*) Växer i en ell. annan tum vida, nedligg. och plattade mattor med något uppböjda grenspetsar; bladen ofta föga krökta, i grenspetsarne mer klotlika.

\*42 *H. blytii* Br. & Sch. stj. oordentligt förgrenad, med tråds mala, n. raka och upprätta grenar; bladen mer och mindre ensidigt utstående, föga böjda, konkava, äggrundt lancettlika, hastigt smalspetsiga, glest småsågade, ostrimmade, med ojemnt 2delad, svag nerv, och cellväf som hos föreg.; kaps. som hos föreg., men med vårtspetsigt lock. 24 5, 6. Fig. Br.eur.

Sten. r. (*N. söd. delen: Blytt enl. Sch.*) Ännu finare än föreg., från hvilken den. enl. Schimpers beskr. och fig. i Br.eur., hufvudsakl. skiljer sig med rakare grenar och blad, de sednare bredare och tvärt sammandragna till en kortare spets; nerven svag, af en kort och en längre strimlik gren. Anses af Lindb. för blott en obetydlig form af föreg. Osedd af utg.

γ — *Heterophyllum* Sch. Bladen smalspetsiga, på stj. ensidigt krökta, på gren. raka; med parafyllier; sambyggare.

43 *H. Haldanianum* Grev. stj. elken krypande, oordentligt pargrenig; stj. bladen ensidigt böjda uppåt, grenblad. utstående, alla äggrundt lancettlika, spetsiga, helbräddade, n. nervlösa och med stora, uppblist vidgade, genomskinl. hörnceller vid basen; kaps. cylindrisk, lutande och något krökt ell. rak och upprät, med koniskt, snedspetsadt lock och smal ring. 24 9, 10. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.389.

Jord, murkna stamm. r. (VB. Norsjö sn, mell. Långträsk och Svanslet vid Skellefte-  
elf, på murkna stockar.) Bildar nedtryckta rotslående tuftor af brun- ell. gul-  
grön färg. Stjelken ell par tum lång, med  $\frac{1}{2}$ —1 tum långa grenar. Svenska ex.  
utan frukt.

d — *Drepanium* Sch. Bladen nervlösa ell. otydl. dubbelnerviga, ord-  
nade i 2 tydliga rader med ensidigt böjd spets; dels med, dels  
utan parafyllier.

α — Tvåbyggare; med parafyllier.

- 44 *H. pratense* Br. & Sch. stjelen nedligg. ell. n. upprät, glest och oordentligt par-  
grenig, med plattade grenar; bladen n. 2sidiga, med ensidigt nedböjda spetsar,  
ägggrundt lancettlika, spetsade, helbräddade, i torrt tillstånd på tvären vågiga, n.  
nervlösa ell. med mycket kort dubb. nerv; bladbasens hörnceller vidgade [icke stora  
och uppblåsta]; perichætialgren. rotslående, med sågade blad; kaps. aflång, krökt,  
n. slät, med lågt koniskt, spetsigt lock, bred ring. 2 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.  
Bryac.exs.330.

Skog., kärr, skogsäng. r. (Ner. Eker sn; Skepphulta äng i Svennevad, ymn. fruktbär.:  
C. Hn. Rosl. Snellinge i Börstil sn. Gestr. Mårdäng; Kubbo; ön Rönnmåra.  
Helsl. Hemstanäs, i Flyången och Tönsmyran; Alfsta och Arbrå snr: R. Oldb. Pil.  
Lpm. nedom Kåbrenäive. Lul. Lpm. Snjårak vid Qvikkjokk: Holmgr. Öl. Böda  
park: Zett. — N. Christiania. Lillehammer. Dovre, mell. Kongsvold och Vårstien.  
Finnm. Maalselvdalen, vid Overgaard: Holmgr.; Bøsekop: G. v. Frauent.) Blekt  
ljusgrön ell. gulaktig, 3—6 tum hög, med tunn och platt, liniebred stjelk, utmärkt  
af de fullkoml. genomskinliga bladen med bredare spets och otydligare nerv,  
smärre bladhörnceller än hos följ. art. Hanblir dels bildande egna, små, knopp-  
lika stånd, dels med små rötter fästade vid honväxtens stj. och blad (pseudomo-  
noik blomställning; se Sch.Syn. och Br.eur.).

- 45 *H. Lindbergii* Mill. stjelen nedligg. ell. båglik uppböjd, oordentligt och glest par-  
grenig, med n. uppräta, enkla och jemnhöga grenar; bladen ensidigt klotlika, breda  
ägg. — n. lancettlika, spetsade, helbräddade, med kort, dubbel nerv och stora, starkt  
uppböjda, vattenklara hörnceller vid basen; perich.gren. icke rotslående, med strim-  
miga, helbräddade blad; kaps. aflång—äggformig, krökt, torr finstrimmig, med lock  
och ring som hos föreg. 2 7. —  $\beta$  *condensatum* Berggr. liten, tätt tuftad, upptill  
brungul; bladnerv enkel, teml. lång, hörncell. mindre, ej uppblåsta. Fig. F.I.D.2802.  
R.Hn.Bryac.exs.270 [*H. arcuat.*].

Dik., vägbant. (Sk.—Lul. Lpm. och VB. Hall. Varberg: Scheutz. Funnen m. fr. af  
Lindb. nära Stockh., vid Örhem; af Stud. Oldb. vid Gefle och i Helsl. Alfsta sn. vid  
Born; samt af Sillen i Vestml. vid Häggesta i Odensvi. — N. från Christianiastrakten—  
Finnm. —  $\beta$  N. Dovre, nedom Finnshöe: Berggr.) Växer i lifligt gröna, stund.  
brunglöna mallor, med 1—2 t. höga, i spetsen krökta grenar. Hanblir på egna  
stånd, som fullkomligt likna honväxten. Frukt på tumslånga skaft, mycket säll-  
synt. Ex. af  $\beta$ , meddelade af Berggr., förete nog afvik. utseende och karakterer;  
närmast denna, men ännu finare, är en af Holmgr. under namnet *tumescens*  
lemnad form från Lul. Lpm. Stora Sjöfallet. — *H. curvifolium* ed.6. *H. prat.*  $\beta$   
hamatum Sch. *H. patientia* och *H. arcuatum* Lindb.

- 46 *H. imponens* H. stj. nedliggande, delad i n. regelbundet pargreniga hufvudgrenar;  
bladen 2sidigt tegellagda, ensidigt skärformigt nedböjda, från ägggrund bas lancettlikt  
syllika, med lång, krusigt vriden och höjd, starkare sågade spets, längs hela kanten  
finsågade, med ingen ell. kort, dubb. nerv, och kvadratiska, yrgade, gula hörnceller  
vid basen; parafyll. stora; kaps. smal, cylindrisk, upprät och n. rak, med koniskt,  
uddspetsigt lock och bred ring. 2 8, 9. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.327.

Klipp., jord, trädst. r. (Sk. Höör m. fl. st.; samt Smål. Elmhult: Berggr.; Skurugata.  
ÖG. Lemunda; Kolmorden, nära Marmorbruket: C. Ind. Södm. Stafsjö bruk, med  
unga fr.: Mosén. Ner. Skåleklint, samt nära Villingsberg: C. Hn. Vestml. Rams-  
hyttan, på Aborrkärrberget: Sill. VG. Hunneberg, nära Nygård.) Stjelken ganska  
lång, i ofta stora mallor af vacker gulbrun ell. brunglön färg. Till växtsedet  
mest lik *H. cupressif.*, men lätt igenkänlig på den mycket mer regelbundna för-  
greningen och de starkt krusiga, tydl. sågade bladen. Frukt sälls.

- 47 *H. callichroum* Brid. stjelen nedligg. ell. uppstigande, delad som hos föreg.; bladen

tätt sittande, skärformigt nedböjda, från bredt äggrund, konkav bas hastigt smalt lancettlika, långspetsiga, *helbräddade*, med ingen ell. kort, dubb. nerv, och *helt få*, vidgade, gula ell. vattenklara hörnceller vid basen; parafyll. små; kaps. *af lång*, något krökt, med konvext, uddspetsigt lock, *mycket bred ring*. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Rab. Bryoth. 12: 347.

**Klipp.**, jord, helst i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Nammats vid Qvikkjokk; Kådepakte vid Saggatjaure m. fl. st.: H. Holmgr. — N. Tromsö, Maalselvdaalen och Aalesund: Holmgr. Helgeland, på Tomö, Huglö och Hønnæsö i Ranen: A. Bl. & Arn. Mostamarken: Ångstr. Vasensfjeld nära Næs jernverk m. fr.) *Rent grön ell. gulgrön, mattlikt växande moss, något finare än föreg.; utmärkt af alla sina delars mjukhet och de något krusiga bladen från följ. Hanblirna dels på egna stånd, som likna honväxten, dels (på Skottska ex. enl. Wils.) fästade, likasom hos H. prat., med små rötter på honväxtens blad.*

**48 H. cupressiforme** L. stjelken nedliggande, oordentligt delad, säll. n. regelbundet pargrenig; bladen 2sidigt tegellagda, skärformigt nedböjda, konkava, äggrundt lancettlika, jemnt afsmalnande till spets, *helbräddade ell. i spetsen finsågade*, med ingen ell. kort och svag, dubb. nerv, och *talrika*, kvadratiska, gula ell. vattenklara hörnceller vid basen; parafyll. *få och smala*; kaps. n. cylindrisk, något krökt, med konvext, udd- ell. vårtspetsigt lock, bred ring. 24 4—7. — *β mamillatum*: fin, med tattsitt., n. parvisa trinda grenar och långspetsiga blad; locket med vårt. — *γ resupinatum*: fin, gulgrön, med tattsitt., upptå böjda bl.: locket med sprötluk udd. Fig. Br.eur. FID.535.f.2. R.Hn.Bryac.exs.326.

\* *Vaucheri* Lesq. Cat. tätt tufvad, brungrön, med uppräta, n. jemnhöga grenar, tätt tegellagda, svagt böjda bl. af bredt jemnbreda celler och med ännu talrikare, mycket små, quadr. hörnceller vid basen. Fig. Rab.Bryoth.598.

**Klipp.** och sten. a. (*Sk.—Lpl.* — N. — *γ Sk.* Kullaberg. — \* *VG.* Kinnekulle. Stockh. Utön; Dalarö, samt *VB.* Luleå vid Råbäck: Holmgr. Öl. flerst.: Lindb. och Zett. Gottl. Helvig sn. — N. Dovre: Berggr. Trondhj., samt Bodö och Tromsö: Holmgr.) *Växer i stora och låta mattor af mörkgrön, brun-ell. gulaktig färg, och var. i högsta grad till groflek och förgrening. Bladens cellväf vanl. mycket tät, af smalt jemnbreda celler. — β H. mamillatum ed.6. γ H. resupinatum Wils. \* som är H. cupressif. \* juleaceum Zett. och ed.9, anses af flere, på grund af den lösare cellväfen, som god art.*

*β — Tvåbyggare; utan parafyllier.*

**49 H. Heufleri** Jur. stjelkens hufvudgrenar n. jemnhöga, enkla ell. n. regelbundet pargreniga, med krökta spetsar; bladen tattsittande, ensidigt skärformigt krökta, konkava, äggrundt—af långt lancettlika, smalspetsiga, med *starkt tillbakarullade kanter*, *helbräddade ell. i spetsen småsågade, strimmiga*, med kort, dubb. nerv, och *helt få, små, quadr., vattenklara* hörnceller; kapseln cylindrisk, något krökt, med koniskt, vårtspetsigt lock. 24 7, 8. Fig.

**Klipp.** i fjelltr. r. (*Pit. Lpm.* Tjdtjakk: Lindb. fört. öfver Spitsb. mossor. — N. Finnmark på hafsclipp, vid Talvig: Dr. Lor.: Tromsö, Flöjelsfeld; samt Nordl. Bodö: Holmgr. Dovre, Finnshöe och Knudshöe, samt med fr. vid Vårstien: Berggr.: Kongsvold: Lor. Gudbrandsd.. Ringeboe: Holmgr.) *Bildar låta, 1—2 tum höga, ofvan gulgröna, nedtill bruna tufvor, med teml. fina grenar. Dovre-ex., meddelade af Berggr. och Lorentz, dro till pargreniga, hvaremot de Finnmarkska till sina n. enkla stjelkar ell. hufvudgrenar fullkomligt likna ex. från Salzburg och Tyrolen. — H. revolutum Lindb.*

**50 H. Bambergeri** Sch. hufvudgren. n. uppräta, jemnhöga, enkla ell. mycket glest och oordentligt förgrenade; bladen mycket tätt sittande, ensidigt krökta n. i cirkel, äggrundt lancettlika, långt smalspetsiga, med *platta*, *helbräddade kanter*, *ostrimmade*, nervlösa ell. med svag och mycket kort dubb. nerv, och *få, små, quadr., gula* hörnceller. 24. Fig.

**Fjelltr. r. (Pit. Lpm.** Tjdtjakk. *Herjed.* Stora Midtåklappen: P. J. Hellb. — N. Nordl. Næsne och Hammerö i Helgeland: A. Bl. & Arn. Dovre, på Blåhöe: Berggr.: Kongsvold, på Knudshöe, särd. vid Sprebäckens öfre lopp, samt på Högsnyta: Berggr. och Lor.: Finnsb.: Holmgr.) *Dubbelt gröfre än föreg., mycket tätt tufvad och styf, upptill grön ell. gulgrön, nedtill brungul; mest utmärkt af de 2—3 tum långa, n. enkla hufvudgrenarne ell. stjelkarne och de cirkelformigt krökta bladen. Frukt*



okänd. — *Ex. från Herjed. äro enl. Flora f. 1868 af Sch. bestämda till H. condensatum Sch., men hafva icke, såsom denna beskrifves, lösare cellväf än vanlig H. Bamb., och skilja sig i intet från Norska och utländska ex. af den sednare.*

γ — Sambyggare.

- 51 *H. hamulosum* Br. & Sch. stj. uppstigande ell. upprät, n. regelbundet pargrenig; bladen glest tegellagda, starkt skärformigt krökta, från äggrund bas lancettlika, småningom sammandragna till en lång och smal spets, helbräddade, endast i öfversta spetsen sågländade, med ingen ell. otydl., kort dubb. nerv och knappt vidgade hörnceller vid basen; kaps. aflång—cylindrisk, föga krökt, med konvext, uddspetsigt lock, teml. bred ring. 2½ 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.2749. Rab.Bryoth.491.
- Fjellklipp. r. (Lul. Lpm. alla fjell vid Qvikkjokk; Jokkmokk etc.: Holmgr. Pit. Lpm. Käksa. Jemtl. Snasahögen, vid Handölsforsen; Åreskutan, vid Ullnå: S. Almqv. Herjed. Stora Midtåklappen: Oldb. — N. Finnm. Maalselvdalen: Holmgr. Nordl. Helgeland, flerest. i Ranen: A. Bl. & Arn. Dovre, Vårstien och de högre delarne af Knudshöe; Blåhöe och plåtan nedom Finnshöe: Berggr. Gudbrandsd., Stuelsbron i Ringeboe: Scheutz. Tidenfeld. Sogn: Wulfsb.) *Tumshög och fin, något sprödt, växande i låta, gulaktiga tuffor, med bladen krökta n. i cirkel.*
- 52 *H. fastigiatum* Brid. stj. krypande, n. regelbundet pargrenig, med korta, uppräta, krökta smågrenar; bladen tätt sittande, skärformigt krökta, från äggrund bas hastigt sammandragna till en lång och smal spets, helbräddade, med nerv som hos föreg. och teml. talrika, starkt vidgade hörnceller vid basen; kapseln aflångt cylindrisk, något krökt, med konvext, trubbigt vårtbärande lock, smal ring. 2½ 7, 8. Fig. Br.eur.
- Sten., helst kalk-, r. (Jemtl. Fjösön: Holmgr. Herjed. i Vemdalen. Dal. Osmundsberget; Boda kapell m. fl. st. i Rättvik sn. Verm. vid Persbergs grufvor. Ner. kring Dylta bruk flerest.: C. Hn. — N. Finnm. Tromsø, i allm.: Holmgr. Nordl. Salten: Schleg. och Arn.: Helgeland, flerest. i Dunderlandsdalen: A. Bl. & Arn.) *Fin som föreg., i 2—3 tums vida nedtryckta mattor, gulaktigt grön, rotlödande.*
- 53 *H. pallescens* (H.) P.B. stjelen som hos föreg.: bladen tegellagda, skärformigt krökta, från äggrund bas lancettlika, långspetsiga, från midten uppåt finsågade, med tillbakavikna kanter, och nerv som hos föreg.; hörncellerna vid basen små, föga vidgade; kapseln n. cylindrisk, föga krökt, med stort koniskt, kort sprötspetsadt lock, teml. bred ring. 2½ 7, 8. — *β subulaceum* Sch. bladen tätare tegellagda, föga krökta. Fig. Br.eur. [*H. reptile* och *perichæte*]. Rab.Bryoth.299.
- Sten., trädstamm. r. (VB. Skellefteå: samt Ångml. Hernösand: Holmgr. Helsl. Hudiksvall; Arbrå sn, Dropphällen: Oldb.; Söderhamn: Holmgr.; Skog sn, Hemstanäs. Gestr. Gefle. Uppl. Gottunda: Rosersberg. Stockh. St. Essingen: Skrubba: Haga park. Södm. Svanvik vid Nyköping: C. Ind.; Stafsjö bruk: Mosén. ÖG. Vinnerstad: Holmgr. Herjed. Funnedsalsberget: Oldb. Dal. Osmundsberget; Norrbärke: Grycksbo. Vestml. Loka. Ner. Breffvens bruk, vid Skirabäcken: C. Hn. Verm. Tollerud; Pershöjd. Hall. — N. Dovre, Kongsvold: Scheutz. Gudbrandsdalen: Berggr. Lillehammer. Næs jernverk. Kongsberg.) *Nåstan så fin som de 2 föreg., grön ell. gulgrön; utmärkt af de sågade bladen och det snedt sprötspetsiga locket, som är vidare än kaps. — H. protuberans* Brid. *H. reptile* Michx. och Sch. Syn. *Leskea pallesc.* H. enl. Sch. Syn. och Lindb., som granskat Swartz' orig. ex. *β* är *H. perichæte* Br.eur. *H. pallescens* Sch. Syn. synes, såsom Lindb., *Milde* m. fl. anse, endast vara en mera gles- och smalbladig form af närr. art.

### 3. BRACHYTHECIUM Schimp.

† *Myurium* Sch. Bladen rundtrubbiga med hårudd; tvåbyggare.

- 1 *B. herjedalicum* Lindb. stjelen nedliggande, oordentligt pargrenig, med uppräta, uppåt vidgade grenar; bladen tätt tegellagda, starkt konkava, bredt äggrunda ell. elliptiska. rundtrubbiga med utdragen härfin, smätandad udd, helbräddade, med fin nerv till midten och mycket tät, fast cellväf. 2½. Fig.
- Fjelltr. r. (Herjed. Stora Midtåklappen. — N. Nordl. Sulitälma: Lor. Dovre, på Finnshöe; Kongsvold flerest.: Berggr.) *Några tum lång, teml. grof, glänsande gulgrön mossa, med klubblikt trinda grenar; bladen ovanligt starkt konkava med hårudd af ungefär ½ deras egen längd. Frukt obekant. — Myurium* Sch. Syn. *Hypnum*

ed.9. Påstås af Lorentz i dess "Ausflug nach Sulitälma" vara identisk med *Brachythec. cirrhosum* Sch., hvarom utg., som aldrig sell säkra ex. af den sednare, ej kan yttra sig.

†† *Ptychodium* Sch. Bladen afsmalnande till spets; parafyllier talrika; tvåbyggare.

- 2 B. *plicatum* Br. & Sch. stielken krypande, oordentligt förgrenad; bladen tätt sittande, utstående ell. något ensidiga, åggrundt lancettlika långspetsade, med tillbakavikna, helbräddade kanter, djupa längdveck, och upp emot spetsen försvinn. nerv, fåga vidgade hörnceller vid basen; kaps. på slätt skaft, aflång, lutande ell. horisontal, med lågt koniskt lock, mycket smal ring. 24 10—4. Fig. Br.eur.

Fjelltr. r. (Pit. Lpm. Wallåive, i sluttn. mot Laiselfven. Jemtl. Åreskutan och Östersund: Arn.; Tännforsen: Schleg. & Arn. — N. Finnm. Tromsø, på Fløjelfeld: Berggr. & Holmgr.; Maalselvålen, Hvassbrun: Holmgr. Nordl. Sulitälma: Lor.; Salten, Vigstjeld m. fr.: Schl. & Arn.; Helgeland, Ranen flerst., i Moe m. fr.: Ax. Bl. & Arn. Bergen st., Sogn: vid Blåflaten i Lærdal: Wulfsb.) *Quarterslång ell. mera, teml. grof, gulgrön utan glans, med utstående ell. mot grenarnes spets svagt ensidigt krökta blad; utmärkt af de talrika parafyllierna.* — *Ptychod. Sch. Syn. Hypnum* ed.9.

††† Bladen afsmalnande till spets; alltid utan parafyllier.

\* Fruktskafet öfverallt slätt.

a — Tvåbyggare.

- 3 B. *glareosum* Br. & Sch. stielken utdragen, nedliggande med uppräta trinda grenar; bladen tätt tegellagda, smalt åggrundt lancettlika, småningom afsmalnande till en mycket lång, hårfin spets, helbräddade ell. i spetsen glesat finsågade, veckigt strimmiga, med nerv till ofvan midten; bas- och hörncellerna små, kvadratiske; kaps. oval, krökt, med koniskt spetsigt lock, mycket smal ring. 24 10—4. Fig. Br.eur. Fl.D. 2806, f.1. R.Hn.Bryac.exs.296.

Jord. r. (Smål. flerst. enl. Schentz. ÖG. Omberg: Lemunda m. fl. st. Södm. Nyköping: C. Ind. Stockh. Huddinge; Haga ruiner: Drottningholm. Uppl. Uppsala, Gottsunda och Polacksbacken: Ångstr. Herjed. Skarffjellet: Oldb. Vestml. Munga i Romfartuna: Sill. VG. Kinnekulle: Hunneberg. Öl. mångenst.: Zett. Gottl. Slite; strand s. om Klinte: Hgn. — N. Christiania, på Egeherget: Berggr.; Gudbrandsdalen, vid Stuelsbron: samt Dovre, vid Kongsvold: Scheutz.) *Lik följ., men flerdubbelt gröfre, med tjockare och glänsande grenar; mest utmärkt af den hårlika bladspetsen, som utgör en tredjedel af bladets hela längd. Frukt sällsynt.* — *Hypnum* Bruch. och ed.9.

- 4 B. *albicans* Br. & Sch. stielken och gren. som hos föreg., men mycket smälare; bladen åggrundt lancettlika, med syllik spets, och talrikare, kvadr. hörnceller, för öfr. som hos föreg.; kapseln n. åggformig, sned ell. något krökt, med koniskt, spetsigt lock, smal ring. 24 3, 4. — *β Thedenii*: stj. lång, krypande, n. pargrenig, med korta grenar; bladen glesare, finsågade, något ensidiga, med längre nerv. Fig. Br.eur. [α & β]. Sill. M.exs 155. R.Hn.Bryac.exs.150.

Sandjord, ljunghed., β skugg. sten. (Sk.—Ångml. Dal. och Verm. Öl.: Zett. Gottl. — N. till Trondhj. — *β Gestr.* Kubbo. Dal. Grycksbo: Lindb. Ner. Skogaholm; trol. flerst.) *Ljusgrön ell. halmgul, glänsande, med 1—2 tum långa, smala och trinda, vanl. enkla grenar. β är ofta quarterslång och har ett afvikande utseende, men är otvivelaktigt endast en af lokalen beroende form. Frukt teml. sällsynt.* — *Hypnum* Neck. och ed.9. *β H. Thedenii* ed.9. *Brachyth. Thed. Br.eur.*

b — Mångbyggare.

- 5 B. *Mildeanum* Sch. stielken uppstigande, med grofva, n. enkla, uppräta grenar; bladen utstående, torra tilltryckta, åggrundt lancettlika, sylspetsiga, helbräddade ell. upptill omärkligt sågtandade, något strimmiga, med nerv till ofvan midten, några kvadratiske hörnceller vid basen; kaps. åggformigt aflång, något krökt, med lågt koniskt lock och bred ring. 24 8, 9. Fig. Rab.Bryoth.597.

Fukt. och leriga st., vatt. r. (Stockh. vid Kungsholms tull, m. fr.: Lindb.) *Lik en grof form af följ., med tumslånga, starkt glänsande gulaktiga grenar, och hufvudsakl. skiljd med sina både en- och 2könade blr — är dock enl. Milde stund. sam-*

byggare —, det lägre locket med bredare ring och de mer långspetsiga och långnerviga, föga strimmiga bladen. — *Hypnum* ed.9.

c — Sambyggare.

- 6 *B. salebrosum* Sch. stjelen krypande, oordentligt — n. pargrenig; bladen vanl. utstående, äggrundt lancettlika *sylspetsade*, oftast glest småsågade, oordentligt strimmiga, med nerv till midten, helt få och föga vidgade hörnceller vid basen; kaps. äggformigt aflång, krökt, med koniskt lock och smal ring. 24 7—9. Fig. Br.eur. Fl.D.2805. Lindgr.M.exs.6. R.Hn.Bryac.exs.149.

\* *turgidum* Hn. gren. långa gulglänsande; bladen tilltryckta, helbräddade.

Jord, sten, trädst. etc. a., \* i fjelltr. r. (Sk.—VB. och *Lul. Lpm.*: Holmgr. — N. till Finn.: Hgn. — \* *Lul. Lpm.* Stora Sjöfallet: Hgn. *Pil. Lpm.* Herjed. — N. Finnm. Maalselvadalen: Hgn. Nordl. Helgeland, Korgen i Hemnaes, m. fr.: A. Bl. & Arn. Dovre, Finnshöe och Kongsvold; Blåhöe: Berggr.) *Gul- ell. brungrön, teml. grof, med tåtsittande korta, än nedtryckta, än n. upprätta smågrenar. Var. på murken ved med finare och glesare grenar: β gracile* ed.9. \* är habituellt mera lik *B. glareosum*. — *Hypnum* Hoffm. och ed.9.

- 7 *B. erythrorrhizon* Sch. stjelen krypande och rottrådig, oordentligt delad i korta uppstigande, kröktla smågrenar; bladen tåtsittande, på de yngre grenarne ensidiga, alla från bredt äggrund bas hastigt långt smalspetsiga, nedtill helbräddade, längs spetsen hvass-sågade, strimmiga, med i spetsen upphörande nerv, föga vidgade hörnceller vid basen; kapseln aflång, något krökt. 24 5,6? Fig. Br.eur.

Stenar. r. (*Um. Lpm.* Laxfjället: Ångstr. *Ångml.* Skog sn: Frist. enl. Lindb.; Hernösand; samt *Medelp.* Sundsvall: Holmgr. — N. Bogstadås: Bl.) Något styf, mycket mindre än föreg., med talrika mycket korta smågrenar; bladspetsen sterböjd; fruktskaften korta. Lock och ring okända. Ez. från Skog sn i *Ångml.* hänföres i ed.9 origtigt till *B. lætum*, som icke är funnen i Skand., men öfverensstämma icke heller väl med fig. af *B. erythrorrh.* i Br.eur. — *Hypnum* C. Müll. och ed.9.

- \* 8 *B. collinum* Br. & Sch. stjelen som hos föreg., med raka smågrenar; bladen tåtsittande, tegellagda, vanl. något ensidiga, konkava, från äggrund bas kort lancettlikt tillspetsade, öfverallt finsågade, föga strimmiga, med nerv till midten och mer vidgade, klorofyllrika hörnceller vid basen; kapseln äggformig, något sned, med konvext, värthårande lock och bred ring. 24 6—8. Fig. Br.eur.

Jord, klippspring. i fjelltr. r. (N. Dovre, vid Fogstuen; Jerkind; Kongsvold, ymnig i klippspringor: Lor.) Föga mer än tumslång och fin, grön, med tått gylltrade grenar. Bladens cellväf temligen lös, genomskinlig, utom i hörnen vid basen. Kaps. jämförelsevis stor och tjock, något lutande, på halftumslångt skaft. — *Hypnum* Schleich. och ed.9.

\*\* Fruktskaftet öfverallt stråft.

a — Sambyggare.

- 9 *B. velutinum* Br. & Sch. stjelen krypande, oordentligt pargrenig, med korta, uppstigande smågrenar; bladen från smalare bas äggrundt lancettlika, småningom afsmalnande till en lång spets, öfverallt småsågade, n. ostrimmade, med nerv till ofvann midten, knappt olikformiga hörnceller vid basen; kapseln tjock, äggformig, med koniskt, kort uddspetsigt lock, bred ring. 24 4—6. — *β intricatum*: spådare, med lancettlikt syllika blad. Fig. Br.eur. H.St.Cr.4,t.27; *β* t.28. R.Hn.Bryac.exs.294.

Skugg. jord, trädrött, etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Liten som föreg., mjuk, till färg och förgrening i hög grad varierande, vanl. ljus- ell. gulgrön, med ell. utan glans; bladen ofta ensidiga; frskäft meränd. talrika,  $\frac{1}{2}$  tum höga, purpurroda; kaps. mogen kastanjebrun. — *Hypnum* L. och ed.9. *β H. intricatum* H.

- \* 10 *B. trachypodium* Br. & Sch. stjelen som hos föreg.; bladen som hos föreg., med längre och smalare, n. hårlök spets, små, quadratiska hörnceller vid basen; kapseln oval ell. aflång, något krökt, med lågt koniskt, trubbigt lock, bred ring och mycket stor mössa. 24 7. Fig. Br.eur.

Klippspring. r. (N. Dovre, Kongsvold, icke långt från Sprenbäcken och vägen till Vårstien 1867: Dr Kiær; vid foten af Högsnyta 1868: Dr Lorentz.) Något gröfre än föreg. och mera tåtbladig, glänsande högrön, med tjockt, mycket stråft, ljusrött frskäft; mössan täckande hela kaps., som vanl. är brungul; det rundtrubbiga

locket har en omärklig vårlik udd, synes dock på norska ex. variera med en längre och smalare kägellik udd. — *Isothecium trachyp.* Brid. *Hypnum* C. Müll.

- 11 *B. reflexum* Br. & Sch. stjelen utdragen, krypande, n. *pargrenig*, jemte de inkrökta smågrenarne trådmal; bladen från bredt äggr. ell. hjertlik, nedlöpande bas hastigt lancettlika, smalspetsiga, med nedtill tillbakavikna, öfverallt finsågade kanter, n. *utlöpande* nerv, och de *bukiga* bladhörnens celler starkt *vidgade*, *kvadratiske*; kapseln rundadt oval, sned och horisontal, med koniskt, uddspetsigt lock, bred ring. 24 8—10. Fig. Br.eur. Sill.M.exs.156. R.Hn.Bryac.exs.145.

Skugg. st., sten. och trädrö. (Sk.—VB. och Lul. Lpm.: Hgn. Öl. Böda: Zett. — N. till Finn.) 3—4 tum lång, men mycket fin, krypande, högrön mossa med långa, intrasslade hufvudgrenar, mycket korta, upptill vanl. krökta smågrenar; stjelkl. glest sittande, utstående, smågrenarnes något ensidiga; kaps. liten, slull. svartbrun. — *Hypnum* WM. och ed.9. *H. tenellum* Wg.

- 12 *B. Starckii* Br. & Sch. stjelen teml. grof, krypande, oordentligt förgrenad, med n. upprätta, krökta smågrenar; bladen från bredt äggr. ell. hjertlik, nedlöpande bas småningom och kort tillspetsade, med vriden spets, öfverallt sågade, ostrimmade, med nerv till ofvan midten och mycket stora, kvadratiske hörnceller vid basen; kapseln som hos föreg. 24 4, 5; 8, 9. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.355.

Skog., på stenar och stubbar, r. (Sk.—Hels. Ängsl. samt VB. Umeå; och Lul. Lpm. Pajerim: Hgn. Ner. flerst. Verml. Pershöjd i bergsl.: Kindb. Herjed. Funnedsdalsberget: Hellb. Öl. Ouenbylund: Zett.; Böda: Lindb. — N. Ringeboe i Gudbrandsd.; samt Dovre, vid Fogstuen: Berggr. Finnm. Maalselvden: Hgn.) Vanl. mycket, någongång föga, gröfre än föreg., grön ell. gulaktig, i stora, lösa tufvor, med stjelkladens bas hjertlik, grenbladens äggrund och isynnerhet de sednarens spets halft omvriden; kaps. slull. svart, med långa sidotaggar på inre peristoloms cilier. — *Hypnum* Brid. och ed.9. *H. rutabulum* β *explanatum* Myr.

- \*13 *B. glaciale* Br. & Sch. stjelen krypande, oordentligt förgrenad; bladen löst tegellagda, föga nedlöpande, bredt äggrundt lancettlika, tvärt sammandragna till spets, öfverallt småsågade, något strimmiga, med nerv till ofvan midten ell. närmare spetsen, föga *vidgade*, *aflånga* hörnceller vid basen; kapseln oval, något krökt, lutande—horisontal, med koniskt, uddspetsigt lock och smal ring. 24 7, 8. Fig. Br.eur. \*

Jord, sten, i fjelltr. r. (N. Finnm. Maalselvden: Hj. Hgn. Nordl. Sulitälma: Lor. Dovre, på Nystuehöe och vid Fogstuen (äfven m. fr.: Hgn.); Knudshöe, Kallvillasjön, Finnshöe, samt Drivstuen, v. om elfven, på sistn. ställe äfven m. fr.: Berggr. Gousta-fjeld.) Mindre och finare än föreg., utmärkt af alla sina delars mjukhet, till färgen gul- ell. brungrön, i nedtryckta tufvor; gren. n. trinda af de tegellagda bladen; dessa af lösare cellväf än hos föreg. Frukt hos oss sällsynt. — *Hypnum* Br. & Sch. och ed.9.

- 14 *B. rutabulum* Br. & Sch. stjelen utdragen, teml. grof, krypande, oordentligt delad i olikstora och ojemmt gyllrade, upprätta grenar; bladen utstående, från smalare vidfästning äggrunda, småningom smalspetsade, öfverallt småsågade, otydligt strimmiga, med nerv till midten och föga *vidgade*, *aflånga* hörnceller vid basen; kapseln äggformig—afång, krökt, med koniskt, uddspetsigt lock, bred ring. 24 9—5. Fig. Br.eur. Fl.D.2804. R.Hn.Bryac.exs.148.

Skugg. st., gräsvall. (Sk.—Hels. Torn. Lpm. enl. Ångstr. Ner. Hall. Varberg: Scheutz. Öl.: Lindb. — N.) Vanl. högrön, med flere tum långa, tjocka, löst tufvade grenar; smågrenarne tumslånga, med smalare blad. Bladen stora, med lös cellväf, varföra n. helbräddade; kapseln, på tumshögt skaft, slull. svartbrun, saknar taggar på inre peristoloms cilier, kvarpå smärre former sakrast skiljas från *B. Starckii*. — *Hypnum* L. och ed.9.

b — Tvåbyggare.

- 15 *B. rivulare* Br. & Sch. stjelen utdragen nedliggande, med grofva, uppstigande, oordentligt ell. knippevis förgrenade hufvudgrenar, krökta smågrenar; bladen utstående, från smalare, något nedlöpande bas bredt äggrunda, tvärt sammandragna till en kort och smal spets, glest och fint naggsågade, med nerv till ofvan midten och stora, rhomboidiskt sexsidiga ell. n. rektangulära hörnceller vid basen; kapseln äggformig, sned, med koniskt, långt uddspetsigt lock, bred ring. 24 9, 10. Fig. Br.eur. R.Hn. Bryac.exs.295.

Fukt. st. i skog. r. (Sk. Skärali; Fogelsång; Höör och Qvesarum: Berggr. Smål. Grenna, samt Holaveden m. fl. st.: Scheutz. ÖG. Omberg; V. Ny; Krokek sn, Getå: Mosén. Stockh. Sandsjön; Väntholmen. Gestr. Gefle, nedom Signalberget. Helsl. Hemstanäs. Lul. Lpm. Qvikkjokk, Vallskogen: Hgn. Dal. Thorsång sn, Storsund; Grycksbo. Ner. Hardeemo sn, Lanna hage; Skåleklint m. fl. st.: C. Hn. VG. Håbeberg; Göteborg enl. Ångstr. Öl. Borgholm etc.: Zett. Gottl. Koppavik. — N. Gudbrandsd., Laurgård: Hgn. Dovre, nära Grönbakken och vid Drivstuen: Berggr. Bergen st., Sogn flerst.: Wulfsb. Aalesund; samt Tromsø: Hgn.) *Stor som föreg., med ofta trädlik förgrening, ljusgrön ell. gulaktig i svällande tufvor; bladen stora, glänsande; kapseln på tumslångt ell. längre skaft, stor, rödbrun, sällsynt.* — *Hypnum Bruch* och ed.9.

\*\*\* Fruktskaftet endast upptill stråft; sambyggare.

+ 16 *B. campestre* Br. & Sch. stjelen utdragen, krypande ell. uppstigande, oordentligt förgrenad; bladen något utstående, äggrundt lancetlika, med teml. lång *syllik*, n. *uddlikt vidfogad spets, glest småsågade, strimmiga*, med nerv till ofvan midten, *föga vidgade*, n. *kvadratiske* hörnceller vid basen; kapseln *af lång, smal*, något krökt, med koniskt spetsigt lock, teml. smal ring; inre peristis cilier utan sidotaggar. 24 4, 5. Fig. Br.eur.

Gräsbevätta st. r. (Stockh. vid Marieberg. Bergillund, Drottningholm och Ulriksdal; samt Öl. Södvik: Lindb. Trol. flerst., men lätt förväxlad med *B. salebrosum*.) *Till storlek och utseende mest lik B. salebros., löst tufvad, vanl. gulaktigt grön och glänsande. Fr.skaftet tumshögt, endast upptill något stråfprickigt.* — *Hypnum Bruch*.

17 *B. populeum* Br. & Sch. stjelen krypande, rotsläande, oordentligt delad i täta, korta och uppräta grenar; bladen från aflång ell. äggrund bas *småningom afsmalnande till en lancetlik*, utdragen spets, *upptill sågade*, n. *ostrimmade*, med nerv *försvinnande i spetsen, vidgade, aflånga* bas- och hörnceller; kapseln *tjock, oval*, smed, med koniskt, uddspetsigt lock, smal ring; inre peristis cilier med sidotaggar. 24 4, 5; 8, 9. —  $\beta$  *majus*: gröfre, gul- ell. brunglänsande, med tätare grenar, mer småspetsade blad. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.29. Lindgr.M.exs.31. R.Hn.Bryac.exs.146. Sten. och trädstamm. (Sk.—Helsl. och Dal. Medelp. Sundsvall: Hgn. Boh. Öl.: Lindb. Gottl. — N.) *Vanl. blott 1 å 2 tum lång, teml. fin, bildande ofta stora hoptrasslade mallor af något glänsande, mörkgrön färg. Fr.skaften korta, vanl. mycket talrika.* — *Hypnum H. och ed.9.  $\beta$  H. concinnum Hn ed.6.*

18 *B. plumosum* Br. & Sch. stjelen krypande, delad i vanl. tvåsidiga och uppräta grenar; bladen tätsittande, utstående och något ensidiga, från *bredt äggrund ell. n. deltoideisk bas hastigt sammandragna till en kortare, lancetlik spets*, n. *helbräddade, ostrimmade*, med nerv till midten, små *kvadratiske* hörnceller; kapseln *som hos föreg.* 24 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2806.f.2. Thed.M.exs.105. R.Hn.Bryac.exs.147. Sten. i bäck. (Sk.—VB. och Lul. Lpm. Boh. Öl.: Zett. — N.) *Vanl. något gröfre än föreg., ofta flere tum lång, glänsande gul- ell. brungrön; kaps. slutt, svart, på kort skaft.* — *Hypnum Sw. och ed.9. H. pseudoplumosum Brid. och Ångstr.*

#### 4. CAMPTOTHECIUM Schimp.

1 *C. lutescens* Br. & Sch. tvåbyggare; stjelen utan rotludd, *nedligg.*, mer och mindre pargrenig, med uppstigande grenar; bladen från aflång bas lancetlikt *syllika*, långspetsiga, i *spetsen finsågade*, starkt strimmiga, med nerv till *långt* ofvan midten; kapseln på *stråft* skaft, aflångt cylindrisk, något krökt, med *koniskt*, kort sprötspetsadt lock. 24 5, 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.210.

Murar, jord etc. helst i kalktrakter. (Sk.—Uppl. Ner. i alla kalktrakter, äfven m. fr.: C. Hn. Verm. Limön; Carlstad. Lul. Lpm. Snjårak vid Qvikkjokk: Holmgr. Öl.: Lindb. Gottl. — N. Bergen st.) *Gulaktig och glänsande, ofta flere tum lång och teml. grof.* — *Hypnum Huds. och ed.9. — Anm. Öl. ex., meddelade af Zett. und. namn af Homalothec. Philippeanum Br. & Sch., skilja sig med kortare bladspets och nerv från den uhländska arten och höra snarare hit; ätm. åro de, såsom sterila, ganska osäkra.*

2 *C. nilens* Sch. tvåbyggare; stjelen och de uppräta, plattadt pargreniga stamgrenarne *betäckta af rotludd*; bladen som hos föreg., men *helbräddade*, med i *spetsen upp-*

hörande nerv; kapseln på *slätt* skaft, aflångt cylindrisk, krökt, med *konvext*, uddell. kort sprötspetsigt lock. 2 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.120.  
 Kärräng. a. (Sk.—Lpl. — N.) 3—5 tum lång, *stuf*, *starkt gulglänsande*, med *spetsiga* grenar. — *Hypnum* Schreb. och ed.9.

## 5. AMBLYSTEGIUM Schimp.

† *Leptodietyum*. Endast bladens basceller parenkymatiska, de öfriga prosenkymatiska [smalt och spetsigt sexsidiga]; sambyggare.

- 1 *A. riparium* Br. & Sch. stjelken utdragen, krypande, stund. flytande, oordentligt delad i ofta pargreniga hufvudgrenar; bladen *glesa*, *oftast 2sidiga*, bredt äggrundt—*aflångt lancettlika*, *långt smalspetsiga*, *helbräddade*, med nerv till ofvan midten; kapseln *aflångt cylindrisk*, *krökt*, med *koniskt*, *spetsigt* lock och *bred* ring. 2 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2388,f.2. R.Hn.Bryac.exs.180.

Våta st. på murken ved, i brunnar etc. a. (Sk.—Helsl. och Dal. VB. Skellefteå, vid Krångforsen. Lul. Lpm. Jokkmokk, Kaitum: Hgn. Hall. Varberg; samt Öl. enl. Scheutz. — N.) Mörk- ell. *ljusgrön*, *stund. gulgrön*, *mjuk*, *vanl. flere tum lång*, med *breda*, *af de 2sidiga* bladen *plattade smågrenar*; fr.skaften *tumshöga*. — *Hypnum* L. och ed.9.

- 2 *A. trichopodium* (Schultz.) stjelken krypande, gles och oordentligt delad i n. uppräta, *spensliga* grenar och smågrenar; bladen *glesa*, *allsidigt* och *starkt utstående*, från bredt äggrund bas *hastigt smalspetsade*, *helbräddade*, med *smal nerv till midten*; kapseln på *mycket långt och smalt* skaft, *aflång*, *krökt*, med *långt koniskt* lock, *teml. bred* ring. 2 4, 5. Fig. Br.eur. [*A. ripar.* var. s.]

Sanka str. r. (Stockh. vid Brunnsviken, nära Haga slott: Lindb. Ner. vid Skogaholmsjön i Svennevad sn; samt Örebro, i skogskärr nära Sommarro: C. Hn. Sk. vid Åkersberg: Berggr. Gotl. Thorsborg: Hgn.) *Ell par tum lång*, *fin*, *mörkgrön*, *mycket glesbladig*. Fr.skaften 2 tum höga, *mycket smala* och *slåta*. — *Hypnum* Schultz. *H. tenuisetum* Lindb. och ed.9. *Amblyst. ripar.* var. s. *trichopod.* Br.eur. och Sch. Syn.

- 3 *A. Kochii* Br. & Sch. stjelken som hos föreg., bladen *af lösare cellväf*, *lättsittande*, *otydligt småsågade*, med *teml. grof* nerv, för öfr. som hos föreg.; kapseln oval—*aflång*, *sned*, med *långt koniskt* lock, *smal* ring. 2 7, 8. Fig. Br.eur.

Fukt. st. r. (Öl. Melboda, på hafsstranden, 1865: Lindb.) *Liten och fin* som föreg., *hvilken den till karaktärerna står ganska nära*, *ehuru de mera lättsittande bladen och de endast tumshöga fr.skaften gifva den ett afvikande utseende*. — *A. curvipes* Br. & Sch. *torde blott vara en form häraf*, med *sina glesare blad* n. *bildande en öfvergång till A. trichopod.*

- 4 *A. Juratzkanum* Sch. stjelken som hos föreg.; bladen *teml. lättsittande*, *allsidigt utsperrade*, från bredt äggrund bas *långt smalspetsiga*, grenbladen *smalt lancettlika*, *alla mot basen småtandade*, mot spetsen n. *helbräddade*, med i *spetsen upphörande* nerv; kapseln *aflång—cylindrisk*, *något krökt*, med *koniskt* lock, *smal* ring. 2 6, 7. Fig. Rab.Bryoth.641.

Murken ved, gräsbeväxta st. r. (ÖG. Vinnerstad. Stockh. Mölna på Lidingön; Drottningholm; Gåsberget. Uppl. Blidö sn i Roslagen. Ängml. Songa enl. Hgn. Öl. Böda skog: Lindb.) *Stor som de närmast föreg. arterna*, *grön ell. brunaktig*, med *oordentligt intrasslade*, *halftumslånga smågrenar*, *samt dels utstående*, *dels och mest utsperrade blad*; *tumshöga fr.skaft*. *Närmast beslägtad med A. serpens*, *hvaraf Lindb. anser den vara en varietet*; dock utmärkt af den olikformiga cellväfven. — *Hypnum* Lindb. och ed.9.

†† *Amblystegium* [i eg. men.]. Bladens alla celler parenkymatiska, vida.

\* Bladen med vanl. tydlig, utdragen nerv.

a — Tvåbyggare.

- 5 *A. filicinum* Lindb. stjelken täckt af ymnigt rotludd och *tärika parasyllier*, nedligg. ell. upprät, *plattadt pargrenig*, med *korta grenar*; bladen *ensidigt böjda* ell. *aflsidigt utstående*, från äggrund, *nedlöpande* bas *snart lancettlika*, *spetsiga*, *öfverallt finsågade*, med *grof*, n. *utlöpande* nerv och *mycket stora*, *kvadratiska*, *brandgula*

hörn- och basceller; kapseln cylindrisk, krökt, med koniskt, spetsigt lock och smal ring. 24 5, 6. Fig. Br.eur. [*Hypnum*]. Lindgr. M.exs. 28. R.Hn. Bryac. exs. 329. Fukt. st., källdrag etc. (Sk.—Ängml. Säbrå: Arn.; och Herjed. Lul. Lpm. Snjårak; Kaddepakte: Holmgr. Öl.: Zeit. Gottl. — N. till Nordl. Flomn. Tromsö: Holmgr.) Växer i tätta, 2—3 tum höga, ljusgröna tuffor; äldre fruktbär. ex. mer nedligg. och ofta bruna. Till det yttre mest lik *Hypn. commutatum*, hvarmed den af Sch. sammanställs i subgenus *Cratoneuron*; deremot till bladens cellväf endast förbar med *Amblystegium*, såsom Lindb. först visat. — *Hypnum* L. och ed. 9.

b — Sambyggare.

- 6 *A. irriguum* Sch. stjelen nedliggande, efter hela sin längd rotsläende, oordentligt pargrenig; bladen glest sittande, utstående ell. något ensidiga, från nedlöpande, ägg- rund bas lancettlika, långt smalspetsiga, n. helbräddade, med n. utlöpande nerv och mycket lös cellväf vid basen; kapseln aflång—oval, krökt, med koniskt uddspetsigt lock, bred ring. 24 6. Fig. Br.eur. Rab. Bryoth. 342.

Sten. i bäckar, r. (Sk. Wallsjö; Fogelsång. ÖG. Omberg; Linköp., Tinnerbäckem: Hgn; V. Ny sn, Kafvelbäck. Uppl. Uppsala, Qvarnbo. Gottl. i en bäck söd. om Visby; mell. Visby och Lummelund, samt vid Klinte: Holmgr.) En par tum lång, gul- ell. svartaktigt grön, mycket finare än föreg.; mest beslaglad med följ., hvarmed den af gammal varit förväxlad, men skild med sin större styfhet, tydligare pargrenighet och mer långspetsade blad. Den Gottl. formen anses af Lindb. tillhöra föreg. art, hvartill den bildar en öfvergång, samt kallas af honom var. *pseudo-irriguum*. — *Hypnum* Wils. och ed. 9. *H. fluviatile* Br.eur. till en del.

- 7 *A. fluviatile* Sch. stjelen nedliggande, sparsamt rotsläende, oordentligt delad i fina, gläsa och utdragna n. uppräta grenar; bladen knappt nedlöpande, kort spetsade, helbräddade, för öfr. som hos föreg.; kapseln cylindrisk, krökt, med lock och ring som hos föreg. 24 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn. Bryac. exs. 179.

Sten. i bäckar. (Sk.—Helsl. Skog sn. Tönnebro. Verml. Gottl.: Holmgr. — N.) Stor som föreg., men gröfre och mjukare, svartgrön; bladen i grenarnes spets klotlikt böjda, eljest n. raka, af lös cellväf. Frukt sällsynt. — *Hypnum* Sw. och ed. 9.

- 8 *A. radicale* Br. & Sch. stjelen nedliggande, efter hela sin längd rotsläende, delad i tättsittande, dels korta och uppräta, dels längre och nedtryckta grenar; bladen allsidigt utstående, från bredt ägg- rund bas hastigt långt sylpetsiga, helbräddade, med stark, i spelsen försvinnande nerv, och fast cellväf af tjockväggiga, sexsidiga, vid bashörnen kvadratiske celler; kapseln cylindrisk, krökt, med koniskt lock, bred ring. 24 5, 6. Fig. Br.eur.

Jord, pålar etc. r. (Stockh. Edebyholme vid Drottningholm: Lindb. Ner. Örebro: C. Hn. Gottl.: Lindb.) Brungrön, något gröfre än följ., hvarmed den är nära beslaglad, ehuru skild med de kortare och bredare bladcellerna, den längre och tjockare nerven samt stjelkens större styfhet. — *A. varium* Lindb. *Leskea varia* H. *Hypnum* P.B.

- 9 *A. serpens* Br. & Sch. stjelen krypande, efter hela sin längd rotsläende, jemte de tättsittande, mer och mindre uppräta grenarne, tagelsmal; stjelkladen gläsa, utstående, äggrundt lancettlika, grenbladen tätare, lancettlikt sylpeta, alla smalspetsiga, helbräddade, med svag, emot spelsen försvinnande, stund. otydlig nerv och lös cellväf, kvadratiske hörnceller vid basen; kapseln som hos föreg. 24 7, 8. —  $\beta$  *serotinum* Lindb. mycket fin, grön, med uppstig. grenar, kort och fin bladnerv, under mynn. starkt hopdragen kapsel. Fig. Br.eur. Fl.D. 2387, f. 2. Thed. M. exs. 106. R.Hn. Bryac. exs. 178.

Jord, ved, trädrött, sten. etc. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Stockh. Drottningholms park.) En—flere tum lång, men mycket fin, ljus- ell. brungrön, stundom i handstora mat- ler. Var. mycket, men har vanl. långa fr. skaf och jemförelsevis stora kapslar. — *Hypnum* L. och ed. 9.

- \*10 *A. finnmarkicum* (Lor.) stjelen nedligg., rotsläende, jemte de tättsittande, n. enkla och uppräta grenarne tagelsmal; bladen n. tilltryckta ell. svagt ensidiga, från ägg- rund bas småningom lancettlika, spetsiga, helbräddade ell. vid midten och basen omärkligt tandade, med grof, till ell. ofvan midten nående nerv, lös, sexsidig, vid

basen kvadratisk, *klorofyllfattig* cellväf; kapseln n. horizontal, aflång, krökt, med konvext, trubbigt lock. 24 8, 9? Fig.

Murken ved, r. (N. Finn. Tälvig, vid sjön Storvand 1868: Dr Lorentz.) *Hela mossan gulaktig, med halftumshöga, enkla, mycket smala grenar. Kapseln liten, på Lorentz' ex., samlade i Juli, dels gammal från fjolåret, dels ung och grön; ex:s knapphändighet hafva ej tillåtit någon undersökning af ringen. Cellväfen liknar alldeles de närstående Amblystegii-arternas, men är ovanligt fattig på klorofyll; trol. är det därför, som Lor. i bref sagt sig anse denna art vara mest beslaglad med H. pallescens, hvarom den ock påminner med sin färg, ehuru de grofnerviga bladen och deras parenkymatiska cellväf hindrar dess ställande i nämnde arts närhet. — Hypnum Lor. mskr.*

\*\* Bladen nervlösa ell. blott med otydl. spår till nerv.

a — Inre peristomets tänder med mellanligg. cilier; sambyggare.

\*11 *A. enerve* Br. & Sch. stjelken oordentligt förgrenad, jemte de korta grenarne n. hårfin; bladen konkava, n. ovala med smal, föga utdragen spets, helbräddade, nervlösa, med små kvadratiske hörnceller vid basen; kapseln på bögböjdt skaft horizontal, från en tydl. hals n. cylindrisk, sned, med kägellikt, trubbigt lock, föga bred ring. 24 7, 8. Fig. Br.eur.

Fjelltr. r. (N. Dovre, på stenar bland *Pseudolesk catenulata*: Bl. enl. Sch. På de sista 20 å 30 åren icke återfunnen.) *Fin som mindre former af A. serpens, och derifrån skiljd med de i förhåll. till längden bredare, alltid smärre och mycket konkava bladen af fastare cellväf, samt den smala kapseln på svanhalslikt böjdt skaft. Allt enl. Schimp.; öfverd af utg. — Hypnum ed.9.*

12 *A. confervoides* Br. & Sch. stjelken krypande, oordentligt delad i n. pargreniga grenar, jemte grenarne hårfin; bladen ytterst små, glesa, utstående ell. svagt ensidiga, från äggrund bas hastigt smalt lancetlika, långspetsiga, helbräddade, nervlösa, med föga olikformiga hörnceller vid basen; kapseln lutande ell. n. horizontal, aflångt oval, sned, med konvext, smedt uddspetsigt lock, smal ring. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.639.

Stenar. r. (VG. Kinnekulle, på sandsten nedanför Råbäck. Um. Lpm. Laxfjellet och Klippen: Ångstr. — N. Vestfjordalen. Trondhj. vid Hasselvig: Ångstr.; Lerfossen: Schleg. och Arn. Nordl. Helgeland, Lerskardalen och Grönfjeld: A. Bl. & Arn.) *Mörkgrön, stull. brunaktig, fin som föreg. och följd, men skiljd från begge med den längre och smalare bladspetsen, samt från den förra med lockets form och från den sednare med det inre peristomets cilier. — Hypnum Brid. och ed.9.*

b — Inre peristomet utan cilier; sambyggare.

< 13 *A. subtile* Br. & Sch. stjelken krypande, med korta, upprätta och trinda, n. hårfinna grenar; bladen något ensidigt böjda ell. allsidigt utstående, smalt äggrundt lancetlika, spetsiga, helbräddade, nervlösa ell. blott med spår till en kort nerv, med föga vidgade hörnceller vid basen; kapseln aflång, n. upprätt, vanl. föga sned, med lågt koniskt, uddspetsigt lock, mycket smal ring. 24 8, 9. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.35. R.Hn.Bryac.exs.177.

Sten., trädstamm. etc. r. (Sk. Esperöd. Smål. Femsjö, vid Yaberg. ÖG. Gusum. Stockh. Uppl. Rosersberg; Uppsala. Gestr. Gelle. Helsl. Hemstanäs. Vestml. Loka: Hamnstr. Ner. Myrö. Verml. VG. Kinnekulle. Öl. Zeit.) *Muyet liten, n. hårfin, högrön ell. gulaktig, i templ. vida tufvor, med knappt halftumshöga fr.skaft. Mest lik små former af A. serpens, men lätt skiljd med de n. nervlösa bladen och den n. raka kapseln utan cilier. — Hypnum Hoffm. Leskea H. och ed.9.*

c — Inre peristomet utan cilier; tvåbyggare.

14 *A. Sprucei* Br. & Sch. stjelken krypande ell. uppstigande, trådfin, oordentligt delad i hårfinna, n. upprätta grenar; bladen glest sittande, föga utstående, smalt äggrundt lancetlika, spetsiga, helbräddade ell. glest och ojemnt finsågade, fullkomligt nervlösa, med grof cellväf och n. likformiga hörnceller vid basen; kapseln upprätt, knappt sned, från en smalare hals omv. äggformig, med konvext, vårspetsadt lock, smal ring. 24 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.176.

Klippspring. r. (Um. Lpm. Laxfjellet: Ångstr. Herjed. Ramansberget; Axhögen; Stora Midtåklappen: Hellb. Dal. Osmundsberget. VG. Kinnekulle; Hunneberg. Smål.



Husqvarna enl. Scheutz. *Gottl.* — *N. Dovre*, vid Drivstuen, Vårstien och Kongsvold. Krokkleven nära Christiania.) *Lika fin som de föregående, knappt mer än halftumslång, tätare tufvad och mer upprätt än föreg., med ytterst små blad. Kapsl. på skaft af mindre än  $\frac{1}{2}$  tum höjd, i torrt tillstånd omv. kagellik, med starkt vidgad mynning.* — *Leskea Bruch. L. tenella Sch. mskr. och ed.9. Platydictya Berk.*

## 6. PLAGIOTHECIUM Schimp.

† Bladen, särd. torra, föga glänsande [undant. *P. latum*], af lösare cellväf, långt nedlöpande.

\* Bladen raka [icke ensidigt böjda].

a — Tvåbyggare.

1 *P. undulatum* Br. & Sch. grenarne nedliggande; bladen tegellagda, äggrundt aflånga, hastigt kortspetsiga, helbräddade, endast i spetsen småtandade, på tvären vågiga, med kort dubbel nerv, cellöfven längs kanten tätare än midtuti bladen; kapseln på långt skaft, lutande, aflång, krökt, torr färad, med kort sprötspetsadt lock och bred ring. 2½ 6—8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.385.

Mörka skog., berg, r. (Sk. Hall. Boh. Marstrand; Christinedal nära Gustafsberg. VG. Göteborg; Kinnekulle etc. Dalsl. Verml. Elggatan i Glafva sn. ÖG. Ömberg; samt V. Ny och Motala snr, äfv. m. fr.: Hj. Hgn. Smål. flerst.: Berggr. och Scheutz. Blek. Carlskrona skärg. Öl. Böda park; samt Ottenby lund: Zett. — N. Laurvig—Nordl. Helgeland, Ranen: A. Bl. och Arn.; Sulitälma: Lor.) *Störst i släktet, stund. kvarterslång i stora mattor af en egendomlig blek ell. hvitaktig grönska, med 2 tum långa, n. enkla, 2 lin. breda grenar, plattade af bladen, som skenbart bilda 2 tilltryckta, 2 utstående rader. Frukt sällsynt.*

2 *P. silvaticum* Br. & Sch. grenarne ofast upprätta; bladen mer och mindre glest sittande, vanl. 2sidigt utstående, äggrundt lancettlika, småningom spetsade, helbräddade, släta, med kort och otydl. dubbelnerv, likformig, mycket lös cellväf, bascellerna störst; kapseln lutande ell. horizontal, cylindrisk, n. rak ell. föga krökt, äldre färad, med snedt sprötspetsadt lock, smal ring. 2½ 7, 8. — *β Roesei* Lindb. mindre; grenarne trinda af löst tegellagda, mycket konkava blad. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth. 448; *β* Br.eur.

Skog., berg. (Sk. nor. del. flerst.: Scheutz och Hamnstr. — *Gestr. Ner. och Verml. Ängml. Hernösand: Hgn. Boh. Marstrand. Öl.: Zett. — N. — β Boh.* vid Lysekil: Dr G. Retzius enl. Lindb.) *Ofta lika långsträckt som föreg., men mindre grof; deremot gröfre än följ. art, hvarmed den utan tvifvel är mycket nära besläktad, har dock vanl. mörkare, mera glanslös grön färg, glesare blad af lösare cellväf, och längre spets på locket. — Hypnum L. och ed.9. β H. Roeseanum Hps. Plagiath. Roesean. Br. & Sch., stor som följ. art.*

b — Sambyggare.

3 *P. denticulatum* Br. & Sch. grenarne dels upprätta, dels nedliggande; bladen vanl. 2sidigt, stund. allsidigt utstående, äggrundt lancettlika ell. aflånga, kort uddspetsiga, helbräddade ell. i öfversta spetsen ånsågade, släta, med kort och otydl. dubbelnerv, och något mindre lös cellväf än föreg.; kapseln lutande ell. horizontal, aflång—cylindr., mer och mindre krökt, med koniskt, kort uddspetsigt lock, bred ring; inre perist. med mellanligg. cilier. 2½ 5—8. — *β obtusatum*: bl. konkava, n. ovala, trubbiga ell. med kort udd; locket n. utan udd. Fig. Br.eur. Fl.D.2388, f.1 och 2504. Rab.Bryoth.691.

Skog. klipp. a. (Sk.—Lpl. — N.) *I tätta mattor växande, ljusgrön ell. gulaktig moss, i friskt tillstånd vanl. glänsande, med tumslånga, vanl. platta, i skugga stund. trinda grenar. — Hypnum L. och ed.9. β H. obtusatum Wg. Plag. dentlic. β Donnii Lindb.*

\*4 *P. latum* Br. & Sch. grenarne upprätta, bräckliga; bladen som hos föreg., mer glänsande, med något längre udd, helbräddade; kapseln n. upprätt, aflång och rak, med koniskt, kort och snedt sprötspetsadt lock, smal ring; inre perist. utan cilier. 2½ 8. Fig. Br.eur.

Klipp. r. (N. Gudbrandsdalen, vid Wilk: Berggr.; Laurgård: Hj. Holmgr.) *Markbart*

finare än föreg. och mest lik följ., mjuk och liftigt grön som denna, men mer upprät, med mindre platta stjelkar och gröfre cellväf i bladen, hvilka sakna strimmor och den krökta hårdudden. Anses af Lindb. genom mellanformer öfvergå i föreg. art; både norska och af Schimp. samt Lorenz meddelade sydeurop. ex. synes dock i hög grad afvika från denna. — *Leskea Berggr.*

- 5 *P. piliferum* Br. & Sch. grenarne plattade, uppstig. ell. n. nedligg.; bladen 2sidigt, mer säll. något ensidigt vända, föga utslående, konkava, ovala—aflånga, tvärt sammandragna i en lång, hårlig, krökt udd, helbräddade, oordentligt strimmiga, med mycket kort och otydl. dubbelnerv, teml. tät cellväf, men stora bas- och hörnceller; kapseln n. upprät och rak, aflång, med från konvex bas lågt koniskt, n. trubbadt lock, bred ring; inre perist. utan cilier. 2 6—8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.59. Klipp., träd. (Pil. Lpm. Kaltisbuota; Kåksa. VB. Luleå, vid Råbäcken: Hgn. Ångml. och Jemil. — Smål. Dalsl. och VG. på spridda st. i alla prov. — N. Nordl. Helgeland: A. Bl. och Arn.; Salten: Schl. & Arn. Bergen st. Sogn.: Wulfsb. Vestfjordalen. Græsenås: Scheutz. Laurvig. Egeland.) Bildar vanl. stora, gröna ell. gulaktiga mattor, med halftumslånga,  $\frac{1}{2}$  lin. breda grenar, talrika halftumshöga fr-skaft; yttre peristometsänder n. lika bleka och genomskinliga som det inres. — *Leskea* Sw. och ed.9. *Hypn. orthocarpon* Ångstr.

\*\* Bladen med ensidigt böjd spets; sambyggare.

- 6 *P. Mühlenbeckii* Br. & Sch. stjelen nedligg. ell. uppstigande, med uppräta grenar; bladen från äggrund bas småningom afsmalnande, lancettlika, långspetsiga, fint och glesl småsågade, med kort dubbel nerv och de långt nedlöpnade bashörnens celler mycket stora, starkt uppblåsta; kapseln n. upprät ell. lutande, från en tydlig hals cylindrisk, något krökt, med koniskt, trubbigt lock och bred ring; inre perist. med cilier. 2 6, 7. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.124. R.Hn.Bryac.exs.384. Berg, klippstr. etc. r. (Um. Lpm. Laxfjellet: Ångstr. Herjed. Midtdalen: Oldb. Ångml. Grundsunda sn. Önska gästg.: Hgn. Uppl. Norrbyskogen nära Uppsala. Ner. Garp-hytan, i Rödjslan: C. Hn. Smål. Vexjö; Skurugata: Scheutz. Boh. Skafthö: G. Retz. enl. Lindb. — N. Finnm. Hammerfest; Tromsötrakten, samt Maalsnäs: Hgn. Nordl. Sulltälma: Lor.; Skjærstad: Schleg. & Arn.; Helgeland, t. a. i Ranen: A. Bl. & Arn.; Sundfjord. Trondhj. st., Stenhaubugten: A. Bl. & Arn.; Aalesund: Hj. Hgn. Dovre. Bergen st., fleret. i Sogn: Wulfsb. Næs jernverk. Laurvig.) Grön ell. gulaktig, till habitus något lik följ. art, men mindre, och skiljd med de bredare bladen och deras nedlöpnande, uppblåsta hörnceller; bl. ofta sperradt ensidiga:  $\beta$  chrysophylloides Sch. — *Hypnum* ed.9. *Hypn. striatellum* C. Müll. *Plagioth. striat.* Lindb., begge de sednare namnen grundade derpå, att närv. art skulle vara *Bridels Leskea striatella*.

†† Bladen mycket glänsande, med tät ell. ytterst tät cellväf, af smalt jemnbreda celler, icke nedlöpnande.

\* Bladen med ensidigt böjd spets; sambyggare.

- 7 *P. silesiacum* Br. & Sch. stjelen nedligg., rotslående, med båglik nedböjda grenar, n. uppräta ell. båg böjda smågrenar; bladen från aflång bas lancettlika, långt smal-spetsiga, helbrädd., endast i spetsen glesl småsågade, med kort och otydl. dubbelnerv. af likformig, vid basen något lösare cellväf; kapseln lutande ell. horisontal, n. cylindrisk, något krökt, med koniskt trubbigt lock, smal ring; inre perist. med cilier. 2 6, 7. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.2. R.Hn.Bryac.exs.60. Murkna stubb. etc. (Sk.—Held. Skog. sn. Medelp. Sättna: Ångstr. Vestml. Ner. Verm. Christinehamn; Karlskoga. Öl. fleret.: Lindb. och Zett. — N. till Nordl. Finnm. Kaagöen.) Ljusgrön, 1—2 tum lång, med  $\frac{1}{2}$ —nära 1 tum långa, stund. rotslående grenar. — *Hypnum* PB. och ed.9. *Plagioth. Seligeri* Lindb. *Plagioth. repens* Lindb.
- 8 *P. turfaceum* Lindb. stjelen nedtryckt, med båglik nedböjda grenar; bladen svagt ensidigt böjda, från aflång bas lancettlika, med mycket lång och smal, n. syllik, flerböjd spets, sågade, n. nervlösa, af tät, n. likformig cellväf; kapseln lutande, aflångt cylindrisk, föga krökt, med lågt koniskt, trubbadt lock, bred ring; inre perist. med cilier. 2 7. Fig. Fl.D.suppl.117. Kårr, torfjord, trädrött. r. (Däl. Grycksbo; Norrbärke. Vestml. Ramshyttan i Rams-

berg sn. — *N. Gudbrandsdalen*, nära Ringeboe vid elfstränderna: Berggr.) Något mindre än föreg., ljusgrön, bildande teml. stora mattor, till storlek och färg icke olik *Pl. Mühlenb.*, men lätt skild på de icke nedlöp. ell. uppblåsta bladhorn-cellererna. — *Hypnum Lindb. och ed.9.*

- 9 *P. nitidulum* Br. & Sch. stjelken nedligg., rotsläande, med uppblåsta ell. uppräta grenar; bladen aflångt lancettlika, långt smalspetsiga, helbräddade, nervlösa, af tät och likformig, vid basen något lösare cellväf; kapseln lutande ell. horisontal, stund. n. upprätt aflång ell. oval, vanl. sned, med koniskt, trubbigt lock, smal ring; inre perist. med ell. utan cilier. 2½—8. — *β pulchellum*: bl. små, starkare ensidigt böjda, med kortare spets; kaps. mer upprätt och regelbunden. Fig. Br.eur. Lindgr. M.exs.1. R.Hn.Bryac.exs.383; *β* 382.

Klippspring., murkna stubb. etc., *β* helst. i fjelltr. (*Lpl.—ÖG. Smål. och VG. Boh. Christinedal. — N. — β Lpl.—Helsk. Dal. och Verml. — N. Nordl. Sulitälma: Lor.—Gudbrandsdalen.*) Liten som föreg., glänsande grön ell. gulgrön, mest lik en mycket spåd *Pl. denticul.* Inre perist. låder långa, med korta, mellanligg., ofta försvinnande cilier. — *P. nitidum Lindb. Hypnum Wg. och ed.9. β Leskea pulchella H. Hypn. pulch. Dicks. och ed.9. Plag. nitidum β suberectum Lindb.*

\*\* Bladen raka, 2sidiga; tvåbyggare.

- 10 *P. elegans* Sch. stjelken nedligg., rotträdig, med uppstigande ell. uppräta, vanl. plattade grenar, dessa ofta med talrika, mycket små, knippenvis gylltrade grenbildningar ell. nyskott i bladvecken; bladen äggrundt lancettlika, med lång, n. härfin spets, upptill otydligt sågade, nervlösa ell. med kort och svag, 2delad nerv, och ytterst fin och tät cellväf; kapseln lutande ell. n. hängande(?), äggformig, rak och slät, med koniskt, kort uddspetsigt lock. 2½. Fig. Hook.M.exot.1.9. enl. Lindb. Berk.Handb.12.f.3. R. Hn.Bryac.exs.293.

Klipp., hålor, r. (*Sk. flerst. Blek. Carlshamn. Smål. Ubbemåla i Algutsboda; Lemnhult m. fl. st.: Scheutz. ÖG. V. Ny sn, flerst.; Hj. Hgn. Södm. Nyköping, Årila-bergen m. fl. st.: C. Ind. Stockh. teml. allm. Ångml. Hernösand: Hgn. Ner. flerst.: C. Hn. VG. Kinnekulle; Halle- och Hunneberg; Göteborg: Hgn. Boh. Christinedal. Götll. Thorsborg: Hgn. — N. Egebjerg vid Christiania: Berggr.*) Ljligt och glänsande grön, i ofta stora mattor; dels fin som föreg., dels märkbart gröfre. Fruk. ej funnen i Skand., och så föga säkert känd, att det icke ännu är afgjort, om denna art rättast förenas med *Plagiothec.* eller, såsom Lindb. vill, med följ. slägte, med hvars första art den i öfr. är nära beslägtad, ehuru lätt skild på bladens låda cellväf. — *Hypnum Hook. och ed.9. Rhynchostegium Lindb. Plag. nanum Jur. Hypn. collinum Wils. och Plag. Schimper Jur. & Milde äro säkerligen, såsom Lindb. visat, endast former af denna art.*

## 2 Flocken Eurhynchiesæ.

### 7. RHYNCHOSTEGIUM Schimp.

† Bladen med kort och otydl. dubbel, ell. ingen nerv; tvåbyggare.

- 1 *R. depressum* Br. & Sch. stjelk och grenar mjuka, nedliggande; bladen tätt sittande, något tvåsidiga, smalt äggrunda, kort smalspetsade ell. n. trubbad, öfverallt otydligt sågade, af i spetsen lösare, på midten tätare och vid basen mycket lös cellväf; kapseln aflångt oval, något krökt, med långt och snedt sprötpetsadt lock, bred ring. 2½, 8, 9. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.386.

Skugg. klipp., sten. r. (*VG. Kinnekulle, på sandsten nedanför Råbäck. ÖG. Motala sn, Lemunda: Hgn. Stockh. Ryssviken på Sicklaön. Uppl. Uppsala, Göttsundabergen: Mosén. Öl. Borgholms slottsbranter: Zett. Götll.? — N. Dovre, något söd. om Drivstuen: Berggr.*) Liten, en ell. par tum lång, nedtryckt, glänsande grön ell. gulgrön, med starkt glänsande gula grenspetsar, utmärkt af sin mjukhet. Kapseln, på ½ tum långt skaft, föga längre än lockets spröt. — *Hypnum Bruch. och ed.9. Förenas, jemte alla de följ., af Milde med släktet Eurhynchium.*

†† Bladen med lång och tydlig, enkel nerv; sambyggare.

- 2 *R. rusciforme* Br. & Sch. stjelken vanl. nedtill bladlös, krypande, oordentligt delad i plattade ell. trinda, uppräta ell. båglik böjda grenar och smågrenar; bladen all-

sidigt utstående ell. något tvåsidiga, från smalare nedlöp. bas äggrundt aflånga, kort spetsade, öfverallt småsågade, med nerv till långt ofvan midten, af teml. tät, vid bashörnen något vidgad cellväf; kapseln lutande, snedt oval ell. äggformig, med långt sprötspetsadt lock, bred ring. 24 8, 9. Fig. Br.eur. Fl.D.2389. R.Hn.Bryac.exs.292. Sten. i strömmar och bäck. (Sk.—Gestr. Ner. Skirabäcken i Asker sn: C. Hn. Öl. Köpings branter: Scheutz. Gotll. — N. till Salten.) Fast och styf, mörkgrön, grof, flere tum lång, med vanl. tumhöga smågrenar, ofta utdragen och flytande som en Fontinalis; kapseln icke längre än locket med dess spröt. — *Hypnum ruscifolium* Neck och ed.9. *H. rusciforme* Weis. *H. riparioides* Hedw. — Anm. En, under var. namnet *lacustre*, med tvekan hilsförd form, funnen af Kand. Mosén i en sjö i Södm., beskrifves såsom ovanligt stor, ända till almlång, klynnegrenig med bågbojda blad etc.

3 R. *murale* Br. & Sch. stjelken krypande, oordentligt delad i trinda och trubbiga, upprätta grenar; bladen n. tegellagda, konkava, äggrunda—afånga, hastigt kortspetsade ell. trubblade, n. helbräddade, med nerv till omkr. midten, af teml. tät, vid basen lösare cellväf; kapseln lutande, snedt aflång ell. oval, för öfr. som hos föreg. 24 4, 5. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.384.

Sten. mur. etc. r. (Sk. Lund, Örest.; Bosjöklöster. VG. Hunneberg, vid Bragnum. Öl. Borgholms slottsbranter: Zett. — N. Trondhj. st. Aalesund: Berggr. Nordl. Salt-dalen.) Mörkgrön, med låta, 3—5 lin. höga, något tjocka grenar; bladnerven varierar till längden och är ofta svag, n. omärklig. — *Hypnum H.* och ed.9.

4 R. *tenellum* Br. & Sch. stjelken mycket fin, krypande, med korta och tätsittande, n. upprätta grenar; bladen svagt två- ell. ensidigt utstående, smalt lancellika, småningom afsmalnande till en mycket lång, n. hårfin spets, ell. n. sylfika, gles och svagt landade, med lång, i öfversta spetsen försvinnande nerv; cellväfven som hos föreg.; kapseln lutande—horizontal, snedt äggformig, för öfr. som hos föreg. 24 4, 5. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.323.

Kalkberg, r. (VG. Kinnekulle, ofvanför Hellekis och Råbäck. ÖG. Alvastra. Öl. på landtborgen mell. Resmo och Vickelby, samt i Köpings branter: Zett. Gotll. Thorsborg: Kopparkv.; Galgerbet vid Visby enl. ex. af Stud. A. T. Björkm.; Stora Carlsö.) Mycket fin och inkrasslad, ljus- ell. gulgrön, vanl. glänsande; bladen stundom allsidigt utstående, med något svag nerv. — *Hypnum Dicks* och ed.9. *H. micracanthis* Myr. *H. algerianum* Brid. *Rhynchost. algr.* Lindb.

## 8. EURHYNCHIUM Schimp.

† Fruktskafet stråft.

\* Sambyggare.

1 E. *Teesdalii* Lindb. stjelken mycket fin, krypande, med korta, tät sittande, n. upprätta grenar; bladen all- ell. något 2sidigt utstående, smalt aflånga—n. jemnbreda, trubblade, öfverallt fint sågade, med tjock nerv till nära spetsen; kapseln horizontal, oval, ell. aflång, med långt sprötspetsadt lock, bred ring. 24 10—5. Fig. Wils.Bryl. Brit.L55.

Klipp., hålor, r. (VG. Kinnekulle, på sandsten mell. Trollmen och Råbäcks hamn. ÖG. Omberg, i Borghamns sjöbranter och Rödgalvelsgrotta.) Lik *Rhynchost. tenellum*, men ännu finare och vanl. mörkgrön utan glans, med glesare och dubb. kortare, något styfva blad, hvilkas nerv är grön och märkbart gröfre än hos denna; då frukt finnes lättast skiljd med fruktskafets stråfhet. Har, såsom Lindb. i bref påpekat, varit förvexlad med *Rhynchosteg. curvisetum* (Brid.), till hvilken fig. i Br.eur. hörer, med vid midten upphör., smal nerv etc. — *Hypnum Sm.* och ed.9. *H. Schleicheri* Not.

\*\* Tvåbyggare. Bladen gles sittande, n. 2sidiga, alltid ostrimmade.

2 E. *praelongum* Br. & Sch. stjelken lång och fin, krypande, oordentligt och gles parrenig; stjelkbladen n. utsperrade, bredt hjertlikt äggrunda, grenbl. smalare, alla spetsade, öfverallt hvasst småsågade, med uppemot spetsen försvinn. nerv och något vidgad hörnceller vid basen; kapseln n. horizontal, tjock och snedt äggformig, med långt sprötspetsadt lock och bred ring. 24 10—5. — *β atrovirens*: gröfre och mera

gyttad, mörkgrön, med större, n. trubbad bl. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.262.  
 β Turn.M.Hib.t.24. Br.eur.

Åkr., diken, trädrött. etc. α., β på skugg. st. (Sk.—Gestr. Helsl. Ålsta sn: Oldb. Dal. Norrbärke: Liedstr. Ner. Verml. Boh. Christinedal. Öl.: Lindb. Gottl. — N.) Bildar på jorden bland gräs tunna och lösa, ljusgröna mattor af intrasslade fina och flere tum långa stjelkar. — *Hypnum* L. och ed. 9. β *H. Swartzii* Turn.

+ 3 *E. Schleicheri* Lor. stjelken som hos föreg., med tätare och n. upprätta grenar; bladen åggrundt lancettlika, något smalspetsiga, mer finsågade och af smalare celler än hos föreg., för öfr. lika; kapseln kortare skafstad, för öfr. som hos föreg. 2 5, 6. Fig. Br.eur.

Skogsmark, r. (Sk. Röddinge: Prof. Åkerm.; Ramlösa park: R. Hn. ÖG. Lemunda: Holmgr. Allt enl. Lindb. Stockh. Haga enl. ex. af S. Lindgr. Öl. Borgholm enl. ex. af Scheutz.) Gröfre än föreg. och växer i tät, liftigt ljus- ell. gulgröna, glänsande mattor; bladnerven vanl. kortare, upphörande litet ofvan midten. Mer utmärkt af sin habitus, än karakt. — *Hypnum* Hedw. fl. Eurhynch. Lorentz Verz. der Eur. Laubm. (det första arbete, hvart utg. funnit artnamnet upplaget inom detta släkte). *E. prælong.* δ abbreviat. Br.eur.

< 4 *E. Stokesii* Br. & Sch. stjelken lång, teml. grof och fast, nedliggande, pargrenigt delad i ånå pargreniga grenar, med talrika parafyllier mellan bladen; stj.bladen glest sittande, utsperrade, från nedlöpande bredt hjertlik ell. n. triangelformig bas hastigt lång- och smalspetsiga, öfverallt sågade, med i spetsen försvinn. nerv; cellväfven upptill tät, vid basen och isynn. i de starkt urhållade bashörnen af talrika, mycket stora och genomskinn. celler; smågrens blad lancettlika; kapseln horisontal, aflång, slutt. n. cylindr., med lock och ring som hos *E. prælong.* 2 9, 10. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.263.

Skugg. jord, r. (Sk. Gullarps trädg.; Broby och Emilslöf snr: Hamnstr. Smål. Husqvarna enl. Scheutz. Stockh. Nacka; Skarpneck; Dalarötrakten flerst.: Hj. Hgn. Gestr. Gelle, vid Tolforsbäcken. Verml. Pershöjd i bergsl.: Kindb. VG. Kinnekulle; Halleberg. Boh. Christinedal; Marstrand. Hall. Varberg: Scheutz. Öl. Ottenby lund: Zett. — N. enl. Ångstr.) Erinrar om *Hyloc. umbrat.*, men är spädare, till färgen gul- ell. brunaktigt grön, i tät tufvor, med långa, enkla och styfva sperrbladiga nyskott jemte de egenll. grenarne; de öfre bladcellerna bredare än hos *E. prælongum*. Frukt icke funnen i Scer. — *Hypnum* Turn. och ed.9.

\*\*\* Tvåbyggare. Bladen tät sittande, allsidiga, vanl. strimmiga.

5 *E. piliferum* Br. & Sch. stjelken utdragen, nedligg., oordentligt delad i långa, n. pargreniga hufvudgrenar; bladen långt nedlöpande, bredt åggrunda, trubbad med lång, böjd, hårlik udd, öfverallt småsågade, strimmiga, med nerv till omkr. midten och talrika, stora genomskinn., n. kvadratiske hörnceller vid basen; kapseln lutande, åggformig—n. cylindr., krökt, med långt sprötspetsigt lock, bred ring. 2 4—6. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.32. R.Hn.Bryac.exs.264.

Gräsbevätta st. vid diken etc. (Sk.—Helsl. och Dal. Ångml. Hernön: Arn. VB. Umeå: Hgn. Jemll. Um. Lpm. Laxfjellet; Storavare. Torn. Lpm.: Lest. enl. Ångstr. Öl.: Zett. Gottl. — N.) Vanl. 3—4 tum lång, ljusgrön och glänsande, med tumslånga fruktstaf. Bladens cellväf för öfr. tät, men i de nedlöp. hörnen plötsligt starkt vidgad. — *Hypnum* Schreb. och ed.9.

< + 6 *E. Vaucheri* Br. & Sch. stjelken nedligg., oordentligt delad i upprätta, knippvis gyttade, och på samma sätt ånå förgrenade grenar, med långt afsmalnande smågrenar; bladen åggrunda—åggrundt lancettlika, hastigt afsmaln. i en lång, hårlik spets, småsågade, något strimmiga, med fin nerv till ofvan midten, genomskinn., kvadr. hörnceller vid basen; kapseln liten, lutande, åggf.—aflång, med sprötspetsigt lock, bred ring. 2 6, 7. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.13.

Kalkbergr. r. (VG. Kinnekulle, vid Mörkekief; samt Öl. på stenar i Borgholms slottsbranter. J. E. Zett.) Bildar glänsande, gul- ell. grågröna mattor; mindre än föreg., och i ans. till den nästan trädlika förgreningen mycket olik denna, mer beslägtad med föl. Kaps. mycket längre än locket med dess spröt, på tumslångt, mycket sträft skaf. Frukt icke funnen hos oss. — *Hypnum* Rabenh. och ed.9. *H. tenuinerve* Lindb.

< 7 *E. crassinervium* Sch. stj. och hufvudgren. oordentligt förgrenade i upprätta, trinda,

*trubbade* smågrenar; bladen tätt sitt. ell. n. tegellagda, konkava, *bredt äggunda*, *tvärt sammandragna till en kort och bred spets*, *finsågade*, knappt strimmiga, med särd. nedtill tjock nerv, nående ofvan midten, och hörncell. vid basen som hos föreg.; kapseln som hos föreg. 2 5, 6. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.335, 478.

Sten. r. (Blek. Djupadal: Scheutz. ÖG. Ömberg, flerest.; samt V. Ny sn, Hålberget: Hgn. VG. Göteborg, allm.: Hgn; Kinnekulle; Hunneberg, mot Nygård. Boh. Marstrand. Öl. Borgholms slottsbranter: Zett. — N. Trondhj.: Arn.) *Växer i låga, glänsande gröna, mjuka tusvor; smågren. tumshöga, märkbart gröfre än hos föreg., tätt sittande, n. svällande. Frukt högst sälls. i Skand., endast funnen af Hgn vid Göteborg. — Hypnum Tayl. och ed.9.*

\*8 E. *velutinoides* Br. & Sch. stj. nedligg., oordentligt delad i *tätt gytttrade*, uppstig. grenar och smågrenar; bl. tätt sittande, utstående, *äggurndt lancetlika*, *hastigt kort smalspetsiga*, n. *helbräddade* ell. upptill småtandade, *strimmiga*, med *upp emot spetsen* försvinn. nerv och *små, kvadratiske* hörnceller; kaps. lutande, *snedt oval*, med långt sprötpetsigt lock, *bred ring*. 2 4, 5. Fig. Br.eur. \*

Sten., trädrott. r. (N. Laurvig, på trädrotter bland *Brachyth. rutabulum*: Holmgr.) *Till storlek och utseende lik dels Brachyth. popul., dels Eurhynch. striatul., glänsande gulgrön, med korta, n. knippvis samlade smågrenar, fullkomligt öfverensstämmande med utl., af Sch. meddelade ex., på hvilka samt afbildn. i Br.eur. locket med sitt spröt är af hela kapseln längd. Frukt ej funnen på de Norska ex. — Hypnum Bruch. H. filiforme Lam.*

†† Fruktskäftet slätt. Tvåbyggare.

9 E. *striatum* Sch. stjelken grof och långt utdragen, krypande, oordentligt delad i ofta knippevisa, tvåsidigt utbredda ell. upprätta, vanl. tillspetsade grenar; *stjelkbladen usperrade, från bred, n. triangelformig bas hastigt lancetlika*, spetsiga, öfverallt sågade, *starkt strimmiga*, med nerv till *upp emot spetsen* och vidgade, n. kvadratiske bashörnceller; grenbl. ägg. lancetlika; kapseln aflång—cylindrisk, något krökt, med långt sprötpetsigt lock, mycket bred ring. 2 5, 6; 8, 9. Fig. Br.eur. [*E. longirost.*]. Lindgr. Mex.33. R.Hn.Bryac.exs.261.

Skog. r. (Sk.—Gestr. Helsl. Hemstanäs. Ner. mångenst. Verml. Pershöjd i bergsl. Dalsl. Hesselskog; Hafsås i Fröskog: Kindb. Boh. Christinedal; Carl Bengtsered: Wahlstedt. Öl. flerest.: Zett. Gottl. — N. Græsenås nära Christiania: Scheutz. Langöe vid Holmestrand. Bergen st., Sogn.: Wulfsb.; Svandö. Trondhj. st., Levanger: Schleg. & Arn.) *Stor, ofta quarterslång, mattlikt växande, lifligt grön och glänsande, med 1—1½ tum långa fruktskäft. Blomningen pseudo-monoik. — Hypnum Schreb. och ed.9. H. longirostre Ehrh.*

+ 10 E. *striatulum* Br. & Sch. stjelken krypande, med upprätta, knippevis förgrenade ell. tätt pargeniga grenar; stjelkbladen *utstående, från bredt hjerlik bas småningom afsmalnande* i en lång och smal spets, *finsågade, svagt strimmade*, med stark nerv till *ofvan midten* och *tatrika*, genomskinnl. kvadratiske bashörnceller; grenbl. äggurndt lancetl.; kapseln som hos föreg, med *mycket smälare ring*. 2 4, 5. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.387.

Kalkberg. r. (Öl. Köpings branter: J.E. Zett. Gottl. Thorsborgens väggar; Stora Carlsön: Lindb. och Hj. Hgn.) *Bildar lösa mattor likt föreg., som den afven i habitus något liknar, ehuru dubbelt finare och knappt glänsande, grön ell. brungrön. Huvudstilen lik huvudstilen. — Hypnum Spruce och ed.9.*

11 E. *strigosum* Br. & Sch. stjelken krypande, mycket glesbladig, oordentligt delad i mer och mindre upprätta, pargeniga hufvudgrenar; bladen *från deltoideisk ell. äggurnd bas jemnt afsmalnande till en kort spets ell. trubbade*, öfverallt hvasst sågade, *ostrimmade*, med *upp emot spetsen* försvinn. nerv och *helt så* kvadratiske bashörnceller; kaps. som hos föreg., med bred ring. 2 8, 9. —  $\beta$  *imbricatum* Sch. mycket liten, med korta, trinda och trubbiga smågren., tegellagda, n. triangelformiga, trubbiga, omärkl. naggade blad. Fig. Br.eur. Sill.M.exs.152,  $\beta$  153. R.Hn.Bryac.exs.260.

Skugg. jord,  $\beta$  sandåsar. (Sk.—Lpl. — N.) *Hufvudformen 2—3 tum lång, spädare än föreg., lifligt grön, utmärkt af de starkt sågade, trubbade bladen;  $\beta$  föga mer än halftumslång, med linjelånga smågrenar, är säkerligen en af lokalen beroende förkrumpt form. Blomningen pseudomonoik. — Hypnum Hoffm. och ed.9.  $\beta$  H. præcox: Hedw.*

- 12 *E. diversifolium* Br. & Sch. stielken *fin*, krypande och skottalstrande, med korta enkla ell. knippevis delade *upprätta, trinda och trubbiga* grenar; stielkbladen *glösa*, jemte de tätt tegellagda grenbl. från bred, n. deltoisk bas *smart långspetsiga*, något strimmiga, smågrenarnes tätt tegellagda, *äggrunda trubbiga*, alla *glösa sågade*, med nerv till midten och små kvadrat. hörnceller vid basen; kaps. som hos föreg. 2. 7, 8. Fig. Br.eur.

Jord i fjelltr. r. (*Pil. Lpm. Tjidsjakk. Jemtl. Åreskutan enl. Ångstr. — N. Dovre, flerest. kring Drivstuen.*) Till storlek och utseende icke olik föreg.s β, men något gröfre, mer glänsande, med längre smågrenar och skiljd med de olikformiga bladen; torde väl dock knappt vara annat än en fjellform af föreg. Blomn. enl. Sch. pseudo-monoik. — *Hypnum* ed.9.

### 9. THAMNIUM Schimp.

- 1 *T. alopecurum* Br. & Sch. stielken rotstocklik, underjordisk ell. krypande, med spridda, upprätta ell. uppböjda, nedtill enkla och bara, upptill 2sidigt ell. plattadt trädlikt delade hufvudgrenar; smågren. dels korta trubbiga, dels mycket långa, spetsiga, i spetsen rotsläende; bladen äggrunda, med kort grofsågad spets och i denna försvinn. nerv. mycket tätt cellväf, bascell. n. jemnbreda; kapseln äggform. aflång, sned och lutande, med sylspröadt lock. 2. 4—6; 8, 9. Fig. Br.eur. Lindgr. M.exs.53. R.Hn. Bryac.exs.354.

Skog., klippålor, r. (Sk. Hallandsås; Fruali; Skäråli; Spraglerödsbollar etc. Smål. Ökna, i Djupskuran; samt Adelöfs, Marbäcks m. fl. snr: Scheutz. ÖG. Omberg; Motala sn, Hälberget och Lemunda; samt V. Ny sn, Näs: Hgn. Stockh. flerest. Helsl. Mo sn, Djupdalsgrottan på Kasberget. Ner. Garphyttan; Ullavi- och Skälekint: C. Hn. VG. Kinnekulle; Hunneberg; Göteborg. Dalsl. flerest. Öl. Köpings branter: Zett. Gottl. Thorsborg. — N. Gräfsenäs: Scheutz. Holmestrand. Berg. st. Huglöe och Svanöe; Sogn: Wulfsb. Trondbj. på Monken; Vallsö; samt Nordl. Dönnasö i Helgeland: A. Bl. & Arn.) Mycket mjuk, grön ell. gulgrön. Fr. knappt funnen nordligare än i Danmark. — *Hypnum* L. och ed.9

### 3 Flocken Pylaisiæ.

#### 10. HOMALOTHECIUM Schimp.

- 1 *H. sericeum* Br. & Sch. stielken krypande, med uppböjda grenar och smågrenar; bladen från smalt äggrund bas utdraget lancettlika, smalspetsiga, helbräddade ell. otydl. småsågade, groft strimmiga, med mot spetsen försvinnande nerv; kaps. på stråft skaft, upprätt, n. rak, aflång—cylindrisk, med kägellik lock. 2. 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2386. R.Hn. Bryac.exs.172.

Klipp., mur. etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Flere tum—*quarterslång*, vanl. *gulglänsande*, till bladens form och cellväf förvillande lik *Camptoth. lutea*, från hvilken den i sterill tillstånd ofta är svår att skilja. — *Hypnum* L. Leskea H. och ed.9.

#### 11. ISOTHECIUM Brid.

- 1 *I. myurum* Brid. stielken krypande, med oordenligt delade, båglikt böjda, till en del spetsade grenar; bladen tegellagda, konkava, äggrunda—oval, kortspetsiga, n. helbräddade, i öfversta spetsen tandade, med nerv till ofvan midten, hörncell. vid basen teml. stora, kvadratiska, gulgröna; kapseln aflång, upprätt, med koniskt, sprötspetsigt lock, bred ring. 2. 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.649,f.2. Sill.M.exs.163. R.Hn. Bryac.exs.233.

Skugg. st., berg. a. (Sk.—Helsl. och Herjed. Öl. Gottl. — N.) Löst tufvad, liftigt och glänsande grön, med 3—4 tum lång stielk och föga kortare, vanl. åt båda ändar afsmalnande hufvudgrenar. Varierar dock betyd. i storlek och förgrening. — *Hypn. curvatum* Sw. Leskea curv. Voit. och ed.9. *Hypn. myosuroides* Wg.

- 2 *I. myosuroides* Brid. stielken krypande, med upprätta, trädlikt ell. knippevis delade grenar, spetsiga, till en del långspetsigt utdragna smågrenar; bladen tegellagda, från bredare, hjerlik bas lancettlika, med lång och smal spets, öfverallt *finågade*, med nerv till ofvan midten och små, kvadr. hörnceller vid basen; kapseln aflång, något

*Iutande*, för öfr. som hos föreg. 24 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.649 och 2750. Sill.M. exs.162. R.Hn.Bryac.exs.234.

Skugg. bergvägg. (Sk.—VB. och *Lul. Lpm.* Jokkmokk: Hgn. *Dalsl. Boh. Öl.* Böda park: Zell. — N. vid staden Bergen: Lor.; flerst. i Sogn: Wulfsb. Trondhj. st., Valdarsund: A. Bl. & Arn.) *Märkbart finare och mindre än föreg., af mera mörkgrön ell. brunaktig färg; i följd af den trådlika förgreningen med helt annan habitus; bladen i grenspetsarne stund. ensidiga. Frukt teml. sällsynt. — Hypnum L. Leskea Roth. och ed.9. Hypn. Myosurum Wg. Eurhynchium Sch. Syn.*

## 12. ORTHOTHECIUM Schimp.

† Stjelk och grenar n. utan rottrådar.

1 *O. rufescens* Br. & Sch. stjelken uppstigande, *klynnegrenig*, med uppräta, n. jemnhöga grenar; bladen *något utstående ell. svagt ensidiga, syllikt lancettlika, med lång hårfn spets*, helbräddade, n. *ända upp till spetsen invikna* kanter, strimmiga, nervlösa ell. med kort och otydl. dubbelnerv vid basen, af smalt jemnbreda, raka celler; kapseln aflång, uppräta, med koniskt, kort *sprötpetsigt* lock. 24 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.23.

Våta klipp. i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Ruonas; Unna Toki; Wallespiken; Kaddepakte vid Sagatjaure: Holmgr. *Herjed.* Midtåkläpparne. — N. Finnm. Tromsö och Maalselvdalet: Holmgr. Nordl. Helgeland, i Ranen flerst., samt på Silforsfjeld i Moe, äfven m. fr.: A. Bl. & Arn. Trondhj. st. Gævingåsen: Ångstr.; Fossen. Dovre, särd. vid Kongsvold och Vårstien, äfven med fr.: C. & R. Hn. Bergen st., Voss, Christiania, i Krokkløven.). 3—5 tum hög, *tufvad, glänsande rödbrun, grof, med tållutande blad. Mycket sälls. med fr. — Hypnum Dicks. Leskea Schwagr. och ed.9.*

2 *O. chryseum* Br. & Sch. stjelken uppstigande, *enkel ell. med 2—3, enkla grenar*; bladen *tilltryckta, raka, äggrundi lancettlika, spetsade, med kort udd*, helbräddade *platta* kanter, starkt strimmiga, nervlösa, af smalt jemnbreda, *slingriga* celler; kapseln aflång, något lutande, med konvext, *vårtspetsigt* lock. 24 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.24.

Klipp. i fjelltr. r. (*Torn. Lpm.* Kurrawaara. *Lul. Lpm.* Kerkeware; Kaddepakte: Holmgr. *Pit. Lpm.* Walläwe; Tjidsjakk. *Jemll.* Snasehögen, vid Handölsforsen. *Herjed.* Stora Midtåkläppen; Ramansberget; Skarffjellet: Oldb. — N. Finnm. Tromsö. Nordl. Bejeren, på Meraftenklumpen: Schl. & Arn.; Helgeland, flerst.: A. Bl. & Arn. Dovre, mångenst.; vid Kongsvold m. fr.) 3—4 tum hög, *något finare än föreg., tufvad, ljus brungul, glänsande, med af de tållsiut. bladen trinda grenar; bladen dubb. kortare, men mycket bredare än hos föreg. Sälls. med fr. — Leskea Hornsch. och ed.9.*

3 *O. lapponicum* (Sch.) stjelken oordentligt delad i n. enkla grenar; bladen *aflångt lancettlika, småningom sammandragna till en kort småågdad udd*, för öfr. helbräddade med platta kanter, kort, otydlig dubbel nerv och utdragna, *jemnbredt rhomboidiska* celler. 24 Fig.

Fjelltr. r. (*Pit. Lpm.* Tjidsjakk, i en snöback: Lindb.) *Stor som föreg. ell. något finare, af glänsande gulgrön färg. Frukt obekant. — Brachythecium Sch. Leskea Lindb.* ✓

†† Stj. och grenar högt upp med talrika rottrådar.

4 *O. strictum* Lor. stjelken n. *uppräta*, delad i få, uppräta och n. enkla grenar; bladen *föga utstående, ell. svagt ensidiga, äggrundi lancettlika, med kort, uddlik spets*, helbräddade, *ända upp till spetsen invikna* kanter, ostrimmade, nervlösa, af utdragna, smalt jemnbreda celler. 24. Fig. R.Hn.Bryac.exs.87 [bland *O. intric.*].

Klippspring. i fjelltr. r. (*Herjed.* Ramansberget: Oldb. — N. Finnm. Talvig, vid Stora-vand: Lorentz. Dovre, vid Vårstien och Kongsvold: C. & R. Hn.) *Omkring 1—2 tum hög, mycket finare än de föreg., glänsande brungul, ofta med fina, trådlika skott i bladvecken. Frukt obekant. I Skand. har denna art förväxlat med följ., tills den af Lindb. nyligen urskiljdes. — Leskea Lindb. L. intricata Hn. var. subrecta: C. Hn. mskr.*

5 *O. intricatum* Br. & Sch. stjelken något utdragen, *nedliggande, intrasslad*, oordent-



ligt delad i korta, uppräta ell. längre och nedligg. smågrenar; bladen *något ensidigt böjda, syliskt lancettlika*, med *lång och smal* spets, helbräddade, *platta kanter*, knappt strimmiga, nervlösa ell. med kort och svag, ofta dubb. nerv vid basen; cellerna som hos föreg.; kapseln n. upprät, aflångt äggformig, med lågt koniskt, trubbadt lock. 24 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.87 [blandad med föreg.].

Fukt. klipp., helst i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Kaddepakte vid Saggtjaure: Holmgr. *Jemtl. Åreskutan. Herjed. Ramansberget; Skarffjellet och Midtåkläpparne etc.*: Oldb. *ÖG. Omberg. Gottl. Thorsborg.* — *N. Finnm.* Tromsö och Maalselvdalen: Holmgr. Nordl. Ranen i Helgeland flerst.: A. Bl. & Arn. Trondhj. Mostamarken, m. fr. Dovre, teml. allm.) *Liten och fin som föreg., mjuk och glänsande gulgrön, i några tum vida mattor. Frukt sälls. — Leskea Hn. edd.5—9. L. chrysea Angstr. i Fr.S.V.Sc.*

### 13. PYLAISIA Schimp.

*P. polyantha* Sch. stjelen krypande, delad i n. pargreniga hufvudgrenar, med korta, trinda och uppräta smågrenar; bladen tätt tegellagda, utstående ell. ensidigt böjda, smalt äggrundt lancettlika, långspetsade, helbräddade, nervlösa, af smalt jemnbreda, i bashörnen kvadratiske celler; kapseln aflångt cylindr., rak och upprät, med kägellikt lock, smal ring. 24 9—4. Fig. Br.eur. Fl.D.2387,f.1. Thed.M.exs.109. R.Hn.Bryac.exs.22.

Trädstamm., tak etc. a. (*Sk.—Lpl. — N.*) Växer i låta, gröna och glänsande, knappt tumhöga tufvor, alltid rikligt fruktbärande. — *Hypnum Schreb. Leskea Hedw. och ed.9.*

### 14. THEDENIA Schimp.

+ 1 *T. suecica* Br. & Sch. stjelen krypande, oordentligt pargrenig; bladen glest sittande, utstående, från en bredare ell. smalare äggrund bas hastigt hopdragna till en smal, kortare ell. mycket lång och slerböjd, n. utsperrad spets, helbräddade, nervlösa, af upptill rhombiska, nedtill smalt rhomboidiska, vid bashörnen kvadratiske celler; kapseln något lutande, från en smal hals aflångt cylindr., med snedt sprötspetsadt lock, utan ring. 24 6,7. Fig. Br.eur.

Trädrötter i fjelltr. r. (*Herjed. Funnedsalsberget; Hamraffellet; vid byn Melmagen.* Upptäckt 1836 af Thed., men sedan aldrig återfunnen, ehuru ofta eftersökt.) *Finare än föreg., tumslång, mjuk och grön, bildande intrasslade mattor. — Hypnum C. Hn. ed.6. Pylaisia Lindb.*

### 4 Flocken Cylindrotheciesæ.

### 15. CYLINDROTHECIUM Schimp.

1 *C. concinnum* Sch. tvåbyggare; stjelen upprät, regelbundet och tätt pargrenig; bladen i torrt tillstånd tegellagda, konkava, bredt—aflångt äggrunda, trubbad, med vid basen tillbakavikna kanter, helbräddade, n. nervlösa; cellväfven mycket tät, af smak jemnbreda, i bashörnen stora kvadratiske celler; kapseln upprät och rak, utdraget cylindr., med kägellikt lock, mycket smal ring. 24 8,9. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.173.

Gräsväxta st. r. (*Uppl. Uppsala, i botaniska trädg., och vid Qvarnbo; i Carolina-parken och vid Observatoriet; Mosén. Gottl. Visby och n. om Snäckgårdet: Lindb. enl. Holmgr. — N. Christiania, utanför Akers bro: Berggr. Dovre, kring Kongsvold och Drivstuen. Nordl. Helgeland, Lygö och Tomö i Ranen: A. Bl. & Arn.*) *Habituell något lik Hypn. Schreberi, men bildar mycket låtare och fastare tufvor, af glänsande gulgrön färg och 3—4 tum höjd; bladen hafva vid basen spår till 3 ell. flere nerver. Mest utmärkt af frukten, men denna är icke annu funnen i Skand. — Hypnum Not. och ed.9. H. orthocarp. Pyl. H. Montagnei ed.7. Cylindroth. Montagnei Br.eur.*

### 16. PLATYGYRIUM Br. & Sch.

1 *P. repens* Br. & Sch. tvåbyggare; stjelen krypande, pargrenig, med korta uppräta, uppböjda ell. nedtryckta trinda smågrenar; bladen tätt tegellagda ell. allsidigt utstående, konkava, smalt äggrunda, sammandragna till en föga lång spets, med till-

bakavikna helbräddade kanter, nervlösa; cellväfven i spetsen af något vidare, mot basen jemnbreda, i bashörnen stora, quadratiska celler; kapseln aflång, upprät, med kägellik, n. till spröt afsmaln. lock, mycket bred ring. 2½ 5, 6. Fig. Br.eur. R.Hn. Bryac.exs.207.

Trädstamm., sten., r. (VG. Hunneberg; Kinnekulle. Ner. Skogaholms herrgård m. fr., Brevfvens bruk och Carlslund: C. Hn. ÖG. Omberg. Södm. Svanvik nära Nyköping: C. Ind. Stockh. mångenst. Uppl. Uppsala, vid Qvarnbo; Elfkarleby, vid Dalelven: R. Hn. Helsl. Hemstanäs, m. fr.; Älsta sn, Vikeberget: Oldb. — N. Ringeboe enl. Ångstr.) *Glänsande gul- ell. brungrön, med 2—3 lin. långa, trinda trubbiga smågrenar; till storlek och förgrening mycket lik Pyl. polyantha, men skild med den kortare bladspetsens lösare cellväf och bladkantens beskaffenhet. Frukt sälls. — Leptohymenium Rab. och ed.9. Pterogonium Schwægr. Anomodon Hub.*

### 17. LEUCODON Schwægr.

1 *L. sciuroides* Schwægr. tvåbyggare; stj. krypande, med båglik uppböjda, n. jemnhöga, enkla ell. ånyo delade grenar; bladen tegellagda, all- ell. ensidiga, från nedlöp. äggrund bas lancettlika, spetsiga, helbrädd., strimmiga, nervlösa; cellväfven tät, af små, in på bladet jemnbreda, längs kanterna rundade celler; kaps. oval, med koniskt lock. 2½ 5. — *β morensis* Sch. gröfre, med större, tätt tegellagda blad. Fig. Br.eur. R. Hn. Bryac.exs.322.

Trädstamm., klipp. (Sk.—Helsl. och Herjed. Um. Lpm. Laxfjellet: Ångstr. Lul. Lpm. Nammats vid Qvikkjokk: Holmgr. Ö. Gottl. — N. till Nordl. — Funnen m. fr. i Sk. vid Esperöd; i Blek. och ÖG. Omberg. — N. nerest i Sogn: Wulfsb. — *β* Stockh. Utön enl. Lindb.) *Mörk- ell. brungrön, ofta quarterslång, med tumshöga, n. en lin. tjocka grenar. Frukt sälls. i Skand. — Hypnum L. Dicranum Sw. Pterogon. Wg. β L. morensis Schwægr.*

### 18. CLIMACIUM Web. & Mohr.

1 *C. dendroides* WM. tvåbyggare; stj. rotstocklik, krypande, med uppräta, nedtill bara, upptill trädlikt grenade hufvudgrenar; bladen äggr. — aflångt lancettlika, n. trubbad, upptill starkt sågade, 2strimmiga, med i spetsen försvinn. nerv; cellväfven i bladsp. af bredare, längre ned smala, i bladhörnen rundadt vidgade celler; kaps. upprät, n. cylindrisk, med sprötspetsadt lock. 2½ 8—10. Fig. Br.eur. R.Hn. Bryac.exs.25. Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) *De uppräta hufvudgren. 2—3 tum höga, bära sällan, men då vanl. rikligt, frukt. — Hypnum L. Leskea H.*

### 19. LESCURÆA Schimp.

1 *L. saxicola* Milde: tvåbyggare; stjelen krypande, oregelbundet delad i n. pargreniga grenar; bladen ensidigt böjda, från smalt äggrund bas lancettlika spetsiga, med inrullade helbräddade kanter, i spetsen sågade, strimmiga, med n. utlöpande nerv; cellerna, särd. i bladets öfre del, smala, n. jemnbreda, i bladhörnen quadr.; parafryll. trädlika; kapseln upprät, oval—aflång, med koniskt lock. 2½ 6. Fig. Br.eur. Klipp., sten. i fjelltr. r. (Pit. Lpm. Peljekaisse och Kalisbuota: Lindb. Herjed. Malmagen, vid Andåsjöans fall; samt Vallarne: Oldb. — N. Finn. Lyngen. Dovre, vid Kongsvold och Drivstuen; samt Goustafeld enl. Lindb.) *Intrasslad, mattlik, fin moss af ljusgrön ell. gulgrön färg. Fr. sälls.; i Skand. blott funnen på Dovre af Berggr. Den till storlek, bladform m. m. ganska lika Pseudol. atrovir. skiljes lätt med märkbart bredare blad, dessas korta och vida, papillösa celler, de bredare olikformiga parafryll. etc. — L. striata β saxicola Br.eur. Anomodon striatus β ed.9.*

### 20. ANTITRICHIA Brid.

1 *A. curtispindula* Brid. tvåbyggare; stj. krypande, med långt utdragna, oordentligt pargreniga hufvudgrenar; bladen utstående, ofta något ensidiga, äggrunda, hastigt samman-dragna till en smal, sperrigt tandad spets, med inrullade kanter, strimmiga, med nerv till ofvan midten och tät cellväf af små, n. jemnbreda, i bladhörnen ytterst talrika, mer breda än långa celler; kaps. oval, lutande, med koniskt lock. 2½ 4, 5. Fig. Br. eur. Fl.D.2384. Lindgr.M.exs.9. R.Hn. Bryac.exs.88. Klipp., sten., träd. (Sk.—VB. och Jeml. Ö. Gottl. — N. till Nordl.) *Ofta fotslång,*

med en lin. tjocka grenar, grön ell. brunaktig, i stora lösa mattor, stund. hängande; fr.skaften knappt  $\frac{1}{2}$  tum, stund. blott 2—3 lin. långa, krökta. — *Hypnum* L. *Neckera* Hedw. *Anomod.* Hook. och ed.6.

## B. — NECKERACEÆ.

## 5 Flock. Neckeresæ.

## 21. NECKERA Hedw.

† Bladen [sård. torra] på tvären vågiga.

\* Sambyggare; kapselns skaft icke längre än perichætialbladen.

- 1 *N. pennata* H. bladen *äggrundi lancellika*, småningom ell. hastigt spetsade, *ofrån midten* svagt tandade, nervlösa ell. med kort och otidl. dubbel nerv; cellväfven upp- till af något vidare, nedtill af smalt jemnbreda celler; kapseln *helt och hållet insänkt* mellan perichæt.bladen, aflång, med koniskt, kort sprötspetsigt lock. 24 4, 5. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.36. R.Hn.Bryac.exs.228.

Trädstamm., säll. klipp. r. (*Blek.—Gestr. Helsl.* Hemstanäs. *Ner.* Hamrarne i Göth- lunda; samt Sirsjö i Qvisbro sn: C. Hn. *Hall.* Varbergstrakten: Scheutz. — *N.* Holmestrand; Ourdal; Valders etc.) *Stjelken lång krypande, med 2—3 tum höga, grofva, pargreniga hufsvudgrenar, brungrön; bladen med 2—5 tvärvågor, mer spetsiga än hos följ. — Fontinalis L.*

- 2 *N. oligocarpa* Br. & Sch. bladen *aflånga*, något böjda, *tvärt* kort uddspetsiga, i *spetsen* småsågade, nervlösa ell. med nerv som hos föreg.; *cellerna kortare*, för öfr. som hos föreg.; kaps. insänkt, slutt. med *öfre delen framskjutande öfver perich.bl.*, ägg- formig, med lock som hos föreg. 24 5—8. Fig. Br.eur. Thed.M.exs.110. R.Hn. Bryac.exs.21.

Klipp., helst i fjelltr. r. (*Torn. Lpm.* Mustawaara. *Lul. Lpm.* Qvikkjokk; Jokkmokk m. fl. st. *Pil. Lpm.* Peljekaisse; Käksa. *Um. Lpm.* Gillisnölle; Laxfjellet: Ångstr. *Jemtl.* Frösön: Holmgr. *Herjed.* Funnesdals- och Ulfberget etc.: Oldb. *VB.* kring Luleå: Holmgr., Östberget vid Umeå. *Ångml.* Sollefteå; Hgn; Skuluberget; Vala- berget. *Medelp.* Sättna, Solomsberget. *Helsl.* Bollnäs; Hemstanäs. *Gestr.* Kungs- berget; Mårdång. — *N.* Dovre, vid Kongsvold. Gudbrandsdalen, Stuelsbro. Vest- fjorddalen.) *Spädare än föreg., men vanl. med lika långa ell. längre hufsvud- grenar, rent grön; bladen med många tvärvågor. — N. intermedia Thed.*

\*\* Tvåbyggare; kapselns skaft längre än perich.bladen.

- 3 *N. pumila* H. bladen *aflånga*, mer säll. äggrunda, afsmalnande ell. hastigt samman- dragna till en kortare ell. längre spets, *med ena kanten till midten inviken, den andra lika högt tillbakarullad*, i spetsen finsågade, med mer ell. mindre tydl. tvär- vågor; nerven som hos de föreg.; cellväfven *som hos föreg., ytterst tål*; kaps. med *något* utskjutande skaft, oval, med koniskt, *kortspetsigt* lock. 24 4—6. —  $\beta$  *Phi- lippeana*: bladen äggrunda, hastigt sammandragna till en lång och smal, flerböjd spets, starkt tvärvågiga. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.229.

Trädst., säll. klipp. r. (*Sk.* och *Hall.* allm. på bokstammar. *Smål.* Femsjö; Vexjö. Elmhult, Ljunga och Vilstad enl. Scheutz. *Helsl.* Mo sn, Ranboberget; Segersta sn. Landa, samt Alfta sn, Vikeberget och Arbrå sn, vid Koldemo: Oldb. —  $\beta$  *N.* vid Laurvig.) *Hufsvudformen 2—3 tum hög, mycket späd, med 1—1½ lin. utskjutande fruktskaft; frukt dock icke funnen i Sv. Smågren. ofta udragna i långa, fina flageller. Anmärkningsvärd är artens förekomst på klippor allstades i Helsl. —  $\beta$ , som är gröfre, ljus gulgrön och mycket tåll grenig, synes härigenom sam- bladformen och vågigheten, mycket utmärkt, men anses alltm. allmänt höra hit: N. Philipp. Br. & Sch.*

- 4 *N. crispa* H. bladen *aflånga* ell. tunglika, *trubbade med kort udd*, i spetsen finsågade, *med begge kanterna nedtill svagt invikna, starkt tvärvågiga*, med nerv som de föreg.; *bladspetsens celler vida, rhomboidiska, bascell. vidgade, rektangulära*, de öf- riga n. jemnbreda; kaps. på *långt* utskjutande skaft, äggformig, med *långt* och smalt *sprötspetsigt* lock. 24 5—8. Fig. Br.eur. Sill.M.exs.164. R.Hn.Bryac.exs.230

**Klipp.** (Sk.—Gestr. Ångml. Hernön: Ångstr. Herjed. Ulfberget. Verm. Ner. Dalsl.: Kindb. Boh. Christinedal. Gottl. Thorsborg. — N. Christiania. på Græfsenås: Scheutz. Holmestrand. Bergen st.) Stör, med ofta *quarters-* ell. *fotslänga*, 2 lin. breda *hufvudgrenar*, glänsande gulgrön, i stora mattlika lager; frskaflet nära  $\frac{1}{2}$  tum långt. — *Hypnum* L.

†† Bladen släta; tvåbyggar.

- 5 *N. complanata* Hüb. bladen *afslånga* ell. *tunglika*, trubbad med *vanl. kort udd*, helbräddade kanter, den ena inviken, endast i spetsen småsågade, n. nervlösa; cellväfven tät, af i spetsen korta och något vidgade, i det öfriga bladet längre, smalt jemnbr. celler; kapseln långt skaftad, rak och upprät, oval, med smalt kägellikt, till spröt afsmalnande lock. 24 5. —  $\beta$  *longifolia*: glest förgrenad, med längre, n. tunglika, tillspetsade bl. —  $\gamma$  *tenella*: mycket späd, glest förgrenad, med små, smalt omv. äggr. bl. Fig. Br.eur. Fl.D.2385. Somf.Cr.exs.27. R.Hn.Bryac.exs.231.

**Klipp., trädst.** (Sk.—Lpl. Öl.: Zett. Gottl. Funnen med fr. i Sk. vid Skärals m. fl. st.; VG. Hunneberg; Billingen: Wahlst. Smål. Kronoberg: Scheutz. — N. —  $\beta$  N. söd. del. —  $\gamma$  Helst. Hemstanäs. Lul. Lpm. Niauvi. Öl. Köpings branter: Zett.) Mjuk, *vanl. ljusgrön*, med smågren. ofta förlängda till *uldragna smala flageller*. Frukt sälls., på *halftumslånga* skaft. — *Hypnum* L. *Leskea* H.

- 6 *N. Besseri* Jur. bladen *elliptiska* ell. omv. *äggrunda*—*rundade*, trubbiga, fint småsågade—n. helbräddade, n. nervlösa ell. med kort och svag dubb. nerv; cellväfven mycket lösare än hos föreg. af upptill och i bladets midt elliptiskt rhomboidiska, mot basen rektangulära celler; kapseln långt skaftad, rak och upprät, afslängt äggformig, med sylsprötadt lock. 24. —  $\beta$  *rotundifolia*: spädare, med rundade, n. helbräddade blad. Fig. Br.eur.

Sten., klipp. r. (N. Gudbrandsdalen, vid Wilk: Berggr. —  $\beta$  Vestml. Sala, på en sten i hagen vid Blyhvitfabriken.) Något finare än föreg., rent grön, med en del smågr. uldragna till fina flageller; mest utmärkt af de trubbiga bladens lösa cellväf. Frukt ej funnen i Skand.; har på Wiener-ex. *halftumslångt* skaft. — *Omalia Lobarz.* Neck. *Sendineriana* Br.eur. *Homalia Sendtn.* Sch. Syn.  $\beta$  N. rotundif. Hn edd.5—9.

## 22. HOMALIA Brid.

- 1 *H. trichomanoides* Br. & Sch. sambyggare; bladen *afslånga*—n. elliptiska, något krökta, trubbad, längs kanterna otydligt, i spetsen starkt naggade, med tunn nerv till ell. öfvan midten; cellväfven af upptill rhomboidiska, nedtill smalt jemnbreda, i bashörnen kvadratiske celler; kapseln långt skaftad, n. upprät och rak, afslängt, med sylsprötadt lock. 24 8, 9. Fig. Br.eur. Fl.D.1421. R.Hn.Bryac.exs.232.

Trädst., klipp. (Sk.—Lpl. — N.) Mattlik, glänsande mörkgrön, med uppstig., orangebundel delade *hufvudgrenar*, *halftumslånga* och *liniebreda platta*, *vanl. trubbiga smågrenar*, nära *tumslånga*, fina fruktskaft. — *Hypnum* Schreb. *Leskea* H. *Omalia* Br.eur. Neckera Hn edd.5—9.

## C. — FABRONIACEÆ.

### 6 Flocken Habrodontæ.

#### 23. HABRODON Schimp.

- \*1 *H. Notaristi* Sch. stielken mycket fin, krypande, oordentligt delad i korta, trinda n. upprätta grenar; bladen från äggrund bas hastigt sammandragna till en lång, smal spets, helbräddade, nervlösa, af upptill korta, n. elliptiska, i bladets mellersta del mer långsträckt, längs kanterna nedom midten och i bashörnen n. kvadratiske celler; kapseln upprät och rak, afslängt, med koniskt lock. 24 4, 5. Fig. Schimp.Br.eur. Suppl.III&IV.

Trädstamm. r. (N. i staden Bergen på almar 1868: Dr. Lorentz.) Knappt tumsläng, med 2—3 lin. långa smågrenar, i låla, mörkgröna mallor på trädens bark. Norska, af Lor. meddelade ex., hafva ofta vid bladbasen en mycket kort, men bred antydning till nerv, för öfr. fullkomligt lika italienska och skotska ex. Fr.skaft

$\frac{1}{2}$  tum högt; fr. ej sunnen i N. — *Pterogon. perpusill.* Not. *Habr. perpusill.* Lindb. *Clasmatodon* Lindb. i bref.

7 Flocken **Myrinieæ.**

## 24. MYRINIA Schimp.

- 1 *M. pulvinata* Sch. stj. nedligg. ell. uppstig., oordentligt delad i korta, trinda, uppböjda grenar; bladen konkava, äggrunda—äggrundt lancettlika, trubbiga, helbräddade, nervlösa ell. med kort och otydl. nerv; cellväfven lös, af i spetsen och mellersta delen rhomboidiska, längs kanternas nedre del och i bashörnen quadr. celler; kapseln aflång, n. rak och upprät, med koniskt lock. 24 5, 6. Fig. Br.eur.  
Trädrött. r. (*Verml.* Carlstad, vid Sandbäcken. — N. Christiania. Gudbrandsdalen, vid Elstad i Ringeboe; Berggr. Dovre, vid Kongsvold.) *Föga mer än tumslång, intrasslad, mörkgrön, till alla delar mycket mjuk, erinrande om Leskea polycarpa, men har icke ensidiga blad.* — *Leskea* Wg. och ed.9. *L. subnervis* Schwægr.

## D. — PTEROGONIACEÆ.

8 Flocken **Pterogonieæ.**

## 25. PTEROGONIUM Sw.

- 1 *P. gracile* Sw. tvåbyggare; hufvudgren. uppstig., nedtill bara, upptill trädlikt delade i båglikt krökta smågrenar; bladen bredt äggrunda, spetsade, särd. i spetsen sågade, vid basen otydligt dubbelnerviga, glest papillösa; cellväfv. tät, af i spetsen rhombiska, på midten och längs nerven n. jemnbreda, i bashörnen mycket talrika och små, mer breda än långa celler; kaps. aflång—cylindr., n. rak, med kägellikt lock. 24 4, 5. Fig. Br.eur. Fl.D.2673. R.Hn.Bryac.exs.259.  
Klipp., trädst. r. (*Boh.* Christinedal. — N. Bergen st., Bolstadörren nära Evanger; Sogn, Blåfjaten i Lærdal; Wulfsb. Trondhj. st., vid Sundalsören i Romsdalen; Scheutz.) *Gulgrön; de trädlika hufvudgrenarne 1—2 tum höga; smågren. omkr.  $\frac{1}{2}$  tum långa, spetsade, trinda af de i torrt tillstånd tegellagda bladen. Frukt icke sunnen i Skand.* — *Hypnum* L. *Pterigynandr.* H. *Leptohymenium* Hüb. och ed.9. *Pterogon. ornithopodioides* Lindb.

## 26. PTERIGYNANDRUM Hedw.

- 1 *P. filiforme* H. tvåbyggare; stjelen, jemte de oordentligt delade hufvudgren. och trinda, tagelsmala smågrenarne nedligg. ell. båglikt nedböjda; bladen tätt tegellagda, ofta ensidiga, konkava, aflånga—omv. äggrunda, kort uddspetsiga, i spetsen fintandade, med svag, stund. omärklig, enkel nerv till midten, *tätt* papillösa; cellväfv. mindre tät, af i bladspetsen rhombiska, i midten jemnbreda, vid bashörnen *teml. vidgade, quadr. celler*; kapseln aflång—cylindr., n. rak, med kort sprötspetsadt lock. 24 5, 6. —  $\beta$  *heteropterum*: grenarne gröfre; bladen mer ensidiga och omv. äggrunda. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.10. R.Hn.Bryac.exs.289.  
Sten., skugg. klipp. a. (*Sk.—Lpl.* — N.) *Bildar låta mattor af intrasslade, smala grenar, grön ell. gulaktig. Frukt teml. sälls.* — *Pterogonium* Sw. *Leptohym.* Hüb. och ed.9.  $\beta$  *Pterogon. heteropl.* Brid., *Leptohym. filif.*  $\beta$  *crassius* ed.9.

## E. — LESKEACEÆ.

9 Flocken **Thujidieæ.**

## 27. THUJIDIUM Schimp.

† Stjelen 2—3dubbelt pargrenig; tvåbyggare.

- 1 *T. tamariscinum* Br. & Sch. tredubbelt pargrenig; stjeln- och grenbladen konkava, från bredt hjertlik bas tvärt sammandragna till en lång och smal, krökt spets, svagt tandade, i spetsen ojemnt sågade, med i spetsen försvinn. nerv, på båda sidor starkt papillösa; perich.bladen n. jemnbreda, med långa trädlika cilier i kanten; kapseln

n. cylindr., krökt, med långt sprötpetsigt lock, utan ring. 2 8, 9. Fig. Br.eur. Fl.D.2439. R.Hn.Bryac.exs.89.

Fukt. skogsm., klipp. (Sk.—Helsl. Skog sn. *Jeml.* Frösön, Östberget: Arn. *Ner. alm. Boh. Öl.: Zett. — N.*) Ofta mer än quarterslång, ett par tum bred, med stora triangelformiga, rent gröna nyskott; för öfr. vanl. brun- ell. gulaktig; smågren:s blad n. äggrunda. Kaps. stor, mycket sälls.; utg. har endast funnit fr. i *Ner. vid Skåleklint. — Hypnum H. och ed.9.*

- 2 *T. delicatulum Br. & Sch.* dubbelt pargrenig; stjelk- och grenbl. mer tillslitt., mest papillösa på undre sidan, för öfr. som hos föreg.; perich.bladen n. äggrundt lancellulika, med lång hårlig spets, utan cilier i kanten; kaps. som hos föreg., men med kort sprötpetsadt lock, smal ring. 2 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2439. Lindgr.M.exs.34. R.Hn.Bryac.exs.90.

Sten., trädstamm., etc. a. (Sk.—Ångml. och *Jeml. Öl. Gottl. — N.*) Ofta lika lång som föreg., men smalare, knappt tumsbred, mindre sammansatt till sin förgrening, lifligt grön ell. brun, glanslös. — *Hypnum L. och ed.9. H. recognitum Hedw. H. proliferum Sw.*

†† Stjelken en gång pargrenig.

- 3 *T. abietinum Br. & Sch.* tvåbyggare; stjelken med kort ludd [bildadt af trådlila förgrenade parafyllier]; bladen bredt äggrunda, spetsiga, fåradt strimmiga, med i spetsen försvinn. nerv, på båda sidor till papillösa; kapseln cylindrisk, något krökt, med koniskt lock, bred ring. 2 4, 5. Fig. Br.eur. Fl.D.2442. Lindgr.M.exs.52. R.Hn.Bryac.exs.290.

Sten., trädst., grus. st. a. (Sk.—VB. och *Jeml. Pit. Lpm. Öst. Itstjakk. Lul. Lpm. Jokkmokk: Holmgr. Öl.: Zett. Gottl. — N.* till Finn. Tromsö: Holmgr.) Vanl. 2—3 tum lång, 1 tum bred, styf, med låta spetsade smågrenar, de öfre korta trubbiga; till färgen mörkgrön ell. brungul, glanslös, väx. i låta mattor. Frukt. sälls. — *Hypnum L. och ed.9.*

- 4 *T. Blandowii Br. & Sch.* sambyggare; stj. med ymnigt och långt, slutl. brunt ludd; bladen bredt hjertlika, smalspetsiga, fåradt strimmiga, med nerv till ofvan midten, på öfre sidan n. utan papiller, vid bashörnen kantade af greniga cilier; kapseln aflångt cylindr., något krökt, med koniskt, uddspetsigt lock, bred ring. 2 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.2445. Lindgr.M.exs.7. R.Hn.Bryac.exs.291.

Kärräng. (Lpl.—Verm. *Ner. och ÖG. Smål. Gransbo i Säby sn: Scheutz. Öl. Melboda: Lbg. Gottl. Thorsborg. — N.*) Något gröfre än föreg., vanl. 4—5 t. hög, n. upprätt tuftig, ljus- ell. gulgrön, mjuk; utmärkt af det ymniga, i början ljusare luddet på stjelken. Bladens cellväf lösare än hos föreg. — *Hypnum WM. och ed.9.*

††† Stjelken oordentligt pargrenig; sambyggare.

- 5 *T. gracile Br. & Sch.* krypande, rotsläende, med olikstora, spetsiga smågrenar; stjelk-bladen något utstående, från hjertlik bas tvärt sammandragna till en syllik, småsågad spets, med tillbakavikna kanter, veckiga, med i spetsen försvinn. nerv, starkt papillösa, af små rundade celler; parafyll. talrika; smågren:s bl. äggrunda, spetsade, med platta kanter; kaps. aflång, krökt och lutande, med koniskt, uddspetsigt lock, teml. bred ring. 2 7, 8. Fig. Sull.lc.musc.t.100 enl. Lindb.

Trädrött. r. (Stockh., vid Skarpneck, på en af jord betäckt trädrot, med mogen fr. i Sept. 1864: Lindb.) Svenska ex. 1—2 tum långa, späda, gulaktiga, glanslösa med knappt tumslånga fruktskaft.

## 28. HETEROCLADIUM Br. & Sch.

† Tvåbyggare.

- 1 *H. dimorphum Br. & Sch.* stjelken oordentligt—teml. regelbundet pargrenig, med trinda, n. tagelåna smågrenar; stjelkl. och hufvudgren:s blad allsidigt utstående, med nedböjd spets, från bredt hjertlik bas hastigt smalt långspetsiga, smågren:s löst tilltryckta, äggrunda, kortspetsiga ell. trubbad, alla i kanten fint naggade, n. nervlösa; kapseln aflång, krökt, horisontal, med lågt koniskt, trubbigt lock. 2 4—6. Fig. Br.eur. Sill.M.exs.154. R.Hn.Bryac.exs.144.

Jord, sten. i skog. r. (Lpl. Ångml. och Herjed.—Verm. *Ner. Vestml. och Stockh.*

*Smål.* Ubbemåla i Algutsboda. — *N. Finnm.* kring Tromsø: Holmgr. Nordl. Helgeland, Huglō i Ranen: A. Bl. & Arn. Dovre, vid Drivstuen: Holmgr.; och Fogstuen. Christiania.) *Icke* olik *Thuid. abiet.*, *men* mycket *finare*, bildande *vida*, *vanl. gulgröna* mattor. *Bladens cellväf* har ett *lösare utseende* än hos de *följ. arterna* i *släktet*, emedan de *långa cellerna* i *bladets* *midt* hos *nårv.* *dels sträcka sig* *högre upp* *åt spetsen*, *dels nedtill* *intaga mer än halva*, hos de *följ. blott en tredjedel af hela* *bladets bredd*. — *Hypnum* Brid. och ed.9.

- 2 *H. heteropterum* Br. & Sch. *stjelken* *mycket oordenlligare förgrenad* än hos *föreg.*, med *långa*, *vanl. utdragna* och *smalspetsade smågrenar*; *stj.- och grenbl. ensidigt utstående*, *breddt äggrunda*, *småningom kortspetsade*, smågren:s *äggrundt lancettlika. utstående*, *alla starkt papillösa*, *finsågade*, *n. nervlösa*; *kapseln* *som hos föreg.*, med *sprötspetsadt lock*. 24 10, 11. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.209.

Skugg. klipp., hålor, r. (*Sk. Söderåsen*, på KlöfvaHallar m. fl. st. *Smål. mångenst. enl. Scheutz. Hall. Bårarp. Boh. Christinedal. VG. Halle- och Hunneberg. Ner. Viby sn, Sumpshallen; Gropdalen i Lerbäck, samt Ullavikint m. fl. st.: C. Hn. Herjed. Stora Midtåkläppen enl. Hellb. — N. Christiania, Bogstadås: Scheutz. Bergen st. i Sogn: Wulfsb. Trondhj. st., Aalesund: Berggr. & Holmgr.) *Fin som föreg.*, *men vanl. mörkgrön*, med *styf stjelk* och *mycket mer utdragna smågrenar*, *hvilkas blad ej äro tilltryckta; största delen bladceller rundade. Frukt ej funnen i Skand. — Hypnum Spruce och ed. 9. Leptohym. Ahnfeltii Angstr.**

†† Sambyggare.

- \*3 *H. Kurrii* Br. & Sch. *stj. glest*, *n. regelbundet pargrenig*; *stjelk- och grenbl. n. utsperrade*, *äggrundt lancettlika*, *spetsiga*, smågren:s *utstående*, *alla starkt papillösa*. *hvasst sågade*, *n. nervlösa*; *kapseln* *som hos föreg.*, *locket okändt*. 24 6, 7? Fig. Br.eur.

Jord i fjelltr. (*N. Dovre*, funnen 1828 af Kurr; sedan aldrig återfunnen ell. annorstädes upptäckt.) *Till förgrening och färg mest lik H. dimorph.*, *till bladen och deras cellväf H. heteropt.* Hos alla 3 arterna finnes oftast vid bladbasen en kort och svag antyd. till en dubb. ell. 2klufven nerv. — *Hypnum* ed.9.

## 10 Flocken Pseudoleskeæ.

### 29. PSEUDOLESKEA Br. & Sch.

- 1 *P. tectorum* Sch. *stjelken* *krypande*, *n. pargrenig*, med *korta*, *uppstigande grenar*; *bladen tilltryckta*, *oftast något ensidiga*, *konkava*, från *breddt äggrund* *bas tvärt sammandragna till en lång och smal spets*, med *helbräddade*, *n. alldeles platta kanter* och *mycket kort*, *men tjock, 2klufven nerv. icke papillösa*. 24. Fig. Rab.Bryoth.600.

Fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* vid Qvikkjokk: Stud. Fredriksson enl. Lindb.; Nammats: Holmgr. Herjed. vid Djupdalsbäcken i Midtådalen, på Midtåkläppen samt vid Andåsjöans fall enl. ex. af Oldb. — *N. Dovre mångenst.*, såsom Blåhöe, Nystuehöe, Finnhöe, vid Drivstuen samt nära Goverlivandet: Berggr.) *Liten och fin*, i *teml. stora och låga*, *nedtryckta*, *mörk- ell. brungröna tuftor utan glans. Frukt icke funnen. Träffas i södra Tyskl. oftast på gamla tegeltak långt från fjelltr. och torde dñven hos oss förekomma på dylika. — Pterogon. Al. Br. Leskea Lindb.*

- 2 *P. catenulata* Br. & Sch. *stjelken* *som hos föreg.*; *bladen allsidigt tegellagda*, *konkava*, från *breddt äggrund* *bas hastigt kort lancettlika*, *spetsade*, med *helbräddade*, *n. platta kanter*, och *enkel nerv till midten*, *papillösa*; *kapseln aflång*, *lutande* och *något krökt*, med *kort sprötspetsigt lock*, *bred ring*; *inre perist. med cilier*. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.54. R.Hn.Bryac.exs.208.

Sten, helst kalk, r. (*Blek. Ronneby. ÖG. Omberg; Motala och V. Ny snr, på Vetterns stränder och öar. Ner. Apelvik i Hammar sn: C. Hn. Uppl. Eggebyholm enl. Angstr. VG. Kinnekulle, nedom Österplana. Verm. Limón i sjön Yngae; Persbergs grufvor. Herjed. Ulfberget. Jemtl. Frösön och Viks gästg.: Holmgr. Öt. mångenst.: Zett. — N. Christiania: Scheutz. Bergen st., Sogn: Wulfsb. Dovre. Gudbrandsd. Ringeboe: Holmgr. Nordl. Helgeland, Ranen: A. Bl. & Arn.; Salten. Finnm. Flöjelfeld vid Tromsø: Holmgr.) *Ett par tum lång, tagelsmal, brunaktig, till tuftvad med upprätta smågrenar, mycket små blad. Frukt ej funnen i Skand. — Hypnum Brid. och ed.9.**

- 3 *P. atrovirens* Br. & Sch. stjelen som hos föreg.; bladen tegellagda, vanl. *ensidigt böjda*, konkava, från bredt äggrund bas hastigt kort lancettlika, spetsiga, med tillbakavikna kanter, *finådgad* spets, i *spetsen försvinnande* nerv; kapseln lutande, oval—afång, vanl. krökt, med lågt koniskt lock, *smal* ring; inre perist. utan cilier. 24 5, 6. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.28. Thed.M.exs.108. R.Hn.Bryac.exs.26.
- Step., helst i fjelltr. (Lpl.—Dal. Idre. Verml. nära Konradsfors. VB. Umeå: Holmgr. Ängml. Säbrå, allm.: Arn. *Helsl.* Hudiksvall: Holmgr.; Hanebo och Skog snr. Stockh. Ryssviken. — N. Finnm.—Dovre. Österdalen, på Trysilddfeld. Gudbrandsd., Ringeboe: Berggr. Bergen st., Sogn: Wulfsb. Valdres. Rollaug.) *Stor som föreg., men vanl. gröfre, mörk- ell. brungrön, med låta, oliklånga smågrenar, större blad än föreg.* — *Hypnum* Sm. *Leskea* Hn. edd. 2—9. *L. incurvata* Hedw.

11 Flocken *Leskeæ*.

## 30. ANOMODON Hook. &amp; Tayl.

† Alla grenar och smågrenar likformiga, trubbiga.

- 1 *A. apiculatus* Br. & Sch. bladen *allsidigt* utstående, från bredt hjertlik, *öronflikad* bas tvärt sammandragna till en *small tunglik*, rundadt trubbig spets, med ell. utan en kort udd, helbräddade med platta kanter, vid basen vågiga och n. taggigt papillösa; nerven försvinn. nedom spetsen; kapseln *af långt äggformig*, rak och upprät, med kort sprötpetsigt lock, *smal*, enkel ring. 24 9—4? Fig. R.Hn.Bryac.exs.380.
- Skugg. klipp. r. (VG. Billingen, nära Sköfde, 1865 funnen af Cleve enl. Lindb.) *Stjelen hos denna såväl som alla de följ. arterna utdragen, krypande, med n. upprätta, oordenligt ell. knippsvis delade grenar och smågrenar; dessa hos närv. art svartgröna, på svenska ex. knappt tumshöga, på utländska vanl. dubb. högre. Frukt icke funnen i Sv.; på Tyska ex., funna och meddelade af Geheeb, har den ½ tum långt skaft.* — *Hypnum* Rugelii C. Müll.
- 2 *A. viticulosus* Hook. & T. bladen *ensidigt böjda*, från *smalt* äggrund bas lancettlika, trubbiga, helbräddade, med vågiga, nedtill invikna kanter, och under spetsen försvinn. nerv; kapseln *af långt cylindrisk*, upprät, rak ell. något krökt, med *smalt kågellikt* lock, *smal* ring. 24 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2383. Somf.Cr.exs.121. Sill. M.exs.166. R.Hn.Bryac.exs.206.
- Skugg. klipp. (Sk.—Gestr. Ängml. Skuluberget; Grofellsberget i Säbrå; samt Jemll. Östersund: Arn. Ner. Nerest. Verml. Gäsborn; Persbergs grufvor. Dalsl. Baldersnäs, vid Teåkersjön. Smål. mångentst.: Scheutz. Boh. Christinedal: Henån på Oroust: Ther. Engstr. Öl.: Zeit. Gottl. — N. till Finnm.) *Bildar stora och tjocka mattor af rostgul färg; grenarne 2—3 tum långa, gröfre än hos föreg., i topparne gröna; bladspetsen otydligt naggad; fr.skaft nära tumslånga. Teml. sälls. med fr.* — *Hypnum* L. *Neckera* H.
- †† Gren. olikformiga, en del tjockare och trubbiga, en del utdraget trådlika, spetsiga.
- 3 *A. attenuatus* Hüb. de tjockare grenarne bågkrökta, bladen *ensidigt böjda*, äggrundt lancettlika, *trubbade*, med ell. utan en kort udd, med platta, helbräddade kanter, i *spetsen småtandade*; nerven försvinn. under spetsen; kapseln som hos föreg., med sylsprötdt lock, utan ring. 24 8, 9. Fig. Br.eur. Sill.M.exs.165. R.Hn.Bryac.exs.353.
- Skugg. klipp., trädrött. etc. (Sk.—Helsl. Segersta sn, nära Varpen; samt Alfta sn, Gunbo: Oldb. Vestml. Ner. och Verml. Boh. Christinedal. — N. Christiania. Lillehammer. Gudbrandsdalen: Berggr. Bergen st., Sogn: Wulfsb. Trondhj. st., Levanger: Schleg. & Arn.) *Teml. lik föreg., men till alla delar hälften mindre och mer intrasslad, lättast skiljd med de långa, trådmala skotten, vanl. brunaktig, mer säll. rent grön. Mycket sälls. med fr.; utg. har på skand. ex. frukt endast från Gottsundabergen nära Uppsala, samlade redan af Myrin.* — *Hypnum* Schreb. *Leskea* H. *Neckera* Myr.
- 4 *A. longifolius* Hn. bladen utstående och något ensidiga, från äggrund bas *utdraget och smalt lancettlika, långspetsiga, helbräddade*, med i *yttersta spetsen* försvinnande nerv; kapseln som hos föreg. 24 5, 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.352.



Skugg. klipp., trädrott. (Sk.—Gestr. och Dal. Ångml. Säbrå, Grofellsberget: Arn. Jemll. Frösön: Holmgr. Öl. flerst.: Zett. och Scheutz. Gottl. Thorsborgen: Holmgr. Funnen med frukt i *Vesm.* vid Sala, mell. grufvan och Nyberg. — N. Christiania, i Mærradalen. Bergen st., i Sogn: Wulfsb. Nordl. Moe, Selsoråsfjeld: A. Bl. & Arn.) Till färg och växtsätt ganska lik föreg. art, ehuru ännu finare, men väl skiljda med de långa, smalspetsiga bladen. Fr. sällsynt; skafet omkr. 3 lin. långt, hälften kortare än hos föreg. — *Pterigynandrum* Schleich. *Hypnum* C. Müll. *H. tenellum* Myr. enl. ex. *Leskea incurvata* Myr. Coroll.

## 31. LESKEA Hedw.

- 1 *L. polycarpa* Ehrh. sambyggare; stielken oordentligt delad i n. pargreniga hufvudgrenar, med uppstig. smågrenar; bladen vanl. ensidiga, äggrundt lancettlika, kortspetsiga, helbräddade, med vid basen tillbakavikna kanter, i spetsen försvinn. nerv: kapseln upprät, aflång—cylindr., något krökt, med smalt kägellikt lock, smal ring. 2 6—9. —  $\beta$  *paludosa*: gröfre, med större och glesare blad, längre, n. cylindr. kapsel. Fig. Br.eur. FLD.2563,f.2;  $\beta$  1662. R.Hn.Bryac.exs.350.

Trädst., sten.,  $\beta$  helst vid vatt. (Sk.—Gestr. Dal. och Verm. Öl. vid Thorslunda kyrka: Zett. — N.) Mörkgrön, glanslös, i låta mattor; stj. 2—3 tum lång, jemte grenarne af en gröfre tråds tjocklek ell. hos  $\beta$  tjockare. Fruktar vanl. talrika. — *Hypn. medium* Dicks. *Lesk. paludosa*  $\beta$  *polycarpa* ed.9.  $\beta$  *L. paludosa* H. och ed.9.

- 2 *L. nervosa* Myr. tvåbyggare; stielken och gren. som hos föreg.; bladen tegellagda, mer säll. ensidiga, äggrundt lancettlika, långt smalspetsiga, helbräddade, med tillbakavikna kanter, och n. utlöpande nerv; kapseln upprät, n. cylindr., rak, med smalt kägellikt ell. sprötspetsigt lock, smal ring. 2 5, 6. —  $\beta$  *laxifolia* Lindb. med mindre långspetsiga blad af större, mer genomskin. celler. —  $\gamma$  *rupestris*: med finare smågrenar, i kanten otydl. nagrade blad och vanl. kortare nerv. Fig. Br.eur. FLD. 2680. Somf.Suppl.t.2. Lindgr.M.exs.8. R.Hn.Bryac.exs.351.

Sten., trädst.,  $\beta$  och  $\gamma$  i fjelltr. (Sk. Stenstorp nära Ringsjön: Bergr. Smål.—Ångml. och Jemll. Pit. Lpm. öst. Istjakk. Öl. flerst.: Zett. Gottl. Vibble. — N. Laurvig. Bjerke i Asker. Christiania, i Mærradalen. Bergen st., Sogn: Wulfsb. Dovre. Gravaune gästgg. i Romsdalen: Scheutz. Trondhj. st., vid Stören: Holmgr. Nordl. Ranen: A. Bl. & Arn.; Salten. Finnm. Maalselvdalen: Holmgr.; vid Lyngseidet. —  $\beta$  Pit. Lpm. Adolfsströms bruk, vid ån Laissan: Lindb. —  $\gamma$  N. Dovre, på Knuds- och Finnshöe: Bergr.) Något finare än föreg., låt och intrasslad tuftig, vanl. svartgrön ell. brun. Frukt sälls., utvecklas oflaste, då arten växer på träd;  $\beta$  och  $\gamma$  endast sanna sterila; den sednare, som är *L. rupestris* Bergr., anses af Lindb. vara en smalbladig form af *Pseudolesk. catenulata*. — *Hypnum* C. Müll. *Pterogon. Schwagr.* *Lesk. norvegica* Somf.

## 32. MYURELLA Schimp.

- 1 *M. julacea* Br. & Sch. stj. uppstig. ell. upprät, klynnegrenig ell. med knippevis samlade, uppräta och jemnhöga, trinda grenar; bladen låt tegellagda, konkava, rundadt äggrunda, trubbiga, helbräddade ell. finsågade, n. nervlösa ell. med kort och otydl. dubb. nerv, kapseln något lutande, aflång, med koniskt, värtspetsigt lock. 2 5—7. Fig. Br.eur. FLD.2620,f.2. Wg.FL.L.t.24. R.Hn.Bryac.exs.174.

Klipp., jord, r. (Lpl.—Sk. Öl. flerst.: Lindb. och Zett. Gottl. — N.) Tuftorna vanl. låta, knappt tumshöga, ljus blågröna, nedtill gulaktiga, med n. trådsamma, spröda grenar. Frukt sälls. — *Hypnum* Vill. och ed.9. *H. moniliforme* Wg.

- 2 *M. apiculata* Br. & Sch. stj. och gren. som hos föreg.; bladen löst tegellagda ell. något utstående, djupt konkava, rundadt äggrunda, tvärt sammandragna i en något utdragen, hårläk, krökt udd, n. helbräddade, med nerv som hos föreg.; kapseln n. upprät, aflång, med lock som hos föreg. 2 6, 7. Fig. Br.eur. Thed.M.exs.104. R. Hn.Bryac.exs.175.

Klipp. i fjelltr. r. (Torn. Lpm. Kurawaara. Lul. Lpm. Unna Toki; Nammats och Sjäkrak vid Qvikkjokk, samt Kaddepakte vid Saggetjaure: Hj. Holmgr. Pit. Lpm. Kåksa; Svartberget. Jemll. Snasahögen. Herjed. Hamrafjellet; Ljungdals- och Funesdalsbergen m. fl. st. — N. Finnm. Maalselvdalen: Holmgr. Nordl. Ranen i Helge-

land flerst.: A. Bl. & Arn. Trondhj. Dovre. Finden, vid Dokkeelf.) *Lik föreg., men ännu finare, lifligt ljusgrön; af de smärre, mycket konkava, något glesare bladen peribandslik. — Isohecium Hüb. Hypnum Thed. och ed.9.*

F. — *HOOKERIA* C.12 Flocken *Hookeriæ*.33. *HOOKERIA* Sm.

- 1 *H. lucens* Sm. sambyggare; stjelen föga grenig, jemte grenarne plattad af de på 2 sidor tilltryckta, på 2 sidor utstående bladen; dessa bredt äggrunda, trubbiga, helbräddade, nervlösa, af mycket lös, klorofyllrik cellväf; kapseln oval, lutande ell. horizontal, med sprötspetsigt lock. 2. 9, 10. Fig. Br.eur. Fl.D.Suppl.1, t.49. R.Hn. Bryac.exs.349.

Skugg. klipp. vid källor etc. r. (Sk. Hallandsås, på Trollehallar. Smål. Femsjö, söd. om Yabergs sågvarn. Boh. Skaftö. — N. Stavanger. Bergen st. Nord-Huglöe; Sognefæste; Midtundalen vid Evindvik; Wulfsb.; Svanöe. Trondhj. st. vid Aalesund; Hl. Holmgr. & Berggr.) *Ell par tum lång, med nära tumslånga, 2—3 lin. breda grenar; bladen genomskinliga och oljeglänsande. — Hypnum L. Pterygophyllum Brid., Br. & Sch. och ed.9. Då Smith år 1808, se Engl.Bot.1.1902, grundade släktet Hookeria på just närv. art, bör den framför alla andra, senare dit förda arter, bibehålla detta släktamn. Utg:s åtgärd att i ed.7 utbyta detsamma mot Pterygophyllum var förhastad.*

G. — *FONTINALACEÆ*.13 Flocken *Dichelymæ*.34. *DICHELYMA* Myr.

- 1 *D. falcatum* Myr. bladen tegellagda, 3radiga, skärformigt krökta åt en sida, rännformiga, lancettlikt syllika, n. helbräddade, med ullöpande ell. kort utskjutande nerv; perich.bladen omslutande ungefär halva fr.skaftet; kapseln upprätt, aflång, med kägellikt till långt spröt afsmalnande lock; inre perists tänder fullständigt förenade till en hög, gallerlik, röd kägla. 2. 4—10. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1832, t.6. Lindgr. M.exs.26. R.Hn.Bryac.exs.86.

Sten. i och vid vatt. (Lpl.—Sk. mellan Selarp och Trolleholm. — N. Finnm. Maaseldalen, vid Overgaard; Holmgr. Dovre, vid Volesjöarne. Hedemarken. Gudbrandsdalen, vid Ringebu; Berggr. Filesfeld. Christiania.) *Stjelen krypande, ell par-fere tum lång, med uppböjda ell. uppräta, 2—6 tum höga, teml. grofva, mörkstund. svartgröna grenar, med ½ tum långa fr.skaft; perists tandkägla lätt bortfallande. — Fontinalis Hedw. F. capillacea L.Fl.Su. Neckera C. Müll.*

- 2 *D. capillaceum* Br. & Sch. bladen något åtskillda, 3radiga, ensidigt, men svagare krökta, köladt rännformiga, från bredare, äggrundt lancettlik bas, ytterst smalt syllika, med hårfin, öfverst åtgändad spets, bildad af den långt utskjutande nerven; perich.bl. omslutande hela fr.skaftet; kapseln utviki från perichatiets sida, äggformig, med konvex, sprötspetsigt lock; inre perists tänder n. fria, endast i öfversta spetsen gallerlikt förenade till en gulaktig, mindre hög kägla. 2. 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.205.

Trädrött. vid vatten, r. (Sk. Wisseröd. VG. Hunneberg. vid sjön Långvattnet. Ner. Willingsberg, vid sjön Stora Willingen och ån der nedanför: C. Hn. Vestmt. Odensvi, vid Alstaån; vid Holmsjön nära Högfors bruk i Norbergs bergsl.; Sill. Stockh. vid Orhem med fr. Gestr. nära Storbron.) *Spenstigare och mera glesbladig än föreg., med rakare, hårfinna blad. Mest utmärkt af frukten, som är mycket sälls. — Fontinalis Dicks. Neckera C. Müll. Myrins Dich. capill. är enl. orig.ex. den amerikanska D. pallescens Br. & Sch.*

14 Flocken **Fontinalese.**

## 35. FONTINALIS Lin.

† Bladen skarpt kölade, n. hopvikna.

- 1 *F. antipyrretica* L. stielken och gren. skarpt 3kantiga, ända till basen bladiga, utan bibrötter; bladen nedlöpande, ägggrunda, spetsade, helbräddade, sällan 2klufna, af föröfr. likformiga, i bashörnen stora, rektangulära celler; kapseln innesluten, regelbunden, aflång, med koniskt lock. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8. —  $\beta$  *gigantea* Sull. mycket gröfre och styfvare, men mindre grenig, med gul-ell. brunglänsande, breda blad. Fig. Br.eur. Sv.B.215. FLD.1892. R.Hn.Bryac.exs.83.

Sten. i helst rinnande vatt. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Gotll. Snäckgårdet vid Visby, samt i Väskinde sn enl. Lindb.) Ofta fotslång ell. mera, svartgrön, med gröna grenspetsar. Teml. sälls. med frukt, hvilken mest träffas ned mot stielkens bas. — *Pilotrichum* C. Müll.

- † 2 *F. gracilis* Lindb. stj. och gren. skarpt 3kantiga, nedtill bladlösa, i lederna och vid perichætiets bas med rottrådar; bladen nedlöpande, ägggrundt lancettlika, trubade, helbräddade, långa kölen [med undant. blott af de yngsta] till basen 2delade; cell. invid kölen dubb. längre och smalare än de öfriga, bashörnens teml. fä. rektang. gulbruna; kaps. innesluten, ovak rundad, på en sida bukig och derig. smed, med lågt koniskt lock. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. E.B.t.1861.

Sten. i rinn. vatt. r. (Um. Lpm. Björneback i Stensele: Ångstr. Stockh. vid Gladövarn i Huddinge; samt Verm. i Kroppa sn enl. Lindb. ÖG. Tinnerbäcken vid Linköping: Kindb. och Nordst. Trol. flerst., såsom funnen på många st. i Finn.) Stor som föreg., men spensligare, tätt knippevis förgrenad, brungrön, med dubb. större kapsel. Hos oss icke ännu funnen med frukt. — *F. antipyr.*  $\beta$  minor Wg. enl. Lindb.

†† Bladen rännformiga [med rundad rygg] ell. n. platta.

- 3 *F. dalecarlica* Br. & Sch. stielken och gren. rundadt 3kantiga, nedtill bladlösa; bladen tegellagda, tydligt 3radiga, rännformiga, lancettlika, smalspetsiga, helbräddade; perichæt.bladen n. lancettlika, spetsiga; kaps. regelbunden, aflång, med koniskt lock; det inre gulaktiga peristomets tänder endast upptill fullständigt förenade. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. Br.eur. V.Åk.H.1846,t.16. FLD.2751. R.Hn.Bryac.exs.84.

Sten. i strömm. (Lpl.—Gestr. och Dal. Vestml. Högfors bruk. Ner. flerst.: C. Hn. Verm. VG. Nordinge sn; Kohergsån i Ellsb. län: Wahlst.; Göteborg. Boh. Risån vid Uddevalla. Små. Ekesjö-ån, samt i Algutsboda enl. Scheutz. Blek. — N. Finn.—söd. delen.) Fin som föreg. ell. finare, högt upp genom bladens bortdöende n. tagellik, ofta 2 fot lång och utom de mörkgröna grenspetsarne n. alldeles svart. Frukt sälls. Liknar mest af alla den utländska *F. squamosa* L., hvarmed den fördom förenades; men denna skiljer sig med större och bredare blad af lösare cellväf, trubbiga perich.bl. och inre perist.s till en högröd, gallerlik kägla fullständigt sammanbundna tänder. — *Pilotrich.* C. Müll.

- † 4 *F. hypnoides* Hn. stj. och de korta, utstående gren. i spetsen trinda; stj.bladen glest, grenbl. mera tätt sittande, alla utstående, stielkonfati., ofvan basen n. platta [de öfrista konkava], från bredare bas småningom sylkt lancettlika, spetsiga, helbrädd.; perich.bl. bredt ovala, sargadt trubbiga, af lös cellväf; kapseln halft utskjutande, elliptisk, med koniskt lock; inre perist.s tänder fullständigt förenade till en gallerlik, röd kägla. 2 $\frac{1}{2}$  8. Fig. Br.eur. V.Åk.H.1846,t.15. FLD.2807. R.Hn.Bryac.exs.85.

Sjöar, stillast. vatt. r. (Gestr. Oslättfors bruk, i Flyet. Uppl. Uppsala, vid Sunnersta. Stockh. i Söderbysjö; Nacka dammsjö. ÖG. Åtvid sn, i Bysjön vid Adelsnäs: Kindb. Dal. Thorsång sn, Storsund. Ner. Göthlunda sn, Fröshammarviken: O. G. Blomh. Boh. Marstrand, på Härholmen.) Betydl. spådar äro de föreg. och af helt afvikande utseende, mörkgrön ell. brunaktig, med mycket fä och korta grenar, glea blad, som endast i topparne äro tegellagda och bilda en sylkt spets. Frukt sälls., träffas på de föråldrade stielkarne. — *Pilotr. Strömbäckii* C. Müll. — Anm. Den i Finn. nyupptäckta *F. dichelymoides* Lindb., utmärkt af i grenspetsarne ensidigt böjda, rännformiga ell. plattade, n. sylkt lancettlika, långspetsiga blad m. m., torde afven finnas i Sver., och bör sökas på trädrötl. o. dyl. vid stränder.

†† *Musci acrocarpi.*

Frukten från stjelkens ell. grenarnes spets, ytterst sällan från sidan.

I. *Musci stegocarpi.*

Frukten öppnande sig med tydligt, affallande [undant. *Systegium*] lock.

## H. — BUXBAUMIACEÆ.

15 Flocken *Buxbaumieæ.*

## 36. BUXBAUMIA Hall.

- 1 *B. indusiata* Brid. fruktskaflet rödbrunt; kapseln gröngrul; den sednare plattadt äggformigt aflång, otydligt kantad, med öfverhuden på framsidan vid mognaden lossnande och sönderbristande; ringen smal; yttre perist. af en 3—4dubbel rad tänder.  $\odot$  6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2752,f.2. R.Hn.Bryac.exs.58.

Murkna stubb. r. (*Smål.—Helsl. Vestml. och Ner. VB.* Umeå sn, Klaberget. Öl. mell. Saxnäs och Röhälla: Zett.; Melböda: Lindb.) Växer spridd ell. gruppvis. Stjelken n. omärklig, beklädd af rotludd och bladlemningar; fr.skaftet  $\frac{1}{2}$ —1 tum högt; kaps. 2 lin. lång, nedtill nära 1 lin. bred, mer upprät än hos följ. — *B. aphylla*  $\beta$  *viridis* Moug;  $\beta$  *indusiata* Wg. *B. viridis* Lindb.

- 2 *B. aphylla* L. fr.skaftet och kapselns undre sida glänsande rödbruna; den sednare bredt äggformig, sned, öfre sidan platt, ljus brungrön, genom en mörkbrun glänsande kant skild från den undre, nedåt buktigt vidgade sidan; ringen mycket bred; yttre perist. af en enkel rad, bleka tänder.  $\odot$  5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2752,f.1. Sv. B.521. R.Hn.Bryac.exs.57.

Barrskog. på sandjord, r. (*Lpl.—Sk. Klöfvehallar; Broby sn, flerst.: Hamnstr. — N. Dovre. Bergen st., Ousedalen. Christiania.*) Till växtsätt, storlek och stjelt lik föreg.; kaps. kortare, men bredare och mera tulande, lik en upp och nedvänd hästhof; kaps. affaller hos båda arterna från det tjocka skaftet.

## 37. DIPHYSCIUM Ehrh.

- 1 *D. foliosum* Mohr. stjelkladen [på sterila ex.] jemnbredt tunglika, trubbiga, tjocka och fasta af mycket tät cellväf, papillösa och gröna; perichæt.bl. långa och tunna, lancettlika, borstspetsiga, n. öfverstående den oskaftade, snedt äggformiga kapseln.  $\odot$  7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.249. Sv.B.521,f.2. R.Hn.Bryac.exs.288.

Jord, särd. på berg, r. (*Sk. Skärall; Trollehall; Reften etc. Smål. Elmhult; Berggr.: Fenisjö; Vilstad och Korsberga snr: Scheutz. Hall. Hjulberg. VG. Göteborg. Dalsl. Verm. Dal. Ufberget i Norrbärke; Stållviksberget i Ludvika; samt Vestml. vid Nora sjö: Sill. Ner. Skåleklint och Jetteberget vid sjön Tisaren, äfv. steril: C. Hn. ÖG. Ömberg; Kolmorden, nära Qvillinge kyrka: Mosén. Uppl. Uppsala. — N. Christiania st., Eningsdal; Bogstadås: Scheutz; Slidre. Bergen st., Osmundvang; Sausund; Flöjfeld vid Bergen: Lor.*) Tätt tuffad, 2—3 lin. hög, med fr. lik ett stort *Phascum*; sterila tuffor vida sällsyntare, med blad, som erinra om vissa *Encalypta*-arter. — *Buxbaumia sessilis* Schmid. *Webera Diphyscium* Ehrh. Beitr. *Webera sessilis* Lindb.

## I. — GEORGIACEÆ.

16 Flocken *Tetrarhidaeæ.*

## 38. TETRAPHIS Hedw.

- 1 *T. pellucida* H. stjelken grenig, jemte grenarne bladig och upprät, en del gren. i spetsen bärande en af omv. hjertlika blad bildad skål, hysande talrika groddknoppar;

bladen äggrundt lancettlika, spetsiga, helbräddade, med mot spetsen försvinn. nerv: kapseln cylindrisk, med kägellikt lock, utan ring. 24 4—7. Fig. Br.eur. FLD.306; 1412. Thed.M.exs.129. R.Hn.Bryac.exs.99.

Skog., ruttna stubb. a. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl. tumshög, nedtill n. bladlös, i såta tufvor; de knoppbärande grenarne långst; och med bredare, mer trubbiga blad. — *Mnium* L. *Georgia Mnemosynum* Ehrh. *G. pellucida* Rab.

### 39. TETRODONTIUM Schwægr.

- 1 *T. Brownianum* Schw. stielken enkel, mycket kort, af de tegellagda bladen knopprik, stund. vid basen med långa och fasta, uppåt bredare och 2—3flikiga, n. bruna bladlika utskott; bladen konkava, äggrunda—afånga, trubbad, helbräddade, nervlösa ell. med otyd. nerv vid basen; kapseln äggformig, med konvext, uddspetsigt lock, utan ring. ☉ 7. Fig. Br.eur.

Bergsklyft., grott. r. (VG. Kinnekulle, på sandsten nedanf. Helleks och Råbäck, samt midt för Källby kyrka. ÖG. Motala, vid Lemunda flerst.: Holmgr. Verml. Kroppa sn, på Brattberget. — N. Græsenäs nära Christiania. Krokklefven. Nordl. Helgeland, på Tvårfjeld i Lerskardalen: Ax. Bl. enl. Arn.) Mycket liten, omkr. ½ tum hög, växer vanl. spridd; de öfre bladen spetsigare, stund. något småtandade. — *Tetraphis* Grv. (enl. Lindb.) och ed.9. *T. ovata* Funck. *Tetodont. varium* Lindb. *Georgia Brownii* C. Müll.

## K. — POLYTRICHACEÆ.

### 17 Flocken Polytrichææ.

#### 40. POLYTRICHUM Dill. Lin.

† Kapseln 4kantig, med tydligt skif- ell. ringformigt bihang nedom basen: *Pterygodon* Lindb. (peristis: tänder på insidan med vinglika bihang).

\* Bladens kanter platta, sågade.

- 1 *P. commune* L. bladen vanl. båglik utböjda, jemnbredt syllika, långspetsiga, med platta, skarpt sågade kanter, i spetsen sågtandad rygg; kapseln rhombiskt—quadr. 4kantig, afång—kubisk; locket med trubbadt—spetsigt spröt. 24 4—9. Fig. Br.eur. Sv.B.101. FLD.1418. Lindgr.M.exs.16. R.Hn.Bryac.exs.56.

\* *cubicum* Lindb. bladen kortare, torra n. tilltryckta; kaps. kortare, n. kubisk, föga hvasst, quadr. 4kantig, med kort och tjockt trubbadt spröt på locket. Fig.

\* *Svaritzii* Hn. bl. korta, föga utstående, något krusigt vridna; kaps. kort, n. kubisk, hvasst, rhombiskt 4kantig, med föga fränskiljdt bih., långt och smalt, spetsigt spröt. Fig.

Skog., kärr, a. (Sk.—Lpl. — N. — \* *cub.*: Stockh. flerst.: Lindb. — \* *Svaritzii*: Gestr. Forsbacka bruk, på bolmarne. Uppl. Edbo sn i Rosl.: Mosén. Stockh.) Störst af alla, ofta fotshög, med långt frskäft, bildande låta tufvor; kaps. hos hufvudf. afång, hvasst och rhomb. 4kantig, med trubbadt spröt. — *P. yuccæfolium* Ehrh.

\* *cub.* *P. comm.* γ Br.eur. & Sch. Syn. \* *Sv.* *P. alpestre* Sv.

\*\* Bladens kanter inböjda, helbräddade.

- 2 *P. juniperinum* W. bladen utstående—tilltryckta, blågröna, jemnbredt lancettlika, upptill längs ryggen sågtandade, med kort brun, sågad udd af den utlöp. nerven; kapseln 4kantig, afång—kubisk. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.22. R.Hn.Bryac.exs.55.

\* *strictum* Lindb. bl. tilltryckta, kortare; kaps. kubisk. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.82.

Torfkärr. a. (Sk.—Lpl. — N. — \* *Lpl.*—Sk. nor. delen: Bergr. Öl.: Zeu. Gottl. Fardume. — N.) Omkr. 4—5 tum hög. Hufvudformen har mer utstående blad och längre kapsel; \* fastare tufvad, nedtill hopplådd af hvitt rotludd. — *P. commune* β L. \* *P. strictum* Banks. enl. Lindb. *P. alpestre* Hoppe.

- 3 *P. piliferum* Schreb. bladen nedtill små och glesa, kring stielkens spets hastigt stora, tegellagda, något utstående, från bred bas syllika, med lång, hvit färdad hårud, slät rygg; kapseln 4kantigt äggformig. 24 5—7. Fig. Br.eur. FLD.1362, f.2. R.Hn.Bryac.exs.54.

Tor. hedar, berg, mur. a. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl. blott 1½—2 tum hög, utmärkt af den nedtill smala, upptill genom de derstädes gytttrade bladen plötsligt fördubbel tjockare stjelken. — *P. commune* γ *L. P. pilosum* Neck.

†† Kapseln trubbadt 6—4kantig, med sammanflytande bihang: *Leiodon* Lindb. (perists tänder utan bihang; innef. äfven följ. slägte).

\* Bladkanterna hvasst sågade.

4 *P. formosum* H. bladen utstående—utböjda, platta, jemnbredt lancettlika, långspetsiga, sågade; kapseln aflång, 6—4kantig, gulaktig, med teml. tydligt bihang, kort och tjockt spröt på locket; perists tänder 64. 2½ 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.2611. R.Hn. Bryac.exs.52.

Skogsmark. (Sk.—Hels. Ångml. Framnäs i Säbrå: Arn. Ner. allm.: C. Hn. Verml. Öl.: Zett. — N. till Nordl.) Näst *P. commune* störst af våra arter, 6—8 tum hög, i vidsträckt tuftor; mycket utmärkt af den långa och smala kapseln, som i början är gulgrön, slutt. blekt gulbrun. — *P. attenuatum* Menz.

5 *P. gracile* Menz. bladen som hos föreg., men n. rännformiga; kapseln äggformig, mycket trubbigt och otydligt kantig, gröngul, med mindre tydligt bihang, långt och smalt spröt på locket; perists tänder ofta blott 32. 2½ 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D. 1419. Lindgr.M.exs.84. R.Hn.Bryac.exs.53.

Tufviga kärr. (Lpl.—Sk. Öl.: Zett. — N.) Tätt tufvad, mindre än föreg., men lika som denna med långt fruktstakt; kaps. särd. yngre tydligt äggformig, slutt. brun. — *P. longisetum* Sw.

\*\* Bladkanterna fullkomligt helbräddade.

6 *P. sexangulare* Flörke: bladen föga utstående, från en bredare bas hastigt kort lancettlika, med inböjda kanter, trubbadt; kapseln upprät ell. lutande, kort, äggformig—n. kubisk, med konvext, sprötspetsadt lock; perist. af 64 tänder. 2½ 7, 8. Fig. Br.eur.

Högre fjelltr. r. (Torn. Lpm. Nuljalaki: Björnstr. & Frist. enl. Lindb. Um. Lpm. Stuurware: Ångstr. — N. Finnm. Tromsö: Bl. enl. ex. best. af Sch. Nordl. Salten, på Solvågind: A. Drake enl. Lindb.) Med fruktstaktet 1—2 tum hög, tätt tufvad, med korta och fasta blad; knappt skiljbar på annat än kapselns kanter och bihang, samt enl. Lindb. kapselhudens små, likformigt quadr. celler, från en del ex. med n. helbrädd. blad af Pog. alp. γ septentr., hvarmed den af många förf. och i föreg. edd. förvextals. — *P. septentrionale* Schwegr. *P. septentr.* ed.9, till en del.

#### 41. *POGONATUM* P. Beauv.

+ Stjelken högre, upptill grenig.

1 *P. alpinum* Röhl. bladen utstående—utböjda, ell. något ensidiga, rännformiga, jemnbredt lancettlika—kort syllika, glest, stund. omärkl. sågade; kapseln cylindrisk—rundadt äggformig, mer och mindre lutande, med omärkl. bihang och kapselhuden af stora, mycket olifformiga celler; lockets spröt långt och smedt; perists tänder olifstora. 2½ 6, 7. — β *arcticum*: kaps. utdraget cylindrisk, något krökt. — γ *septentrionale*: bladen vanl. tilltryckta, korta, starkt rännform., föga spetsiga, ofta omärkl. sågade; kapseln rundadt äggformig. Fig. Br.eur. Fl.D.1362,f.1. Somf.Cr.exs.21. R. - Hn.Bryac.exs.80. β Sw.M.Su.1.8,f.17. γ Sw.1.9,f.18. R.Hn.Bryac.exs.81.

Skog., berg., β och γ fjelltr. (Lpl.—Stockh. och Verml. Boh. Skafv. Smål. vest. del. enl. Wg; Skåflesfallshåla och Djupskuran: Scheutz. Sk. Långstorp. — N. — β Lpl.—Dal. Idre. — N. — γ Lpl.—Herjed. — N. Finnm. Hammerfest: C. Hn. — Bergen st. Voss enl. ex. af Bl.) Hufvudformen med fr. skafstet vanl. 2—4 t. hög, med n. utböjda, långa och tydl. sågade blad, aflång kapsel. — *Polytrichum* L. och ed.9. β *Polytr. arcticum* Sw. *P. alp. γ cylindric.* Lindb. γ *Polytr. septentr.* Sw. *P. norvegicum* Hedv.

2 *P. urnigerum* PB. bladen utstående, torra n. tegellagda, blågröna, smalt lancettlika, spetsiga, sågade; kapseln på teml. groft skaft, cylindrisk—n. bägerlik, upprät, utan bihang; kapselhuden af små, likformiga, n. quadratiska, papillösa celler; lockets spröt kort, rakt; perists tänder korta, jemnstora. 2½ 10—4. Fig. Br.eur. Fl.D.296. Lindgr. M.exs.43. R.Hn.Bryac.exs.79.

Grus- och lerjord. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl. 2—3 tum hög, men ofta mycket mindre, i hög grad varierande, till och med enl. Lindb. funnen i Finnl. med 4kantig kapsel. — *Polytrichum* L. och ed.9.

†† Stjelen låg, enkel.

- + 3 *P. capillare* Brid. bladen något glesa och tunna, utstående, torra tilltryckta, rånnformiga, smalt lancettlika, trubbad med kort udd, glest sågade; kapseln på mycket fint skaft, kort, lutande, snedt båglik; kapselhudens celler stora, n. aflånga, papillösa; perist. af långa, jemnstora tänder. 24 6, 7. —  $\beta$  minus (Wg). blad och kaps. kortare; fr.skaft och tänder längre. Fig.

Sand. stränd. r. (VB. vid Torn. elf enl. ex. af Wg. —  $\beta$  Torn. Lpm. Karesuando, vid elfven nedom prestgården: Läst. och C. Hn. VB. Skellefteå, vid elfven: Lindb.) Mer beslagtad med föreg., än med de följ., ehuru lågodat och enkel som dessa. — *Polytrichum* Michx. *P. urnig.*  $\beta$  capill. Wg. Fl. Su.  $\beta$  *P. urnig.*  $\beta$  cap. Hn ed.9. *Pogonot. longidens* Ångstr.

- 4 *P. aloides* PB. bladen tättsittande, tjocka, utstående, torra inböjda, plattade, aflånga lancettlika, föga spetsiga, långt ned hvasst sågade; kapseln upprätt, aflångt cylindrisk, starkt papillös, med perists. tand. teml. korta. 24 5, 6. Fig. Br.eur. FL.D. 2062.f.1. Lindgr. M.exs.86. R.Hn.Bryac.exs.169.

Dikeskant., lerjord. (Sk.—VG. Ner. mångenst.: C. Hn.; och ÖG. Stockh. Orem; Uggelvik: Lindb. Boh. — N. Laurvig. Mellan Houg och Bergen etc.) Hela mossan knappt tumshög, med jemförelsevis korta och breda blad; kapseln blek, på omkr.  $\frac{1}{2}$  tum högt, rakt och teml. tjockt skaft. — *Mnium polytrichoides*  $\beta$  L. *Polytrichum* Hedw. och ed.9. *P. nanum* Weiss.

- 5 *P. nanum* PB. bladen tjocka, utstående, rånnformiga, smalt ell. jemnbredt tunglika, trubbiga, i spetsen svagt sågade; kapseln upprätt ell. lutande, rundadt äggformig, slutt. vidgad i klock- ell. n. trätlik, slät; perists. tand. långa. 24 5, 6. Fig. Br.eur. FL.D.2062.f.2. Lindgr. M.exs.85. R.Hn.Bryac.exs.170.

Lerjord. (Sk.—Uppl. Uppsala. Gestr. Gefle, vid Tolfors: Oldb. Vestml. Grönö: Sill. Ner. Nerest. VG. Dalsl. Fröskog. Hall. Träslöf sn: Scheutz. — N.) Stjelen n. lägre än hos föreg., men det fina, ofta flerböjda fr.skaftet vanl. märkbart längre, ofta tumshögt; kaps. brun, med starkt vidgad mynning, n. utan papiller. — *Mnium polytrichoides* L. *Polytrichum* Neck. och ed.9. *P. pumilum* Sw. *P. subrotundum* Huds. Pog. subrot. Lindb.

#### 42. OLIGOTRICHUM Lam. & DC.

- 1 *O. lævigatum* Br. & Sch. bladen tegellagda, starkt konkava, äggrunda—aflånga, trubbiga, med i öfversta spetsen invikna kanter, svagt naggtandade; kapseln lutande, snedt äggformig, krökt, med smal mynning, långa, olikformiga tänder; locket konvext, med snedt spröt. 24 6, 7. Fig. Br.eur. FL.D.1772. Wg. Fl. L.t.22.

Sandjord. r. (Torn. Lpm. på Muonioelfvens strand i Karesuando, nära Muonio öfre by och Kedkesuando. — N. Finnm. vid Bosekop.) Med fr.skaftet omkring tumshög; mossan glatt. — *Polytrich.* Wg. *P. glabrat.* Wg. mskr. *Oligotr. glabr.* Lindb. *Catharinea lævig.* Brid. och ed.9. *Psilopilum arcticum* Brid. Sch. Syn.

- 2 *O. hercynicum* Lam. & DC. bladen inböjda, de nedre äggrunda, de öfre aflångt lancettlika, spetsiga, med från mitten till spetsen invikna, glest och otyd. sågade kanter; kapseln upprätt, äggf. aflång—n. cylindrisk, rak, med korta, olikstora tänder; locket koniskt, med tjock trubbad spets. 24 6, 7. Fig. Br.eur. FL.D.1417. Somf. Cr.exs.120. R.Hn.Bryac.exs.171.

Sandjord i fjell- och bergstr. r. (Um. Lpm. Stuurware. Jeml. Herjed. ned till Sveg. Dal. Idre; Leksand. Helal. Hemstanäs. — N. Finnm. Kågtind vid Maursund: C. Hn; Tromsö: Hgn. — Christiansand.) Stjelen 2—5 lin. hög; fr.skaftet tumshögt ell. mera. Mossan ung något hårig. — *Polytrichum* H. *Catharinea* Ehrh. och ed.9. *Bryum incurvum* Huds. *Oligotr. incurv.* Lindb.

#### 43. CATHARINEA Ehrh.

- 1 *C. undulata* WM. sambyggare; bladen långa, jemnbredt lancettlika, vågiga, n. ända från basen hvasst sågade, på undre sidan sträffa af i sneda rader från nerven

till kanten] *ordnade småtaggar*, nerven upptill på undre sidan taggig; kapseln lutande cylindrisk, rak ell. något krökt, med långspröadt lock. 24 10—5. Fig. Br.eur. Fl.D.477. Lindgr.M.exs.17. R.Hn.Bryac.exs.34<sup>x</sup>.

Jord, dik., skugg. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Stjelken 1—2 tum hög, enkel ell. klynne-*grenig; *bladen tunna, gröna, tydligt kantade*; kapseln 2 lin. lång, med n. lika långt spröt, rödbrun. — *Bryum L. Polytr. H. Atrichum PB. och Br.eur. Cath. Callibryon Ehrh.*

2 *C. tenella* Röhl. tvåbyggare; *bladen kortare, aflångt lancettlika, knappt vågiga, från omkr. midten sågade, på begge sidorna glatta*, nerven gles taggig; kapseln något lutande, aflång—urnelik, n. rak, med långspröadt lock. 24 9, 10. Fig. Br.eur. Lindgr. Mex.87.

Torffjord. (Sk.—Medelp. Sättne: Ångstr. Lul. Lpm. enl. ex. af Læst. Dal. Verml. — \*) N.) *Omkring hälften mindre än föreg., enkel, med tunna, mörk- ell. smulvgröna, kantade bl.; kaps. blott 1 lin. lång, gulbrun på gulaktigt skaft. — Polytr. undul. β minus Wg. Atrichum Br.eur.*

\*) *Fotbelen närg Dalen. Kty*

# L. — BRYACEÆ.

## 18 Flocken Timmieæ.

### 44. TIMMIA Hedw.

† Bladnervens rygg mot spetsen sågad; tvåbyggare.

1 *T. austriaca* H. *bladen utstående, likformiga, från bredt omslidande bas plöteligt smalt lancettlika, spetsiga, själva spetsen något trubbad*, sågade; kapseln horisontal, från en smalare hals, aflångt oval, strimmig, med konvext, vårtspetsadt lock; inre perists tänder *hvitaktiga, utan sidotaggar*. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.suppl.1.t.48. R.Hn.Bryac.exs.78.

Berg. r. (Lul. Lpm. Qvikkjokk etc.: Holmgr. Pit. Lpm. flerst. VB. vid Krångforsen. Jemtl. Frösön, på Östberget; samt Ångml. Hernön; och Medelp. Sundsvall: Holmgr. Herjed. Funnes- och Ljungdalsbergen. Dal. Osmundsberget; Norrbärke: Liedstr. Hels. flerst. Gestr. Hemlingberget. Verml. Persbergs grufvor. Ner. Ullaviklint: C. Hn. Stockh. Sandsjöberget. Södm. Salem sn, Bockholms-Sätra. ÖG. Marmorbruket: Mosen; Omberg. VG. Kinnekulle. — N. Nordl. Ranen: A. Bl. & Arn. Dovre flerst. Åmodt: Bl. Sogn, i Ardal: Wulfsb. Vid Tindsjön: Holmgr. Egeland enl. Lindb. Bogstadås; Grønsnås: Scheutz.) *Stj. ofta uppböjd, vanl. 2—3 tum hög, med fint, n. lika högt fr.skaft; liknar till stj. och bl. ett Polytrichum.*

†† Bladnervens rygg slät; sambyggare.

2 *T. bavarica* Hessl. *bladen utstående, likformiga, från något omslidande bas småning. jemnbredt lancettlika, hvas-spetsiga*, sågade; kapseln horisontal, med kort hals, oval, slät, med högre konvext, öfverst intryckt och i fördjupn. vårtbärande lock; inre perists tänder *gulaktiga, med hvasa sidotaggar* i de knutigt vidgade lederna. 24 6—8. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.72. R.Hn.Bryac.exs.77 [allt und. n. af *T. megapol.*].

Berg. r. (Torn. Lpm. Enontekis, på Mustawaara: Wg. enl. Lindb. Lul. Lpm. Nam-mats vid Qvikkjokk: Hgn. Herjed. Gröndörren; Hamrafjell. VG. Kinnekulle, vid Hellekis. ÖG. Omberg. — N. Finn. Hvalvik vid Lyngenfjord: Wg. enl. Lindb.; Maals-eivdalen, mell. Sverrevol och Kongslie: Holmgr. Nordl. Salten, på Solvågntind; Hals: Schl. & Arn.: flerst. i Dunderlandsdalen: A. Bl. & Arn. Trondhj. flerst. Dovre, flerst. Bergen st., Sogn, vid Otternæs: Wulfsb.) *Lik föreg., men mindre; bl. vanl. något krusiga, af mycket smärre celler än hos både föreg. och följ. — T. austr. β alpina ed.3. T. megapolit. edd.4—8 och de flesta förf., som ej skilja denna och följ. som arter.*

3 *T. megapolitana* H. β *norvegica* Lindb. *bladen krusiga, olikformiga, de nedre lancettlika, trubgade, af tätare cellväf, de öfre dubb. längre och smalare, spetsiga, af lösare cellväf, alla sågade*; kapseln lutande, omv. äggformig, med lock och inre tänd. som hos föreg. 24. Fig. Hedw.St.crypt.1.t.31.a.



Fjeltr. r. (*Lul. Lpm. Qvikkjokk, Kaddepakte: Hgn. Pit. Lpm. Tjiddjakk. Herjed. Se. Midtåklappen: Oldb. — N. Finnm. Tromsø, flerest.; samt Hvassbrun i Maalselvdaalen: Hgn. Nordl. Ranen i Helgeland teml. allm.: Arn. Dovre, vid Drivstuen, Vårstien och Kongsvold. Gudbrandsdalen, vid Stuelsbro.*) *Bildar tufvor af något styfva, upprätta, 1—3 tum höga stjelkar, med gulgröna toppar; dernedom bruna med bredare blad och sammanväfda af rotludd. Frukt ej funnen på β, som är T. norvegica Zell. Hufvudformen, som är T. cucullata Michx., icke funnen i Skand.*

## 19 Flocken *Bartramieæ.*

### 45. BREUTELIA Schimp.

\* 1 *B. arcuata* Sch. stjelken uppstig. ell. n. upprätt, högt upp beklädd med ymnigt rotludd; bladen från bredt äggrund baslöst. bas utsperrade, syllikt lancetlika, hvasst sågade, djupt strimmiga, med i öfversta spetsen försvinnande nerv; cellväfven i bladspetsen af smalt rektang., mot basen längre och bredare, i bladhörnen vid basen stora, aflångt sexsidiga celler; kapseln hängande, n. klotrund, strimmad, med litet, vårtspetsigt lock. 2, 8, 9. Fig. Br.eur.

Klipp. r. (*N. Romsdalen, bland gräs på klippor vid Veblungsnæs i Aug. 1868: Dr Lorentz.*) Omkr. 4—6 tum hög, löst tufvad, gulgrön, i hög grad utmärkt af de sperriga bladen och rödbruna rotluddet. De af Lor. meddelade norska ex. sakna frukt. — *Bartramia* Brid.

### 46. PHILONOTIS Brid.

1 *P. fontana* Brid. bladen dels tilltryckta, små, äggrunda, trubbiga, dels större, något utstående ell. ensidiga, äggrundt lancetlika, smalspetsiga, vid basen 2strimmiga, alla finsågade, med utlöp. nerv; de inre perigonalbladen bredt äggrunda, trubbiga, nervlösa ell. med otydlig nerv, n. utsperrade; kaps. långt skafat, äggformigt klotrund; inre perist:s tänder knappt längre än cilierna. 2, 5, 6. — β *falcata*: bladen ensidiga böjda. Fig. Br.eur. Fl.D.298; 2305.f.2. Lindgr.M.exs.73. R.Hn.Bryac.exs.201.

Källdrag, fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) Var. i hög grad till storlek och förgrening, från 1—6 tum hög, vanl. upptill knippeliskt delad i långa, enkla smågrenar; bildar stora ljus- ell. gulgröna, nedtill af rotludd hopfullade tufvor. Kaps. stor. — *Mnium* L. *Bartramia* Brid. och ed.9.

2 *P. calcarea* Sch. bladen likformiga, meränd. ensidigt böjda, smalt äggrundt lancetlika, långt smalspetsiga, finsågade, med utlöpande, gröfre nerv och lösare cellväf än hos föreg.; alla perig.bladen äggrunda, spetsiga, med tydlig nerv, n. utsperrade; kaps. som hos föreg., med kortare tänder och inre perist. dubb. längre än cilierna. 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.suppl.1,t.51. R.Hn.Bryac.exs.287.

Kalkkärr. r. (Sk. flerest. ÖG. Vinnersta; V. Stenby etc. Ner. Yxhult i Kumla sn, vid gamla kalkbrott: C. Hn. VG. Billingen: O. G. Blomb.; Kinnekulle, ofvan Trollmen och Rustsäter etc. Dal. Boda kapell. Herjed. Midtåhammar: Oldb. Öl. Gottl. — N. Dovre.) Lik föreg., men vanl. gröfre och renare grön. Blytta ex. från Dovre små och spåda, med knappt ensidiga blad, likna till storlek och habitus *P. marchica* Br. & Sch., men hafva perig.bladen utsperrade, icke upprätta. — *Bartramia* Br. & Sch. och ed.9.

3 *P. capillaris* Lindb. liten och spåd, med n. hårfinna grenar; bladen glesit sittande, svagt utstående, likformiga, från bredare bas n. syllikt lancetlika, finsågade, ostrimmade, med fin spets af den långt utlöpande nerven, teml. tät cellväf; perig.bladen äggrunda, spetsiga, med tydlig nerv, n. utsperrade. 2.

Jord. r. (Stockh. vid Nacka, Petersberg, Drottningholm och Huddinge, vid Jernvägen: Lindb.) 1/2—1 tum hög och ytterst spåd, hos oss endast sunnen steril och med hanbl. Lär i Dann. vara engång sunnen med fr. på mindre än tumshögt skafat enl. Lindb., som synes vara oviss, huruvida den utgör en egen art ell. en fin form af *P. marchica*. Upptages här såsom art, för all uppmärksamheten må riktas på densamma. Den i Hedwigia för 1867 omnämnda *Ph. parvula* Lindb. från Hunneberg (? "Huembug") i VG. är för utg. fullkomligt okänd.

## 47. CONOSTOMUM Sw.

- 1 *C. boreale* Sw. bladen *5radigt tegellagda*, kölade, lancetlika, spetsiga, i spetsen sågade, med utlöpande ell. i spetsen försvinn. nerv; cellväfven lös, af rhomboidiska och rektangulära celler; kapseln med kort hals, rundadt omv. äggformig, med litet, sprött-spetsadt lock. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.1424,f.2. Wg.Fl.L.21. Somf.Cr.exs.108. R.Hn.Bryac.exs.202.

Berg, helst i fjelltr. (Lpl.—Verm. Kroppa etc. Vestml. Skinnskatteberg. Helsl. Mo sn, Kasberget. — N. Finnm.—Christiansand.) *Stjelkarne, kantiga af bladraderna, bilda tumshöga, blågröna, hårdt packade tufvor; fr.skaften öfven omkr. tumshöga.* — *Bryum tetragonum* Dicks. *Conost. tetrag.* Lindb. *Bartramia conostoma* Br. & Sch.

## 48. BARTRAMIA Hedw.

† Peristomet dubbelt, regelbundet.

\* Sambyggare; bladen papillösa.

- 1 *B. Halleriana* H. bladen *hvitatlig, n. omslidande* bas, utstående ell. något ensidiga, torra *flerböjda, hårfin syllika*, hvasst sågade, med utlöpande nerv; kapseln n. klotrund, på skaft *kortare än bladen och skenbart utgående från sidan af stjelen.* 2 $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.538,f.3; 823,f.1 enl. Lindb. Somf.Cr.exs.24. R.Hn. Bryac.exs.198.

Bergvägg., klyft. r. (Lpl.—Verm. Dalsl. VG. Boh. Christinedal. Ångml. Borgen i Ytter-Lännäs. Gestr. Gefle, vid Skogmur. Vestml. Ramshyttan: Sill. Ner. Ullavi- och Skåleklint: C. Hn. ÖG. V. Ny sn; Omberg. Smål. Nerest. enl. Scheutz. — N. Nordl. söd. del.—Holmestrand.) *I svällande, högröna, nedtill af ymnigt, brunt rotludd hopvåda tufvor, af 2—6 tums höjd, oflast med spetsade grenloppar; de knappt mer än linieånga fr.skaften sitta vid årsskottens utgångspunkt och tyckas dräp utgå från stjelkens sida.* — *Bryum laterale* Retz. *Br. norvegicum* Gunn. *Bartr. norv.* Lindb.

- 2 *B. crispa* Sw. bladen *icke omslidande*, utstående, torra *krusigt vridna, lancetlikt syllika*, med vid basen inrullade kanter, hvasst sågade, med utlöpande nerv; kapseln klotrund, *långt skaftad, från stjelkens spets.* 2 $\frac{1}{2}$  6—8. —  $\beta$  *minor*: mer lågväxt, med kortare och mindre krusiga blad. Fig. Br.eur. Fl.D.2305,f.1. Somf.Cr.exs.23. R.Hn.Bryac.exs.20.

Klipp. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Bildar stora, blå-ell. gulaktigt gröna, högt upp af rotludd genomvåda tufvor, 1—3, stund. ända till 6 tum höga, oflast ytterst rikt fruktbarande;  $\beta$ , som är B. pomiformis H., anses af Sch. och många såsom artens hufvudform och är vanl. blott tumshög.*

\*\* Blr tvåkönade.

- \*3 *B. Normanni* (Holmgr.) bladen *icke omslidande, starkt ensidigt skärformigt krökta, papillösa, lancetlikt syllika*, med *lång hårfin flerböjd spets*, från basen till omkr. midten inrullade kanter, *hvasst sågade*, med utlöp. nerv; kapseln teml. långt skaftad, liten, n. klotrund. 2 $\frac{1}{2}$  6, 7? Fig.

Fjelltr. r. (N. Finnm. i Maalselvdalen 1868: HJ. Holmgr.) *Tätt tufvad, 2—3 tum hög, grof, i friskt tillstånd (enl. uppg. af Hgn) "ljus, n. hvitatligt gröngul", torr upptill mörkgrön, med något ljusare gröna grenloppar, nedtill svartbrun och med rotludd; kaps. på de få fr.ex., utg. sett, har omkr. 3 lin. långt skaft och dubbelt peristom.* Blrna, som utg. funnit 2könade, hindra denna högt utmärkta forms förening med föreg. art. — *B. crispa*  $\beta$  *Normanni* Holmgr. i bref.

- 4 *B. Oederi* Sw. bladen *icke omslidande, utstående*, torra något krusiga, utan papiller, *smalt lancetlika*, spetsiga, med *ända upp emot spetsen inrullade kanter*, i *spetsen sågade*, med knappt utlöpande nerv; kapseln som hos föreg. 2 $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.478. Somf.Cr.exs.119. R.Hn.Bryac.exs.199.

Klipp. r. (Lpl.—Sk. Öl. Köpings branter: Zett. Goull. Thorsborg. — N. Finnm.—söd. delen.) *1—3 tum hög, långt upp beklädd af rotludd, tätt tufvad, mörk-ell. brungrön, med spetsiga, spröda stjelkar och grenar, samt kortare och bredare blad än de öfriga skand. arterna; bladen torra föga vridna, utmärkta genom sin glatthet; kaps. i fjelltrakter ofta ytterst liten.* — *B. gracilis* Flörke. *Bryum* Retz.

- 5 *B. ithyphylla* Brid. bladen utstående—tilltryckta, torra n. raka, papillösa, från en hvitglänsande, bred omslidande bas hastigt syliskt hårfina med platta kanter, svagt sågade, med bred, snart hela spetsen uppsyllande nerv; kapseln långt skäftad, klotrund, starkt färad. 24 6, 7. — *β strigosa*: med raka, tilltryckta, spröda blad. Fig. Br.eur. Fl.D.2306, f.1. R.Hn.Bryac.exs.200.

Jordhåll., klipp., *β* i fjelltr. (Sk.—Lpl. — *N.* — *β* Lpl.—Jemtl. — *N.* Finnm. och Dovre.) Vanl. tumshög, styf och glänsande, ljusgrön, i små, tätta tufvor; bladens omslidande bas framlyser hvit långsefter stjelen. — *B. pomiformis* Sw. *β* *B. pomif.* *β* Wg.

†† Peristomet enkelt och oregelbundet, ell. felande; blr 2kånade.

- \*6 *B. breviseta* Lindb. bladen något utstående, torra n. raka, papillösa, från en kort och bred, omslidande, knappt hvitglänsande bas mera småningom syliskt bårfin, med platta finsågade kanter och nerv som hos föreg.; kapseln på mycket kort, mell. bladens inneslutet skäft, stor, n. klotrund, färad, med liten mynning. 24 7. Fig. Klipp. r. (*N.* Finnm. på Maasö nära Magerö, 1863: Th. Fr. & S. Henschen enl. Lindb.) 1—2 tum hög, till habitus ej oläk föreg., men tufvorna glänslösa, öfverst gröna, för öfr. lät hopvåfda af ymnigt, brunt rolludd. Kapseln i stjelkens spets höjer sig knappt öfver bladen på det raka och upprätta, 1—2 lin. långa skäftet.

## 20 Flocken *Aulacomniaceæ*.

### 49. GYMNOCYBE Fries.

- 1 *G. turgida* Lindb. bladen tegellagda, konkava, från n. äggrund bas utdraget aflånga, trubbiga, helbräddade, med tillbakavikna kanter och i spetsen försvinnande nerv; kapseln lutande, sned, aflångt oval, med konvext, vårtspetsadt lock. 24 6—8. Fig. Br.eur. Fl.D.2375. Wg.Fl.Lt.23. R.Hn.Bryac.exs.110.

Fjelltr. (Lpl.—Herjed. — *N.*) Växer i stora, upptill gulgröna, nedtill bruna, svallande tufvor, utan rolludd och därför lätt sönderfallande, med mer och mindre nedliggande, 3—4 tum långa, grofva stjelkar. Frukt sällsynt. — *Mnium* Wg. *Aulacomnium* Schwægr. och ed.9.

- 2 *G. palustris* Fr. bladen mer och mindre utstående, de nedre bredt, de öfre smalt lancettlikt jemnbreda, kortspetsiga, med tillbakavikna kanter, endast i spetsen tandade, med upp emot spetsen försvinn. nerv; kapseln lutande, snedt äggformigt aflång—n. cylindrisk, krökt, med konvext, n. sprötspetsadt lock. 24 6—8. Fig. Br.eur. Fl.D.2376. Thed.M.exs.112. R.Hn.Bryac.exs.109.

Fukt. st. a. (Sk.—Lpl. — *N.*) Tufvad, grön ell. gulaktigt grön, med ofta längre, men vanl. smalare stjelkar än hos föreg., högt upp sammanvåfda af rödbrunt rolludd, icke sällan med trådlika knoppbårande skott (s. k. pseudopodier). — *Mnium* L. *Aulacomnium* Schwægr. och ed.9.

### 50. AULACOMNIUM Schwægr.

- 1 *A. androgynum* Schwægr. bladen utstående, torra något krusiga, kort jemnbredt lancettlika, spetsade, med tillbakavikna, helbrädd. kanter, i spetsen sågade, med deri försvinn. nerv; kaps. n. upprätt, slutl. horizontal, n. rak, aflångt cylindrisk, med från rundadt konvex bas kägellikt afsmaln. lock. 24 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.299. R.Hn.Bryac.exs.204.

Skog. på jord, stubb., klipp. r. (Sk.—Helsl. Ner. och Verml. Boh. Christinedal. Öl.: Zeit. — *N.?*) 1—2 tum hög, lät tufvad, högrön, nedtill rostbrun af ymnigt rolludd, n. alltid med talrika pseudopodier. — *Mnium* L. *Gymnocybe* Fr. *Orthopyxis* PB. *Sphærocephalus* Lindb.

## 21 Flocken *Meesiaceæ*.

### 51. PALUDELLA Ehrh.

- 1 *P. squarrosa* Ehrh. bladen allsidigt utsperrade, med nedböjd spets, nedlöpande, n. triangelformiga—äggrundt lancettlika, spetsiga, ojemnt sågade, kölade, med i spetsen

försvinn. nerv; kaps. långt skaftad, något lutande och krökt, aflång, med konvext, värtspets. lock. 24 7—9. Fig. Br.eur. Fl.D.2377. Sill.M.exs.170. R.Hn.Bryac. exs.168.

**Kärr.** (Lpl.—Smål. och Dalsl. Sk. vid Ringsjön m. fl. st. Öl. Melboda: Lindb. — N.) *Stjelkarne* vanl. 3—4 tum långa, enkla och upprätta, mer säll. nedligg., till bekladda med rolludd och förenade i stora tufvor. — Bryum L. *Meesia* Wg.

52. *MEESIA* Hedw.

- 1 *M. tristicha* Br. & Sch. tvåbyggare; bladen 3radiga, utstående—utsperrade, från nedlöpande, bredare bas lancetlika, spetsade, hvasst sågade, kölade, med n. utlöp. nerv; kaps. mycket långskaftad, utdraget, snedt päronlik, utan ring; locket lågt koniskt. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.1122,f.1. Sill.M.exs.168 [*M. longisetata*]. R.Hn. Bryac.exs.378.

Sanka kärr. r. (Lpl.—Ner. och ÖG. Smål. flerst. enl. Scheutz. Sk. Hasslebro; Broby sn, Fremmenaryd: Hamnstr. — N.) *Grof*, 3—5 tum hög, med n. lika höga fr.skaft, i nedtill svartaktiga, upptill högröna tufvor; strax igenkänlig från följ. på de skif- ell. stjärnlika hanbrna i toppen af egna stånd. — *Mnium triquetrum* L. *Meesia triquetra* Ångstr. och Lindb.

- 2 *M. longisetata* H. blr 2kånade; bladen 6—8radiga, glesa, dels utstående, dels utsperrade, helbräddade, platta, för öfr. som hos föreg.; kapseln som hos föreg., men med ring. 24 6, 7. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.19.

Sanka kärr. r. (Torn. Lpm.—Ner. i Markkärr vid Örebro. ÖG. V. Ny sn, i Åsens kärr [nu utgången enl. Holmgr.] Sunda sn: Stud. K. F. Dusen. — N. Christiania, vid Nöckelvand och Lysagerkjærn.) *Stor och tufvad som föreg., men mindre grof.*

- 3 *M. uliginosa* H. mångbyggare; bladen 8radiga, upprätta ell. föga utstående, de nedre kortare. n. lancetlika, de öfre längre, jemnbredt lancetlika, alla rundtrubbiga, med helbräddade, tillbakavikna kanter och grof, i spetsen försvinn. nerv; kaps. teml. långt skaftad, för öfr. som hos föreg. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.1471,f.2. Sill.M. exs.169. R.Hn.Bryac.exs.377.

**Kärr.** fukt. kilpp. r. (Lpl.—Uppl. och Verml. ÖG. Motala sn, Lemunda: Holmgr. Smål. Femsjö. Gottl. Slite. — N.) *Tufvad; stjelen* vanl. knappt tumshög, fr.skaften inemot 2 tum. *Varierar i fjelltr. med blott ett par lin. hög stjelk och ½ tums fr.skaft: β minor* ed.9, *M. minor* Brid. — Bryum trichodes L. *Meesia trichodes* Spruce.

53. *AMBLYODON* Pal. Beauv.

- 1 *A. dealbatus* P.B. bladen aflånga—lancetlika, kortspetsiga, i spetsen sågade, med nedom spetsen försvinn. nerv; kapseln långt skaftad, snedt och utdraget päronlik, med lågt, koniskt, trubbigt lock, enkel ring. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.1471,f.1. Sw.M. Su.1.5,f.10. R.Hn.Bryac.exs.379.

Våta st., torfmoss. r. (Sk. Lackalänge: Abnf.; Annelöf; Bosarp; Årup etc. VG. Kinnekulle, nära Kesta. ÖG. Ömberg; Vinnerstad. Stockh. Uggelvikén; Solna. Uppl. Uppsala, i Norbykärr: Vahlö sn. Gestr. Gefle, vid Stensborg. Herjed. Jemt. Lpl. Gottl. Snäckgårdet vid Visby; samt St. Carlö: Holmgr. — N. Stabækskjærn nära Christiania. Nordl. Bodö; samt Finn. Tromsö: Hgn; Lyngseidet: C. Hn.) *Stjelen* från ett par linier—halfstumshög, fr.skaftet omkr. 1½ tum; bladen ljusgröna, skul. hvilande, mycket tunna, af lös, genomskinlig cellväf. — Bryum Dicks. *Meesia* H.

54. *CATOSCOPIUM* Brid.

- 1 *C. nigratum* Brid. bladen något utstående, från bredare bas lancetlika, långspetsiga, med helbräddade, tillbakavikna kanter och n. utlöpande nerv; kapseln föga långskaftad, rundad, böjd åt sidan, med konvext, värtspetsadt lock, utan ring. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2686. Somf.Cr.exs.18. R.Hn.Bryac.exs.203.

**Kärr.** r. (Torn. Lpm. Karesuando.—Verml. Helsl. Loos sn. Gestr. nära Grinduga. Uppl. Uppsala, i Norbykärr. ÖG. Hagebyhöga och Vinnerstad sn. Öl. flerst. enl. Zett. Gottl. vid Gothenmsån. — N.) *Fin*, i låta tufvor af ½—flere tums höjd, öfverst gulaktigt gröna, till större delen bruna och sammanväfda med rolludd; kaps. mycket lilén, på 3—4 liniers, mer sällan tumshögt skaft. — *Weisia* H.

Hartman, Skandinaviens Flora II (10:de uppl.).

22 Flocken *Mniaceæ*.

## 55. CINCLIDIUM Sw.

† Blr 2könade.

- 1 *C. stygium* Sw. bladen *rödaktiga*, från smälare bas omvänt äggrunda, med *spetsad* udd af den utlöpande nerven, kantade med en enkel rad triåda celler, helbräddade; kapseln med en tjock och tydlig hals *elliptisk*, hängande intill skaflet, n. blygrå, med *lågt* konvext lock; det yttre perist:s tänder *korta*; det inres hvalf qvarsittande. 24 7. Fig. Br.eur. Fl.D.1422. Sill.M.exs.167. R.Hn.Bryac.exs.107.

Sanka kärr. (Lpl.—Sk. Kongasjö. — N. Finnm. Hammerfest.—söd. delen.) 2—4 tum hög, *tsufvad*, med *ymnigt* rolludd, *stora* genomskintiga blad, af *rundadt sexkantiga*, i *divergerande* rader *ordnade* celler; nerven och kanten *högröda*. — *Mnium* Br.eur.

- 2 *C. subrotundum* Lindb. de *öfversta* bladen *gröna*, de *öfriga* *svartaktiga*, från ytterst smal och kort bas, n. *runda*, *rundtrubbiga*—*intruckta*, med *mycket* kort och *trubbig* udd, n. utlöpande nerv, kantade med en *dubbel* cellrad, helbräddade; kapseln *liten*, *nedböjd*—n. *hängande*, från en kort hals *ovalt* klotrund, brungul, med *högt* konvext lock; det yttre perist:s tänd. *långa*, det inres hvalf *affallande* med *locket*. 24 7, 8. Fig.

Kärr i fjelltr. r. (Torn. Lpm. Karesuando, Kuttainen vid Palajoki; J. P. Norrlin enl. Lindb. Lul. Lpm. Nammats vid Qvikkjokk; samt Kaitumsfallet vid Jokkmokk; Holmgr. Um. Lpm. Tärna sn, vid Högsta by: Ångstr. Herjed. vid Storbäcken öst. om Val-larne: Oldb. — N. Nordl. Saltdalen: A. Drake; Moe, Andsfeld etc. i Helgeland: A. Bl. och Arn. Dovre: Zett.) Till *storlek* och *växtsätt* lik föreg., men bladen *rodna* *icke*, utan *svartna* af *ålder*; endast nerven och kanten *äro röda*; cellerna *stora*, *ordnade* som hos föreg.; kapseln *icke tryckt* intill skaflet, blott hälften så stor som hos föreg., n. lika tjock som lång, med liten mynning.

†† Tvåbyggare.

- 3 *C. arcticum* Br. & Sch. bladen som hos *C. stygium*, men *smärre*, de  *yngsta* *gröna*; kapseln *nedböjd*—n. *hängande*, från en teml. lång och smal hals *af lång*, brun, med *högt* konvext lock; det yttre perist:s tänder *långa*, det inres hvalf *qvarsittande*. 24 7, 8. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1846.t.2. R.Hn.Bryac.exs.108.

Kärr i fjelltr. r. (Um. Lpm. Laxfjellet i Tärna sn: Ångstr. — N. Finnm. Bosekop: G. v. Frauenf. Dovre, vid Drivstuen: Scheutz; Kongsvold, på slutt. af Knudshoe.) Till *stjeln*, *blad*, *färg* och *växtsätt* lik *C. styg.*, men *spensligare*; kapseln *icke tryckt* intill skaflet. Utmärkt från begge de föreg. genom den *smälare* kapseln och *de* *talrika* *hanblirna* på *upptill* n. *bladlösa* *grenar*.

## 56. MNIMUM Lin.

† Bladen kantade, helbräddade [hos *M. Blytii* till en del otydl. tandade]; nyskotten uppräta, liknande sterila stjekar; bladnervens rygg glatt.

\* Blr 2könade.

- 1 *M. subglobosum* Br. & Sch. bladen glest sittande, bredt omv. äggrunda, rundadt trubbiga—n. intruckta, med *nedom spetsen* försvinn. nerv; kapseln *liten*, nedböjd, n. klotrund, med tunn *gråhvit* hud; locket med kort och *tjockt* spröt. 24 6, 7. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1846.t.3. R.Hn.Bryac.exs.49.

Fukt. st. (Torn. Lpm. Karesuando m. fl. st. Lul. Lpm. teml. allm. Um. Lpm. Tannbäcken: Ångstr. VB. Krångforsen. Ångml. Tåsjö flerst. Herjed. Malmagen; Funnedsalberget. Dal. Grycksbo. Helsl. Fårla, Arbrå, Alfta och Bollnäs snr: Oldb.; Hemstanäs. Gestr. Gefle flerst. Stockh. Sandsjön. Ner. Örebro; samt i Edsberg. Viby, Halsberg m. fl. snr: C. Hn. ÖG. Vinnerstad: Holmgr. — N. Finnm. flerst. Dovre. Gudbrandsd. Laugård: Holmgr. Hedemarken. Sogn, i Utedalen: Wulfb. Christiania, Græfsenäs: Scheutz.) Något lik följ. art, men *späddare*, med *kortare* *bladnerv*, utmärkt af den *lilla*, *myk-* och *blekhinniga*, *oftast* *till skaflet* *nedböjda* kapseln, med dubb. större sporer. — *M. pseudopunctatum* Lindb.

\*\* Tvåbyggare.

- 2 *M. punctatum* L. bladen som hos föreg., stora, vanl. med kort udd, n. *utlöpande*

nerv, och af något mindre lös cellväf; kapseln horizontal ell. något nedböjd, aflångt oval, med *fastare* hud; locket med kort, men *smält* spröt. 24. 10—5. Fig. Br.eur. Fl.D.2378. Thed.M.exs.111. R.Hn.Bryac.exs.48.

Skugg. st. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Löst tufvad; stjelen 1—2 tum hög, med ymnigt rofudd, stora, rödkantade blad; kapseln vanl. mycket längre än hos föreg., någon gång ganska liten.* — *Bryum Schreb. Mn. serpyllifolium Neck.*

3 *M. hymenophylloides* Hüb. stjelen uppstigande, grenig, äldre svart; bladen *små, gles* sittande, utstående, på grenarne vertikala och 2sidiga, från smal, *knappt* nedlöpande bas rundadt äggrunda, trubbad med udd; nerven n. utlöpande. 24. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.50.

Klipp., klippspring., helst i fjelltr. (Lpl.—Herjed. Medelp. Borgsjö sn, Randklöfven. — N. Finnm. Maalselvdalen flerst.: Holmgr. Nordl. Sulitälma: Lor.; Salten: Schl. & Arn.; Helgeland, flerst. i Ranen: A. Bl. & Arn. Trondhj. Dovre. Gudbrandsdalen.) *Löst tufvad, 1—2 tum hög, mer och mindre upprätt, med något styfva, lifligt gröna glänsande blad, de äldre med svartbrun nerv. Endast sunnen med honbl. Hanbl. och fr. obekanta.* — *Bryum Hn. ed.3.*

4 *M. hymenophyllum* Br. & Sch. stjelen upprätt, grenig, äldre svartbrun; bladen *små, idt* sittande, upprätta ell. föga utstående, från smal, *långt* nedlöpande bas bredt ovala—äggrunda, trubbad utan udd, med under spetsen försvinn. nerv. 24. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1846.t.4. R.Hn.Bryac.exs.51.

Vid foten af fukt. klipp. i fjelltr. r. (Torn. Lpm. Kurawaara. Lul. Lpm. Kaddepakke vid Saggetjaure: Holmgr. Pil. Lpm. Kåksa: Wallåve. Herjed. Stora Midtåkläppen; Ramans- och Funnedalsberget: Hellb. — N. Finnm. Tromsø och Maalselvdalen: Holmgr. Nordl. Ranen: A. Bl. & Arn. Dovre, kring Drivstuen och Kongsvold.) 2—6 tum hög, stund. högre, blågrön, genom rofudd fast hoptufvad, ofta med talrika, stjernlika hanbl. Honbl. och fr. obekanta. — *Cinclidium Lindb.*

5 *M. Blytii* Br. & Sch. stj. som hos föreg.; bladen *små, långt* nedlöpande, de nedre något gles sittande, bredt äggrunda, de öfversta tätt sitt., större och smalare, upprätta ell. föga utstående, alla *uddspetsiga, smält ell. otydligt kantade, de nedre helbräddade, de öfre med små mjuka och trubbiga länder* i kanten, i spetsen försvinn. nerv; kapseln horizontal, med kort hals, aflång; locket konvext, omärkligt vårtspetsadt. 24. 7. Fig. Br.eur. Vet.Ak.H.1846.t.4. R.Hn.Bryac.exs.47.

Skugg. st. i fjelltr. r. (Lul. Lpm. Snjörak och Njuonjes vid Qvikkjokk: Holmgr. Herjed. St. Midtåkläppen, m. fr.: Oldb. — N. Finnm. Maalselvdalen: Holmgr. Dovre, omkr. Kongsvold och Drivstuen flerst. Goustafield. Funnen m. fr. i Finnm. på toppen af ett mindre fjell nedom Storfjellet i Maalselvdalen af Hgn; samt på Dovre, vid Kongsvold af Jensen, Vårstien enl. ex. af Dr F. Kiær och vid Sprenbäcken enl. ex. af Lor.) *Tufvad som föreg., 2—4 tum hög, med smalare och spetsigare blad, som blifva blå, då de länge ligga i vatten. Sälls. med fr.*

†† Bladen kantade, starkt och tydligt tandade, med enkla tänder; nyskotten ofäst krypande; bladnervens rygg glatt.

\* Kapsels lock med långt spröt; blr 2kånade.

6 *M. rostratum* Schrad. bladen gles sittande, omv. äggrunda—bredt tunglika, *rundadt trubbiga med kort udd, kvassstandade*, med utlöpande nerv; toppbladen samlade i rosett; kapseln på upptill bågböjdt skaf något nedböjd, oval, med koniskt, *till långt spröt* afsmalnande lock. 24. 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2379. Lindgr.M.exs.12. R.Hn. Bryac.exs.139.

Skugg. och fukt. st. r. (Sk. Dahlby enl. Fr. Fl.Sc.; Broby, vid Udarp. — Gestr. Gefle, vid Tollforsbäcken. Ängml. Hernön. Jemil. Frösön: Holmgr.; Åreskutan. Dal. Orsa sn, vid Kallmora; Osmundsberget. Ner. Edsberg sn, Fjugesta; samt Skogaholm flerst.: C. Hn. VG. Hunneberg: Kindb. Dalsl. Hafsås. Boh. Christinedal. Öl. flerst.: Zett. — N. Aalesund: Holmgr.) *Växer spridd ell. löst tufvad, med tumshög upprätt frukt. stjelk, långa krypande nyskott från dennes bas; frskaften vanl. flere tillhopa; kapseln gulaktig, knappt dubb. längre än locket med dess spröt.*

†† Locket konvext—koniskt, utan spröt.

a — Blr 2kånade.

7 *M. cuspidatum* H. bladen utstående, från nedlöp. bas omv. äggrunda, toppbl. något

längre och smalare, alla uddspetsiga, *gulkantade*, *ofvan midten hvasstandade*, med *utlöpande* nerv och *teml. tät* cellväf af n. rundade celler; fr.skaftet *ensamt*; kapseln *horizontal* ell. *något nedböjd*, *tjockt oval*, med konvext, vanl. rundtrubbadt lock. 2½ 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2129. Lindgr.M.exs.38. R.Hn.Bryac.exs.135.

Skugg. st., sten. etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Ofta i vidsträcktla och låta tufvor; st. omkring tumshög, med dels kryp., dels mer uppräta nyskott; fr.skaften tumshöga*. — *M. silvaticum* Lindb.

- 8 *M. medium* Br. & Sch. bladen utböjda, de nedre glesa äggrunda, de öfre tätsittande, stora, från mer och mindre nedlöpande bas bredt tunglika—*aflånga*, uddspetsiga, *n. ända från basen hvasstandade*, med meränd. encelliga tänder, n. *utlöpande* nerv och *rundadt* sexsidiga celler, *dubb. större än hos föreg.*; fr.skaft *långa*, *1—flere tillhopa*; kapseln *hängande*, *aflånga*, med koniskt ell. högt konvext, uddspetsigt lock. 2½ 6, 7. — *β procereum* Lindb. större, med talrika fr.skaft tillhopa. Fig. Br.eur. R. Hn.Bryac.exs.137.

Fukt. skugg. st. (*Lul. Lpm.* och *VB.* Umeå: Holmgr. — *ÖG. Ner.* och *VG. Sk. Broby.* — *N. Finnm.* Maalselvålen; samt Trondhj. st. vid Stören: Holmgr. Gule-dalen, vid Bogen. Dovre. Gudbrandsdalen, vid Laurgård: Kindb.) *Mer än dubb. större än föreg., och mest lik följ.; nyskotten oftast felande; fr.skaften blekröda*, 2 tum höga, hos hufvudformen vanl. 1—2 ur samma perichætium.

b — Tvåbyggare.

- 9 *M. affine* Bland. bladen ofta med långa, 2—3celliga tänder i kanten, utlöpande nerv, *aflångt* sexsidiga celler, *för öfr. som hos föreg.*; fr.skaft. *teml. långa*, vanl. flere tillhopa; kapseln *hängande*, *aflångt oval*, med konvext, vårtspetsadt lock. 2½ 5—8. — *β elatum*: *tätt tufvad högväxt*, med långa nyskott, långt nedlöpande blad, kortare kapsel. — *γ ciliare*: bladkantens tand. mycket långa och smala. — *δ integrifolium* Lindb. mindre, med kortare och bredare, n. helbräddade bl. Fig. Br.eur. Fl.D.2066, f.1; 2612, f.2. *β* Lindgr.M.exs.37. R.Hn.Bryac.exs.136.

Fukt. st., kärr. (Sk.—VB. Skellefteå och Um. Lpm. Lycksele: Ångstr. *Lul. Lpm.* Jokkmokk: Holmgr. Boh. Christinedal. Öl.: Zett. — *N.* — *β* Samma utbredn. som *a.* — *γ Dal.* vid Leksands by: Lindb. — *δ* i fjelltr. och på Öl. enl. Lindb.) *Stor som föreg., vanl. löst tufvad, med stora blad och talrika, långa, oftast krypande nyskott från stjelkens bas*. — *M. serpyllifol.* *β cuspid. L. M. cuspidatum* Neck. Lindb. *β, ell. M. insigne* Müll., som af Lindb. och Milde erkännes som egen art och skulle *skilja sig med långt nedlöp. blad samt korta och trubbiga, encelliga kantländer*, då *M. affine* skulle hafva *icke nedlöp. bl., men 2—4celliga tänder, synes utg. efter gränsning af en stor mängd ex. från olika lok. utan all gräns öfvergå i M. affine; man finner näml. lika ofta nedlöp. och icke nedlöp. bl. med encelliga som med långt flercelliga kantländer. Äfven M. medium var. med mer och mindre nedlöp. bl., ehuru de vanl. kallas knappt nedlöpande. En lågodat form, med ofta ensamma fr.skaft, är M. rugicum Laur.*

- 10 *M. undulatum* H. bladen nedtill glest, upptill tätt sittande, *toppb. rosettl. samlade*, alla utstående—utböjda, nedlöpande, *aflångt ell. jemnbredt tunglika*, trubbad med udd, ända från basen hvasstandade, på tvären *vågiga*, med utlöp. nerv; fr.skaften *teml. korta*, flere tillhopa; kaps. *nedböjda*, *aflång-oval*, med konvext, vårtspetsadt lock. 2½ 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2128. R.Hn.Bryac.exs.138.

Fukt., skugg. st. (Sk.—Helsl. Vestml. och Verml. Boh. Oroust, vid Henån: Th. Engstr. Öl.: Zett. Goull. — *N. till Trondhj. st.*) Vanl. 2—4 tum hög, i *vidsträcktla lösa mattor*, med talrika uppstigande nyskott jemte långa, *skottlika nedböjda*, *ofta rotstående grenar från stjelkens spets, derigenom trädlik*; bladen 3—4 lin. långa. smala. Frukt. *sållynt*. — *M. serpyllifol.* *δ Lin. Bryum ligulatum* Schreb.

+++ Bladen kantade, starkt och tydl. tandade, med dubbla tänder; nyskotten alltid uppräta.

\* Locket konvext, utan spröt; tvåbyggare.

- 11 *M. hornum* L. bladen tätt sittande, upprätt utstående, uppåt längre och smalare, *något nedlöpande*, ovalt—smalt lancettlika, spetsiga, med slutl. rödbrun, tätt och hvasst tandad kant, n. utlöpande, på ryggen sågad nerv; kapseln ensam, lutande ell. horizontal, *aflång-oval*, med konvext, vårtspetsadt lock. 2½ 6—8. Fig. Br.eur. Fl.D. 2066, f.2. Lindgr.M.exs.39. R.Hn.Bryac.exs.143.

Skog. på fukt. st. (Sk.—Helsl. VB. Skellefteå och Norsjö. *Jemtl. Snasahögen. Verml. Vestml. Ner. Boh. Öl.*: Lindb. & Zett. — N. till Nordl. Salten: Arn.) *Stjelken* 2—3 tum hög, i stora och låta, vanl. mörkgröna tufvor; kaps. gul. — *Bryum Schreb.*

\*\* Locket med spröt.

a — Bladnervens rygg glatt.

- 12 *M. spinosum* Schwagr. tvåbyggare; bladen samlade mot stjelkens ell. grenarnes spets, de öfre hastigt större, alla utstående aflångt omv. äggrunda, spetsade, med syllik udd af den utlöpande nerven, ofvan midten hvasst dubbeltandade, med de öfre cellerna i tydl. rader; fr.skaften vanl. 2—6 tillhopa; kapseln horizontal ell. svagt nedböjd, aflångt oval, med koniskt, kortsprötadt lock. 2½ 6—8. Fig. Br.eur. R.Hn. Bryac.exs.142.

Fukt. skogsm., helst i fjelltr. r. (*Lul. Lpm. Qvikkjokk. i Walleskogen: Holmgr. Pit. Lpm. Wallåive. Um. Lpm. Larfjellet: Ångstr. Jemtl. Snasahögen; Åreskutan, i Mörvikshummels bäckdalar, och vid gästgg. Stånggårde. Herjed. Djupdalsbäcken i Midtdalen: Oldb.; Malmagen; Funnedsalsberget. VG. Kinnekulle. — N. Finnm. Maalselvdalen: Holmgr. Nordl. Salten, på Baadfeld: Schl. & Arn. Dovre, kring Drivstuen. Gudbrandsd. Laugård: Holmgr. Rollaug i Vestfjorddalen, och vid Tindsjön.*) *Stjelken* tumshög ell. mera, enkel ell. upptill med ett par grenar; bladen mörkgröna, stora, 2—3 lin. långa; fr.skaften tumshöga. Gröfre och mörkare än den habituellt liknande, i mell. Eur. och ofta på samma plats växande *Mn. spinulosum* Br. & Sch., som lätt skiljes med sina 2kånade blr. — *Bryum Voil.*

- 13 *M. serratum* Brid. blr 2kånade; bladen spridda uteser hela stjelken, upptill mer lätt sittande, föga olikstora, något utstående, från nedlöpande bas aflångt lancetlika, spetsiga, med syllik udd och i spetsen försvinn. nerv, ofvan midten hvasst dubbeltandade, med stora celler, de öfre icke i rader; fr.skaft ofast ensamt; kapseln n. horizontal, oval—aflång, med koniskt, kortsprötadt lock. 2½ 5, 6. — β *integrifolium* Lindb. bl. helbräddade. — γ *apiculatum* Lindb. mindre; locket udd- [icke spröt-] spetsadt. Fig. Br.eur. Fl.D.2808. Lindgr.M.exs.40. R.Hn.Bryac.exs.140.

Skugg. st. r. (Smål. Femsjö; Taberg: Zett. ÖG. Omberg m. fl. st. *Stockh. Carlbergs park. Uppl. Skokloster. Gestr. Kubbo. Jemtl. Herjed. Dal. Osmundsberget; Kallmora och Skatungsbyn i Orsa. Vestml. Sala. Ner. Sköllersta sn, Tarsta såg: C. Hn. VG. Kinnekulle. Öl. Gårdby och Gråberg: Zett. Gottl. vid Gothemsån. — N. till Nordl.) *Omkring tumshög, i ljusgröna tufvor; stjelken enkel, med upprätta nyskott från basen; fr.skaft stund. 2 tillsammans; kaps. gulaktig, med rödbrun mynning. Liknar vida mer de 3 följ. arterna än föreg. — Bryum marginatum* Dicks. *Mn. marg. Lindb.**

b — Bladnervens rygg sågad; tvåbyggare; fr.skaften ensamma.

- 14 *M. riparium* Müll. bladen lätt sittande, utstående, kort nedlöpande, äggrundt—ovalt lancetlika, spetsiga, något bredt kantade, n. från basen tandade, med i spetsen försvinnande nerv och små, klorofyllrika celler; kapseln teml. kort skaftad, elliptiskt aflång, med kortsprötadt lock. 2½ 7, 8. Fig.

Fjelltr. r. (*Lul. Lpm. Qvikkjokk* flerest: Holmgr. *Herjed. Funnedsalsberget: Thed. — N. Finnm. vid Lyngen: J. P. Norrlin enl. Lindb.; Maalselvdalen: Holmgr. Dovre, Kongsvold: Jens. och Kindb.*) *Mycket närbeslägtad med och måhända blott en frödigare skuggform af följ., med endast de nedre bladen af ålder rödbruna, enl. Lindb., som sjelf synes tvifvelaktig om dess arträtt; ex. från de angifna lokalerna af Thed. och Kindb. motsvara endast delvis den gifna beskrifningen. — År enl. Lindb. de flesta förf:s M. lycopodioides.*

- 15 *M. orthorrhynchum* Br. & Sch. bladen ovallt ell. aflångt lancetlika, spetsiga, smalare kantade, ungefär från midten tandade, med dubb. större, klorofyllfättiga celler, för öfr. som hos föreg.; kapseln horizontal, ovallt aflång, med n. koniskt, kortsprötadt lock. 2½ 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.141.

Skugg. st., klippspring. r. (*Lul. Lpm. allm. enl. Holmgr. Pit. Lpm. flerest. Um. Lpm. Offjell: Ångstr. VB. Krångforsen. Jemtl. Frösön: Holmgr. Herjed. mångenst. Dal. Osmundsberget; Skatungen. VG. Kinnekulle, vid Råbäck. ÖG. Gopö, Lemunda och Omberg: Holmgr. — N. Nordl. Sulitälma: Lor. Dovre, ymn. vid Drivstuen och Kongs-*



vold. Gudbrandsd., Stuelsbro. Vestfjorddalen, vid Hougforsen i Rollaug.) *Omkring tumshög, lätt tufvad, mörkgrön, slutt. hel och hållen gulaktigt rödbrun. Fordom förvezlade med den habituellt lika M. serratum, men lätt skiljd med de vanl. i rikrika hanständen, hos hvilka ofta skottlika grenar utgå lätt under den stjernlika blomman.*

- 16 *M. inclinatum* Lindb. bladen glesl sittande, knappt nedlöpande; de nedersta små, bredt äggrunda, n. helbrädd., de öfre större, aflånga, trubbad med udd, smalt kantade och dubbeltandade, med i spetsen försvinn., upptill sågad nerv, och små celler, fattiga på klorofyll; kapseln på bågbojdt skaft, lutande, äggformigt aflång, med afsmaln. hals och lågt koniskt, kortspröadt lock. 2½ 7. Fig.

Fukt. klipp. i fjelltr. r. (Lul. Lpm. Stora Sjöfallet 1867: Holmgr. Pil. Lpm. Kåksa 1856: Lindb.) Mindre och spädare än föreg., äldre bibehållande sin gröna färg.

+++ Bladen okantade, med glatt nerv; nyskotten upprätta; tvåbyggare.

\* Bladen tydl. sågade, likasom hos alla de föreg. af vida, kantigt rundade celler.

- 17 *M. stellare* H. bladen upprätt utstående, uppåt tilltagande i storlek, nedlöpande, aflångt lancettlika, spetsiga, med kort, smal udd, ofvan midten sågade, med nedom spetsen upphörande nerv; kapseln lutande—horizontal, aflång, med konvext, rundtrubbigt lock. 2½ 5, 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.45.

Skugg. st., bergsklyft. r. (Sk.—VB. och Pil. Lpm. Boh. Christinedal. Öl.: Lindb. & Zett. Gottl. — N. nära Fämundsjön. Gudbrandsd., Laurgård: Holmgr. Dovre, vid Kongsvold. Sogn, i Lyster: Wulfsb.) Stjelken ¼—1 tum hög; bladen ljusgröna, mycket mjuka, antaga i vatten slutt. blå färg; kapseln brungrön, sälls. — *Bryum* Schrad.

\*\* Bladen n. helbräddade, af smala, aflångt rhombiska celler, ordnade i tydl. divergerande rader.

- 18 *M. cinclidioides* Hüb. bladen utstående, de nedre kortare och bredt äggrunda, de öfre bredt aflånga—tunglika, alla rundtrubbiga ell. n. intryckta, utan ell. med kort udd, otydligt och glesl småtandade, med i spetsen försvinn. nerv; kapseln långt skaftad, hängande intill skaftet, äggformig, med konvext, kort uddspetsigt lock. 2½ 6. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.11. R.Hn.Bryac.exs.47.

Kärräng. (Sk.—Lul. Lpm.: Holmgr. och VB. Öl. Melböda: Lindb. Gottl. Storholmen i Fardume träsk. — N. till Nordl. Salten och Sulitälma.) Habituellt lik *Cinclid. stygium*, men skiljd från denna och alla de öfriga *Mnia* genom bladens cellob., hvori den mer närmar sig *Bryum*; stjekarne 3—6 tum, stund. högre, lätt tufvade och förenade af rolludd; kaps. på 2—3 t. högt skaft, slutt. brunaktig, med yttre perist. svartbrunt. — *Bryum* Bl.

## 23 Flocken Bryese.

### 57. ZIERIA Schimp.

- 1 *Z. julacea* Sch. stjeklbladen aflångt lancettlika, nyskottens lätt tegellagda, starkt konkava, äggrunda, spetsiga, alla helbräddade, med under spetsen försvinnande nerv; kapseln n. horizontal, blott hälften så lång som den smala halsen, jemte denna snedt klubblik, med konvext, vårtspetsadt lock; inre perists. tänd. föga längre än de yttre. 2½ 7, 8. Fig. Br.eur. [Br. Zierii]. R.Hn.Bryac.exs.133.

Klippspring. etc. i fjelltr. r. (Torn. Lpm. Kurawaara. Lul. Lpm. Sarkavare; Berestäd. vid Qvikkjokk: Holmgr. Pil. Lpm. öst. Itstjakk; Kåksa. Um. Lpm. Laxfjellet. Jeml. Snasahögen; Åreskutan; Helagsfj. Herjed. Ljungdals- och Storsjötrakten; Hamrafjellet etc. — N. Finnm. Nordl. Trondhj. Mostamarken. Bogen i Guledalen. Dovre. Bergen st., Sogn etc.) Ljust hvitrod; stjekl och nyskott tillhopa knappt mer än halftumshöga, fr.skaftet ungef. lika långt, föga längre än kapseln med sin hals. — *Bryum Zierii* Dicks. och ed.9.

- 2 *Z. demissa* Sch. de nedre stjeklbl. äggrundt lancettlika, spetsiga, med under spetsen upphörande nerv, de öfversta lancettlika, långt smalspetsiga, med utlöp. nerv, nyskottens löst tegellagda, något utstående, alla helbräddade; kapseln nedböjd, lika lång som halsen, jemte denna snedt päronlik, med lock som hos föreg.; inre perists. tänder n. dubbelt längre än de yttre. 2½ 7—9. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.134.

Jord, bergspring, i fjelltr. r. (*Pit. Lpm. Tjiddjakk*. — *N. Nordl. Bodö: Holmgr; vid Saltenford, mell. Lödningen och Vågan: Lor. Vangsfield i Opdal. Dovre, på fjellplatån mell. Rise- och Finnsbø; samt mell. Finnsbø och Hemsjön; i Sprenbäcksdalen m. fl. st. kring Kongsvold. Liten som föreg.*, ell. ännu mindre, yngre hvitgrön, äldre brunaktig, med smalare, mer utstående blad; fr-skäften korta, upptill omböjda, kaps. tjockare än hos föreg. — *Bryum Hook., Br.eur. och ed.9. Meesia Hornsch.*

## 58. ANOMOBRYUM Schimp.

- 1 *A. julaceum* Sch. stielken och nyskotten trinda, tätbladiga; bladen tätt tegellagda, starkt konkava, bredt äggrunda—äggrundt aflånga, trubbiga, helbräddade ell. i spetsen glest och omärkl. småsågade, med under spetsen försvinn. nerv och tät cellväf i bladets öfre del af smalt jemnbreda, långa och n. raka celler; kapseln nedböjd, aflång, med konvext, vårtspetsadt lock. 2 8, 9. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.243, 363. Fukt. klipp. etc. i fjelltr. r. (*Lul. Lpm. Qvikkjokk flerst.: Hgn. Pit. Lpm. Kåksa. Um. Lpm. Gitsfjellen. Jemt. Snasahögen, vid Handölsforsen. — N. Nordl.—Dovre. Bergen st. Sogn: Wulfsb.; Voss; Ullensvang etc.*) Glänsande gulgrön, med  $\frac{1}{2}$ —1 tum långa, n. tagelsmåla nyskott; knappt funnen med fr. i Skand. — *Bryum Sm. och ed.9. Br. filiforme Dicks. Lindb.*

- 2 *A. concinatum* Lindb. stj. och nyskotten som hos föreg.: bladen tegellagda, något konkava, äggrunda—ovalt lancetlika, kort uddspetsiga, med ullöppande nerv och något vidare, men kortare, raka ell. något krökta celler i öfre delen. 2. Fig. Klipp., helst i fjelltr. r. (*Lul. Lpm. Nammats vid Qvikkjokk: Stud. Fredrikson enl. Lindb. Herjed. Ulfberget: Oldb. ÖG. Omberg, på Hjessan: Hgn. — N. Dovre, vid Sprenbäcken. Budskeruds amt, Gravfossen nära Modum.*) Knappt tumshög, trådfin, tufvad i nedtill rödaktiga, och af rotludd förenade, upptill gröna tufvor; nyskotten få och enkla. Endast honbl. funna; frukt okänd. Ar måhända, såsom *Wils. anser*, blott en form af föreg. — *Bryum Spruce och ed.9. B. nimbigenum Tayl. B. julac. β Wils.*

## 59. BRYUM Dill.

† *Rhodobryum* Sch. Bladen mycket stora, rosettlikt samlade i toppen, stielken dervedanför n. bar. Inre perists tänder med mellanligg. cilier, som i kanten bafva skarpa taggar.

- 1 *B. roseum* Schreb. tvåbyggare; de nedre bladen mycket få och glesa, fjäll-lika; toppbladen smalt omv. äggrunda, spetsiga, nedom midten med tillbakavikna kanter, ofvan midten starkt sågade, med stark, n. utlöppande nerv; kapseln nedböjd, aflång, med konvext, vårtspetsadt lock.\*) 2 9, 10. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac. exs.217. Skugg. skogsm. (*Sk.—Lpl. — N.*) 1—2 tum hög, löst tufvad, med underjordiska nyskott från stielkens bas och ett ensamt i spetsen, der de 3 lin. långa bladen äro samlade; fr-skäften höga, 1—3 tillhopa, teml. sällsynta. Liknar till de stora bladen ett *Mnium*, men är till deras cellväf och peristomet ett verkligt *Bryum*. — *Mnium serpyllif. γ L.*

†† *Bryum* [i eg. mening]. Stielken öfverallt n. likformigt bladig, vanl. med 2 nyskott i spetsen; inre perists cilier som i föreg. afl.

\* Bladen i friskt tillstånd utstående, äggrunda—lancetlika, spetsade.

a — Kapseln utdraget klubblik ell. päronlik, med lång hals (n. af sjelfva kapselns längd).

α — Tvåbyggare.

- 2 *B. pseudotriquetrum* Schwægr. stielken utdragen, vanl. grof, ända upp till spetsen med tätt rotludd; nyskotten vanl. grofva och tätbladiga; bladen smalt äggrundt lancetlika, smaltspetsiga, tydl. kantade, helbräddade, end. i öfversta spetsen omärkligt tandade, med knappt utlöppande nerv; kapseln långt skaftad, nedböjd, utdraget klubblik, slutl. hopdragen under mynningen. 2 6, 7. — *β cavifolium*: bladen starkt

\*) Hos alla skand. arter i detta och följ. släkte är locket i det närmaste sådant som hos denna art.

konkava, mer och mindre rundade, i spetsen inböjda, trubbad med udd. Fig. Br. eur. Fl.D.2505. Lindgr.M.exs.65. R.Hn.Bryac.exs.16 [α & β].

Våta st., fukt. klipp. etc. (Sk.—Lpl. — N. — β ÖG. Omberg. Stockh. Uggelvikskällans utlopp. Uppl. Uppsala, Vitulfsberg. Gestr. Fleräng. Öl. Vickleyby: Lindb.; Åhs, Resmo, Horn: Zett. Gottl. Flaringe; söd. om Klinte: Holmgr.) Med nyskotten 1—4 tum hög, lått tufvad, vanl. brungrün. β, som är *B. neodamense* Hx., är, ehuru ofta mycket utmärkt till uts., säkerligen blott en lokalform, med öfvergångar till α. — *Mnium* H. *M. bimunt* Wg. Br. *ventricosum* Dicks. Lindb. — Anm. Br. Jackii C. Müll. uppgifven, ehuru med en viss tvekan, af Zett. för Öland, förklaras af Lindb. på det bestämdaste höra hit; utg., som icke känner den ull. *B. Jackii*, kan icke mell. Zett:s ex. med detta namn och en spädare pseudotriqu. finna någon märkbar olikhet.

3 *B. pallens* Sw. stjelen kort, ända upp, jemte de vanl. utdragna, teml. låtbladiga nyskottens nedre del med rotludd; bladen något nedlöpande, ovala—ovalt lancettlika, spetsiga, kantade, n. helbräddade, med udd af den utlöpande nerven; kapseln horizontal—nedböjd, med mycket lång, meränd. krökt hals, snedt päronlik, icke under mynn. hopdragen. 2 7, 8. Fig. Sw.M.Su.t.4,f.12. Br.eur. Somf.Cr.exs.25. Lindgr. M.exs.68. R.Hn.Bryac.exs.18.

Fukt. jord. (Sk.—Lpl. — N.) Stjelkarne från ett par lin. till halftumshöga, lått tufvade och förenade medelst rotludd, med vanl. 1—1½ tum höga, yngre vanl. ljusst rödaktiga och talrika nyskott, mellan hvilka de 1—1½ tum höga frskäften uppskjuta; kapseln stor, gul ell. ljusbrun.

4 *B. Duvalii* Voit. stjelen något utdragen spenslig, nedtill med rotludd, jemte de långa och spensliga nyskotten mycket glesbladig; bladen mycket långt nedlöpande, bredt äggrundt lancettlika, spetsiga, okantade, helbräddade, med under spetsen försvinnande nerv; kapseln hängande, med den långa, raka halsen utdraget och regelbundet päronlik, slutt. hopdragen under mynningen. 2 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D. 2684. R.Hn.Bryac.exs.219.

Sanka äng., källdrag etc. r. (Lpl.—Gestr. och Dal. Stockh. Dalarö; samt ÖG. V. Ny och Vinnerstad snr: Holmgr. Smål. i Almesåkra, Ekeberga m. fl. snr enl. Scheutz. — N.) Stjelt och nyskott tillhopa 1—3 tum höga, ljusröda, i stora, men lösare tufvor; särd. nyskotten vingade af de n. från blad till blad nedlöpande bladbaserna; frskäften mycket fina, ofta 2 tum höga. Sälls. med frukt.

#### β — Sambygare.

5 *B. subrotundum* Brid. stjelen och de n. knopplika nyskotten korta och tätbladiga; bladen konkava, äggrundt—omv. äggrundt lancettlika, spetsade, med platta, upptill svagt och glesl tandade kanter och borstlik udd af den utlöpande nerven; kapseln nedböjd—hängande, rundadt—afångt päronlik, regelbunden, med litet och lågt, vårtspetsadt lock. 2 7. Fig. Br.eur.

Fukt. jord, r. (Pit. Lpm. Tjiddtjakk. Um. Lpm. Laxfjellet; samt Jeml. Åreskutan och Kålhaugen: Ångstr. — N. Dovre, i landsvägskanterna mell. Kongsvald och Sprebäcken.) Väzer spridd ell. gruppvis; stjelen med talrika små sidogrenar, jemte nyskotten blott 2—3 lin. hög; frskäftet föga mer än halftumshögt.

6 *B. pallescens* Schleich. stjelen och nyskotten mer och mindre utdragna, upptill tätbladiga, med ymnigt rotludd; bladen föga konkava, smalt äggrundt lancettlika, spetsiga, ofta med udd, med tillbakavikna, helbräddade kanter, de nedre med försvinnande, toppbladen med utlöpande nerv; kapseln horizontal—något nedböjd, utdraget, n. klubbformigt päronlik, regelb., med högt konvext, uddspetsigt lock. 2 6—8. — β boreale Sch. gröfre och mer grenig, med längre och smalare bl., längre frskäft. Fig. Br.eur. Fl.D.2381,f.1. R.Hn.Bryac.exs.221.

Mur., klipprött, jord. (Sk.—Helsl. Ängml. Hernösand. Lul. Lpm. Herest.: Holmgr. Um. Lpm. Tärna sn: Ångstr. Jeml. Frösön: Holmgr. Herjed. Herest.: Hellb. Dal. Ner.: C. Hn. Öl.: Lindb. & Zett. Gottl. Vibble. — N. — β i fjelltr. Lul. Lpm.—Herjed. — N.) Mycket varierande till storleken, stjelen från ett par lin. till flera tum, och då icke olik följ., alltid lått tufvad och högt upp emot de gröna topparne hopväfd af ymnigt, rödbrunt ludd; den långa och smala, föga nedböjda kapseln teml. långt skafad, slutt. under mynningen hopdragen, utmärkt af det ovanl. höga och spetsiga locket.

## γ — Blr 2könade.

7 *B. bimum* Schreb. stj. och nyskotten *som hos föreg.*; bladen köladt konkava, nedlöpande, äggrundt—af långt lancettlika, kort uddspetsiga af den utlöpande nerven, med tillbakavikna kanter, helbräddade, endast i öfversta spetsen sågade; kapseln hängande, mer ell. mindre utdraget päronlik, regelbunden, med lågt konvext, värtbärande lock. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2382 [utom f. r—t enl. Lindb.]. Lindgr.M. exs.66. R.Hn.Bryac.exs.220.

Kärr, fukt. klipp. etc. (Sk.—Lpl. — N.) Tufvad och ofta stor som *B. pseudotriquetra* och i hög grad lik denna, men vanl. spensligare och glesbladigare, oftare upptill grön, samt säkert skild med bläna och den till udd utlöpande nerven.

8 *B. cirrhatum* Hornsch. stjelen och nyskotten *som hos föreg.*; stjelen toppblad smalt, nyskottens bredt äggrundt lancettlika, alla långt och köladt smalspetsiga, med lång gleståndad udd af den utlöp. nerven, starkt tillbakavikna, helbräddade kanter; kapseln nedböjd—hängande, n. klubblik, regelbunden, med lock som hos föreg 24 7, 8. Fig. Br.eur.

Fukt. st., helst i fjelltr. r. (Lul. Lpm. Qvikkjokk; Kerkevar. Pit. Lpm. Tjiddjakk. Herjed. Stora Midtåklappen: Hellb. Dal. Osmundsberget; Styggforsen. VG. Lidköping, vid Venern. Gottl. Koppavik. — N. Dovre, på Finnsjö; mell. Drivstuen och Vårstien, vid Kongsvold etc. Lom, Visdal. Tronsfjellet: Hellb. Laurvig.) Späddare än föreg., ofta ett par tum hög, med mycket smala, utdragna nyskott; tufvorna sammanväfda af svartaktigt ludd; på torrare ställen lågväxt och mer lik följ., men skild med mer nedböjda kapslens tjockare hals.

9 *B. intermedium* Brid. stj. och nyskotten korta, mer och mindre tätbladiga, den förra med ymn. rotludd; bladen (ätm. de öfre) smalt äggrundt lancettlika, afsmalnande till en lång, gleståndad udd, bildad af den utlöp. nerven, med n. platta, helbräddade kanter; kapseln horisontal ell. något nedböjd, med mycket lång, något krökt hals, medt och utdraget päronlik, med högt konvext, uddspetsigt lock. 24 6—8. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.64. R.Hn.Bryac.exs.257.

Jord, murar, r. (VG. Rackeby. Ner. Edsberg sn. i Fjugesta kalkbrott: C. Hn. Stockh. Haga ruiner. Uppl. Uppsala, vid Lassby. — N. Dovre enl. ex. af Schimp.) Bildar låga, vanl. knappt halftumshöga, upptill liftigt gröna tufvor, med fina, ofta 1½ tum höga fr.skaft; utmärkt af den långhalsiga, före lockets affall. knappt nedböjda kapseln, som aldrig är så hopdragen under mynningen som hos den ofta teml. lika *B. pallescens*.

b — Kaps med kort hals.

α — Blr 2könade.

10 *B. microstegium* Br. & Sch. stjelen och nyskotten ytterst korta, tätbladiga; toppbladen smalt äggrundt lancettlika, långt smalspetsiga, med n. helbräddad udd af den utlöp. nerven, och helbräddade, tillbakavikna kanter; kapseln nedböjd, af långt päronformig, regelbunden, icke hopdragen under den trånga mynningen, med högt konvext, uddspetsigt lock. 24 7, 8. Fig. Br.eur. V.A.H.1846, t.12.

Jord i fjelltr. r. (Um. Lpm. vid Stuorware: Ångstr. — N. Dovre, vid vägen nära Kongsvold.) Stjelen och nyskott tillhoppa endast 2—3 lin. höga, tätt tufvade; fr.skaften tumshöga, med liten kapsel.

β — Tvåbyggare.

11 *B. turbinatum* H. stjelen och nyskotten mer och mindre utdragna, säd. de sednare glesbladiga; bladen äggrundt lancettlika, spetsiga, med helbräddade, i spetsen omärkligt naggsågade, vid basen tillbakavikna kanter och i en kort udd utlöpande nerv; kapseln hängande, regelbundet päronformig, slutt. starkt hopdragen under mynningen. 24 6—8. — β latifolium Br. & Sch. i stora, ljusgröna, svällande tufvor, med stora, löst tegellagda, starkt konkava och glänsande blad, stor, långskaftad kapsel. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.118. Rab.Bryoth.622.

Fukt. st., β vid fjellback. (Sk.—Jemtl. och VB. Umeå, samt Luleå: Holmgr. — N. — β Lul. Lpm. Qvikkjokk flerst.: Holmgr. Öl. Myckleby: Lindb. — N. Finm. Rosta-fjeld i Maalselvdaalen: Holmgr. Nordl. Sulitälma: Lor.) Mycket varierande i storlek, från föga mer än en half till 2, β 3—4 tum; nyskotten vanl. ½—nära 2 tum höga. Framför allt utmärkt af den i äldre tillstånd under det stora peristomet

starkt hopsnörda kapseln, hvars hals samtidigt blifver ganska smal. —  $\beta$  B. Schleicheri Schwægr.

- 12 B. *caespitium* L. stjelken och nyskotten korta, tätbladiga, nedtill med rotludd; toppbladen störst, smalt äggrundt lancettlika spetsiga, med lång udd af den utlöpande nerven, helbräddade, med ända upp mot spetsen tillbakavikna kanter; kapseln nedböjd—hängande, smalt, päronformig—n. aflång, knappt sned, stult, något hopdragen under mynn. 24 6, 7. —  $\beta$  *badium* Sch. mindre, och lösare tufvad ell. spridd; bl. med mindre tillbakavikna kanter, röd nerv och längre, tyd. tandad udd; kaps. kortare, stult. läderbrun. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.69. R.Hn.Bryac.exs.321.

Tak, mur., jord, a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Goll. Koppavik nära Visby: V. Pripp enl. Lindb.) Växer vanl. i låga, omkr.  $\frac{1}{2}$  tum höga tufvor, mer och mindre hopväfda af rotludd, med talrika, högre ell. lägre fruktskaf. —  $\beta$ , ell. B. *badium* Bruch, känner utg. endast af ull. ex., hvilka synas föga utmärkta.

- 13 B. *Mildeanum* Jur. stjelken och de trådfina nyskotten något utdragna, upptill mer tätbladiga; bladen äggrundt lancettlika, spetsiga, med något kort udd af den utlöp. nerven, helbräddade ell. mot spetsen tandade, med tillbakavikna kanter; kapseln nedböjd ell. hängande, klubbformigt päronlik, rödbrun, stult, kastanjebrun. 24 7, 8? Fig. Fukt. klipp., jord etc. r. (ÖG. V. Ny sn; samt VG. på klippor vid Vetterns stränder: Holmgr.) Mycket hårdt tufvad i tumshöga, nedtill ljusbruna, i toppen glänsande gröna tufvor, med trådmala, nedtill gles-, upptill tätbladiga nyskott, enl. ull. ex., som habituellt mycket likna *Anomobr. concinnat.*, men hafva mycket lösare cellväf. Suenaka ex. äro lägre, med mer utstående blad, och derigenom tjockare nyskott, eljest lika; frukt ej funnen i Sv.

- 14 B. *Mühlenbeckii* Br. & Sch. stjelken och de teml. grofva nyskotten utdragna, i torrt tillst. trinda af de tegellagda bladen, glanslösa, med ymn. rotludd; bladen äggrunda—aflånga, trubblade utan udd, med helbrädd., ända upp mot spetsen tillbakavikna kanter och i spetsen försvinnande nerv; kapseln nedböjd—hängande, aflångt klubblik ell. smalt päronformig, regelbunden. 24 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.258. Fukt. klipp. r. (Lul. Lpm. Namnats vid Qvikkjokk: Holmgr. Pit. Lpm. Kalishuota. Um. Lpm. Lax- och Olssjellen: Ängstr. Medelp. Sundsvall. Uppl. Uppsala, Lassyb; Norrtelge: Mosén. Stockh. flerst. ÖG. Nor. Vi sn, Visqvarna: Stud. Dusen. VG. Hunneberg. Boh. Strömstad: Stud. G. Theel. — N. Sundalen, mell. Sliper och Gjora gästgg. m. fr.: Scheutz. Sogn flerst., äfv. m. fr.: Wulfsb. Filefjeld, i Frostalen. Gudbrandsd., Laugård: Holmgr. Näs jernverk.) Bildar låga, tumshöga, bruna ell. smulvgröna tufvor, liknande följ., men utan all glans. Bladen bredare och af lösare cellväf än hos denna, saml. emedan nerven icke utlöper, utan udd. Frukt sälls. — B. alp.  $\beta$  brevifol. Myr. enl. Lindb.

- 15 B. *alpinum* L. stj. och nyskotten som hos föreg., men mycket glänsande och med föga rotludd; bladen lancettlika, spetsiga, med kort udd af den utlöpande nerven och helbräddade ell. i spetsen omärkl. naggade, nedom midten tillbakavikna kanter; kapseln som hos föreg. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2506,f.2. R.Hn.Bryac.exs.224. Klipp. r. (Sk.—Uppl. Medelp. Sundsvall. Herjed. Funnedsälberget; Hamrafjell: Hellb. Verm.: Kindb. Ner. Skåne- och Ullaviklind: C. Hn. Dalsl. Lilla Strand i Fröskog: Kindb. Boh. Hall. — N. till Nordl.) Växer i låga tumshöga rödbruna, glänsande tufvor, med smalare och spetsigare blad än föreg., från hvilken den, oaktadt en viss habituell likhet, är väl skild. Frukt sälls.

- 16 B. *atropurpureum* Br. & Sch. stjelken och nyskotten korta, tätbladiga, den förra med ymn. rotludd; toppbladen störst, konkava, äggrunda, spetsiga med kort udd af den utlöp. nerven, helbräddade, nedom midten med tillbakavikna kanter; kapseln hängande, med kort och tjock, stult, rynkig hals, n. oval, under mynningen aldrig hopdragen; locket stort höghvåldt, med kort udd. 24 5, 6. Fig. Br.eur.

Jord, r. (Sk. Broby sn, Åskekärr: Hamnstr. enl. Lindb. Herjed. Flottafjell?) Tufvorna ett par lin. höga, med knappt halftumshöga frskaf.; kapseln mycket liten, blodröd, stult. svartrod. Ex. från Herjed. har utg. ej sett, men enl. Lindb. höra de hit, ehuru möjl. någon förväxling rörande lokalen egt. rum, då denna art ingenslades annars tillhör fjelltr. Öfr. i ed.9 upptagna lokaler tillhöra följ., mycket närstående art.

- 17 B. *Klinggraffii* Sch. stj. och nysk. som hos föreg.; bladen från bredare bas småning. lancettlikt afsmalnande till en lång och smal spets med udd af den utlöp. nerven,

helbräddade, endast i spetsen glest tandade, med *tillbakavikna* kanter, af lös cellväf; kapseln som hos föreg., under den vida mynningen starkt hopnörpt. 24 5, 6. Fig. R.Hn.Bryac.exs.223. [Br. atropurp.]

Jord, sand, st. r. (Södm. vid Skäcklinge källa i Botkyrka sn. Stockh. vid Marieberg.) Lika liten som föreg., från hvilken den huvudsakl. skiljer sig med den hopnörpta kapseln och de smalare bladen. Dessa beskrifvas af Milde med und. spetsen försvinn. nerv, men både på sv. ex. från Stockh. och på ex. från Breslau, utg. meddelade af Milde sjelf, är den tydl. utlöpande; andra, ex. har utg. ej sett. — B. atropurpureum ed.3, till en del. B. erythrocarp. 8 turfaccum Sch. Syn.

18 B. erythrocarpum Schwægr. stj. och nyskotten korta, upptill tätbladiga, med rotludd; bladen som hos föreg., men större och särd. i spetsen med tätare cellväf; kapseln nedböjd—hängande, aflångt klubb- ell. päronlik, under mynn. meränd. något hopdragen, mörkröd med ljusare rödt lock och peristom; locket som hos föreg. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.70. R.Hn.Bryac.exs.222.

Fukt. sandjord, r. (Sk. Stockh. vid Ålkistan. Uppl. Runsa; Uppsala, Sandviken; Edbo sn, vid Järinge: Mosén. Helsl. Hemstanäs. VB. Skellefteå. Dal. Grycksbo. Ner. Skogaholm: C. Hn. VG. Hunneberg; Lidköping, vid Venerns strand; Göteborg. Hall. Bårarp.) Stjelken och nyskotten 2—3 lin. höga fr. skäften omkr. tumhöga, ofta högre; kapseln längre och smalare än hos de 2 föreg., men dock liten. Stundom utveckla sig i bladvecken små klotrunda och purpurroda knopplika bulbill; dyl. har utg. funnit afven på föreg. art.

\*\* Bladen i friskt tillstånd utstående, mycket breda, rundade—omv. äggrunda, trubbiga med ell. utan hårudd. Tvåbyggare.

19 B. capillare L. stj. och nyskotten något utdragna, mer och mindre tätbladiga, den förra med ymn. rotludd; bladen, mer och mindre konkava, aflångt—rundadt omv. äggrunda, trubbad ell. tvärt sammandragna i en hårlig udd, helbräddade ell. öfverst omärkl. naggade, rundtom kantade, med utlöp. ell. und. spetsen försvinn. nerv; kaps. lutande—horizontal—nedböjd, utdraget klubblik—kort päronlik. 24 6—8. —  $\beta$  Ferchelti: bl. starkt konkava, elliptiskt rundade, med lång udd; kaps. hängande, kort päronlik. —  $\gamma$  carinthiacum: bl. som hos  $\beta$ , med mycket kort udd, icke utlöp. nerv. Fig. Br.eur. Fl.D.2685,f.1. Lindgr.M.exs.67. R.Hn.Bryac.exs.218.

Skogsm. på sten., jord etc. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Öt. Vickteby: Lindb. Gottl. klippor vid Tenglingsmyr i Etehem. — N. Vestfjordalen, —  $\gamma$  Blek. vid Carlshamn: Lindb.) Tufvorna vanl.  $\frac{1}{2}$ —1 tum höga, med  $1\frac{1}{2}$  tum långa fr. skäft och smal, teml. lång kapsel. Bladen i torrt tillstånd vridna.

20 B. cyclophyllum Br. & Sch. stjelen längst ned och i bladvecken med rotludd, jemte de smala nyskotten utdragen, glesbladig; bladen konkava, rundade—elliptiska, rundtrubbiga, helbräddade, okantade, af lös cellväf, med nerven upphörande under spetsen; kapseln hängande, liten, päronlik, hopdragen under mynn. 24 6, 7. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.17.

Kärrkanter, r. (Sk. vid Näs mosse. Stockh. Lidköping bro: Orhem. Gestr. Oslättfors, vid Flyet. Helsl. Hemstanäs, vid den mindre sjön; Ångm. Örnköldsvik. VB. Skellefteå; Norsjö. Dal. Grycksbo, vid Grycken. Ner. Örebro, vid Lillån; samt vid Dylta station: C. Hn. — N. Svinbökjern vid Näs jernv.) Växer i lösa och mjuka, ljusgröna mattor, af 1—2 tum höga, ofta enkla stjekar, med glesa, i torrt tillst. vridna blad. Frukt sälls.

\*\*\* Bladen afven i torrt tillstånd tegellagda och tilltryckta, bredt äggrunda. Tvåbyggare.

21 B. argenteum L. stj. och nyskotten något utdragna, trinda och tätbladiga hvitglänsande, nedtill med rotludd; bladen konkava, bredt äggrunda, plöfsligt hopdragna [topphl. aflånga, småning. afsmalnande] till en smal, genomskinlig spets, med platta, helbräddade kanter och långt nedom spetsen försvinn. nerv; kapseln hängande, aflång—omv. ägsformig, slutl. hopdragen under mynn. med lågt konvext; n. uddlöst lock. 24 10—5. —  $\beta$  lanatum: rätt tufvad; bl. silfverhvita, med lång hårlig, utsperrad udd. Fig. Br.eur. Fl.D.860,f.1; 2381,f.2. Somf.Cr.exs.117. Lindgr.M.exs.71. R.Hn.Bryac.exs.226.

Jord, mur., tak etc. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Smål. Jönköping, vid Sanna enl. Scheutz. Stockh. Haga ruiner m. fl. st. Uppl. Uppsala slottsbacke.) Stjelken tillhopa med

nyskotten vanl.  $\frac{1}{2}$ , stund. 1 tum hög, med omkr.  $\frac{1}{2}$  tum höga fr.skaft. *Bildar ofta teml. stora, silfverhvita ell. hvitgröna, lösare ell. tätare tufoor.* —  $\beta$  *B. lanatum* Brid.

+++ *Cladodium* Sch. Stjelken öfverallt bladig; inre perist:s cilier släta [utan sidotaggar], ehuru i lederna knutigt vidgade, ofta mycket korta ell. glande.

\* Kapseln fullkomligt rak och regelbunden; inre perist. utan cilier ell. blott med ännen till sådana.

a — Blr 2könade och mångbyggare.

- 22 *B. pendulum* Sch. stjelken kort, med något utdragna, tätbladiga nyskott; bladen köladt konkava, smalt äggrunda, smalspetsiga med lång udd af den utlöpande nerven, helbräddade, i öfversta spetsen småsågade, med *tillbakavikna* kanter; *de flesta blirna 2könade*; kapseln *hängande*, med tydlig hals päronlik; locket *med lång udd*; perist:s inre hinna *skenbart utan både lånder och cilier.* 24 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D. 2613, f. 2. Lindgr. M. exs. 58.

Jord, mur. r. (*Sk.* Lund, på Kungsmarken; Broby sn, Tydinge; Hamnstr. ÖG. V. Ny; Egebyborna; Norrköping etc. *Södm.* Eskilstuna. *Stockh.* Ängml. Tisjö. *Lul.* Lpm. Puolaure; Nammats. *Herjed.* Stora Midtåkläppen; Flottasjell. *Verm.* Carlstad. *VG.* Kinnekulle. *Boh.* Marstrand, på Koön: O. G. Blomb. Öl.: Zett. *Gottl.* — N. Modum, vid Gravfossen. *Dovre.*) *Var. mycket till storleken; tufoorna vanl. halftumshöga, med knappt tumshöga fr.skaft; udden på locket märkbart längre än hos de flesta öfr. arter. Inre perist. så fastväxt vid det yttre, att dess lånder och cilier endast delvis blifva synliga.* — *Ptychostomum* Hornsch. *Br. cernuum* Br.eur.

- 23 *B. inclinatum* Bland. stjelken och nyskotten som hos föreg.; bladen *smalare än hos denna*, n. lancettlika, med udd af den *ullöp.* nerven, *starkt kantade*, upptill *glest tandade*; *blirna oftast 2könade*; kapseln långt skaftad, *nedböjd—hängande*, *smak päronlik*; locket *med låg, vridlik udd*; inre perist. med *långa, tydliga lånder*, omärkliga cilier. 24 5, 6. Fig. Br.eur. Sw. M. S. u. t. 5, f. 11. Lindgr. M. exs. 61.

Jord, murar. (*Sk.—Gestr.* Gelle; och *Verm.* Limkullen i Nordmarken. *Lul.* Lpm. vid Puolaure. Öl. Borgholm m. fl. st.: Zett. *Gottl.* vid Gotheimsån: Lindb. — N. Kongsberg. Sogn fjerest.: Wulfsb.) *Var. mycket. Stj. 2—3 lin.—nära tumshög; fr.skaftet vanl. 1—2 tum långt, någon gång kort. Skiljes säkrast från föreg. på det inre perist., hvars lånder äro långa och fria från de yttre.* — *Pohlia* Sw.

- 24 *B. Warneum* Bland. stjelken och nyskotten som hos föreg., *ofta med trådliska flaggeller*; bladen äggrundt lancettlika, spetsiga, i spetsen glest sågade, med *platta* kanter och i ell. under spetsen *försvinnande* nerv; oftast *sambbyggare*; kapseln långt skaftad, *hängande*, kort päronformig, med *smal* mynning och högt konvext, uddspetsigt lock; inre perist. *som hos föreg.* 24 6—9. Fig. Br.eur.

Fukt. st., stränd. r. (*Gottl.* vid Gotheimsåns utlopp: Lindb.) *Tufoorna knappt  $\frac{1}{2}$  tum höga, med 1—1 $\frac{1}{2}$  tum långa fr.skaft. Nära beslägtad med B. mamill.*

b — Blr alltid 2könade.

- 25 *B. lacustre* Bland. stjelken kort, jemte de något utdragna, vanl. smala, nyskotten, upptill tätbladig; bladen konkava, äggrunda, kort n. uddspetsiga, helbräddade, med *tillbakavikna* kanter och dels i spetsen *försvinnande*, dels utlöpande nerv; kapseln liten, nedböjd—hängande, af långt päronformig, med *uddspetsigt* lock, och inre perist. *som hos föreg.* 24 6—8. —  $\beta$  *alpinum* Sch. stjelken högre; bladen smalare; kapseln mindre, föga nedböjd, på kortare skaft. Fig. Br.eur. Lindgr. M. exs. 59.

Sand. str.,  $\beta$  i fjelltr. r. (*VG.* Rackeby sn, bortåt Peten, på Venerns strand. *Uppl.* Uppsala, Islandet *VB.* Haparanda. —  $\beta$  *Torn.* Lpm. Jukkasjärvi. *Lul.* Lpm. Qvikkjokk. Kaddepakte: Holmgr. *Pit.* Lpm. Tjiddjakk. *Um.* Lpm. Stuurware: Ångar. — N. Finnm. Talvig: Lor. Guledalen, vid gästg. Langedet. *Dovre.*) *Stjelken hos hufvudformen ell. par lin. hög, med dubb. så långa nyskott; fr.skaftet kortare ell. längre; kapseln jemförelsevis mycket liten, knappt en lin. lång, rödbrun, med trång mynning.*

## c — Sambyggare.

- 26 *B. calophyllum* R. Br. den korta stielken och de något utdragna nyskotten upptill tätbladiga; de nedre stielkbladen *rundadt*, topp- och nyskottibl. *bredt äggrunda*, alla starkt konkava, *trubbiga ell. med mycket kort trubbad spets*, helbräddade, med platta ell. tillbakavikna kanter, i ell. under spetsen försvinn. nerv, lös cellväf; kapseln hängande, *kort päronformig*, med trång mynning, lågt konvext, *vårtdränd lock*. 2½ 6—9. Fig. Br.eur.

Stränd. r. (VG. mellan Lidköping och lägenheten Klöfvet. — N. Trondhj., vid Lerfossen: Holmgr.) *Med nyskotten omkr. halftumshög, i lösa tufvor ell. spridd; fr.skaftet tumshögt, rödt. Hanbln vid honblns bas. Utmärkt från de föreg. genom de breda och trubbiga, löst tegellagda bladen och deras lösa, Mniumlika cellväf. — B. latifolium Br.eur.*

- 27 *B. Marratii* Wils. stielken och de tjocka, n. *knopplika* nyskotten mycket korta, tätbladiga; bladen mycket konkava, *af långa*, trubbiga helbräddade, med platta kanter och under spetsen försvinn. nerv, lös cellväf; kapseln nedböjd—hängande, från en kort hals n. *klotrund*, med trång mynn. och *långt uddspetsigt lock*; det inre perist. *fastväxt* vid det yttre. 2½ 9. Fig. Br.eur.

Sand. stränd. r. (Öl. Borgholm enl. Zett. M. Oel. Götll. vid Gothenmsån; mell. Boge vik och Tjällders vik; vid Kittelviken i Sundre sn: Lindb.; vid Fogelviken, samt Fårön, vid Märrsholm: Cleve enl. Lindb. i M.nov.scand.) *Stielken och nyskotten tillhoppa blott 3—4 lin. höga, gulgröna, väx. spridda ell. löst tufvade. Hanbln i spetsen af ett nyskott. Bladens cellväf som hos föreg. Fruktskaflet tumshögt, fint; mest utmärkt af fruktens form och lockets n. spröliga udd. Fr. dock icke ännu funnen på Sc. ex.*

- 28 *B. mamillatum* Lindb. stielken teml. kort, med *kort klubblika*, upptill tätbladiga nyskott; bladen starkt konkava, n. *elliptiska, kortspetsade, kantade* och med *nedom midten tillbakavikna*, mot spetsen småsågade, kanter, tjock, under spetsen försvinn. ell. i en kort, glest sågad udd utlöp. nerv, lös cellväf; kapseln hängande, *kort päronlik*, med trång mynning och n. *platt*, vårtdränd lock; inre perist. *frött*. 2½ 7. Fig.

Sand. str. r. (Södm. Dalarön: Holmgr. Götll. vid Gothenmsån; samt hafsstr. vid Fogelvik och Othem: Cleve enl. Lindb.) *Bildar låta, halftumshöga tufvor, upptill brungröna af 1—2 lin. långa nyskott, bladen teml. stora, Mniumlika, torra hopvridda; fr.skaftet på Götll. ex. knappt tumshögt, tjockt, på ex. från Dalarö 1½—2 tum; kaps. gulgrön, mycket tjock.*

(*B. Brownii.*)

\*\* Kapseln tydligt sned [hos *B. Brownii* ofta regelb.]; inre perist. meränd. med tydliga [undant. *B. uliginos.*] cilier.

## a — Tvåbyggare.

- \*29 *B. oeneum* Blytt: stielken och nyskotten *utdragna*, föga tätbladiga; bladen utstående, äggrundt lancettlika, spetsiga, kantade, helbräddade, med *starkt tillbakavikna* kanter och kort udd af den utlöp. nerven; kapseln n. *hängande*, utdraget päronlik, något krökt, med trång mynn. och högt konvext, trubbadt lock. 2½ 7. Fig. Br.eur. V.Ak. H.1846,t.9. R.Hn.Bryac.exs.225.

Torff., fukt. klipp. i fjellr. r. (N. Nordl. Bodö: Holmgr. Dovre, mell. Fogstuen och Jerking; flerst. kring Kongsvold. Torffeld (?) enl. C. Müll.) *Med nyskotten 1—2 tum hög, lått tufvad, spensig och spröd, kopparröd; bladens kanter och nerv röda; fr.skaften föga öfvernående nyskotten; inre perist. fasthängande vid det yttre. — B. rutilans C. Müll.*

## b — Sambyggare.

- 30 *B. uliginosum* Br. & Sch. stielken och de tätbladiga nyskotten *teml. korta*; bladen utstående, smalt äggrundt lancettlika, smalspetsiga, med udd af den utlöpande nerven, *kantade*, med tillbakavikna, mot spetsen trubbsågade kanter; kapseln långt skafstad och med *lång smal* hals, slutl. hängande, utdraget päronlik, något krökt, med *litet, vårtspetsadt lock*. 2½ 7.8. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.62. R.Hn.Bryac.exs.320. Kärr, fukt. jord, r. (Sk. Broby. VG. Hunneberg; Kinnekulle, vid byn Örnekulla. ÖG. Vinnerstad; Lemunda; Norrköping. Södm. Dalarö: Holmgr. Stockh. Nacka; Drottning-



holm; Haga ruiner. *Uppl.* Eckerön; Uppsala flerst.; Örbyhus: Ångstr. *Gestr.* Gefle, vid Holmsund: R. Hn. *Göthl.* Vibble. — *N.* Dovre, på Finnsbøe.) *Stjelken med nyskotten från ett par lin. till mer än halftumshög; fr.skaftet omkr. 1½ t. högt, med lång gulbrun kapsel. Habituet lik B. inclin., till kaps. icke olik B. pallens.*

- 31 *B. Brownii* Br. & Sch. *stjelken och nyskotten utdragna, upptill tätbladiga; bladen som hos föreg., med lång, hårlig udd af den utlöp. nerven, icke kantade, men med tillbakavikna kanter; kapseln långt skaftad, hängande, från en otydlig hals aflångt päronlik, ofta regelbunden, med vidt, högt konvext—n. koniskt, uddspetsigt lock. 2½ 6, 7. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1846.t.8.*

Torfjord i fjelltr. r. (*Um. Lpm.* Stuurware enl. uppg. af Ångstr. — *N.* Nordl. Bodö: Holmgr. Dovre, vid Fogstuen och Jerkind.) *Tall tufvad och rotträdig, ljusgrön, med talrika, nära tumshöga nyskott; fr.skaftet omkr. tumslångt. Inre perist. med långa cilier. — Pohlia bryoides R. Br.*

c — Blr 2kånade.

- 32 *B. purpurascens* Br. & Sch. *stjelken och nyskotten utdragna, smala, något glesbladiga; bladen äggrundt lancettlika, spetsade, med kort udd af den utlöpande nerven, smalkantade, helbräddade; kapseln nedböjd ell. hängande, med lång hals, utdraget päronlik, knappt krökt, med lågt, värtribrande lock. 2½ 6, 7. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1846.t.7.*

Fukt. st. i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* vid Puolaure. *Pit. Lpm.* Peljekaisse. *Herjed.* Stora Midtåklappen: Oldb.; vid Tvärån i öfre Ljusnadal. *Dal.* vid Idre kapell. — *N.* Lom, Visdal. *Dovre.* vid Kongsvold, Jerkind och Fogstuen.) *Tufvad och stor som föreg., rödaktig, med kapseln mynn. och lock vidare än hos följ. Inre perist. n. frill. — Pohlia R. Br.*

- 33 *B. arcticum* Br. & Sch. *stjelken och nyskotten korta, upptill tätbladiga; bladen n. aflånga, spetsiga, med lång udd af den utlöp. nerven, bredt rödkantade, med tillbakavikna, helbräddade kanter; kapseln hängande, med lång hals, utdraget päronlik, något krökt, med trång mynn. och litet, uddspetsigt lock. 2½ 6, 7. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1846.t.6. Lindgr.M.exs.60. R.Hn.Bryac.exs.286.*

Fukt. jord, helst i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* allm.: Holmgr. *Pit. Lpm.* Wallåive. *Jemtl.* Snasahögen. *Herjed.* Skarffjellet: St. Midtåklappen. *Gestr.* Gefle. *Stockh.* Sundsta. *V.G.* Lidköping. — *N.* Trondhj. st. Mostamarken. *Dovre.* Tellemarken, på Bleesfeld. *Kongsberg.*) *Tufvad, knappt halftumshög, med tumshögt fr.skaft; nyskotten smala.*

## 60. WEBERA Hedw.

† *Webera* Sch. Kapseln nedböjd ell. hängande, vänl. med kort hals och päronlik; inre perist. med tydliga, utdragna cilier [und. *W. cucullata*].

\* Tvåbyggare.

- 1 *W. albicans* Sch. *stjelken och nyskotten utdragna glesbladiga; de nedre bladen äggrunda, spetsiga, de öfre aflångt lancettlika, kort- och bredspetsade, alla platta, upptill finsågade, med under spetsen upphör. nerv, och lös cellväf; hanblurna stora skifell. stjernlika; kapseln långt skaftad, n. hängande, rundadt päronformig. 2½ 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.166.*

Fukt. sandjord, r. (*Sk.* mell. Lackalänge och Valkärra. *Smdl.* Algutsboda; samt Vester-vik: Scheutz; Taberg och Husvarna: Zett. *ÖG.* Marmorbruket: Mosén. *Ner.* Skoga-holmstrakten flerst. m. fr.: C. Hn. *Stockh.* Lidingöbro; Marieberg etc. *Uppl.* Uppsala; Harg's bruk. *Gestr.* Märtsbo by. *Helsl.* Bollnäs: Oldb. *Dal.* Idre. *Herjed.* *Jemtl.* Östersund: Holmgr.; Åreskutan. *Ängml.* Sollefteå. *Um. Lpm.* Stuurware och Gitsfjellen: Ångstr. *Lul. Lpm.* Njuonjes: Holmgr.; Skjella-Puolta: H. Widm. *Öl.* Tveta och Böda: Zett. — *N.* Christiania—Finnm. Tromsö; Maalselvdalen: Holmgr.) *Stjelken oftast enkel, ½—2 tum hög; hanblurna i spetsen af egna stjelkar, ofta talrika. Löst tufvad och utmärkt af sin blekt blågröna färg och alla delars mjukhet. Kapseln liten, före mogn. blåaktigt grön, stull. brungul. I fjelltr. är hela växten mycket större, i svällande tufvor, med bredare, konkava blad: β glacialis Sch. — Mnium Wg. Bryum Wahlenbergii Sw., Br.eur och ed.9. Lamprophyllum Lindb., liksom alla de öfriga.*

- 2 *W. carnea* Sch. *stjelken och nyskotten korta, tätbladiga; bladen lancettlika, toppbl.*

längre och smalare, småningom spetsade, mot spetsen sågade, med *platta* kanter och under spetsen upphör. nerv, genomskinliga af den *mycket lösa* cellväfven; *handblirna små*; kapseln på *tjockt* skaft, n. hängande, *af långt* päronformig, med högt konvext lock och slutl. *mörkrödt* yttre peristom. 24 5, 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.15.

Sand. lerbjör, r. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl. Salten.) *Spridd ell. löst tufvad med oflast enkel 2—5 lin. hög stielk, omkr. halfstumhögt fr.skaft, samt söga mer än ½ lin. lång kapsel. Nära beslagtd med sölj., men lått skild med bladens lösare cellväf och platta kanter, samt peristomets färg. — Bryum L. och ed.9. B. atropurp. Wg. i WM. Ind. musc. enl. Lindb.*

3 *W. pulchella* Sch. stj. och nysk. *som hos föreg.*; bladen med till midten tillbakavikna kanter, af *lätare* cellväf, knappt genomskinnl., för öfr. *som hos föreg.*; handblirna *små*, på grenig stielk; kapseln på *fin*t skaft, n. hängande, *rundadt* päronformig, med lågt konvext lock och *gult* yttre peristom. 24 6, 7. Fig. Br.eur.

Sandjord, r. (Sk.—Jemtl. Åreskutan. Ångml. Hernösand och Örnsköldsvik; samt VB. Umeå: Holmgr.; Ratan; Skellefteå; Luleå. *Lul. Lpm.* mell. Storbacken och Jokkmokk: Holmgr. — N. Nordl. Salten.) *Stor som föreg., men spädare och mer glänsande, spridd ell. löst tufvad; bladcellerna med ungefär samma längd halfsten smalare; kaps. n. klotrund, svartbrun. — Bryum H. och ed.9.*

4 *W. Ludwigii* Sch. stielken *uppsstigande*, vanl. *utdragen* [hos  $\beta$  kort], enkel ell. med ett ensamt, *utdraget* nyskott under spetsen; *de nedre bl. åggrunda*, de öfre allt längre och smalare, *toppbl. jemnbredt lancettlika*, alla trubade ell. kortspetsade, i spetsen naggsågade, med *högt upp tillbakavikna* kanter och under spetsen försvinn. nerv; kapseln på *nedtill knåböjadt, fint* skaft, nedböjd—hängande, *utdraget* päronlik, krökt, med uddspetsigt lock, *ljusgult* yttre peristom. 24 7, 8. —  $\beta$  *gracile*: späd och lågväxt; bl. smalare, tilltryckta; kaps. kortare. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.13 [a &  $\beta$ .]

Fukt. st. i fjelltr. (*Lul. Lpm.* flerst. *Pit. Lpm.* Tjiddjakk. *Um. Lpm.* Mars- och Gitsjellen, samt Stuurware: Ångstr. *Herjed.* — N. Finn. Maalselvdalen; samt Trondhj. st. Aalesund: Holmgr. Dovre, på Stor- och Finnhöe. Tellem. Bleefjeld. Bergen st., flerst. i Sogn: Wulfsb.; Gråsidan på Voss; Folgefonden. —  $\beta$  Torn. *Lpm.* Kedkesuando. *Lul. Lpm.* mell. Qvikktjokk och Njuonjes på öar och stränder: Hgn. *Pit. Lpm.* Peljekaisse. *Jemtl. Skaltugan; Åreskutan. Herjed.* — N. Nordl. Sulitälma: Lor., samt Salten—Goustafeld.) *Stielkarne ½—2 tum långa, något spensliga och glesbladiga, i låta höggroña tufvor; fr.skaftet purpurrodt;  $\beta$  n. trådsml. — Bryum Spreng. och ed.9. B. boreale Somf.*

5 *W. annotina* Schwaegr. stielken och nyskotten *upprätta, något utdragna*, de sterila stielkarne *långt utdragna*, smala, *glesbladiga, med knoppar i bladvecken*; bladen från bredare bas *lancettlika*—n. jemnbreda, spetsade, för öfr. *som hos föreg.*; kapseln på *rakt, styft* skaft, nedböjd—hängande, *utdraget* päronlik ell. n. klubblik, slutl. under mynn. hopdragen, med *uddspetsigt* lock och *brandgult* yttre peristom. 24 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.215; 2613,fl. R.Hn.Bryac.exs.14.

Fukt. sandjord. (Sk.—Lpl. — N.) *Ljusgrön, löst tufvad, med omkr. tumshöga ell. högre, sterila stielkar, små purpurroda knopplika bulblir i bladvecken, tumslånga blekröda fr.skaft och mycket liten, slutl. gulröd kapsel. Sälls. med frukt. — Bryum H. och ed.9.*

\*6 *W. Schimperi* Sch. stielken och nyskotten *upprätta, smala och utdragna*, upptill tätbladiga; bladen upprätta, de öfre n. *tegellagda, smalare*, från bredare bas lancettlika, småningom spetsade, i spetsen *omärkligt* naggade, med *platta* kanter och n. utlöpande nerv, af *tät* cellväf; kapseln på *rakt* skaft, slutl. hängande, *af långt* päronlik, med lågt konvext, *vårtbärande* lock och *blekgult* yttre perist. 24 7, 8. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1846,t.10.

Fukt. st. i fjelltr. r. (N. Dovre, vid Jerkind. Jättasfeld.) *Stielken med nyskotten omkr. tumshög, i låta, rödaktiga tufvor, endast de yngsta bladen gröna, alla de öfr. röda; kapseln en lin. lång, med inre perist:s cilier knutiga. Mest beslagtd med sölj. — Bryum C. Müll. och ed.9. B. rutilans Br.eur.*

\*\* Sambyggare, med antheridier i toppbladvecken vid honblirnas bas; säll. tillika 2bygg.

7 *W. nulan* H. stielken och nyskotten vanl. *utdragna, endast upptill tätbladiga*; de nedre bladen kortare och bredare, *åggrundt lancettlika*, toppbl. mycket längre, *jemn-*

*bredd lancettlika*, spetsade, i spetsen sågade, med platta kanter och i spetsen försvinn. nerv, alla *glänsande*; kapseln nedböjd—hängande, aflång—omv. äggformig, med *högt konvext, uddspetsigt* lock; yttre perist. tänder rödbruna, i spetsen bleka, det inre med *långa* cilier. 2. 6—8. — *β sphagnicola* (Br. & Sch.) stj. och nyskott smala utdragna; oftast 2byggare. Fig. Br.eur. Fl.D.1423,f.2. Lindgr.M.exs.63. R.Hn.Bryac. exs.167. *β* Br.eur.

Kärr, skog., berg etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) *I hög grad varierande efter olika lokal, än spridd ell. tufvad, än med 3—4 lin., stund. mer än tumshög stjelk, 1—3 tum långt fr-skafst o. s. v. Antheridierna hos denna och följ. art sitta mellan toppbladen så nära omkr. fr-skafstets bas, att blrna n. synas 2könade: detta är hvad Lindb. kallar parokt blomning. — Bryum Schreb. och ed.9. β, som vanl. är rödaktig till färgen, utgör en medelform till föreg., men skiljes af Sch. såsom egen art: Web. Sphagnicola.*

8 *W. cucullata* Sch. stjelen och de n. trådsmla nyskotten något utdragna, tätbladiga; de nedre bladen konkava, korta, *aggrunda, trubdade*, helbräddade, de öfre från *breddare bas lancettlika*, spetsade, med ojemnt sågad, ofta *hufstikt hopdragen* spets, alla med platta kanter och under spetsen försvinn. nerv, *glänslösa*; kapseln hängande, päronlik, med *lågt konvext, vårtbärande* lock; yttre perist. tänder smala, *gulaktiga*, det inres cilier korta, *smart försvinnande*. 2. 6—8. Fig. Br.eur. Fl.D. 2683. Rab.Bryoth.442.

Fukt, jord i fjelltr. (Torn. Lpm. Keitotsorro vid Naimakka. *Lul. Lpm. Qvikkjokk: Wuoka; samt Tåresåive; Holmgr. Pit. Lpm. Walläive; Adolfsström. Jemtl. Snasahögen; Åreskutan enl. Ångstr. Herjed. Helagsjellen; Malmagen; Skarfjellet: Oldb. Ångml. Hernösand: Holmgr. — N. Finnm. Hammerfest—Norsjellet i Buskeruds amt.) Tätt tufvad, grön och mjuk; stjelen blott 3—4 lin. hög, med tegellagda, inböjda, mest trubdade blad; nyskotten smala, 3—6 lin. långa. — Bryum Schwægr. och ed.9.*

†† Kapseln lutande ell. horisontal [högst sällan nedböjd], med kort hals, cylindrisk; inre perist. med tydliga, utdragna cilier.

9 *W. cruda* Sch. tvåbyggare ell. med 2könade blr; stjelen oftast enkel, *utdragen*, uppåt mer tät- och storbladig; de nedre bladen helbräddade, äggrundt, toppbl. smak lancettlika, n. *utsperrade*, i spetsen glest sågade, *alla starkt glänsande*, spetsiga, med under spetsen försvinn. nerv; kapseln *cylindrisk—n. klubblik*, med lågt vårtbärande lock och blekgult yttre peristom. 2. 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.2682. Somf. Cr.exs.26. Lindgr.M.exs.13. R.Hn.Bryac.exs.163.

Bergspring., jordhålor etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Löst tufvad, utmärkt för sin glans; stjelen ofta tumshög ell. högre; bladen ljusgröna ell. blågröna; kapseln omkr. 2 lin. lång, varierar n. upprätt, cylindrisk; β minor Sch.; samt någongång kort päronlik: γ subglobosa Sch. — Bryum Schreb. och ed.9.*

††† *Pohlia* Sch. Kapseln lutande ell. horisontal, med lång hals, oftast cylindrisk ell. klubblik; inre perist. utan cilier ell. endast med ämnen dertill: sambyggare.

\* Antheridierna i bladvecken vid honblrnas bas, utan eget perigonium.

10 *W. longicollis* H. stjelen enkel, *utdragen*, tätbladig; bladen uppåt tilltagande i längd, *alla upprätta*, starkt glänsande, lancettlika—n. jemnbreda, spetsiga, mot spetsen sågade, med upp till midten tillbakavikna kanter och i spetsen försvinn. nerv; kapseln oval, *af halsens längd*, med högt konvext, uddspetsigt lock, gult yttre peristom. 2. 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.1424,f.1. Sw.M.Su.t.6,f.13. R.Hn.Bryac.exs.164.

Fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* allm. i skogsregionen: Holmgr. *Pit. Lpm. Käksa; Tjidiyakk. Um. Lpm. Stoorware. Jemtl. Snasahögen; Åreskutan. Herjed. Dal. VB. nära Kihlangi vid Muonio-elf. Ångml. Tåsjö. — N.) Växer i stora, 1—2 tum höga, fasta och guldgänsande tufvor. Habituell lik föreg., men mer beslägtad med följ. — Bryum Sw. och ed.9. *B. elongat. β alpinum Br.eur.**

11 *W. elongata Schwægr.* stjelen och nyskotten korta, uppåttill tätbladiga; bladen som hos föreg.; kapseln kortare än den långa halsen och föga vidare, med koniskt, uddell. sprötspetsigt lock. 2. 9, 10. Fig. Br.eur. Fl.D.1470; 2380,f.1.R.Hn.Bryac.exs.376. Skugg. st., berg. r. (Sk. Kullaberg. Smål. Vexiötrakten. ÖG. Motala sn, Lemunda.

VG. Göteborg, Gunneboskogen. Dal. Malung, vid Fors. Herjed. Funnedsalsberget. Lul. Lpm. Kaddepakke: Holmgr. — N. Vestfjorddalen, Rollaug. Bergen st., mell. Bergen och Hauge; Sogn flerst. enl. Wulfsb.; Oldendalen; Aalesund: Holmgr. Finnm. Maalselvdaalen: Holmgr.) Växer spridd ell. gruppvis; stjelen vanl. blott ett par lin. hög; fr.skaftet 1—2 tum; kaps. stult. n. upprät. Hufvudsakl. skild från föreg. med värisätet, den korta stjelen och smala kapseln. — Bryum Dicks. och ed.9

- 12 *W. polymorpha* Sch. stjelen vanl. enkel, stund. med nyskott, kort, endast upptill tätbladig; toppbladen aflångt lancettlika, spetsiga, i spetsen sågade, med nedtill tillbakavikna kanter och i spetsen försvinn. nerv; kapseln längre än sin hals, aflång, med lågt koniskt, trubbadt lock; inre perist. utan spår till cilier. 24 8, 9. Fig. Br. eur. R.Hn.Bryac.exs.165.

Fjelltr. r. (Lul. Lpm. Qvikkjokk. Um. Lpm. Laxfjellet och Stuorware: Ångstr. Jemtl. Snasahögen. Herjed. Ösjöklappen; Haftorstöten. — N. Dovre, vid Drivstuen och Vårstien; på Finnsbø. Bergen st. Sogn, Vettisgjælet: Wulfsb. Nära Mariestuen.) I högsta grad varierande. Hos oss är stjelen vanl. ett par lin. och fr.skaftet 5—8 lin. högt; en del ull. ex. mycket större. Växer i lösa tuvor ell. gruppvis. Kaps. var. i Jemtl. och på Dovre kort, påron'ormig: var. *brachycarpa* Br.eur. — Bryum ed.9.

\*\* Hanblrna med särskilda perigonalblad, knopplika.

- 13 *W. acuminata* Sch. stjelen med ell. utan nyskott, kort ell. utdragen, endast upptill tätbladig; toppbladen aflångt lancettlika, spetsiga, mot spetsen sågade, med nedtill tillbakavikna kanter och i spetsen försvinn. nerv; kapseln med den långa halsen smalt klubblik, med koniskt udd- ell. kort sprötspetsadt lock; inre perist. utan cilier. 24 7, 8. —  $\beta$  *tenella*: stj. utdragen, med talrika nyskott; kaps. liten, på kort krökt skaft. —  $\gamma$  *arcuata*: stj. spåd, enkel; fr.skaftet omböjdt n. från midten. Fig. Br.eur.

Fjelltr. r. (Lul. Lpm. Sähkok; Næmmats vid Qvikkjokk, samt Wuoka: Holmgr. Pit. Lpm. Svarthøget vid Hornafvan. Jemtl. Snasahögen, vid Handölsforsen. Herjed. — N. Finnm. Maalselvdaalen, vid Hvassbrun: Holmgr. Trondhj. st. Suul, vid Kongstuen. Dovre, vid Vårstien.) Mest lik *W. elongata* till habitus, men meränd. liten som föreg.; kaps. kortare, stult. mer horisontal. Skiljes bäst på de knopplika hanblrna. — Bryum Br. & Sch. och ed.9.

## 61. LEPTOBRYUM Schimp.

- 1 *L. pyriforme* Sch. stjelen n. enkel, något utdragen, endast upptill tätbladig; toppbladen utböjda, glänsande, från lancettlik bas utdraget sylfika, med borstlik tandad udd af den breda ullp. nerven; kapseln hängande, med lång och smal hals påronlik; locket högt konvext, värtbärande. 24 5, 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.106.

Mur., sand- och torfjord. (Sk.—Lpl. — N.) Löst tufvad, vanl. lifligt grön, med 2—5 lin. hög stielk, och 1—1½ t. högt och fint fr.skaft, liten, glänsande rödbrun kapsel. Igenkänlig från alla Brya på de långa, hårfinna toppbladen; de nedre bl. små och glesa, fjälllika. — Mnium L. Bryum H. och ed.9.

## 24 Flocken Pleurobryes.

### 62. MELICHOFFERIA Hornsch.

- 1 *M. nitida* Hornsch. tvåbyggare; stjelen fast tufvade, jemntoppadt greniga, tagel-smala, tätbladiga; bladen ågrundt lancettlika, spetsade, mot spetsen sågade, med bred, under spetsen försvinn. nerv; kapseln n. upprät, från en tydlig hals påronlik, med lågt koniskt lock. 24 8, 9. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.285.

Skifferberg, helst i fjelltr. r. (Lul. Lpm. Qvikkjokk, Storholmen: Holmgr. VG. Hunneberg, i branterna mot Nygård. — N. Dovre, vid Vårstien, samt Skåp- och Sprenbäckarne m. fr. Gudbrandsd. Elstad i Ringeboe m. fr.: Berggr. Vang i Valdres, på Bergsfjeld. Goustafjeld. Vid Mjösen.) Tufvorna från ½ till 1½ tum höga, tätta, upptill gröna ell. blågröna, nedtill bruna ell. gula; fr.skaftet 2—4 lin. högt. Frukt ganska sälls. Var. till färg och storlek efter olika lokaler. — Weisia Funck. *W. zonata* ed.4.

## M. — FUNARIACEÆ.

25 Flocken *Physcomitriaceæ*.

## 63. FUNARIA Schreb.

† Kapseln snedt päronlik, med dubbelt peristom.

\* Kapseln refflad, med bred ring.

- 1 *F. hygrometrica* Sibth. bladen konkava, äggrundt aflånga, kortspetsiga, helbräddade, med i spetsen upphörande nerv; kapseln på långt, vridet och flerkrokt skaft, slutl. n. hängande, med lågt konvext, trubbigt lock, spiralvridet peristom. ☉ 4—10. Fig. Br.eur. Sv.B.228. Fl.D.648,f.2. Thed.M.exs.113. R.Hn.Bryac.exs.104.

Diken, svedjeland etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Spridd ell. tufvad, med 2—4 lin. hög stjekk, som i spetsen bär de stora, n. knoppiskt hopslutna bladen och det vanl. 1—2 tum höga fr.skaftet; kapseln stor, rödbrun. Var. på sand. ställen mycket liten, med kort, rakt fr.skaft, och otydl. refflad kapsel: β nana ed.9. — Mniur L.*

\*\* Kapseln slät, utan ring.

- 2 *F. calcarea* Wg. (icke Sch.) bladen smalt äggrunda ell. aflångt lancettlika, småningom afsmaln. i en smal och utdragen spets, upptill hvasst sågade, med under spetsen upphörande nerv; kapseln på n. rakt skaft, upprätt ell. lutande, med n. koniskt lock och spiralvridet peristom. ☉ 5,6. Fig. Br.eur. [F. hibernica]. V.Ak.H.1806,1,4,f.2. R.Hn.Bryac.exs.319.

Sandig kalkjord, r. (Öl. Köpings branter: Zett. Gottl. Stora och Lilla Carlsö: Klinta-backe: Eitelhem sn. klipp. vid Tenglingsmyr; Visby: Holmgr.; Fårön, vid Gåsmora.) *Växer gruppvis ell. löst tufvad; stj. 1—2 lin. hög, fr.skaftet omkr. ½ tum, kapseln jemförelsevis stor. — F. Mühlenbergii ed.7. F. hibernica Hook. och Sch. Syn. — Anm. F. Mühlenb. Br.eur., ell. F. mediterranea Lindb., som Sch. i Syn. anser vara den rätta F. calc., skiljer sig med n. omv. äggr., tvärt spetsade, otydl. trubbnagade bl.*

†† *Entosthodon* (Schwægr.) \*. Kapseln regelbunden, med otydligt, enkek ell. intet peristom.

- 3 *F. fascicularis* Sch. bladen utstående, smalt ovala, spetsiga, ofvan midten hvasst sågade, okantade, med under spetsen upphörande nerv; kapseln upprätt ell. något lutande, päronlik, med smal mynning, och otydliga spår till tänder, utan ring; locket plattadt konvext, med i spiral ordnade celler. ☉ 5,6. Fig. Br.eur. Fl.D.2064,f.2. Rab.Bryoth.353.

Jord i trädg., diken etc. r. (Sk. i Knästorp; vid Vidarp och vid Årup.) *Växer gruppvis; hela mossan omkr. ½ tum hög, med teml. stor, brun ell. brungul kapsel, lik smärre ex. af Physcomitr. pyriforme, men lätt skiljd med den stora, ensidiga mössan och locket, som saknar spröl. — Gymnostomum H. Physcomitrium Brid. och ed.9.*

- 4 *F. Ahnfeltii* (Fr.) bladen upprätta, n. tegellagda, aflångt lancettlika, spetsiga, svagt och glest tandade, bredt gulkantade ända upp till spetsen, med stark, i spetsen försvinn. nerv; kaps. upprätt, päronlik med slutl. vidgad mynn., utan peristom och ring; locket lågt konvext, med radielika cellrader. ☉ 5,6. Fig. Br.eur. Fl.D.2687,f.1.

Jord, r. (Smål. Femsjö, Håknasjöns vestra torfläcka strand. VG. mellan Degeberz och Stola vid Marskalkstorpel.) *Till växtsättet lik föreg., men ännu mindre, med röd kapsel. Gymnostomum Fr. i Nov. Physcomitrium ed.9. — Utl. ex. af Ph. ericetorum Br.eur. (Entosthodon Sch. Syn. Funaria obtusa Lindb.), hvaraf den svenska formen anses som en variation, skilja sig med bredare blad, smalare kant och kortare nerv.*

\*) I sin *Manip. Muscor. primus* p. 56 och följ. har Lindb. tydligen visat, att, om alla arter af *Fun.* och *Entosth.* sammanställas, ingen gräns emellan dessa släkten gifves, ehuru om endast de fåtaliga skand. arterna tagas i betraktande, de begge släktena tyckas rätt väl begränsade.

64. *PHYSCOMITRIUM* Brid.

- 1 *P. pyriforme* Brid. bladen vanl. utstående, bredt tunglikt lancettlika, spetsiga, ofvan midten sågade, med under spetsen upphör. nerv; kapseln päronlik, slutt. hopdragen under mynn., med konvext, kort trubbsprötadt lock. ☉ 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D. 537, f. 1. Lindgr. M.exs. 49. R.Hn.Bryac. exs. 105.
- Jord, diken etc. (Sk.—Gestr. Ner. och Verml. Hall. Varberg: Scheutz. — N.) *Gruppvis växande ell. tufvad, med fr.skaftet knappt tumshög; kapseln jemförelsevis stor, rödbrun.* — *Bryum L. Gymnostomum H.*

65. *PYRAMIDULA* Brid.

- 1 *P. tetragona* Brid. bladen konkava, äggrundt ovala, med lång syllik spets och deri försvinnande nerv, helbräddade; kapseln kort skaftad, upprät, päronlik, med konvext, kort trubbsprötadt lock. ☉ 4, 5. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac. exs. 12.
- Trädesåkr. r. (Uppl. Uppsala, flerest, bortåt Lassby backar och Rickomberga. Stockh. Örby i Brännkyrka sn. Smål. Odensvi.) *Hela mossan blott 2—4 lin. hög, väx. spridd ell. gruppvis; toppbl. teml. stora knopplikt samlade; hanbln vid stjelnens bas. Mest utmärkt af den stora 4sidiga mössan.* — *Gymnost. Schwægr. Physcomitr. Br.eur.*

26 Flocken *Disceliæ*.66. *DISCELIUM* Brid.

- 1 *D. nudum* Brid. stjelen ytterst kort, n. omärklig, utgående från den qvarsittande förgrödden; bladen knopplikt samlade, äggrundt aflånga, spetsade—trubbade, helbräddade, nervlösa; kaps. långt skaftad, horisontal, rundadt äggformig, med bred ring och lågt koniskt lock. ☉ 4, 5. Fig. Br.eur. Wg. Fl.L.t. 19. R.Hn.Bryac. exs. 347.
- Lerjord vid stränd. r. (VB. vid Tornioelf. Angml. Medelp. Sättna. Uppl. Husby-långh. sn. Stenby tegelbruk. Dal. Sättersdalen. Verml. Filipstad, vid Storbrohytan; Uddeholm; vid Klarelfven i Eksbärad. — N. Finnm. Trondhjem: Schleg. & Arn. Christiania.) *Stjelen knappt  $\frac{1}{2}$  lin. hög, fr.skaftet omkr. 6—8 lin. högt, slutt. rött; mössan ofta qvarsittande vid skaftets öfre ända.* — *Bryum Dicks. Weisia Hook. W. rosea Wg.*

N. — *SPLACHNACEÆ*.27 Flocken *Splachnæ*.67. *SPLACHNUM* Linn.

† Kapseln märkbart—flere gånger smalare än sitt bihang, som alltid har annan färg än kapseln.

\* Bihangt skärm- ell. sköldlikt; tvåbyggare.

- 1 *S. luteum* L. bladen n. ovala—bredt lancettlika, långt smalspetsiga, helbräddade ell. sård. mot spetsen småsågade, med i spets. försvinn. nerv; kapseln bihang mycket stort, gult, cirkelrundt, konvext, slutt. plattadt; perist. gult. ☉ 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D. 1359. Lindgr. M.exs. 24. R.Hn.Bryac. exs. 131.
- Fjellmyrar, skogskärr, r. (Lpl. och VB. — Gestr. Dal. och Verml. Vestml. Loka. VG. Djursåtra i Versås sn: Wahlst. Smål. Nottebäck; Båldö i Dädesjö sn: Scheutz. — N. Finnm.—Skydsmoe nära Christiania.) *Löst tufvad; stj. omkring  $\frac{1}{2}$  tum hög, med stora blad; fr.skaftet 3—6 tum högt; kapseln bihang i början n. flasklikt, slutt. platt, med omkr.  $\frac{1}{2}$  tums diam. Hanstånden små, späda, med knopp- ell. n. stjernlik blomma i toppen.*
- 2 *S. rubrum* L. bladen som hos föreg., men n. ända till basen starkt sågade; kapseln bihang stort, mörkt purpurrött, halfklotformigt, aldrig plattadt; perist. brandgult. ☉ 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D. 1358. Sv.B. 647. R.Hn.Bryac. exs. 130.
- Fjellmyr., kärr, r. (Lul. Lpm. och VB. — Gestr. Dal. och Verml. Södml. Marieberg i Grödinge; Virå bruk; Ö. Vingåker i Dalaskogen. Vestml. Odensvi: Sill.; Frösåker.

*Ner.* Markkärret nära Örebro: Stud. M. T. Perzonn; Skogaholm flerst.: C. Hn. *VG.* nära Djursåtra i Versås: Wahlst. — *N.* ned till Oudalen och Skydsmoë.) *Till värt-sätt och storlek lik föreg.*

\*\* Bihanget päronlikt, afsmaln. nedåt; sam- och tvåbyggare.

- 3 *S. ampullaceum* L. de nedre bladen n. lancettlika, de öfre omv. äggrunda—spadlika, hastigt långt smalspetsade, *groft*, n. *flikigt* tandade särd. upptill, med i spetsen försvinn. nerv; bihanget med *långt utdragen smal bas*, yngre ljusst rödgult, slutt. n. rött; perist. gult. ☉ 7. Fig. Br.eur. Fl.D.822. R.Hn.Bryac.exs.44.

Kärr. (Sk. och Blek.—Helsl. Dal. och Verm. Ångml. Nora sn. VB. Umeå sn, Koddis. Öl. Melböda: Lindb. Götth. — N.) *Bildar stora, lösa, lifligt gröna tufvor, af tumshöga stjelkar och nysskott, med vanl. talrika hanbl; fr.skaftet 1½—2 tum högt, bih. omkr. 3 lin. långt, öfverst 1½ lin. i diam.*

\*\*\* Bihanget klotrundt, slutt. svartrött; tvåbyggare.

- 4 *S. vasculosum* L. de nedre bladen rundade, de öfre breda omv. äggrunda—äggrunda, alla *trubbiga* ell. med kort trubbad spets, *helbräddade*, med under spetsen upphörande nerv; bihanget *flere gånger* vidare än kapseln; perist. brandgult. ☉ 2, 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.1413. R.Hn.Bryac.exs.132.

Kärr. (Lpl. och VB.—Södm. Ner. och Stockh. ÖG. Krokek: Mosén; Linköping: Vinnerstad etc. Blek. Ronnebytrakten. Sk. — N.) *Löst tufvad; stjelkarne ofta 1—1½ tum höga; fr.skaften vanl. 1—2 tum; bihanget vanl. stort som en liten art, på ytan vårtprickigt.*

- 5 *S. sphaericum* Sw. bladen från smal bas n. omv. äggrunda, hastigt *långt smalspetsiga*, helbräddade ell. mot spetsen svagt sågade, med nerv som hos föreg.; bihanget *något* vidare än kapseln; perist. brandgult. ☉ 7. Fig. Br.eur. Sw.Meth.Musc.t.1.f.1. Fl. D.Supp.1.t.42. R.Hn.Bryac.exs.43.

Kärr. (Lpl. och VB.—Södm. Ner. och Verm. VG. Djursåtra: Wahlst. Smål. Almesåkra och Vilstad snr enl. Scheutz; Femsjö. — N.) *Stj. vanl. kort, stund. utdragen, ända till tumshög; fr.skaften omkr. 2, stund. 3—5 tum långa. Bih. mycket litet, dock aldrig smalare än kapseln, yngre grönt, slutt. svartrött. Var. med kort och tjockt fr.skaft, n. äggform. bihang af kapseln vid: β ovalum ed.9, men denna form öfvergår utan gräns i den vanliga. — S. gracile Dicks. S. pedunculatum Lindb.*

†† *Aplodon* R. Br. Kapseln knappt smalare än det föga olivfärgade bihanget; sambyggare.

- 6 *S. Wormskjoldii* Horn. bladen äggrunda—aflånga, *trubbade ell. med smal, längre ell. kortare, trubbadt uddlik spets, helbräddade*, med under spetsen upphörande nerv; kaps. brunaktig, rundad ell. elliptisk, med mörkbrunt bihang af ungef. samma storlek och form. 2, 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.1659.

Fjelltr. r. (Lpl. förmodl. Karesuando enl. ex. af Læst. — N. Finnm. Vadsö; Tromsö. Trondhj. st. Mostamarken, vid Folsöen. Dovre enl. Sch. Syn. Bergen st. Sogn, i Kaupangskoven: Wulfsb.) *Löst tufvad, till alla delar mjuk, med utdragna, 1—2 tum höga stjelkar, teml. kort [5—8 lin.] fr.skaft, hvori samt i ans. till det föga vidgade bih. den liknar följ. slägte; hvaremot bladens mycket lösa cellväf och mössans form utmärka den såsom ett verkligt Splachnum. — Eremodon Brid.*

## 68. TETRAPLONDON Br. & Sch.

- 1 *T. angustatus* Sch. bladen *utdraget lancettlika*, med mycket lång och smal borslik spets, *sågade*, med i yttersta spetsen försvinn. nerv; kapseln *kort skaftad, föga höjande sig öfver* bladen, kortare och något smalare än det smalt omv. äggformiga, *ljusbruna* bihanget. 2, 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.1658. Somf.Cr.exs.8. R.Hn.Bryac.exs.102.

Skog., berg etc. r. (Lpl.—Uppl. Vestml. och Verm. — N. Finnm.—Dovre. Bergen st. Sogn, i Aardal: Wulfsb.) *Tätt tufvad och mjuk, med vanl. 1—3 tum höga, spensliga stjelkar och något glesa blad; frukterna små, vanl. talrika, på 2—5 lin. långa skaft. — Splachnum Sw. och ed.9.*

- 2 *T. mnioides* Sch. bladen konkava, omv. äggrunda—aflånga, *tvärt sammandragna till*

en smal borstlik spets, *helbräddade*, med nerv som hos föreg.; kapseln *längre* skafstad, kortare, men knappt smalare än det aflånga, slutl. *svartröda* bihanget. 24 6, 7. —  $\beta$  *fastigiatum*: större; bih. slutl. n. dubb. längre och vidare än kaps. —  $\gamma$  *cavifolius*: bl. starkt konkava, tegellagda; kaps. kortskafstad. Fig. Br.eur. Fl.D.suppl.1, t.43.f.1;  $\beta$  Fl.D.1414. Somf.Cr.exs.9. R.Hn.Bryac.exs.103.

Berg, kärr, r. (*Lpl.*—*Stockh. Dal.* och *Verm.*—*N.*— $\gamma$  *Pit. Lpm.* Kåbrenåiwe. *Jemtl.* Snasahögen. — *N. Dovre*, Sneebættuen.) *Tufvorna mer och mindre låta, vanl. omkr. tumshöga*, med  $\frac{1}{2}$ —1 tum höga *fr.skaft*; kaps. och bih. *stult. svartröda*. — *Splachnum H.* och *ed.9.*  $\beta$  *Spl. fastigiatum Dicks.* *S. Brewerianum H.*

28 Flocken *Tayloriæ*.

## 69. TAYLORIA Hook.

1 *T. splachnoides* Hook. bladen n. spadlikt aflånga, *småningom tillspetsade*, från midten ojemnt grofsågade, med under spetsen upphörande nerv; kaps. aflång—elliptisk, vidare än det lika långa balslika bihanget, med högt *kägellikt* lock och *långa*, hårlika *skruvridna* tänder. 24 7, 8. —  $\beta$  *mucronata*: bl. mer tillspetsade; kaps. med lägre lock. Fig. Br.eur. Fl.D.suppl.1, t.44.

Fjelltr. r. (*Herjed.* Funnedsalsbergets nordöstra sida. *Dal.* Särna, vid Njupaskärs vattenfall. — *N. Dovre*, Gudbrandsd., nära Ringeboe prestg. Nummedalen, Rollaug. Telemarken, Tind och Goustafield. —  $\beta$  *N. Dovre*.) *Växer i små, lösa tufvor; stj. omkr.  $\frac{1}{2}$ —1 tum hög, fr.skaftet tumshögt, med mycket smalt bih., som jemte kaps. är gulaktigt; den sistnämndas tänder komma vid påandning i listigt vibrerande rörelse; centralstiftet utskjutande.* —  $\beta$  *T. cuspidata Hn. ed.4.* *T. splachn.  $\gamma$  angustifolia Sch. Syn.*

2 *T. serrata* Br. & Sch. bladen aflånga—spadlikt aflånga. *hastigt* hopdragna till en *kort och smal* spets, *mot spetsen* sågade, med nerv som hos föreg.; kapseln som hos föreg., med högt *konvext* lock och *kortare, bredare*, trubbad tänder. 24 6, 7. —  $\beta$  *tenue*: lägre, med bredare bl.; locket n. koniskt; centralstiftet utskjutande. Fig. Br.eur.  $\beta$  R.Hn.Bryac.exs.42.

Skog., kärr. (*Lpl.* och *VB.*—*Gestr. Dal.* och *Verm.* *Ner.* Örebro, vid Markkärret; samt Skogaholm, flerst.: C.Hn. ÖG. Lemunda och Omberg; Holmgr.; Vadstena-trakten. *Smål.* Jönköping, vid Sanna; Zett. — *N. Finnm.* Tromsø; Hgn. Nordl. Ranen: A. Bl. & Arn. Trondhj. st., Meldalen; Bl.: Aalesund; Hgn. Dovre. Bergen st., Sogn; Wulfsb. Ullensager i Romerige.) *Vanl. något mindre än föreg., med svarttröd kaps. och bihang, tänd. icke rörliga som hos föreg. Hufvudformen är i Skand. mycket sällsyntare än  $\beta$ .* — *Splachnum H.*  $\beta$  *S. tenue Dicks.*

## 70. DISSODON Grev. &amp; Arn.

1 *D. Froelichianus* Grev. bladen *tegellagda*, aflånga—tunglika, *rundtrubbiga*, *helbräddade*, med under spetsen upphörande nerv; kapseln elliptisk, *knappt längre* än bih., slutl. nedtryckt klotrund, rödbrun, med n. koniskt lock och *parvisa* tänder. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.suppl.1, t.43.f.2. R.Hn.Bryac.exs.100.

Fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Stuur Toki vid Wiribaure; Puoitesjaure; Kerkevere; Snjårak vid Qvikkjokk; Holmgr. *Pit. Lpm.* Wallåive; Tjiddjakk. *Jemtl.* Snasahögen; Getvalen. *Herjed.* Stora Midtåklappen: Oldb. — *N. Finnm.* Kaveringtind vid Lyngseidet etc.: C. Hn; Hvassbrun i Maalseldalen; Hgn. Nordl. Salten, Skaiti: Schl. & Arn.; Ranen flerst.: A. Bl. & Arn. Dovre. File och Goustafield.) *Tufvad, med vanl. halftums-höga stjelkar och knappt tumshöga fr.skaft; bladen bredare än hos följ., genomskänliga af mycket lös cellväf.* — *Splachnum H.* *Tayloria Mitt.* *S. reticulatum Sw.*

2 *D. splachnoides* Grev. bladen *mindre tyd. tegellagda* och *smalare*, tunglika, för öfr. som hos föreg.; kapseln *längre* skafstad, *längre* än bih., med *något lägre* lock och *alla tänd. lika långt åtskiljda*, för öfr. som hos föreg. 24 8, 9. Fig. Br.eur. R. Hn.Bryac.exs.101.

Fukt. st., helst i fjelltr. r. (*Torn. Lpm.* Karesuando.—*Herjed. VB.* Skellefteå. Ångml. Tåsjöberget. ÖG. Motala, vid Lemunda stenbrott. — *N. Finnm.* Hammerfest; Kaveringtind etc. Nordl. fjellet Rappisvari: Lor. Dovre. Bergen st., Sogn flerst.: Wulfsb. Vang i Valdres.) *Tufvad, oflast större än föreg., med 1—3 t. höga stjel-*



kar och finare, omkr. 1½—2 t. höga fruktskafst, kapseln med sitt bihang något mindre; bladen af lös cellväf, men grönnare och ej så genomskinliga som hos föreg. — *Splachn. ligulatum* Dicks. *Weisia* Schwægr. och *Wg.* *Eremodon* Brid.

## 71. OEDIPODIUM Schwægr.

- 1 *O. Griffithianum* Schw. bladen rundadt spadlika, trubbiga, helbräddade, med långa ledade kanthår vid basen, bred, under spetsen upphör. nerv, af lös, i spetsen tätare cellväf; kapseln n. klotrund, med långt och smalt, halslikt bihang, konvext trubbigt lock. ☉ 6, 7. Fig. Br.eur. E.B.1938.

Klippspring., bergvägg. i fjelltr. r. (*Um. Lpm.* Vilhelmina sn, på Käringhögen i Gutsjellen; Tärna sn, Laxfjellet. — *N. Bergen* st., vid Förde; Sogn, på Gunhildtaana och Slengjesolkletten i Evindvik: A. Bl., samt Legdene i Jorddalen vid Vik: Wulfsb.; Ousedalen i Ullvig sn; mell. Graven och Voss.) Växer i små tuftor, till alla delar mycket mjuk och saftig; stj. ¼—½ tum hög, enkel ell. med 1—2, lika långa nysskott, bladen upptill större, n. roselllikt gylltrade, blågröna; fr.skaftet omkr. ½ tum högt, tjockt och utan gräns öfvergående i kapselbihang. — *Bryum* Dicks. *Gymnostomum* Sm.

## O. — SCHISTOSTEGACEÆ.

## 29 Flocken Schistostegææ.

## 72. SCHISTOSTEGA Mohr.

- 1 *S. osmundacea* WM. stjelkarne utskjutande från den qvarsillande smaragdgrönt glänsande, alglika förgrödden, enkla, nedtill bladlösa; de kantställda bladen n. rhomboidiska, de öfr. lancetlika, alla spetsiga, helbräddade; kapseln elliptisk ell. klotrund, med lågt konvext lock. ☉ 5—7. Fig. Br.eur. Fl.D.suppl.t.114,f.1. Lindgr.M.exs.98. R.Hn.Bryac.exs.284.

Mörka bergs- och jordhålor, r. (*Sk.* Ösjökloster; Höör; Bökestad; Ekestiga. *Blek.* Jemshög. *Smål.* Fredriksdal i Alnesåkra: Scheutz. *ÖG.* Lemunda. *Södm.* Eskilstuna. Jätteberget; Mariefred, vid Kalkudden; Dalarö: Hgn. *Stockh.* Stadshagen. *Gestr.* Gefle, vid Tolfsfors: R. Hn. *Ängml.* Tåsjoberget. *VB.* Baggböle: Hgn; *Lup.* Iowa nära Niemis gästgg. *Dal.* Leksand; Norrbärke. *Verm.* Conradsfors. *VG.* Kinnekulle. *Hall.* Ljungby sn. — *N. Christiania*, Egebjerg: Ängstr. Bårum. Hund i Vardal. Gudbrandsd., Elstad i Ringehoe: Berggr. Bergen st., Närstrand. Nordl. Mosfeld i Ranen: A. Bl. & Arn.) Ljust blågrön, 3—5 lin. hög, med 2—3 lin. långt fr.skaft; kaps. ytterst liten. Märkvärdig för det vackra skenet från förgrödden. — *Mnium* Dicks. *Gymnost.* Sm.

## P. — GRIMMIACEÆ.

## 30 Flocken Encalyptææ.

## 73. ENCALYPTA Schreb.

† Peristomet dubbelt.

- 1 *E. streptocarpa* H. tvärbbyggare; stjelken utdragen, grenig; bladen aflånga, trubbiga ell. med omärklig udd, helbräddade, med i spetsen försvinn. nerv; kapseln spiralstrimmig, med yttre perists tänder dubb. längre än det inres hårlika tänder. 2½ 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.2126. Sill.M.exs.180. R.Hn.Bryac.exs.162.

Berg, helst kalk-, mur. r. (*Sk.* Balsberg: Berggr. — *Ängml.* och *Jeml.* Torn. *Lpm.* Kurrawara. *Öl.* Gottl. — *N.* till Nordl. Ranen: A. Bl. & Arn.) Tätt tuftad, grof, upptill lifligt grön; stj. 1—2 t. lång; fr.skaftet tumslångt; mössan 2—3 lin. lång, nående långt ned på skaftet. — *E. grandis* Sw. *E. contorta* (Wulf.) Lindb.

- 2 *E. procera* Bruch. sambyggare; stjelken och bladen som hos föreg.; kapseln rakstrimmig, med yttre perists tänder lika långa och breda som det inres, dem motsatta tänder. 2½ 7. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.161.

Klipp. i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Kaddepakte vid Saggatjaure: Hgn. *Herjed.* Ljungdalsberget. — *N. Finnm.* Fløjelsfjeld vid Tromsø; samt Hvassbrun i Maalselvdaalen: Holmgr. Nordl. Salten, Hals: Schl. & Arn. Dovre, flerst. vid Kongsvold och Sprenbäcken. Kongsvinger: Holmgr.) *Till vårtedt och storlek lik föreg.; mössan något kortare.*

†† Peristomet enkelt, af 16 fullständiga tänder; sambyggare.

\* Mössan nående långt ned på fr.skaftet, i nedre kanten långt sliktandad; kapseln alltid slät.

- 3 *E. ciliata* Hoffm. bladen *äggrundt aflånga, trubbiga* med kort *mjuk* udd, helbräddade, med *i ell. under udden försvinnande* nerv; kapseln *utan* bihang vid basen, med *brandgull* peristom; mössan nedtill *likformigt* tandad. 24 6—8. Fig. Br.eur. Fl.D.1001,f.2; 1416,f.2. Thed.M.exs.127. R.Hn.Bryac.exs.157.

Klippspring. (*Lpl.*—Sk. Belteberga. — *N.*) *Tufvad, med vanl. omkring tumshög stjerk; bladudden ljusgul; fr.skaftet omkr. ½ t. högt, mössans regelbundna tandbräm i början inböjdt under kapseln, bildande en sluten hinna, ofta brandgull.* — *Leersia H. L. fimbriata* Brid. *E. laciniata* Lindb.

- 4 *E. apophysata* N. & Hornsch. bladen *smalare* än hos föreg., *aflångt lancettlika, spetsade*, med vanl. längre udd, helbrädd., med *ullöpande* nerv; kapseln med kort, halstikt bih. vid basen och *ljusrött* peristom; mössan nedtill *ordenligt* tandad. 24 6—8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.158.

Fjellklipp. r. (*Lul. Lpm.* Sähkok; Kerkevere. *Um. Lpm.* Laxfjellet. — *N. Nordl. Salten*, på Solvaagtind; Helgeland, Örtfjeld vid Dunderlandsdalen: A. Bl. & Arn. Dovre enl. Scheutz.) *Stor som föreg., med märkbart större mössa, hvars tandbräm slutl. bortfaller; kapsels bihang brungull, föga smalare än kapseln.* — *E. affinis H. fl. enl. Lindb.*

\*\* Mössan nående ned till kapsels bas ell. föga längre, nedtill omärkl. naggad; kaps. rakstrimmig ell. slutl. färad.

- 5 *E. rhabdocarpa* Schwægr. bladen *knappt* konkava, *äggrundt—aflångt lancettlika*, trubade, med kortare ell. längre hårläk udd, och *i eller under udden upphörande* nerv; kapseln från *vidgad bas, utan* bihang, smalt *äggformigt* aflång, *rakstrimmig*, slutl. färad, med vanl. *högroddt* peristom. 24 7, 8. — *β leptodon* Lindb. lågväxt, med kortare, vanl. långt håruddiga blad, kortare, mindre tydl. strimmig kapsel. Fig. Br.eur. Fl.D.2127. R.Hn.Bryac.exs.160.

Klipp. r. (*Lpl.*—ÖG. VG. Billingen: Wahlst. Bok. Strömstad: G. Theel; Christinedal. Öl. Karlevi: Lindb.; Åhs alvar och Horns sjöbranter: Zeit. Gottl. Grumpevik i Vamlingbo. — *N.* — *β N. Dovre* enl. Lindb. i Spitsb. M.) *Till storlek och vårtedt lik E. ciliata, för hvars var. den ansågs af Wg. — E. affinis H. fl. enl. Sch.*

- 6 *E. brevicolla* Sch. bladen *starkt* konkava, *äggrundt aflånga, trubade*, de nedre med kort, de öfre med lång *hårudd, bildad af den ullöpande* nerven; kapseln *cyllindrisk, med kort halstikt* bihang, djupt färad, med *vitaktigt* peristom. 24 5, 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.159.

Klipp., sand. st. r. (*Lul. Lpm.* Puolaure; Snjörak; Sähkok; Kaddepakte etc.: Holmgr. Pit. *Lpm.* Tjiddjakk. *Um. Lpm.* Laxfjellet: Stuorware. *Jemll.* Frösön: Hgn. *Herjed.* Malmagen: Oldb.; Ulfberget vid Viken. *Uppl.* Uppsala, Polacksbacken. — *N. Finnm.* Fløjelsfjeld vid Tromsø: Holmgr. Nordl. Dunderlandsdalen: A. Bl. & Arn. Trondhj. st., mell. gästgg. Volan och Soknæs. Dovre, flerst. Gudbrandsd. vid Tofte: Sch.; Laurgård: Hgn. Bergen st. Leirdalsören: Lor. Gravfossen nära Modum. Næs jernverk. Christiania, på Egebjergel.) *Vanl. något mindre än de föreg., med knapp en linie lång kapsel, på 3—5 lin. långt skaft.* — *E. longicolla* var. *Br.eur.*

††† Peristomet ofullständigt af högst flygtiga tänder, eller felande; sambyggare.

- 7 *E. vulgaris* H. bladen *aflånga—tunglika, trubade* med kort, stund. hårläk udd och *i ell. under spetsen försvinn.* nerv; mössan nående till kapsels bas, i nedre kanten *helbräddad*, blekt gulgrön; kaps. slät, utan bihang, med intet ell. snart affallande, hvitt och ofullständigt peristom. 24 4—6. — *β elongata*: stj. tufvad, mer än tumshög, med bredare blad. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.156.

Tor. st., mur. etc. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.* — *β ÖG.* Omberg.) *Stjelen hos hufvudformen*

vanl. 2—3 lin. hög, med föga högre fr.skaft. — *Bryum extinciorium* L. Sp. Pl. (α). *Encalypta extinct.* Sw. och ed.9.

- 8 *E. commutata* N. & Hornsch. bladen bredt lancettlika, spetsade, med utdragen *syllisk* udd, bildad af den *utlöpande* nerven; mössan nående *långt ned* på skaftet, i nedre kanten *omärkligt sargad*, brunaktig; kapseln slät, ofta något krökt, utan bihang och peristom. 2. 6—8. Fig. Br.eur. Fl.D.1425. R.Hn.Bryac.exs.155.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. Kurrawaara. Lul. Lpm. Wirihauare; Kerkevere; Alkavare; Kaddepakte; Holmgr. Pil. Lpm. Tjiddjakk. Jemll. Snasahögen, vid Handölsforsen. Herjed. Midtåklappen: Oldb. — N. Finnm. Hvassbrun och Aglappen i Møalselvdalen: Hgn. Nordl. Dunderlandsdalen, Brediksfeld: Bl. & Arn. Trondhj. st., Meelhuus. Dovre mångenst.) *Stjelken* vanl.  $\frac{1}{2}$ —1 tum hög; fr.skaftet n. lika högt; mössan *mycket glänsande*. — *E. alpina* Sm. *E. affinis* Schwagr.

### 31 Flocken *Orthotriches*.

#### 74. ORTHOTRICHUM Hedw. \*)

† Fruktskaftet kortare än kapseln, knappt nående öfver bladen.

\* Peristomet dubbelt; det inre af 16, breda tandlika cillier.

- 1 *O. Lyellii* Hook. tvåbyggare; bladen utdraget och smalt lancettlika, långspetsade, med helbräddade, *platta* kanter, vågiga, torra *krusigt vridna*, på *båda sidor bärande talrika, ledade, bruna groddtrådar*; kapseln något utskjutande, *färad*, med perist. inre tänder *rödaktiga*, i kanten *föga sargtandade*; mössan *mycket hårig*. 2. 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2493, f.2. R.Hn.Bryac.exs.255.

Trädstamm. r. (Sk. teml. allm. Blek. Vämö m. fl. st. Smål. mångenst. i söd. och vest. del.: Äfven vid Jönköping, Ryhof enl. Scheutz. Hall. allm. VG. Hunneberg; Göteborg. Äfv. m. fr.; samt Södm. vid Sandemars herrg. på Dalarö: Holmgr. Öl. Böda: Lindb.; Ottenby: Zett. — N. Laurvig. Krokklieven. Bergen st. Österöe.) *Stor*,  $\frac{1}{2}$ —3 tum lång, ofta *hängande med uppböjda toppar*; bladen i *friskt tillstånd starkt utsperrade*. Frukt *sälls*. De på bladen *framskjutande trådarne* *gränsa sig och alstra nya plantor*.

\*) Då de från fruktskaftets längd, peristomets och mössans beskaffenhet hemtade kännetecknen, ehuru onödgångliga för arternas undersökning och bestämning, endast kunna läggas till grund för en artificiell anordning, meddelas här nedan en på deras naturliga frändskap grundad öfversigt af samma arter:

#### a. Obtusifolia.

1. obtusifolium. 2. gymnostomum.

#### b. Affinia.

3. affine. 4. fastigiatum. 5. patens. 6. Rogeri. 7. tenellum. 8. pumilum. 9. Schimperii. 10. stramineum. 11. alpestre.

#### c. Speciosa.

12. speciosum. 13. Killiasii. 14. macroblephare. 15. Blyttii. 16. Sommerfeltii. 17. arcticum

#### d. Diaphana.

18. diaphanum.

#### e. Lejocarpa.

19. lejocarpum. 20. Lyellii.

#### f. Pulchella.

21. pulchellum.

#### g. Rupestris.

22. cupulatum. 23. Sturmii. 24. rupestre. 25. urnigerum. 26. anomalum. 27. lævigatum.

- 2 *O. lejocarpum* Br. & Sch. sambyggare; bladen från bredare bas lancettlika, spetsiga, med helbrädd., tillbakavikna kanter, torra raka, uppräta, utan groddtrådar; kapseln insänkt, slät, med inre perist:s tänder *hvitgula*, i kanten starkt sargtandade; mössan gleshårig. 2½ 5. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.516.

Trädst., säll. sten. r. (Sk.—Gestr. Ner. Ullaviklint: C. Hn. Verml. Christinehamn. Dalsl. Hafsås i Frösök. VG. Göteborg: Hgn. Hall. Bårarp. Boh. Öl. Tveta: Zett. — N. Laurvig. Bergen st.) Tumshög, vanl. ljusgrön; utmärkt af den fullkomligt släta kapseln och det inre peristomets beskaffenhet. — *O. striatum* H.

\*\* Perist. dubbelt; det inre af 16, fina, hårlika ciller; sambyggare.

- 3 *O. urnigerum* Myr. bladen aflångt lancettlika, spetsiga, med helbrädd., tillbakavikna kanter; fr.skaftets slida hårig; kapseln framskjutande, äggformig, med vidgad bas, slutl. hopdragen under mynn., och derigenom urnelik, lätt reflad; cilierna af en dubbel cellrad; mössan hårig. 2½ 6—8. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.41.

Klipp. r. (Uppl. Uppsala. Stockh. Södm. Eskilstuna. på Villstaberget etc. ÖG. Omberg, vid Alvastra: Holmgr. Smål. Jönköping: Scheutz; Eds socken i Kalm. län.) Något gulaktigt grön, löst tufvad och glesbladig, tumshög ell. högre, med stor gulbrun kapsel.

- 4 *O. diaphanum* Schrad. bladen aflångt lancettlika, hastigt sammandragna till en *hvit*, genomskinlig, småsågad spets, helbräddade, med tillbakavikna kanter; fr.skaftets slida glatt; kapseln insänkt, aflång, med mot skafet afsmalnande bas, icke hopdragen under mynn., otydligt strimmig; cilierna af en enda cellrad; mössan glatt ell. med få strödda hår. 2½ 4, 5. Fig. Br.eur. Fl.D.1420,f.1; 2494,f.1. Lindgr.M.exs.83. R. Hn.Bryac.exs.315.

Träd, säll. sten. r. (Sk. Lund, Reften, Knästorp; Kronetorp etc. Blek. Carlskrona, i Hoglands park. Smål. Algutsboda prestg.; Jönköping: Zett. ÖG. Kumla gästg.; Vinnerstad. Stockh. vid Gungan; Observatoriibacken; Kungsholmen; Kastellholmen. Ner. Örebro flerst.: C. Hn. VG. Kinnekulle; Roo; Lidköping. Öl. Mörbylilla och vid Thorslunda kyrka: Zett. Götll. Helvig sn; Tjengdarve gästg.; Hgn.) Knappt halftumshög, mycket mjuk, högrön, utmärkt af de hvita bladspetsarne.

\*\*\* Perist. dubbelt; det inre af 8, fina, hårlika cilier [hos *O. rup.*, stram. och *Rogeri* stund äfven 16].

a — Mössan tydligt hårig; sambyggare.

α — Kapseln yngre n. slät.

- 5 *O. speciosum* N. v. Es. bladen lancettlika långspetsiga, med tillbakavikna kanter, cell. i spetsen större än i bladets midt; fr.skaftets slida hårig; kapseln utskjutande, aflång, äldre oordentligt färad; mössan stor, n. klocklik, mycket hårig. 2½ 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2493,f.1. Lindgr.M.exs.79. R.Hn.Bryac.exs.254.

Trädst., stenmur. (Sk.—Herjed. och Ängml. Öl.: Zett. — N.) Stor, 1—2 tum hög, löst tufvad, med uppstigande stjelkar, nedtill rostbrun, upptill grön; lätt igenkänlig på den utskjut., n. släta kapseln och mycket håriga mössan.

β — Kapseln med tydliga, upphöjda ränder.

- 6 *O. rupestre* Schleich. bladen från bredare bas lancettlika spetsiga, med tillbakavikna kanter, utböjda, torra styft tegellagda, svagt papillösa, i spetsen af små celler; fr.skaftets slida glatt; kapseln insänkt ell. något utskjutande, äggformig, färad; mössan kägellik, mycket hårig. 2½ 6—8. — β *Schlmeyeri*: mer än tumshög, brun- ell. gulgrön; kaps. något utskjut.; mössan mer hårig. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.15. R.Hn. Bryac.exs.314.

Klipp. (Sk.—Lpl. Öl. Götll. — N.) Tumshög ell. mera, vanl. mörkgrön, ofta n. svart, styfvare än föreg. och de följ. i afd.; perist:s cilier mycket flyktiga. Af Lindb. funnen på Götll. med 16 cilier. — *O. rupicola* Funck.

- 7 *O. affine* Schrad. bladen torra, vanl. något utstående, starkt papillösa, för öfr. som hos föreg.; fr.skaftets slida glatt; kapseln något utskjutande, aflång, med afsmalnande bas, och smala ränder; mössan kägellik, tunn, brungrön, gles kort-hårig. 2½ 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2493,f.1. Lindgr.M.exs.77. R.Hn.Bryac.exs.253.

Trädst., säll. sten. (Sk.—Gestr. och Dal. Jemtl. Boh. Öl.: Lindb. och Zett. — N.)  
*Omkring tumshög, löst tufvad, rent grön, mest lik O. speciosum och följ. art.*

- 8 *O. fastigiatum* Bruch: bladen som hos föreg., men kortare och omärkligt papillösa; kaps. mer insänkt, ovalt aflång, med bredare ränder, kortare peristom och cilier; mössan klocklik, fastare, blekgul—brunaktig, gleshårig. 2 5. Fig. Br.eur. Fl.D. 2615.f.2. Lindgr.M.exs.78.

Trädstamm. (Sk.—ÖG. Södm. Nyköping: C. Ind. Stockh. Ångml. Säbrå. Grofellsberget: Arn. Ner. Vällingsberg: C. Hn. VG. Hall. Öl. Ottenby, Thorslunda etc.: Zett.; Örmöga och Böda: Lindb.) *Tumshög, löst tufvad, nära beslägtad med föreg. Skiljer sig jemte de 3 föreg. med. storleken och de vanl. talrika gamla kapslarna på stjelnas sidor från de 3 följ., som vanl. äro ganska lågväxta och mera undantagsvis hafva äldre qvarstill. kapslar på sidan.*

- 9 *O. tenellum* Bruch: bladen från bredare bas lancettlika, med trubbad spets, tillbakavikna kanter, svagt papillösa; fr.skaftets slida glatt; kapseln något utskjutande, aflångt cylindrisk, med breda ränder, slutt. hopdragen under mynn.; mössan kugellik, blekt gulgrön, gleshårig. 2 5. Fig. Br.eur.

Trädstamm. r. (Sk. Lund, vid Helgonabacken. Verml. Christinehamn, på aspstammar vid Gustafslund enl. C. Ands. Diss.) *Mycket mindre och späddare än de föreg., knappt ½ tum hög, ljusgrön; utmärkt af den smala kapseln, hvars breda ränder äro mer höggula än de mellanliggande ytorna.*

- 10 *O. patens* Bruch: bladen från smalt ägrund bas lancettlika, spetsiga, med nedtill tillbakavikna kanter, fint, men tydligt papillösa; fr.skaftets slida hårig; kapseln insänkt, tjockt äggformig, med smala ränder, slutt. urnelik med utböjd mynning; mössan klocklik, blekgul, gleshårig. 2 5. Fig. Br.eur.

Trädst., sten. r. (Stockh. på klippor vid Ältasjön, ymnig; Dalarö; samt VG. Göteborg; och Gotl. Klinte: Holmgr. — N. Bergen st. Balholmen; Kirkebøe; Vik enl. Wulfsb.; Sausund; Svanøe. Dovre, på klipp. mellan Drivstuen och Vårstien.) *Liten som föreg. ell. omkr. ½ tum hög, löst tufvad, ljusgrön ell. gulgrön; kaps. yngre blekgul, med gula ränder, slutt. brunaktig och icke olik den hos O. urnigerum.*

- 11 *O. alpestre* Hornsch. bladen utdraget och smalt lancettlika, spetsiga, med tillbakavikna, upptill tät smånaggade kanter, fint papillösa; fr.skaftets slida hårig; kapseln något insänkt, oval, med breda ränder, slutt. jemte mössan som hos föreg. 2 7, 8. Fig. Br.eur.

Klipp. i fjellr. r. (Lul. Lpm. Qvikkjokk, i Walleskogen: Holmgr. Pit. Lpm. Peljekaisse. Um. Lpm. Laxfjellet. Jemtl. Fröberget enl. Ångstr. — N. Finnm. Sverrevol i Maelselvdalen; samt Flöjelfjeld vid Tromsø: Hgn. Dovre, mell. Drivstuen och Vårstien; Kongsvold. Bergen st., flerst. i Sogn: Wulfsb.) *Halftumshög, gul- ell. brungrön, mest lik O. stramineum, men skild med de mjukare, tydligare papillösa bladen, den tjockare, mer blekgula kaps. samt den vidare och blekare, något mer håriga mössan.*

b — Mössan glatt ell. n. glatt.

α — Sambyggare.

- 12 *O. stramineum* Hornsch. bladen och fr.skaftets slida som hos föreg.; kapseln insänkt, äggformigt aflång gulbrun, med breda, brandgula ränder, slutt. något hopdragen under mynn.; mössan klocklik, hvitgul med brun spets, glatt ell. med några få hår. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.82.

Trädstamm. r. (Sk. Trolleholm; Arendala; Hæckeberga etc. Hall. Fröllinge. VG. Göteborg: Holmgr.; Halle- och Hunneberg; Kinnekulle. Verml. Höglunda i Nor sn. Smål. vest. delen; samt vid Vexjö och Vestervik enl. Scheutz. ÖG. Motala sn. vid Hålsberget. Stockh. Nyckelviken; Drottningholm. Ångml. Grofell i Säbrå sn.: Hgn. Öl. flerst.: Zett. — N. Laurvig. Næs jernverk. Bergen st., Öfridsdal vid Vik i Sogn: Wulfsb.) *Omkr. ½ tum hög, vanl. gulgrön; perist. cilier varierar 8 och 16; mössan kort, af mycket ljus färg.*

- 13 *O. Rogeri* Brid. bladen aflångt—jemnbredt lancettlika, trubbiga, med tillbakavikna helbräddade kanter, icke papillösa, af stora celler; fr.skaftets slida glatt; kapseln utskjutande, aflångt päronlik ell. klubblik, med tvär bas mot skaftet, breda ränder

af samma färg, icke hopdragen under den vida mynn.; mössan klocklik, hvitaktig, glatt. 24 6. 7. Fig. Schimp.Br.eur.Suppl.

Trädst. r. (Sk. Lund, Helgonabacken. Öl. Karlevi: Lindb. — N. Skydsmoe i Romerige. Bergen.) Stor som föreg., mycket mjuk, blekgrön. Utmärkt af de trubbiga, på undre sidan mer blekgröna bladen med ovanl. stora celler, samt den genomskinliga tunna kapseln, med uppblåst färad hals. Var. med 8 och 16 cilier i inre perist. — O. pallens Bruch enl. Sch.

14 O. Schimperii Hamm. bladen n. äggrundt lancettlika, trubbad ell. med kort udd, tillbakavikna helbrädd. kanter, svagt papillösa; fr.skaftets slida glatt; kapseln insänkt, tillhoppa med den korta vida, mot skaftet tvärt afsatta halsen elliptisk, slutt. aflång, med breda brandgula ränder; mössan vidgad klocklik, glatt ell. med några få hår. 24 5. 6. Fig. Br.eur. [O. pumilum]. Lindgr.M.exs.15. R.Hn.Bryac.exs.252.

Trädstamm. ell. sten. (Sk.—Helsl. och Jeml. — N.) Omkr. halftumshög, mörkgrön, nära beslaglad med följ., men med blad, kapsel och mössa kortare och bredare än hos denna; äfven perist:s tänder och cilier något kortare, de sednare endast vid basen bildade af 2 cellrader. — O. fallax Sch. Syn. O. pumilum Br.eur.

15 O. pumilum Sw. bladen lancettlika, spetsiga, för öfr. som hos föreg.; fr.skaftets slida glatt; kapseln slutt. mer utskjutande, tillhoppa med den lika långa, ned till skaftet smån. afsmånande halsen aflång, slutt. cylindrisk, för öfr. som hos föreg.; mössan kägellik, glatt, 24 5. 6. Fig. Br.eur. [O. fallax]. Lindgr.M.exs.14.

Trädst. säll. sten. (Sk.—Gestr. Gefle. Ner. och Verml. Öl.: Zett. — N.) Ofta växande tillhoppa med föreg. och likasom den rikt fruktbarande. Perist:s cilier ända till spetsen bildade af 2 cellrader. — O. fallax Bruch och Br.eur.

#### β — Tvåbyggar.

16 O. obtusifolium Schrad. bladen konkava, äggrundt aflånga, med rundtrubbig, genomskinlig, smånaggad spets, nedom midten inböjda kanter, starkt papillösa; kapseln insänkt, äggformigt aflång, med lång, nedåt afsmånande hals, färad; mössan klocklik, upptill brun och sträf af omärkl. hår. 24 5. 6. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.42. R.Hn.Bryac.exs.311.

Trädst. (Sk.—Lpl. — N. till Nordl.) 3—8 lin. hög, ljus- ell. blågrön, mjuk, med i torrt tillstånd tegellagda blad, hvilka ofta på ytan bära dylika klubblika groddträdar som hos O. Lyellii.

\*\*\*\* Peristomet enkelt [utan cilier]; sambyggar.

17 O. cupulatum Hoffm. bladen aflångt lancettlika, spetsiga, med tillbakavikna kanter, i spetsen af mycket små celler och otydl. papillösa; kapseln insänkt, rundadt äggformig, slutt. urnelik, ända till basen färad, med strålformigt utstående peristom; mössan kort och vidgad klocklik, gleshårig. 24 5. 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2494,f.2. Lindgr. M.exs.74. R.Hn.Bryac.exs.312.

Klipp. (Sk.—Uppl. Uppsala. Ner. och Verml. Helsl. Hudiksvall: Holmgr. Öl. alvaret: Lindb. — N.) Nära tumshög, teml. tätt tufvad, mörk- ell. brunggrön, med upprätta stjelkar och i torrt tillstånd tegellagda blad; mössan vanl. blekt gråbrun, starkt vidgad, med få, stund. n. inga hår.

18 O. Sturmii Hornsch. bladen mot spetsen starkt papillösa, för öfr. som hos föreg.; kapseln insänkt, äggformig, slutt. endast upptill svagt färad, slutt. något hopdragen under mynn., med upprätt peristom; mössan n. kägellik, hårig. 24 6—8. Fig. Br.eur. Fl.D.2560,f.2. Lindgr.M.exs.75. R.Hn.Bryac.exs.313.

Klipp. r. (Smål. Urshult, vid kyrkan; samt vid Åreda gästgg. och Vexjö: Scheutz. ÖG. Vg. Ner. Skogaholm: Ullaviklint: C. Hn. Stockh. flerst. Uppl. Uppsala. Helsl. Hudiksvall, på Getberget. Herjed. Funnedsalsberget. Jeml. Frösön; samt Medelp. Sundsvall: Holmgr. Ångml. Säbrå, Grofellsberget: Arn. Lul. Lpm. Kerkeväre; m. fl. st.: Holmgr. Goull. Thorsborg. — N. Dovre. Nordl.) Vanl. större och lösare tufvad än föreg., med upprätt stjelkar, n. svartgrön; utmärkt af den endast under mynn. svagt strimmade, för öfr. släta kapseln och den smalare, mer håriga, gula mössan.

\*\*\*\*\* Peristom felande; tvåbyggare.

- 19 *O. gymnostomum* Bruch: bladen *konkava*, torra tegellagda, äggrundt aflånga, *trubbiga*, med *ända upp till spetsen* invikna kanter, *starkt papillösa*; kapseln *insläkt.* oval, *med kort, mot skafet tvär* bas, n. röda ränder; mössan liten, klocklik, glatt ell. gleshårig. 24 4, 5. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.310.

Trädst., helst aspstamm. (Sk.—Gestr. Geste. Ängml. Örnsköldsvik. Vestml. Sättra. Ner. flerst. Verm. Carlstad. vid Sandbäcken. VG. Göteborg: Holmgr. — N. Christiania.) Mest lik *O. obtusif.*, *äfven till de på bladen befämliga groddträdarne*, men *vänl. något gröfre, brunaktigt grön, och äfven i sterilt tillst. skiljd med de ända upp i sjelfva spetsen starkt invikna bladkanterna.*

†† Fruktskafet märkbart längre än kapseln, uppskjutande öfver bladen; sambyggare.

\* Peristomet dubbelt.

a — Bladen spetsiga; det inre perist. af 16, glest taggiga cilier.

- 20 *O. pulchellum* Sm. bladen lancettlikt jemnbreda, spetsiga, med nedtill tillbakavikna, upptill platta kanter, papillösa, torra böjda hit och dlt; kapseln aflång, slät ell. med otydl. ränder, slutl. cylindrisk, färad. med yttre perist:s tänder *rödbruna*; mössan klocklik, glatt. 24 5. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.256.

Trädst. r. (Sk. Törringe; Dalby; Alnarp; Lund, vid Reften och Fogelsång m. fl. st.: Röddinge; Trolleholm.) *Knappt halftumshög, mjuk, ljusgrön; lätt igenkänlig på den lilla, ljusgula kapseln, med dess röda peristom.*

b — Bladen trubbiga, ell. med smalare, trubbad spets; cilier 8 [hos *O. macrobl.* äfven 16].

a — Cilierna platta, tandlika, papillösa, i kanten bugtandade.

- \*21 *O. macroblephare* Sch. bladen *aflångt—lancettlikt jemnbreda*, trubbiga, med tillbakavikna kanter, starkt papillösa; kapseln aflång—cylindrisk, tätt under mynn. *med 8 korta och svaga ränder*, för öfr. slät; inre perist:s cilier *dels 16, dels 8*, af de yttre tändernas längd, *breda, starkt bugtandade*; mössan kägellik, n. glatt, *kvitaktig*. 24 6—8. Fig. Schimp.Br.eur.Suppl.

Klipp. i fjelltr. r. (N. Dovre, vid Drivstuen och Kongsvold. Gudbrandsd., på Loms-eggen: Moë enl. Sch.) *Omkring tumshög, brungrön, med i torrt tillstånd tilltryckta ell. hit och dit krökta blad. Till cilierna närmast jemförlig med O. lejocarp., men tillika mycket närbeslägtad med följ. art, hvaraf Lindb. anser den endast vara en varietet.*

- \*22 *O. Killiasii* C. Müll. bladen från bredare, n. äggrund bas, *vid midten hopdragna* till en aflångt jemnbred, trubbad spets, för öfr. som hos föreg.; kapseln smalt cylindrisk, *slät*; inre perist:s cilier 8, *smalare och mindre djupt bugtandade*; mössan klocklik, *gleshårig, gul*. 24 7. Fig.

Klipp. i fjelltr. r. (N. Dovre, flerst., t. ex. nära Kongsvold, vid foten af Högsnyta enl. ex. af Lorentz.) *Omkring tumshög, teml. tätt tuftad, brun med ljus gulgröna toppar, bredare blad, smalare och slätare kapsel än föreg., ehuru, enl. hvad. Lindb. i sina Spilsb. Moss. visat, till peristomet föga skiljd. Äfven beslägtad med O. specios., hvaraf Sch. ansett den vara en fjellform: O. spec. var. alpicola Sch. mstr.*

β — Cilierna trinda, hårlika, genomskinliga och glatta, mycket kortare än yttertänderna.

- \*23 *O. Sommerfeltii* Sch. bladen från bredare bas aflångt lancettlika, med trubbad, grundt och ojemnt naggad spets, *tillbakavikna kanter, stora, kvadratiske och rektangulära genomskinkl. basceller, glatta* [utan papiller]; kapseln *långt skafad*, af den långt nedlöp. halsen påronlik, slutl. urnelik, *med breda ränder och starkt färad hals*; mössan kägellik, gleshårig. 24 7, 8. Fig. Sch.Br.eur.Suppl.

Klipp. i fjelltr. r. (N. Finnm. Talvig; samt Nordl. vid Vendsæt i Skjerstad: Lor. Klippor vid Saltenfjord: Somf. enl. Sch.) *1—1 tum hög, i låta tuvor af brungrön färg, med löst tegellagda blad.*

- \*24 *O. arcticum* Sch. bladen som hos föreg., med *smalare*, trubbad spets, *smärre*, rektangulära basceller, gula hörnceller, *tydligt papillösa*; kapseln *kortare* skaftad, n. slät; för öfr. som föreg. 24 7, 8. Fig. Sch.Br.eur.Suppl.
- Klipp. vid kusten, r. (N. Finnm. Hammerfest: C. Hn; Talvig: Lor.; Kaaifjord; samt vid Tromsö: Bl. enl. Sch. Nordl. Bodö; samt Vendsæt i Skjerstad: Lor.) *Till storlek och växtsätt lik föreg., men med mer tått sittande, tegellagda blad. Hos båda äro bladen bredare och tunnare, mer trubbiga och hafva kanterna längre upp emot spetsen tillbakavikna än hos följ. art. Lorentz' ex., lemnade under namn af O. Blyttii, höra tydl. hit.*
- \*25 *O. Blyttii* Sch. bladen jemnbredt lancettlika, *spetsade*, med *sjelfva spetsen trubbad*, nedom midten tillbakavikna, *upptill platta* kanter, vid basen strimmiga, *starkt papillösa*; kapseln *teml. långt* skaftad, med kortare och tjockare hals, päronlik, slutl. urnelik, *starkt färad*; mössan som hos föreg. 24 6, 7. Fig. Sch.Br.eur.Suppl.
- Klipp. r. (N. Christiania: Blytt enl. Sch.) *Tumshög, teml. grof, mörkt brungrön; bladen torra löst tegellagda, med stora, ofta 2kufna papiller, och mindre genomskinliga basceller än hos de 2 föreg.; kapseln gul, yngre n. slät.*  
(*O. anomalum*  $\beta$  *saxatile*.)

\*\* Peristomet enkelt.

- \*26 *O. lævigatum* Zell. bladen från bredare bas aflångt lancettlika, *spetsade*, med *trubbad* spets, tillbakavikna kanter och *små* basceller, *starkt papillösa*; kapseln aflång, slutl. cylindrisk, *fullkomligt slät*; mössan mycket hårig. 24 7. Fig. Sch.Br.eur.Suppl.
- Klipp., sten. r. (N. Lomsfjellen, vid Rødsheim. Bergen st., Borgund: Lor.) *Omkring tumshög, svartaktig med gröna toppar, tått lufvad och täbladig; bladen torra tegellagda; kapseln gul, alltid utan ränder, med kort hals.*
- 27 *O. anomalum* H. bladen från bredare bas lancettlika, småningom tillspetsade, med mer och mindre tillbakavikna kanter, stora basceller, *svagt papillösa*; kapseln oval—aflång, med 16—8 ränder, slutl. något urnelik, *färad*; mössan vanl. *gleshårig*. 24 5, 6. —  $\beta$  *saxatile*: bl. *smalare*, hvass-spetsiga; kaps. *smalare*, n. cylindrisk, med 8 tydl. och långa ränder; dels inga, dels 8 cilier. Fig. Br.eur. och Sch.Br.eur.suppl. Fl.D.1420,f.2; 2615,f.1. Lindgr.M.exs.76.  $\beta$  Sch.Br.eur.suppl.
- Klipp., sten., säll. träd,  $\beta$  kalksten. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Ner. Dylta; Blacksta i Kumla m. fl. st., samt VG. Billingen, nära Sköfde: C. Hn. Boh. Koön vid Mörstrand: O. G. Blomb. Öt. allm.: Lindb. Gottl. Öerest.: Cleve enl. Lindb.)  $\frac{1}{2}$  till mer än 1 tum hög, mörkgrön. *Hufvudformens karaktär har vanl. 16 långa ränder, hos  $\beta$  är hvarannan kort och otydlig. —  $\beta$  *O. saxatile* Wood.*

## 75. ULOTA Mohr.

† Peristomet dubbelt; det inre af 8, säll. 16, cilier; sambyggare.

\* Bladen i torrt tillstånd raka och styft tegellagda [icke vridna ell. krusiga], med tillbakavikna kanter.

- 1 *U. Hutchinsiae* Sch. bladen från äggrund ell. aflång bas lancettlika, *kortspetsiga*, med n. utlöpande nerv, *svagt papillösa*; hanblirna litet nedom fr.skaften, på samma gren som dessa; kapseln vanl. långt skaftad, oval, slutl. aflång med *smalare* mynn., färad, med 8 cilier; mössan mycket hårig. 24 5, 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.343.
- Klipp. (Lpl.—Blek. och Sk. — N.) *Omkring  $\frac{1}{2}$  tum, säll. tumshög, svartaktig, med kortare och rakare, mer tilltryckta blad än de öfriga i släktet; bladens celler hälften mindre än hos följ. — Orthotrichum Sm. och ed.9. O. crispum  $\gamma$  Wg.Fl.Su. O. americanum PB Ulota americ. Lindb.*

\*\* Bladen i torrt tillst. mer och mindre krusigt vridna, med platta kanter.

a — Hanblirna i spetsen ell. på sidan af en egen gren.

- 2 *U. curvifolia* Brid. bladen från bredare bas smalt lancettlika, spetsiga, med nedom spetsen upphör. nerv, *tått och starkt papillösa*; kapseln som hos föreg., men *märkbart mindre*; mössan hårig, nedtillflikig. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.109. Sill.M.exs.171 [Ort. Hutchinsiae].
- Klipp. r. (Lpl.—Gestr. Dal. och Verml. Dalsl. — N. ned till Kongsberg.) *Nära tums-*



*hög, vanl. nedtill brun, upptill gulgrön, stundom mer svartaktig, alltid gröfre än föreg., och med de längre och smalare, något krusigt vridna bladen mer erinrande om de följ. arterna. — Orthotrich. Wg. Fl. Lapp. och ed.9. O. crispum β Wg. Fl. Su.*

b — Hänblirna litet nedom frskaften, på samma gren som dessa.

- 3 *U. Bruchii Hornsch.* bladen från något bredare bas jemnbredt lancettlika, spetsiga, torra något krusigt vridna; kapseln långt skaftad, oval, med lång hals, slutl. *mycket lång och smal, med smal mynning, färad; mössan mycket hårig.* 24 6, 7. Fig. Br.eur. [Orth. coarctat.]. Lindgr. M.exs.80. R.Hn.Bryac.exs.344.

Trädst. r. (Sk.—Uppl. Vestml. och Ner. VG. Dalsl. Boh. — N. till Trondhj. st.) *Växer i 1/4—1 tum höga, små rundade tuvor af grön ell. gulgrön färg; hufvudsaktigen skild från de 2 följ. med den större, slutl. mycket smala, både uppåt och nedåt småningom afsmalnande, under mynn. icke hopdragna kapseln. — Orthotrichum Wils. och ed.9. O. coarctatum Br. & Sch.*

- 4 *U. crispa Brid.* bladen som hos föreg., torra starkt krusiga och hopvridna; kapseln som hos föreg., men hopdragen under den vidgade mynn.; mössan mycket hårig. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.178, 521.

Trädst. r. (Sk.—Helsl. Vestml. och Ner. Boh. Öl. Borgholm; Böda: Zett.; Melböda: Lindb. — N.) *Till storlek och växtsätt lik föreg., vanl. gul- ell. brunaktig, med starkare krusiga blad och något kortare frskaft, men längre kapselhals; mest utmärkt af den i äldre tillstånd under mynningen urnelikt hopdragna kapseln. Sporerne rödbruna. — Orthotrich. H. och ed.9.*

- 5 *U. crispula Bruch:* bladen något kortare och bredare, för öfr. som hos föreg.; kapseln kortare skaftad och mindre, med smalare och otydligare ränder, slutl. kort och trubbig, knappt hopdragen under mynn.; mössan mycket hårig. 24 5, 6. Fig. Br.eur. Lindgr. M.exs.81. R.Hn.Bryac.exs.345.

Trädst. r. (Sk.—Stockh. Ner. VG. Boh. Öl. Ottenby: Lindb. — N. Christiania. Laurvig. Vestfjordalen. Bergen. Bogen i Guledalen. Grötten i Romsdalen. Nordl. etc.) *Vanl. mera grön än föreg., med kortare och tjockare kapsel, ännu krusigare ehuru kortare blad, gröna sporer; ofta ytterst svår att skilja. Af gammalt uppgifven t. o. m. för Lpl., hvilket torde bero på förväxling med U. curvis; då artens utbredning åt nordn ej är säkert känd, meddelas här ofvan de nordligaste lokaler, hvarest från utg. eger säkra ex. — Orthotr. Br. & Sch. och ed.9.*

++ Peristomet enkelt [utan cilier]; sambyggare.

- 6 *U. Ludwigii Brid.* bladen jemnbredt lancettlika, spetsiga, torra något vridna; kapseln n. päronlik, slät, endast vid den hopdragna mynningen kort strimmig, med upprätt peristom; mössan mycket hårig. 24 8, 9. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.342.

Trädstamm. r. (Smål. Femsjö. i Hägnen. Boh. Christinedal. Verm. Kyrkebol i Ny sn. Vestml. Ramsbyttan. Löffallet. — N. Christiania—Trondhj. st. Mostamarken.) *Knappt tumhögh, gulbrun, med mindre krusiga blad än de närmast föreg.; mest utmärkt af den släta, teml. tjocka kapseln med dess tränga mynning. — Orthotr. Brid. och ed.9. O. coarctatum P.B. ent. Sch. Ulota coarctata Lindb.*

- 7 *U. Drummondii Brid.* bladen från äggrund bas jemnbredt lancettlika, spetsiga, torra vridna; kapseln klubblik, efter hela längden 8strimmig, slutl. färad, afsmalnande mot mynn., med utstående peristom; mössan gleshårig. 24 8, 9. Fig. Br.eur. Somf. suppl.t.1. R.Hn.Bryac.exs.341.

Trädst. r. (Blek. Jemshög: O. Hamm. Smål. Femsjö. ÖG. Kolmorden. Verm. Kroppa, på Brattberget. Dalsl. Tisselskog. — N. Bergen st. Kirkebø. Tingsnåset etc. Trondhj. st. Meelhuus gästg.; Mostamarken; Merager. Nordl. Ranen flerst.; A. Bl. & Arn.; Salten; Sörensnäs.) *Stjelken kort, nedliggande och rotstående; bladen på stj. och grenarnes nedre del ljusbruna, i grenlopparne gulgröna, längs kanten med flere rader ljusare kvadratiske celler. — Orthotr. Hook. och ed.9. O. subrepens Somf.*

+++ Tvåbyggare; frukt obeakt.

- 8 *U. phyllantha Brid.* bladen jemnbredt lancettlika, spetsiga, med nedtill tillbakavikna kanter och utlöpande nerv, som i yttersta spelsen är förtjockad och bär en rundad

*gyttring af små, anånga, ledade groddknoppar ell. korta groddtrådar.* 24. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.346.

Strandklipp., sten. r. (Sk. Ifvetofsta sn, nedom Årup, Krogstorp och Edenryd. *Blek. Carlshamn; Verkö. Hall. Varberg. Boh. Marstrand; Kindb.; Lysekil. — N. Stavan- ger. Bergen st. vid Sognsfjorden: Wulfsb. Trondhj. st. Sundalsören i Romsdalen: Scheutz; Trondhjem, Levanger, Vælsø och Stenhaubugten: Arn.; Otterøen. Nordl. Bodø: Holmgr.; Vindsæt vid Saltensfjord: Lor.; Ranen: Arn.)  $\frac{1}{4}$ —1 tum hög, tufvad, med jemnhöga, uppåt tjockare grenar; svartbrun, endast toppbladen ljusare, brun- gula och krusiga. — *Orthotrichum* Br. & Sch. och ed.9. *O. jullandicum* Brid*

## 32 Flocken *Zygodontes*.

### 76. ZYGODON Hook. & Tayl.

1 *Z. viridissimus* Brid. tvåbyggare; bladen aflångt—jemnbredt lancettlika, smalspetsiga, med platta, helbräddade kanter och i spetsen försvinn. nerv, starkt papillösa, torra inböjda ell. vridna; kapseln 3 gånger kortare än sitt skaft, ovalt aflång—smalt päron- lik, slutt. färad, icke hopdragen under mynningen; locket med långt, snedt spröt. 24 4, 5. —  $\beta$  *rupestris* Lindb. gröfre och mörkare, med längre och smalare, udd- spetsiga, torra vridna blad. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.275 [ $\alpha$  &  $\beta$ ].

Trädst.,  $\beta$  sten. r. (Sk. Skäråli m. fl. st. i nor. och mell. del. på bokstammar; Lund, Helgonabacken: Berggr. *Blek. Carlshamn. Hall. Fröllinge; Hasslöf. Smål. Femsjö; Göberga i Linderås: Scheutz; Klintaberg: Zett. VG. Halleberg; Hunneberg m. fr. —  $\beta$  Smål. Jönköping och Taberg enl. Scheutz. ÖG. Omberg. Stockh. mångenst. Gestr. Urfsjell nära Gefle. Helsl. Hemstanäs; R. Hn. Dalsl. Lilla Strand i Fröskog; Örn- dalen i Ör och Dansbo i Dalskog: Kindb.)  $\frac{1}{4}$ —1 tum hög, löst tufvad, hufvudsfor- men lifligt grön,  $\beta$  mörkgrön ell. brun; bladen mindre än hos arterna i följ. slägte, tunnare och genomskintigare, med tydligare, runda celler; fr.skaftet 2—3 lin. högt. Frukt högt sälls. i Sv. — *Bryum* Dicks.  $\beta$  *Z. rupestris* Lindb. *Z. vi- rid.*  $\beta$  *saxicola* Mdo.*

### 77. AMPHORIDIUM Schimp.

1 *A. lapponicum* Sch. sambyggare; bladen från bredare bas lancettlika. spetsiga, med helbräddade platta kanter, i spetsen upphörande nerv, torra krusigt hopvridna; kapseln af skaftets längd, yngre päronlik, slutt. under den vida mynningen starkt hopdragen och urnelik, färad; locket med kort spröt. 24 5—7. Fig. Br.eur. Fl.D. 1771. Lindgr.M.exs.25 [de fruktb. ex.]. R.Hn.Bryac.exs.186.

Klipp. r. (Lpl. och VB.—*Verm. Ner. och Södm. ÖG. Motala sn. Hälberget: Holmgr.; Omberg; Urberget i N. Vi: Kindb. Smål. Klintaberg i Almesåkra: Zett. VG. Hunne- berg. Dalsl. — N.) Tumshög ell. något mera, nedtill brun, upptill mörkgrön, med spröda stjelkar; fr.skaftet omslutet af skärmbleden. — *Gymnostomum* H. *Amphidium* Sch.Cor. och R.Hn.Bryac. *Zygodon* Br.eur. och ed.9. *Cylicocarpus* Lindb.*

2 *A. Mougeotii* Sch. tvåbyggare; bladen jemnbredt lancettlika, spetsiga, med helbrädd. nedtill tillbakavikna kanter, n. utlöpande nerv, torra inböjdt krökta, icke krusiga; kaps. hälften kortare än sitt skaft, för öfr. som hos föreg.; locket med långt spröt. 24 5—7. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.25 [de sterila ex.]. R.Hn.Bryac.exs.187.

Klipp. r. (Sk.—*Herjgd. Hammarén* vid Flon: Oldb. och *Medelp. Randklöfven: S. Almqv.; Sundsvall; samt Angml. Söbrå; och Jemt. Frösön: Hgn. Pit. Lpm. Käksa etc. Lul. Lpm. Jokkmokk och Qvikkjokk flerst.: Hgn. — N. Christiania—Nordl. Finn. Maals- elvdalen: Hgn.) Vanl. ett par, stundom 4—5 tum hög, i mjuka, svällande, lösa tufvor af nedtill rostbrun, upptill lifligt grön färg, mycket grenigare än föreg. Frukthärande ex. mycket lägre; knappt tumshöga, hos oss ganska sällsynta. — *Amphid.* Sch.Cor. och R.Hn.Bryac. *Zygodon* Br.eur. och ed.9. *Cylicocarpus* Lindb.*

## 33 Flocken *Ptychomitriæ*.

### 78. PTYCHOMITRIUM Färnr.

\*1 *P. polyphyllum* Färnr. bladen från äggrund, starkt strimmig bas smalt lancettlika,

kölade, med nedtill tillbakavikna, mot spetsen hvasst sågade kanter, torra krusigt hopvridna; kapseln utdraget skaftad, aflång; locket med långt rakt spröt. 2 $\frac{1}{2}$  10—5. Fig. Br.eur. Fl.D.2685,f.2.

Klipp. r. (N. Stavanger. Bergen st. vid staden Bergen; Sogn, nära Laviks prestg.: Wulfsb.; Selløe; Svanøe. Trondhj. st. Lysøe.) *Tumshög, mjuk, i gulgröna, stund svartgröna tufvor, med vanl. flere, 3—4 lin. höga fr.skaft tillhopa; kapseln knappt 1 lin. lång, med lika långt spröt.* — *Bryum Dicks. Trichost. Hook. Racomitrium Brid.*

### 79. COSCINODON Spreng.

1 *C. pulvinatus* Spr. bladen från äggrund bas lancettlika, afsmalnande till en lång, genomskinlig, glest sågad hårudd, starkt strimmiga, med stark nerv; kapseln kort skaftad, något insänkt, omv. äggformig, med koniskt, kort sprötspetsadt lock. 2 $\frac{1}{2}$  5, 6. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.110. R.Hn.Bryac.exs.276.

Klipp. sten. r. (Lul. Lpm. Wastenjaure. — N. Nordl. Salten. Bergen st., Sogn mångst.: A. Bl. & Wulfsb. Gudbrandsd., Elstad i Ringeboe; Bergrg.; Lösnes. Hede-marken, nära Mjösen. Christianiatrakten. Bjerke i Asker.) *Bildar 3—5 lin. höga, låta, nära löst förenade tufvor af blågrön färg, gråblåda af bladens håruddar. Liknar i öfrigt en Grimmia, till mössan ett Orthotrichum; skild från båda med peristomet.* — *Grimmia cribrosa* H. *Cosc. cribrus* Spruce.

### 34 Flocken Hedwigiesæ.

#### 80. HEDWIGIA Ehrh.

1 *H. ciliata* H. bladen konkava, tegellagda ell. ensidiga, från äggr. ell. aflång bas lancettlika, med lång, hvit och genomskinlig, ojemnt tandad spets, nervlösa, starkt och groft papillösa; perichæt.bl. med vanl. långt hårbräddad spets; kapseln insänkt, n. klotrund, med plattadt, vårtbärande lock; mössan glatt ell. hårig. 2 $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *ex-ridis*: bladspetsen icke ell. föga genomskinl. Fig. Br.eur. Fl.D.1532. R.Hn.Bryac.exs.41.

Sten., klipp. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Ljusgrön, torr blåaktig, 1—2 tum hög, löst tufvad, med n. jemnhöga grenar, utan de trådsmla skott, som utmärka följ.* — *Bryum apocarpon*  $\beta$  L. *Anoetangium* H. *Schistidium* Brid. *Hedwigidium* Hn ed.9. *Hedwigia albicans* Lindb.

#### 81. HEDWIGIDIUM Br. & Sch.

\*1 *H. imberbe* Br. & Sch. bladen konkava, torra tätt tegellagda, smalt äggrunda—n. lancettlika, med smal, naggad [icke hvit] spets, n. tillbakavikna kanter, nervlösa, otydligt papillösa; perich.bl. med längre, ojemnt naggad spets; kapseln något utskjutande, elliptisk, med snedt koniskt lock; mössan glatt. 2 $\frac{1}{2}$  5, 6. Fig. Br.eur.

Sten., trädst. r. (N. Bergen st., Osterøe, på träd.) *Norska ex. bilda gulbruna, 4—6 lin. höga tufvor, med trinda grenar, af hvilka en och annan ullöper i ett trådsmlt skott, och likna fullkomligt pyreneiska ex. Frukt icke funnen i N. Engelska ex. dro 2 tum höga, mörkgröna.* — *Anoetangium* Hook. & Tayl.

### 35 Flocken Grimmiesæ.

#### 82. GRIMMIA Ehrh.

† *Schistidium* Brid. Kapseln insänkt ell. längre än skaftet, regelbunden; locket med spröt; sambyggare.

1 *G. maritima* Turn. bladen tätt sittande, från bredare bas lancettlika, smalspetsade, utan hinnaktig udd, med grof utlöpande nerv, torra krökta och något krusigt vridna, perich.bl. dubbelt längre; kapseln kort skaftad, insänkt, blekt gulbrun, n. halfklotformig, med bruna, af små hål genombrutna tänder; locket konvext, sprötspetsadt. 2 $\frac{1}{2}$  6—8. Fig. Br.eur. Fl.D.2496. Somf.Cr.exs.17. Zett.Grimm.exs.6. R.Hn.Bryac.exs.374.

Strandklipp. vid hafvet. (Sk. Kullaberg.—Boh. Stockh. skärg. Rosl. Svartklubben etc. — N. hela kusten till Finnm. Hammerfest.) *Knappt tumshög, låt tufvad och låt*

bladig, svartgrön ell. brun; utmärkt från följ. genom sina tjockare, tätare hoppackade stjelkar och de smalare bladens krusighet, som gifva den ett helt annat utseende. Bladkant. dels platta, dels tillbakavikna.

- 2 *G. apocarpa* H. bladen som hos föreg., men kortare och bredare, med tillbakavikna kanter och oftast hinnaktig, hvit spets ell. hårudd, torra upprätta och raka; kapseln n. oskaftad, vanl. insänkt, rödbrun, bagarlik, med purpurroda, 2. hela tänder; locket som hos föreg. 24 4—9. —  $\beta$  *gracilis*: utdragen, ofta flytande, med glesare, vanl. något ensidiga bl., med kort hårudd. —  $\gamma$  *rivularis*: utdragen, grenig, med äggrundt lancettl. bl. n. utan hårudd. —  $\delta$  *alpicola*: bladen bredare, utan hårudd; kaps. utskjut. Fig. Br.eur. Fl.D.480. R.Hn.Bryac.exs.188.  $\delta$  Sw.M.Sut.1,f.1.
- Fukt. sten a. (Sk.—Lpl. — N. till Finn.) Växer i vanl. tumshöga, stund. mycket högre, mörkgröna, svarta ell. ljusbruna, mer och mindre lösa tufvor; var. i högsta grad. De anförda varr. hafva af en del förf. ansetts för egna arter. — *Bryum* L.
- 3 *G. conferta* Funck: bladen från n. äggrund bas afsmalnande till en kort, hos de öfversta hårlig spets, med tillbakavikna kanter, af mycket små celler, torra tilltryckta; kapseln n. oskaftad, insänkt, rundadt bagarlik, med sprickfulla, brandgula tänder; locket konvext, med kort spröt. 24 5. Fig. Br.eur. Zett.Gr.exs.1. R.Hn.Bryac.exs.189.
- Bergvägg. r. (Stockh., vid Nacka qvarnar.) Tufvorna gröna och mjuka, låga, knappt halftumshöga, men låta, af i torrt tillstånd tagelsmala stjelkar; bladen kortare och af mycket tätare cellväf än hos de föreg.; kapseln liten. — *G. apocarpa*  $\gamma$  *stricta* Wg. *G. pulvinata* Sw.

†† *Gasterogrimmia* Br. & Sch. Kapseln insänkt, sned, utan peristom [hos den skand. arten]; locket med vårta; sambyggare.

- 4 *G. anodon* Br. & Sch. bladen konkava, de nedre äggrunda, spetsade utan hårudd, de öfre äggr. lancettlika, spetsiga med lång, hvit och sågad hårudd, alla med platta helbräddade kanter; kapseln på kort krökt skaft, insänkt, snedt rundad, på ena sidan buktig, gulröd, utan peristom, med plattadt, vårtbärande lock. 24 4—6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.375.
- Klipp. r. (Um. Lpm. på öfversta spetsen af Laxfjellet i Tärna sn. Herjed. Midtåkläppen; samt Ulfberget: Oldb. — N. Christiania, på Hovedöen: Dr. F. Kier. Bergen st., Sogn, på Storeskaret vid Wik: Wulfsb.) Bildar låta,  $\frac{1}{2}$  tum höga tufvor, ofvan hvita af de öfre bladens långa hårudd.

††† *Eugrimmia*. Kapseln med tydligt utskjutande, i yngre tillst. krokigt, ofta nedböjdt [föråldradt mer upprätt] skaft; mössan hättelik.

\* Sambyggare; bladens hårudd tydlig, oftast lång.

- 5 *G. pulvinata* Sm. bladen aflånga, med något tillbakavikna kanter, tvärt samman-dragna till en lång, småsågad hårudd; kapseln elliptisk, tydligt 6—8randad, slutl. kantig, med mörkröda, n. hela ell. i spetsen oordentl. 2klufna tänder; locket konvext, med spröt af halfva kapselns längd. 24 5, 6. —  $\beta$  *cana*: lägre, hvit af hår, längre än sjelfva bladen. Fig. Br.eur. Fl.D.2307,f.2; 2496,f.1. Lindgr.M.exs.91. R. Hn.Bryac.exs.277. Zett.Gr.exs.8.
- Sten., helst kalk-, mur. etc. (Sk.—Uppl. Ner. VG. Hall. Varberg: Scheutz. Å.: Lindh. Goll. — N. Christiania och Stavanger—Trondhj. —  $\beta$  vid halskusten.) Växer i små rundade, knappt tumshöga tufvor, med de små kapslarna på 2—3 lin. långa skaft, yngre nedböjda mellan de blågröna bladen. — *Bryum* L.
- \*6 *G. apiculata* Hornsch. bladen äggrundt—smalt lancettlika, med tillbakavikna kanter, af smärre celler än hos föreg., småningom afsmalnande till en kort, helbräddad hårudd; kapseln elliptisk, slät, med brungula, håliga och klufna tänder; locket konvext, med vårta ell. kort udd. 24 7, 8. Fig. Br.eur.
- Fjellklipp. r. (N. Dovre, på Nystuböe.)  $\frac{1}{2}$ —1 tum hög, i låta, upptill gulgröna tufvor, af tjocka, tätbladiga stjelkar; de nedre bladen utan hårudd; kapseln liten, med gull lock.
- 7 *G. Schulzei* Wils. (och Sch. Syn.) bladen från bredare bas utdraget lancettlika, med tillbakavikna kanter, och stora, quadratiska, genomskinliga hörnceller vid basen, Hartman, Skandinaviens Flora II (10:de uppl.).

*småning. afsmalnande till en mycket lång, starkt sågtandad hårudd; kapseln elliptisk ell. omv. äggformig, 8strimmig, slutt. färad, med purpurroda, djupt 2delade tänder; locket konvext, med teml. långt spröt. 2 5, 6. Fig. Br.eur. [G. funalis]. R.Hn.Bryac.exs.316.*

Klipp. r. (Sk. Bosarp m. fl. st. Blek. Carlshamn; Ronneby. ÖG. Omberg. Stockh. Salem sn. Östenberget. VG. Göteborg. Boh. Skåftö; Koön vid Marstrand: O. G. Blomb. Öl. Resmo och Glömminge: Zett. — N. Christiansand. Stavanger. Bergen st. Sogn, vid Nordnes: A. Bl.) *Mycket större och lösare tufvad än de 2 föreg., vanl. 1—2 tum hög, mycket grenig, med lättsillande och utstående, långa, brungröna, äldre svartaktiga blad; kapseln 2—3 gånger större än hos föreg., med rödbrunt lock. — Dryptodon Brid. G. funalis Br.eur. G. decipiens Lindb. och ed.9, ett namn, som genom Mildes granskning af orig.ex. till Trichostom. decipiens Schulz, hvarpå det grundar sig, befunnits origligt; jemf. G. Hartmanii.*

\*\* Tvåbyggare.

a — Bladen med tydlig, ofta lång hårudd.

8 *G. elatior Br. & Sch.* bladen från äggrund bas långt och smalt lancettlika, med starkt tillbakavikna kanter och likformiga, n. jemnbreda bashörnceller, småning. afsmalnande till en mycket lång, n. helbräddad hårudd; kapseln n. äggformig, 10strimmig, slutt. aflång, färad, med breda, röda, grundt och oordentligt klufna och hålliga tänder; locket koniskt, afsmaln. till ett långt spröt. 2 5, 6. Fig. Br.eur. Lindgr. M.exs.92. Zett.Gr.exs.14, 15.

Klipp., helst i fjelltr. r. (Pit. Lpm. vid Hornafvan, i Arjeploug. Jeml. Åreskutan. Ångml. Nämforsen i Liden. Helsl. Färila sn, vid Laforsen; Årbrå och Ålsta snr flerst.: Oldb. Uppl. Södm. ÖG. vid Vettern i V. Ny; Omberg. Ner. Ullaviklin: C. Hn. Verml. vid Venern. VG. Rackeby. Boh. Christinedal. — N. Nordl. Salten. Trondhj. st. Sundalsören: Scheutz. Bergen st. Sogn: A. Bl. & Wulfsb. Dovre—Christiania.) *Stor som föreg., hvilken den habituellt liknar, men vanl. gröfre, löst tufvad, med söga greniga stjelkar, nedtill svartbrun, öfverst brungrön, med mycket långa blad, hvilkas hörnceller hafva samma form som de öfriga bascellerna; kapseln stor som hos föreg.*

9 *G. Mühlenbeckii Sch.* bladen från bredare bas smalt lancettlika, upptill kölade, nedtill med en ell. flere rader quadr., genomskinn. celler längs kanten, småning. och jemnt afsmalnande till en teml. lång, starkt sågad hårudd, de nedre med kort hårudd; kapseln oval, slät, slutt. oordentligt rynkig, med rödaktiga, hela ell. grundt klufna tänder; locket konvext, med kort spröt. 2 5—7. Fig. Br.eur. [G. incurva]. R.Hn.Bryac.exs.278 [G. trichoph.]. Zett.Gr.exs.12 [G. trichoph.].

Klipp., sten. (Sk.—Helsl. Ner. och Verml. Ångml. flerst.: Holmgr. Öl. nor. del.: Zett. — N. Christiania—Gudbrandsd. Bergen st., Sogn, vid Fortun i Lyster: A. Bl.)  $\frac{1}{4}$ —1 tum hög, löst tufvad och fallande isår, mörkgrön; kapseln liten som hos *G. pulcr.* — *G. trichophylla*  $\beta$  *septentrionalis* Sch. Syn. *G. trichophylla* ed.9, icke Græv., hvars art af detta namn, såsom Lindb. visat, skiljer sig med smalare bladnere, n. slät hårudd, dubb. större, strimmad kapsel etc., och icke ännu blifvit funnen i Skand.

10 *G. spiralis Hook* bladen lått, i spiral tegellagda, från bredare bas smalt lancettlika, upptill kölade, nedtill längs kanten med omkr. 3 rader rektangulära celler, de öfversta småning. afsmalnande till en teml. kort, n. slät hårudd; kapseln oval ell. elliptisk, slät, slutt. något färad, med mörkröda, oordentligt klufna och sprickfulla tänder; locket lågt koniskt, ell. med kort trubbigt spröt. 2 5, 6. —  $\beta$  *epiliferæ* Zett. tagelsmal, med äggrundt aflång, trubbad blad utan hårudd. Fig. Br.eur. R. Hn.Bryac.exs.190. Zett.Gr.exs.10;  $\beta$  11.

Klipp. i fjelltr. r. (Lul. Lpm. Njuonjes och Wuoka: Holmgr. Pit. Lpm. flerst. Jeml. Snasahögen, vid Handölsforsen; Åreskutan. — N. Finn. Hammerfest: C. Hn; Aglappen i Maalselvålen; samt Nordl. Bodö; och Trondhj. st. Stören: Hgn. Dovre, på Finnshöe, Vårstien, Kongsvold och Blåhöe. Gudbrandsd., på Lomsfjellen. Bergen st., Sogn: Wulfsb. —  $\beta$  Lul. Lpm. Nammats, Kaddepakte och Wuoka: Hgn. — N. Finn. med  $\alpha$ : Hgn. Dovre, vid Kongsvold. Laurhöe i Lom. Valders och Voss. Goustafield.) *1—1½ tum hög, spenslig och spröd, i nedtill svartaktiga, upptill grågröna, lått sönderfallande tufvor; stjelkar och grenar uppböjda; kapseln liten,*

*ljusbrun, med brandgull lock, sällsynt. — Trichostom. funale Schwægr. G. funalis Sch. Syn., hvilket namn dock är förvillande, såsom af många äfven tillagdt G. Schultzei, hvarjemte det icke synes fullt säkert, att Schwægr. med sin T. funale menat denna art.*

b — Bladen med omärklig, de nedre oftast alldeles utan hårudd; torra mer och mindre vridna.

- 11 *G. Hartmanii Sch.* bladen torra löst tilltryckta, något vridna, de öfre från lancettlik bas utdraget och syltligt afsmalnande till en mycket kort, n. helbräddad hårudd, upptill kölade, med tillbakavikna kanter, rektangulära basceller och längs kanten flere rader n. kvadratiske celler. 2 $\frac{1}{2}$ . —  $\beta$  propagulifera: de öfversta bl. i spetsen bärande en gyttring groddknoppar i st. för hårudd. Fig. R.Hn.Bryac.exs.317. Zett. Gr.exs.13.

Klipp. sten. (Sk.—Gestr. Ner. och Verml. Boh. Öl.: Zett. — N. Laurvig. Christiania. Bergen st. Sogn: Wulfsb. Dovre, vid Drivstuen: Berggr. Opdal: Scheutz.) Växer i ofta vidsträckt, 1—3 tum höga, något lösa, nedtill bruna ell. svarta, upptill mörkgröna ell. gulbruna tufvor, med något ensidiga, långa, fuktiga utböjda, torra något krusiga blad. Handlr och frukt okända; förökar sig trol. genom bladens groddknoppar. — Häl höra enl. Milde orig.ex. af *Trichost. decipiens Schultz*, ehuru, då Schultz äfven lemnar beskrifn. på frukten, det är troligt, att han under det anförda namnet inbegripit äfven någon annan art.

- 12 *G. torquata Grev.* bladen torra krusigt vridna och i spiral omgifvande stjelken, aflång lancettlika, spetsade, de nedre utan, endast de öfversta med en mycket kort hårudd, kölade, med platta kanter och alla celler i bladbasen jemnbreda—rektangulära. 2 $\frac{1}{2}$ . Fig. Somf.Cr.exs.106. Thed.M.exs.128. R.Hn.Bryac.exs.318. Zett.Gr.exs.9.

Klipp. r. (Lpl.—Helsl. och Verml. Dalsl. Gölkullen i Heggelskog. Ner. Ullaviklint; och Skogaholm, i Gropdalen: C. Hn. VG. Halle- och Hunneberg. Smål. Ingaryds dal i Ölme stad, samt Skurugata: Scheutz. — N. Finnm.—Budskerud.) Bildar rundade och kullriga, 1—2 tum höga, mjuka, nedtill svartaktiga, ofvan lifligt gröna, yttast lätt sönderfallande tufvor; stjelkarne upprätta, kljnnegreniga, med jemnhöga, trubbiga grenar; bladen små, ofta i spelsen med groddknopplika utväxter, likasom hos föreg. Frukt okänd. — *Zygodon (?) Lieb.*

- \*13 *G. contorta Sch.* bladen torra krusigt kopperidna, från aflång bas småningom utdraget och smalt syltlik, utan ell. med mycket kort hårudd, kölade, med nedtill tillbakavikna kanter, alla bas- och hörnceller rektangulära, genomskinliga; kapseln oval, slät, med brandgula, djupt och oordentligt klufna och håliga tänder; locket koniskt, med kort trubbig udd. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. Br.eur. [*G. uncinata*].

Klipp. i fjelltr. r. (N. Dovre, vid Fogstuen, m. fr. Rundeneffeld. Bergen st. Sogn, på Dyrhaugtind m. fr.: Wulfsb.) Tufvorna söga mer än halftumshöga, mjuka, nedtill bruna, ofvan svartgröna, med något glesa, mycket smala blad; kapseln mycket liten, blekgul, med rödgull lock och peristom. — *Dicranum Wg. Fl. Carp. Grimm. uncinata Kaulf. G. incurva Schwægr. [icke skiljd art] ed.9.*  
(*G. spiralis*  $\beta$ .)

††† *Gambelia.* Kapseln slät, med tydligt utskjutande, rakt och upprätt skaft; mössan dels hättelik, dels ensidig.

\* Bladen med hårudd; mössan hättelik,flikig.

a — Sambyggare.

- 14 *G. Donniana Sm.* de öfre bladen utdraget lancettlika, med platta kanter, lång, tandad hårudd, och alla bascellerna rektangulära—jemnbreda, n. genomskinliga; kapseln knappt utskjutande mell. perichæt-bladen, liten, gulaktig, aflång, med gul- ell. brunröda, n. hela tänder; locket konvext, med trubbig värtä ell. kort, trubbigt spröt. 2 $\frac{1}{2}$  6, 7. Fig. Br.eur. [*G. obtusa*]. R.Hn.Bryac.exs.191. Zett.Gr.exs.16.

Fjellklipp. r. (Lul. Lpm. Njuonjes och Wuoka: Holmgr. Um. Lpm. Laxfjället och Gitsfjellen: Ångstr. Jemt. Åreskutan. Herjed. Helagsfjellen; Midtälklappen: Oldb. — N. Finnm. Sverrevol i Maalselvdalen; samt Nordl. Bodö: Hgn; Salten; Ranen; vid Hemnäs och Roxlien. Trondhj. st. Vangsfjeld i Opdal. Dovre, vid Vårstien, Kongsvold,

Storhøe etc. Gudbrandsdalen, i Lomsfjellen m. fl. st. Bergen st. Selløe; Soga, i Jorddalen vid Wik: Wulfsb. Filefjeld. Voss. Valdres.) *Knappt halftumshöga små, grön- ell. svartgröna tufvor, med de små bleka kapslarna knappt höjda öfver toppbladen, hvilkas hårudd dock var. längre ell. kortare; var. öfven med ensidig mössa.* — *G. obtusa* Schw.

- 15 *G. ovata* WM. bladen som hos föreg., med tillbakavikna kanter, lång, svagt tandad hårudd, bladbasens kanceller n. *quadratiske*, mer *genomskinliga*, de öfr. bascellerna rektangulära; kapseln mer *framskjutande*, större, brun, aflång, med *hög-röda, djupt delade* tänder; locket konvext, med *snedt, spetsigt* spröt. 2 6—9. — *β affinis*: stj. låg, men gröfre; kaps. större, knappt utskjut. — *γ cylindrica*: större; bl. långhåriga; kaps. aflångt cylindr. Fig. Br.eur. Fl.D.2614, f.1. Somf.Cr.exs.16. R. Hn.Bryac.exs.279. Zett.Gr.exs.17.

Sten. klipp. (*Lpl.—Herjed. och Ängml. Gestr. Uppl.* nära Uppsala. *Stockh. ÖG.* Vinnerstad sn: Holmgr. — N. Finnm.—Christiania. — *β ÖG.* Omberg, vid Rödgaflv. — N. — *γ Verm.* med sjön Fryken, nedom Vestgård.) *Omkr. 1 tum hög, oval, svartgrön, med ljusare toppar i små tufvor; kapseln föga större än hos föreg., men af mörkare färg. Mössan varierar n. ensidig.* — *G. ovalis* Lindb. *γ* är *G. ovata β patens* ed.9.

b — Tvåbyggare.

- 16 *G. elongata* Kaulf. de nedre bladen lancettlika, utan hårudd, de öfversta från aflång bas lancettlika med *platta* kanter och *kort, slät* hårudd, *alla bas- och hörnceller rektangulära*; kapseln teml. långt skaftad, äggformig—aflång, gul, med rödbruna, n. *hela* tänder; locket lågt koniskt, *trubbigt, utan spröt.* 2 7, 8. Fig. Br.eur. R. Hn.Bryac.exs.36. Zett.Gr.exs.23.

Fjellklipp. r (*Lul. Lpm.* Wuoka, samt vid Tarraure: Holmgr. *Herjed.* Helags- och Skarfjellen. — N. Dovre, vid Vårstien, Kongsvold, Jerkind och Lilla Nystubøe. Bergen st. Voss. Goustafield.) *Stjelkarne trådlika, klynnegreniga, löst förenade i svarta, tumshöga tufvor. Mer beslägtad med G. atrata och unicolor än med följ.*

- 17 *G. leucophæa* Grev. endast de små, nedersta bladen hårlösa, *alla de öfre större, ägg-rundt aflånga—lancettlika*, med *platta* kanter och *bred, mycket lång, starkt tandad* hårudd, *talrika quadratiske hörnceller* vid basen; kapseln föga öfverstående perichæt-bladens hårudd, äggformig—oval, brun, med purpurroda, till midten oordentligt klufna tänder; locket från konisk bas *sprötspetsadt.* 2 5, 6. Fig. Br.eur. Lindgr. M.exs.93. R.Hn.Bryac.exs.192. Zett.Gr.exs.18.

Klipp. r. (*Sk. Ivetofta; Årup; Bäckaskog; Håstveda. ÖG.* Söderköping; Omberg: Vinnerstad sn allm.: Holmgr. *Stockh. Uppl.* flerst. i Uppsalatrakten. *Ner. Örebro-trakten. VG. Öl. Örmöga etc.: Lindb. — N. Laurvig. Bergen st., Sogn, på Blåfjæten i Lerdal: Dr. Kjør.) Bildar omkr. 1 tum höga, lätt sönderfallande tufvor, gröngröna af de mörka bladen och dessas långa hvita hårudd, hvars bas omgifver bladspetsen; bladens basceller närmast nerven rektangulära. Kapseln teml. stor.*

\*\* Bladen med hårudd; mössan ensidig; tvåbyggare.

- 18 *G. commutata* Hüb. de öfre bladen plötsligt mycket större än de nedre, *lancettlikt syllika*, med *platta* kanter och *föga* lång, något tandad hårudd, rektangulära bas-hörnceller; kapseln på *tydl. utskjutande skaft*, äggformigt oval, brun, med *purpur-röda, till midten oordentligt klufna* tänder; locket med *långt, snedt, syliskt* spröt. 2 5—7. Fig. Br.eur. Somf.t.15. R.Hn.Bryac.exs.280. Zett.Gr.exs.19, 20.

Sten. (*Sk.—Gestr.* vid Oslåfjors: R. Hn. *Vestml. Ner. och Verm.* Öl. enl. Zett. — N. till Trondhj.) *Tufvorna omkring tumshöga, svartgröna, lätt sönderfallande, af uppböjda, nedtill n. bladlösa stjelkar; kapseln stor, höjande sig 1—2 lin. öfver bladspetsarne, med mycket bred ring. Perichæt-bladens hårudd lång. Var. stundom utan hårudd.* — *Dryptodon ovalis* Brid. *Campylopus ovalis* Wg.

- 19 *G. montana* Br. & Sch. de öfre bladen utdraget lancettlika, med *platta* kanter och *mycket lång, tandad* hårudd, rektangulära bashörnceller; kapseln *kort skaftad, icke framskjutande* öfver bladens hårudd, äggformig, brun, med rödaktiga, *högst oordentligt* slika och *håliga* tänder; locket som hos föreg. 2 5—6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.21. Zett.Gr.exs.21.

Klipp. r. (*ÖG.* på Kolmorden, allm. i Qvillinge sn: Mosén. *Stockh. mångenstädes.*

*Uppl.* Uppsala, Husbyborg etc. *Boh.* Koön vid Marstrand: O. G. Blomb. — *N. Christiania.* Lomsfjellen, vid Rödshelm. Dovre, kring Kongsvold.) *Halstumshög* i mjuka, svartaktiga tufvor, icke olik *G. ovata*, men skild med den längre hårudden och ensidiga stora mössan m. m. Kapseln mycket mindre än hos föreg., n. utan ring.

- \* 20 *G. alpestris Schleich.* bladen från bredare bas lancettlika, med kortare, otydligt tandad hårudd, för öfr. som hos föreg.; kapseln något framskjutande öfver bladens hårudd, aflång—n. cylindrisk, brungul, med purpurroda, i spetsen något håliga och sprickiga tänder; locket konvext, med tjock, trubbig värta. 24 7, 8. Fig. Br.eur.

Klipp. i fjelltr. r. (*N. Nordl.* Salten, på Baadfeld: Schl. & Arn. Vangsfjeld i Opdal. Lomsfjellen, på Lomseggen och Suleims Storhøe. Valdres, på Bergsfjeld i Vang. Goustaefjeld.) *Bildar små, halstumhöga, låga, blå- ell. grågröna tufvor, med små framskjutande kapslar, som äro utmärkta af sin långsträckt form; ringen bred. (G. mollis.)*

\*\*\* Bladen utan hårudd; tvåbyggare.

a — Bladen af tät cellväf, smala, med n. utlöpande nerv.

- 1 *G. unicolor Grev.* bladen från aggrund bas hastigt lancettlikt jemnbreda, trubbiga, med platta kanter och alla basceller rektangulära; kapseln långt skaftad, äggformig—aflång, gul, med rödgula, till midten oordentl. sprickiga tänder; locket rödgult, med långt, snedt spröt. 24 6, 7. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.193. Zett.Gr.exs.24.  
Klipp. r. (*Lul. Lpm.* Nammats vid Qvikkjokk, samt Wuoka: Holmgr. *Pit. Lpm.* Istjakk. Herjed. Funnesdalen. Medelp. Sundsvall. *Uppl.* Uppsala, Lässbybackar. Verml. Rånsedssnipan. — *N. Nordl.* Salten. Dovre. Lomsfjellen. Bergen st., Sogn-dal: Wulfsb.; Leirdalsören: Lor. Tellemarken. Egebjerget vid Christiania.) 1—2 tum hög, teml. fin, i n. helt och hållet svartbruna, lätt sönderfallande tufvor; kapseln med mycket bred ring.

- 22 *G. atrata Mielichh.* bladen lancettlikt jemnbreda, trubbad, med tillbakavikna kanter och quadratiska hörnceller vid basen, torra något krusiga; kapseln långt skaftad, aflångt äggformig, brunaktig, med blekgula, hela ell. upptill 2klufna tänder; locket som hos föreg., vanl. med kortare spröt. 24 7, 8. Fig. Br.eur.  
Fjellklipp. r. (*Lul. Lpm.* Qvikkjokk, på Klippholmen: Holmgr. — *N. Dovre,* Vårstien och Kongsvold.) 1—2 tum hög, låt tufvad, med jemnhöga grenar, mycket gröfre än föreg., helt och hållet solsvart ell. med de öfversta topparne gröna; kapseln med bred ring. Frukt icke funnen i Skand.

b — Bladen af stora celler, breda, med kortare nerv.

- 23 *G. mollis Br. & Sch.* bladen konkava, bredt aggrunda—aggrundt lancettlika, trubbiga, endast perichæt-bladen med kort, genomskinlig spets, alla mjuka, med platta kanter och lös cellväf af n. quadratiska celler; kapseln föga utskjutande, aflång, brunaktig, med röda, längs midten håliga tänder; locket högt konvext, med kort udd. 24 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.194. Zett.Gr.exs.22.  
Fjelltr. r. (*Torn. Lpm.* fjellet Ripanes vid Tornio-tråsk. *Pit. Lpm.* Peljekaisse. — *N. Dovre,* vid Kongsvold; Sneehættens fot; Storhøe; Blåhøe. Rundeneffjeld: Zett. Lomsfjellen. Bergen st. Ousedalen, mell. Graven och Vosse. Goustaefjeld.) *Tufvorna in- emot tumshöga af tjocka stjelkar, på stenar i fjellbackar ofta 2 tum, med bredare blad (: var. aquatica Sch.), alltid mjuka och ljusgröna, liknande ett Orthotrichum; kapseln sällsynt, liten, med smal ring; ensidig, mycket flygtig mössa. — G. orthotrichoides Hn. edd.5—9, det i sjelfva verket äldsta namnet, men några månader senare publiceradt än det af Br. & Sch. gifna.*

### 83. RACOMITRIUM Brid.

† *Dryptodon.* Stjelken klynnevis delad i upprätta, n. jemnhöga grenar.

\* Bladen trubbad, utan hårudd.

a — Kapseln på bågliket nedböjdt skaft.

- 1 *R. patens Hüb. och Sch. Syn.* bladen torra tilltryckta ell. något ensidiga, från bre-



dare bas utdraget lancettlika, med *smal trubbad spets*, tillbakavikna kanter, i spetsen försvinnande nerv; bladspetsens celler rundadt kvadratiske, basens smalt jemnbreda, i hörnen rektangulära; kapseln oval, slutt. rynkigt färad. med röda, djupt och oordentligt 2delade tänder; locket långt sprötsadt. 2½ 5. Fig. Br.eur. [*Grimmia*]. Lindgr. M.exs.44. R.Hn.Bryac.exs.37. Zett.Gr.exs.25.

Klipp. (Smål. Hall. och Boh.—Verm. Dal. och Helsl. Medelp. Sundsvall: Holmgr. — N. till Nordl. Finnm. Maalselvdalen: Holmgr.) 1—flera tum hög, svart- eller brungrön, i lösa, lätt sönderfallande tufvor. — *Bryum Dicks. Trichostom. Schwægr. Campylopus Wg.Fl.Su. Grimmia Br. & Sch. och ed.9. G. arcuata Not.*

b — Kapseln på rakt, upprätt skaft.

\*2 *R. ellipticum Br. & Sch.* bladen från bredare bas lancettlikt *syllika*, med själva spetsen trubbad och *helbräddad*, kanterna *platta*, men förtjockade, nerven försvinnande i *yllersta spetsen*; bladspetsens celler rundadt kvadratiske, basens n. jemnbreda; kapseln *rundad*, mörkbrun, med röda, till *midten* oordentligt 2—3klufna tänder; locket med långt och *rakt*, syllikt spröt. 2½ 10—4. Fig. Br.eur.

Klipp. r. (N. Bergen, på Marmorholmens strandklippor. Monken utanför Trondhjems-fjorden enl. Ångstr.) *Knappt tumshög, svarbrun med gröna toppar; kapseln ½ lin. lång och n. lika tjock. Liknar mest Grim. commutata, men lätt skiljd med lockets raka spröt och bladens cellväf.* — *Dicranum Turn.*

3 *R. protensum Al. Br.* bladen från bredare bas *jemnbredt lancettlika*, med *rund-trubbig, helbräddad spets, tillbakavikna kanter*, i spetsen försvinn. nerv, cellväf som hos föreg.; kapseln *afång*, ljusbrun, med röda, n. till basen 2delade tänder; locket med *mycket långt, rakt, syllikt spröt*. 2½ 5—7. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.38. Zett.Gr.exs.27.

Fukt. klipp. r. (Sk.—Helsl. Ner. och Verm. Herjed. Funnedsalsberget: Hellb. Boh. Hall. — N. Laurvig. Holmestrand. Christiania, Græsenås: Scheutz. Næs. Stavan-ger. Bergen st., Sogn: Wulfsb. Trondhj. st., Sundalen: Scheutz; Otteröe.) *Växer i ofta stora, upptill vanl. gulgröna, något mjuka mattor, af 1—5 tum långa, nedliggande, icke säll. intrasslade stjelkar med i torrt tillstånd tilltryckta, raka blad; kaps. ½—1 lin. lång, på 3—4 lin:s skaft; lockets spröt ungef. af kapselns längd.* — *R. calaractarum Brid. Grimm. aquatica C. Müll.*

4 *R. aciculare Brid.* bladen vanl. något ensidiga, *smalt åggrundt aflånga*, med trubbig, ojemnt tandad spets, tillbakavikna kanter, under spetsen försvinn. nerv, cellväf som hos föreg., men med *några få, starkt vidgade hörnceller* vid basen; kapseln mörkbrun, äldre svart, för öfr. jemte locket *som hos föreg.* 2½ 5—7. Fig. Br.eur. Fl.D. 1001.f.1. Lindgr.M.exs.19. R.Hn.Bryac.exs.196. Zett.Gr.exs.19.

Fukt. klipp., sten i bäck. (Sk.—Helsl. och Dal. Boh. Christinedal. — N. till Hammerfest.) *Tufvorne mörkare gröna, ända till svarta, af 1—2 tum höga, tjockare och styfvere, vanl. uppböjda stjelkar, med bredare blad än hos de föreg. Kaps. som hos föreg.* — *Bryum L. Campylopus Wg.*

\*\* Bladen med hvit spets ell. hårudd.

5 *R. sudeticum Br. & Sch.* bladen lancettlika med *smal, genomskinlig hvit spets* ell. mycket kort, omärkligt naggad hårudd, tillbakavikna kanter och i bladspetsen n. *quadratiske* celler; kapseln liten, elliptiskt aflång, brun, med röda, djupt 2delade tänder; locket med syllikt spröt af omkr. halfva kapselns längd. 2½ 5, 6. Fig. Br. eur. R.Hn.Bryac.exs.39. Zett.Gr.exs.28.

Berg, klipp. r. (Lul. Lpm. Nerest: Holmgr. Pit. Lpm. Kåbrenåive. Jemt. Soassa-högen; Åreskutan. Herjed. Funnedsalsberget: Hellb. Verm. Hackrandsberget. VB. Umeå; samt Ångml.: Holmgr. Helsl. Mo sn, Kasberget. Stockh. Vinterviken. — N. Finnm.—Goustafeld.) 1—2 tum hög, svarbrun, ofta med gröna toppar; kaps. liten, teml. kort skaftad. — *Trichostomum Funck. Grimmia C. Müll.*

†† *Racomitrium* [i eg. men.]. Med talrika, korta och utstående sidogrenar.

\* Bladen med hvit spets ell. hårudd.

a — Bladens hårspets icke papillös.

6 *R. microcarpum Brid.* bladen lancettlika, med *kort, tandad, hvit spets, tillbakavikna*

kanter och ända upp till spetsen smalt jemnbreda, slingriga celler; kapseln aflång, gulbrun, med sprötspetsadt lock af halfva kapselns längd. 2½ 7, 8. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.14. R.Hn.Bryac.exs.40. Zett.Gr.exs.34.

Sten. (Lpl.—Gestr. Dal. och Verml. allm.; i de sydligare prov. ned till Smål. mer sparsamt. — N.) Bildar knappt tumshöga, låga, brun- ell. gulgröna tufvor, med all- ell. ensidigt utstående blad, och meränd. med talrika små frukter af knappt ½ lin. längd, på 3 lin. skaft. Enklare former stund. nog lika föreg., men skiljbara på cellväfven i bladets spets. — *Trichost. Funck.*

7 *R. heterostichum* Brid. bladen lancettlika, med vanl. lång, småtandad hårlig udd, något tillbakavikna kanter och i spetsen rundade ell. kvadratiska celler; kapseln aflång—cylindrisk, rödbrun, med långt sprötspetsadt lock. 2½ 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2307.f.1. Thed.M.exs.115. R.Hn.Bryac.exs.195. Zett.Gr.exs.29, 30.

Berg, a. (Sk.—Lpl. och VB. Öl. enl. Zett. — N.) I högsta grad varierande, med än mycket lång, än n. ingen hårudd, i hvilket fall den liknar *R. fasciculare*, samt med än talrika, än n. inga små sidogrenar, då den mycket närmar sig *R. sudeticum*. Vanl. i tumshöga, grågröna tufvor, med utstående ell. ensidigt böjda blad, talrika, vid pass en lin. långa frukter, på 2—3 lin. långa skaft. — *Trichost. H. Grimmia C. Müll.*

b — Bladens hårspets starkt papillös.

8 *R. canescens* Brid. bladen åggrundt lancettlika, med utdragen, naggad hårspets, tillbakavikna kanter och i spetsen n. kvadratiska celler, öfverallt fint, men tydligt papillös; kapseln långt skaftad, aflångt och smalt äggformig, med mycket långa, hårfinna tänder; locket med rakt, syllickt spröt af kapselns längd. 2½ 5—7. — *β ericoides*: grenarne knutiga af talrika korta och trubbiga smågrenar. Fig. Br.eur. Fl.D. 2561.f.1; *β* 2497.f.2. R.Hn.Bryac.exs.283. Zett.Gr.exs.37; *β* 38—40. *β* Lindgr.M.exs.89.

Berghällar, a. (Sk.—Lpl. Öl. enl. Zett. — N.) Vanl. 1—3 tum hög, upprätt och mycket grofre än de 2 föreg., i lösa, gråaktigt gulgröna mattor af stor vidd, med några tumslånga fr.skaft; bladen var. någon gång utan hårudd. — *Trichostom. Hedw. β, Trichost. ericoides* Schrad., anses af Lindb. för hufvudform.

9 *R. lanuginosum* Brid. bladen lancettlika, mot spetsen med genomskinliga, hvita, jemte den långa hårspetsen sargadtflikiga, dernedom tillbakavikna kanter, mot basen omärkligt papillösa, af celler som hos föreg.; kapseln kortare skaftad, från korta sidogrenar, liten, äggformig ell. oval, med teml. långa tänder, lockets spröt kortare än kapseln. 2½ 5—7. Fig. Br.eur. Fl.D.2561.f.2. Lindgr.M.exs.18. R.Hn. Bryac.exs.282. Zett.Gr.exs.35, 36.

Berg, a. (Sk.—Lpl. — N.) Växer i låga, intrasslade, ofta kvartersdjupa mattor af grågrön färg, med mycket längre, men spensligare stjelkar än föreg.; fr.skaften 2—3 lin. långa, samlade på de 1—2 lin. långa sidogrenarne; kapseln mycket kortare och vidare än hos föreg. Var. stundom med n. omärkligt hårspets. — *Bryum hypnoides* L., i hvilket namn dock flere arter inbegripas. *Racomitr. hypnoides* Lindb.

\*\* Bladen utan hårudd.

10 *R. fasciculare* Brid. bladen från något bredare bas n. jemnbredt lancettlika, trubbad, med tillbakavikna kanter och jemnbreda celler ända upp till spetsen; kaps. teml. långt skaftad, oval—aflång, rödbrun, med sylsprötadt lock, kortare än kapseln. 2½ 5—7. Fig. Br.eur. Fl.D.2497.f.1. Lindgr.M.exs.88. R.Hn.Bryac.exs.197. Zett.Gr.exs.31—33.

Berg. (Lpl.—Smål. Sk. vid Höör och Fogdaröd: Berggr.; Broby sn: Hamnstr. — N.) Stjelkarne vanl. 2—3 tum långa, teml. grofva, nedliggande, med n. knippetvisa hufvudgrenar, talrika korta utstående smågrenar, i lösa, mörk- ell. svarigröna mattor, med utstående blad, slutt. svartnande kapsel. — *Trichost. Schrad. Rac. virescens* Lindb.

### 36 Flocken *Cinclidotæ*.

#### 84. CINCLIDOTUS Pal. Beauv.

1 *C. fontinaloides* PB. bladen n. rännformiga, aflångt lancettlika, spetsade, med udd af den utlöp. nerven, tjocka, helbräddade kanter; kapseln ganska kort skaftad, n. inno-

skuten mell. de mycket korta sidogrenarnes blad, aflångt äggformig, brun, torr strim-  
mig, med i långa hårfina likar djupt 2—3delade tänder, och smalt kägellikt, spet-  
sigt lock. 24 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2617. R.Hn.Bryac.exs.227.

Stenar i vatten, r. (Sk. Skärall. ÖG. Linköping, i Tinnerbäcken. Öl. vid Karlevi.  
Gottl. vid Kopparvik; vid hafstr. mell. Visby och Lummelund: Holmgr.) Flere tum,  
ända till quarterslång, svartgrön, flytande ell. hängande, knippevis förgrenad, ej  
olik en *Fontinalis*, men med grof nerö. Hånblirna talrika i n. hufvudlika gyll-  
ringar. — *C. minor* Lindb. Trichost. H. Racomitr. Brid. Gumbelia C. Müll.

## Q. — POTTIACEÆ.

### 37 Flocken *Trichostomææ*.

#### 85. TORTULA \*) (Hedw.) Schreb.

† *Syntrichia*. Peristomets nedre del långt rörformig.

\* Blr 2könade.

- 1 *T. princeps* Not. bladen konkava, bredt aflånga, trubbad, med rödbrun nerv ut-  
löpande i en teml. lång, hvit, n. slät hårudd, och nedtill tillbakavikna kanter; kap-  
seln small cylindrisk, något böjd, med peristomets nedre rörformiga del n. lika lång  
som sjelfva tänderna. 24 5, 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.307.  
Sten. r. (Gottl. Snäckgårdet vid Visby; samt vid hafstr. midt för L. Carlso: Holmgr.;  
vid stranden mell. Boge och Tjälbers.) Stor som följ., men i tätare och mer tät-  
bladiga, brungröna tuvor, med tumshöga fr.skaft, 1½ lin. lång, mycket smal, röd-  
brun kapsel, kägellikt (likasom alla arterna), rödt ell. rödgult lock. — *Barbula*  
*Malleri* Br. & Sch.

\*\* Tvåbyggare.

- 2 *T. ruralis* Ehrh. bladen från omslidande bas sperrigt ut- och nedåt böjda, kölade,  
utdraget aflånga, trubbiga, med lång hvit, starkt taggig hårudd och ända upp till-  
bakavikna, upptill papillöst naggade kanter, nervens baksida småtaggig; kapseln cy-  
lindrisk, för öfr. som hos föreg. 24 6—8. — β *calva*: till alla delar mindre, med  
mycket kort bladdudd, smalare kapsel. Fig. Br.eur. Sv.B.270. Fl.D.2495,f.2. R.Hn.  
Bryac.exs.213.

\* *danica* (M. T. Lge): till alla delar mindre och spädare, mörkgrön, med n. platta  
ell. endast nedtill tillbakavikna bladkanter, slätare hårudd. Fig. Fl.D.2809,f.2. R.  
Hn.Bryac.exs.214 [*Barb. lævip.*].

Sten., tak etc. a.; \* trädst. r. (Sk.—Lpl. — N. — β ÖG. V. Ny sn. Åsen. — \* Sk. V.  
Vram. Blek. Carlskrona, i Hoglands park och Gröna gången.) Hufvudformen bildar  
stora lösa, brunaktiga, 1—2 tum tjocka mattor, med teml. glest sittande blad, som  
endast i torrt tillstånd äro upprätta, i friskt utsperrade. De af Lindb. och Milde  
såsom en hufvudkaraktär uppgifna vecklika längdränderna nära bladkanterna  
saknas, såvidt utg. kunnat finna, mycket ofta, om ej oflast. Var. i Nerikes kalk-  
trakter med röd hårudd. — β närmar sig följ. art, hvarmed den af Milde för-  
enas; och \* utgör, ehuru skild derifrån med blirnas kön, en medelform till *T.*  
*lævipila*, hvarmed den hos oss länge varit förveclad. — *Bryum* L. \* *Barbula*  
*danica* M. T. Lge. *T. lævipila* ed.9 till en del.

- < 3 *T. intermedia* Wils. bladen upprätt utstående, n. platta, från smalare bas spädlikt  
aflånga, rundtrubbiga ell. i spetsen intryckta, med mycket lång, sågad hårudd och  
endast nedtill svagt tillbakavikna, upptill n. omärkligt naggade kanter; nerven n.  
slät; kapseln kortare skaftad än hos föreg., sjelf kortare, small cylindrisk, för öfr.  
som hos föreg. 24 5, 6. Fig. R.Hn.Bryac.exs.309.

Kalkklipp. r. (Öl. Tveta och Köpings branter: Zett. Gottl. Elsta sn; Visby, på Gals-

\*) De af Hedw. först uppetälda begge släktena *Tortula* och *Barbula* förenades af  
Schreb. till ett enda, för hvilket han, jemte de flesta engelska bryologer samt Notaris m. fl.  
behållit det förra namnet, hvaremot C. Müll., Br. & Sch. m. fl., äfven förenande begge  
släktena till ett, föredragit det sednare.

berget; Slite; Hesse i Fleringe sn; Stora Carlsön, äfven med fr.: Holmgr.) Omkr.  $\frac{1}{2}$ —1 tum hög, i låta tufvor af svartaktig färg, hwaremot den hvita hårudden, som iöfverhet hos de öfversta bladen ofta är längre än hela bladskifvan, blir så mycket märkbarare; bladens celler hälften mindre än hos föreg. — *Barb. ruralis*  $\beta$  *rupestris* Br. & Sch.

- 4 *T. papillosa* Wils. bladen utstående, kopkava, från n. qvadratisk bas rundadt spadlika, trubbiga, med mycket kort och slät, endast i spetsen hvit udd af den utlöpande, gröna, starkt papillösa, upptill knoppelstrande nerven, och med platta kanter; de öfre bladcellerna mycket stora, löst förenade, rundadt sexsidiga. 2 $\frac{1}{2}$ . Fig. Jens. Bryol. Dan. t. 6, fig. 30, f. 6. Bergr. Iakttag. t. 2, f. 17. R. Hn. Bryac. exs. 215.

Trädstamm. r. (Sk. Lund, i Lundagård etc.; ej sällsynt på slätbygdens pilstammar. Blek. Carlskrona, i Hoglands park, på almar; Carlshamn. VG. vid Göteborg: Bergr. enl. Holmgr.) Från ett par lin. till en half tum hög, i små rundade tufvor af svartgrön färg; bladbasens celler genomskinliga, n. qvadratiske, de öfriga fyllda af grönsyft, men skilda medelst smala, klart genomskinl. mellanrum, på undre sidan papillösa. Frukt okänd; förökas genom de små groddknopparne från bladnerven. — *T. rotundifolia* Hn edd. 5—7, något yngre namn. Barb. papill. C. Möll.

- 5 *T. latifolia* Hn. bladen utstående, de öfre n. roselllikt gyltrade, omv. äggrunda—bredt tunglika, rundtrubbiga ell. i spetsen intryckta, utan hårudd, med i spetsen upphörande nerv och platta, endast nedtill tillbakavikna kanter; bladcellerna små, penkilika, kapseln teml. kort skaftad, cylindrisk, med peristomets rörformiga del hälften så lång som sjelfva tänderna. 2 $\frac{1}{2}$  5. Fig. Br. eur. Bergr. Iakt. t. 3, f. 1. R. Hn. Bryac. exs. 216.

Trädstamm., murk. ved, säll. på sten, r. (Sk. Lund. på gamla pilar och almar; V. Vram. Blek. Wedeby, på pilträd.) Till storlek och färg ej otik föreg., men lätt skiljd med de hårlösa bladen och dessas låta celldaf, samt från *T. lævipila* med blernas kön och håruddens frånvaro. Från spridda punkter på sjelfva bladskifvan utvecklas dylika groddknoppar som från nerven hos föreg. Frukt ej funnen i Sverige. — *Syntrichia* Bruch enl. Brid.

- 6 *T. norvegica* Wg. bladen sperrigt utstående, konkava, äggrundt lancelllika, spetsade, med teml. lång, föga sträf, röd hårudd af den utlöpande nerven, och med tillbakavikna kanter; kapseln långt skaftad, aflång, med peristomets rör som hos föreg. 2 $\frac{1}{2}$  7. 8. Fig. Br. eur. [*Barb. aciphylla*].

Klipp., helst i fjelltr. r. (Lul. Lpm. Wuoka: Holmgr. Pil. Lpm. Tjidsjakk och Wittjokk. Herjed. Axhøgen: Hellb.; Stora Midtåkläppen: Oldb. Dal. Osmundsberget. — N. Finnm. Flöjelfeld vid Tromsø: Holmgr. Nordl. Örnefeld och Vesteraalie i Helgeland: A. Bl. & Arn. Dovre.) Till storlek och habitus mest lik *T. ruralis*, rödbrun, men lätt skiljd med bladspetsens form och håruddens färg. Frukt ej funnen i Skand. — *Syntrichia* WM. Tort. *aciphylla* Spruce och edd. 5—8.

\*\*\* Sambyggare.

- 7 *T. lævipila* Schwægr. bladen utböjda, aflångt spadlika, med rundtrubbig, något urnuppen spets, lång, n. slät, hvit hårudd af den utlöpande, röda, på baksidan släta nerven, och ofvan midten platta kanter; kapseln teml. långskaftad, aflångt cylindrisk, något böjd, med peristomets rör knappt hälften så långt som de flere gånger hopvidna tänderna. 2 $\frac{1}{2}$  6—8. Fig. Br. eur. Fl. D. 2809, f. 1. Rab. Bryoth. 322.

Trädstamm. r. (Sk. vid Lund; samt i Näs sn. Öl. Mörbyhilla, på ask enl. Zett.) Växer i låga och låta, gröna tufvor; bladen upptill papillösa; håruddens nedre del stund. rödaktig. — *Syntrichia* Brid.

- 8 *T. alpina* Wils. bladen utstående—utböjda, aflångt spadlika—tunglika, trubbad, med ingen ell. ganska kort, n. slät, vid basen röd hårudd, bildad af den utlöpande, röda nerven, med nedom midten tillbakavikna kanter, tätt papillösa; kapseln cylindrisk, något böjd, med peristomröret flere gånger kortare än sjelfva tänderna. 2 $\frac{1}{2}$  8—10. Fig. Br. eur.

Klipp. r. (Götl. Thorsborg: Lindb.) I halftumshöga, mjuka tufvor, spädare än föreg., med mindre trubbiga blad, smalare kapsel. Sv. ex. utan frukt.

- 9 *T. subulata* H. bladen n. tunglika, spetsade, med kort udd af den utlöpande nerven,

helbräddade, naggade ell. i spetsen sågade, kantade med gulaktiga, rektangulära celler, papillösa; kapseln utdraget cylindrisk, något krökt, med peristomets rör af själva tändernas längd ell. längre. 2 4, 5. Fig. Br.eur. Fl.D.1000,f.2. Lindgr. M.exs.96. R.Hn.Bryac.exs.95.

Mur., jord, kalkhäll. (Sk.—Uppl. Ner. och Verml. Boh. Strömstad: G. Théel. Öl. enl. Zett. Goult. — N.) Stjelken ofta blott ett par lin., stundom mer än halftumshög; bladen stora; kapseln med locket 2—3 lin. lång. — *Bryum L.*

- 10 *T. mucronifolia* Schwægr. bladen aflångt spadlika, spelsade, med teml. lång udd af den utlöp. nerven, helbräddade, okantade, med vid basen tillbakavikna kanter, icke papillösa; kapseln aflångt cylindrisk, sned, med peristomröret kortare än själva tänderna. 2 6—8. Fig. Br.eur. Fl.D.suppl.t.115,f.2. R.Hn.Bryac.exs.96.

Fjelltr. r. (Lul. Lpm. Qvikkjokk, vid kyrkan. — N. Finnm. Alten. Trondhj. st. Örkedalen, vid Bjergaker. Dovre, vid Drivstuen och Kongsvold. Gudbrandsd., Laurgård: Wiik: Scheutz. Bergen st. Sogn, vid Optun i Lyster: Bl.; Maristuen: Lor.) Nära beslägtad med föreg., hvaraf Lindb. anser den endast vara en fjellform. — *T. subulata* β *laevifolia* Lindb.

†† *Pleurochæte*. Peristomets nedre rörformiga del mycket kort; fr.skaften vanl. från den utdragna stjelkens sidor; bladen tunna, med smal, tydlig nerv, i spetsen sågade.

- 11 *T. squarrosa* Nol. tvåbyggare; bladen sperrigt utböjda, torra krusigt hopvridna, från bredare bas smalt lancettlika, spetsiga, med utlöp. ell. i öfversta spetsen försvinn. nerv, ofvan midten ojemnt sågade, papillösa; kapseln aflångt cylindrisk, något krökt, med ytterst fina, starkt papillösa tänder. 2 5, 6. Fig. Br.eur. Kalkberg, r. (Goult. på Hoburgen: Lindb.) 1—2 tum hög, lifligt grön och spröd, i lösa tufvor, utan rolludd, med nedtill glesare, i grenlopparne tätare sittande blad. Frukt icke funnen på Sv. ex.; dessa har utg. ej sett. — *Pleurochæte squarrosa* Lindb.

††† *Barbula*. Bladen helbräddade ell. blott smånaggade af papiller; fr.skaften fr. toppen. För öfr. som föreg. afd.

\* *Tortuosa*. Bladen med platta kanter, torra sammanvridna. Tvåbyggare.

- 12 *T. tortuosa* Ehrh. bladen vågiga, från aflång, hvit bas jemnbredt lancettlika, småningom smalspetsiga, med kort udd af den utlöp. nerven och platta, af papiller naggade kanter; kapseln upprätt, brun, cylindrisk, något krökt, med flere gånger vridna tänder. 2 5—7. Fig. Br.eur. Fl.D.880,f.1. R.Hn.Bryac.exs.94.

Klipp. etc. (Sk.—Lpl. Öl. Goult. — N. till Finnm.) Bildar stora, 1—2 tum tjocka, vanl. gulaktigt gröna mattor, med i friskt tillstånd n. sperrigt utböjda, i torrt krusigt hopvridna blad. — *Bryum L.*

- 13 *T. inclinata* H. bladen som hos föreg., men något bredare och mera kort, n. kuflikt spetsade mot den mycket korta udden; kapseln lutande, gulaktig, snedt kägellik, vanl. krökt, med mindre hopvridna tänder. 2 5, 6. Fig. Br.eur.

Klipp., jord, r. (Öl. mångenst., isynnerhet i södra delen allm. enl. Zett. — N. vid Christiania: Zett. Bergen st., Sogn, Skogadalsnaasi: Wulfsb. Finnm. Maalselvdalen: Holmgr.) Omkring halftumshög, tjock, gul- ell. brunaktig, och föga skiljd från föreg., ätm. i sterilt tillstånd, såsom alla skand. ex., utg. sett.

- 14 *T. fragilis* Wils. bladen styft upprätta ell. föga utstående, torra sammanvridna, mycket spröda, från lancettlik bas långt och syliskt afsmalnande till en fin, spröd udd, bildad af den hela bladspetsen uppfyllande nerven, helbräddade, tät papillösa; kapseln kägellik, n. rak, med flere gånger vridna tänder, och lock n. af kapselns egen längd. 2 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.152.

Fukt. jord, klipp. och hafsstr. r. (Lul. Lpm. Qvikkjokk, Jokkmokk m. fl. st.: Holmgr. — Herjed. och längs kusten till Stockh. ÖG. Linköping, Kettilbergen: Kindb.; Näs och Vinnerstad. VG. Kinnekulle, m. fr. Sk. Krogstorp i Ilvetofta etc. Öl. flerst.: Zett. Goult. flerst. — N. Finnm. Tromsö; samt Maalselvdalen: Holmgr. Dovre, Drivstuen och Kongsvold; vid Sprenbäcken m. fr. Gudbrandsd., Elstad i Ringeboe: Bergr.; Laurgård: Holmgr.) På stränder och i klippspringor tumshög, i fjellmyrarna ofta 3 tum, alltid tät tufvad, till alla delar ytterst spröd, sård. bladspetsen, som vid

lättaste beröring springer af. Mycket sälls. m. fr. — *Didymodon* Hook. *Trichost.* C. Müll. Barb. *Drummondii* Müll.

\*\* *Unguiculatæ*. Bladen med hoprullade kanter utan hårudd, mörkgröna ell. brunaktiga. Tvåbyggare.

a — Nerven upphörande med bladspetsen (icke bildande någon udd).

- 15 *T. cylindrica* Lindb. bladen glest sittande, uppåt större, toppbl. störst, n. rosettlíkt gytttrade, alla ut- och flerböjda, torra krusiga, från kort, n. äggrund bas småningom utdragel syllika, spetsiga, med till midten ell. längre upp tillbakavikna kanter och talrika, rektangulära, genomskinn. basceller, papillösa; kapseln kägellik, med engång hopvridda tänder; locket af halfta kapsels längd. 2½ 5, 6. Fig.

Kalkklipp., jord, r. (Sk. Tydinge i Broby sn; Bosjöklöster, samt Wrangelsborg nära Ringsjön; Berggr. Öl. flerst.; samt Gottl. allm.: Lindb.) Omkr. tumhög, löst tufvad, vanl. rödbrun, strax igenkänlig på de öfre långa och krusigt vridda bladen. Den mycket närstående, utl. *T. vinealis* Not. skiljes bland annat med quadratiske celler vid bladens bas; fr. ej funnen i Sv. — *T. vin. β flaccida* Wils. och ed.9. Barb. cylindr. Tayl.

- 16 *T. fallax* Schrad. bladen sperrigt ut- och nedböjda, torra krusiga, kölade, från bredare bas lancettlika—n. jemnbreda, spetsiga, med upp mot spetsen tillbakavikna kanter, svagt papillösa, med talrika, genomskinn., n. rektangulära basceller; kaps. n. kägellik, med flere gånger hopvridda tänder, syllick lock af omkr. kapsels egen längd. 2½ 9—5. Fig. Br.eur. Fl.D.2309.f.1. Sill.M.exs.172. R.Hn.Bryac.exs.250.

Jord, väkant. etc. (Sk.—Medelp. och Jemt. Öl. Röstlösa; samt Böda skog: Lindb. — N. till Nordl.) Stjelkarne vanl. ¼—1 tum höga, n. svartgröna ell. mörkbruna; var. dock mycket till storlek och färg. — *Bryum imberbe* Huds.; deraf Tort. imberbis Lindb.

- 17 *T. recurvifolia* Berk. bladen skärformigt nedböjda, torra löst tilltryckta, föga krusiga, kölade, från äggrund bas kort lancettlika, spetsiga, med ungefär till midten tillbakavikna kanter, starkt papillösa, endast de nedersta bascellerna genomskinn. och n. rektangulära; kaps. cylindrisk, rödbrun, med sylsprötadt lock och tand. som hos föreg. 2½ 9, 10. Fig. R.Hn.Bryac.exs.308.

Klipp. r. (Sk. Lund: Lindb. VG. Kinnekulle, vest. om Husaby; Mösseberg, vid Klefva: O. G. Blomb. Öl. Karlevi: Lindb.; Tveta, Älgutsrum och Köpings branter: Zeit. Gottl. Othems klint; Slite. — N. Christiania, nära Sandvigen: C. Hn.) Växer i stora och lösa, på Gottl. mer svartaktiga, eljest vanl. rödbruna mattor af 1—2 tum tjocklek och är i allmänhet dubb. gröfre än föreg., hvarifrån den mera skiljer sig med habitus än karakterer; bladen märkbart kortare och bredare, samt särd. på nervens undersida vida mer papillösa än hos föreg. — *T. reflexa* Brid. och Lindb. Detta i Sp. Musc. gifna namn ändrades dock senare i Bryol. univ. af Brid. sjelf till Barb. *fallax γ refl.*, hvarefter både arten och namnet synas hafva fallit i glömska, tills Wils. åter urskiljde den förre som ny: (*Grimmia*) *recurvifol.* Wils., hvilket artnamn sedan blifvit allmänt antaget.

b — Nerven utskjutande till en kortare ell. längre udd.

- 18 *T. unguiculata* Roth: bladen utstående, kölade, torra något krusiga, äggrundt—af långt lancettlika, vanl. trubbad med kort udd af den utlöp. nerven, och till midten tillbakavikna kanter, papillösa, med färglösa, rektangulära basceller; perichæt.bl. lika stjelkbl.; kaps. aflång—n. cylindr., rödbrun, med långt sprötspetsadt lock och flere gånger hopvridda tänder. 2½ 4, 5. Fig. Br.eur. Fl.D.2308.f.1. Thed.M.exs.114. R.Hn.Bryac.exs.251.

Mur., äkr. etc. (Sk.—Gestr. Dal. och Verml. Öl.: Lindb. Gottl. — N. till Nordl. Salten.) Stjelk. ¼—knappt 1 tum höga i ofta vidsträckt, mörkgröna, mjuka tufvor. Träffas på kalkberg mycket gröfre, med stora högröna blad, korta frskäft: var. robusta Lindb. Varierar för öfr. i hög grad. — *T. selacea* Lindb.

- \*19 *T. icmadophila* (Sch.) Lindb. bladen upprätt utstående ell. tilltryckta, styfva och raka, icke krusiga, från äggrund bas hastigt syllika, med smal spets, till öfre delen bildad af den utlöp. nerven, upp emot spetsen tillbakavikna kanter, bredt rektangulära, ljusgröna basceller; perich.bl. aflånga, rundtrubbiga, med lång udd; kaps. aflång, brun, med lock och täud. som hos föreg. 2½ 8. Fig. Br.eur.

Fukt. klipp. r. (N. Dovre, på klipp. öst. om elfven vid Drivstuen; Kongsvold, nära Sprenbäcken. Gudbrandsd., vid Ringebø vest. om Lougen. Allt enl. Berggr.) *Norska ex. 1—1½ tum höga; ull. ex. från Schimp. mycket högre, för öfr. lika. Växer i låta, lätt sönderfallande, nedtill bruna, upptill mörk- ell. brungröna tufvor af spensliga stjelkar. Frukt ej funnen i Skand. — Barbula Sch.*

- 20 *T. Hornschuchiana* Not. bladen utstående och *utböjda, torra något vridna, kölade, lancettlika, spetsiga* med udd af den utlöp. nerven, upp *emot spetsen* tillbakavikna kanter, rektang. basceller; perich.bl. med platta kanter. längre udd, *för öfr. lika stjelkl.*; kaps. aflång, något böjd, med lock och tand. som hos föreg. 2½ 5. 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.306.

Sandjord, vågkant. r. (Stockh. Drottningholm: Lindb.; Dockans äng; Tranholm. Ö. Karlevi m. fr.; samt Örmöga gästgg. och Vickelby ster.: Lindb.) *Mycket lågodat, med knappt halftumshöga, n. trådmala stjelkar, vanl. brunaktig; ex. från Drottningholm dock lifligt gröna.*

\*\*\* *Convoluta*. Bladen som i afd. \*\*, men ljus- ell. gulgröna. Tvåbyggare.

- 21 *T. revoluta* Schrad. bladen något utstående, styfva, kort lancettlika, trubbad med *kort udd af den utlöp. nerven, från nedom midten ända upp till spetsen bredt* tillbakarullade kanter, papillösa; perich.bl. *spetsiga, med nerv*; kaps. på *nedtill rödt* skaft, aflång, rödbrun, dubb. längre än sitt lock. 2½ 5. 6. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth. 422.

Kalkberg, mur. r. (Gottl. på ön Furilen.) *Stjelkarne 3—4 lin. höga, lätt tufvade, med lätt sittande, torra tegellagda och något vridna blad; fr.skaften ej så långa som hos följ., endast upptill gula.*

- 22 *T. convoluta* Schrad. bladen mer och mindre utstående, lancettlika—jembredt tunglika, spetsade ell. trubbad, med svag, i ell. *under spetsen upphörande* nerv, platta, endast mot basen tillbakavikna kanter, papillösa; perich.bl. *trubbiga, med ell. utan udd, nerlösa, hoprullade*; kaps. på *mycket långt, gult* skaft, n. kägellik, rödbrun, med lika långt syliskt lock. 2½ 5. 6. — *β fragilifolia* Spruce: bl. mycket längre. jembreda, ut—nedböjda. i kanten vågiga. Fig. Br.eur. Fl.D.2614,f.2. Sill.M.exs.173. R.Hn.Bryac.exs.154.

Jord, torra st. etc. (Sk.—VB. Skellefteå; och Jemt. Ragunda, vid Krångforsen: Arn. Ö. Gottl. — N. till Nordl. — *β* Ö. Röstlösa; samt Gottl.: Lindb.) *Växer i ofta vidsträckt, fasta tufvor af knappt halftumshöga, nedtill bruna, ofvan lifligt gulgröna stjelkar, med fina, tumslånga ell. längre, ända nedifrån gula fruktskaft.*

\*\*\*\* *Cuneifolia*. Bladen med hvit hårudd. Sambyggare.

- 3 *T. muralis* H. bladen aflånga—bredt tunglika, trubbiga med mer ell. mindre lång hårudd, skenbart kantade genom kanternas invikning; kaps. aflång—cylindrisk, med långspröadt lock och flere gånger hopvridna tänder. 2½ 4—10. Fig. Br.eur. Fl.D. 2308,f.2. R.Hn.Bryac.exs.153.

Murar, kalkberg. (Sk.—Uppl. Uppsala; Löfsta prestg. Ner. Bysta; Kumla sn; Carlslund etc.: C. Hn. Ö. flerst.: Zett. Gottl. — N.) *Bildar låga, vanl. blågröna, af bladens håruddar ofta hvitgrå tufvor, ell. ock växande spridd; stjelkarne ett par lin.—halftumshöga; fr.skaften omkr. ½ tum höga. — Bryum L.*

++++ *Tortula* [i eg. men.]. Perist. som hos afd. *Barbula*; stjelen mycket låg [1—2 lin.]; bladen mycket tjocka, konkava af de inåt omböjda kanterna, med mycket bred, upptill på öfre sidan af små ledade trådar betäckt nerv.

\* Tvåbyggare.

- 24 *T. aloides* Ångstr. bladen *utstående, jembredt lancettlika, spetsiga, med en upphöjd* rand längs undre sidans midt; kaps. *lutande—horizontal, cylindrisk, något böjd, med engång hopvridna tänder; mössan af lockets längd.* © 5. 6. Fig. Br.eur. Lerjord, r. (Gottl. vid vägen mell. Visby och Koppavik 1865: Lindb.) *Växer liksom de följ. spridd ell. grupperis. Stjelen 1—2 lin. högd, med 8—9 blad; fr.skaftet på Gottl. ex. omkring 3 lin., på utländska stund. 5—6 lin. högt. — Trichostomum Koch. Tori. rigida Sm.*

\*25 *T. ambigua* Ångstr. bladen *stjernetlikt utbredda*, från äggrund bas *afånga* med *haklikt inkrökt spets*, på undre sidan *rödaktiga*; kaps. *upprätt*, cylindrisk, något *sned*, torr *färad*, med *tänd*. och *mossa* som hos *föreg.* ☉ 5, 6; 8, 9. Fig. Br.eur.

Lerjord, r. (*N. Gudbrandsdalen*, mell. *Hundtorp* och *Brandvold*.) Något *större än föreg.*, men *lika såbladig*, med *tjockare* och *trubbigare spröt* på kapseln lock. — *Barbula* Br. & Sch. *Ar.*, *enl. Schimp.*, jemte *följ. art de flesta äldre författares Barb. rigida*.

\*26 *T. stellata* Lindb. bladen *utstående*, elliptiskt—smalt *afånga*, *trubbiga ell.* med *kort udd*; kaps. *upprätt*, kägellik, något *sned*, med *flere gånger* hopvridna *tänder*; mossan nående ned på *halfta kapseln*. ☉ 5, 6; 8, 9. Fig. Br.eur. [*Barb. rig.*]. Somf.Cr. exs.111.

Lerjord, r. (*N. Christiania*, *Trondhjem*.) Obetydligt *mindre än föreg.*, med *lika så blad*, samt *smalt och spetsigt spröt* på *locket*. — *Bryum stellat.* Schreb. *Barb. rigida* Br. & Sch., hvilket namn varit hänfördt till *hvaroch en af arterna i denna afd. och derigenom fått en så vacklande betydelse*, att det torde vara räddast att alldeles bortlägga *detsamma*.

\*\* Blr 2könade.

27 *T. brevirostris* Hook. & Grev. bladen *knopplikt hopslutna*, rundade—elliptiska, *rundtrubbiga*; kaps. *afång*—cylindrisk, *knappt sned*, med *flere gånger* hopvridna *tänder*, *kort kägellik lock*; mossan som hos *föreg.* ☉ 3, 4; 7—9. Fig. Br.eur. Fl.D.Suppl. t.115, f.1. R.Hn.Bryac.exs.35.

Lerjord, r. (ÖG. nära *Karlottenborg* i *Vinnerstad sn.* *Uppl.* vid *Uppsala*. *Gestr.* *Gefle* vid *Tolfors*; *ford.* äfven vid *vestra tullen*. *Dal.* *Säther*. — *N. Christiania*, *Trondhjem*.) *Den ytterst korta stjelen jemte de 10—12 bladen bilda tillhopa en liniehög, lökformig gyllring, ur hvars midt det en half, stund.  $\frac{1}{2}$  tum höga frskaftet uppskjuter; locket vanl. knappt  $\frac{1}{2}$  så långt som kaps. Varierar någon gång med dubb. längre stj. och blad.* — *Barbula* Br. & Sch. *Tort. rigida* Sw. och *Wg.Fl.Su.*

## 86. DESMATODON Brid.

† Kapseln lutande ell. nedböjd.

\* Peristomet af sinsemellan fria och likformiga, något hopvridna *tänder*.

\*1 *D. Laureri* Br. & Sch. bladen *konkava*, *kölade*, *afånga*, *trubbade*, med *udd af den utlöp. nerven*, *tillbakavikna*, n. *helbräddade kanter*, *papillösa*; frskaftet *krökt*; kaps. derigenom n. *hängande*, *afångt oval*, med *kort sprötspetsadt lock*. 2 6—8. Fig. Br.eur. Fl.D.suppl. t.150. R.Hn.Bryac.exs.128.

Fjelltr. r. (*N. Dovre*, mell. *Vårstien* och *Kongsvold*; på *Finnshöe*.) *Stjelen tufvad*, 2—5 lin. hög; bladen n. *tegellagda*; frskaften 5—6 lin., *upptill båglikt krökta*. — *Trichostom.* Schultz. *Tortula* Lindb. *Didymodon* Blyttii Hn. *Dermat. nilens Lieb.* Fl.D.

\*2 *D. obliquus* Br. & Sch. bladen *äggrundi lancettlika*, *spetsade*, med *lång udd af den utlöp. nerven*, *tillbakavikna*, *upptill smånaggade*, n. *genomskinliga kanter*, *starkt papillösa*; frskaftet något *krökt*, kaps. derigenom *lutande*, *afångt cylindrisk*, något *krökt*, med *lock* som hos *föreg.* 2 6—8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.129.

Fjelltr. r. (*N. Nordl.* *Bodö*: Somf. *Dovre*, mell. *Vårstien* och *Kongsvold*; *flerest. kring Kongsvold*.) *Stjelen ett par lin. hög; frukskaftet mindre krökt än hos föreg.; kaps. längre och smalare, sned, mera ljusbrun. Denna och föreg. stå i ans. till perist.: och lockets byggnad mycket nära släktet Tortula, dät de af Lindb. föras; de öfr. 3 arterna närma sig deremot mera till följ. släkte, hvarmed de ock af nyssnämnde förf. förenas.* — *Trichost.* C. Müll. *Tort. suberecta* Hook. *T. cuneifolia* Somf. Suppl. Fl. Lapp. *enl. Lindb. (formen från Bodö).*

\*\* Perist. af delvis hopväxta, raka *tänder*.

3 *D. cernuus* Br. & Sch. bladen *afångt lancettlika*, *spetsade*, med *kort udd af den utlöp. nerven*, n. *platta*, *omärkligt naggade kanter*, *papillösa*; frskaftet *rakt ell. flerböjdt*; kaps. *lutande*, *snedt oval ell. omv. äggformig*, med *konvext*, *uddspetsigt lock*. 2 6, 7. Fig. Br.eur. Wg.Fl.Lapp.t.20. Somf.Cr.exs.10.



Bergstr. r. (*Jeml.* Areskutan. *Vestml.* Sala, vid grufvan. — *N. Finnm.* Kistrand på Langöen. Nordl. Bodö. Trondhj. st., Levanger, nedom Holmen på hafsstranden.) *Liten som föreg.* — *Didymod. latifolius* Wg. *Trichostom. inclinatum* C. Müll. *Trichost. cernuum* Lindb.

†† Kapseln upprät, med raka ell. inbøjda, icke vridna tänder.

- 4 *D. latifolius* Brid. bladen konkava, kölade, *bredt aflånga*, trubbad, med lång ell. kort, vanl. hårlik udd, *tillbakavikna helbräddade* kanter, papillösa; kaps. aflång, rak och upprät, brun, med *fria*, likformiga, raka ell. inbøjda tänder; locket med kort, snedt spröt. 24 7, 8. —  $\beta$  *glacialis*: bladen med kort udd, icke utlöp. nerv. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.9.  $\beta$  Fl.D.2065. Thed.M.exs.125.

Fjellklipp. (*Lpl.—Herjed.* — *N. Finnm.*—Norfjellet i Budskeruds amt.) *Stjelken vanl.* 2—3 lin. hög, hos  $\beta$  ofta *håltumshög*; *fr.skaflet omkr.  $\frac{1}{2}$  tum*; *bladens hårudd hos  $\alpha$  bildad af den utlöp. nerven.* — *Dicranum* H. *Trichost. Schwægr.* *Didymod. pilifer* Wg.  $\beta$  *Desm. glacialis* Funck.

- 5 *D. systylius* Br. & Sch. bladen *aflångt omv. äggrunda*, trubbiga med lång hårudd, *platta*, upptill småtandade kanter, *mindre papillösa*; kaps. cylindrisk, rak och upprät, gulbrun, med kortare, hår och der *hopväxta*, raka tänder; locket som hos föreg. 24 7, 8. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1846. R.Hn.Bryac.exs.127.

Fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Nammats vid Qvikkjokk; samt *Jeml.* Ragunda: Holmgr. — *N. Finnm.* Tromsö: Hgn. Dovre, vid Drivstuen och Kongsvold. Gudbrandsd., Ringeboe. Filefjeld. Goustsfjeld.) *Mindre och spädare än föreg.* Locket vid lossnandet en tid *fästadt vid centralstiflet och upphöjdt öfver peristomet*, som är mera blekrödt än hos föreg. — *Trichostom. C. Müll.*

## 87. TRICHOSTOMUM Hedw.

† Bladen mer och mindre trubbad, utan udd.

- 1 *T. tophaceum* Brid. bladen köladt konkava, utstående, från bredare bas *lancettlikt jemnbreda*, trubbad—rundtrubbiga, med tillbakavikna, helbräddade kanter och *liten* nedom spetsen upphör. nerv, groft papillösa, med *alla basceller rektangulära*; kaps. *aflång—oval*, med koniskt, snedt sprötspetsadt lock, utan ring. 24 4, 5. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.274.

Klipp. r. (*Sk. Lund:* Lindb.; Bösmöllan; Krogstorp i Ifvetofta sn; Hesselholm, nära Finjasjön: Berggr. Öl. Gårdbbygg: Lindb.; Horns sjöbranter: Zett. Gottl. Grumpevik i Vamlingbo; Åhr i Fleringe. — *N. Nordl.* Bodö enl. Holmgr.) *Hos oss vanl. blott 2—4 lin. hög, med 5—6 lin. långt fr.skafst; de öfre bladen jemte de yngre grenarnes mest trubbiga.* — *Didymod. ed.4.* *D. trifarius* Ahnf. i *Fr.Fl.Sc.* — Anm. Zett.: *sterila Weisia* (ell. *Didymod.*) *amblyphylla* från Öl., ehuru tumshög och mer långbladig, torde såsom Lindb. anmärkt vara en utdragen form af närv. art, som den liknar till bladens form och textur, men hvarifrån den aftriker med sin spenslighet och de mycket glesa, i fukt. tillstånd nedbøjda bladen, hvarigen. habitus är nog olika.

- 2 *T. rigidulum* Sm. bladen kölade, utstående—*utsperrade*, från bredare bas *lancettlika spetsade*, med *sjelfva spetsen något trubbad*, tillbakavikna, helbräddade kanter och i *yttersta spetsen* försvinn. nerv, bascell. *invid nerven rektangulära*, de öfriga bascell. *rundadt quadratiska*; kaps. cylindrisk, med lock som hos föreg., *smal ring.* 24 6, 7. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.95. R.Hn.Bryac.exs.372.

Fukt. klipp. etc. r. (*Lul. Lpm.* Dal. Osmundsberget. *Fermil.* Långbanshyttan. *Ner.* Dylta: C. Hn. Stockh. Haga ruiner. ÖG. Omberg; Brunnehy sn. Vestanå kalkbr.: Kindb. VG. Kinnekulle; Jarlehus; Trollhättan, Smål. Vestervik; Brähehus m. fl. st. enl. Scheutz. *Sk.* Bosjöklöster. Öl. Herest.: Lindb. och Zett. — *N. Nordl.* Saften. Trondhemstrakten. Dovre, vid Kongsvold; samt Gudbrandsd. Ringeboe: Berggr. Vid Wormen. Christiania, i Mørradalen. Skien.) *Stjelk. vanl. tumshöga*, i mer och mindre låta *tuftor af brungrön färg; ganska lik Tort. fallax.* — *Didymod. Hedw.* *Tortula* Lindb.

†† Bladen med udd af den utlöp. nerven.

- 3 *T. mutabile* Bruch.: toppbladen *hastigt stora*, *n. utsperrade*, torra krusigt vridna.

jernbredit lancettlika, *spetsade med kort udd*, platta helbräddade kanter, alla bascellerna rektangulära, genomskinliga; kaps. aflång—oval, med *långspröadt* lock utan ring, korta, ojemma tänder. 24 5. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.371.

Kalkberg, r. (Öl. Röstlösa, Resmo samt Karlevi: Lindb.; Köpings branter: Zett. Gottl. Thorsborgens; Bogeclin; Othem; Slite.) *Tufvorna*  $\frac{1}{4}$ —1 tum höga, brunaktiga; *stjelk. teml. tjocka, ojemnt bladiga*. Sv. ex. utan frukt. — *T. brachydontium* Bruch.

- 4 *T. crispulum* Bruch: toppbladen störst, *utstående*, torra krusigt vridna, lancettlikt jernbreda, med *trubbad, huflikt hopdragen spets* och mycket kort udd, platta helbrädd. kanter, alla bascell. rektangulära, men *smärre än hos föreg.*; kaps. *som hos föreg.*, men med *långa, ojemma tänder*. 24 6. —  $\beta$  *brevifolium*: tätare tufvad, med spensligare stjelk, kortare blad. —  $\gamma$  *angustifolium*: bl. smalare, n. 3radiga, de öfre lancettlikt syllika. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.370.

Kalkberg,  $\gamma$  kärrmark, r. (ÖG. V. Ny sn. Gopö: Holmgr. Öl. Vickelby, vid kyrkan: Lindb. Gottl. Thorsborgens: Zett. och Lindb.; Etelhem: Zett. —  $\beta$  Gottl. Kopparvik enl. Zett. —  $\gamma$  Uppl. Norrbykärr nära Uppsala.) *Tätt tufvad, upptill liftigt grön, med spensligare stj. än föreg., från några få lin. till mer än halstumshög; kaps. liten*. —  $\gamma$  *T. viridulum* Bruch, *T. trifarium* ed.7, *T. planum* Lindh.; de svenska ex. af denna form föras af Schimper till *Didymod. luridus*.

- 5 *T. flavovirens* Bruch: toppbladen *hastigt mycket större* än de nedre, utstående, torra starkt krusiga, *från en glänsande hvit, slidlik, något bredare bas jernbreda, trubade med udd, nedtill platta, upptill inrullade helbrädd. kanter*, alla bascellerna *utdraget, smalt rektangulära, fullkoml. vattenklara*; kaps. aflångt cylindrisk, med smalt *kägellikt* lock utan ring, och med *långa, likformiga*, otydligt vridna tänder. 24 5, 6. Fig. Br.eur.

Sand, st. r. (Stockh. på Utön.) *Löst tufvad, med knappt halstumshöga stjelkar, som mellan de mjuka, gröna och genom kanternas inrullning starkt konkava bladen lysa klart hvita af de glänsande bladbaserna. Frukt ej funnen i Sv.* — *Tortula* Lindb.

## 88. LEPTOTRICHUM Hampe.

† Bladen lancettlikt jernbreda. Sambyggare.

- 1 *L. glaucescens* Hpe. de nedre bladen små och glesa, toppbladen mycket större, *lancettlikt jernbreda, spetsiga med n. utlöp. nerv. i spetsen gles sågade, med platta kanter, och gråaktigt blågröna af ett fint mjölligt öfverdrag*; cell. upptill kvadratiska, mot basen rektangulära; kaps. cylindriskt aflång, med kägellikt lock, bred ring. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.1661. Lindgr.M.exs.23. R.Hn.Bryac.exs.151.

Klippspring. etc. (Lpl.—Verm. Ner. nära Brevens bruk: Stud. A. T. Björkm. Södm. ÖG. Marmorbruket: Mos. — N. Finnm. Maalselvdaalen: Holmgr. Trondhj. st. Sylfjellen enl. S. Almqv. Dovre, Gudbrandsd., Ringeboe: Bergrg. Bergen st. i Sogn: Wulfsb. Tellemarken, vid Tindsjön. Christiania, Krokklefven.) *Löst tufvad, mjuk, med  $\frac{1}{4}$ —1 tum höga, greniga stjelkar; färgen liknande spanskgroä; hanblarna i grenspetsarne*. — *Didymod. Brid. Trichost. Hedw. och ed.9. Ditrichum caesium* Lindb.

†† Bladen från en bredare, kort bas n. härfint syllika.

\* Sambyggare.

- 2 *L. pallidum* Hpe. bladen raka ell. något ensidigt böjda, från smalt äggrund bas hastigt hårfina, upptill sågade, med i spetsen försvinn. nerv; kaps. på långt, blekgult skaft, aflång, något sned, med smalt kägellikt lock, kortare än halva kaps., smal ring; tänder fria ell: parvis hopväxta i de nedre lederna, svagt hopvridna. ☉ 5, 6. Fig. Br.eur.

Jord, r. (Stockh. i Ulriksdals trädgård. VB. vid Heden.) *Stjelk. blott 1—2 lin. höga, med blekt gulgröna blad, mer än tumshögt fr.skaft och blekt gulbrun kapsel*. — *Bryum* Schreb. *Trichostom. Hedw. och ed.9.*

\*\* Tvåbyggare.

- 3 *L. flexicaule* Hpe. stj. *utdragen, sterböld; bladen något ensidigt böjda ell. allsidigt utstående, från lancettlik bas syllikt hårfina med platta kanter och i den vant. sågade*

öfversta spetsen försvinn. nerv; kaps. liten, upprät, aflångt kägellik, med spröt-spetsadt lock, smal ring. 2½ 5, 6. Fig. Br.eur. Fl.D.2688,f.2. Lindgr.M.exs.48. Somf. Cr.exs.13. R.Hn.Bryac.exs.249.

Bergshäll. (Sk.—Lpl. — N.) Stjelkarne 1—3 tum långa, n. trådsmla i brunaktiga tufvor; fr.skaften tumshöga, med jemförelsevis mycket liten kapsel; lockets spröt något längre än halfva kapseln. — Didymod. Brid. D. rostratum Wg. Trichostom. Br.eur. och ed.9. Ditrichum Hpe.

4 L. homomallum Sch. stjelen kort; bladen vanl. ensidigt böjda, från äggrund bas hastigt långt och syliskt hårfin, med platta kanter och utlöp. nerv, helbräddade; kaps. på långt, rött, skaft, aflångt kägellik, upprät, rödbrun, med kägellik lock, smal ring. ☉ 6, 7. —  $\beta$ . strictum: till alla delar mindre, med raka blad. Fig. Br.eur. Fl.D. 2688,f.1. R.Hn.Bryac.exs.34.

Jord. (Sk.—Lpl. och VB. — N.) Bildar rent gröna tufvor. Stjelen 3—4 lin., fruktskaftet omkr. tumshögt; locket rakt, kortare än halfva kapseln. Ditrich. Hpe.

5 L. tortile Hpe  $\beta$  pusillum: stj. kort; bladen raka, i torrt tillstånd uppräta och tilltryckta, från lancellik bas utdraget syllika, med på midten tillbakavikna kanter, utlöp. nerv, i öfversta spetsen småsågade; kaps. upprät, brungul, ovals aflång, med kort sprötspetsadt lock, smal ring. ☉ 10—5. Fig. Br.eur. Fl.D.suppl.t.45,f.2. Thed.M.exs.124.

Jord. (Sk.—Lpl. — N.) Lägre och spädare än föreg., grön, med ½ tum höga fr.skaft; bladen kortare och bredare, kaps. af ljusare färg, med spetsigare lock, som är kortare än halfva kaps. Hufvudformen, som enl. Lindb. icke finnes i Skand., är till alla delar större, med smalt cylindrisk, ofta krökt kapsel. — Didymod. pusillus Hedw. Trichostom. Schrad. och ed.9. Ditrich. pusill. Timm.

### 38 Flocken Ceratodontese.

#### 89. TRICHODON Schimp.

1 T. cylindricus Sch. stj. ganska kort; bladen sperrigt flerböjda, torra krusigt vridna, från aflång, n. omslidande bas hastigt syliskt hårfin, i den af nerven uppfyllda spetsen småsågade; kaps. på mycket fint, gult skaft, smalt och utdraget cylindrisk, något lutande och krökt, slätt, med kort kägellik lock, bred ring. ☉ 6—8. Fig. Br.eur. [Ceratodon]. Fl.D.suppl.t.114,f.2. Somf.Cr.exs.115. R.Hn.Bryac.exs.10.

Väskant., dik. etc. r. (Lpl.—Verm. Ner. och ÖG. Smål. Grenna: Scheutz. — N. Finnm. och Nordl. Dovre, vid Vårstien etc. Bergen st., Balholmen i Sogn.) Växer spridd ell. gruppvis, till alla delar mycket späd; stj. 2—4 lin., fruktskaftet 5—8 lin. högt, den ytterst smala kaps. ljusbrun. — Trichostomum H. Didymodon Wg. Fl.Su. Ceratodon Färnr. och ed.9. Trichod. tenuifol. Lindb.

#### 90. CERATODON Brid.

1 C. purpureus Brid. stj. kort—utdragen och grenig; bladen utstående—utböjda, kölade, lancellika spetsade, med tillbakavikna, i öfversta spetsen täthade kanter, vanl. i spetsen försvinn. nerv; kaps. på rödbrunt skaft, aflång—n. äggformig, slutt. något krökt, lutande—horizontal, färad, med koniskt lock, bred ring. 2½ 5—9. —  $\beta$  conicus (Milde): nerven rödbrun, utlöp. i en lång udd. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.11.

Jord., mur. etc. a. (Sk.—Lpl. — N. —  $\beta$  Öl. vid Örmöga gästgg.; samt Gottl. Thorborg: Lindb.) Öfverallt ymnig, i stora rödbruna ell. mörkgröna, omkr. tumshöga tufvor; kaps. på ½—1 tum högt skaft, rödbrun. En form med 1—2 lin. hög stielk är Bryum Celsii L. — Mnium L. Dicranum Hedw. Trichost. conicum Hpe.

### 39 Flocken Distichiese.

#### 91. DISTICHUM Br. & Sch.

1 D. capillaceum Br. & Sch. bladen glesa, 2sidigt utstående—utböjda, från aflång omslidande bas hastigt syliskt hårfin, med utlöpande nerv, helbräddade; antheridierna utan egna perigonialblad, litet nedom fr.skaften; kaps. upprät, aflång—n. cylindr.

med kort kägellikt lock, smala tänder. 2 7, 8. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.12. Lindgr. M.exs.94. R.Hn.Bryac.exs.97.

Bergsklyft. (Sk.—Lpl.—N.) Tätt tufvad, upptill glänsande grön, med  $\frac{1}{2}$ —flere tum höga, greniga stjelkar, platta af de 2sidiga bladen och hvilglänsande af dessas slidlika baser; kaps. röd, på 6—8 lin. skaft. — *Cynodontium* Hedw. *Didymodon* WM.

2 *D. inclinatum* Br. & Sch. bladen som hos föreg., men tilltillande, i öfversta spetsen smådgade; antherid. omgifna af 1—3 perigon.bl.; kaps. lulan, äggformig, med kort kägellikt lock, bredare tänder. 2 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.2687,f.2. Somf. Cr.exs.11. Sill.M.exs.179. R.Hn.Bryac.exs.98.

Bergsrött., kärr, r. (Lpl. Jemtl. Snasahögen; Åreskutan. Herjed. Axhögen: Hellb. Gestr. Gessle, vid hafsstränd. Uppl. Uppsala, i Norrbykärr. Stockh? vid Haga ruiner. ÖG. Vånerstad; Omberg. VG. Kinnekuhle. Boh. Strömstad; G. Theel. Sk. Malmö; Bösmossen etc. Ö. Karlevi alvar: Lindb. Götll. vid Gothenmsån. — N.) Mer mörkgrön och lågväxt än föreg. — *Swartzia* Ehrh. *Cynodont.* H. *Didymodon* Sw.

#### 40 Flocken *Pottiae*.

##### 92. EUCLADIUM Br. & Sch.

1 *E. verticillatum* Br. & Sch. bladen utstående, lancettlikt jemnbreda, spetsade, med platta, nedom midten grundt sågade, upptill helbräddade kanter, utlöp. bred nerv; cell. vid basen stora rektangulära, de öfre ända upp i spetsen rundadt kvadratiske; kaps. upprät, oval, slät, med långt smalspröadt lock, smal ring. 2 6, 7. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.363.

Kalkberg, r. (ÖG. Omberg, Rödgalvelsgrotta och Alvastra. Ö. Åhs; mell. Tveta och Thorslunda; i Köpings präster och vid Horn: Zett. Götll. Koppavik; Othemsklint; ö. Furillen. — N. enl. Ångstr.) Stjelkarne halftumshöga ell. högre, mycket greniga, med blågröna blad, löst tufvade, oftast nedtill hvita af kalk. Frskäften  $\frac{1}{2}$  tum höga; ej funnen m. fr. i Skand. — *Weisia* Brid.

##### 93. DIDYMODON Hedw.

† Blr tvåkönade.

1 *D. rubellus* Br. & Sch. bladen utstående—utböjda, kölade, torra krusiga, de öfre störst, lancettlikt jemnbreda, trubbad med udd, kanterna tillbakavikna, helbräddade, nerven upphör. med spetsen, bascell. stora genomskinn. rektangulära; kaps. upprät, aflång, med snedt sprötspetsadt lock, bred ring. 2 8—10. Fig. Br.eur. Fl.D.2498. Thed.M.exs.26. R.Hn.Bryac.exs.247.

Bergskrefv., mur. etc. (Sk.—Lpl. — N.) Stjelkarne  $\frac{1}{2}$ —1 tum höga, i lösa, nedtill rödbruna tufvor; de äldre bladen röda, med brun nerv; kapseln sprötl. varierar längre och kortare. — *Weisia curvirostris* Brid. *Trichost. rubellum* Rabenh. och ed.9.

†† Tvåbyggare.

\*2 *D. rufus* Lor. bladen ut- och nedböjda, torra n. raka och tilltryckta, från äggrund bas smånigom lancettlikt tillspetsade, med tillbakavikna helbrädd. kanter, utlöp. nerv; bascell. gula, rektangulära, de vid kanten och alla de öfre ända till spetsen små, rundadt kvadratiske, papillösa; perichæt.bl. af lösare cellväf, strimmiga, för öfr. lika. 2 4. Fig.

Fjelltr. r. (N. Salten, på stenar vid Skjerstadfjordens strand nära Vendsæt 1868: Lorentz.) Norska ex. 1 $\frac{1}{2}$ —2 tum höga, teml. grofva, i lösa, mörkt rödbruna, endast i öfversta topparne något gröna tufvor; utl. ex. stundom dubb. högre och mer gröna än de norska. Frukt och hanbl. okända.

3 *D. luridus* Hornsch. bladen utstående, torra något krusiga, smalt äggrundt lancettlika, de nedre spetsade, de öfre trubbad, alla med helbräddade, tillbakavikna, endast i spetsen platta kanter, utlöp. nerv, ända till nedersta basen små, kvadratiske celler, knappt papillösa; kaps. aflång, något krökt, med kägellikt lock, smal ring. 2 4, 5. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.661.

Kalkklipp. r. (Götll. på Hoburgen: Lindb.) Stjelkarne knappt  $\frac{1}{2}$  tum höga, i lösa

tufvor af brungrön färg; bladen ganska små, utmärkta af sina små, ogenomskinn. basceller, af hvilka endast de 2 nedersta raderna äro rektangulära, då de hos föreg. af följ. hafva denna form högt upp i bladets nedre del. Allt enl. utl. ex.; svenska osedda af utg. De i ed.9 efter uppg. af Lindb. hit förda ex. från Lund lära enl. densammes nyare granskning tillhöra *Trichost. tophac.* — *Trichostom. Spruce* och ed.9.

- 4 *D. cylindricus* Br. & Sch. bladen utstående, långa och flerböjda, torra starkt kru-siga, smalt jemnbreda, spetsiga, med platta, i spetsen ojemnt smånaggade kanter. i spetsen försvinn. nerv och talrika, stora, vattenklara, rektangulära basceller; kapseln upprätt, smalt cylindrisk, med långt sylsprötadt lock, smal ring. 24 9, 10. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.248.

Sten., fukt. jord, r. (Sk. Höör flerst.: Berggr.; Skärals; Broby sn, vid Helgeå och Åskekärr, samt Sjöhogahusen: Hamnstr. — N. Næs jernverk. Vestfjordstaden.) Stjelkarne tumshöga, i lösa tufvor af grön ell. gulgrön färg. Frukt ej funnen i Skand. — *Weisia tenuirostris* Hook. & Tayl. *Trichost. tenuirostre* Lindb. *Trichost. cylindr. C. Müll.* och ed.9.

#### 94. POTTIA Ehrh.

† *Anacalypta* Roehl. Kapseln med peristom [n. utan hos *P. Starckeana* γ].

- 1 *P. latifolia* C. Müll. bladen knopplikt tegellagda ell. hopslutna, starkt konkava, rundadt omv. äggrunda, tvärhugget trubbiga med udd, helbräddade, platta kanter och under spetsen upphör. nerv, icke papillösa; kaps. oval, med snedsprötadt lock, smal ring, blekröda, djupt och ojemnt 2klufna tänder. ☉ 6, 7. — β *pilifera*: blad- udden långt utdragen, hårlök. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.126 [α & β].

Fjelltr. på jord, r. (Lul. Lpm. Unna Toki vid Wirihauere. Um. Lpm. Laxfjellet i Tärna. — N. Finnm. Maalselvdalen, på Hvassbrun: Holmgr. Nordl. Dovre, vid Drivstuen, Vårstien och Kongsvold. — β *Jeml.* Snagahögen, vid Handölsforsen: Almqv. — N. Nordl., Saken; Helgeland, i Dunderlandsdalen: A. Bl. & Arn. Dovre.) Stjelkarne, som växa gruppvis ell. i små tufvor, äro 1—2 lin. höga, n. lökformiga genom bladens anordning, slutt. med nyskott; bl. hvitaktigt gröna, glänsande, n. genomskinn., af lös cellväf, hos α med mycket kort udd. — *Weisia Schwægr.* *Didymod. bulbosus* Hn. ed.4. *Anacal. latifol.* Färnr. och ed.9.

- 2 *P. lanceolata* C. Müll. bladen utstående, kölade, aflånga—bredt lancettlika, spetsade med borstlik udd af den utlöp. nerven, helbrädd. tillbakavikna kanter, papillösa; kaps. upprätt, aflång—oval, med snedsprötadt lock, bred ring, röda, hela ell. längs midten hälliga tänder. ☉ 4, 5. Fig. Br.eur. Fl.D.1660,f.2. R.Hn.Bryac.exs.305.
- Lerjord, r. (Sk. Lund; Fogelsång; Kjöfänge. VG. ÖG. Fagervik. Stockh. Öl. Röstlösa: Lindb.; nedom Köpings branter: Zett. Gottl. Visby.) Tufvad, med 2 lin. höga, enkla, ell. dubb. högre, greniga stjelkar, 3—4 lin. höga fr.skaft; bladens cellväf tätare än hos föreg. — *Weisia Brid.* *Anacalypta Röhl.* och ed.9.

- 3 *P. Starckeana* C. Müll. bladen utstående, äggrundt lancettlika, för öfr. som hos föreg.; kaps. upprätt, oval—aflång, med lågt koniskt, trubbigt lock, utan spröt och ring, med gula, korta och trubbiga, ofta omärkliga, hela ell. hälliga tänder. ☉ 4, 5; 10. — β *brachyoda*: tänd. tvärhuggna, ytterst korta. — γ *gymnostoma* (Wils.): n. utan allt peristom. Fig. Br.eur.; γ Br.eur. [*P. minutula*]; Fl.D.2064,f.1.

Lerjord, åkr. r. (Södm. Hagbyberga. Uppl. Uppsala, vid galgbacken 1868, men trol. redan utrotad: Mos. Gottl. Klinte: Holmgr. — β Sk. Krogstorp i Ilvetofsa sn. Öl. Resmo, Karlevi samt vid Örmöga gästg.: Lindb. — γ Sk. allm. på slätten. ÖG. Vinnerstad m. fl. st. teml. allm.: Holmgr. Södm. Eskilstuna, nära St. Tidö. Uppl. Uppsala. Ängml. Hernösand: Arn. Gottl. Burs sn.) Hela mossan 2—3 lin. hög, med mycket liten, särd. hos γ slutt. vidgad, n. skålförmig kapsel; växer spridd ell. gruppvis; den mycket korta stjelen enkel. — *Weisia Hedw.* *Anacalypta Färnr.* och ed.9. γ *Gymnostom. minutulum* Schwægr. *Pottia minutula* Färnr. och ed.9. *P. Starck.* β *Davallii* Lindb.

†† *Pottia* [i eg. men.]. Kapseln utan peristom.

\* Bladnerven utan lameller.

- 4 *P. truncata* Färnr. bladen utstående—utböjda, mot spetsen något kölade, aflångt

omv. *äggrunda*—bredt lancettlika, trubbad med kort udd af den utlöp. nerven, med helbräddade ell. omärkligt naggade, *platta* kanter, otydl. *papillösa*; kaps. omv. *äggformig*—*bägarlik*, med lågt konvext, snedt sprötspetsadt lock, n. utan ring.  $\odot$  2 4, 5; 9, 10. Fig. Br.eur. Fl.D.2495,f.1. Thed.M.exs.130. R.Hn.Bryac.exs.125. Lerjord, åkr. etc. a. (Sk.—Helsl. och Dal. — N.) *Växer gruppvis eller i smärre tuvor af 2—5 lin. höjd, med vanl. enkel, stund. grenig stjelk.* — *Bryum truncatum* L. *Gymnostom. Hedw. Pottia eustoma* Lindb.

5 *P. intermedia* Färnr. bladen utstående, *af långt lancettlika, spetsade med teml. lång hårlig udd* af den utlöp. nerven, helbräddade, *något tillbakavikna* kanter, *papillösa*; kaps. *af långt bägarlik*—n. *cylindrisk*, med lock som hos föreg., *bred ring*.  $\odot$  2 4—6. Fig. Br.eur. Fl.D.537,f.2. Lindgr.M.exs.99.

Jord, tor. st. r. (Sk. Södra Wall. Smål. Jönköping: Zett. Stockh. vid Stora Sickla; Stadshagen; Bergilund. Uppl. Uppsala, på Slotts- och Polacksbacken. Gestr. Gefle, vid Tolffors: R. Hn. Ner. Skogaholms herrgård: C. Hn. Verml. Carlstad, nära Sjö-tullen: Kindb. VG. Lidköping. Öl. Vickelby; samt Örmöga: Lindb. — N. Qvams-kleffen. Bergen st., Sogn: A. Bl.) *Till växtsätt lik föreg., men större, med dubb. längre kaps., som enl. Lindb. lär visa spår till peristom, hvilket utg. dock ej lyckats iakttaga. Liknar mest P. lanceolata, men har icke så starkt och långt tillbakavikna bladkanter ell. kapselns mynning afsmalnande som denna.* — *Gymnost. Turn. Pottia trunc.  $\beta$  major* Br.eur. *P. trunc.  $\beta$  intermed. ed.9.*

< 6 *P. Heimii* Färnr. bladen utstående—utböjda, de öfversta störst, *utdraget lancettlika, spetsiga, med i spetsen försvinnande nerv, platta, mot spetsen småågade* kanter, *längs kanten smalare celler, papillösa*; kaps. *långt skaftad, af långt bägarlik*, med snedt sprötspetsadt lock. 2 6. Fig. Br.eur. Fl.D.1361,f.1; 2304,f.1. Somf.Cr.exs.7. R.Hn. Bryac.exs.304.

Fukt. Jord, hafsstränd. (Sk.—VB. Hall. Boh. Öl.: Lindb. och Zett. Inuti landet vid Uppsala. — N. Christiania—Finnm.) *Dubb. större än de föreg., med halftumshögt ell. högre fruktskaft; bladen vanl. gulskantade. Är stund. mångbyggare.* — *Gymnost. Heimii* och affine N. & Hornsch.

(*P. Starckeana*  $\gamma$  *gymnost.*)

\*\* Bladnerven på öfre sidan med breda, gröna lameller.

< 7 *P. cavifolia* Ehrh. bladen *knopplikt hopslutna ell. tegellagda, starkt konkava*, omv. *äggrunda, trubbad med hvil hårudd* af den utlöp. nerven, helbräddade *platta* kanter, otydligt *papillösa*; kaps. kort skaftad, *af långt*—*äggformig*, med snedt sprötspetsadt lock, utan ring.  $\odot$  4—6. —  $\beta$  *incana*: bladen kortare än sin hårudd. Fig. Br.eur. Fl.D.1893,f.2. R.Hn.Bryac.exs.124.

Tor. st., mur., torftak etc. r. (Sk.—Uppl. Uppsala, vid Nontuna. Vestml. Sala. Verml. Christinehamns kyrkog. Dalsl. Åmål. Öl. nedom Köpings branter: Zett. —  $\beta$  Sk. Tomarp. Gotl. Visby.) *Hela mossan 2—5 lin. hög, utmärkt af de lökformigt hopslutna, bleka bladen, hvilkas nerv på öfre sidan har 2 ell. flere vecklika hin-nor (lameller), som i början dro hoprullade kring en samling små groddknoppar.* — *Gymnost. ovatum* Hedw.

## R. — SELIGERIA CEÆ.

### 41 Flocken *Blindia*.

#### 95. *BLINDIA* Br. & Sch.

1 *B. acula* Br. & Sch. bladen utstående ell. ensidigt böjda, från konkav, *af långt* syl-lik spetsade, med *platta helbräddade* kanter och *utlöpande, hela spetsen uppyllande* nerv; alla celler, utom i bashörnen, jemnbreda; kaps. upprätt, rundadt påronlik, med långt snedsprötadt lock, utan ring. 2 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.1660,f.1. R.Hn.Bryac. exs.123.

Fukt. klipp. r. (Lpl.—Jemtl. Helsl. Bollnäs sn, Bolleberget: Oldb.; Mo sn, Kasberget. Dal. Grycksbo, nära Gopasjön. Verml. Dalsl. VG. Kinnekulle; Hunneberg; Göte-borg. Ner. Garphyttan: C. Hn. ÖG. Lemunda; Ömberg. Smål. Yaberg i Femsjö; Möckelns s.v. strand och vid Elmhult: Berggr. — N. Finn. — Christianiatrakten.) *Tufvad, glänsande brungrön, af 1—2 tum höga, greniga stjelkar, med 3—4 lin.*

håga fruktskafst, små bruna kapslar, hvilka slull. genom grenarnes tillväxt tyckas utgå från dessas sidor. — *Weisia* Hedw. och ed.9.

## 96. STYLOSTEGIUM Br. & Sch.

- 1 *S. caespititium* Br. & Sch. bladen utstående ell. något ensidiga, lancettlika, afsmaln. i en lång, smalt jemnbred, öfverst af den utlöp. nerven bildad spets, helbräddade med platta kanter; perichæt.bl. stora, öfverstående den rundadt päronlika, slutl. n. skålförmiga kapseln; locket kort snedsprötadt, utan ring. 24 7—10. Fig. Br.eur. R.Hn. Bryac.exs.33.

Fukt. klipp. i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Kaddepakte vid Saggatjaure: Holmgr. Herjed. Stora Midtåkläppen: Hellb.; Axhögen; Ramundberget. — *N. Dovre*, flerst. kring Kongsvald.) Vårer i  $\frac{1}{4}$ —1 tum höga, gulgröna, glänsande tufvor, med mycket greniga stjelkar, vanl. talrika, mell. perichæt.bl. insänkta kapslar, som äro föga längre än lockets spröt. — *Anoetangium* Schwægr. *Gymnostom.* WM. *Blindia* C. Müll.

## 42 Flocken Seligeriæ.

### 97. SELIGERIA Br. & Sch.

† Kapseln med peristom.

\* De nedre bladen och perichæt.bladen olikformiga, trubbiga.

- 1 *S. diversifolia* Lindb. de nedre bladen smalt äggrundt lancettlika, de yttre perich.bl. från bred äggrund, omslidande bas tvärt hopdragna till en kort, jemnbred spets, de innersta bredt äggrunda, alla konkava, trubbiga, med platta helbrädd. kanter och i spetsen försvinnande nerv; kaps. upprätt, oval—päronlik, med snedt sprötspetsadt lock. inböjda, parvisa, tänder. 24 6. 7. Fig. Schimp.Br.eur.suppl.

Kalksten, r. (*Vestml.* Sala, vid grufvorna, och på en sten i hasselskog vid Nyberg.) 1—2 lin. hög, gulgrön, växande gruppvis, med 1—2 lin. höga fruktskafst.

\*\* Alla bladen n. likformiga, meränd. spetsiga.

- 2 *S. recurvata* Br. & Sch. bladen från bredt lancettlik, rännformig bas småning. långt och fint borstspetsiga, helbräddade, med grof, spelsens öfre del uppfyllande nerv; kaps. på båglik skafst nedböjd, päronlik, med föga snedt sprötspets. lock. 24 6. 7. —  $\beta$  *pumila* Lindb. brun, till alla delar mindre, med kortare bl., finare nerv. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.20. R.Hn.Bryac.exs.212.

Bergvägg., helst sandsten, skiffer, r. (*Sk.* Kullaberg. VG. Ålleberg; Kinnekulle. Dals. Lilla Strand; Jäpplandaberget i Steneby sn. *Vestml.* Sala, nära Gröna Gången. Dal. Orsa sn, Kallmora by; Styggforsen. *Lul. Lpm.* Ruonas. — *N. Christiania* trakten. Trondhj. st. Stördalen; Mostamarken. —  $\beta$  *Lul. Lpm.* Nammats vid Qvikkjokk. — *N. Salten*: Somf. enl. Lindb.) Stor som föreg., brungrön, tufvad, med i torrt tillstånd och på föräldrade ex. raknande, 2—3 lin. höga fruktskafst. — *Bryum* Dicks. *Grimmia* H. *Bryum setaceum* Wulf enl. Lindb. Selig. *setacea* Lindb.  $\beta$  *Weisia calcarea* Somf. enl. Lindbergs granskning af orig.ex.

- 3 *S. crassinervis* Lindb. bladen uppåt tilltagande i storlek, från konkav, bredare bas tvärt hopdragna till en utstående, kort, något trubbad, af den mycket grofva nerven bildad borstlik spets, helbräddade; kaps. på något krökt skafst lutande, päronlik, slutl. under mynningen hopdragen och urnelik, med snedt sprötspets. lock och inböjda, spetsiga tänder. 24 5. Fig.

Kalkklipp. r. (VG. Billingen, upptäckt 1865 af Cleve.) Mindre än föreg:s  $\beta$ , växande spridd, med mycket korta blad, knappt liniehögt fruktskafst, gröngul, slull. svartnande kapsel med vid mynning. Allt enl. Lindb. i Sällsk. pro Fl. & F. Fenn. förh. 1868; osedd af utg.

- 4 *S. pusilla* Br. & Sch. bladen n. raka och uppräta, från lancettlik bas småningom afsmalnande till en lång, hvass, syl- ell. borstlik spets, fint smånaggade, med smal, i spetsen upphör. nerv; kaps. på rakt skafst, upprätt, päronlik, slull. färad, med vid mynning, långt snedsprötadt lock. spetsade tänder. 24 6—8. —  $\beta$  *brevifolia* Lindb.

- bl. kortare och bredare, mindre spetsiga, tydligare naggade, med ännu finare nerv. Fig. Br.eur. Rab. Bryoth. 572, 608.
- Kalkberg, r. (VG. Kinnekulle, på Mörkeklef. — N. Trondhj., på Dalbjerget. —  $\beta$  N. Biri vid Mjösen.) 1—2 lin. hög, lifligt grön, med 1—2 lin. långt fruktskaft; lockets spröt n. af kapselns längd. — *Weisia Hedw.*
- 5 *S. acutifolia* Lindb. de öfre stielk- och perichæt-bladen från bredare, omalidande bas hastigt afsmalnande till en lång, borstfön, upptill fnsågade, n. stickande hvass spets, n. helt och hållet bildad af den ullöf. grofva nerven; kaps. på kort, rakt skaft, upprät, kort päronlik, med något trång mynning, hört och tjockt, trubbigt spröt, trubbadtänder. 2 1/2 6, 7. Fig.
- Kalkberg, r. (Gottl. Thorsborg; Othems klint; Grogarnsberget.) Lifligt grön, i 1—2 lin. höga tufvor; fr.skaftet mycket kort, knappt höjande kaps. öfver perichæt-bladen. Mest lik den ull. *S. calcarea* Br. & Sch., som dock skiljes genom sina korta, trubbiga blad.
- 6 *S. tristicha* Br. & Sch. bladen 3radiga, vanl. raka och uppräta, från konkav, lancetlik bas småningom afsmalnande till en kort och bred, vanl. helbräddad trubbad spets, med nedtill smal, i spetsen bred nerv; perichæt.bl. n. utstående, mer långspetsade; kaps. på rakt skaft, upprät, kort päronlik, med långt och smalt snedsprötdt lock, trubbadtänder. 2 1/2 7—9. —  $\beta$  *patula* Lindb. bladspetsen mer utstående och längre, fint naggad. Fig. Br.eur. Somf. Cr. exs. 19.
- Kalkberg, r. (N. Nordl. Salten. —  $\beta$  Gottl. Thorsborg.) Liten som de föreg., ljusgrön, med stund. uldragna, 3—4 lin. höga, trådäna grenar. — *Weisia Brid. Sp. musc.* *W. trifaria* Brid. och Somf. *Selig. trifaria* Lindb.

†† *Anodus* Br. & Sch. Kapseln utan peristom.

- 7 *S. Donniana* C. Müll. bladen föga utstående, raka, från bredare bas hastigt jemnbredt syllika, spetsiga, glest fnsågade, med grof, spetsen n. uppfyllande nerv; kapseln på rakt skaft, upprät, kort päronlik, med kort, föga snedt spröt. 2 1/2 7, 8. Fig. Br.eur. Rab. Bryoth. 107.
- Klipp. r. (Herjed. Ulfberget; samt Midtåhammar, och Hammarén vid Flon: Oldb. VG. Kinnekulle, Herest. på sandstenslagret: Hunneberg, på alunskiffer ofvan Nygård. ÖG. Omberg, i Rödgalvelsgrota. Öl. kalkklipp. vid Köpings kyrka: Zett. Gottl. Thorsborg; Othems klint. — N. Nordl. vid Fiskevåg i Saltalen: Ranen Herest.: A. Bl. & Arn. Trondhj. Mostamarken.) Till storlek och växtsätt lik de föreg., brungrön, med ytterst fint, 1 1/2 lin. högt fr.skaft, mycket liten blekbrun kapsel. — *Gymnostom. Sm. Anodus* Br.eur.

## S. — FISSIDENTACEÆ.

### 43 Flocken *Fissidentese*.

#### 98. OCTODICERAS Brid.

- 1 *O. Julianum* Brid. bladen glest, 2sidigt utsperrade, jemnbredt lancetlika, spetsiga, helbräddade, med mot spetsen försvinn. nerv; kaps. omv. kägellik, af det uppat vidgade skaftets längd, med kägellik lock af samma längd och kort mössa af samma form. 2 1/2 6—8. Fig. Br.eur. R. H. Bryac. exs. 246.
- Sten. i vatten, r. (ÖG. Vestra Harg sn, i Borgejön. Stockh. i Söderbysjö; samt vid Nacka bro. Uppl. i Stamsjön: G. Theel.) 1—2 tum hög, svartgrön, oordentligt förgrenad, med omkr. 2 lin. långa blad, ytterst små frukter; Svenska ex. ej funna med frukt. — *Fontinalis Savi. Conomitrium* Mont. *Skitophyllum fontanum* Pyl. *Octodic. fontanum* Lindb.

#### 99. FISSIDENS Hedw.

† Fruktskaftet från stielkens sida ell. bas.

† Sambyggare.

- 1 *F. adiantoides* H. bladen aflånga, spetsade med udd, med bred, ljus kant, upptill



småsågade, längre ned fint naggade, med i spetsen försvinnande nerv; kaps. på skaft från stjelkens öfre del, rödbrun. 2 9—5. Fig. Br.eur. Fl.D.1713. Thed.M.exs. 116. R.Hn.Bryac.exs.245.

Fukt. skogsmark. (Sk.—Lpl. — N.) 1—2 tum lång ell. mera, vanl. 2—3 lin. bred, tillbladig, brunaktigt grön, med grenar både från stjelkens bas och spets. — *Hypnum* L. *Dicranum* Sw. *F. taxifolius* β Wg.

2 *F. taxifolius* H. bladen aflånga, trubbad med udd af den utlöp. nerven, med smälare ljus kant, öfverallt fint naggade; kaps. på skaft från stjelkens bas, brun. 2 8, 9. Fig. Br.eur. Fl.D.473.f.2. Sill.M.exs.174. R.Hn.Bryac.exs.244.

Fukt. jord. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl. mycket mindre än föreg.,  $\frac{1}{2}$ —1 tum hög, omkr. 1 lin. bred, liftigare grön och mera mjuk, med större bladceller än föreg., och grenar endast från stjelkens bas. — *Hypnum* L. *Dicranum* Sw.

#### \*\* Tvåbyggare.

3 *F. decipiens* Not. bladen aflånga, kortspetsade, med utlöp. ell. i spetsen försvinn. nerv. svagt ljuskantade, i spetsen sågade, nedtill fint naggade; kaps. på skaft från stjelkens nedre del, rödbrun. 2 8, 9. Fig. R.Hn.Bryac.exs.369 [*F. rupestris*.]

Kalkklipp. r. (Öl. Röstlösa, Resmo och Karlevi; samt Gotll. Thorsborg: Lindb.) Omkring tumshög och något bredare än föreg., liftigt grön, leml. glesbladig och styf, med små bladceller. — *F. rupestris* Wils.

†† Fruktskaftet från stjelkens spets.

#### \* Tvåbyggare.

4 *F. osmundoides* H. bladen aflånga, trubbad med udd, fullkomligt okantade, n. ända till basen till färsågade, med under spetsen upphör. nerv; kaps. n. upprät, aflång, brun, med långt sprötspetsadt lock. 2 6—8. Fig. Br.eur. Sw.M.Sut.2. Lindgr.M. exs.20. R.Hn.Bryac.exs.243.

Fukt. st., bäckstränd etc. (Sk.—Lpl. — N.) Bildar ofta stora och låta tufoor af mörk- ell. brungrön färg, med 1—2 tum höga stjelkar af omkr. 1 lin. bredd, talrika blad af lös cellväf, och stund. ytterst talrika frukter på 3—5 lin. långa skaft. — *Dicranum* Sw.

5 *F. pusillus* Wils. bladen smalt, n. jemnbredt lancettlika, spetsiga, smalt men tydligt kantade till nära den svagt landade spetsen, med nerv som hos föreg.; kaps. upprät, oval, med lockets spröt mycket kortare än kaps. 2 4, 5. Fig.

Kalkklipp. ell. sandsten, r. (Sk. Höör: Berggr.; Skäråli; samt VG. Kinnekulle, vid Mörkeklef: Lindb. — N. Christiania: Dr Kiær. Brevig: Cleve enl. Lindb.) Liten och späd, med 1—2 lin. hög, fjäbladig stjelk och 2—3 lin. högt fruktskaft; mest lik följ. art, såsom hvars var. den anføres i Schimp. Syn., men skild med inflorescensen och lokalen på klippor. — *F. incurvus* β *pusillus* Sch. Syn.

#### \*\* Sambyggare.

6 *F. incurvus* Schwægr. bladen aflångt lancettlika, spetsade med udd, helbrädd, med smal, men tydlig, mot den ojemnt och svagt naggade spetsen upphörande kant och strax under spetsen försvinn. nerv; hanblommen ensam, i spetsen af en egen gren; kaps. vanl. lutande, med lock som hos föreg. 2 4, 5. — β *angustifolius* Lindb. bl. flere gånger smalare, jemnbreda. γ *crassipes* Sch. gröfre, med flere och mer tätsett. blad, tjockare fr.skaft. Fig. Br.eur. Sw.M.Sut.2.f.3. Sill.M.exs.175. R.Hn.Bryac.exs.242.

Lerjord, γ sten. i bäck. (Sk.—Lpl. — N. — β Sk. Bosjöklöster. — γ Sk. Skäråli m. fl. st. norr om Ringsjön: Berggr.) I yngre tillstånd liten som föreg.; äldre half-tumshög. Ull. ex. af γ stora och utmärkta, men lära enl. Sch., Milde m. fl. bero af lokalen, och en dylik öfvergång till hufvudformen synas de svenska utgöra. — *Dicranum* WM. *F. viridulus* Wg och ed.9, ett namn, som är osäkert, då enl. fig. 1368 i E.B. *Dicr. viridul.* Sm. lika väl kan afse *Fiss. exilis* som närv. art och trol. inbegriper flere af de små arterna, hvarför och denna fig. af olika förf. hänföres än till den ena, än till den andra arten.

7 *F. bryoides* H. bladen smalt aflånga, trubbad med udd, helbrädd., med tjock, ända

till yttersta spetsen fortlöpande kant och utlöp. nerv; hanblrna flere, i bladvecken, kort skafade; kaps. vanl. upprät, aflång, med lock som hos föreg. 24 10—5. Fig. Br.eur. [*F. exilis*]. R.Hn.Bryac.exs.339.

Små jordhåll. i gräsvall. r. (Sk. Lund, nära Fogelsång; Stehag och Höör m. fl. st.: Berggr.; Österslöfs sn, Tomarp: Hamnstr. Smål. Husvarna: Zett. Ner. Skogaholm: samt nära Örebro: C. Hn. Boh. Christinedsl.) Stor som föreg., utmärkt af de med nerven i bladudden sammanlöpande bladkanterna, samt af de mycket tydliga, knopplika hanblrnas plats.

8 *F. exilis* H. och Sch. Syn. bladen aflångt lancettlika, spetsade, fint naggade särd. mot basen, okantade, med utlöp. nerv; hanblrna vid stjelkens bas, kort skafade; kaps. upprät, aflång, med lock som hos föreg. 24 10—5. Fig. Br.eur. [*F. Bloxami*]. R.Hn.Bryac.exs.340.

Lerjord, r. (Stockh. vid Danviks källa; Marieberg; Drottningholm: Lindb. Uppl. Uppsala, vid Eklundshof: Mos. Vestml.) Ännu mindre än de föreg., växande spridd ell. gruppvis på lera, med 1—1½ lin. hög stjelk, 2 lin. långt fruktskaft, ytterst liten kapsel. — *F. Bloxami* Wils.

## T. — LEUCOBRYACEÆ.

### 44 Flocken *Leucobryææ*.

#### 100. LEUCOBRYUM Hampe.

1 *L. glaucum* Schimp. stjelken klynnegrenig, med jemntoppade grenar; bladen tättsittande, från oval bas lancettlika, n. rörformigt hoprullade, helbräddade, nervlösa; kaps. lutande, snedt aflång, slutt. särad, med mycket långspröadt lock. 24 10—5. Fig. Br.eur. [*Oncophorus*]. Fl.D.824,f.3. R.Hn.Bryac.exs.184.

Skogsmark, r. (Sk.—Uppl. Uppsala. Vestml. Ner. och Verm. Boh. Öt. Götth. — N. södra del.; Bergen st. Sogn: Wulfsb.) Bildar stora, låga, ofta 2—3 tum tjocka, Sphagnumlika mattor af hvitaktigt blågrön färg; stj. och blad spröda; kaps. jemförelsevis liten, ganska sälls. — *Bryum* L. *Dicranum* Hedw. *Leucobryum* vulgare Hpe.

## U. — WEISIACEÆ.

### 45 Flocken *Dicranææ*.

#### 101. CAMPYLOPUS Brid.

† Bladen med stora, uppblåst vidgade bruna hörnceller vid basen.

\*1 *C. atrocirens* Not. stj. klynnegrenig, utdragen; bladen svagt utstående, från lancettlik bas långt syllika, med rännformig, i en lång, hvit och sågad hårudd småningom öfvergående spets. 24. Fig. Schimp.Br.eur.suppl. [*C. longipilus*].

Fukt. klipp. r. (N. Goustafield, ofvan gården Dale: Dr Klær. Stavanger enl. Zett. Bergen st., Evindvik, Værholmen och Vaden i Sogn: Wulfsb.; Flöjsfeld vid staden Bergen, allm.; samt Trondhj. st., vid Veblungsnæs: Lorentz.) Stjelkarne grofva, 2—3 tum höga, i låga och fasta tuvor af svartaktig färg, endast i topparne något gröna; engelska ex. häfva mer lysgröna och glänsande toppar än de norska, som fullkoml. likna pyreneiska ex. Frukt obekant. — *C. longipilus* Brid. och Schimp.Suppl. [icke Syn. och Br.eur.].

2 *C. flexuosus* Brid. stj. som hos föreg., men lägre och spädare; bladen utstående ell. något ensidiga, från lancettlik bas hastigt syllika, med rännformig, i öfversta delen finsågad spets utan hårudd; kaps. på båglik nedböjdt skaft, aflång—elliptisk, äldre särad, med långspröadt lock. 24 5, 6. Fig. Br.eur. och Schimp.Br.eur.suppl. R.Hn. Bryac.exs.338.

Fukt. klipp., sten. r. (Sk. Fogdaröd m. fr.: samt vid Höör: Berggr. Boh. nära Kyrkvik och i Vallbodalen vid Lysekil. — N. Bergen st., Sogn, på Fondöen i Evindvik: A. Bl. & Wulfsb.; vid Bergen; samt Trondhj. st. Christiansund: Lor.) ½—1 tum hög, svartbrun, med gröna toppar, torr något glänsande; stjelk. ända upp beklädda

med rödbrunt ludd, stund. försedda med smala, snart affallande, småbladiga flageller. Fr. sällsynt. — *Bryum* L. *Dicranum* Hedw.

†† Bladbasens celler ofärgade, vattenklara.

- 3 *C. fragilis* Br. & Sch. stjelken kort, med knippevisa smågrenar, nedtill med rotludd; bladen tätt sittande, något utstående, raka och spröda, från hvitglänsande lancettlik bas syllika, i spetsen omärkligt finsågade; kaps. som hos föreg. 24 5. 6. Fig. Br.eur. och Schimp.Suppl. Rab.Bryoth.504.
- Klippspring., torfjord, r. (Sk. vid Höör, afv. med frukt; samt vid Röstånga: Berggr.) Bildar halftumshöga, låta, glänsande gröna och långa stjelkarne hvitaktiga tufvor, med rödbrunt ludd, kortare bladspetsar än föreg. — *Bryum* Dicks. *Dicr. Funckii* C. Müll.
- 4 *C. turfusus* Br. & Sch. stjelken något utdragen, vid basen grenig, utan smågrenar, endast längst ned med rotludd; bladen mindre tätt sittande, utstående, med längre och finare borstlik, flerböjd, gles och omärkl. finsågad spets; kapseln längre skafstad, för öfr. som hos föreg. 24 5. 6. Fig. Br.eur. och Schimp.Suppl.
- Torfjord, skogsmark, r. (Sk. Höör, i torfmossen kring Klockesjön: Berggr. Öl. i gran-skog mell. Röhälla och Söxås: Zett.) Något högre, men spensligare, med längre och smalare blad, finare nerv än hos föreg., till färgen mera brun- ell. gulgrön. — *Dicranum* C. Müll.
- 5 *C. brevifolius* Schimp. stjelken mycket kort, vanl. enkel, utan rotludd; bladen allsidigt upprätta, från lancettlik bas kort syllika, n. rörformigt hoprullade, i öfversta spetsen fårande. 24. Fig. Schimp.Br.eur.suppl.
- Klipp. mur, r. (N. staden Bergen: Lor.) Norska ex. 3—5 lin. höga, gulgröna, knappt glänsande, i låga, lätt sönderfallande tufvor. Bladen kortare och bredare än hos de öfr. arterna, af mest quadratiska celler och med mycket bred nerv. Frukt okänd.

### 102. DICRANODONTIUM Br. & Sch.

- 1 *D. longirostre* Br. & Sch. bladen n. skärformigt ensidigt böjda ell. allsidigt utstående, något spröda, från lancettlik bas med stora bruna hörnceller hastigt borstfint syllika med mycket lång, n. helbräddad spets och bred, hela spetsen uppfyllande nerv; kaps. på flerböjdt skaf, aflång—cylindr., slät, med långsprötadt lock. 24 8—10. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.241.
- Torfjord etc. r. (Sk. vid Höör: Berggr.; Ifvetofta sn, mell. Råby och Leingaröd. Smål. Nässjö jernv.station: Berggr.; Ekesjö, nedom Soåsen: samt Ingaryds del i Ölmeåstad: Scheutz. — N. Gudbrandsd. vid Elstad i Ringeboe: Berggr. Trondhj. st. Romsdalen, vid Aalesund: Holmgr. & Berggr.) Växer i låta och mjuka, gröna ell. bruna, af rotludd sammanväfda tufvor af 1, stund. flere tums höjd, med knappt halftums-långa fruktskaf. — *Didymodon* WM. *Cynodont. Schwagr.*

### 103. DICRANUM Hedw.

† *Undulata*. Störväxta, tätt tufvade arter med af rotludd täckt stjelk, på tvären vågiga blad; tvåbyggare; kaps. krökt.

\* Fruktskafen flere samsittande.

- 1 *D. robustum* Blytt: bladen ensidigt ell. oordentligt böjda, på midten något vågiga, torra i spetsen skrufligt vridna, från lancettlik bas hastigt afsmaln. i en mycket lång borstlik, upptill längs kanterna och ryggen småsågad spets; cell. i bladspetsen oordentligt rundadt quadratiska; kaps. n. cylindrisk, krökt, med långsprötadt lock, teml. bred ring. 24 7, 8. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1846,t.13. R.Hn.Bryac.exs.5.
- Barrskog. (Lpl. och VB.—Uppl. Uppsala. Stockh. Nacka. Dal. Vestml. Ner. Villingsberg, och Skogholm: C. Hn. Gottl. — N.) Mycket stor och grof; stjelken 6—8 tum lång, vanl. uppstigande, nedtill med ymnigt rotludd. — *D. Drummondii* C. Müll. *D. elatum* Lindb.
- 2 *D. undulatum* H. bladen skärformigt ensidigt böjda, starkt vågiga, från bredare bas jemnbredt lancettlika, långspetsade, i spetsens kanter och rygg starkt sågade, med i spetsen försvinn. nerv; cell. n. jemnbreda ända upp till spetsen; kaps. aflång, krökt,

med långspröadt lock, *smal ring*. 2 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.1533,f.1. Sw.M.Su.t.3, f.5. Lindgr.M.exs.46. R.Hn.Bryac.exs.4.

Skog. a. (Sk.—VB. och Pit. Lpm. Öl. Gottl. — N.) Vanl. 2—3 tum hög, upprätt ell. uppböjd, med ymnigt brunt rolludd ända till spetsen af den tjocka stjälken. — *D. polysetum* Sw.

\* Fruktskafren ensamma.

3 *D. palustre* Brid. bladen utstående ell. i topparne något ensidiga, mot spetsen vågiga, från lancettlik bas smalt jemnbreda, i spetsens kanter småsågade, på undre sidan och nerven n. helbräddade; cell. n. jemnbreda ända upp till spetsen; kaps. aflång, föga krökt, strimmig, med lock som hos föreg., utan ring. 2 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.72.

Fukt. st. (Sk.—VB. och Lul. Lpm. Qvikkjokk. Öl. Gottl. Fleringe. — N. till Trondhj.) Omkr. 1 ell. 2 tum hög, grön, med rolludd. Mest lik *D. scopar.*, men med rakare, ofvan midten vågbräddade blad, hvilkas nerv är smalare och försvinner nedom spetsen, hvarjemle bashörnens cellöf är mycket lösare. — *D. Bonjeani* Not.

4 *D. Schraderi* WM. bladen upprätt utstående ell. svagt ensidiga, föga böjda, vågiga, torra något krusiga, från bredare bas n. jemnbreda, trubbad, ofvan midten sågade långa kanter och rygg; bashörncell. plötsligt stora och uppbåsta, bruna, de öfr. cell. i nedre bladhälften smalt jemnbreda, i den öfre små, oliformiga, quadrat.—triangulära; kaps. n. cylindr., med lock som hos föreg., teml. bred ring. 2 7, 8. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.47. R.Hn.Bryac.exs.73.

Kärr. (Sk.—Lpl. — N.) Tätt tuffad, glänsande gul- ell. brunaktig, med 3—5 tum höga, upprätta stjälkar, högt upp beläckta af rolludd; bladen något spröda, ofta n. raka; kaps. liten. — *D. Bergeri* Bland.

5 *D. spurium* H. bladen knippevis gyttrade, utstående, säll. ensidiga, torra inkrökta och krusigt vridna, starkt vågiga, från konkav, n. ådgrund bas hastigt hopdragna till en smalt jemnbred, upptill långa kanterna och nervens rygg sågad spets, på hela undre sidan papillösa; cell. i öfre delen rundade; kaps. som hos föreg. 2 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2491. Lindgr.M.exs.22. R.Hn.Bryac.exs.74.

Torr skogsmark, berghäll. (Sk.—Ångml. och Dal. Um. Lpm. Lycksele: Ångstr. Pit. Lpm. Arvidsjaur. Boh. Öl. Böda: Lindb. — N. till Trondhj. st.) Omkring 2 tum hög, upptill gul ell. ljusgrön, med jemntoppadt klynnegreniga, i lösa tuffor för- enade, något tjocka stjälkar, föga rolludd.

†† *Scoparia*. Som afd. *Undulata*, men med släta blad.

\* Bladspetsen tydligt sågad.

a — Cell. i bladens öfre del långsträckta ell. jemnbreda, endast i yttersta spetsen något vidgade, rhomboidiska.

6 *D. majus* Turn. bladen vanl. halfcirkelformigt ensidigt krökta, från lancettlik bas småningom långt och borsfint syllika, i spetsen småsågade; fruktskafren flere samsittande, blekt gulgröna; kaps. aflång, krökt, något strimmig, med långspröadt lock, utan ring. 2 5—7. Fig. Br.eur. Fl.D.2447. Thed.M.exs.119. R.Hn.Bryac.exs.75.

Mörka skog. (Lul. Lpm. Qvikkjokk, Walleskogen: Holmgr.; och VB.—Smål. Boh. och Sk. nor. del. Öl.: Zett. Gottl. — N. Trondhj. st., Sundalen, vid Storfall: Scheutz.) 3—6 tum hög, vanl. rent grön, med något spensliga, gles- och långbladiga, båg- likt uppböjda stjälkar. Bladen var. någon gång n. raka.

7 *D. scoparium* H. bladen ensidiga, dels klotlikt böjda, dels n. raka, lancettlikt syllika, vanl. i spetsen småsågade; fruktskafren ensamma, röda; kaps. cylindriskt aflång, slät, för öfr. som hos föreg. 2 5—8. Fig. Br.eur. Fl.D.824,f.1. Thed.M.exs.118. R.Hn.Bryac.exs.69.

Skog., klipp., sten. etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl. ett par tum hög, lifligt grön, men varierar i yttersta grad efter olika lokaler såväl till storlek och färg, som till bladens riktning och form, sågning m. m. — *Bryum* L.

b — Cell. i bladens midt och öfre del korta och vida, rundadt kvadratiske.

8 *D. Mühlenbeckii* Br. & Sch. bladen tättsittande, allsidigt utstående, mer säll. en-

sidiga, torra krusigt vridna, lancettlikt syllika, *upptill rörformigt hoprullade*, med den småsågade spetsens *öfversta celler mer långsträckt* än de öfriga; fr.skaften ensamma, ljusgula: kaps. *cylindriskt aflång, rödbrun, krökt, n. slät*, med långspröadt lock, smal ring. 2½ 7.8. Fig. Br.eur.

klipp. r. (*Jemtl. Frösön*; samt *Ängml. Sollefteå*; och *Medelp. Sundsvall: Holmgr. — N. Dovre*, på Knuds- och Nystuehöe vid Kongsvold, samt Stor- och Blåhöe vid Fogstuen; *Berggr.*) 1—2 tum hög, grön ell. gulbrun. *tätt tufvad, vanl. med mycket rotludd; till fruktens storlek och form lik föreg., till stjelk och blad mer lik vissa former af solj., hvarmed den i ans. till bladens cellväf är närmast beslägtad.*

9 *D. fuscescens* Turn. bladen *vanl. ensidigt och starkt klotlikt böjda*, torra krusigt vridna, *smalt lancettlikt syllika, efter hela sin längd rännformiga, med korta celler ända upp i yttersta delen af den långt ned glest småsågade spetsen*; fr.skaften ensamma; kaps. *liten, aflångt klubblik, brungrön, något krökt, strimmig, slutl. färad*, med lock och ring som hos föreg. 2½ 7.8. — *β cirrhatum*: *tätt tufvad med ymn. rotludd, tätsitt., gulgröna, krusigt hopvridna blad.* Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs. 21. R.Hn.Bryac.exs.71; *β* 367 [*D. Mühlenb. β brevifol. Lindb.*].

klipp., murk. ved etc. (*Lpl.—Sk. — N. — β Jemtl. Gestr. Gefle. Uppl. Uppsala. Stockh. Öl.* vid Vickleby kyrka; samt *Gottl. Helvig sn: Lindb. — N. Dovre*, på Knuds- och Blåhöe; samt *Gudbrandsd. Ringeboe: Berggr. Lom, vid Rødsheim.*) *Hufvudformen 1—2, stund. 4—5 tum hög, vanl. teml. spenslig, brungrön, mer säll. rent grön, med smalare, ända till borstfint spetsiga blad; β liknar mer föreg., hvarmed den ock af Lindb. förenas. — D. congestum Brid. och Br.eur. — Anm. Dier. labradoricum C. Müll., som i ed.9 upptogs för Norge enl. uppg. af Lindb., anses af densamme i Fört. öfv. Spitsb. Moss. för en form af D. fuscesc., hvilket ock synes utg. vara fallet med fruktbar. ex. från Grönl., meddelad af Schimp. och som äro tvåbygg. med korta rundade bladceller upptill; de af densamme lemnade norska ex. äro deremot sambygg. och måste på grund af bladens öfverallt långa, jemnbreda celler snarast föras till D. arcticum.*

\*\* Bladspetsen helbräddad; cell. i bladets öfre del korta och vida, kvadratiska—aflånga.

10 *D. elongatum* Schwægr. bladen *svagt ensidigt böjda*—upprätt utstående, från lancettlik bas syllika, med *smal, utlöpande nerv*; cell. i *öfversta bladspetsen mer aflånga* än de öfriga; kaps. *aflångt och snedt äggformig, något krökt, slutl. färad*, med långt sylspröadt lock, smal ring. 2½ 7—8. Fig. Br.eur. Fl.D.1533,f.2. Somf.Cr.exs.112. Thed.M.exs.120. R.Hn.Bryac.exs.70.

Fukt. st., helst i fjelltr. (*Lpl.—Dal. Verml. Slättne i Dalby sn. — N.*) *Vanl. gulbrun, säll. grön, 1—4 tum lång; stjelk. smala, högt upp förenade medelst ymn. rotludd; bladen små, föga krökta; kaps. på föga utdraget skaft, liten, brungrön. — D. Sphagni Brid.*

11 *D. fragilifolium* Lindb. bladen *raka, något utstående, torra krökta hit och dit, mycket spröda*, från lancettlik bas långt syllika, med *n. rörformigt hoprullad spets och bred, utlöp. nerv*; cell. i bladets *hela öfre del rundadt kvadratiska—oval*a; kaps. som hos föreg. 2½ 7. Fig. Schimp.Br.eur.suppl. Fl.D.suppl.t.116. R.Hn.Bryac.exs. 122.

Jord. murken ved etc. i fjelltr. (*Lul. Lpm. Qvikkjokk, i Walleskogen; samt vid Parkejaure: Holmgr. Pit. Lpm. Peljekaisse; Adolfströms bruk; en holme i Hornafvan, nära Arjeploug. Um. Lpm. Laxfjellet; Stensele: Ångstr. — N. Finnm. Talvig, Kaafjord m. fl. st. i Alten: Lor.; Tromsø och Maalselvdalen: Holmgr. Gudbrandsd. Ringeboe: Berggr.*) *Tätt tufvad, med spensliga stjelkar och ymn. rotludd, 1—3 tum hög, blekgul, med ljusgröna toppar. Nära beslägtad med föreg., till hvilken öfvergången icke saknas.*

+++ *Orthocarpa*. Tufvade, med släta blad; tvåbyggare; kapseln n. cylindrisk, rak och upprätt.

\* Bladen helbräddade.

a — Cellerna i bladens öfre del korta och vida, kvadratiska—rektangulära.

12 *D. strictum* Schleich. bladen *raka, något utstående, spröda, från lancettlik bas hastigt*

långt syllika, med *rännformig* spets och *smal* nerv; cell. i *bashörnen* talrika och mycket stora, i bladets öfre smalare del *kort och bredt rektang.*—*kvadratiska*; kaps. från tjockare bas aflång, med långspröadt lock, smal ring. 24 6. Fig. Br.eur. R. Hn.Bryac.exs.366.

Fukt. st., trädrott, etc. r. (Gottl. Kräklingbo sn: Holmgr.; Thorsborg, samt vid Gothemån, på tallstammar enl. Lindb.; Fardumeträsk i Rute sn.) 1—2 tum hög, *lätt tufvad*, *ljus- ell. gulgrön*, mycket lik och i *ster. tillstånd* ofta n. omöjlig att skilja från föreg., hvarmed Gottl. ex. i ed.9 också förenades. Endast hon-ex. utan fr. funna i Sverige.

< 13 D. *viride Schimp.* bladen lättsittande, föga utstående, mycket spröda, från lancettlik bas *småningom* syllika, med rännformig spets, smal nerv; *alla* bascellerna stora, genomskinliga, *de öfriga cell. i hela bladet rundadt kvadratiska—elliptiska*; kaps. nedåt afsmaln., aflång, med lock som hos föreg. 24 7. Fig. Schimp.Br.eur.suppl.

Trädstamm., sten. r. (Sk. Skäråli, på bokstammar: Lindb.) Omkring *tumshög, löst tufvad, ljusgrön*, med rotludd, *långa, i torrt tillstånd krusigt krökta* blad med *snart afbruten, stund. svagt tandad spets*. Mer olik föreg. till habitus än karakterer, och närmande sig D. *fulvum*. Sv. ex. utan frukt. — D. *fulvum* \* *viride* Lindb. i ed.9. *Campylopus viridis* Sull. & Lesqu.

14 D. *Scottianum* Turn. bladen utstående och vanl. något ensidigt krökta, lancettlikt syllika, rännformiga, med bred, i spetsen försvinn. nerv; *endast bashörnens* celler stora, genomskinl., cell. i bladets öfre del *rundadt kvadratiska*; kaps. som hos föreg., slät, stund. något krökt, med odelade ell. grundt och ojemnt 2—3klufna tänder. 24 7, 8. Fig. Br.eur.

Strandklipp. r. (Boh. Marstrand: Prof. Huss enl. Lindb.; samt på Koön: O. G. Blomb.) 1—2 tum hög, mycket gröfre än föreg., af mörk- ell. brungrön färg, bladen något glänsande. Mest utmärkt af peristomets beskaffenhet och de fullkoml. helbräddade bladen. Svenska ex., bestämde dels af Lindb., dels af Zell., synas utg. icke säkra, såsom egande ofta i spetsen småsågade blad och till frukten allför mycket närmande sig D. *fuscescens*. Arten upptages emellertid här, för att uppmärksamheten måtte riktas på densamma och ytterligare granskning i naturen komma den till del.

(D. *fulvum*.)

b — Cellerna i bladens öfre del långa, smalt jemnbreda.

15 D. *albicans* Br. & Sch. bladen svagt ensidiga ell. upprätt utstående, n. raka, från lancettlik bas småningom och långt syllika, rännformiga ell. genom kanternas hoprullning upptill n. rörformiga, med nerven uppfyllande n. hela bladskifvan, spröda; kaps. n. cylindrisk, ostrimmad, med långspröadt lock, smal ring. 24 8, 9. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.68.

Fjelltr. r. (Pit. och Um. Lpm. Herjed. Helagsfjellen: Oldb.; Skarffjellet. — N. Nordl. Salten, på Solvågind; Sulitälma: Lor.; Helgeland flerst.: Schleg. A. Bl. & Arn. Dovre, mångest. Bergen st., Sogn, Jorrdalen vid Vik: Wulfsb.) Bildar 1—3 tum höga, gul- ell. hvitaktigt gröna tufvor; stj. med rotludd, spröd; bladens cellväf tät, af smalt jemnbreda celler, *endast i bashörnen lösare, med så bred nerv, att den utom längst ned, der ett par smala, ljusare och genomskinl. kanter äro lemnade, upptager hela bladets bredd*. Fr. ej funnen i Skand. — D. *enerve* Thed., äldre namn, men ej passande för den mest brednerviga af alla arterna.

\*\* Bladen i spetsen tydligt sågade.

a — Cell. i bladens öfre del smalt jemnbreda.

16 D. *Sauteri* Br. & Sch. bladen svagt ensidigt böjda, syllikt hårfina, med teml. bred nerv, *endast i öfversta spetsen* finsågade; kaps. som hos föreg. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.75.

Trädstamm. etc., helst i fjelltr. r. (Pit. Lpm. vid Adolfsström. — N. Gudbrandsd. Ringeboe, vid Stuelisbron: Scheutz.) Glänsande gulgrön, mjuk, omkr. tumshög, något spåhare än följ., som den i hög grad liknar, och knappt skiljd med annat än mer helbrädd. blad och smalare nerv, som uppgifves vid basen hafva en kant af mer än 20 cellrader utanför sig, då samma kant hos följ. skulle bestå af blott

12—15 cellrader; huru konstant denna karaktär är kan utg. i brist på nog talrika ex. ej afgöra. Frukt ej funnen i Skand.

- 17 *D. lohngifolium* H. bladen vanl. ensidigt och starkt skärformigt krökta, långt syhlit hårfinna, med mycket bred nerv, långt ned finsågade; kaps. som hos föreg. 24 6—9. Fig. Br.eur. Fl.D.2492.f.2. Thed.M.exs.121. R.Hn.Bryac.exs.67.

Sten. a. (Sk.—VB. och Lul. Lpm. Öl.: Zett. — N.) 1—2 tum hög, glänsande blekgrön, lall igenkänligt på de mycket krökta, hårfinna bladen och den raka kapseln; stj. utan rolludd.

b — Cellerna i bladens öfre del korta, kvadratiske—kort rektangulära.

- 18 *D. fulvum* Hook. bladen ensidigt och skärformigt böjda ell. allsidigt krökta bit och dit, från lancettlik bas hastigt långt och syllickt hårfinna, rännformiga, vanl. långt ned småtandade, stund. n. helbräddade, med bred nerv och n. ända till basen rundadt kvadratiske celler; kaps. cylindr.—aflång, strimmig, med längsprotadt lock, smal ring. 24 9, 10. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.273.

Sten., helst i bokskog. r. (Sk. Sätöfta och Fogdaröd i Höör sn; Skärati; KlöfvaHallar; Broby sn, vid Linneryd, Uddarp m. fl. st.: Hamnstr.; Ilvetöfta och Näsrum sn; Håstveda sn, Hallasnärje; samt Blek. Jemshög; Hamnstr. Smål. Elmbult; Berggr. Hall. Ellemosse.) Omkr. tumshög ell. mera, löst tufvad, af mörk n. svartgrön ell. brungul färg, med ymn. rolludd och långa glesa, krusigt vridna blad. Frukt ej funnen i Sv. Närmast beslägtad med *D. viride*. — *D. interruptum* Brid. och Br.eur.

- 19 *D. flagellare* H. bladen mer och mindre ensidigt böjda, från lancettlik bas småning. långt och smalt syllicka, rännformiga, i öfversta spetsen tandade, med smal nerv och i den öfre delen kort rektangulära celler; kaps. som hos föreg. 24 6—8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.121.

Murken ved, jord etc. i skog. r. (Lpl. Helsl. Dal. och Verml.—Sk. Fogdaröd i Höör sn; Berggr.: Uddarp i Broby sn; Hamnstr. Öl. flerst.: Lindb. och Zett. — N. Nordl. Saken. Hedemarken, vid Oudal.) Vanl. 1—1½ tum hög, i tätta och fasta tufvor, högt upp sammanväfda af brunt rolludd; de sterila stjelkarne oftare än de fruktbär. försedda med småbladiga, n. trådmala, spröda flageller i de öfre bladveckan.

- 20 *D. montanum* H. bladen allsidigt utstående ell. knappt ensidiga, torra krusigt hopvridna, från lancettlik bas småning. långt och smalt syllicka, rännformiga, långt ned småsågade, med bred nerv och i öfre delen rundadt kvadratiske celler, på undre sidan papillösa; kaps. aflång—cylindrisk, n. slät, för öfr. som hos föreg. 24 6, 7. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.66.

Trädstamm., stubb. etc. (Sk.—Lpl. — N.) ¼—1 tum hög i mjuka, gulaktiga ell. ljusgröna tufvor, mycket krusig af de vridna bladen; kaps. stull. oordentligt rynkig, aldrig tydligt och regelbundet strimmig som hos de 2 föreg.

(*D. viride*, *Scotianum*.)

++++ *Falcata*. Tufvade med släta blad; sambyggare; kapseln oval—ömv. äggformig, sned och lutande, med fästknöl vid basen.

\* Cellväfven i bladens öfre del tät, af smalt jemnbreda celler.

- 21 *D. arcticum* Schimp. bladen upprätt utstående ell. något ensidigt böjda, från lancettlik bas syllicka, upptill rännformiga ell. n. rörformigt hoprullade, n. helbräddade med smal nerv, stora brungula, kvadratiske hörnceller vid basen, alla öfr. celler smalt jemnbreda; kaps. lutande, aflång, n. slät, med tydlig fästknöl, sprötspetsadt lock, teml. bred ring, och högröda, n. glatta länder. 24 7, 8. Fig. Schimp.Br.eur.suppl.

Jord i fjelltr. r. (N. Finnm. Kongshavnfeld vid Bosekop; samt Nordl. Sulitälma och fjellet Rappisvari: Lor. Dovre, Sneebåtten: Solms-Laub.; Kollen och Nystuboe vid Kongsvold, samt på Storhøe; Berggr.) 1—3 tum hög, lall tufvad, upptill grön ell. brungrön, n. så grof som *D. scopar.*, utan rolludd; hanbln likasom hos de följ. 2 arterna lall nedom fr.skaftens bas; kaps. gulbrun. — *D. glaciale* Berggr. *D. labradoricum* ed.9.

- 22 *D. Starckii* WM. bladen skärformigt, mer och mindre ensidigt böjda, från lancettlik

bas *smalt* syllika, rännformiga, med *något* bredare celler; kaps. slutl. färad, med *ljusröda*, *papillösa* tänder; för öfr. som föreg. 24 7, 8. Fig. Br.eur.

Fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* mångenst.: Holmgr. *Pit. Lpm.* flerst. *Jemll.* Snasahögen. *Herjed.* flerst. — *N. Finnm.* Aglappen och Hvassbrun i Maalselvdalen; samt vid Tromsö: Holmgr. Nordl. Salten, på Baadsfeld. Trondhj. st. Aalesund: Holmgr. Dovre. på alla de högre bergen. Rundenesfeld. Lomsfjellen. Bergen st., Sogn: Wulfsb.) *Mycket* mindre och *späddare* än föreg.  $\frac{1}{4}$ —1 tum hög, med *smalare*, *vanl. starkt krökta* blad, *mörkare brun* kapsel. På alla de ex., *utg. eger*, äro bladcellerna *långsträckta*, *jembreda*, aldrig så korta och vida som på fig. i Br.eur.

\*\* Cellväfven i bladens öfre del mera lös, af kortare och vidare, rektang. —rundadt quadr. celler.

- 23 *D. falcatum* H. bladen *starkt skärformigt och ensidigt krökta*, från lancettlik bas långt och smalt syllika, n. helbrädd., med *små*, quadratiska bashörnceller; kaps. kort, snedt omv. äggformig, *slät*, med liten fästknöl, sprötspetsadt lock, smal ring och *högröda*, papillösa tänder. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Fl.D.2003.

Fjelltr. r. (*Lpl. Herjed.* Helagsfjellen. — *N. Finnm.* Hvassbrun i Maalselv., samt Flöjelsfeld vid Tromsö: Holmgr.: Tromsdalstind. Trondhj. st., Aalesund: Holmgr. Dovre, på Sneehætten och Nystuehøe. Bergen st., Jölstersfjellen och Folgefonden etc. Tellemarken, på Goustafeld. Hornetten i Nissedal.) Omkr.  $\frac{1}{4}$  tum hög, *fin som föreg. ell. ännu finare*, *lätt tufvad*, svartbrun med gröna toppar, n. *halfcirkelformigt krökta* blad; kapsels tänder *större än hos föreg. och följ.*

- 24 *D. Blyttii* Br. & Sch. bladen *allsidigt utstående, böjda hit och dit, ell. något ensidiga*, från bredare bas n. borstfint syllika, n. helbrädd., med *stora* ljusbruna bashörnceller; kaps. snedt oval, lutande, slät, slutl. med tydlig fästknöl; tand. *ljusröda*, papillösa; för öfr. som föreg. 24 6—8. Fig. Br.eur. V.Ak.H.1846.13. R.Hn.Bryac. exs.272.

Klipp. r. (*Lul. Lpm.* samt VB. vid Luleå, Umeå etc.: Holmgr. — ÖG. V. Ny sn, Åskebäck; och VG. vid Trollhättan. Smål. Femsjö. Boh. Skaftö. — *N. Finnm.* Hammerfest; Bosekop: Lor.: Tromsö: Holmgr. Dovre, på Finns- och Nystuehøe; Sneehætten. Bergen st., Evindvik m. fl. st. i Sogn: Wulfsb. Goustafeld.) *Till storleken som föreg., brun- ell. mörkgrön, med smärre blad än de 2 föreg.; hanbln sittande långt nedom fr.skaftets utgångspunkt; perist:s tänder smalare än hos de föreg.*

++++ *Fulvella* (*Arctoa* Br. & Sch.). Som afd. *Falcata*; kaps. n. regelbunden, omv. äggformig—oval, på kort, föga ell. icke öfver perichæt.bladen framskjutande skaft.

- 25 *D. fulvellum* Sm. bladen *ensidigt, skärformigt krökta*, från bredare bas hastigt långt och borstfint syllika, i *spetsen finsågade*, med utlöp. nerv, *stora* quadratiska hörnceller vid basen, *de öfriga cell. jembreda—rektangulära*; kaps. upprätt ell. föga lutande, *urnelik, slät*, äldre oordentl. färad, med djupt 2delade tänder, sprötspetsadt lock, smal ring. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2002. R.Hn.Bryac.exs.6.

Klipp. i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Njuonjes vid Tarrejokk; Qvikkjokk; på Storholmen: Holmgr. *Pit. Lpm.* Tjiddjakk. *Um. Lpm.* Gutsfjellen; Laxfjellet. *Jemll.* Åreskutan. *Herjed.* Helagsfjellen, Viglen: Oldb.; Nedalen. — *N. Nordl.* Salten, på Solvågtind: Helgeland, Örnefeld: A. Bl. & Arn. Dovre, på Vårstien, Gederyggen och Storhøe; Sneehætten. Bergen st. i Sogn: Wulfsb.; Filefeld. Goustafeld. Hecksfeld. Egebjergst vid Christiania.) *Tufvorna  $\frac{1}{4}$ —1 tum höga, bruna; kaps. föga höjande sig öfver bladen, rödbrun, med högröda, i torrt tillstånd strålförmigt utspärrade tänder.* — *Arctoa* Br.eur. och ed.9. *Dicr. Mörchii* Fl.D.

- 26 *D. hyperboreum* C. Müll. bladen *utstående, föga ell. icke ensidiga*, lancettlikt syllika med kortare, n. helbräddad borstfin spets, *finare*, knappt utlöp. nerv, *små*, quadrat. hörn- och kantceller, älven cell. i bladets öfre del n. *quadratiska*; kaps. omv. äggformig, *strimmig*, äldre regelbundet färad, med till midten oordentligt klufna och håliga tänder, sprötspetsadt lock, *bredare ring*. 24 6, 7. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.76. Bergspring. i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Njuonjes och Wuoka: Holmgr. *Pit. Lpm.* Tjiddjakk. — *N. Finnm.* Flöjelsfeld vid Tromsö; samt Aglappen och Hvassbrun i Maalselv.: Holmgr. Dovre, nära Sprenbäcken vid Kongsvold.) *Lösare tufvad och till*



alla delar gröfre än föreg., brun ell. n. svartaktig, med kortare och bredare blad; perist:sänder i torrt tillst. n. upprätt. — *Arctoa* Br.eur. och ed.9.

- 27 *D. Anderssonii* Schimp. bladen raka, icke ensidiga, från omv. äggrund—afhäng bas tvärt hopdragna till en kortare syllik, naggsågad spets, med tjock utlöp. nerv; cell nedtill smalt, upptill bredare rektangulära; kaps. rundadt äggformig, äldre n. urnelik, sfärad, med till basen 2—3delade tänder, snedt sprötspetsadt lock. 24 6, 7. Fig. Flora 1859, t. 7, f. 3—8.

Fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* på den klippiga toppen af fjellet Njuonjes, upptäckt 1856 af Wichura, sedan icke återfunnen.) Stor som föreg., med kaps. ej framskjulande öfver perich.bladen. Allt enl. Wichura i Flora od. allg. bot. Zeit. och Schimp. Syn. Addenda; osedd af utg. — *Arctoa* Wich. och ed.9.

#### 104. DICRANELLA Schimp.

† Bladen ensidigt böjda. Tvåbyggare.

\* Bladens cellväf tät, af jemnbreda, endast vid bladbasen något bredare celler; kaps. vanl. sned.

- 1 *D. heteromalla* Sch. bladen ensidigt böjda, från bred bas hastigt horstfina, n. helbräddade; kaps. lutande, aflångt omv. äggformig, sned, slutt. hopdragen under mynningen, otydl. strimmig, med långsprötdt lock, smal ring. 24 5—9. Fig. Br.eur. Fl.D.479; suppl. t. 45, f. 1. R.Hn.Bryac.exs.3.

Jord, dikeskant. etc. (*Sk.—Gestr. och Dal. Öl.* Ottenby lund: Zett.; Myckleby: Lindb. — *N.*) Bildar halfstumhöga, glänsande ljusgröna tufvor, med söga högre, gula fruktskafst; lockets spröt af kapselns längd. Af gammalt uppg. att förekomma ända till Lpl., men utg. saknar ex. från nordligare landskap än de ofvan nämnda och kan ej heller någorstades finna arten angifoen från nordligare lokaler. — *Dicranum* H. och ed.9.

- 2 *D. subulata* Sch. bladen mer och mindre ensidiga, från lancettlik bas borstfina, helbräddade; kaps. lutande, omv. äggformig, sned, icke hopdragen under mynn., otydl. strimmig, med bred ring, för öfr. som hos föreg. 24 5—9. Fig. Br.eur. R.Hn. Bryac.exs.2.

Fukt. jord. (*Lpl.—Sk. — N.*) Bäst skiljd från föreg., som den i öfr. mycket liknar, med den kortare, aldrig under mynn. hopdragna kaps.; för öfr. mer mörkgrön, till alla delar något mindre och spädare; fr.skaften gula. — *Dicranum* H. och ed.9.

- 3 *D. curvata* Sch. bladen ensidigt böjda, från äggrund bas hastigt borstfina, i spetsen finlandade; kaps. upprätt ell. n. upprätt, söga sned, tydligare strimmig, för öfr. som hos föreg. 24 9—5. Fig. Br.eur.

Bergstr. r. (*N.* Trondhj. st. Vennsfeld i Mostamarken: Ångstr.) Föga skiljd från föreg. — *Dicranum* H.

- 4 *D. varia* Sch. bladen n. allsidigt utstående ell. något ensidiga, från lancettlik bas småningom syllika, helbräddade; fruktskafst rödt; kaps. lutande, oval—afhäng, något krökt, slutt. något hopdragen under mynn., med kortsprötdt lock, utan ring, stort peristom. 24 5, 6; 9, 10. Fig. Br.eur. Sw.M.Su. t. 3, f. 7. Fl.D.2310, f. 2. Thed.M.exs.122. R.Hn.Bryac.exs.182.

Ler- och sandjord. (*Sk.—Lpl. — N.*) Stjelken ett par lin.—halfstumshög, med längre ell. kortare fruktskafst; kaps. rödbrun, med stora, purpurroda, vanl. kägellik hopstående länder, sprötdt af halva kapselns längd; bl. varia i spetsen svagt ständade. — *D. rubra* Lindb. *Dicranum* H. *D. rigidulum* Sw. (*D. cerviculata.*)

\*\* Bladens cellväf mycket lös, af ojemnt rektangulära och aflånga celler; kaps. upprätt, regelbunden.

- 5 *D. rufescens* Sch. bladen ensidigt, n. skärformigt böjda, från lancettlik bas jemnbred syllika, glest tandade, med bred, knappt utlöp. nerv; kaps. liten, rak och upprätt, äggformig—omv. äggformig med kort bals, koniskt, udd- ell. kort sprötspetsadt lock, utan ring; perist. stort. 24 10—5. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.365.

Sand- och lerjord, r. (*Sk. vid Årup; Höör: Berggr. Smål. Jönköping: Zett. Dald.*

mell. Kroppesjell och Högsåters kyrka: Myr. VG. Göteborg: Prof. Aresch. enl. Ångstr. Ner. Örebro: C. Hn. *Gestr. Gefle*, nära Bäckebro. *Ängml. Hernösands varf*: Arn. VB. Heden. — N. Christiania: Kiær. Näs jernverk.) *Växer i låta, ofta vidsträckta tufvor af rödbrun färg, vanl. talrika frukt- och han-ex. tillsammans; stj. 2—4 lin. hög, enkel, med lika högt, rött fruktskaft; perist. högrödt, n. lika högt som själva kaps. — Dicranum Turn. och ed.9.*

†† Bladen allsidigt utsperrade [hos *D. cervicul.* mindre sperr. än hos de öfr.].

\* Tvåbyggare.

- 6 *D. cerviculata* Sch. bladen utstående med flerböjd spets, någongång svagt ensidiga, från lancettlik bas *syllika, helbrädd.*, med bred, *utlöpande* nerv, *alla celler jemnbreda*; fruktskaftet *gult*; kaps. lutande, snedt rundadt äggformig, slät, med tydl. *fastknöl*, mycket långsprötdt lock och smal ring. ☉ 7, 9. — *β pusilla*: blott 2—3 lin. hög, med n. uppräta bl., liten fastknöl. Fig. Br.eur. Fl.D.2310,f.1. Sill.M.exs.176. R.Hn.Bryac.exs.183.

Ler. st., torfjord. (Sk.—Lpl. — N.) *Bildar låta, ofta vidsträckta tufvor, lysande gula af talrika fr.skaft; stjclk. vanl. ett par lin. hög, med 4—5 lin. fr.skaft, gulbrun kapsel. — Dicranum H. och ed.9. β D. pusillum H. Ht hör afven D. flavidum WM.*

- 7 *D. squarrosa* Sch. bladen utsperrade—n. nedåt böjda, från omslidande ägggrund bas *aflånga, trubbiga, helbräddade, med i spetsen försvinn. nerv*; bascellerna genomskinn. jemnbreda, de öfre korta, n. ovala; fruktskaftet *rött*; kaps. lutande, äggformig—omv. äggform., slät, utan fastknöl, med kägellik lock utan spröt och ring. 2 8, 9. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.63.

Bäck, kärr, helst i fjelltr. r. (*Lul. Lpm. Walle* vid Qvikkjokk. *Pil. och Um. Lpm.* flerst. *Herjed. Malmagen m. fr.: C. & R. Hn; Ljung- och Funnesdalen. Dal. Leksands by m. fr.; Bjursås: Liedstr.*; mell. *Helgbo och Sundbo. Verml. Kyrkebo i Ny sn; Hedenskog bruk: Kindb. Boh. Christinedal. Smål. Holtsby helsobrunn i Als-heda: Scheutz. — N. Finnm.—söd. delen.) Vanl. 2—4 tum hög, i lösa och mjuka, gröna ell. gulgröna tufvor, betydl. gröfre än de öfr. i släktet. *Frukt högst sälls., blott på lågväxta ex.; locket kortare än halfta kaps. — Dicranum Schrad. Dichodontium Schimp. Coroll.**

- 8 *D. Schreberi* Sch. bladen mycket utstående ell. utsperrade, torra n. skrufvridna, från omslidande bredare bas *lancettlikt syllika, spetsiga, upptill ojemnt sågade*, med i *spetsen försvinn. nerv*, bascell. *närmast nerven* genomskinnliga aflånga, *kancell. och de öfre kortare, rektang.—ovala; fr.skaftet rött*; kaps. lutande, äggformig, slät, utan fastknöl, med sprötspetsadt lock utan ring. 2 9, 10. Fig. Br.eur. Fl.D.2810. Sill. M.exs.177, de ster. ex. R.Hn.Bryac.exs.364.

Fukt. ler- och sandjord, r. (*Smål. Husvarna: Zett. enl. Scheutz. ÖG. Vinnerstad: Holmgr. Ner. Örebro flerst.: C. Hn. Stockh. Vinterviken; samt mell. Rörstrand och Carlberg enl. Thed. Gestr. Gefle. Lpl.? — N. Dovre, vid Kongsvold och Rise: C. & R. Hn.) Vanl. 3—5 lin. hög, utom det ungefär liklånga fruktskaftet; sterilt stund. mer än tumshög och lik en mindre form af föreg.; färgen vanl. gulgrön; cellväfven mycket lösare än hos följ.; kaps. vanl. mycket längre än lockets spröt. *Hanväxten knappt liniehög, knopplik. — D. Crispa Lindb. Dicranum H. och ed.9.**

†† Sambyggare.

- 9 *D. Grevilleana* Sch. bladen utsperrade, från omslidande bredare bas *hastigt långt och smalt syllika, spetsiga, helbräddade*, med nerv som hos föreg., *alla cell. aflånga—jemnbreda*; kaps. lutande, snedt äggformig—omv. äggformig, strimmad, med otydlig fastknöl, långt sprötspetsadt lock utan ring. 2 8, 9. Fig. Br.eur. Sill.M.ex.177. frukt-ex. R.Hn.Bryac.exs.64.

Fukt. jord, helst i fjelltr. r. (*Um. Lpm. Larfjellet: Ångstr. Jemtl. Åreskutan. Herjed. mångenst. Ängml. Hernösand: Holmgr. Gestr. Gefle, vid Kungsback etc.: R. Hn. Uppl. Edbo sn: Mos. Vestml. Gröndalsgrufvan i Norberg: Sill. — N. Finnm.—Christiania.) Mycket lik föreg., men lätt skiljd med inflorescensen, samt den mycket längre och finare bladspetsen. — *Dicranum Br. & Sch. och ed.9.**

- 10 *D. crispa* Sch. bladen utböjda, torra krusigt hopvridna, från bredare, omfattande bas

*hastigt hårfint syllika*, helbräddade ell. i spetsen småtandade, af jemnbreda celler: kaps. rak och upprätt, regelbundet aflångt urnelik, med slutl. vidgad mynning, refflad, utan hals ell. fästknöl, med långt sprötspetsadt lock, smal ring. 24 7. 8. Fig. Br.eur. Fl.D.2492,f.1 [t. en del]. Thed.M.exs.123. R.Hn.Bryac.exs.65.

Sandjord. (Sk.—Lpl. och VB. — N. till Finnm. Alten enl. ex. af Lor.) *Mycket spädare än föreg., i lösa ljusgröna tufvor, med hit och dit krökta, hårfina blad; mest utmärkt af den upprätta, gulröda kapseln; fr.skaftet rödt. — D. vaginalis Lindb. Dicranum H. och ed.9.*

### 105. ÅNGSTRÖMIA Br. & Sch.

\*1 *Å. longipes Br. & Sch.* bladen n. tilltryckta, de nedre små, äggrunda trubbiga, de öfversta större, äggrundt lancettlika, spetsade, alla helbräddade, med under spetsen upphör. nerv; kaps. n. klotrund, locket med kort, kagellik spröt, utan ring. 24 7. Fig. Br.eur. Somf.Suppl.t.1. R.Hn.Bryac.exs.93.

Fukt. jord i fjelltr. r. (N. Nordl. Salten, ofvan Midbyeosen. Dovre, norra Vårstiens öfre sluttn. mot Drivstuen.) *Stjelken n. tagelfin, 4—5 lin. hög, fruktskaftet ungef. lika långt, med mycket liten, upprätt kapsel. — Weisia Somf.*

### 106. TREMATODON Rich.

1 *T. ambiguus Hornsch.* bladen utstående, från äggrund bas långt syllika, spetsiga, rännformiga, med utlöp. nerv; kaps. kortare än sitt halslika bihang, med långa, djupt 2delade tänder, långt och smalt sprötspetsadt lock. 24 7—9. Fig. Br.eur. Fl.D. 1416,f.1: 2309,f.2 Somf.Gr.exs.116. Sill.M.exs.178. R.Hn.Bryac.exs.8.

Fukt. st., torfjord, r. (Sk. Höör. — Helsl. Dal. och Verm. Ängml. Lamryan i Ytter-Lännäs. Pit. Lpm. Arvidsjaur. Lul. Lpm. Qvikjokk. Boh. Oroust; Skaftö. — N. söd. del.—Nordl. Ranen: A. Bl. & Arn.) *Stjelk. 1—5 lin. höga, samlade grupper eller i tufvor; kapseln med sitt vid basen tvåra bihang omkr. 2 lin. lång, slutl. mörkt gulröd, på nära tumshögt skaft. — Dicranum H. D. setaceum Sw. och Wg.*

\*2 *T. brevicollis Hornsch.* bladen konkava, tegellagda, äggrunda med kort trubbad spets, helbräddade, med i spetsen försvinn. nerv; kaps. icke kortare än sitt bihang, med korta, odelade tänder, lock som hos föreg. 24 8, 9. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac. exs.7.

Grusjord i fjelltr. r. (N. Nordl. Helgeland, på Brediksfjeld: A. Bl. & Arn. Dovre, toppen af Finnshöe, samt mell. Kongsvold och Sprenbäcken.) *Till alla delar omkr. hälften så stor som föreg., med tjockare fruktskaft och bihangets bas afrundad.*

### 107. DICHODONTIUM Schimp.

1 *D. pellucidum Sch.* bladen allsidigt utstående, från omslidande bredare bas n. jemnbredt lancettlika, spetsade, upptill meränd. glest naggsågade, med under spetsen upphör. nerv, upptill tätt punktförmig cellväf, starkt papillösa; kaps. lutande, snedt äggförmig, med djupt delade tänder, långt sprötspetsadt lock, utan ring. 24 5, 6. Fig. Br.eur. [Dicranum]. R.Hn.Bryac.exs.62.

Fukt. klipp. r. (Sk. Fogelsång; Skärals etc. Smål. Nerest. enl. Scheutz. ÖG. Omberg: V. Ny och Motala snr. Medelp. Um. Lpm. Olfsjlet: Ångstr. Jemtl. Snasabögen. Herjed. Malmagen. Dal. Särna etc. VG. Kinnekulle. Boh. Christinedal. — N. Christiania, på Egeberget: Bergrg.; Nordmarken. Bergen st., Lyster i Sogn: Wulfsb. Gudbrandsdalen: Bergrg. Dovre, vid Kongsvold. Trondhj. st., Guledalen, vid Bogen. Nordl. Salten.) *Omkring tumshög, i liftigt gröna mattor, med 1/2 tum höga fruktskaft. — Dicranum H. och ed.9. Tridontium Lindb.*

### 108. CYNODONTIUM Br. & Sch.

† Kapseln slät.

\* Bladen utan papiller; kaps. med tydlig fästknöl, fullständigt peristom.

1 *C. virens Br. & Sch.* bladen upprätt utstående, torra något vridna, från vidgad bas med tillbakavikna kanter småningom small lancettlika, rännformiga, vanl. firsågade; bascell. genomskinnliga, jemnbreda, alla de öfriga små, n. kvadratiske; kaps. aflång, krökt, med mindre fästknöl, sylsprötdt lock. 24 6, 7. — *β compactum*: tätare tufvad, med kortare, n. helbrädd. blad. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.185.

Fukt. st., kärr etc. (*Lul. Lpm.* Njuonjes enl. ex. af Hellb.; Qvikkjokk; samt *VB.* Luleå: Holmgr. *Jemll.* Snasahögen; Åreskutan. *Herjed. Dal.* Särna. *Stockh.* Gångsätra träsk. *ÖG.* Motala, vid Lemunda. — *N.* Dovre, vid Drivstuen och Kongsvold.) *Vanl. rent ljusgrön, tufvad, 1—2 tum hög, med greniga stjelkar, som högt upp dro försedda med rolludd; bladen kortare och i spetsen bredare, mindre krusiga och utstående, kaps. längre och rödare än hos följ., hvarmed näro. art länge varit sammanblandad, hvarför här för begge arterna angifvas endast de lokaler, som på grund af ex. i utg:s ego kunna anses fullt säkra, ehuru arternas utbredning möjligen är vida större. — *Oncophorus* *Brid.* *Dicranum* *H.* och *ed.9.**

- 2 *C. Wahlbergii* (*Brid.*) bladen från omslidande, bred, omv. ägggrund bas med platta kanter plötsligt långt och smalt sylrika, rännformiga, glesl fänsagade—fullkomligt helbrädd., med utsperrad flerböjd spets, torra krusigt skruvridna; cell. som hos föreg.: kaps. kortare, mindre krökt, med mycket tydlig fästknöl, sylsprötadt lock. 2½ 5—7. —  $\beta$  *compactum*: tätt tufvad, med kortare, fullkoml. helbräddade blad. *Fig. Br.eur. [Dicr. virens  $\beta$ ]. Lindgr.M.exs.45 [Dicr. virens].*

Fukt. st., murken ved etc. (*Torn. Lpm.* Karesuando. *Lul. Lpm.* Qvikkjokk; Jokkmokk och Stora Sjöfallet; samt *VB.* Råbäck och Edefors: Holmgr. *Herjed.* vid Kolsätt. *Helsl.* Färila, vid Laforsen; Ljusdal, Alsmyran. *Gestr.* flerst. i Hamrånge, Hille och Vahlbo snr. *Stockh.* Lilla Nyckelviken, samt Furusund: *Lindb. Vestml.* Odensvi, i Stora Rödmossen. *Ner.* Villingsberg; Brevfen; samt Skogaholm: *C. Hn.* — *N.* Finn. Hammerfest: *C. Hn.*; Tromsö och Maalselvålen: Holmgr. Nordl. Sulltälma: *Lor.* Gudbrandsdalen.) *Stor som föreg., dels gulaktigt grön, dels svarigrön, med enklare stjelkar, föga rolludd; utmärkt af de mycket längre bladen, hvilkas slidlika bas är upprät, hvarmot den långa smala spetsen är utsperrad och mera än hos föreg. uppfylld af nerven. — *Oncophorus* *Brid.* *Dicranella* *Lindb.* *Dicranum virens  $\beta$  ed.9.*, till en del.  $\beta$  *D. Homanni* *Boeck.**

\*\* Bladen papillösa; kaps. utan fästknöl, med mycket ofullständigt peristom.

- 3 *C. Bruntoni* *Br. & Sch.* bladen ut- och flerböjda, torra krusiga, de öfversta störst, alla n. jemnbredt lancettlika, spetsade, med till ofvan midten tillbakavikna, mot spetsen glesl tandade kanter, n. utlöp. nerv, vid basen större n. rektangulära, för öfr. små, rundadt kvadratiske celler; kaps. upprät, n. äggformig, rak ell. något krökt, med små, ojemnt till basen 2delade, snart bortfallande tänder, sylsprötadt lock. 2½ 6, 7. *Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.336.*

Bergspring. r. (*Sk.* Skäråli; Trollehallar; Ryssherga; Leingaröd; Röstånga: Berggr. *Blek.* Carlshamn. *Smål.* Skurugata: Scheutz. *ÖG.* Omberg; Motala sn, Hälberget. *VG.* Halle- och Hunneberg. *Dalst.* Korpeknatten. *Bok.* Marstrand; Skafth; Ljungskil enl. Berggr. *Lul. Lpm.* Parkijaure: Holmgr. — *N.* Enningdal. Trondhj. st. Aalesund; samt Nordl. Bodö; och Finn. Tromsö och Maalselvålen: Holmgr.) *Tätt tufvad, ½—1 tum hög, med omkr. 3 lin. långa gulaktiga fruktskaf, ljusbrun kaps., röda ofta blott rudimentära tänder. — *Dicranum* *Sm.* *Didymodon obscurus* *Kaulf.* *Oreoweisia* *Milde.**

†† Kapseln färad, med fullständigt peristom; bladen papillösa.

- 4 *C. polycarpum* *Sch.* bladen utstående flerböjda, säll. ensidiga, torra vridna, från lancettlik bas n. jemnbreda, spetsiga, med tillbakavikna, upptill fint sågtandade kanter, i spetsen försvinn. nerv, glesl papillösa; kaps. upprät—lutande, aflångt omv. äggformig, något sned, med mer ell. mindre tydlig fästknöl, sylsprötadt lock. 2½ 5, 6. —  $\beta$  *strumiferum*: kaps. mera sned, med tydlig fästknöl. *Fig. Br.eur. [Dicranum]. Lindgr.M.exs.90.  $\beta$  Thed.M.exs.117. R.Hn.Bryac.exs.271.*

Berg, sten. (*Sk.—Lpl. — N.*) *Tufvad, ½—2 tum hög, vanl. mörkgrön; kaps. hos hufvudformen upprät och regelbunden, endast med spår till fästknöl;  $\beta$  är den vanligaste formen och mycket allmän. — *Dicranum* *Ehrh.* och *ed.9.*  $\beta$  *Dicr. strumiferum* *Ehrh.* *Cynodont. strumif. R. Hn.**

- 5 *C. gracilescens* *Sch.* bladen utstående flerböjda, torra mera krusigt hoporidna, kortare, lancettlikt jemnbreda, trubbad, upptill fint naggade, vanl. tätt och fint papillösa, för öfr. som hos föreg.: kaps. upprät, oval—aflång, föga sned, utan fästknöl, med sylsprötadt lock. 2½ 6—8. —  $\beta$  *curvisetum*: fr.skafet längre, båglikt nedböjdt. —  $\gamma$  *tenellum*: lågväxt, med kortare. n. glatta och helbrädd. blad. *Fig. Br.eur. [Dicr.]. Fl.D.suppl.1.t.46. Somf.Cr.exs.114. R.Hn.Bryac.exs.337.*

Berg, r. (*Lpl.*—*Verm.* *Ner.* och *Södm.* *ÖG.* Kolmorden: Mos.; V. Ny; Omberg. *VG.* Kinnekulle. *Smål.* Femsjö: Odensvi sn i Kalm. län: E. A. Strömb. — *N.* —  $\beta$  *N.* Dovre, vid Vårstien och Kongsvold. —  $\gamma$  i de nor. prov.) *Bildar 1—2 tum höga, ljusgröna, mjuka tufvor med något bredare och trubbigare, i friskt tillstånd utböjda blad än hos föreg.* — *Dicranum WM.* och *ed.9.*  $\gamma$  *D. alpestre Wg.*

46 Flocken **Weisse.**109. WEISIA *Hedw.*

† *Rhabdoweisia Br. & Sch.* Kapseln tydligt strimmig, med kort hals, långa tänder. Sambyggare.

\* Bladen starkt papillösa, med tillbakavikna kanter.

- 1 *W. Schisti Brid.* bladen jemnbredt lancettlika, *trubbade*, ogenomskinliga, *längs hela kanterna lätt papillöst naggade*, med under spetsen försvinn. nerv; kaps. från en tydlig hals, oval, med från nedersta basen småning afsmalnande, *bredt lancett-ell. syllika* tänder, kort sprötspetsadt lock. 2, 6, 7. Fig. Br.eur.

Klippspring. r. (*Smål.* Odensvi sn: Strömb. *Ner.* Ullaviklint: C. Hn. *Vestml.* Ramshyttan, Loberget: Sill. *Stockh.* vid Skrubba; Gåsberget enl. Thed. *Helsl.* Bollnäs sn, Tjärberget; samt Arbrå sn, Dropphällen, och Hudiksv. på Getberget: C. & R. Hn. *Medelp.* Sundsvall: Lindb. *Herjed.* Ulfberget, samt *Jemt.* Hofverberget: R. Hn. *Lul.* Lpm. Nammats; samt Parkijaure: Holmgr. — *N.* Christiania, Krokkliefven. Tellemarken, vid Tindsjön. Gudbrandsd., Ringeboe.) *Stjelk. från ett par lin. till halftumshöga i lösa, mjuka, gröna ell. gulbruna tufvor, med omkr. 2 lin. höga fr.skaft. Väl skild från de 2 följ., med hvilka den af gammalt stund förveklats; hvarför utg. här endast upptager de lokaler, som han har sig bekanta såsom fullt säkra. Gränisar nära till de sista arterna i föreg. släkte, med hvilket den ock förenas af Lindb.* — *Bryum Oed.* *Cynodontium Lindb.*

\*\* Bladen icke ell. omärkligt papillösa, med platta kanter.

- 2 *W. denticulata Brid.* bladen jemnbredt lancettlika, *mer-ell. mindre trubbade*, upptill groft och glest sågtandade, med under spetsen försvinn. nerv; cell. i bladets öfre del *n. quadratisk*; kaps. som hos föreg., med från bredare, *n. triangulär bas smalt jemnbredt syllika* tänder, långt sprötspetsadt lock. 2, 6—8. Fig. Br.eur. R.Hn. *Bryac.exs.335.*

Klippspring. r. (*Sk.* Jularp, samt Hofshallar vid Båstad enl. Lindb.; mell. Bosjökloster och Höör: Berggr. *VG.* Göteborg: Prof. Wahlb.; Hunneberg: Lindb.; Kinnekulle: Lindgr. *Dalsl.* Korpeknatten. *Boh.* Skafthö. *ÖG.* Motala sn, Lemunda. *Dal.* Närke: Jellet i Transtrand: Liedstr. *Lul.* Lpm. Nammats: Holmgr. — *N.* Gudbrandsdalen, Ringeboe: Berggr.) *Stor. som föreg., med mycket genomskinliga blad; säkrast skild från följ., hvarmed den är mycket nära besläktad, på peristomets länge quar-sittande, vida fastare och gröfre tänder.* — *Rhabdow. crispata Lindb.*

- 3 *W. fugax H.* bladen *smalt jemnbredt lancettlika, spetsiga*, glest småsågade—hel-bräddade, med n. utlöp. nerv; cell. i bladets öfre del på tvären ovala (mer breda än långa); kaps. *n. utan hals*, omv. äggformig, med från mycket bred och låg bas tvärt hårfin, mycket flygtiga tänder, långsprötadt lock. 2, 6—8. Fig. Br.eur. R. Hn. *Bryac.exs.211.*

Klippspring. r. (*VG.* Hunneberg: Lindb.; Kinnekulle, nära Källby: Zett. *Boh.* Kongel. Åkerm. enl. Lindb. *ÖG.* Omberg: Holmgr. *Stockh.* flerst.: Lindb. *Vestml.* Ramshyttan, på Loberget: Sill. *Helsl.* Mo sn, Kasberget. — *N.* Egebjergert vid Christiania enl. ex. af Blytt. Bergen st., flerst. i Sogn. enl. Wulfsb.; Voss: Bl. Dovre, vid Vårstien och Drivstuen. Nordl. Salten: Somf.; Käringsön: Wg.) *Vanl. spådre än föreg., med genomskinnl. blad och därför mycket tydliga celler; var. dock dels med gröfre bladceller och större kaps., dels med n. hälften mindre celler och kapsel, hvars tänder snart bortfalla, endast kvarlemnande den låga breda basen, så att perist. tyckes saknas. En sådan skenbart tandlös form är var.  $\beta$  *gymnostoma ed.9* ell. *Gymnost. granuliferum Hn ed.4.* — *Grimmia striata Schrad.* *Weisia striata Kaulf.**

†† *Emoëisia* Sch. Kapseln slät; peristomets tänder långa, syllika. Sambyggare.

- 4 *W. crispula* H. bladen allsidigt utstående, flerböjda—ensidigt, stund. skårformigt böjda, torra krusigt hopvridna, från konkav, bredare bas hastigt långt rännformigt syllika, spetsiga, med helbrädd. platta kanter, i spetsen försvinn. nerv och stora bruna, n. quadratiska hörnceller vid basen; kaps. upprät, aflångt äggformig, med långspröadt lock utan ring. 2 6—8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.333.

Fjell- och bergstr. (Lpl.—Dal. VB. Smål. Elmhult och vid Möckeln enl. Berggr. — N.)  $\frac{1}{2}$ —1 tum hög, dels i fasta svarbruna tufvor med gröna toppar, dels löst tufvad gulbrun; bladen på undre sidan tydligt papillösa; fr.skaften  $\frac{1}{2}$ —1 tum höga. — *Blindia* C. Müll. *Dicranoweisia* Milde.

- \*5 *W. compacta* Brid. bladen tätt sittande, utstående, torra icke krusiga, med kortare och bredare, trubbad spets; kaps. slutl. något lutande, med kort hals, mera kortspröadt lock; för öfr. som föreg. 2 6, 7. Fig. Br.eur.

Fjelltr. r. (N. Dovre, på Harbacken; samt vid Storhøe, i en bäckdal mot Fogsåen.) Tufvorna 3—4 lin. höga, svaraktiga, mycket tätta; fr.skaften blott ett par lin. höga; kaps. mörkare brun än hos föreg., hvaraf närv. måhända blott är en varietet.

- 6 *W. cirrhata* H. bladen utstående—utböjda, torra krusigt vridna, från konkav bredare bas mer småningom jemnbredt och n. köladt lancett-ell. syllika, spetsade, med helbrädd. tillbakavikna kanter, i spetsen försvinn. nerv och med de öfriga bascellerna föga olikformiga hörnceller; kaps. upprät, smalt aflång, med långspröadt lock, bred ring. 2 5, 6. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.332.

Klipp., berg, r. (Sk. Stenshufvud; Lund, vid Fogelsång; Trolleholm; Höör; Årup enl. Lindb.; Lunnon, Friggetofta, Uddarp m. fl. st. i Broby sn, samt Tomarp i Österslöv sn; Hamnstr. Smål. Vexjö. Dalsl. Hesselskog. Stockh. på Foglarön.) Omkr. half-tumshög, med lika högt fruktskaft, tufvad, nedtill ljusbrun, upptill ofta liftigt grön, mjuk, med kortare blad och smalare kaps. än *W. crispula*. — *Blindia* C. Müll. *Dicranoweisia* Lindb.

††† *Microëisia* Sch. Kapseln slät; perist:s tänder mycket korta, ofta ofullständiga—felande.

- 7 *W. viridula* Brid. sambyggare; bladen utstående flerböjda, torra krusigt vridna, från bredare bas jemnbredt syllika, med upptill inrullade kanter, helbräddade, med udd af den grofva ullöp. nerven, tätt och fint papillösa; kaps. upprät, äggformig—aflång, rödbrun, med långspröadt lock, smal ring.  $\odot$  4—10. —  $\beta$  *microdus*: fr.skaftet längre, blekgult; tänd. smalare, röda. —  $\gamma$  *gymnostomoides*: kaps. utan, ell. blott med spår till tänd. Fig. Br.eur. Fl.D.2304,f.2. R.Hn.Bryac.exs.61.

Sand- och lerjord,  $\gamma$  bergspring. (Sk.—Gestr. och Dal. Jemtl. Frösön; Holmgr. Boh. Christinedal. Öl. Tvetaås: Zett. — N. —  $\beta$  N. —  $\gamma$  Smål. Oskarshamn. Stockh. Gåsberget; Stora Essingen. Gestr. Gråberget. Ner. Skåleklint: C. Hn. Öl. Vickleyby kyrka: Lindb. Götll. Nerest. — N.) Ljusgrön, tufvad, ett par lin. hög, med föga högre fr.skaft, förvillande lik *Gymnost. microst.* och knappt skiljd med annal än den mer mörkfärgade kapseln peristom och brist på mynninghinna. — *Bryum* L. *Simophyllum* Lindb. *Weisia controversa* H.  $\gamma$  *W. gymnostomoides* Brid. *Gymnost. tortile* Hn. edd.5—8 (icke Schwægr.).

- \*8 *W. Wimmeriana* Br. & Sch. blir 2könade; bladen lancettlikt jemnbreda med huflik spets, för öfr. som hos föreg.; kaps. upprät, oval, med mycket korta, tvärhuggna, ljusbruna, inåt rigtade tänder, långspröadt lock, bred ring.  $\odot$  8, 9. Fig. Br.eur. Fjelltr. r. (Norge: Somf. enl. Schimp.) Lik föreg., men med längre och smalare blad; för öfr. skiljd med de 2könade blöna, det längre och finare fr.skaftet, blekare kaps., samt peristomets små, inom mynningen horisontall inåt vända länder, som knappt äro så långa som ringens bredd. Allt efter utl. ex.; norska oseedda af utg. — *Gymnostomum* Sendtn.

## 110. ANOECTANGIUM Schwægr.

- 1 *A. compactum* Schw. bladen något utstående, torra inkrökta ell. svagt vridna, lancettlika, spetsiga, nedtill fint papillöst naggade, för öfr. helbrädd., konkava med platta kanter och i spetsen upphör. nerv; bascell. genomskinnl., rektangulära, de öfr. rundadt

kvadratiske, små; kaps. med tydl. hals, aflång—oval, med mycket långt sylsprötadt lock. 24 7, 8. Fig. Br.eur. [A. æstiv.]. R.Hn.Bryac.exs.1.

Fukt. klipp., helst i fjelltr. r. (Lul. Lpm. Gellivare tuoddar: Ångstr.; Njommelsaska, och flest. vid Qvikkjokk: Holmgr. Pit. Lpm. Kåksa. Jemtl. Snasahögen. Herjed. Ljungdalsberget. ÖG. Lemunda; Hälberget. — N. Nordl. Helgeland, flest i Ramen: A. Bl. & Arn.; Kärängön—Stavanger och Christiania.) Tufvorna stora och fasta, 1—2 tum höga, bruna, ofvan rent gröna; fr.skaften nära  $\frac{1}{2}$  tum långa, fästade teml. långt ned på stjelkens sidor; bladen i torrt tillst. ofta i tydliga spiraler kring stjelken. — Gymnostom. Brid. G. æstivum N. & H. G. tristichon Wg.

### 111. GYMNSTOMUM Hedw.

† Bladnerven icke utlöpande; kapselns mynn. öppen. Tvåbyggare.

\* Stjelken utdragen, grenig.

1 G. curvirostre H. bladen utstående, smalt lancettlika, spetsiga, med helbräddade, nedtill tillbakavikna kanter, under spetsen upphör. nerv, icke papillösa; kaps. omv. äggformig—klotrund, rödbrun, slät, med långt och smalt sprötspetsadt lock. 24 7—9. —  $\beta$  microcarpum: kaps. liten, rundad. —  $\gamma$  pallidisetum: kaps. smalt omv. äggformig; lockets spröt kortare. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.32.  $\beta$  Somf.Cr.exs.107.

Fukt. klipp. r. (Lpl.—Dal. Idre. ÖG. Omberg. Öl. vid Vickelby kyrka: Lindb.; med. Tveta och Thorslunda kyrka: Zett. Götll. Kopparvik: Eksta; Bogeklint. — N. —  $\gamma$  N. Dovre.) Tull tufvad, 1—2 tum hög, ljusbrun, ofvan mera grön, vanl. med mycket rolludd. — Pottia Ehrh. Weisia C. Müll. Hymenostylium Lindb.

2 G. rupestre Schwagr. bladen utstående—utböjda, lancettlikt jemnbreda, trubbad, med papillöst finnaggade, platta kanter, i spetsen upphör. nerv, till papillösa; kaps. aflång ell. oval, gulaktig, slät, med kägellikt spröt på locket. 24 6—8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.334.

Klipp. r. (Lul. Lpm. Nammats vid Qvikkjokk: Holmgr. Pit. Lpm. Tjiddjakk. Jemtl. Åreskutan: Frösön: Holmgr. Medelp. Sättna: Ångstr. Dal. Osmundsberget. Vestml. Sala. VG. Kinnekulle; Hunneberg. ÖG. Lemunda och Hälberget; Omberg. Smål. Grenna, vid Gerabäcken: Scheutz. Götll. Kopparvik; Stora Carlso. — N. Finnm. Alten: Zett. enl. Lindb. Nordl. Bodö: Holmgr. — Christiania.) Tufvorna vanl.  $\frac{1}{4}$ —1 tum höga, mer och mindre låda, bruna, ofvan mörkgröna, med mycket rolludd, 2—5 lin. långa fr.skaft. — Weisia C. Müll. Trichostom. Milde. Gymnost. æruginosum Sm. Trichost. ærugin. Lindb.

\*\* Stjelken mycket kort, oftast enkel.

3 G. tenue Schrad. bladen söga utstående, torra raka och uppräta, de nedre tunglika, de öfre från aflång bas smalt jemnbreda, alla trubbiga, konkava med platta, n. helbräddade kanter, under spetsen upphör. nerv, papillösa; kaps. upprät, aflång, med kort kägellikt spröt på locket, bred ring. 24 7, 8. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.362. Sandsten, kalkberg, r. (Sk. Kjugekullen vid Ifösjön, på grusig krita. Öl. Köpings bränner: Zett. Götll. Hoburgen; Grumpviken i Vamlingbo, på sandsten; Kittelviken: Lindb.) Löst tufvad ell. växande gruppvis, med omkr. en linie höga stjelkar, 2—3 lin. höga fr.skaft; kaps. ljusbrun, med röd mynning. — Weisia C. Müll. Trichost. reflexum  $\beta$  gymnostomum Lindb.

†† Hymenostomum R. Br. Bladnerven utlöpande i en udd; kapselns mynning tillsluten af en hinna. Sambyggare.

4 G. microstomum H. bladen utstående, lancettlika, spetsiga, helbräddade, med inrullade kanter, papillösa; kaps. aflång—elliptisk, vanl. något smed, slät, med smal mynning, längre ell. kortare, smalt sprötspetsadt lock. 24 4, 5; 9, 10. Fig. Br.eur. Fl.D.2612,f.1. R.Hn.Bryac.exs.331.

Ler- och sandjord. (Sk.—Gestr. Gelfe. Ner. Örebro; Dylta m. fl. st.: C. Hn. VG. Göteborg; Kinnekulle. Öl. Götll.) Växer i ett par lin. höga, lösa och mörkgröna tufvor, med fr.skaft af samma höjd; var. mycket till kapselns form, lockets höjd etc. — Weisia C. Müll. Simophyllum Lindb.

5 G. squarrosum Wils. bladen sperrigt utböjda, något bredare, med platta kanter;

kaps. elliptisk, regelbunden, mindre, och kortare skafad; för öfr. som föreg. 24 10—4. Fig. Br.eur.

Lerjord, r. (Öl. Vickieby allvar: Lindb.) Löst tuffad, grön, liten som föreg., men med nedliggande hufvudstjelt, från hvars öfre sida nya skott skjuta uppåt. — *Weisia* C. Müll.

112. *SYSTEGIUM* Schimp.

1 *S. crispum* Sch. toppbladen störst, torra krusigt vridna, jemnbredt lancett- ell. syllika, spetsiga, med helbrädd. inrullade kanter och till udd utlöp. nerv, af vid basen aflånga vattenklara, högre upp små, n. qvadratiska celler, på undre sidan tät papillös; kaps. vanl. insänkt. klotrund, med lågt koniskt lock. 24 4—6. Fig. Br.eur. Fl.D. 1891, f.2. R.Hn.Bryac.exs.31.

Ler- och sandjord, r. (Sk. Lund; Arendala; Vidarp; Trollenäs. Smål. Odensvi sn. Stockh. Rålambshof; Ullsunda etc. Uppl. Upsala, vid Strömparterren, Håga, Husbyborg etc. Gestr. Gelle. Vestml. Sala, nära Norrby kyrka. Ner. Örebro: C. Hn.) 2—5 lin. hög, nedtill enkel, upptill 2—3grenig; kaps. sällan något framskjulande mell. bladen; locket stund. affallande. — *Phascum* Hedw. och ed.9. *Asiomum* Hpe. *Weisia* Lindb. *Simophyllum* Lindb.

II. *Musci cleistocarpi*.

Kapseln utan tydligt lock, affallande oöppnad ell. oregelbundet uppbristande.

V. — *ARCHIDIACEÆ*.47 Flocken *Archidiæ*.113. *ARCHIDIUM* Brid. \*)

1 *A. alternifolium* Schimp. stjelkl. glesa, äggrundt lancettlika, smalspetsiga; perichæt-bladen större, från äggrund bas lancettlikt syllika, mot spetsen smätandade, uddspetsiga af den utlöp. nerven; cellväfven lös, af utdraget sexsidiga celler; kaps. insänkt, klotrund, utan spår till lock. 24 5—7. Fig. Br.eur. R.Hn.Bryac.exs.181.

Ler. ställ. r. (Sk. mellan Höör och Stehag, nära Ormanås: Berggr. VG. Venersborg, på Venerns stränder öst. om staden; nära Lidköping.) Är första året ett par lin. hög och enkel; blir sedan grenig, nedliggande, 4—6 lin. lång. Ganska lik *Pleurid. alternifol.*, men vid fruktinögn. lätt skiljd med den oskafade kapseln, som har alldeles rundad topp och innehåller blott omkr. 20, jemförelsevis stora sporer. — *A. phascoides* Brid. *Phasc. alternifolium* Dicks.

X. — *PHASCACEÆ*.48 Flocken *Bruchies*.114. *SPORLEDERA* Hampe. \*\*)

1 *S. palustris* Hpe. de öfre bladen störst, från lancettlik bas småningom. perichæt-bladen från kort och bred bas hastigt, öfvergående i en lång, borstfin, till stor del af den utlöp. nerven bildad, upptill glest sågad spets; cell. aflångt sexsidiga; kaps. insänkt, äggformig, glanslös, med kort och rak, konisk spets. 24 6. Fig. Br.eur. R. Hn.Bryac.exs.303.

\*) Närmast slägt med *Leptotrichum* bland *Trichostomeæ*.

\*\*) Närmast slägt med *Trematodon* bland *Dicranææ*.



Fukt. st. torfsford. r. (Sk. vid Håbör, i torfgravar.) Grön ell. brun, i början ett par lin. hög, enkel, andra året större och något grenig, med teml. stor, blekgul kapsel. — *Phascum* Br. & Sch. ed.9. *Pleuridium* Br. & Sch. [omarbetning]. *Bruchia* C. Müll.

49 Flocken **Pleuridiæ.**115. **PLEURIDIUM** Brid. \*)

† Toppladen störst, af något tät cellväf, med utlöpande ell. n. utlöp. nerv.

- 1 *P. alternifolium* Rabenh. sambyggare; toppbl. från oval bas hastigt sammandragna till en lång syllik, svagt finsågad spets, hvars öfre del helt och hållet fylles af den breda nerven; bascell. hysande klorofyll; kaps. insänkt, rundadt oval, med något utdragen och sned spets. ☉ 5, 6. Fig. Br.eur. Lindgr.M.exs.97. R.Hn.Bryac.exs.92. Jord, dikeskant. (Sk.—Helsl. Bollnäs sn. vid Hamre: Oldb. Dal. Ner. allm. Dald. Öl. vid Färjestaden: Zett. — N.) Stjelken 2—5 lin. hög, enkel, ell. grenig med utdragna nyskott, af gul-ell. mörkgrön färg. — *Phascum subulatum* Schreb. (enl. Lindb.) och ed.9. *Pleurid. subulat.* Lindb.

- 2 *P. subulatum* Rabenh. blir 2kånade; toppbl. från lancettlik bas mer småning. af smalnande till en lång syllik, svagt finsågad spets, med smalare, i yttersta spetsen försvinnande nerv; bascell. tomma, vattenklara; kaps. med mycket kort, n. rak spets, för öfr. som hos föreg. ☉? 4—6. Fig. Br.eur. Fl.D.2560,f.1 enl. Lindb. Rab. Bryoth.152.

Jord, r. (Blek. Vämö. Smål. Femsjö enl. Scheutz. VG. Hunneberg. Stockh. vid Barnängen.) Stor som föreg.s mindre former, enkel, af gulgrön färg, med lösare cellväf i den mer långsträcktä bladbasen. — *Phascum subulatum* Schreb. (enl. Schimp.). *P. acuminatum* Lindb. och ed.9. — Anm. Vid denna och föreg. arts bendmmande följde utg. i ed.9 Lindb.; men då det vid jemförelse med Schrebers afh. visar sig ganska troligt, att denne under namnet subulat. inbegripit begge arterna, på hvilka öfven del af Lindb. i V. Ak. Öfvers. 1864, p. 587 citerade Schreberska uttrycket är lika tillämpligt, anser utg. del nu ej vara skäl att afrika från de i senare tider allmänt antagna bendmningsätten.

†† Alla bladen n. likformiga och lika stora, af lös cellväf, med långt ned försvinnande nerv.

- 3 *P. nitidum* Rab. blir 2kånade; bladen lancettlika, spetsiga, upptill svagt och glest sågade, med smal och otydlig, i spetsens nedre del försvinn. nerv; cell. aflånga, genomskinn.; kaps. något framskjutande, oval, med kort, trubbad, föga sned spets. ☉ 9, 10. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.403.

Jord, dikeskant. r. (Sk. Östra Ljungby sn, Bläsinge. Smål. Odensviholm: Ljunga enl. Scheutz; Femsjö. ÖG. Vinnerstad: Vestra Stenby. Södm. Svanvik vid Nyköping: C. Ind. Stockh. Stadshagen. Gestr. Gefle; Östanbäck; Osläufors. Vestml. Vesterås. Ner. Örebro flerst. ymn.: C. Hn. Verm. Christinehamn. VG. Venersborg. Boh. Kongell, vid Marieberg. — N. Asker.) Blekt gulgrön, 1—2 lin. hög, växande gruppvis, enkel ell. grenig, ofta med flere, skenbart från bladvecken, tillsammans utgående kapslar. — *Phascum* H. och ed.9. *Asiomum* Hpe. *Ph. axillare* Dicks. *Pleurid. axillare* Lindb.

50 Flocken **Phasceæ.**116. **PHASCUM** Lín. \*\*)

- 1 *P. bryoides* Dicks. toppbladen störst, vanl. utstående, äggrundt lancettlika, med belbräddade, tillbakavikna kanter, och udd af den starka utlöp. nerven; bladspetsens celler rundadt sexsidiga; kaps. på utskjutande skaft, upprät, oval, småningom afsmaln. i ett snedt, trubbigt spröt. ☉ 4—6. Fig. Br.eur. Fl.D.2063. R.Hn.Bryac.exs.361.

\*) Närmast slägt med *Leptotrichum* bland *Trichostomeæ*.

\*\*) Närmast slägt med *Pottia* bland *Pottiaæ*.

Jord, r. (Sk. Gullarp; Årup. Södm. Strengnäs kyrkogård 1832 [sedan knappt återfunnen]. *Gestr.* Gelle, vid Tolffors: R. Hn. Öl. vid Karlevi, Örmöga gästg. samt Södvik: Lindb. *Gottl.* Med öfver en linie framskjutande fr.skaft liknar denna art en *Pottia*, till hvilket slägte den och föres af Lindb. under namn af *P. bryoides*. — *Phascum graniferum* Wg. Fl. *Gottl.* *P. piliferum* Wg. Fl. Su.

- 2 *P. cuspidatum* Schreb. toppbl. störst, upprätta ell. n. knopplikt hopslutna, lancettlika med helbrädd., nedtill tillbakavikna kanter och ofta lång, hårlig udd af den utlöp. nerven; bladspetsens celler n. kvadratiske, vanl. omärkligt papillösa; kaps. insänkt, mycket kort skaftad, klotrund ell. rundadt äggformig, med n. omärklig, trubbig udd. ☉ 5. — *β piliferum*: mindre, med lång hårlig, genomskinnl. bladudd. — *β papillosum* Lindb. matt blågrön, med mindre spetsiga, tätt papillösa blad. Fig. Br.eur. Lindgr. Mex. 50. R. Hn. Bryac. exs. 91. *β* Fl. D. 1891, f. 1.

Jord, a. γ r. (Sk.—Ångml. och Jemt. Öl. Örmöga: Lindb. — N. — *β* mer sälls. Sk.—Uppl. och Ner. — γ Stockh. Danvikskrokare.) Vanl. 2—3 lin. hög, grön ell. brungrön; bladen n. kölade, torra något vridna. — *P. acaulon* L. och Lindb. *β P. piliferum* Schreb. γ anses numera af Lindb. för egen art, och synes afven utmärkt af de mycket mindre, rundadt quadr. cellerna i bladens öfre del; utg. eger dock allför få och ofullständ. ex. att ens kunna gifva en diagnos.

## 117. SPHERANGIUM Schimp. \*)

- 1 *S. muticum* Sch. bladen äggrunda, de öfversta störst, starkt konkava och knopplikt hopstående, med nerven utlöp. i en kort, utböjd udd ell. försvinn. i spetsen, helbräddade ell. mot spetsen ojemnt groftandade; cellerna upptill aflångt sexsidiga, omärkligt papillösa; kaps. innesluten, klotrund. ☉ 4—6. Fig. Br.eur. Thed. M. exs. 131. R. Hn. Bryac. exs. 302.

Lerjord, r. (Sk.—Uppl. *Gestr.* Gelle, vid Tolffors. Ner. mångenst. kring Örebro: C. Hn. Öl. vid Färjestaden: Zett.) Växer gruppvis; hela mossan knappt 1 lin. hög, mörkgrön ell. brunaktig, aflångt lökformig, med nedtill mycket små, n. nervlösa blad; kaps. fullständigt dold mell. de 2, 3 stora, n. båliskt konkava toppbladen. — *Phascum* Schreb. och ed. 9. *Acaulon* C. Müll.

## 118. MICROBRYUM Schimp. \*)

- 1 *M. Floerkeanum* Sch. bladen n. upprätta med utböjd spets, bredt äggrunda, smal-spetsiga, helbräddade, de öfre med tillbakavikna kanter och udd af den utlöp. nerven; cell. i bladspetsen aflångt sexsidiga, papillösa; kaps. insänkt, rundadt äggformig, med kort, trubbig udd. ☉ 4, 5. Fig. Br.eur.

Lerjord, r. (Sk. Knästorp. Ner. Örebro, nära Carlsund: C. Hn. Uppl. Uppsala, vid ån; åkr. vid vägen till byn Ekeby m. fl. st.) Ytterst liten, knappt  $\frac{1}{4}$  lin. hög, gruppvis växande och små bruna knoppar liknande mossan, med kaps. synlig mellan toppbladen, som äro något smalare, men knappt längre än de öfr. bladen, och hvilkas spetsar äro utstående, ej hopslutna omkring frukten. — *Phascum* Wm. och ed. 9. *Acaulon* C. Müll.

## 119. EPHEMERELLA C. Müll. \*)

- 1 *E. recurvifolia* Sch. de öfversta bladen störst, utstående—n. sperrigt utböjda, smalt jemnbreda, småning. smalspetsade, särd. mot spetsen ojemnt bugtandade, med grof, till en udd utlöp. nerv; kaps. insänkt, klotrund, med kort snedt spröt. ☉ 10—4. Fig. Br.eur.

Jord, r. (Uppl. Uppsala, i ångsdiken nära Strömparterren upptäckt 1870 af R. Oldb.) Till växtsätt lik *Ephemerum serrat.*, men något större, lätt igenkänlig på de långa, smala, starkt utböjda, ljusgröna bladen midt ibland förgröddens talrika, konferolika trådar. — *Phascum* Dicks. *P. crassinervium* Grev. *Ephemerum pachycarpum* Epe och Br.eur.

51 Flocken *Ephemereæ*.

## 120. PHYSCOMITRELLA Schimp. \*\*)

- 1 *P. patens* Sch. bladen utstående, de öfversta störst, ovala—aflångt omv. äggrunda,

\*) Närmast släkt med *Pottia* bland *Pottieæ*.

\*\*) Närmast släkt med *Physcomitrium* bland *Funariaceæ*.

kortspetsiga, ofvan midten tydligt sågade, med i spetsen försvinn. nerv; cellväfven mycket lös, af aflångt sexsidiga celler; kaps. insänkt, n. oskaftad, säll. kort skaftad, klotrund med en kort udd. ☉ 8, 9. Fig. Br.eur. Fl.D.1410.

Lerjord, stränd. r. (Sk. Lund; Skäglinge. Blek. Beseboda. ÖG. Vinnerstad: Holmgr. Uppl. Uppsala, vid ån m. fl. st. Gestr. Gefle. Helsl. Alfta sn, Kyrkbyn: Oldb. — N. Bergen st., vid Vik i Sogn enl. Wulfsb.; Voss.) 1—3 lin. hög, ofta med tydlig, ehuru kort stielk, blekgrön och mjuk, växande gruppvis. — *Phascum Hedw. och ed.9. Ephemerum Hpe. Aphanorrhagma Lindb.*

### 121. EPHEMERUM Hampe. \*)

1 *E. serratum* Hpe. bladen något utstående ell. svagt ensidiga, de öfre störst, utdraget lancettlika, småningom spetsade, groft och ojemnt, n. flikigt sågade, nervlösa; cellväfven mycket lös, af aflångt sexsidiga celler; kaps. insänkt, glänsande rödbrun, klotrund, med kort, sned udd. ☉ 9—5. Fig. Br.eur. Fl.D.1411, f.1. R.Hn.Bryac. exs.301.

Fukt. lerjord, stränd. etc. r. (Sk. Lund; Knästorp; Trollenäs etc. Blek. Carlskrona. Smål. Odensviholm. ÖG. Östra Ryd; Vestra Ny, vid Åsen: Holmgr. Stockh. Marieberg; Mölnaträsk; Tollarö. Uppl. Uppsala, vid Norrby. Gestr. Oslättfors. Held. Skog sn, Hemstanäs. Vestmt. Köping, vid Grönöån. Ner. Örebro flerst.: C. Hn. — N. Asker.) De fruktbärande stånden omkr. 1 lin. höga, utan märkbar stielk spridda bland den vackert glänsande gröna förroddens lalrika trådar; den röda kaps. tydl. framlysande mell. bladen. — *Phascum Schreb. och ed.9.*

## III. Musci schizocarpi.

Kapseln öppnande sig regelbundet ända till basen i 4, säll. 6, upptill sammanstående flikar.

### Y. — ANDRÆACEÆ.

#### 52 Flocken Andreææ.

#### 122. ANDRÆA Ehrh.

† Bladen med nerv.

\* Tvåbyggare.

1 *A. nivalis* Hook. bladen vanl. ensidigt skärformigt krökta, aflångt lancettlika, småningom afsmalnande till en naggad spets, med n. utlöp. smal nerv, starkt och groft papillösa; perichæt.bl. med nerv; kaps. aflångt äggformig. 2, 7, 8. — β *Zetterstedtii*: bladen mindre krökta, knappt ensidiga. Fig. Hook.&Tayl.t.8. Br.eur. Zeu.Gr.&Andr. exs.50.

Fjellklipp. r. (Herjed. Helagsfjellen; Vigeln: Oldb. — N. Dovre. Rundenesfjeld. Fie-fjeld. Gråsidan i Voss. Tellemarken, Bårdals-skaret. — β Pit. Lpm. Tjiddjakk Herjed. Nedalen; Flottafjell.) Bildar 1—3 tum höga, mjuka, svartaktiga tuvor, med jemntoppadt greniga stielkar; bladens cellväf lös; frukt sällsynt.

2 *A. Blytii* Schimp. de nedre bladen utstående, de öfre ensidiga ell. något skärformiga, alla från aggrund bas hastigt sammandragna till en lång syllik, meränd. helbräddad, till stor del af den ullöp. breda nerven uppfylld spets, omärkligt papillösa; perich.bl. stora, de inre konkava, aflånga med kort udd, utan nerv; kaps. aflångt äggformig. 2, 7, 8. Fig. Br.eur. Zeu.exs.49.

Klipp. och sten. i fjelltr. r. (Pit. Lpm. Tjiddjakk. Um. Lpm. Marsfjellen; Rönnfjell: Ångstr. Jemtå. Snasahögen; Åreskutan. Herjed. Nedalen; Vigeln: Oldb. — N.

\*) Närmast släkt med *Physcomitrium* bland *Funariaceæ*.

*Finnm. Renöe; Tromsdaalstind; Hvassbrun vid Maalsnæs: Holmgr. Nordl. Sulitälma: Lor.; Heigeland, flerst. i Ranen: A. Bl. & Arn. Dovre, Sneehætten; Kollen nära Kongsvold, samt på Storhøe: Berggr. Rundene. Lomseggen. Bergen st., flerst. i Sogn: Wulfsb. Telemarken, Goustafield.) Knappt halftumshög, mörkbrun ell. svart, med fina och spröda stjelkar, mer lik följ. än föreg.; kaps. mycket liten. — A. perichæialis Zell.*

**\*\* Sambyggare.**

- 3 *A. crassinervia* Bruch: bladen ensidigt böjda, säll. allsidigt utstående, från *small* äggrund bas afsmalnande till en lång, syllik, *trind*, papillöst naggad, *öfverst af den utlöp. nerven fyllt* spets, för öfr. glatta; de inre perichæt.bl. nervlösa; kaps. aflång. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Somf.Cr.exs.126. Zell.exs.48.

Klipp. r. (ÖG. V. Ny sn, Elgknösen: Holmgr. Ner. Sumphallen i Viby sn. *Verm.* Svartjärnsberget i Kroppa sn; Hackrandsberget. — N. Christiania. *Finnm. Renöe.*)  $\frac{1}{2}$ —1 tum hög, svartaktig, något glänsande; bladens cellväf, ehuru tål, likväl märkbart gröfre än hos följ., hvarmed denna art är mycket nära besläktad.

- 4 *A. rupestris* Turn. bladen utstående ell. ensidiga, från äggrund bas lancetlik, med mer plattad spets än hos föreg., utlöp. nerv, mycket små, punktilika, i rader ordnade celler, glatta; de inre perichæt.bl. nervlösa; kaps. äggformigt aflång. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Fl.D.2125,f.1. Zell.exs.47.

Klipp. r. (Lpl. och VB. Luleå: Holmgr. — *Verm.* och *Held.* Stockh. Haga, Nyckelvikén; flerst. i skärgården; Dalarö ymn.: Holmgr. *Blek. Dalsl.* VG. Kinnekulle; Rackeby enl. Ångstr. Smål. Dunkaballar: Scheutz; Femsjö. Boh. Hall. Bårarp. Sk. Höör sn, Misseröd. — N. *Finnm.*—*Christiania.*) Stör som föreg., utan glans, i lösa svartaktiga ell. smutsigt mörkgröna tufvor; stj. styf. Var. icke obetydligt till storlek och färg m. m. — A. Rothii WM.

**†† Bladen utan nerv. Sambyggare.**

\* Bladens största bredd vid ell. ofvan midten.

- 5 *A. Hartmani* Thed. bladen söga utstående, vanl. mycket glest sittande, raka, konkava, bredt omv. äggrunda, med kort, trubbig spets, helbräddade, på undre sidan fint och otydligt papillösa; cell. rundade, stora, endast vid basen långsträckta. 24 7, 8. —  $\beta$  *Thedenii*: styfvere, med kortare, mer tätsittande och tydligare papillösa blad. Fig. Br.eur. Thed. Bot.Not.1849,f.1—17; 23—26. Zell.exs.46.

Fjelltr. r. (Pil. Lpm. Tjiddjakk. *Herjed.* på stenar i Nedalens och Midtådalens fjellbäckar. — N. Dovre, vid foten af Sneehætten; Storhøe, i uttorkade rännilar. Rundenefeld. Goustafield. —  $\beta$  N. Dovre.) Växer i vanl. 2—4 tum höga, lösa, ofven i torrt tillstånd mjuka tufvor af klynnegrenigt jemntoppade stjelkar och brungrön färg; bladen n. lika breda som långa. —  $\beta$  *A. Thedenii* Sch. är trol. endast en lokalform.

- \*6 *A. alpina* Turn. bladen torra n. tegellagda, mycket tätt sittande, konkava, från en upprät och tillrückt bas utböjda, omv. äggrunda—gigformiga, hastigt hopdragna till en kort och hvass spets, mot basen sågade, otyd. papillösa; cell. rundade, mycket små, nedom bladens midt långsträckta. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Thed.f.18—22.

Fjellklipp. r. (N. *Finnm.* Alstenöe; Renöe; Tromsö: Holmgr. Trondhj. st. Romsdalen, på Stigfeld: Kindb.; Veblungsnæs: Lor.; Aalesund: Holmgr. & Berggr. Bergen st., Sogn: Wulfsb.; Osteröe.) Tufvorna 1—3 tum höga, svartröda, torra spröda; bladen fasta, glänsande.

- 7 *A. obovata* Thed. bladen från bred, n. kvadratisk bas omv. äggrunda, småningom afsmalnande till en teml. lång, n. lancetlik trubbad spets, helbräddade; cell. rundade, teml. stora, mot bladbasen långsträckta. 24 7, 8. Fig. Br.eur. Thed.f.27—36. Zell.exs.45.

Fjellklipp. r. (Lul. Lpm. Qvikkjokk; Tåresåive: Holmgr. Pil. Lpm. Kåbrenåive m. fl. st. Um. Lpm. Storuman; Marsfjellen. Jeml. Snasabögen; Åreskutan. *Herjed.* flerst. i nordvestra fjellen. — N. Dovre. Rundenefeld. Bergen st., Sogn: Wulfsb.) Till storlek och färg lik föreg., vanl. grof och spröd, med glänslösa blad, hvilkas rundade celler äro märkbart större och, särd. längs kanten, gå mycket längre ned mot basen än hos föreg.

\*\* Bladens största bredd långt nedom midten.

- 8 *A. alpestris* Sch. stj. utdragen, fin; bladen tättsittande och allsidigt utstående, något glänsande, små, smalt äggrunda—äggrundt aflånga, trubbiga, helbräddade, af teml. stora celler, fint papillösa. 24 6, 7. Fig. Br.eur. Thed.f.45—47. Zett.exs.44.

Fjellklipp. (Lul. Lpm. mångåst.: Holmgr. Pit. Lpm. Um. Lpm.: Ångstr. Jemell. Snasahögen. Herjed. — N. Finnm. i Maalselvdalen: Holmgr. Nordl. Salten: Schleg. & Arn.; flerst. i Ranen: A. Bl. & Arn. Dovre. Bergen st., flerst. i Sogn: Wulfsb.: Filesfeld.) 1—2 tum hög, rent ell. rödaktigt svart, med mycket fin, jemntoppad grenig stjerk, blott hälften så stora blad som hos följ., hvaraf flere förf. anse den vara en fjellform. — *A. petroph.* β *alpestris* Thed.

- 9 *A. petrophila* Ehrh. stj. kort; bladen tättsittande, all- ell. ensidiga, glanslösa, äggrunda—äggrundt lancettlika, långt smalspetsiga, helbräddade, af små celler, mer och mindre papillösa. 24 6—8. — α *vulgaris*: alla bl. raka ell. de öfversta något ensidigt böjda. — β *homomalla*: alla bl. ensidigt böjda, mer snedspetsade. Fig. Br.eur. Fl.D.2125,f.2. Thed.f.37—44; 48—54. Zett.exs.41; β 42, 43.

Klipp., sten. a. (Sk.—Lpl. — N.) Tufvorna oflast  $\frac{1}{2}$  tum höga ell. lägre, sall. tumhöga ell. högre, af mörkbrun—svartaktig färg, med tjockare stjerkar och längre blad än föreg. — *A. alpina* WM. *A. rupestris* H.

- 10 *A. sparsifolia* Zett. stj. utdragen spenslig; bladen glest sittande, utböjda, i toppen något ensidiga, glanslösa, utdraget lancettlika, spetsiga, helbräddade, af små celler, fint papillösa. 24 7. Fig.

Fjellbäck. r. (Pit. Lpm. Peljekaisse. — N. Rundenesfjeld, på norra sidan. Goustafield.) Omkring tumshög, löst tufvad, brungrön, torr svartaktigt grön, med dubb. längre blad och n. ännu mindre bladceller än föreg., till habitus erinrande om *A. nivalis*. Anses af Lindb. för blott en form af föreg., hvilket ock synes utg. vara händelsen med ex. från Pit. Lpm., hvilka äro vida tät- och kortbladigare än de norska, mycket mer utmärkta ex.

- 11 *A. papillosa* Lindb. stj. utdragen, teml. grof; bladen tättsittande, allsidigt utstående, något glänsande, äggrunda, med kort och smal, hvass spets, n. helbräddade, af mycket stora och förtjockade celler, groft papillösa. 24 7. Fig.

Fjelltr. r. (Pit. Lpm. Sjället Tjiddjakk 1856: Lindb.) 1—2 tum hög, löst tufvad, mörkbrun—svart, med grofva, greniga stjerkar, tjocka blad, utmärkta af cellerna, som äro omkr. 3 gånger större, än hos *A. petroph.*, ehuru bladen äro lika korta som hos denna.

## 2 Fam. SPHAGNACEÆ Endl.

Bladcellerna af 2 olika slag, inkilade mellan hvarandra, näml. dels små klorosyllförande, dels stora vattenklara, ofta försedda med små runda hål och ringformiga trådar. Kaps. öppnande sig med ett lock, alltid utan peristom och ring. Sporerne af tvänne olikstora slag, icke blandade med springtrådar. Mössan oordentligt bristande och till största delen qvarsittande vid fruktens bas.

## 123. SPHAGNUM (Dill.) Ehrh.

† Grenbladen \*) bredt—rundadt äggrunda, smalkantade, med hufikt inrullad, rundtrubbig och otandad spets. Tvåbyggare.

- 1 *S. cymbifolium* Ehrh. stj. grof, med svällande tjocka tillspetsade smågrenar, blandade med smalare nedåt tilltryckta; stjelkl. bredt tunglika, smalkantade, med rundad, fransig spets; deras vattenklara celler utan ringtrådar och hål; grenbladens klara cell. med talrika ringtrådar och hål; perichæt.bl. bredt äggrunda, okantade, i spetsen fransiga, med ringtrådsceller. 24 7—9. Fig. Schimp. Monogr. Sph. t. 19. Sv. B. 113, f. c. d. Sill. M. exs. 182.

Skogskärr, a. (Sk.—Lpl. — N.) Tåll, ofta fast tufvad, vanl. stor och grof, ända till fotshög; färgen vanl. vitaktigt blågrön ell. rödaktig; alla bl. starkt konkava. — *S. palustre* L. [innefatt. alla då kända arter]. *S. latifolium* Hedw. *S. compactum* Brid., till en del.

†† Grenbladen aflånga—afångt äggrunda, smalkantade, med tvärhuggen, fliertandad spets och meränd. ända från basen inrullade kanter.

\* Stjelkl. n. lika breda från basen till den tvärhuggna, fransiga spetsen; tvåbyggare.

- 2 *S. Ångströmii* C. Hn. smågren. tättsittande, de flesta tjocka svällande; stjelkl. bredt tunglika, upptill smalt, mot basen bredt kantade, med bred, n. tvär, fransig spets, deras celler utan ringtrådar och hål; grenbl. aflångt äggrunda, med 6—fliertandad spets, deras klara cell. med ringtråd. och hål; perichæt.bl. aflånga, trubbiga, helbrädd., utan ringtrådsceller. 24 7—9. Fig. Russow, Beitr. z. Kenntniss der Torfmoose, f. 60, 82, 83.

Kärr i fjellr. r. (Torn. Lpm. Karesuando. Lul. Lpm. Stora Sjöfallet: Holmgr. Pit. Lpm. mell. Skutijaure och Afwaviken. Um. Lpm. Stöttingfjellet; vid Attjetjärnsberget, samt nära Umfors i Tärna: Ångstr. — N. Dovre, kring Drivstuen: Berggr.) Löst tufvad och mycket mjuk, gulaktigt ljusgrön eller brun, stund. n. så grof som föreg., hvarmed den fördom förväxlas. — *S. insulorum* Ångstr. *S. cymbifol. β cordifolium* Hn ed. 6.

\*\* Stjelkl. bredast vid basen ell. midten, rundtrubbiga ell. kort spetsade, i spetsen omärkl. fransiga ell. tandade; sambyggare,

- 3 *S. rigidum* Schimp. stj. grof, med tättsittande tjocka smågrenar; stjelkl. mycket små, från bred bas n. 3sidigt rundade, bredkantade, i spetsen otydl. fransiga, de öfre klara cell. utan ringtråd. ell. hål; grenbl. konkava, deras klara celler med talrika ringtrådar och hål; perich.bl. äggrundt lancettl., kantade, ensidigt böjda. 24 7, 8. Fig. Schimp. Sph. t. 18. Russ. Beitr. f. 58 och 81.

\*) Med grenblad förstås här de som sitta ungefär midt på smågrenarne, ej vid basen eller spetsen.

**Kärr.** (Lpl.—Sk. och Hall. Öl. Högby och Böda snr: Zeil. — N.) Vanl. styf, tät och fast tufvad, grof som *S. cymbisfol.*, men mera lågväxt, upptill blågrön, med mest utstående smågrenar, hvilkas blad icke äro så till tegellagda och tryckta intill hvarandra som hos de föreg. — *S. compactum* Brid., till en del.

- 4 *S. molle* Sull. stj. mindre grof, med tät sitt., mer utböjda, spetsade smågrenar; stjelkl. mycket stora, från smalare bas bredt ovala, ell. omv. äggrunda kort spetsade, smalkantade, i spetsen 2—3tandade, deras öfre klara cell. med talrika ringtråd. och hål; grenbl. bredt aflånga, deras klara cell. som hos föreg.; perich.bl. äggr. lancettlika, okantade, långspetsade, i spetsen tandade. 2. 6—8. Fig. Schimp.Sph. t.26. Russ.Beitr.59.

**Kärr, stränd. r.** (Sk. Höör. Smål. Elmhult: Berggr. Hall. Varberg: Scheutz. VG. Hunneberg, vid sjön Långvattnets strand. — N. Trondhj. st., Aalesund: Berggr.) Vanl. 3—4 tum hög och ej oläk föreg., men till alla delar spåddare och mjukare, blekt ell. hvitaktigt grön. — *S. Mülleri* Schimp.

+++ Grenbladen äggrunda, bredkantade, småningom och jemnt trubbad, i den vanl. afrundade spetsen småtandade, med upptill inrullade kanter; tvåbyggare.

- 5 *S. molluscum* Bruch: stj. fin och mjuk, med aflågsnade spetsiga och nedböjda smågrenar; stjelkl. stora, äggrunda, bredkantade, i spetsen helbräddade ell. omärkt. tandade, deras öfre klara cell. med ringtrådar; grenbls klara öfre cell. bredt rhombiska, med talrika ringtrådar, men få hål; perich.bl. aflångt lancettlika med ringtrådar. 2. 6—8. Fig. Schimp.Sph.t.21. Fl.D2755. Rab.Bryoth.213.

**Kärr, torfgräv. r.** (Sk. flerst. Smål. Elmhult: Berggr.; Vexjö; Nässjö jernv.station: Scheutz. Södm. Hället nära Nyköping: C. Ind. Stockh. Nacka. Uppl. Börje sn. Geatr. Öslåttfors. Um. Lpm. Lycksele. Vestml. Loka. Ner. Viby sn, Sumphallen. VG. Sköfde; Halle- och Hunneberg. Boh. Lysekil. — N. Christiania, Mellemkollen. Kongsberg. Krageröe. Næs jernv. Trondhj. st., Aalesund: Berggr. Nordl. Helgeland, flerst. i Ranen: A. Bl. & Arn.) Löst tufvad, mycket mjuk, af blekt gulgrön färg, spåddast bland alla arterna; smågren. blott 2—3 i hvarje knippe, ell. enstaka. — *S. tenellum* Pers. (enl. Lindb.) och ed.9, äldre namn, men fordom tillagdt finare former af flere arter och därför af de flesta förf. numera bortlagdt.

- 6 *S. subsecundum* N. v. Es. stj. gröfre, styf, med mer och mindre tät sittande spetsiga och nedböjda, stund. skruflikt vridna smågrenar; stjelkl. vanl. små, från bred bas äggrunda—aflånga, bredkantade, i den trub. spetsen något fransiga, deras öfre klara celler med ringtrådar; grenbl. starkt konkava, vanl. ensidigt och klotlikt böjda, deras klara öfre cell. mycket långa och smala, slingriga, med talrika ringtråd. och hål; perich.bl. som hos föreg. 2. 7—9. — *β auriculatum* Lindb. stjelkl. stora, vid basen starkt örönflikade. Fig. Schimp.Sph.t.22,23; *β* t.24. Fl.D.2754.

**Kärr.** (Sk.—VB. och Pil. Lpm. Boh. Christinedal. — N. — *β* VG. Hunneberg. Ner. Villingsberg: C. Hn. Vestml. Loka. Dal. Grycksbo. Geatr. Gefte, vid Olbacka. Um. Lpm. Lycksele: Ångstr. Pil. Lpm.: Lindb. — N. Bergen st., Sogndalavandet: Wulfsb.) Var. i hög grad till storlek och färg, vanl. 4—6 tum hög, gul-ell. brungrön; smågren. omkr. 4 i hvarje knippe. Stjelkens barklager enkelt. — *S. confortum* Brid., en form med vridna smågrenar. *β*, som är *S. auriculat.* Schimp., är till ut. och de stora stjelkl. ganska utmärkt, men påstås af flere förf. så sammanflyta med hufvudformen, att den ej kan skiljas som art; utg. har dock ej sett några säkra öfvergångsformer.

- 7 *S. neglectum* Ångstr. stjelken som hos föreg., med 2—3dubb. barklager; stjelkl. små, äggrunda, bredkantade, i den slutl. mycket trubbiga spetsen omärkt, fransiga, deras öfre klara celler n. utan ell. blott med antydning till ringtrådar; grenbl. starkt konkava, vanl. något ensidigt böjda, med alla de klara cell. smala och försedda med talr. ringtråd. och hål; perich.bl. aflånga, n. okantade, trubbiga, urnupå, utan ringtrådar. 2. 6—8. Fig.

**Kärr, r.** (Dal. Grycksbo 1854: Lindb. Ner. Skogsholms herrgård, i kärren vid sjön: C. Hn. Trol. flerst.) Habituellt ganska lik föreg., gul-ell. brungrön; utmärkt af de ända till basen med ringtrådceller försedda grenbl., under det att stjelk- och perich.bladen sakna sådana. Fruktskafsen hos Amerik. ex. (på svenska ex. har utg. ej sett dem) samlade mell. toppgrenarne, då de hos föreg. ofta utgå långt

*nedom dessa. Nerikes-ex., bestämda af Ängstr., öfverensstämma i allo med af honom meddelade orig.ex.*

+++ Grenbladen smala lancettlika, ell. breda med hastigt smal, mer och mindre utdragen, tvärbuggen och småtandad spets; kant. upptill inrullade.

\* Stjelkbladen tydl. bredast vid basen.

a — Stjelkbl. okantade ell. endast vid basen smalt kantade.

8 *S. squarrosus Pers.* sambyggare; stj. styf, ofta grof och utdragen, med teml. tät sittande, långa, nedböjda ell. hängande, *sperrbladiga* smågrenar, vanl. 4, 5 i hvarje knippe; stjelkbl. *mycket stora*, meränd. uppräta, från bred, tvår bas bredt aflånga, med något smalare, tvår ell. rundad, *tydl. fransig spets, okantade*, utan ringtråds-celler; grenbl. med smal utsperrad, 3—4tandad spets, smalkantade, med *stora och vida* klara celler, försedda med talrika ringtrådar och *stora* hål; perich.bl. i spetsen fransiga, utan ringtrådar, 2½ 7—9. Fig. Sch.Sph.t.17. Fl.D.1415. Sill.M.exs.183.

Skogskärr. (Sk.—Helsl. Ner. och Verml. Um. Lpm. Öl.: Lindb. — N.) Vanl. stor och grof, halffotshög ell. mera, nedtill hvitaktig, upptill ljust blågrön, löst tufvad. — En finare ell. yngre form är *S. squarrosulum Lesq.*

9 *S. leres Ängstr.* tvåbyggare; *späddare och mjukare* än föreg.: stjelkbl. mot basen kantade; grenbl. vanl. smalare, n. tilltryckta, med *mycket stora* hål hos de klara cellerna; för öfr. som föreg. 2½ 7, 8. Fig.

Kärr. r. (Sk. Öslöf enl. Lindb.; Höör och Jularp: Berggr. Södml. Jernä sn, Gestaberg: Cleve enl. Lindb. Stockh. Långsjön, vid Vinterviken. Uppl. Örbyhus: Ängstr. Vestml. Loka. Gestr. Gefle, i Hemlingbyskogen. Um. Lpm. Lycksele flerst. — N. Dovre, i Nystuedalen och vid Fogstuen: Berggr. Finnm. Fløjelsfjeld vid Tromsø: Holmgr.) Nära beslägtad med föreg., hvaraf Schimp., Russ. m. fl. anse den för en var., men skild med hela habitus, alla delars mjukhet, den mera brunaktiga färgen och de trinda släta smågrenarne.

10 *S. Wulfianum Girg.* sambyggare; stj. styf, vanl. utdragen, med tätsittande, talrika (ända till 12) smågrenar i hvarje knippe; stjelkbl. *mycket små*, nedböjda, från bred, tvår bas n. äggrundt triangulära, vid basen kantade, i spetsen *helbrädd.*, utan ringtrådför. celler; grenbl. upprätt utstående—n. utsperrade, äggrundt lancettlika, smalkantade, i den smala tvärhuggna spetsen 3—4tandade, med *långa, smala* klara celler, försedda med talrika ringtrådar och *mycket små* hål; perich.bl. aflånga, utan ringtrådför. celler. 2½ 6—8. Fig. Russ.Beitr.f.6—10 och f.53.

Kärr. r. (Lul. Lpm. Jokkmokk: Holmgr. Um. Lpm. Lycksele, vid Berghunda och Norrhunda; samt Vilhelmina prestg.: Ängstr. Ängml. Tåsjö och Helgum snr: Frist. enl. Ängstr. Ner. Skogsholm, vid sjöarne Hampetussen och Igeln: C. Hn.) Ofta fotshög, gulgrön, till habitus icke olik *S. recurvum*, men skild från denna och alla öfr. med de talrika smågrenarne, hvilka hos dem äro högst 7 i hvarje knippe; hos närv. art äro flertalet af smågren. nedåt tryckta intill och n. svepta omkring stj., det mindre antalet deremot båglikt nedböjda, i torrt tillst. något sperrbladiga. — *S. pycnocladum Ängstr.*, yngre namn.

b — Stjelkbladen tydligt, ofta bredt kantade.

11 *S. acutifolium Ehrh.* sambyggare; stj. mer och mindre utdragen, spenslig, med vanl. glesa, smala och långa smågrenar; stjelkbl. *små*, från bred, tvår bas äggrunda, kortspetsade, i spetsen 3—6tandade, *bredkantade*, de öfre klara cell. vida och försedda med ringtrådar; grenbl. aflångt lancettl., med tandad spets, smalkantade, deras klara cell. vida, med ringtrådar; perich.bl. utan ringtrådar. 2½ 7—9. Fig. Sch.Sph.t.13, 14. Sv.B.113.a,b. Fl.D.1531. Somf.Cr.exs.105.

Kärr. a. (Sk.—Lpl. — N.) Hela mossan mjuk, 3—6 tum hög, vanl. tät tufvad. Var. i högsta grad till växtsätt och färg, hvilken dock oflast är rödaktig, stundt brunröd: var. *fuscum*; utom denna var. hafva en mängd andra dylika blifvit upptäckta, såsom *tenellum*, *purpureum*, *roseum* m. fl., men som ofta öfvergå i hvarandra. — *S. capillifol. Hedro.* *S. capillaceum Sw.*

12 *S. rubellum Wils.* tvåbyggare; stj. spädd och mjuk, med aflägsnade smågrenar, *blott 3* i hvarje knippe; stjelkbl. *stora, smalkantade*, deras klara celler vida, n. utan ring-



trådar; grenbl. äggrundt aflånga, genom kanternas invikning spetsade, för öfr. som hos föreg. 24 7. Fig. Sch.Sph.t.20. Fl.D.2753.

Kärr, r. (Sk. teml. allm. Smål. vest. delen; samt Forsarum jernv.station: Scheutz. Hall. Fröllinge. VG. Halle- och Hunneberg. Verm. Filipstad. Ner. Sumphallen i Viby. Stockh. Nacka; Vermdön, vid Björknäs. — N. Näs jernverk. Trondhj. st. Aalesund: Berggr.) *Löst tufvad, purpurrod, n. lika spåd och mjuk som S. moluscum. Anses af Russo som en var. af föreg.: S. acutifol. & rubellum.*

- 13 *S. laricinum* Spruce: stj. styf, föga grof, med tätt sittande smågrenar, vanl. 4 i hvarje knippe; stjelkl. teml. stora, från bred tvär bas n. äggrundt triangulära, med trubbad, 2tandad ell. omärkt, fransig spets, bredkantade, deras klara celler stora och vida, med ringtrådar och håll; grenbl. aflångt lancettlika, teml. bredt kantade, i spetsen 3tandade, de öfre klara cell. långa och smala, med talrika ringtrådar och mycket små håll. 24. Fig. Rab.Bryoth.712.

Kärr, r. (Um. Lpm. Lycksele, i Nedre Qvarnmyran: Ångstr.) *Mjuk, brungrön, i något lösa tufvor af nära quartershöjd, habituellt något lik följ., för hvars afart den anses af Russo, hvaremot Wils. och flere förena den med S. subsecund., hvilken den dock är i hög grad olik. Allt enl. engelska ex.; svenska osedda af utg.*

- 14 *S. recurvum* PB. sambyggare; stj. något spenslig, utdragen, med något aflågsnade smågrenar, vanl. 4, 5 tillsammans; stjelkl. små, vanl. triangulärt äggrunda, bredkantade, i den trubbad spetsen 2tandade, de klara cell. utan ringtråd. och håll; grenbl. bredt lancettl., kantade, deras öfre klara cell. teml. vida, med talrika ringtråd. och mycket små håll; perich.bl. breda, utan trådsf. celler. 24 7, 8. —  $\beta$  riparium (Ångstr.) till alla delar större och gröfre, med smågren. i torrt tillst. n. sperrbladiga; stjelkl. större, ovala, i den 2tand. spetsen sargade. Fig. Sch.Sph.t.16. Fl.D.1712. Russ. Beitr.f.48—50.

Kärr. (Sk.—VB. och Um. Lpm. Öl. — N. —  $\beta$  Lpl.—Dal. och Uppl. Stockh. ÖG. Rejmyra. — N. Dovre: Berggr.) *Omkr. quartershög, löst tufvad, gul- ell. ljusgrön,  $\beta$  ofta folshög, utmärkt af de sperrbladiga grenarne. Är de flesta förf:s S. cuspidatum, hvaraf följ. ofta anses för en var. — S. Mougeotii Sch.  $\beta$  S. riparium Ångstr. S. robustum Lindb.*

- 15 *S. cuspidatum* Ehrh. tvåbyggare; stj. gröfre, långt utdragen; stjelkl. stora, med talrika ringtrådar i de öfre klara cellerna; grenbl. smalare och mer bredkantade än hos föreg.; perich.bl:s öfre klara celler med ringtrådar; för öfr. som föreg. 24 7—9. Fig. Sch.Sph.t.16. Fl.D.1712. Sill.M.exs.185.

Kärr, vattengrav. etc. a. (Sk.—VB. och Pit. Lpm. — N.) *Ofta folshög ell. mera, grön ell. hvitaktig, växande i sjelfva vattnet, men trol. genom mellanliggande former öfvergående i föreg. — S. lazifolium C. Müll. S. cuspid.  $\beta$  submersum Sch.*

\*\* Stjelkbladen vid den starkt fransiga spetsen bredast ell. åttn. lika breda som vid basen.

- 16 *S. Lindbergii* Schimp. sambyggare; stj. grof och styf, med tätt sittande, föga utdragna, spetsade smågrenar; stjelkl. stora, nedböjda, bredt, n. quadratisk tunglika, bredkantade, i den mycket breda tvärhuggna spetsen starkt fransiga, deras öfre klara cell. utan ringtråd.; grenbl. äggr. lancettlika, tydl. kantade, i spetsen 3tand., deras klara cell. utdragna, smala, med ringtråd.; perich.bl. tvärhuggna, fransiga. 24 6—8. Fig. Sch.Sph.t.25. Russ.Beitr.f.47.

Kärr i fjelltr. r. (Lul. Lpm. Jokkmokk: Holmgr. Pit. Lpm. mell. Skutijaure och Afsviken. Um. Lpm. Lycksele; Lax- och Rönnfjellen: Ångstr. — N. Dovre, mångast: Berggr. Bergen st., Sogn, i Kaupangerskoven: Wulfsb.) *Knappt quartershög, men grof och låt af de mycket närmarde smågrensknippena, rådgul ell. mörkt brungrön, i lösa tufvor, med grenbl. tydligare 5radiga än hos de flesta arter; mera bestäktad med de 2 föreg., än med de följ.*

- 17 *S. Girgensohnii* Russ. tvåbyggare; stj. styf och något grof, med glest sittande, mycket långa och smala smågrenar; stjelkl. stora, upprätta, n. rektangulära ell. quadratiska, nedåt bredt kantade, med tvärhuggen fransig spets, deras öfre klara cell. stora och vida, utan ringtrådar; grenbl. med teml. vida, af ringtråd. uppfyllda klara celler, för öfr. som hos föreg.; perich.bl. med trubbad, urnupen spets. 24 6—8. Fig. Russ. Beitr.f.43—45 och f.61.

Skogskärr, r. (Um. Lpm. Lycksele; samt VB. Örnsköldsvik: Ångstr. Vestml. Nora, vid Christinelund: Hamnstr. Ner. Almbyskogen; Skallerudsdalen; Skåleklint m. fl. st.: C. Hn. Trol. till utbredn. lik följ., ehuru till sista tiden dermed förvexlad. — N. Finnm. Maaselsvd., samt Flöjelfeld vid Tromsø: Holmgr.) Vanl. gul- ell. hvitaktigt grön, ofta fotshög, löst tufvad, gröfre och styfvare än följ.; smågren. i hvarje knippe 3—5. — *S. fimbrial.* var. *strictum* Lindb.

18 *S. fimbriatum* Wils. sambyggare; stj. spenslig, föga styf, med glest sittande, mycket långa och smala smågrenar; stjelkl. stora, upprätta, rundadt spadlika, i den breda rundade spelsen och ned till kanternas midt starkt fransiga; för öfr. som föreg. 2, 7, 8. Fig. Sch.Sph.t.15. Russ.Beitr.f.46,62. Sill.M.exs.184.

Kärr. (Lpl.—Sk. nor. del. Broby skog och Lunnom i Broby sn: Hamnstr. Öl. Böda, samt mell. Saxnäs och Röhälla: Zett. — N. Dovre. Bergen st. Sogn: Wulfsb. Rome-rige. Tvedestrand.) Hvitaktigt ell. ljus blågrön, löst tufvad och något mjuk,  $\frac{1}{2}$ —1 fot hög, till habitus mest lik *S. acutifol.*, men aldrig af rödaktig färg. Smågren. 2—3 i hvarje knippe.

## 3 Fam. HEPATICÆ.

Bladcellerna af ett enda slag. Kapseln öppnande sig regelbundet i 4, sällan i 2 ell. oregelbundet i flere likar, högst säll. [hos några *Marchantiaceæ*] med lock utan peristom ell. ring. Sporerne alltid [utom hos *Ricciaceæ*] blandade med springtrådar. Mössan oordentligt bristande och qvarsittande inom den sambladiga honkalken.

## A. — JUNGERMANNIACEÆ.

1 Flocken *Gymnomitriæ*.

## 124. GYMNOTRIUM Corda.

- 1 *G. concinatum* C. stjelken utan rottrådar, meränd. 2grenig, med trinda, upprätt tjockare grenar; bladen tätt, 2sidigt tegellagda, konkava, bredt äggrunda, grundt och hvass 2flikiga, med trubbiga likar och en smal genomskinlig kant. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. Fl.D.1002,f.2. Hook.Jung.Brit.Syn.t.3. Ekart Syn.Jung.f.63; 113C. Somf.Cr.exs.39. Thed.M.exs.139. Gotsche&Rab.Hep.eur.\*) 155, 325, 423.

Bergsklyft., klippvägg. (Lpl.—Dal. och Gestr. Gefle, på Tvärhalsberget. Uppl. vid Örbyhus: Ångstr. Stockh. Vinterviksbergen; Lilla Nyckelviken. — N.) Mållåst tufvad, gulgrön, slutt. hvitaktigt blågrå; stjelkarne vanl. några få lin., mer säll. tumslånga, n. trådsmla, alldeles täckta af bladen. — *Jungermannia Lightf. J. julacea* Wg. och trol. *Lin. Cæsius concinn.* Gray.

- 2 *G. corallioides* N. v. Es. stj. med glasa rottrådar, oordentligt ell. knippevis grenad i smala, plattade grenar; bladen hela ell. slutt. oordentligt 2flikiga, med trubbiga likar och bred, genomskinlig kant, för öfr. som hos föreg. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8. Fig. G.&Rab. Hep.79, 383.

Fjellklipp. r. (Um. Lpm. högsta toppen af Laxfjellet: Ångstr. Jemtl. Åreskutan. Herjed. Helagsfjellen. — N. Finnm. Hammerfest: C. Hn. Doyre, vid Vårstien.) Tätt tufvad, till alla delar dubb. mindre och finare än föreg., af grågul ell. brunaktig färg; utmärkt af de i kanterna och spetsen fullkomligt vattenklara bladcellerna.

- 3 *G. condensatum* Ångstr. stj. som hos föreg., med mycket smala, trinda grenar; bladen tätt tegellagda, rundade, med grund, trubbig inskränning och 2, korta, spetsiga likar, utan genomskinl. kant. 2 $\frac{1}{2}$ . Fig.

Fukt. fjellklipp. r. (Um. Lpm. Laxfjellet: Ångstr.) Ännu finare än föreg., n. hårsta, 2—5 lin. hög, tätt tufvad, af svartbrun färg. Torde, att döma efter bladform, färg m. m., möjl. vara en *Sarcoscyphus*, såsom Lindb. anser den; men då de af Ångstr. meddelade ex. sakna alla spår till honkalk och utg. icke har sig bekant, att sådan blifvit funnen, torde det tills vidare vara råttast att bibehålla arten inom det slägte, då dess upptäckare, den ende som sett den i naturen, fört densamma.

## 125. SARCOSYPHUS Corda.

† Bladflikarne trubbiga; inskränningen mellan dem föga hvass.

- 1 *S. emarginatus* Spruce: stj. upprätt, utan rottrådar; bladen 2sidigt fästade tvärs öfver stjelken, från bred, omfattande bas n. quadratisk omv. hjerlik, med grund inskränning i spetsen. 2 $\frac{1}{2}$  5, 6. Fig. Fl.D.1945,f.1. Hook.t.27. Ek.f.56; 113B. G.&Rab. 75, 138, 255—6, 315, 374, 453.

\*) Citaterna ur detta exsiccaterverk, hvilket utg. icke varit i tillfälle att sjelf se, äro benäget meddelade af Prof. Lindberg.

- Sten. i bäck., fukt. klipp. (Sk.—Lpl. — N.) 1—2 tum lång, 1 lin. bred, vanl. styf och sård. i toppen tätbladig, stund. dock ganska glesbladig, svartaktig ell. brungrön; bladen från båda sidor liggande mot hvarandra, i friskt tillst. utstående. — Jungerm. Ehrh. *Sarcoscyph. Ehrhartii* Corda. *Nardia emarg.* Gray.
- \*2 *S. sphacelatus* N. v. Es. stj. som hos föreg.; bladen från smal, omfattande och något nedflöpande bas omv. hjertlika, med smalare och djupare inskränning än hos föreg., rundade, i spetsen bruna likar. 2½ 7. Fig. Fl.D.2812.f.2.
- Klipp. r. (Boh. Lysekil 1864: Dr G. Retzius enl. Lindb.) Stor som föreg., men spensligare, ofta enkel och mindre tätbladig; bladen mer utstående. Svenska ex. af svartgrön färg; stikarnes liksom brunsvadda spets iaktages bäst på de öfre bladen; mycket närstående till vissa former af föreg., om ens verkligt skiljd. Skall enl. Lindb. vara funnen med honkalk i Finn.; svenska ex. äro han-ex. — Jungerm. Gieseke. *Nardia Carr.*
- †† Bladlikarne spetsiga; inskränningen hvass.
- \*3 *S. sparsifolius* Lindb. stj. uppstigande, med n. jemnhöga grenar, nedtill rottrådig; bladen gles sittande, utstående, n. kvadratisk—bredt äggrunda, med hvass inskränning, spetsade likar och platta kanter. 2½ 6. Fig. Fl.D.2812.f.2.
- Sten. i bäck. r. (N. Kongsberg, vid stranden af en bäck 1864: Cleve enl. Lindb.) Bildar ½—1 tum höga, lösa, intrasslade tufvor af svartaktig, ofvan brungrön färg; stjelkarne smala, oordentligt krökta om hvarandra; bladen mindre än hos de föreg.; svepebladen blott vid basen sammanväxta. Sambyggare; alla de andra arterna tvåbyggare.
- \*4 *S. revolutus* N. v. Es. stj. upprät, med n. jemnhöga grenar, utan rotludd; bladen tät tegellagda, uppräta, elliptiska—omv. hjertlika, med djup och hvass inskränning, spetsade likar och öfverallt tillbakavikna kanter. 2½. Fig. Fl.D.suppl.119.f.2.
- Fjelltr. r. (N. Dovre, på Knudshøe, Storhøe, Halfvarhøe m. fl. st.) Knappt tumshög, tät och fast tufvad, smalare och mindre plattad än *S. emarg.*, af glänsande svartröd färg; bladen teml. små, mer långa än breda, med tät cellväf, framför allt utmärkta af den genom tillbakavikning uppkomna, rundtom, öfven i stikarnes spets tydligt tjockare kanten. Frukt och kalk obekanta. — *Nardia Lindb.*
- 5 *S. Funckii* N. v. Es. stj. mycket kort och fn, uppstigande med korta grenar; bladen tätsitt., utstående ell. tegellagda, äggrunda—rundade, med djup och hvass inskränning, spetsade likar och platta kanter. 2½ 6—8. Fig. Fl.D.2812.f.1.
- Jord. r. (Smål. vid Algutsboda prestg.: Scheutz. Um. Lpm. Laxfjellet: Ångstr. — N. Tellemarken enl. Ångstr.) Blott en ell. annan lin. lång, intrasslad och löst tufvad, af grå- ell. mörkbrun färg; bladen i fjelltr. mindre djupt inskurna och mer tegellagda, eljest inskurna till midten. Ex., samlade af förf. på Norrfjeld i söd. N. 1844 och i äldre edd. hänfödda till närr. art, äro slerdubb. gröfre och höra säkert icke hit. Redan i sina M. pyren. påpekar Spruce, att denna art är svårskiljbar från *S. adust.*; deras identitet har sedermera Ångstr. antydtt och Lindb. bekräftat, hvarför utg. ej heller tvekar att här upplaga dem som en art under det äldre namnet. — Jungerm. WM. *Gymnomitr. adustum* N. v. Es. *Sarcoscyph. adust.* Spruce och ed.9. *Nardia Funckii* Carr.

126. *ALICULARIA* Corda.

- 1 *A. scalaris* C. stj. kort, nedligg. ell. uppstig., rottrådig; bladen tegellagda och skiftevis nående långt in på stjelkens framsida, konkava, n. cirkelrunda, helbrädd. ell. i spetsen intryckt urnupna; stipl. på flagellerna, triangulärt syllika; kalken alldeles insänkt mell. de bugarlikt hopväxta svepebladen. 2½ 6,7. Fig. Hook.t.61. Ek.f.47; 113A. Fl.D.2811.f.1. Thed.M.exs.136. G.&Rab.69,70,106,223,362,381,416.
- Skugg., fukt. st. (Sk.—VB. Haparanda och Pit. Lpm. Öl. mell. Trögstad och Köpings Kyrka: Zett. — N. Dovre. Trondhj. st., Sundalen, vid Storfall: Scheutz. Finn. Hammerfest.) 3—6 lin. lång, tufvad, vanl. rent grön, kölad af de upptå stjelkens öfre sida vända, mot toppen n. hoplagda bladen; då dessa hafva en inskränning, äro de begge korta stikarne oflast olikstora. — Jungerm. Schrad. *Nardia* Gray.
- 2 *A. compressa* N. v. Es. stj. utdragen, n. upprät, utan rottrådar; bladen 2skidigt Hartman, Skandinavien Flora II (10:de uppl.).

teggelagda tvärs öfver stjelen, uppåt tillagande i storlek, cirkelrunda—n. njurlika, helbrädd., platt lagda mot hvarandra, de öfversta 2 ell. 3 paren inneslutande kalken; stipl. äggrundt syllika, hela ell. urnupna. 2½ 7. Fig. Hook.t.58. Ek.f.5. Fl.D.1774. f.2. G.&Rab.443.

Bäck., helst i fjelltr. r. (*Verm.* Hvitkärns gästgg. i Lekvattnets kapellförsamling. — *N.* Dovre, vid Kongsvold: Lindb. enl. ex. bestämda af *N. v. Es.* Bergen st., Guldfield vid Samnangerfjord enl. *N. v. Es.* Tellemarken, på Bleesfeld.) Ofta 3—4 tum hög, löst tufvad, delad i n. jemnhöga grenar, nedtill smal och bladlös, uppåt allt bredare till den mer än liniebreda toppen; bladen nående lika långt på stjelen bak som framsida, n. motsatta, de nedre fästade något snedt, de öfre tvärs öfver stj., ljusgröna ell. rödaktiga. — *Jungerm.* Hook. *Nardia* Gray.

## 127. *SOUTHYA* Spruce.

(1) *S. obovata* Lindb. stj. utdragen, nedligg. ell. uppstigande, glest rotträdig, mot spetsen grenig; bladen skeft 2sidiga, utböjda, cirkelrunda, helbräddade, vid basen starkt konkava, de öfversta störst, hopväxta och inneslutande hela den omv. äggformiga. Aflikiga och veckade kalken; stipl. O. 2½ 6, 7. Fig. Fl.D.suppl.118,f.2. G.&Rab. 266, 352.

Klipp. r. (*Um. Lpm.* Laxfjellet: Ångstr. Ångml. Bjertrå sn. Herjed. Funnesdalsberget: Helb. — *N.* Mostamarken, nära Fossens vattenfall.) ½—mer än 1 tum lång, upp till nära 1 lin. bred, nedåt afsmalnande, grön; grenarne vanl. knippevis gyllrade. — *Jungerm.* *N. v. Es.* *J. immersa* Ångstr.

*S. fennica* Gottsche: stj. krypande, rotträdig; bladen tätt och 2sidigt fästade tvärs öfver stjelen, från begge sidor hoplagda, motsatta, vid basen hopväxta med hvarandra och med stipl., rundadt njurlika, helbrädd.; stipl. small syllika. 2½. Fig. G.&Rab. 418.

Klipp. i fjelltr. r. (*Um. Lpm.* Laxfjellet: Ångstr. — *N.* Finnm. vid Talvig: Zett. enl. Lindb.) ½—¾ tum lång, ½ lin. bred, gul- ell. brungrön, plattad derigenom att begge sidornas blad dro slutna intill hvarandra; nedåt något afsmaln., med fina nyskott från stjelen spets. Habituell lik en liten *Alicul. compressa*; stipl. ytterst fina, af mot basen 2, mot spetsen blott en enda cellrad, samt svåra att se i ans. till bladens stora bredd och hopväxning. På de ex., utg. eger, saknas kalk alldeles, och enl. Lindb. lär den knappt vara funnen väl utvecklad; utg. anser därför icke tillräckligt skal finnas för artens öfversyllande till annat slagte utur det, hvori dess förste namngifvare, Gottsche, placerat den. — *Jungerm.* Lindb.

## 2 Flocken *Jungermanniesse*.

### 128. *PLAGIOCHILA* N. & Mont.

1 *P. asplenioides* N. & M. stj. nedliggande, med långa enkla ell. upptill 2delade, uppstigande grenar utan rotträdar; bladen tätt sittande, nedlöpande, rundade ell. omv. äggrunda, meränd. i kanten uddtandade, med öfre kanten tillbakaviken; kalken aflång, plattad, snedt tvärhuggen och i spetsen tandad. 2½ 5, 6. —  $\beta$  minor: flere gånger mindre; bl. ofta helbrädd. Fig. Fl.D.1061. Lindenb.Sp.Hep.t.23. Hook.t.13. Ek.f.4. G.&Rab.20, 271, 320.

Skog., berg, a. (*Sk.*—*Lpl.* — *N.*) Vanl. mycket stor, 2—6 tum lång, 2—3 lin. bred, lifligt grön, stund. brunaktig; svepebl. till formen lika de öfriga, men större; kalken 2 lin. lång. — *Jungerm.* *L. Martinellia* Gray.  $\beta$  *Plag. Dillenii* Tayl.

2 *P. interrupta* N. v. Es. stj. utdragen, jemte grenarne nedliggande, glest rotträdig; bladen som hos föreg., bugthräddade, i spetsen afrundade ell. intryckta, oftast helbräddade, med platta kanter; kalken som hos föreg., helbrädd. 2½ 5, 6. —  $\beta$  *pyrenatica* Carr. (enl. Lindb.) bl. i spetsen oregelb. urnupna, ell. 1—flertandade; kalken aflångt omv. äggrund, med uddtandad mynn. (enl. Spruce). Fig. Lindenb.Sp.Hep. t.12. G.&Rab.48, 109, 136, 316.

Berg, och bland andra mossor, r. (*Sk.* Trolleholm; Fogelsång; Broby sn, Uddarp; samt Hästveda sn, Hallasnärje, och Glimåkra sn, Trollastugan; Hamnstr. ÖG. Motala sn, Hälberget. Stockh. Skarpeck; Nacka. *Verm.* Christinehamn. *Um. Lpm.* Lax- och

Olfjellet: Ångstr. *Pit. Lpm.* Öst. Itstjakk. *Lul. Lpm.* Jokkmokk, Ruotivare: Holmgr. — *N.* Dovre, vid Drivstuen. —  $\beta$  *Gotth.* Thorsborgen: Lindb.) *Omk. tumslång och 1 lin. bred, mer grenig, platt och nedligg. än föreg., med kortare fruktgrenar och kalk, gulaktigt brungrön.* — *Jungerm. N. v. Es.*  $\beta$  *Plagioch. pyrenaica Spruce.*

129. *SCAPANIA Lindenb.*

† Bladflikarne rundtrubbiga.

\* Den undre fliken åtm. dubb. större än den öfre.

- 1 *S. nemorosa N. v. Es.* stj. n. upprät, utan rottrådar; *begge* bladflikarne *tätt hårligt uddtandade*, den undre omv. åggrund, med öfre kanten tillbakaviken och nedlöp. på stj., derigenom konkv, *dubb. större* än den rundade öfre; cellväfven tät, af små celler; kalken platt, tvärhuggen, i spetsen uddtandad. 2 5, 6. —  $\beta$  *purpurascens*: purpurröd, särd. de öfre bl. och den stora kalken. Fig. Fl.D.2756, f.2. Hook.t.21. Ek.f.10. G.&Rab.224—5, 279, 331.
- Bergsrött., bäckstränd. (*Sk.—Ångml. och Jemtl. Lul. Lpm.* Qvikkjokk flerst.: Holmgr. Boh. Christinedal. Öl. Böda: Lindb. — *N.* till Finnm.: Holmgr.) 1—2 tum lång, vanl. ett par lin. bred, i lösa tufvor, oftast olivgrön, i toppen ljusgrön. Bladflikarne hos denna och följ. art riglade mer uppåt än hos *S. ulig.* — *Jungerm. L.*
- 2 *S. undulata N. v. Es.* stj. upprät, utan rottrådar; *begge* bladflik. *rundade, helbräddade ell. uddtandade, torra krusigt vågiga*, den undre *platt, dubb. större* än den tilltryckta öfre; cellväfven i bladens midt lös, af stora celler, längs kanterna tät af mycket mindre celler; kalken som hos föreg., *helbrädd. ell. svagt tandad.* 2 5—7. Fig. Fl.D.1773, f.2? Hook.t.22. Ek.f.14; 88. G.&Rab.90, 91, 139, 194, 260, 278, 291, 318, 387—8, 442, 456.
- Bäckstränd. (*Sk.—Lpl. Boh. Marstrand: O. Nordst.; Svanesund på Oroust. — N.*) Vanl. 1½—3 tum lång, 1—2 lin. bred, oftast grön ell. rödaktig. Bladen, isynn. de nedre, glesa; svepebladens *begge* flikar n. lika stora. — *Jungerm. L.*
- 3 *S. uliginosa N. v. Es.* stj. som hos föreg.; *begge* bladflik. *helbräddade*, den undre rundad, 3—4 gånger *större* än den konvexa, njurlika öfre; cellväfven lös, af jemnstora celler; kalken som hos föreg. 2 5—7. Fig. G.&Rab.34, 193.
- Fjällbäck. r. (*Lul. Lpm.* Walle och Sähkock: Ångstr.; Njuonjes och Stora Sjöfallet: Holmgr. *Pit. Lpm.* Kåbrenäive. *Um. Lpm.* Lax-, Mars- och Olfjellen: Ångstr. *Jemtl.* Getvalen. *Herjed. Medelp.* Sättne: Ångstr. — *N.* Trondhj. st. vid Bogen i Guledalen: C. & R. Hn. Dovre, på Nystuehöe. Christianiatrakten, vid Liggeren i Nordmarken: C. Hn.) *Omk. 2 tum lång, 1—1½ lin. bred, rödbrun, ofta svartaktig, teml. glesbladig; bladens kanceller knappt mindre än de öfriga.* — *Jungerm. Sw.*
- 4 *S. irrigua N. v. Es.* stj. nedligg. ell. uppböjd, glest rottrådig; *begge* bladflik. *trubbiga ell. med en kort udd*; den undre hjertlikt rundad, *bugtbräddad*, stund. glest uddtandad, *dubb. större* än den njurlika tilltryckta öfre; cell. små, särd. längs kanterna; kalken som hos föreg., uddtandad. 2 5, 6. Fig. Fl.D.2691, f.1 & 2. Thed.M.exs.147. G.&Rab.317, 332, 385, 392, 454.
- Kärr. fukt. jord. (*Sk. nor. del. — VB. och Jemtl. Öl. Böda: Lindb. — N.*) Växer i små tufvor ell. spridd bland andra mossor, säll. mer än tumslång, men bred som föreg., nedtill mörkgrön ell. brunaktig, upptill ljusgrön, med tunna blad, hvilkas sömm mell. flikarne är längre och mer utböjd från stjelken än hos föreg.; den öfre fliken oftare med udd. — *Jungerm. N. v. Es.*  
(*S. curta.*)

\*\* Begge bladflikarne n. lika stora.

- 5 *S. compacta Lindenb.* stj. uppstigande, rottrådig; bladen uppåt tilltagande i storlek, med rundade, *helbräddade*, mer säll. fint tandade flikar; cellerna små, rundade; kalken plattad, omv. åggrund, med tvärhuggen, fintandad mynning. 2 6, 7. —  $\beta$  *patens*: mindre, med något spetsiga, öppet utstående bladflikar; de öfversta bl. vanl. inneslutande groddkornsgyttringar. Fig. Fl.D.2196. Hook.t.23. Ek.f.11; 80. G.&Rab. 143, 168, 445  $\beta$  *Sill.M.exs.195.*
- Berg.  $\beta$  jord, r. (*Sk. Hästveda sn, Hallasnärje: Hamnstr. Smål. Strömsberg nära Jön-*

köping; Nordst. VG. Halleberg. Dald. berg vest. om sjön Stora Lee. Bok. Oroust: Nordst. Ner. Skåleklint och Jätteberget i Halsberg, samt Ullaviklont: C. Hn. ÖG. Motala sn, Hållberget. Stockh. Huddinge. Öl. Näsby och Resmo: Lindb. —  $\beta$  Stockh. nära Lilla Sickla. Gestr. Gelle, vid Stigslund.) 3—6 lin. lång, 1 lin. bred, grön ell. gulgrön; bladen mycket smalare vid basen, med stund. kort och glesl uddtandadeflikar. — Jungerm. Roth. *J. resupinata* Hook.  $\beta$  *J. palens* Sill.

6 *S. subalpina* N. v. Es. stj. upprät, föga rottrådig; bladflikarne rundade, lät och ojemnt tandade; cell. rundade, teml. stora, mot kanten mindre; kalken som hos föreg. 24 7. Fig. Ek.f.91.

Fjelltr. r. (Torn. Lpm. nära Wittangi. Jemtl. Getvalen. Dal. Särna: Liedstr.; Grycksbo: Lindb. — N. Trondhj., Mostamarken.) *N. hvitaktigt grön, stor som föreg., men vanl. smalare och mer glebladig, med mer jemnstora bl., hvilkas öfre flik är mindre tandad; begge flik. stundom med en kort udd.* — Jungerm. N. v. Es.

7 *S. Bartlingii* N. v. Es. stj. krypande, föga rottrådig; bladen uppåt större, grundt 2-klufna, med rundade, helbräddade, stund. uddspetsiga flikar; cell. små, rundade, vid kanten minst; kalken föga hoptryckt, elliptisk, upptill veckad, med smal helbräddad mynning. 24 6, 7. Fig. G. & Rab. 292, 424.

Fjelltr. r. (Lul. Lpm. Kamajökk vid Qvikkjökk: Holmgr. Pit. Lpm. Kåbrenåiwa. — N. Finn. vid Overgaard i Maalselvden: Holmgr.) *Tufvad, omkr.  $\frac{1}{2}$  tum hög, upptill 1 lin. bred, blek- ell. gulgrön, latbladig.* — Jungerm. Hpe.

*Maritima* (S. v. Es.)

†† Bladflikar, särd. den öfre, spetsiga, den undre störst.

8 *S. æquiloba* N. v. Es. stj. *uldragen*, meränd. upprät, utan rottrådar; bladen jemnstora, grundt 2flikiga, den undre fliken större, bredt äggrund, hastigt kortspetsad, den öfre spetsig, begge helbräddade ell. glesl tandade; cell. små, ogenomskinliga, på bladens baksida starkt papillösa; kalken aflång, platt, tvärhuggen med småtandad mynning. 24 5, 6. Fig. Ek.f.90. Sill.M.exs.194. G. & Rab. 89, 92, 169, 404, 408.

Kalkklipp. r. (ÖG. Omberg och Lemunda: Holmgr. Vestml. Sala, vid Nyberg. Gott. Hoburgen, Thorsborg och St. Carlson: Lindb.; Snäckgårdet vid Visby: C. Hn; Galsberget: Stud. Björkm. — N. Brevig: Cleve enl. Lindb. Finn. Tromsö och Maalselvden: Holmgr.) *Växer i 1—1 $\frac{1}{2}$  tum höga, ljusgröna ell. brunaktiga låta tufvor, med styfva, 1 lin. breda latbladiga stjelkar och ända från basen lika stora, n. vinkelrätt utböjda blad, hvilka enl. Lindb:s obs. utmärka sig från de öfriga arterna genom "den öfverallt lät och groft knottriga" baksidan.* — Jungerm. Schwæg.

9 *S. curta* N. v. Es. stj. kort, uppstigande, nedtill rottrådig; bladen uppåt större, djupt 2flikiga, den undre fliken större, rundad ell. äggrund, trubbig ell. uddspetsig, den öfre kvadratisk ell. triangulär, meränd. spetsig, begge helbrädd. ell. i spetsen glesl tandade; cell. större och mer genomskinl. än hos föreg., icke papillösa; kalken aflång omv. äggrund, platt, med fransigt tandad mynning. 24 5, 6. Fig. Fl.D. 2690, f. 1 & 2. Ek.f.76; 89. G. & Rab. 93, 195—6, 382.

Fukt. jord, murk. ved etc. a. (Sk.—Lpl. och VB. — N. till Finn. : Holmgr.) 2—6 lin. lång,  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  lin. bred, mörk- ell. ljusgrön. *Var. i hög grad, än ensam och tufvad, än spridd bland andra mossor, samt med glesa och lät sittande, trubbiga och spetsiga blad o. s. v., ofta på samma stjelm. En vanl. rödbrun form med bladens undre flik dubb. större än den öfre, uppåt rigtlade, är *S. rosacea* Corda.* — Jungerm. Mart.

10 *S. umbrosa* N. v. Es. stj. kort, uppstigande, rottrådig; bladen uppåt större, djupt 2-flikiga, den undre fliken 2—3 gånger större, vinkelrätt utböjd, den öfre rigtad uppåt, tryckt intill stj., begge äggrundt aflånga, spetsiga, sågade; cell. små, runda; kalken aflång, platt, med tvärhuggen, helbräddad mynning. 24 4—6. Fig. FLD. 2192. Hook.t.24, suppl.3. Ek.f.12. Sill.M.exs.196. G. & Rab. 355, 412, 425.

Murken ved, jord etc. r. (Sk.—Ångml. och Um. Lpm.: Ångstr. — N. till Nordl.) *Mattlikt tufvad, mjuk, gulgrön, stund. rödaktig; stj. 3—6 lin. lång, 1 lin. bred. Lät igenkänd på bladens öfre, längs stj. liggande flik.* — Jungerm. Schrad. (*S. irrigua*.)

130. *JUNGERMANNIA* (Lin.) N. v. Es.

† *Complicatæ*: bladen af 2, mot hvarandra [likasom i föreg. slägte] hopvikna, olikstora flikar; stipl. 0. *Diplophyllum* Lindb.

\* Begge bladflikarne rundtrubbiga.

- 1 *J. obtusifolia* Hook. stj. uppböjd, rotträdig; *begge bladflik. något båglikt böjda utåt*, helbrädd. ell. fintandade, den undre 2—3 gånger större; cell. små rundade; kalken uppblåst, omv. äggformig, med något veckad, hvasstandad mynn. 2½ 7—9. Fig. Fl.D.1831,f.2. Hook.t.26. Ek.f.57. G.&Rab.149,277.

Jord. dikeskant. r. (Sk.—Gestr. och Dal. Helsl. Allta sn: Oldb. Herjed.) 2—4 lin. lång, knappt 1 lin. bred, ljusgrön ell. brunaktigt grön, nedliggande med uppböjda toppar. Förenades af Wg. och Myr. med *J. laxifolia*.

\*\* Den undre bladfliken trubbad, den öfre spetsig.

- 2 *J. albicans* L. stj. upprät, utan rottrådar; bladens undre flik som hos föreg., den öfre rigtad uppåt, åggrundt aflång, spetsig, begge i spetsen finsågade, med en hvit nervlik rand af stora aflånga celler längs midten; kalken aflång, hoptryckt, vid mynn. veckad. 2½ 4—6. Fig. Fl.D.2005,f.2. Hook.t.25. Ek.f.55. G.&Rab.13, 150, 233. Klipphål. bergsrött. (Sk.—Lpl. — N. till Finnm.) Vanl. 1—2 tum lång, fullt 1 lin. bred, mattlik, ljusgrön.

- 3 *J. laxifolia* Wg. stj. mer nedliggande; bladens cellväf likformig af små rundade celler, utan den ljusa midtelranden; för öfr. som föreg. Fig. Wg.Fl.L.t.25. Somf.Cr. exs.38. Sill.M.exs.197. G.&Rab.247.

Klipp. r. (Lpl.—Gestr. Dal. och Verml. Stockh. Stora Essingen. Ner. Ullaviklint: C. Hn. VG. Vålaberg vid Raketorp; Göteborg, Kolandsberget. Dalsl. Smål. Skurugata: Scheutz. — N.) Ungefär hälften mindre och finare än föreg., hvilken den onekligen i de flesta afs. liknar; men någon öfvergångsform i ans. till bladcellerna har utg. aldrig lyckats få se.

\*\*\* Begge bladflikarne spetsiga.

- 4 *J. Dicksoni* Hook. stj. kort, uppstigande, rotträdig; den undre bladfliken aflångt åggrund, rigtad utåt, föga längre än den öfre lancetlika, uppåt rigtade, begge helbräddade ell. bugtigt småtandade, af mycket små, rundade celler; kalken aflång, med fint veckad och tandad mynn. 2½ 6, 7. Fig. Hook.t.48. Ek.f.68.

Berg. r. (VG. Göteborg, vid Kåltorp. Boh. Marstrand, Skafvö. Stockh. Dalarö: Holmgr. — N. Laurvig. Nordl. i Saltöfjället.) 2—6 lin. lång, ½ lin. bred, enkel, ljus ell. gulaktigt grön.

- 5 *J. exsecta* Schmid. stj. kort, uppböjd, rotträdig; undre bladfliken stor och bladlik, konkv, åggrundt lancetlik, stund. i spetsen 2tandad, många gånger större än den öfre tandlika, uppåt rigtade, begge helbräddade, af små, kantiga ell. rundade celler; kalken som hos föreg. 2½ 4, 5. Fig. Fl.D.2692,f.2. Hook.t.19; suppl.t.1. Ek.f.37. G.&Rab.130, 177, 358.

Skogstigg. murk. ved etc. r. (Sk.—Gestr. och Dal. Ångml. Holmstrand i Helgum sn. Jemt. Frösön: Holmgr. Um. Lpm. Lycksele: Ångstr. Pit. Lpm. Tjådjakk. Öl. mell. Saxnäs och Röhälla; samt i Böda skog: Zett.) Tätt tuffad, grön ell. ljusbrun, med n. enkla, 5—7 lin. långa, n. 1 lin. breda stjelkar; bladen lätt sittande, något ensidiga. Utmärkt af den öfre bladflikens litenhet, i det den endast bildar en upp- och framåt rigtad tand, utgående från den undre stikens nedre kant strax ovan midten.

†† *Integrifolia*: bladen 2sidigt fästade, hela, utan flikar och icke hopvikna.

\* Med stipler.

a — Bladens cellväf grof och lös: *Leptoscyphus* Müll.

- 6 *J. Taylori* Hook. stj. utdragen, styf, n. upprät, rotträdig; alla bladen likformiga, konvexa, cirkelrunda, helbräddade, utstående; stipl. på de yngre stjelkarne, flygtiga, bredt syllika; kalken äggformig—aflång, med hoptryckt, tvärhuggen mynn. 2½ 7, 8. Fig. Hook.t.57. G.&Rab.14, 112.



Bergsspring. r. (Sk. Skäråli; Rostup. Smål. Skurugata; samt Almesåkra, nära Storkvarn enl. Scheutz. Boh. Uddevalla; Lysekil. ÖG. Motala sn, Lemunda. *Gestr. Oslåttfors. Dal. Särna. Herjed. Helagsjellen: Oldb. Jemtl. Åreskutan: Snasahögen: Pit. Lpm. Kåksa. Lul. Lpm. Njuonjes: Holmgr. — N. till Finn. Maaseldalen: Holmgr.) Tall tufvad, 1—3 tum hög, 2 lin. bred, grof och styf, brunaktig, med rödbruna toppar; de stora rundade bladcellerna hafva mellan sig andra små triangulära.*

7 J. *anomala* Hook. stj. utdragen, nedliggande, rotträdig; bladen meränd. af 2 former: de nedre konkava, cirkelrunda, utstående, de öfre ränsformiga, äggrunda, n. spetsiga, alla helbräddade; stipl. på smågrenarne, små lancellika; kalken äggformig, veckig, något insänkt. 2½ 7, 8. — β *vagans*: glest kringkryp. bland andra mossor, med alla bl. runda. Fig. Fl.D.1895. Hook.t.34. Ek.f.70, 71, 106. Sill.M.exs.188. Somf. Cr.exs.37. G.&Rab.113, 236, 414, 415.

Kärr, bland *Sphagnum*-arter. (Lpl.—ÖG. Ner. och VG. Smål. Vexlö och Algutsboda; samt Hall. Varberg: Scheutz. Sk. Esperöd; Hittarp i Glimåkra sn: Hamnstr. — N.) Blekt brun-ell. rödaktig, med 1—2 tum långa, 1—2 lin. breda stjelkar, som dels bilda stora, fasta mattor, dels spridda krypa omkring i hvitmossekarren; bladcell. stora rundade, knappt åtskiljda såsom hos föreg., hvaraf en del förf. anse när. vara blott en form. Om olikheterna se N. v. Es. Naturgesch. der Eur. Lebermoose. — *Leptoscyphus* Lindb.

b — Bladens cellväf tät.

(8) J. *Schraderi* Mart. stj. nedliggande, kort rotträdig; bladen konkava, rigtade uppåt och tegellagda, rundadt elliptiska, helbräddade; stipl. på yngre grenar, syllika; kalken långt utskjutande, cylindrisk, vid mynningen veckig. 2½. Fig. Fl.D.2757.f.1. Ek.f.97. G.&Rab.230—1, 338.

Kärr, källdrag etc. r. (ÖG. V. Ny sn, Belleberg och Åskebäck: Holmgr. Jemtl. Handölsforsen: R. Hn. Af Lindb. uppgifven för Stockh. Sandsjön, VG. Halleberg och Boh. Christinedal.) Knappt tumslång, genom bladens riktning upp- och framåt smal, torr n. trådsml, grön, med korta och något glesa rottrådar, med hvilka den enl. N. v. Es. och af honom meddelade ex. i sterilt tillstånd lättast skiljes från den i visst fall mycket liknande *Sphagnoecet. comm.*, som har mycket långa och lätt knippevisa rottrådar, hvarför och utg. är öfvertygad om, att ex. från ÖG. och Jemtl., ehuru sterila, böra föras till J. Schrad. Från de af Lindb. uppgifna lok. har utg. icke sett andra ex. än från VG., som afseu sakna kalk och med sina glesa, platta, utböjda blad, långa, hopknippade rottrådar etc., icke höra hit. *Idem. Tot. Sphagnum glaucodolium* (Sacc.) Dur.

X J. *subapicalis* N. v. Es. stj. krypande ell. uppstigande, kort rotträdig; bladen platta ell. svagt konvexa, glest sittande och utstående åt sidorna, rundadt äggrunda, helbräddade ell. i spetsen omärkligt intryckta; stipl. bredt syllika; kalken föga framskjutande, äggformig, slutl. hoptryckt, slät. 2½ 5, 6. Fig. Fl.D.1716.f.1. G.&Rab.275. Sten., jord, r. (Sk. Trollehall; Hallandsås, i Hasslöfs skog; Broby sn, vid Linneryd och Uddarp; samt Hästveda sn, vid Hallasnärje: Hamnstr. VG. Hunneberg, i Fredstorps hage. — N. Trondhj. Mostamarken.) ½—1 tum lång, i friskt tillst. ¼ lin. bred, torr trådsml, i tunna brunglöna mattor; stipl. på stj. små och omärkliga, på nyskotten stora och tydliga. — J. *scularis* Fl.D. *in aculeum*, var.

\*\* Utan stipler.

a — Bladen aflånga—bredt ell. omv. äggrunda.

10 J. *cordifolia* Hook. stj. upprätt, grenig, utan rottrådar; bladen från bredt hjertlik, strulligt omfattande bas, upprätta, konkava, äggrunda, helbräddade, af stora aflångt sexsidiga celler; kalken aflång, n. slät, med fintandad mynn. 2½ 7, 8. Fig. Fl.D. 1775.f.1. Hook.t.32. Ek.f.26, 75. G.&Rab.171, 251, 341—4.

Sten. i bäck, r. (Lul. Lpm. Walle vid Qvikkjokk; Terraure. Pit. Lpm. Tjiddjakk; Peljekaisse. Um. Lpm. Laxfjellet; Stuurware; Marsjellen: Ångstr. Jemtl. Bunnarfjell; Geivalen. Herjed. Malmagen; mell. Funnesdalen och Långå etc. Dal. Hykjeberget. Verm. Christinehamn, nära Clara källa. Helsl. Hudiksvall, Ullsätters källa. Gestr. Gefle, i Kungsbacken. ÖG. V. Ny sn, Åskebäck. — N. Finn. — Dovre och Bergen st.) 1—4 tum lång, nära 2 lin. bred, mörk-ell. svartgrön, med mycket

*tunna blad, som icke lätt upplifvas i vatten. En närbeslägtad enklare form, som enl. Lindb. icke blifvit funnen i Skand., är J. tersa N. v. Es., G. & Rab. 307, 359.*

- 11 *J. lanceolata N. v. Es.* stj. krypande, grenig, rotträdig; bladen *n. vinkelrätt utstående, platta, elliptiskt ell. äggrundt aflånga, helbräddade, af rundade—elliptiska celler med vida mellanrum; kalken cylindrisk, slät, något krökt, tvärhuggen.* 2½ 5—7. Fig. Hook.t.18. Ek.f.7. G. & Rab. 94, 438.

Fukt. skogsmark. (Sk.—Modelp. och Jemtl. VB. Skellefteå. ÖL. Böda skog: Lindb. Götll. Hesse i Fläringe; Fettings i Tofta sn: Holmgr. — N. Filesfeld. Trondhj. st. Mostamarken.) Omkr. tumslång, 1 lin. bred, mörkgrön, i stora platta mattor, *n. alltid med kalkar; bladen upplifvas mycket lätt i vatten.* — *Lioclæna N. v. Es.*

- 12 *J. riparia Tayl.* stj. som hos föreg., med flageller; bladen *2sidiga, glesa, n. vinkelrätt utstående och skeft fästade, platta, omv. äggrunda—elliptiska, helbräddade, en del grundt urnupna i den trubbiga spetsen; cellväfven teml. tät, af rundadt kantiga, i spetsen helt små celler; kalken påronformig, med hopdragen 5—6veckig, småtandad mynn.* 2½ 7, 8. Fig. Fl.D.2813,f.1. G. & Rab. 57, 71, 116—7, 150—1, 276, 427—8.

Bäck. på kalkgrund, r. (ÖG. Omberg, med Borghamn m. fr. VG. Kinnekulle, vid Mörkeklef. Götll. Visby; Fardume i Rute sn.) ½ tum—mer än tumslång, 1 lin. bred, blekt brungrön; utmärkt från följ. genom flagellerna. — *J. tristis N. v. Es.* är enl. Lindb. endast en gröfre form af närv. art.

- 13 *J. pumila With.* stj. kort, *n. enkel, utan flageller, krypande med uppstig. topp, rotträdig; bladen skeft fästade, något tegellagda och ensidigt vända uppåt, konkava, rundadt äggrunda, helbräddade, trubbiga; cell. som hos föreg., närmast kanten mindre; kalken långt utskjut., aflång, på midten vidgad, upptill veckig, med småtandad mynning.* 2½ 6—8. Fig. Fl.D.2194. Hook.t.17. Ek.f.13; 113D. G. & Rab. 55, 237, 244, 396—8.

Klipp., sandstr. etc. r. (Sk. Klöfvaahall; Skärali. VG. Halleberg. Verml. Christinehamn, på Fogelholmen. Ner. nära Apelvik i Hammar sn, vid Vettern: C. Hn. ÖG. V. Ny sn, Näs stenbrott. Uppl. Söderfors. Dal. Grycksbo. Herjed. Belagsfjellen. Um. Lpm. Ölfjället: Ångstr. Pit. Lpm. Tjiddjakk; Peljekaisse. Lul. Lpm. Jokkmokk. Kaitum: Holmgr.; Walle och Kaskaiwo: Ångstr. VB. Krångforsen. — N. upp till Finnm. Hvassbrun i Maalselvdalen: Holmgr.) 3—5 lin. lång, tagelsmal, intrasslad i tunna, ofta handstora lager af mörkgrön ell. svarbrun färg; bladen, stund. glesa, knappt vidrörande hvarandra. — *J. Zeyheri Hüb.* är enl. Gottsche en form häraf.

#### b — Bladen cirkelrunda.

- 14 *J. sphærocarpa Hook.* stj. uppstigande, rotträdig, *n. enkel; de nedre bl. snedt fästade, med något nedlöp. bas på stjelkens framsida, glesa, de öfre fästade n. tvärs öfver stj. och n. tegellagda, alla n. platta, mycket utstående, helbrädd., af teml. vida 5—6-kantiga, längs bladkanten n. quadratiska celler; kalken långt utskjutande, smalt omv. äggformig ell. klubblik, nedtill slät, upptill något 4kantig, 4tandad* 2½ 5, 6. Fig. Hook.t.74. Ek.f.20. G. & Rab. 186.

Jord i bergstr. r. (Lul. Lpm. Pajerim: Holmgr.; Jokkmokk. VB. Haparanda; Skellefteå, vid elfven; Umeå: Holmgr. Dal. Fulufjell; Hykjeberget, samt Hemfjell: Liedstr. — N. Finnm. Bergen st., i Ousedalen.) Tuftad, vanl. brungrön, med 3—5 lin. långa, ½ lin. breda stjekar, de sterila mer glesbladiga.

- 15 *J. Gentiana Hüb.* stj. krypande, glest rotträdig, med *n. uppräta grenar; bladen skeft vidfästade, tegellagda, konkava, helbräddade, af runda, vida, genomskinkl., i kanten n. likformiga celler; kalken äggformig ell. omv. äggformig, upptill 4kantig, slutl. 4-flikig.* ④ 4, 5. Fig. E.B.t.2238. G. & Rab. 68, 115, 384.

Stränd., öfversvåmm. st., r. (Dal. Grycksbo: Lindb. Um. Lpm. Lycksele, vid Berglund: Ångstr. — N.?) Växer i tunna, lösa mattor med tagelsfina, 1—3 lin. långa stjekar och grenar, af gul- ell. rödaktig färg; bladen på de fertila grenarne uppåt tilltagande, på de sterila aftagande i storlek. — *J. gracillima EB.*

- 16 *J. crenulata Sm.* stj. krypande, rotträdig; bladen fästade tvärs öfver stj. ell. något skeft, teml. tätstittande, utstående och vända uppåt, platta, helbrädd., af något små rundade celler, längs kanten omgifna af en rad stora, 4kantiga celler; kalken föga utskjutande, äggformig, svagt veckig, med oordentligt tandad mynn. 2½ 5, 6. Fig.

Fl.D.1774.f.1. Hook.t.37:suppl.t.1. Ek.t.3&12.f.25. Lindgr.M.exs.100. G.&Rab.172. 219, 360, 406.

Fukt. mark, särd. lerjord, vägkant. etc. r. (Sk. Broby sn, Åskekärr: Hamnstr. *Småt-Vexjö* och *Algutsboda*; samt vid *Almesåkrasjön* enl. Schoutz. *ÖG*. *Motalatrakten-Södm.* Stigtomta prestg.: Hamnstr. *Stockh.* *Uppl.* *Uppsala*: Mos. *Dal.* *Herjed.* *Midtåklappen*, och *Vallarne*: Oldb. *Ner.* *Jätteberget* söd. om *Tisaren*: C.Hn. *Verm.* *Kroppa*. *VG.* *Degeberg*. *Boh.* *Christinedal*. — *N.* *Trondhjemstrakten*. *Flerest.* enl. *Somf.*) *Var. dels halftumslång,  $\frac{1}{2}$  lin. bred, dels mycket spåddare, vanl. ljusgrön ell. rödaktig, med åtm. vid mynn. röda kalkar; lättast igenkänlig på bladens mycket tydliga kantning.*

17 *J. nana* *N. v. Es.* stj. kort, uppstig. ell. upprät, rotträdig; bladen skeft fästade, tättsittande, icke nedlöpande, föga utstående, något konkava, helbräddade, stund. i spetsen svagt intryckta, af vida, längs kanten mindre celler; kalken slutl. utskjutande, äggformig, upptill rektigt 4kantig, 4tandad. 24 7, 8. Fig. G.&Rab.287.

Fukt. jord, helst i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* *Snjörak* vid *Qvikkjokk*; samt *Kaddepakte*: *Holmgr.* *Pit. Lpm.* *Wallåwe*; *Käksa.* *Jeml.* *Åreskutan*. — *N.* *Trondhj. st.*, *Mosmarken*. *Valders*, i *Qvamsklefven* vid *Öjlo*.) *På sin höjd  $\frac{1}{2}$  tum hög,  $\frac{1}{2}$  lin. bred, grenig, mörkgrön ell. brunaktig, skild från följ. med de icke nedlöp. bladens färg och släta kanter, samt den trubbigare kalken.* *J. Lindb.*

18 *J. hyalina* *Lyell*: stj. kort, uppböjd, rotträdig; bladen tegellagda, skeft fästade, nedlöpande, något uppåt vända, vid basen konkava, med bugtigt intryckta, vågiga kanter, genomskinliga af vida, rundade, jemnstora celler; kalken föga utskjutande, uppbåst äggformig, med spets, omkr. 5kantigt veckad, slutl. tandad mynning. 24 5, 6. Fig. Hook.t.63. Ek.f.45. G.&Rab.189, 234, 469.

Fukt. jord, r. (*ÖG.* *Vinnerstad*; och *VG.* *Roo*. — *Helsl.* och *Herjed.* *Um. Lpm.* *Lycksele*: *Ångstr.* *Lul. Lpm.* *Jokkmokk* och *Qvikkjokk* flerst.; *Holmgr.* — *N.* *Kongsvinger*; *Trondhjem*; samt *Finnm.* *Tromsö* och *Maalselvdalen*: *Holmgr.*) *Stor som föreg., vanl. i platta, glänsande ljusgröna tufvor; bladen utmärkta för sin genomskinliga, egendomligt glänsande, blekt blågröna färg, stund. helbräddade.* — *J. Schmideltiana* *Hüb.*

19 *J. cæspiticia* *Lindenb.* stj. ytterst kort, n. upprät, rotträdig; bladen 2sidigt tegellagda, föga utstående, helbräddade, af teml. vida, jemnstora celler; kalken stor och utskjutande, omv. äggformig, trubbig, med 4—5veckig, slutl. tandad mynning. ☉ 6, 7. Fig. Fl.D.2195. Ek.f.95. Thed.M.exs.137.

Lerjord, r. (*Gestr.* *Gefle*, på åkerrenar och i diken vid *Mariefund* nära *Nynäs*. *Trol.* *Flerest.*, men för sin litenhet lätt förbisedd.) *Hela mossan föga mer än 1 lin. lång, tuffad; stj. enkel ell. med ett ensamt nyskott i spetsen; bladen bleka, täckande hvarandras baser; kalken jemförelsevis stor, omkr.  $\frac{1}{2}$  lin. lång.* — *J. Schmideltiana* *Thed. M. exs.* *J. parvula* *Lindb.* och *ed.9.*

c — Bladen halfcirkelrunda [mer breda än långa].

20 *J. confertissima* *N. v. Es.* stj. utdragen, föga rotträdig; bladen glesa, 2sidigt skeft vidfästade, utstående, platta, hel- ell. bugtbräddade, af teml. vida, rundadt kantiga, n. jemnstora celler; kalken (enl. *Lindb.*) långt utskjutande, utdraget äggformig. 24 7. Fig.

*Fjellbäck.* r. (*Pit. Lpm.* i en snöbäck på fjellet *Peljekaisse* 1836: *Lindb.*) *Upptages på Lindbergs auktoritet och efter af honom meddelade sterila ex. med högst ofullständiga blad; dessa ex. äro nära 2 tum långa, n. tagelsmåla och afvika såväl i storlek som flere karakt. från N. v. Es:s beskrifn., enl. hvilken denna art skulle hafva  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$  t. lång, tätbladig stj., med på tvären fästade blad, blott till hälften utskjut. kalk etc., samt mycket likna *Alicul. compr.*, hvilket för ingen del är fallt med de *Lappska* ex.* *J. angusticaulis*

+++ *Bidentes*: bladen 2sidiga, 2flikiga ell. 2- [säll. 3-] tandade [hos art. 24, 32—35 rännformigt hopvikna].

\* Med stipler.

a — Bladen plattadt utbredda.

21 *J. Mülleri* *N. v. Es.* stj. nedligg. ell. uppstigande, rotträdig; bladen rundade, urnupet

*2tandade* med mycket grund, vanl. halfmånlik inskärning och spetsiga ell. trubbigaflikar; cell. *teml. små*; stipl. *små*, lancettlika, bela ell. nikiga; kalken *n. cylindrisk*, slät, med veckig 4klufven mynning. 2/5, 6. — *β acuta Lindb.* bladens inskärning något hvass med spets. flikar; stipl. syllika. Fig. G.&Rab. 147—8, 227, 395. *β* Ek.f. 101. Sill.M. exs. 191. G.&Rab. 56, 58, 97—100, 220, 238, 240, 243, 269, 314, 333, 413.

\* *heterocolpos Thed.* plattadt hoptryckt från sidorna; bladen omv. hjertlika, de nedre med vid, de öfre med smal inskärning; kalken oval ell. något päronlik Fig. V.Ak.H. 1833. = 2 3

Fukt. jord, \* i fjelltr. bland mossor, r. (ÖG. Hållberget; Lemunda. Ångml. Hernösand; samt Sollefteå: Holmgr.; Bjerträ. VB. Luleå; samt Lul. Lpm. Jokkmokk och Qvikkjokk: Holmgr. — N. Dovre; Aalesund och Finnm.: Holmgr. — *β Gestr.* Kubbo, vid Qvarckårnsbäcken. Dal. Norrbärke, vid sjön Barken; Osmundsberget. Pil. Lpm. Peljekaisse etc. — N. Hardanger. Dovre. — \* *Herjed.* Malmågen; Funnese och Ljungdalen. Dal. Idre. — N. Fämundstrakten. Mostamarken: Ångstr.) 1/2—1 tum lång, 1 lin. bred, gul- ell. brungrön, föga grenig. Stipl. små, dolda i rolluddet; bladkanlen i sjelfva inskärningen litet utböjd. — *β J. acuta Lindenb.*

22 *J. bantriensis Hook.* stj. nedliggande, föga rotträdig; bladen skeft vidfästade, från bredare bas *quadratisk rundade*, 2klufna, med rundtrubb. inskärning och spetsiga ell. trubbiga flikar; cell. *vida*, *genomskinliga*; stipl. *teml. stora*, smalt äggrunda—n. syllika, *sargadt tandade ell. helbrädd.*; kalken omv. *kägellik*, slät, med hopdragen, åttandad mynn. 2/6, 7. Fig. Hook. Suppl. t. 3 [*J. bidentata*]. G.&Rab. 305.

Fukt. st. r. (ÖG. Omberg. i skogen nära Elfvarum. Gottl. vid Gothemåns strand m. fr.) 1—2 tum lång, plattad af de åt sidorna utstående bladen och mer än 1 lin. bred, brungrön, enkel ell. upptill fågrenig. Jemte följ. art så nära beslägtad med föreg., att Lindb. numerera, trol. med rätta, anser dem alla 3 som former af en och samma art.

23 *J. Hornschuchiana N. v. Es.* stj. nedligg., rotträdig; bladen skeft vidfästade, konkava, n. *cirkelrunda*, *grundt 2flikiga*, med rundtrubb inskärning och *uddspetsiga* flikar; cell. *stora*, *men föga genomskinliga*; stipl. *teml. stora*, lancettlika, ofta djupt och ojemnt 2flikiga, med 2—3 *syllika sidoflikar ell. lånder*; kalken aflång, slät, med hopdragen, småtåndad mynning. 2/8, 9. Fig. G.&Rab. 128, 246.

Kärr, r. (Jeml. Åreskutan, horfåt Husåhytta. *Herjed.* nedom Funnedsdalsberget: C. & R. Hn; nedom St. Midtåkläppen, samt vid Ljusnedals bruk: Oldb. *Gestr.* Gefle, i Ormkårsmuren vid Kubbo. Ner. Garphyttan: C. Hn. Gottl. Åhr i Fläringe; Klinte: Holmgr. — N. Lysö nära Trondhj.: Ångstr. Dovre, vid Kongsvold.) 1—3 tum lång, och mer än 1 1/2 lin. bred, oljeglänsande brun- ell. högrön, föga grenig, platt af de 2sidigt utbredda stora bladen; svepebl. 2, lika de öfr., men mindre och med ännu grundare inskärning; kalken gulgrön.

(*J. ventric. \* porphyroleuca*)

b — Bladen ensidigt vända framåt, n. rännformigt hopvikna.

24 *J. plicata Hn.* stj. nedliggande, upphöjd—n. upprät, något rotträdig; bladen *vanl. tätt tegellagda*, skeft vidfästade, *ensidigt framåt vända*, konkava, runda, n. *till midten klufna* i 2, säll. 3, *äggrunda trubbad* flikar, med trubbad inskärning; cell. små, rundade; stipl. delade i 2, syllika, vid basen vanl. tandade flikar; kalken aflång. 2/6, 7. Fig.

\* *Kunzeana Hub.* stj. utdraget trådlik, mer upprät och enkel, mera glesbladig; bl. mer utstående, jemte stipl. smalare. — *β gracilis*: bladflik. mer spetsiga. Fig. V.Ak.H. 1838. G.&Rab. 394.

Fukt. st. (Lpl.—*Gestr.* Dal. och *Verm.* Ner. Svarthäcken nära Brevfvens bruk: C. Hn. — N. Finnm. Tromsö; Aalesund; samt Dovre, på Finnshöe: Holmgr. — \* *Pil. Lpm.* Peljekaisse; Arvidsjaur, på Prestberget. VB. Råbäck; samt Ångml. Sollefteå: Holmgr. *Herjed.* Dal. *Helst.* Uppl. Lingonbacka; Vitulfsberg. Stockh. Stadshagen; nära Skanstull. ÖG. V. Ny sn: Holmgr. VG. Hunneberg. — N. Finnm. Aglappen i Maalseldalen: Holmgr. Trondhem.) *Fast tufvad, brun ell. gulgrön; stj. 1/2—1 1/2 tum lång, groft trådlik, n. trind; bladflik. rundtrubb., utan ell. med udd.*

\*\* Utan stipler.

a — Bladen platta ell. konkava.

α — Bladspetsens likar trubbiga.

- 25 *J. inflata* Huds. stj. nedligg. ell. n. upprät, grenig, glest och kort rotträdig; bladen glesa, skeft fästade, meränd. platta, rundade, n. till midten klufna i 2, trubbiga likar, med trubbad inskränning; kalken aflångt påronlik, trubbig, slät, med kort 4—5tandad mynning. 2½ 5, 6. — β *hercynica*: tufvad, upprät, med slaka och smala nyskott; bl. konkava, med inböjda likar. — γ *laxa*: dubb. större, grön, med platta bl. Fig. Fl.D.1945.f.2. Hook.t.38. Ek.f.23; 81. Thed.M.exs.140. G.&Rab.145, 174, 253, 311, 390, 450.

Kärr, fukt. jord. (Lpl.—Smål. — N.) Vanl. tagelsmal, brungrön, ofta n. svart, omkr. tumslång; β mycket gröfre, lifligt grön. — β *J. hercynica* Hüb.

- 26 *J. orcadensis* Hook. stj. upprät ell. uppstig, föga grenig, rotträdig; bladen något närslutande, skeft fästade, 2sidiga ell. ensidigt framåt vända, n. platta, från bred, något nedlöpande bas äggrunda, i den något tillbakaböjda spetsen grundt och trubbigt klufna i 2—3, vanl. olikstora, trubblade likar ell. lånder. 2½. Fig. Hook.t.71. Ek.f.39. G.&Rab.40, 399, 460.

Fjelltr., bland moss. och lavar, r. (Lul. Lpm. Herjed. mell. Tännäs och Långå: Oldb. Dal. Idre, vid Gröfvelsjön; Transtrand, på När- och Hemfjellet. — N. Trondhj., på Monken: Ångstr. Hedemarken, på Sahlfjellet nära Dalgräusen: Oudalen, nära Stor-söen. Dovre, vid Kongsvold. Bergen st., mell. Graven och Voss.) 2—3 tum lång, mer än ½ lin. bred, blekt brungrön; inskränningen i bladspetsen mycket grund; bladcell. små. Kalk och frukt okända.

(J. Wenzelii.)

β — Bladlikarne spetsiga [undant. en del bl. hos *J. Wenzelii*].

- 27 *J. ventricosa* Dicks. stj. nedligg. ell. uppböjd, grenig, rotträdig; bladen skefva, 2sidigt utstående, platta, n. kvadratisk, grundt 2flikiga, med bred och trubbig inskränning, spetsiga likar; svepebl. störst, mycket breda, ojemnt 3—4flikiga, veckiga; kalken uppbildat äggformig, slutt. oval, upptill veckig och tandad. 2½ 7—9. Fig. Fl.D.2005, f.1. Hook.t.28. Ek.f.58. Somf.Cr.exs.40.

\* *porphyroleuca* N. v. Es. stj. högröd; bladen bleka, ovalt kvadratisk, med mindre trubbig inskränning; svepebl. djupt flikiga, ofta åtföljda af sylrika stipler. Fig. Fl.D. 1715, f.1, och 2625. Ek.f.78. G.&Rab.184—5, 288.

Skog, \* murkna stubb. etc., a. (Sk.—Lpl. — N.) Vanl. fast tufvad, ½—¾ tum lång, ½ lin. bred, mer och mindre plattad af de utböjda, mot toppen vanl. till tegel-lagda, nedtill glesare, hos hufvudformen vanl. rent gröna bladen.

- 28 *J. Wenzelii* N. v. Es. stj. nedligg. ell. uppböjd, enkel ell. upptill 2grenad, rotträdig; bladen skefva, 2sidigt utstående, konkava, n. cirkelrunda, grundt och trubbigt intryckta, med dels trubbiga, dels spetsiga, ofta ojemnt tandade likar ell. lånder; svepebl. störst, n. kvadratisk, ojemnt 1—3tandade; kalken långt utskjutande, aflångt cylindrisk, n. slät, upptill trubbig, tandad. 2½ 6, 7. Fig. G.&Rab.389.

Fukt. st. i fjelltr. r. (Torn. Lpm. Täppijänka. Lul. Lpm. Wuoka: Holmgr. Pit. Lpm. vid en bäck från Wittjokk nära Arvidsjaur m. fr. Um. Lpm. Rönn- och Oljefjellet: Ångstr. Herjed. Haftorsstöten.) Stor som föreg., brunaktig; föga skild från följ.

- 29 *J. alpestris* Schleich. stj. som hos föreg.; bladen äggrundt kvadratisk, grundt och trubbigt urnupna med inböjda, vanl. spetsiga likar, de nedre bladen plattare och mer utstående, de öfre starkt konkava, skeft riglade upp- och framåt; svepebl. störst, rundade, 2—3flikiga, hälften kortare än den aflånga, släta, trubbiga, 4tandade kalken. 2½ 5, 6. Fig. Fl.D.2757, f.2. G.&Rab.190, 264—5, 304.

Klipp-, på multn. mossor, r. (Lul. Lpm. Qvikkjokk, Jokkmokk etc.: Holmgr. Pit. Lpm. Tjiddjakk; Peljekaisse etc. Ångml. Hernösand: Holmgr. Jemtl. Snasahögen. Herjed. Skarffjellet. Dal. vid Skatungen; Norrbärke. Uppl. Vahlö sn, Stummelbo; Tierp sn, Fors. Stockh. Skarpneck; Nacka; Vermdön. Ner. Skåleklint: C. Hn. Boh. Marstrand. — N. Finnm. Tromsö, och Maalselvdalen: Holmgr. Trondhjem. Gudbrandsdalen.) Spridd, mer säll. mattlikt utbredd, bland ell. öfter andra i upplösning stadda mossor; yngre grön, äldre blekt ell. rödaktigt gul ell. brun-

aktig,  $\frac{1}{2}$ —1 tum lång,  $\frac{1}{2}$  lin. bred; de öfre bladens starkt konkava bas upprät, spetsen utstående.

- 30 *J. bicrenata* Lindenb. stj. mycket kort, krypande, rotträdig; bladen skeft fästade, *tätt tegellagda, rigtade uppåt*, konkava, rundadt åggrunda, djupt och *hvasst urnupna, med korta spetsigaflikar, af små, mot kanterna och spetsen mindre celler, med vida mellanrum*; svepebl. något större, 2—3flikiga, fint sågtandade; kalken åggformig, *veckig*, med fintandad mynning. 2½ 5, 6. Fig. Fl.D.2692.f.1. Ek.f.93, 2. Thed. M.exs.141. G.&Rab.127, 187, 310, 411.

Jord, r. (Sk. Linneryd och Uddarp i Broby; samt Vestraby i Emitslöfs sn: Hamnstr. Hall. Bårarp; Varberg, vid Fiskeläget: Scheutz. VG. Degeberg. Smål. Lemnhult: Scheutz. ÖG. Södm. Gerstaberger. Stockh. flerest. Uppl. Brunnby i Östuna: Ångstr.; Vahlö. Dal. Norrbärke. Um. Lpm. Berglunda i Lycksele: Ångstr. Pit. Lpm. Glommersliden: Arvidsjaur.)  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  lin. lång, *ljust gulgrön, tätbladig*; kalken  $\frac{1}{2}$  lin. lång, tydligt *veckig*; utom med de små och åtskiljda, derigen. punklika cellerna lätt skild i friskt tillstånd från följ., såsom redan Spruce i *M. & Hep. af the Pyr. anmärker*, med en egendomlig aromatisk lukt, som följ. saknar.

- 31 *J. intermedia* Lindenb. stj. som hos föreg.; bladen skeft fästade, *tätt tegellagda, rigtade uppåt*, något konkava, *rundadt ell. åggrundt kvadratiska, halfmånlikt ell. trubbigt urnupna*, säll. 3flikiga, med olikstora spetsiga flikar; cell. *teml. vida, jemnstora, tätt gränsande till hvarandra*; svepebl. större, 3—4flikiga, bugtandade; kalken vidgad åggformig, slutl. *veckig*, med fintandad mynning. 2½ 5, 6; 9, 10. —  $\beta$  *capitata*: uppåt vidgad; öfre bl. hufvudlikt gytttrade, krusiga, flerflikiga. Fig. Fl. D.2626.f.2. Ek.f.93, 1; t.6och12.f.46;  $\beta$  f.32. Hook.t.80 ( $\beta$ ). G.&Rab.60, 144, 312.

Jord, r. (Sk. Årup; Broby. Hall. Bårarp. Smål. Vilstad, vid Heligås; samt i öst. del af Kronobergs län enl. Scheutz. Ner. Svennevad sn; samt Fjagesta i Edsberg: C. Hn. Verml. Dal. Norrbärke. Herjed. Malmagen: Oldb. Södm. Uppl. Uppsala, bortåt Norrby: Dr C. J. Strömb.; Örebrohus; samt Um. Lpm. Berglunda: Ångstr. — N.) *Liten som föreg.*, med rotträdarne hårdt fästad vid marken, endast fri och uppstig. med de något tjockare topparne; kalken 1 lin. lång. —  $\beta$  *J. capitata* Hook.

b — Bladen rännformigt hopvikna.

- 32 *J. saxicola* Schrad. stj. uppstig., *groft trådlik*, föga rotträdig; bladen mycket tätt sittande, skeft vidfästade och något utstående, nående skiftevis med basen öfver stjelkens framsida, *bredt åggrunda*, klufna n. till midten i en öfre spetsig, en undre trubbad flik, begge n. lika stora, åggrunda, helbrädd.; svepebl. 2—4flikiga, småsågade; kalken *utskjutande, uppblåst åggformig, veckig*, fluktandad. 2½ 5—7. Fig. Fl.D.2693.f.1. Ek.f.73. G.&Rab.12, 302.

Berg, mer säll. trädstamm. (Lpl.—Smål. Sk. Skärali. — N.) *Bildar 1—2 tum höga, låta tusvor af brun- ell. gulaktig, mer säll. rent grön färg; stj. enkel ell. mot spetsen skjulande nyskott, på undre sidan konvex, på den öfre platt och n. trapplik af de skiftevisa bladbaserna. Kalken åtm. dubbelt längre än svepebl., utgår från stjelkens spets, men blifver ofta genom nyskott skenbart sidosittande. — J. resupinata* Wg.

- 33 *J. Michauxii* Web. stj. som hos föreg.; bladen ut- ell. något nedböjda, n. *kvadratiska*, djupt 2klufna, med *spetsiga, inböjda*, n. jemnstora flikar, för öfr. som hos föreg.; svepebl. *lika de öfriga*, småsågade; kalken *knappt utskjutande*, n. omv. åggformig, med veckad, fintandad mynning. 2½ 7. Fig. G.&Rab.245.

Murken ved, klipp. r. (Sk. Skärali, på klippor. VG. Bromö i Venern.) *Ungefär tumshög, mera grenig, något finare och med något mindre bladceller än föreg., som den liknar till färg och växtsätt; kalken hälften mindre, af svepets längd. — J. densa* N. v. Es.

- 34 *J. minuta* Dicks. stj. *tagelsmal*, nedligg. ell. uppstigande, n. utan rotträdar; bladen teml. tattsittande, fästade skiftevis och tvärs öfver stj., utstående—upprätt, åggrundt kvadratiska, hvasst och teml. djupt 2klufna, med jemnstora, något spetsiga flikar; svepebl. större, 3flikiga, n. *helbrädd.*; kalken *utskjutande, aflång*, upp till veckig. 2½ 8, 9. —  $\beta$  *gemmipara*: bl. särd. de öfre sargadt sågade. Fig. Fl.D.2190. Hook. t.44. Ek.f.3. Sill.M.exs.189. G.&Rab.36, 270, 290, 429, 430, 464.

Klipp. (Sk.—Lpl. — N.) *Flere gånger finare än de föreg., ända till hårfin, ehuru*

ofta lika lång som de, tätt tufvad ell. spridd bland andra mossor, grenig och vanl. brungrön; bladen sitta mera tvärs öfver stj. än hos föreg. och hafva mindre celler än hos följ., som närv. mest liknar; kalken i förh. till mossans finlek rätt stor.

- 35 *J. Helleriana* N. v. Es. stj. hårfin, krypande, efter hela sin längd rottrådig; bladen som hos föreg., med spetsiga, hos de öfre ofta ojemnt tandade likar; svepebl. 2—3-klufna, taggsågade; kalken föga utskjutande, äggformig—oval, med veckad mynning. 2½ 6—8. Fig. Ek.f.103. G.&Rab.303.

Murk. ved i kärr, r. (Stockh. vid Gåsberget i Järfälla sn; vid Sandsjön. Gestr. Kubbo. Dal. Grycksbo. VB. Nörsjö sn, mell. Granliden och Granbergs träsk. Um. Lpm. i en dal nära Oxsfellet: Angstr.) 3—4 lin. lång, fin som föreg:s minsta former, grenig, gul- ell. brunaktig, på murkna trädstammar bildande ett öfverdrag, som något erinrar om *Trigon. curvifol.* *J. verruculosa*

++++ *Barbata*: bladen 3—6flikiga ell. tandade, veckiga, säll. 2tandade.

\* Med stipler.

a — Bladen grundt flikiga ell. tandade: *J. barbata* Schreb.

- 36 *J. lycopodioides* Wallr. stj. plattad (af de 2sidigt utstående bladen), nedligg. ell. uppböjd, rottrådig; bladen tegellagda, rundade, veckiga och bugtigt rundtom flikade i 5—3, korta rundade, något uddspetsiga tänder; stipl. stora, tegellagda, 2klufna, starkt och långt fransigt tandade i kanterna; kalken oval, veckig. 2½ 6—8. Fig. Thed.M.exs.143. G.&Rab.188,346.

Bergstr. r (Lpl.—Gestr. och Dal. — N.) Störst i afd., 2—3 tum lång, 2 lin. bred ell. bredare, med nyskott i spetsen, lifligt grön; bladen ofast 5-, säll. 4-ell. 3-tandade. Frukt sälls. — *J. barbata* var. *lycopodioides* N. v. Es.

- 37 *J. barbata* Schmid. stj. som hos föreg.; bladen tegellagda, quadratiska, i den tvärs spetsen 3—4tandade, med vanl. spetsiga tänder; stipl. djupt delade i 2, smala, oländade likar, ell. felände; kalken som hos föreg. 2½ 6,7. Fig. Fl.D.2123. Thed. M.exs.142. G.&Rab.37, 131, 235, 432.

Sten. etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Något mindre än föreg., 1—2 tum lång, 1—1½ lin. bred, grön ell. gulaktig, mest lik följ., men skild med bladen, som icke nå så långt fram på stjelkens framsida och hafva begge kanterna ungefär lika långa, n. rålliniga. — *J. barbata* var. *Schreberi* N. v. Es.

- 38 *J. quinquedentata* Web. stj. som hos föreg.; bladen tegellagda, rundadt quadratiska, med öfre kanten helbräddad, den nedre rundad, ojemnt 3—5tandad, veckig; tand. trubbiga med udd, de nedersta böjda in- och uppåt; stipl. otydliga, 2klufna ell. delade, tandade; kalken stor, oval—afslång, upptill veckig. 2½ 7—9. Fig. Fl.D.2814,f.2. Ek.f.41,n:o9. Thed.M.exs.144. G.&Rab.175, 420.

Sten. etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Mörkgrön, 1—2 tum lång, 1—1½ lin. bred; bladens öfre kant lång och hel, spetsen och nedre kanten i en fortlöpande båge tandade, öfversta tanden störst. Stipl. stund. felände. — *J. barbata* var. *quinquedentata* N. v. Es.

- 39 *J. Floerkei* WM. stj. n. trind (af de skefva, framåt ensidiga bladen), uppböjd ell. upprät, rottrådig; bladen tätt sittande tegellagda, äggrundt quadratiska, i spetsen 3-, säll. 2-ell. 4tandade, med korta spetsiga inböjda tänder; stipl. tydliga, tegellagda, delade i 2, vid basen fransigt tandade likar; kalken oval, upptill veckig. 2½ 5—7. Fig. Fl.D.2693,f.2. Wg.Fl.L.t.25,f.3. G.&Rab.183, 248—9, 268, 348—50, 431.

Klipp., helst i fjelltr. r. (Lpl. och VB.—Dal. och Helsl. Stockh. flerst. — N. Finom. Hammerfest—Dovre.) Knappt tumslång, ½ lin. bred, med ensidigt dt stjelkens framsida vända blad, tätt tufvad, brunaktig, vid stygtigt påseende ej olit *J. saxicola*. — *J. quinquedent.* γ *julacea* Wg. Fl.Su. *J. barbata* var. *Floerkei* N. v. Es. *J. tridentata* Scop.

- 40 *J. attenuata* Lindenb. stj. lång, trådläk, rottrådig, med långa, tagelsmala flageller i toppen; bladen närmade, skeft fästade, ovalt quadratiska, i spetsen 2—3tandade, med korta spetsiga tänder; stipl. 2klufna, bugtbräddade, ofta felände; kalken cylindrisk ell. klubblik, vid mynningen veckig. 2½ 7—9. Fig. Fl.D.2814,f.1. Hook.t.70, f.18—22. Ek.f.102. Thed.M.exs.145. G.&Rab.153, 351, 452.

Klipp., skogsstig., murk. ved i skog. r. (Sk. nor. del. och Hall.—VB. och Lpl. — N.)  
 1—2 tum lång, n. trådsma, tufvad, grön ell. brun. — *J. barbata* var. *attenuata*  
 N. v. Es. *J. tridentata* Sw. *J. g. nivalis* Schleich.

b — Bladen n. till basen 3—4delade.

- 41 *J. setiformis* Ehrh. stj. trådläk, n. trind, upprät ell. nedlåg., kort rottrådlig; bladen tättsittande, tegellagda, n. kvadratiske, mer breda än långa, delade n. till basen i 3—4, upprätta, äggrunda—afånga, spetsade likar, med utvikna, meränd. flikandade kanter; stipl. stora, djupt 2delade, särđ. vid basen tandade; kalken vidgad äggformig, veckig, med hårfinaänder vid mynningen. 2 4, 5. —  $\beta$  alpina: finare; bladflik n. helbräddade. Fig. Hook. t. 20. Ek. f. 15. G. & Rab. 96, 252.

Bergvägg. r. (Lpl.—Verm.). Kroppa sn: Wg; och Gestr. Rönnsåsen i Ockelbo. Stockh. Finnboða nära Danviken enl. Thed. VG. Kinnekulle. Smål. Skurugata. — N. — Funnen m. kalk i Lpl. af Linné enl. Lindb.; samt i Helsl. på Ranboberget i Mo sn, Apr. 1843, af utg.) *Brungul, tufvad, stund. i alnsvida, ett par tum tjocka mattor; stjekarne 1—2 tum långa, enkla, med ett ell. 2 nyskott i toppen, torra mycket spröda, alldeles täckta af bladen, som gifva dem ett knaggligt utseende; kalken, som är högst sällsynt, träffas vid nyskottens utgångspunkt och är mycket liten, knappt 1 lin. lång, föga framskjutande mell. svepebl., blekt brunaktig. — J. concatenata* Sm. *Chandonanthus setif.* Lindb.

\*\* Utan stipler.

- 42 *J. polita* N. v. Es. stj. udragen, uppstigande, föga rottrådlig; bladen veckiga, n. kvadratiske, i den tvära spetsen med 3, trubbiga helbräddade flikar; kalken aflång — klubblik, med veckad mynning. 2 7, 8. Fig. Fl.D. suppl. t. 113, f. 1. G. & Rab. 386.

Vid bäcker i fjelltr. r. (Pit. Lpm. Kåksa; Peljekaisse; Arvidsjaur, äfven m. fr. Äfven uppg. för Um. Lpm. Oxsfellet af Ångstr. i Bot. Not.; men ex. sända derifrån kan utg. ej finna skiljda från *J. lycopod.*) 1—1½ tum lång, 1 lin. bred, nedtill brun, i topparne ljusgrön, med något glesit sittande blad, utmärkta af en egendomlig stark fettglans; kalken en god lin. lång, dels i toppen, dels på sidan i följd af stjeklens förlängning genom nyskott.

- 43 *J. incisa* Schrad. stj. ganska kort, uppböjd, tåll rottrådlig; bladen starkt krusigt veckiga, tättsittande, rigtade upp- och framåt, n. mer breda än långa, djupt och olikformigt 3—5flikiga, med kölade, spetsiga, smålandade flikar; kalken oval—omv. äggformig, med veckad, fintandad mynning. 2 6—8. Fig. Fl.D. 1896, f. 1. Hook. t. 10. Ek. f. 30; 77. G. & Rab. 228—9, 346.

Jord, murken ved etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Stj. 2—4 lin. lång, utplattad 1 lin. bred, tufvig; bladen listigt ljusgröna, utmärkta af sin starka krusighet. Är sällan något mer udragen, med glesare sittande blad; vida oftare är stj. knappt urskiljbar.

++++ *Aequifoliae*: bladen skenbart 3radiga [en rad bildad af bladlika stipler].

\* Bladen ungefär till midten 2klufna.

- 44 *J. julacea* Lightf. stj. uppstigande, trådlik, trind, endast vid basen rottrådlig; bladen (och de med dem likformiga stiplerna) tegellagda, tilltryckta konkava, äggrunda, till något nedom midten smalt och hvasst klufna i 2, äggrundt lancettlika spetsiga, mot spetsen ojemnt smålandade flikar; kalken oval, veckig. 2 6—8. Fig. Fl.D. 1773, f. 1. Hook. t. 2. Ek. f. 61. G. & Rab. 126, 152, 467.

Jord nära snödrifv. i fjelltr. (Lpl.—Dal. Fulufjell. — N. Finnm.—Norfjellet i Budske-ruds amt.) Bildar stora fasta mattor af brungrön, äldre blåhvit färg; stj. 1, högst 1 tum lång, ganska grenig; bladen ytterst tättsittande, alltid tilltryckta. — *J. concinnata* Wg. Fl.L. *J. nivalis* Sw. och Wg. Fl.Su. *Chandonanthus julac.* Lindb.

- 45 *J. laxifolia* Hook. stj. n. upprät, hårfin, trind, endast vid basen något rottrådlig; bladen (och stipl.) glesa och spridda, något utstående, svagt konkava, äggrunda, till en tredjedel hvasst klufna i 2, spetsiga, helbräddade flikar; kalken aflång ell. klubblik, veckig. 2 6—8. Fig. Hook. t. 59. Ek. f. 8. G. & Rab. 345.

Fjellbäck. r. (Um. Lpm. Laxfjellet: Ångstr. Jemil. Snasahögen; Åreskutan etc. Herjed. gränsfjellen; Funnesdalsberget. Dal. vid Gröfvelsjön i Idre sn. — N. Finnm. Hammer-



fest. Nordl. Salten. Trondhj. st., Wennsjeld i Mostamarken: Ångstr. Dovre.)  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  tum lång, märkbart finare än föreg., n. färglös; bladens cellväf mycket lös. Begge arterna i afd. öfverdragas i äldre tillstånd samt i herbarier af hvita möjellika svamp- och alg-arter. — En form af närv. art dr trol. J. Hubeneriana N. v. Es.

\*\* Bladen delade till basen i 2—4, af cellerna likasom ledade, hår- ell. syl- lika slikar.

- 46 J. *trichophylla* L. stj. vanl. nedligg., hårfin, glest rottrådig; bladen (och stipl.) delade i 3—4, hårlika, af en enda cellrad bestående, peribandslikt ledade, spetsiga slikar; kalken cylindrisk—smalt klubblik, med hopdragen, tandad mynning. 24 6. Fig. Fl.D.2813,f.2. Hook.t.7. Ek.f.27. Thed.M.exs.134. G.&Rab.15, 267, 313.

Murken ved, bland andra mossor etc., a. (Sk.—Lpl. — N.) Ytterst fin, grön ell. gulgrön; stj. ett par lin.—tumsläng, ganska grenig; bladflikarne längre, stund. dubb. längre än afståndet mell. bladen. — *Chetopsis* Mill.

- 47 J. *setacea* Web. stj. uppstig. ell. upprät, hårfin, end. nedtill rottrådig; bladen (och stipl.) delade i 2—3, nedtill af 2—4 cellrader i bredd bestående, syllika, trubblade, svagt inböjda, ledade slikar; kalken på en kort sidogren, n. cylindr., med vid och franstandad mynn. 24 6—8. Fig. Fl.D.2759,f.2. Sw.Meth.Musc.t.1,f.6. Hook.t.8; suppl.t.1. Ek.f.28. Sill.M.exs.187. G.&Rab.38, 39, 114, 446.

Torfkärr etc. r. (Sk. Skäräli; Röstlång; Broby sn, vid Uddarp och Eskilstorp: Hamnstr. — Gestr. Dal. och Verml. — N. Kongstuen vid Suul: Ångstr. och trol. flerst.) Fin som föreg., gul- ell. brungren; stj. enkel ell. grenig, från ett par lin. till omkr. tumsläng, mattlikt tufvad ell. spridd bland *Sphagna*; bladflik. jemförelsevis korta, knappt dubb. längre än stjelkdiametern, tydl. bredare och trubbigare än hos föreg. — *Lepidozia* Mill.

### 131. TRIGONANTHUS Spruce. = *Polytrichum*

† Med stipler.

- 1 T. *albescens* Lindb. stj. uppstigande, tagelsmal, grenig, föga och kort rottrådig; bladen glest tegellagda, stund. mer åtskiljda, föga utstående, n. cirkelrunda, djupt konkava, 2klufna, med grund och smal, men trubbig inskränning och korta, trubbiga ell. spetsiga, mot hvarandra rigtade slikar: stipl. ågrunda, hela ell. med en liten tand vid basens kant; fruktgrenens blad till form och ställning lika de öfriga, uppåt större: kalken aflångt äggformig, slät. 24 6, 7. Fig. Hook.t.72; suppl.t.4. Ek.f.42. Somf. Suppl.t.3. G.&Rab.35, 468.

Fjelltr., bland andra mossor, r. (Lpl.—Dal. Fulufjell i Särna; När- och Hemfjell i Transtränd. — N. Finnm.—Dovre och Filefjeld.)  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  tum lång, spridd bland andra mossor eller öfver dem bildande ett mattlikt öfverdrag af ljusgrön, skul. perthvit färg; i torrt tillstånd peribandslikt ledad af de halfkloformigt konkava, tilltryckta bladen, hvilkas inskränning säll. når djupare än  $\frac{1}{4}$  af bladets längd och oftast liknar en smal spricka. Ställes redan af Hüb. i Hep. Germ. bland *Jungermannia bicuspidata*, hvilka utgöra släktet *Trigonanthus*. — *Jungermannia* N. v. Es. ed.9. J. *scutata* Somf. Suppl.

- 2 T. *islandicus* Ångstr. stj. nedligg., tagelsmal, föga grenig och rottrådig; bladen glest sittande, utstående, rundade, något konkava, till midten hvasst 2klufna, med spetsade raka slikar: stipl. ågrunda, trubbiga, helbrädd.; kalken n. cylindrisk, veckig. 24. Fig. Fl.D.2758.

Vid fjellback. r. (Lul. Lpm. Stuor Toki vid Wirihaur: Ångstr. Pit. Lpm. Tjiddjakk; samt nedom Wittjokk vid Arvidsjaur: Lindb. Um. Lpm. Rönn- och Laxfjellen: Ångstr.)  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  tum lång, ännu finare än föreg. och mera glesbladig, tät, men löst tufvad, hvitaktig, med djupare och hvasare inskränning mell. bladflik; fruktgren. och kalk saknas på de ex., utg. fält sig meddelade. — *Jungermannia* N. v. Es.

- 3 T. *Francisci* Spruce: stj. n. hårfin, nedligg. med uppstigande grenar, föga rottrådig; bladen glesa, knappt längre än stjelkdiametern, konkava, ovala, grundt 2klufna, med smal, men trubbig inskränning och raka trubbiga slikar; stipl. aflånga, 2klufna ell. hela; fruktgren. uppåt tjockare af tätsitt., allt större, 3radiga, djupare klufna blad; kalken aflång, med veckad mynning. 24 5, 6. Fig. Fl.D.2759,f.1. Hook.t.49. Ek.f.66. G.&Rab.301.

Kärr, bland andra mossor, r. (VG. Hunneberg, bland *Sphagn. molluscum*: Lindb.) Svenska ex. sterila, med halftumslånga hårfina grenar; de nedre bl. hvitgröna, de öfre ljusröda.

- 4 *T. divaricatus* Spruce: stj. n. hårfin, krypande, grenig och rotträdig; bladen bredt äggrunda, till midten hvasst 2klufna, med något trubbadflikar, för öfr. som hos föreg.; stipl. lancettlika, trubbiga, ell. omv. äggrunda, urnupna; fruktgren. och kalk som hos föreg. 2 $\frac{1}{2}$  7, 8. —  $\beta$  *exampbigastriatus* Lindb. utan stipl. Fig. Fl.D.1771, f.1. Hook.t.12. Ek.f.34. G.&Rab.107, 306, 356;  $\beta$  59, 129.

Jord, på mossor, lafvar etc. r.,  $\beta$  mer allm. (Sk. Broby sn. Åskekärr; samt Emitslöfs sn. Vestraby: Hamnstr. Södm. Nyköping: C. Ind. Stockh. flerst.; vid Huddinge kyrka m. fr. Öl. Böda park: Zett. —  $\beta$  Sk.—Gestr. Dal. och Verm. Jemt. Snashögen. — N.) Liten som föreg., ytterst fin, liknande ett fint ludd, med jemförelsevis tjock stjelk. — Jungerm. EB. och ed.9. J. byssacea Hook. J. Starkii Funck.  $\beta$  J. *divaricata* Auctt.

*Capitula 10-12-lig.*

†† Utan stipler.

- 5 *T. catenulatus* Spruce: stj. nedligg. ell. uppstigande, n. hårfin, grenig och rotträdig; bladen teml. tätsittande, n. tilltryckta, konkava, rundadt äggrunda, klufna ungef. till midten i 2, n. raka spetsiga flikar, med mer ell. mindre smal, alltid rundtrubbig inskärning; cell. stora runda, med breda färgade mellanrum; fruktgren. kort; kalken aflång, veckig. 2 $\frac{1}{2}$  5, 6. Fig. G.&Rab.433.

Murk. ved, jord i skog, r. (Smål. Kråketorps gästgg.; Hult, samt Almesåkra: Scheutz. ÖG. V. Ny sn, Belleberg. Ner. flerst. i Lerbäck och Svennevad snr: C. Hn. Dal. nära Helgo i Åhl sn: C. & R. Hn; mell. Falun och Grycksho. Gestr. Kubbo i Hjortronmossen. Helsl. Lassekrogen i Färila: Oldb. Medelp. Sättna: Ångstr. Herjed. Vallarne och Malmagen: Oldb. VB. Norsjö sn, Långträsk. Um. Lpm. Olfjellet: Ångstr. Pit. Lpm. Arvidsjaur. Lul. Lpm. enl. Ångstr. Öl. flerst.: Lindb. och Zett. — N. Rörås: Oldb. Finnm. Maalselvdalen: Holmgr.) Tätt och trassligt hopflett, brun, föga genomskinlig; bladen tätsittande, men icke täckande hvarandra, föga bredare än stjelkdiam., vända framåt, hvarig. växten blifver konvex på undre sidan, rännformig på den öfre; fruktgren. kortare än kalken, deremot hos föreg., hvarmed närv. är mest beslägtad, längre. — Jungerm. Hüb. och ed.9.

- 6 *T. bicuspidatus* Spruce: stj. krypande ell. uppstig., grenig, nedtill rotträdig; bladen vanl. glesa och horisontalt utstående, n. platta, rundadt quadratiska, till midten klufna i 2 lancettlika, raka och spetsiga flikar, med hvasst inskärning; cell. stora, 5—6kantiga, gränsande till till hvarandra; fruktgren. korta; kalken n. cylindr., upptill 3kantig. 2 $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *conferta*: mer gyttad och upprätt, mörkgrön; bl. tätare, något konkava, med smalare inskärning. —  $\gamma$  *Lammersiana*: styfvare, med tätsitt. konkava bl. Fig. Fl.D.2068. Hook.t.11och16; suppl.t.1och4. Ek.f.33. Sill.M. exs.190. G.&Rab.74, 110, 191, 289, 308—9, 353.

Jord, murk. ved. etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Var. i storlek från ett par lin. till nära tumslång, inemot  $\frac{1}{2}$  lin. bred, vanl. lifligt ljusgrön, med mycket lös cellväf; oflast ymn. fruktbärande. — Jungerm. L. och ed.9.

- 7 *T. curvifolius* Spruce: stj. krypande, trädfin, trind, grenig och rotträdig; bladen tätsittande, tegellagda, vid basen buktigt ell. uppblåst konkava, till midten 2klufna, med rundtrubbig inskärning och långa, syllika, smalspetsiga, något mot hvarandra rigtade, inkrökta och ledade flikar; cell. teml. stora, vattenklara, med breda mellanrum; fruktgren. korta; kalken n. cylindrisk, veckad. 2 $\frac{1}{2}$  5—7. Fig. Ek.f.59. G.&Rab.73, 217, 232, 250.

Murkna stockar etc. i skog., r. (Sk. flerst. Smål. Femsjö: Husqvarna, och Näs skog i Ljunga; samt ÖG. Omberg: Zett.; V. Ny sn, Belleberg. Ner. mångsten i Svennevad, Lerbäck och Halsberg snr: C. Hn; Brevens bruk: A. T. Björkm. Öl. Böda park: Zett.) Stjelkarne trädlika, tumslånga, samlade i stora tunna mattor af vackert rödbrun ell. hvitgrön färg; de långa bladstikarnes öfre del består af en enda rad, långsträckt, n. jemnbreda celler. Är en af de vackraste och utmärktaste arter i hela familjen. — Jungerm. Dicks. och ed.9. J. Baueri Lindb.

- 8 *T. connivens* Spruce: stj. vanl. krypande, hårfin, grenig och rotträdig; bladen glest sittande, vanl. platta, cirkelrunda, grundt, mer säll. till midten klufna i 2, spet-

*siga*, mot hvarandra rigtade, n. samstämmandeflikar, med rund inskärning; cellstora, vattenklara, med smala mellanrum; fruktgr. korta; kalken aflång, upptill veckigt 3kantig. 2 5, 6. Fig. Fl.D.2069. Hook.t.15. Ek.f.60. G.&Rab.111, 173, 239, 380.

Jord, bland andra mossor etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Mycket fin, vanl. några få lin. lång, mattlikt tufvad, stund. spridd bland *Sphagna* och utdragen till 1—2 tumslängd, med långt åtskiljda blad, n. alltid ljusgrön ell. hvitaktig och vattenklar, af mycket lös cellväf. Mell. de mot hvarandra rigtade bladflik. liknar inskärningen ofta ett rundt hål. — Jungerm. Dicks. och ed.9. *Cephalozia nuttalliana*

### 132. SPHAGNOECETIS N. v. Es.

1 *S. communis* N. v. Es. stj. nedligg., enkel ell. sparsamt förgrenad, långt rottrådig; bladen tättsittande, de nedre platt utstående, de öfre hoplagda åt stjelkens framsida, alla n. cirkelrunda och platta, helbräddade, af mycket små celler; stipl. på grenarne äggrunda, hela ell. urnupna; kalken i spetsen af korta sidogrenar, aflång, upptill veckad. 2 7, 8. Fig. Fl.D.2251. Hook.t.33; suppl.t.2. Ek.f.43; 48. G.&Rab.16, 300, 321, 366, 440.

Kärr, bland andra mossor, r. (Sk. Årup; Hasslemosse; Broby sn, Eskilstorp och Åskeskärr: Hamnstr. Smål. Femsjö enl. Ångstr. VG. Halle- och Hunneberg. ÖG. Motala sn, Bergsäter. Stockh. vid Skrubba. Ner. Skogaholm, vid sjön Hampetussen: C. Hn. Verml. Christinehamn, i Hagmossen. Dal. Herjed. Um. Lpm. Lycksele: Ångstr. Pil. Lpm. Tjeldtjakk. Torn. Lpm. Kurawaara. Öl. Glömminge: Zett.: Böda: Lindb. — N. Hedemarken, vid Stor-Söen. Trondhj. st., på Lys-öen.) 1 1/2—3 tum lång, 1/2 lin. bred ell. bredare, af blekgrön färg, varglånsande. Förveclas ofta med *Jung. Schraderi*. — Jungerm. *Sphagni* Dicks. *Odontoschisma Sphagni* (Dum.) Lindb. En hithörande form är *Jung. denudata* N. v. Es. *O. denudata*.

\*2 *S. decipiens* (Hook.) stj. upprät, enkel ell. föga grenig, utan rottrådar; bladen fastade n. tvärs öfver stj., tättsittande, konkava, de nedre och nyskottens runda, helbräddade, de öfre olikformiga, dels uddspetsiga, dels i den tvärhuggna spetsen gles 2—3-tandade, med små, spetsiga och taggliga tänder; cellerna ganska små; stipl. 0. 2. Fig. Lindenb.Sp.Hep.Plagioch.t.12. Hook.t.50. Ek.f.105. G.&Rab.213.

Klipp. r. (N. Salten: Somf. enl. Lindb.) Norska ex., fordom sända af Somf. under namn af *Jung. compressa*, äro omkr. 1/2 tum höga, bruna och sterila. Fruktbår. ex. lära emellertid enl. uppg. af Lindb. vara sunna af Spruce i Peru-alperna och bevisa artens släktskap med föreg., ej med *Plagiochila*, dit den förr fördes; utg. har ej sett någon fig. ell. beskrifn. på kalken. — Jungerm. Hook. *Plagioch. N. v. Es. Adelanthus* Mill. *Odontoschisma* Lindb.

### 133. LOPHOCOLEA N. v. Es.

1 *L. bidentata* N. v. Es. stj. nedligg., grenig och rottrådig; bladen n. platt utstående, bredt äggrunda, mot spetsen smedt sammandragna och smedt klufna i 2, sylspetsiga, något utböjda likar, med rundad inskärning; stipl. små, men tydliga, 2—4klufna, med syllika flikar; kalken i grenarnes spets ell., genom grenens tillväxt, på sidan, aflång, med uddtandade flikar. 2 6, 7. — *β cuspidata*: bl. djupare klufna, med längre och raka flikar. Fig. Fl.D.2070. Hook.t.30. Ek.f.153. G.&Rab.49, 133, 258.

Fukt. jord, sten., murk. ved etc. (Sk.—Uppl. Lul. Lpm. Nammats vid Qvikkjokk: Holmgr. Ner. Nerest. VG. Halle- och Hunneberg: Göteborg: Wahlb. Boh. Hall. Varberg: Scheutz. Öl.: Zett. — N. — *β* Öl. Melböda: Lindb.) Växer i blekgröna, stund. stora mattor; stj. 1—2 tum lång, 1 lin. bred; bladen genomskinliga, klufna till vidpass en fjerdedel, vid basen n. lika breda som långa; stipl. 4 gånger mindre än bladen. — Jungerm. L. *Lophoc. Hookeriana* N. v. Es. lär enl. Carr. endast vara en lokalform af denna.

2 *L. minor* N. v. Es. stj. som hos föreg.; bladen n. platt utstående, ovalt gradratiska, grundt klufna i 2, likformiga, spetsiga och raka flikar, med rundad inskärning; stipl. stora, djupt 2klufna, med bredt syllika, hela flikar; kalken som hos föreg. 2 6, 7. Fig. G.&Rab.159—60, 403.

Jordhålor i gräsväfl., på sten. etc. (Sk. Råby. Smål. Rosenlund nära Jönköping enl. Scheutz. VG. Göteborg. Ner. och Södm. — Jeml. Frösön; samt VB. Umeå: Holmgr. Öl. Nerest.: Zett. Goull.) Ungefär hälften så stor som föreg., mjuk och intrasslad,

*ljus- ell. blekgrön; lätt skild med bladformen och de jemförelsevis stora stiplerna, som uppnå en god tredjedel af bladens storlek. I Sv. endast funnen steril; bladens flikar och kanter hafva i stället stor benägenhet att alstra groddknoppar* [: var. *erosa* N. v. Es.], genom hvilka växten sannolikt förökas.

- 3 *L. heterophylla* N. v. Es. stj. krypande, grenig och mycket rottrådig; bladen kvadratisk äggrunda, de nedre teml. djupt urnupna, med trubbiga ell. något spetsiga flikar och trubbig inskärning, de öfre grundt intryckta ell. hela och tvärhuggna; stipl. stora, djupt 2klufna, med syllika, vanl. något tandade flikar; kalken i grenarnes spets, båglik, med hvasstandade flikar. 2 6—9. Fig. Fl.D.1715, f.2. Hook. t.31. Ek.f.54. G.&Rab.50, 76.

Murkna stubb., trådrött., jord etc. (Sk.—Helsl. Dal. Sättersdalen: Liedstr. och Verml. Vestgård i Fryksdalen: Myr. Öl. flerst.: Zett. — N.) Stj. vanl. blott  $\frac{1}{2}$  tum lång; bladen och stipl. af ungefär samma storlek som hos föreg.; färgen oflast blekt gulgrön; vanl. försedd med kalkar. — *Jungerm. Schrad.*

### 134. HARPANTHUS N. v. Es.

- 1 *H. Flotowianus* N. v. Es. stj. utdragen, grenig; kort rottrådig; bladen skeft vidfästade och med den nedre kanten långt nedlöpande på stjelkens framsida, rundadt äggrunda, grundt och vanl. trubbigt urnupna, med korta trubbiga flikar, platta kanter; stipl. olikformiga, de nedre bredare, djupt 2klufna, helbrädd., de öfre allt smalare och grundare klufna, ända till hela, men fint tandade; kalken på en mycket kort sidogren, n. cylindr., slät. 2 7, 8. Fig. Fl.D.suppl.t.120. Thed.M.exs.138. G.&Rab.379, 417.

Kärr, helst i fjelltr. r. (Lpl.—Dal. Idre, Särna och Transtrand; Leksand; Grycksbo. VB. Skellefteå. Angml. Hernösand: Holmgr. Gestr. Edskön, i kärret Svartmaren. — N. Fimm. Hammerfest: C. Hn; Tromsö, och Maalselvålen: Holmgr. Trondhj. st., Gävingåsen och Mostamarken: Ångstr. Aalesund: Holmgr. Tellemarken. Hardanger.) Stjelkarne 1—2 tum långa, 1 lin. breda, bilda gulgröna upprätta tufvor ell. stund. brunaktiga mattor; stipl. tydliga. Frukt sällsynt. — *Jungerm. N. v. Es. J. Hartmani Thed.*

### 135. CHILOSCYPHUS Corda.

- 1 *C. polyanthos* Corda: stj. nedligg., grenig och rottrådig; bladen horisontala, något nedlöpande, rundadt kvadratiske, helbräddade, med rundad, tvärhuggen ell. grundt intryckt spets; stipl. 2klufna, med syllika flikar, stund. hela; kalken vanl. märkbart kortare, stund. n. längre än mössan, med korta, helbräddade ell. längre, tandade flikar. 2 5, 6. Fig. Hook.t.62. Ek.f.50. G.&Rab.10, 118, 178, 192, 257, 285, 319.

\* *pallesceus* (Schrad.) blekt gulaktig ell. gulgrön; kalken af omkr. mössans längd, med längre, tandade flikar. Fig. Fl.D.1716, f.2. G.&Rab.77.

Fukt. jord, murk. ved, \* helst vid källor. (Sk.—VB. och Lpl. — N. till Nordl. —  $\beta$  Sk. Skärali. Smål. Skåtesfallshåla m. fl. st.: Scheutz. Ner. nära Yxbult i Kumla m. fl. st.: C. Hn. Uppl. Uppsala, i Kungsparken; Melsta i Rosl.: Ångstr.; Grisslehamn: Mosén. Helsl. vid Långbo i Skog sn. Öl. Ottenbylund och Böda skog: Zett. — N. Christiania, Bogstadås enl. Scheutz.) Utbredd, platt, 1—2 tum lång, mer än 1 lin. bred; hufvudformen mörkgrön, \* vanl. större, blekt gulgrön; talrika mellanformer såväl i afs. på färgen, som kalkens längd gifvas dock; stipl. små, flygtiga. — *Jungerm. L. \* Jungerm. Schrad. J. viticulosa* Wg. *Chiloscyphus pallesc.* N. v. Es. och ed.9.

## 3 Flocken *Geocalycæ*.

### 136. GEOCALYX N. v. Es.

- 1 *G. graveolens* N. v. Es. stj. krypande, grenig och rottrådig; bladen n. horisontalt utbredda, platta, äggrundt kvadratiske, grundt, men något hvasst urnupna, med spetsiga utstående flikar; stipl. små, tilltryckta, aflånga—ovals, nedom midten 2klufna, med spetsiga flikar; kalken oskaftad från stjelkens undersida, rigad nedåt, gulaktig, cylindrisk. 2 5, 6. Fig. Ek.f.67. Thed.M.exs.135. G.&Rab.434, 451.

Fukt. jord, kärr, r. (VG. Hunneberg. Ner. Edsberg sn, Fjugesta skog: C. Hn. ÖG. V. Ny; Vinnerstad flerst. Södm. Eskilstuna; Dalarö: Holmgr. Stockh. Skrubba;

Hartman, Skandinavians Flora II (10:de uppl.).

vid Sandsjön; Salems sn. *Gestr.* Gefle. *Helsl.* Hemstanäs: R. Hn; Lassekrog i Färila sn: Oldb. *Herjed.* Kolsätt. *Öl.* Böda skog: Lindb. *Gottl.* Hesse i Fläringe. — *N.* Trondhjemstrakten. Finnm. Hvassbrun i Maalselvdaalen: Holmgr.) *I platta mallor af omkr. tumslånga, knappt 1 lin. breda stjelkar; rent grön ell. blekgrön, utmärkt af en egendomlig lukt; bladens inskränning icke rund, ehuru vid, n. råtvinklig. Frukt sälls. — Jungerm. Schrad. J. bidentata Wg. Fl. Su.?*

#### 4 Flocken *Trichomanoides*.

##### 137. CALYPOGEIA Raddi.

- 1 *C. Trichomanis* Corda: stj. krypande, grenig, rotträdig; bladen horizontala, något konvexa, runda—bredt äggrunda, med rundad hel, intryckt ell. stund. 2standad spets, hel-bräddade; stipl. stora, bredare än stj., rundade med större bredd än längd, halfmånl-  
likt urnupna, med äggrunda, trubbiga ell. spetsade flikar; kalken från stjelnens under-  
sida, rigad nedåt, brungrön, cylindrisk. 2 5, 6. Fig. Fl.D.1896,f.2. Hook.t.79. Ek.  
f.35. Somf.Cr.exs.36. G.&Rab.134, 167.

Skog., fukt. jord, murk. ved etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) 1—2 tum lång, omkring 1  
lin. bred, i tåla mallor ell. spridd bland andra mossor, till färgen högrön ell.  
något blåaktigt grön, med nanl. lät silande blad, stora och varaktiga stipl.  
*Frukt sälls. — Minium L. Jungerm. Scop.*

##### 138. LEPIDOZIA N. v. Es.

- 1 *L. reptans* N. v. Es. stj. nedligg., pargrenig, nedtill rotsläende; bladen n. kvadratiska,  
konvexa, djupt 3—4klufna, med något olikstora, lancettlika, spetsade, nedböjda flikar;  
stipl. stora, af stjelnens bredd, mer breda än långa, 4—3flikiga; kalken på en mycket  
kort sidogren från stjelnens undersida, stor, n. lancettlik och 3kantig. 2 5, 6. Fig.  
Fl.D.2124. Hook.t.75. Ek.f.21. Lindenb.Sp.Hep.Lepid.t.5. Thed.M.exs.146. G.&  
Rab.19, 282.

Skog., på stubb, etc. a. (Sk.—Lpl. — N.) Bildar små platta, blek- ell. brungröna  
mallor; stj. 5—12 lin. lång, trådfin— $\frac{1}{2}$  lin. bred, mer och mindre glesbladig; ut-  
märkt af sin pargrenighet och de n. likformiga bl. och stipl. — *Jungerm. L.*  
*Herpetium N. v. Es. Eur. Leberm.*

##### 139. MASTIGOBRYUM N. v. Es.

- 1 *M. trilobatum* N. v. Es. stj. oordentligt förgrenad, föga rotträdig. (med bladen: bred  
och platt, längs midten konvex; bladen tegellagda, n. vinkelrätt utböjda, snedt och  
bredt äggrunda, med konvex bas och två, grundt 3standad spets; stipl. breda, n. njur-  
lika, ojemnt 3—5standade; kalken n. lancettlik, otydl. kantig. 2 8, 9. Fig. Fl.D.2191.  
Hook.t.76. Ek.f.22 och 116,b. Lindenb.Sp.Hep.Mastigobr.t.16. Sill.M.exs.193. G.&  
Rab.12, 280.

Berg, klipprott, i skugga, r. (Sk. Stenshufvud; Leingaröd; Skäråli. *Blek.* Lösen. *Smål.*  
Skurugata; Vestervik m. fl. st. enl. Scheutz. *ÖG.* Omberg; Motala, vid Lemunda.  
*Gestr.* Gefle, på Lång- och Harfällarne; Tvärhalsberget: R. Hn. *Helsl.* Hemstanäs.  
*Vestml.* Loberget vid Ramshyttan: Sill. *Ner.* Lekhytteklint: C. Hn; Sumphallen i  
Viby; Zett. *VG.* Kinnekulle; Halle- och Hunneberg. *Dalsl.* Boh. Christinedal:  
Lysekil; Marstrand. *Hall.* Varberg: Scheutz. *Öl.* Böda och Hörn: Zett. *Gottl.* Thors-  
borg. — *N.* söd. och vest. del. upp till Trondhj.)  $\frac{1}{2}$ —3 tum lång,  $\frac{1}{2}$ —2 lin.  
bred, grön, stund. med trådfina flageller; bladens öfre kant vid basen starkt ut-  
svängd, den nedre n. rak; deras tegellagda konvexa baser bilda längs stjelnens  
öfre sida en upphöjd kultrig rand, utanför hvilken bladen äro platt utbredda åt  
sidorna. *Frukt sälls. — Jungerm. L. Herpetium N. v. Es. Bazzanio Gray.*

- 2 *M. deflexum* N. v. Es. stj. som hos föreg., smal, längs öfre sidan helt och hållet  
konvex; bladen fullständigt konvexa, med nedböjd 2—4standad spets, för öfr. som  
hos föreg.; stipl. som hos föreg., 2—4standade; kalken aflångt äggformig, 3kantig. 2  
8, 9. —  $\beta$  *Martianum*: späd, med talrika, långa flageller, glesare, mer krökta bl. —  
 $\gamma$  *pygmaeum*: 2—4 lin. hög, tufvad; bl. otandade: stipl. urnupna. Fig. Ek.f.99;  $\beta$   
f.98. Lindenb.t.18. G.&Rab.78, 87—8, 198, 281, 400—2.

Berg, helst i fjelltr. r. (*Lul. Lpm.* Sähkök; Ångstr.; Kaddepakte: Holmgr. *Herjed.*

Malmagen: Oldb. *Dal.* Idre, på Salfjellet etc.; Transtrand sn, Hem- och Närfjellet; samt Nås sn, berget Knåsen: Liedstr. *Vestml.* Ramshyttan, i Frankhammarsdalen: Sill. *Verm.* *Dalsl.* Hesselskog. *Smål.* Helveteshålan i Lemnhult; Ingaryds dal, samt Skurugata: Scheutz. *Gottl.* vid Tänglingsmyr i Etelhem. — *N.* Trondhj. Finnden vid Dockaelf; Wennfeld och Monken: Ångstr.; Sundalen, vid Storfall: Scheutz. Dovre flerst. Gudbrandsd., Stuelsbroff. Tind och Vestfjorddalen. — *γ Pit. Lpm.* Kåksa. — *N.* Trondhj., på Monken.) *Mycket smalare än föreg., omkr.  $\frac{1}{2}$  lin. bred, ehuru ofta 2—3 tum lång; färgen gulgrön ell. brunaktig; ofta med talrika flageller. Knappt funnen med fr. i Skand. — Herpetium N. v. Es. Jungerm. tri-crenata Wg.  $\beta$  J. deflexa Mart.  $\gamma$  J. cyrtophylla Ångstr.*

140. *PHYSOTIUM N. v. Es.*

- \*1 *P. cochleariforme N. v. Es.* stj. utdragen, uppstigande, n. enkel, utan rottrådar, (med bladen) n. trind ell. längs öfre sidan starkt konvex; bladen tegellagda nedböjda, deras öfre slik större, konvex, bredt äggrund, i spetsen 2klufven och sågad, den undre mycket mindre, n. parallel med stj., smalt ell. aflångt äggrund, hel. 2 $\frac{1}{2}$  Fig. Hook.t.68. Ek.f.40.

Tor. st. i fjelltr. r. (*N.* vid Lyse i Stavangers amt, bland *Racomitr. lanuginos.*) *Flere, anda till 6 tum lång, öfver en linie bred, af rödbrun färg; den öfre bladliken tvärmed en ell. par spetsiga små länder nära öfre kantens bas. Frukt okänd. — Jungerm. Hook.*

*Physotium marginatum (L.) Hook.*

5 Flocken *Ptilidiææ*.141. *TRICHOCOLEA Dumort.*

- 1 *T. Tomentella N. v. Es.* stj. 2—3dubb. pargrenig; bladflikarne och stiplerna n. helt och hållet upplösta i fina hår, liknande ett ludd; det kalklika svepet bägarformigt, tvärhugget, hårigt. 2 $\frac{1}{2}$  5, 6. Fig. Fl.D.2193. Hook.t.36. Ek.f.49. Sill.M.exs.198. G.&Rab.32, 272.

Kärr, våta st., r. (Sk. Skäråli; Fruåli. *Smål.* Älmås i Femsjö; Skäftesfallshåla i Korsberga, samt vid Husqvarna: Scheutz. *ÖG.* V. Ny sn, Belleberg etc. *Södm.* Eskilstuna, nära Hyndevadsskogen: Ekebykärr; Grödinge sn. *Stockh.* vid Sandsjön. *Gestr.* flerst. i Vahlbo och Hille snr. *Helst.* Hemstanäs: R. Hn. *Ner.* Hunnebergs såg nära Brevfvens bruk: C. Hn. *VG.* Halleberg; Göteborg. *Öl.* Rälla. *Gottl.* källan Fattigmannen nedom Thorsborgen. — *N.* enl. Horn.) *Stjelkarne 2—4 tum långa, med de platt utbredda grenarne inberäknade  $\frac{1}{2}$ —1 tum breda, i ofta fotsvida, hvitgröna ell. gulaktiga mattor; bladen delade n. till utseende af ytterst fin och tät spindelväf, ehuru egentligen bestående af 2 större öfre hufvudflikar och 2 mindre derunder. Frukt knappt funnen i Skand. — Jungerm. Ehrh.*

142. *PTILIDIUM N. v. Es.*

- 1 *P. ciliare N. v. Es.* stj. engång ell. dubb. pargrenig; bladen något konvexa, delade nedom midten i en mycket större, 2klufven öfre och en undre, uppåt tilltryckt och 2delad slik, begge hårkantade; stipl. rundade, otydl. 3flikiga, hårkantade; kalken päronlik, glatt. 2 $\frac{1}{2}$  5, 6. —  $\beta$  *ericetorum*: vanl. brun; engång pargrenig, uppstig., något glesbladig. Fig. Fl.D.1714,f.2. Hook.t.65. Ek.f.36. Sill.M.exs.199. G.&Rab. 9, 108, 197.

Sten., stubb. etc. a. (Sk.—Lpl. — *N.*) *Vanl. mindre än föreg., i tuftade mattor af grön ell. oftare brun färg; stjelkarne ofvan längs efter konvexa och släta, under raggiga af de nedböjda bladens talrika kantiår. Var. i hög grad till storlek, färg och växtsätt. Ofta rikligt fruktbärande. — Jungerm. L. Blepharozia Lindb. Jung. pulcherrima Web.  $\beta$  J. Woodsii Hüb.*

6 Flocken *Platyphylleæ*.143. *RADULA N. v. Es.*

- 1 *R. complanata N. v. Es.* stj. platt, krypande, oordentligt pargrenig, rottrådig; bladen tät tegellagda, n. platta, helbräddade; den öfre fliken rundad, 4 gång. större än den

undre, n. qvadratiska, tilltryckta; kalken vigglikt aflång, platt, tvärhuggen; *hanorg. i kalkens närhet.* 24. 6. 7. Fig. Fl.D.1062. Hook.t.81. Ek.f.31. Somf.Cr.exs.34. Thed. M.exs.148. G.&Rab.17, 361.

Trädstamm., sten. a. (Sk.—Lpl. — N.) En ell. 2 tum lång, 1 lin. bred, platt, ljus gulgrön, stund. mörkgrön ell. gulbrun, i tunna intrasslade mattor, hårdt fästade medelst rottrådar och sugårter, som utgå från stjelken och sjelfva bladens undreflik; säll. något uppstigande. Vanl. med talrika kalkar, med knappt 1—2 lin. framskjulande fr.skaf. — Jungerm. L.

2 R. *Lindenbergiana* Goltzsche: stj. och blad som hos föreg., men öfre bladfliken 5—6 gång. större än den undre, qvadratiska. spetsiga; kalken smalt vigglik, platt, tvärhuggen; *hanorg. i egna, uldragna, smalt cylindriska grenar.* 24. 7. Fig.

Sten. i bäck. r. (Sk. Skärali. Smål. Jönköping, ofvan Torpa: Zett. enl. Scheutz. VG. nedanför Hunneberg. Ner. Skogaholm, i en skogsbäck vid Skåle gård: C. Hn.) Ganska lik föreg., men svartaktig ell. mörkgrön; hufvudsakl. skild med sina långa och smala hangrenar.

3 R. *alpestris* Lindb. stj. nedligg.—uppstig., n. pargrenig; bladen tegellagda, konvexa; öfrefliken rundadt äggrund, med något inviken kant, 4—5 gång. större än den undre qvadratiska, spetsiga, vid basen uppsvalda fliken; kalken omv. äggformig, mer ell. mindre platt, tvärhuggen; *hanorg. i spetsen af egna grenar.* 24. 7. Fig. Lunds Univers. Årsskr. 1866.

Fjelltr., på vissn. löf etc. r. (Um. Lpm. Laxfjellet: Ångstr. — N. Dovre, Finnsbøe på vissn. blad af *Salix*-arter: Bergr.; Kongsvold: E. Skari.) Hela mossan mjuk och gul, tuffad, med mest uppstigande stj. och grenar; bladen mer utböjda åt sidorna och undre fliken mer spetsig än hos de föreg.

#### 144. MADOTHECA Dumort.

1 M. *lavigata* Dum. glänsande; stj. pargrenig, tätbladig; bladens stora öfreflik rundadt äggrund, uddspetsig, med tillbakavikna, uddtandade—n. helbräddade kanter; den undre fliken icke nedlöpande, aflång, trubbig ell. uddspetsig, uddtandad, något smalare än de aflånga äggrunda, uddtandade stiplerna. 24. 6—8. Fig. Fl.D.2760. Hook.t.35. Ek.f.44. G.&Rab.53, 259, 373.

Klipp., bokstamm. r. (Sk. Skärali. VG. Hunneberg, ofvan Nygård: Lindb. — N. enl. Horn.) Vanl. 2—3 tum lång; stj. med bladen 1—1½ lin. bred; glänsande och genomskinligt gulbrun. Endast funnen steril. — Jungerm. Schrad. Porella lavig. Lindb.

2 M. *platyphylla* Dum. glanslös; stj. mer och mindre oordentligt pargrenig, tätbladig; bladens stora öfreflik bredt äggrund, rundtrubbig, med något tillbakaviken belbräddad kant; den undre fliken knappt nedlöpande, äggrund, trubbig, med tillbakavikna, helbrädd. kanter, hälften så bred som stipl.; dessa n. qvadr. rundade, med tillbakavikna, n. helbrädd. kanter. 24. 6—8. —  $\beta$  major: gröfre, mer regelbundet pargrenig och tätbladig, med större, mer tätsittande underlikar och stipl., de sednare rundadt äggrunda, med starkt tillbakaviken kant. Fig. Hook.t.40, f.1. Ek.f.24, 1. Somf.Cr.exs.33. G.&Rab.52, 157, 364.  $\beta$  Fl.D.1714, f.1. Hook.t.40, f.5—21 och suppl. t.3 (enl. Lindb.). Ek.f.24, 2—7. G.&Rab.51, 158, 363, 372.

Skugg. klipp., trädst.,  $\beta$  helst kalkberg. (Sk.—Gestr. Gefle. Ängml. Nora sn. Ner. mängenst. Boh. Christinedal. Öl. flerst. enl. Zett. — N. till Nordl. —  $\beta$  VG. Kinnekulle och Halleberg, äfv. m. kalk: Lindb. ÖG. Omberg. Stockh. Gåsberget i Järfalla. Gestr. Gefle, på Pålserberget; samt Öl. Borgholm: R. Hn. Gottl. Thorsborgen; Norrvangaberget; Stora Carlsön. — N. Holmestrand, m. kalk: Cleve enl. Lindb. Kolsås vid Christiania m. kalk: R. Hn.) Stor, 2—4 tum lång, med 1 lin. bred stj., mörkgrön—gulbrun, utan glans och föga genomskinlig, i ofta mycket stora och tätta mattor. Sälls. med honkalk.  $\beta$  stund. något glänsande. — Jungerm. L. Porella platyph. Lindb.  $\beta$  M. platyphylloidea och navicularis ed.9. Por. platyph.  $\beta$  Lindb.

3 M. *revularis* N. v. Es. vanl. glanslös, oordentl. par- ell. klynnegrenig, mer glesbladig; bladens stora öfreflik bredt äggrund, rundtrubbig, n. helbräddad, meränd. med platta kanter; den undre fliken långt nedlöpande, snedt äggrund, spetsig, med tillbakavikna småtandade kanter, smalare än stipl.; dessa äggrunda qvadratiska, med rundadt till-

*bakaviken spets, vid basen hvasstlandade.* 24 6—8. Fig. Fl.D.2815.f.1. G.&Rab. 371, 421, 449.

Fukt. klipp., bergvägg. (Sk. Skärall: Lindb. *Blek. Djupadal: Scheutz. — Helsl. Mo sn, Kasberget; och Dal. Grangårde sn, Norrhyttan. Öl. mellersta del. enl. Zett. — N. Holmestrand: Cleve enl. Lindb. Christiania enl. Ångstr. Nordmarken, mell. Vaggasteen och Tömt: C. Hn. Haukenæs vid Tindsjön: Holmgr.) *Ofta stor som föreg. och i idla mallor af brungrön ell. gulbrun färg utan glans, vanl. klynnegrenig; stund. spådd och mycket glesbladig, samt är då M. Porella ed.9. — Jungerm. Dicks. J. platyph. β dentata Hn. ed.2. Porella dentata Lindb. — Anm. Utg. har så mycket heldre följt Lindbergs föredöme vid indragandet af de i ed.9 under namnen M. navicul., platyphylloidea och Porella upptagna former, som den förstnämnda blifvit der införd på Lindb:s egen auktoritet och länge var utg. obekant, den andra enl. anm. i ed.9 alltid syns utg. misstänkt som art och den tredje ej väl öfverensstämt med säkra ull. ex., ehuru gillad af N. v. Es.**

## 7 Flocken *Jubuleæ*.

### 145. *FRULLANIA Raddi.*

1 *F. dilatata* N. v. Es. stj. pargrenig, krypande; bladen cirkelrunda, helbräddade, af *likformig* cellväf; bladöronen *rundade, hvalftika, större* än stiplerna; dessa *rundade, djupt urnupna, med platta kanter*; kalken *trubbig ell. i spetsen intryckt med kort udd, på ytan knottig.* 24 5—9. Fig. Fl.D.1831.f.1. Hook.t.5. Ek.f.18. G.&Rab. 54, 156.

Trädstamm., klipp. a. (Sk.—Lpl. — N.) *Bildar tunna och platta, bruna ell. svartgröna mallor; stjelkarne omkr. tumslånga ell. längre, intrasslade, med talrika grenar, knappt ½ lin. breda. Hanorg. ofta talrika, i kort skafade små gyttirningar af 2radiga blad. — Jungerm. L. J. tamariscifolia Wg.*

2 *F. fragilifolia* Tayl. stj. som hos föreg.; bladen *rundadt omv. åggrunda, helbräddade, med en ell. flere peribandslika rader af celler, större och mörkare färgade än de öfr.; bladöronen bredt aflånga, påslika, af stiplernas bredd; dessa bredt omv. åggrunda, 2flikiga, platta; kalken omv. hjertlik, slät.* 24 5—8. Fig. Fl.D.suppl.t.119.f.1. G.&Rab.170, 200, 226.

Klipp., trädst. r. (Sk. Skärall; Broby sn, vid vägen till Lunnom: Hamnstr. Smål. Ta-berg, samt Klintaberg i Almesåkra: Zett. ÖG. Omberg; Ö. Ryd sn. Södm. Hölö sn. Stockh. mångenst. Gestr. Hille sn, Harfshällarne. Ner. Skåleklint; samt vid Fagerliärn i Hammar sn: C. Hn. Verml. VG. Halle- och Hunneberg. Hall. Varberg; Bårarp. Gottl. Othemsklint. — N. Tistedalen vid Fredrikshall.) *Lik föreg., men mindre och spåddare; föga skiljd från följ. Skand. ex. sterila. — Jungerm. Tayl.*

3 *F. tamarisci* N. v. Es. stj. som hos föreg.; bladen cirkelrunda—rundadt åggrunda, helbräddade, *vanl. af likformiga celler*; bladöronen *aflånga, påslika, smalare* än stipl.; dessa *rundadt kvadratiska, 2flikiga, med tillbakavikna kanter*; kalken *aflång, spetsig, slät.* 24 4—8. Fig. Fl.D.1894 och 2627. Hook.t.6. Ek.f.17. Sill.M.exs.200. G.&Rab.80, 199, 209, 455.

Bergväggar. (Sk.—Lpl. — N.) *Oftast mycket gröfre än de föreg., i stund. ganska stora, mer ell. mindre glänsande bruna ell. svartaktiga, säll. mörkgröna mallor; bladen, särd. de yngre, ofta med en uddlik under bladskifvan inböjd spets; utmärkt af de små och aflånga, med stj. parallela bladöronen. — Jungerm. L.*

### 146. *LEJEUNIA G. & Lindenb.*

1 *L. cavifolia* (Ehrh.) Lindb. stj. oordentligt grenig ell. n. pargrenig, föga rotträdig; bladen *tåtsittande, konvexa, rundade, helbräddade, med en liten inviken, påslik flik eller veck på undre sidan vid basen; stipl. rundade, hvasst urnupna med trubade flikar; kalken omv. åggformig, upptill 5kantig.* 24 5.6. Fig. Fl.D.2006. Wg. Fl.L.t.25. Hook.f.42. Ek.f.2. Somf.Cr.exs.35. G.&Rab.47, 273.

Bergsklyft. (Sk.—Lpl. — N.) *Omkr. tumslång, knappt ½ lin. bred, i ofta stora, alltid mjuka och platta, liftigt ell. ljus gröna mallor med mycket intrasslade stjelkar och grenar; stund. krypande, spridd på ell. bland andra bergmossor. Bla-*



*dens cellväf lös, af stora celler; den undre fliken stund. omärklig. — Jungerm. Ehrh. (jemsf. N. v. Es. Naturgesch. Eur. Leb. p. 263, 5 och Lindb. Rev. crit. Ic. in Fl. D. p. 43). J. serpyllifolia Dicks. Lej. serpyllif. Lib. och ed.9.*

- 2 *L. calcarea* Lib. stj. ytterst kort och fin, oordentligt grenig, rottrådig, *likasom ledad af de åtskilda bladen; dessa åggrunda spetsade, i kanten naggade ell. fintaggiga af framskjutande celler, n. påslit sammanrullade, derigen. något klotlikt utböjda; stipl. endast antydda; kalken på en mycket kort sidogren, omv. åggformig, med 5 naggsågade hvassa kanter.* ☉ 4, 5. Fig. Fl.D.2811, f.2. Hook. suppl. t.3. G. & Rab. 46, 283, 323, 365.

Klipp. på andra mossor, r. (ÖG. Omberg, vid Rödgalvel: Näs och Lemunda; samt Goult. Thorsborg: Holmgr. — N. Trondhj. Gævingåsen och Mostamarken: Ångstr.) *Bekläder som ett fint, gulaktigt ludd andra mossor; stj. 1—2 lin. lång, med bladen hårfin. — Jungerm. hamatifolia β echinata Hook. Lej. echinata Tayl.*

## 8 Flocken *Codonieæ*.

### 147. FOSSOMBRONIA Raddi.

- 1 *F. pusilla* N. v. Es. stj. ganska kort, krypande, rottrådig; bladen tätt sittande, uppåtvända, kvadratiske, 3—5flikiga, veckiga, med helbräddade kanter, af mycket stora celler; kalken i stjelkens spets, klocklik, med vidöppen mynning. 2½ 7—10. Fig. Fl.D.1717, f.2. Hook. t.69. Ek. f.38. Sill. M. exs. 192. G. & Rab. 8, 122, 377.

Öfversv. stränd, diken etc. (Sk.—Helsl. och Dal. Ångml. Hernön; samt Um. Lpm. Lycksele: Ångstr. Pit. Lpm. Arvidsjaur. Öl. Böda park: Zett. — N. till Nordl. Salten.) *Bildar små tuvor af ett par lin. långa stjelkar, med oordentligt flikiga och veckiga blad. Kalken, som n. aldrig saknas, är jemförelsevis stor och utmärkt af sin form. — Jungermannia L.*

## 9 Flocken *Diplomitriæ*.

### 148. MÖRCKIA Goltzsche.

- 1 *M. Blythii* Brockm. stambladet nedtryckt, hinnaktigt, med en nervlik förtjockning längs midten, n. omv. åggrundt, i spetsen intryckt, med vågigt veckade kanter och breda rundade sidoflikar; svepebl. flikiga och veckiga; kalken stor, n. cylindrisk. 2½ 7, 8. Fig. Fl.D.2004. G. & Rab. 63, 336.

Fukt. jord i fjelltr. r. (Pit. Lpm. Tjådtjakk. Um. Lpm. Stuorware; Olsfjellet: Ångstr. Jemll. Snasahögen: Åreskutan; Syltopparne. Herjed. — N. Trondhj. st. Öerest. t. ex. Stördalen: Wennfeld; Kålahögen etc.) *Stambl. omkr. ½ tum långa, 3—4 lin. breda, ljusgröna, fästade med talrika rötter, som utgå från den på undre sidan mörkröda medelnerven; sidoflikarne stora och platta, nervlösa. — Jungerm. Möreck. Diplolæna N. v. Es. Diplomitrium Corda. Thedenia Fr. Pallavicinia Lindb. Blythia Möreckii N. v. Es. och ed.9. Möreckia norvegica Goltzsche.*

- 2 *M. hibernica* Goltzsche β *Flotowiana*: stambl. som hos föreg., jernbredt—åflångt, enkelt ell. klynnegrenigt, i spetsen trubbigt ell. intryckt, med bugtbräddade och vågiga, uppböjda kanter; svepebl. flikiga, med sargtandade flikar; kalken stor, cylindrisk. 2½. Fig. Fl.D.2756, f.1. G. & Rab. 163, 295, 334, 335.

Fukt. sandjord, r. (Goult. vid Gotheimsåns stränder, bland *Bryum*-arter 1865: Lindb.) *Hufvudformen, som ej blifvit funnen i Skand., är 1—4 tum lång, 2—3 lin. bred, ofta gaffellikt grenad; β omkr. ½ tum lång, 2 lin. bred, meränd. enkel, med mer vågiga, uppböjda kanter. Allt enl. utl. ex.; svenska ösedda af utg. — Cordæa Flotowii N. v. Es. Diplolæna Lyellii β Flotowii N. v. Es. Eur. Leberm. och Jens. Cons. Hep. Dan. Pallavicinia hibern. β Lindb.*

## 10 Flocken *Haplolsæneæ*.

### 149. PELLIA Raddi.

- 1 *P. epiphylla* N. v. Es. stambl. nedtryckt, hinnaktigt, med en nervlik, på undre sidan rotsläende förtjockning längs midten, oordentligt deladt i hela ell. urnupna, n. rigg-

lika likar med platta ell. vågiga kanter; svepet (enl. Lindb.) öppet ell. ofullständigt på den åt stambladets spets vända sidan; mössan framskjulande, anhäng, hvit och hinnaktig. 2½ 5, 6. Fig. Dill. t. 74, f. 41. Fl.D. 359. E.B. t. 771. Hook. t. 47, f. 4. Ek. f. 52 och 111 (utom f. 3 till hög.). G. & Rab. 29, 30, 105, 124, 241, 457.

Fukt. jord i skugga, a. (Sk.—Lpl. — N.) Stambl. gylltrade, vanl. 1—2 tum långa, omkr. ¼ tum breda, stund. korta och enkla. Kaps. klotrund, gul, på ofta 3 tums högt skaft. — Jungerm. L. *Pellia endiviaefolia* β *epiphylla* Lindb. — Anm. Sistnämnde förf., som i bref meddelat utg. här lemnade citater af fig. öfver begge arterna, anser *P. calycina* såsom den sydligare, till fruktdelarne bättre utbildade hufvudformen, samt *P. epiphylla* som en mera nordlig var. af samma art, helst som mellanformer skola finnas.

2 *P. calycina* N. v. Es. stambl. som hos föreg., men smalare, med tydligare utbildad nerv, ofvan längs midten med en hvass ränna ell. fåra, deladt i aflångt jemnbreda likar med något uppböjda kanter; svepet (enl. Lindb.) fullständigt (slutet rundtom fr.skaftet), kalklikt; mössan insänkt i svepet. 2½ 5. Fig. Hook. t. 47 (utom f. 4). Ek. f. 111, f. 3t. hög. Sturm Deutschl. Fl. II, h. 19 & 20, t. 16. G. & Rab. 181, 221, 242, 297, 339.

Fukt. jord, r. (Boh. Christinedal, ster.: Thed. Södm. Nyköping, Brandkärrsgrufvor, ster.: Apoth. Malmberg. Uppl. Uppsala m. fr.: Hj. Holmgr. Allt enl. Lindb. Ner. Skogaholm m. fr.: C. Hn. Gestr. Gefle, vid Kungsback och Tolfors enl. fruktex., ford. samlade af förf., Thed. och R. Hn. Trol. mångenst., ehuru förvexlad med föreg.) Stor som föreg., men i allmänhet smalare. — Jungerm. Tayl. *J. endiviaefolia* Dicks. enl. Lindb. *Pellia endiviaef.* Lindb.

#### 150. BLASIA Lin.

1 *B. pusilla* L. stambl. nedtryckt, hinnaktigt, en- ell. flernervigt, i spetsen 2flikigt, på undre sidan fjälligt. 2½ 5, 6. — β *Funckii*: stambl. med flere, fina, ljusa, divergerande nerver. Fig. Fl.D. 45 och 2252. Hook. t. 82—4. Ek. f. 98; 114. Thed. M. exs. 133. G. & Rab. 28, 165, 222, 263, 419.

Fukt. ler- och sandjord. (Lpl.—Sk. — N.) Ung blågrön, samlad i stjernlika tumsvida plattlar af vigglika stamblad, ofta med smalt flasklika små groddknoppsgömmen på öfre sidan mot spetsen, samt andra rundade gyttningar af små runda korn på de tunna delarne af stambladets öfre sida; äldre mer spridd och utdragen, gul- ell. brunaktig; bär då först frukt och bortdör sedan. Kaps. på 1—1½ tums långt skaft, aflång; frukt sällsynt, men då den finnes, otroligt ymnig. — Jungerm. *Blasia* Hook. *J. biloba* Sw. *Blasia Hookeri* Corda (den frukt-bär., groft ennerviga). β *Bl. Funckii* Corda (utvecklar ej fullständig frukt).

#### 11 Flocken *Aneureæ*.

##### 151. ANEURA Dumort.

† Stambl. utan allt spår till medelnerv.

1 *A. pinguis* Dum. stambl. platt, nedtryckt, köttigt, oljeglansande, från hela undre sidan rotsläende, jemnbredt och odeladt, ell. aflångt, oordentligt förgrenadt och flikigt, i kanten vågigt; mössan uppstigande från bladets kant, lång, cylindrisk, köttig, finhårig. 2½ 4—6. Fig. Fl.D. 1428. Hook. t. 46. Ek. f. 51; 110. G. & Rab. 41, 103, 436—7. Bäckstrand., kärr etc. (Sk.—Gestr. och Dal. Herjed. nedom Funnesdalsberget. Jemll. Snasabögen. Pit. Lpm. Arvidsjaur; Tjridjakk. Torn. Lpm. Wittangi. Ö. Vickteby; Lindb. Goull. Koppervik. — N.) Stambl. grönt, ½—2 tum långt ell. längre, 2—4 lin. bredt, med 1—2 lin. breda flikar, då sådana finnas; mössan ½ tum lång; kaps. aflång, brun. — Jungerm. L.

2 *A. pinnatifida* N. v. Es. stambl. nedtryckt, platt ell. svagt rännformigt, söga köttigt, glänsande, endast vid basen rotsläende, oregelbundet pargrenigt, med vanl. mot spetsen bredare likar, stund. odeladt tandadt; mössan som hos föreg., men tunn, glatt och slät. 2½ 5, 6. Fig. Fl.D. 2628. Hüb. Deutsch. Leberm. exs. h. 5, n. o 106. G. & Rab. 42, 104.

Fukt. st., kärr, r. (Sk. Röstånga: Lindb. Södm. Eskilstuna enl. ex., ford. samlade af förf. Stockh. Stadshagen m. fl. st.: Lindb. Ångm. Ökmyran i Reese: Frist. enl.

Lindb. *Dal.* Grycksbo: Lindb. *Ner.* Örebro, i Markkärret: C. Hn. Trol. mångenst., ehuru förvexlad med *A. multif.*) *Stambl.*  $\frac{1}{2}$ —1 tum långt ell. längre,  $\frac{1}{2}$ —1 lin. bredt, med längre och kortare grenar omväxlande, och ofta alla utgående från ena kanten, glänsande grönt och af mindre fast bygnad än hos *A. multif.*, som denna art liknar till de talrika grenarne, ehuru väl skiljd med mössan och den fullkomliga bristen på nerv; mössan ljusgrön. — *Jung. sinuata* Dicks. *Aneura multif.*  $\beta$  Dum. *A. sinuata* Hüb.

- 3 *A. palmata* N. v. *Es.* *stambl.* nedliggande, platt, glest rotsläende, pargrenigt, med uppstigande ell. upprätta, vanl. i korta, jemnbreda och jemnhöga stikar handlikt delade grenar; mössan från grenarnes kant, klubbformig, köttig, lätt knottig af små vårtor.  $2\frac{1}{2}$  5—7. Fig. Fl.D.2815, f.2. Ek.f.115. G.&Rab.101—2, 201—3.

Murken ved i kärr etc. (Sk.—Lpl. — N.) Mörkgrön, utmärkt af de lätt gytttrade, n. upprätta, 2—3 lin. höga sidogrenarne, med deras 1—2 lin. långa, knäppt  $\frac{1}{2}$  lin. breda stikar; mössan 1 god lin. lång, grön, slutt. n. hvit. — *Jungerm. H. J. multifida*  $\beta$  Hook.

†† *Pseudoneura* Gottsche. Stambladet med antydning till nerv.

- 4 *A. multifida* Dum. *stambl.* nedliggande—upprätt, på begge sidor konvext. söga rot-trådigt, teml. regelbundet dubbelt pargrenigt; mössan från hufvudflikarnes kant, smalt klubblik, köttig, lätt knottig.  $2\frac{1}{2}$  5—7. Fig. Fl.D.1944. Hook.t.45. Ek.f.50. G.&Rab.43, 463.

Fukt. st., vid källor etc. (Sk.—Helsl. Hemstanäs: R. Hn. och *Ner.* Skåleklints bäckdalar m. fl. st.: C. Hn. — N.) Nedtryckt, mattlik, ell. på gräsbevuxna ställen upprätt, tuffad, vanl. brun,  $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$  tum hög, med mycket smal hufvudstam och n. tråd-fina stikar; hufvudgrenarnes stikar aflagande i storlek uppdå; mössan gulaktigt grön,  $1\frac{1}{2}$ —2 lin. lång, sdrd. upptill starkt vårtfull. Den hos oss vanligaste formen är  $\beta$  *ambrosioides* N. v. *Es.* — *Jungerm. L. J. palmata*  $\beta$  Wg.Fl.Su.

## 12 Flocken Metzgerieae.

### 152. METZGERIA Raddi.

- 1 *M. furcata* N. v. *Es.* *stambl.* platt, n. trådsamt, jemnbredt, ennervigt, klynnedeladt, med mot spetsen något bredare, trubbiga ell. intryckta stikar, glatt ell. med fina hår längs kanterna och nerven; mössan från nervens undre sida, klubblik, köttig och taggig.  $2\frac{1}{2}$  4—6. Fig. Fl.D.1832. Hook.t.55, 56. Ek.f.1. G.&Rab.31, 119—20, 179, 274, 357.

Bergsklyft., sten., trädstamm. (Sk.—Lpl. — N.) Löst sammantrasslad i höggröna ell. gula mattor; *stambl.* 1—1 $\frac{1}{2}$  tum långt,  $\frac{1}{2}$  lin. bredt, stik. ungefär lika breda; cellväfven ganska regelbunden, af stora ösidiga celler. — *Jungerm. L.*

- \*2 *M. pubescens* Rad. *stambladet* öfverallt finludet; dess stikar vanl. mot spetsen något afsmalnande, trubbiga; för öfr. som föreg.  $2\frac{1}{2}$ . Fig. Hook.t.73. Ek.f.19. G.&Rab.84.

Bergsklyft. r. (N. Trondhjem, på Dalhjerget i Mostamarken. Dovre, vid Kongsvold, Sprenbäcken m. fl. st. Gudbrandsd., Ringebøe vid Stuelsbro. Tellemarken, vid Tind-sjön; Rollaug i Vestfjorddalen.) Till storlek och förgrening lik föreg., men ofta något bredare, alltid mer gulgrön med vågiga kanter; cellerna mindre än hos föreg. Knäppt funnen med frukt. — *Jungerm. Schrank.*

## B. — MARCHANTIAEÆ.

## 13 Flocken Jecorarieae.

### 153. MARCHANTIA Lin.

- 1 *M. polymorpha* L. *stambl.* i spetsen 2flikigt ell. klynnedeladt, längs kanterna oordentligt kortflikigt; fruktlästets strålar 8—12, i början nedåt hopbøjda, slutt. platt utstående, trinda; hanorganernas fästen på egna stamblad, kortare skaftade, rundade, grundt mångflikiga.  $2\frac{1}{2}$  6—8. Fig. Fl.D.1427. Thed.M.exs.132. G.&Rab.6, 142.

Jord, helst fukt. st., a. (Sk.—Lpl. — N.) Stambladen styfva, 1—flere tum långa,  $\frac{1}{2}$ —1 tum breda, förenade i ofta stora nedtryckta mallor ell. i kärr n. uppräta, luftvade, ofvan gröna, tecknade med små rhombiska rutor, hvarochen med en por i midten. Var. i hög grad. Både sterila och fertila stambl. bära vanl. på öfre sidan oskaftade, skålformiga groddknoppgömmen.

## 154. FEGATELLA Raddi.

- 1 *F. conica* Rad. stambl. i spetsen 2flikigt, med rundade ell. intryckta flikar, längs kanterna ojemmt småflikigt; fruktfästet äggformigt kägellikt, n. helbräddadt, med 4—8 rum ell. svepen; hanorganernas fästen på egna stambl., oskaftade. 2 4, 5. Fig. Fl.D.274; 2629. G.&Rab.4, 299, 329.

Skugg. bäckstrand. r. (Sk.—Gestr. Gefle, vid Tolffors- och Kungsbäckarne. Ner. Skogaholm; Sköllesta sn; samt Garphyttan: C. Hn. Vestml. Vesterås. Herjed. Funneådsberget. Pit. Lpm. Tjadjakk. Lul. Lpm. Qvikkjokk flerst.: Holmgr. Goull. Lilla Carlson: Oldb. — N. Laurvig. Christiania, Gräsenås; samt Gudbrandsd., Stuelsbron: Scheutz. Dovre. Bergen st., mångenst. Nordl. Salten. Finnm., Flöjel-fjeld vid Tromsø: Holmgr.) Stor som föreg., nedliggande, men mjukare, ofvan tecknad med stora, sexsidiga rutor, hvarochen med en por i midten. — *Marchantia* L. *Conocephalus* Neck. *Cynocephalus* Lindb.

## 155. PREISSIA N. v. Es.

- 1 *P. commutata* N. v. Es. stambl. n. omv. hjertlikt; fruktfästet halfklotformigt—konvext ell. n. platt, rundadt sköldlikt, i kanten 4—5bugtigt; hanorgs fästen på samma stambl., kortare skaftade, cirkelrunda, tunna, bugtbräddade. 2 6—8. Fig. Sill.M. exs.186. G.&Rab.5, 125, 141, 330.

Fukt. st., strand, etc. (Lpl.—Sk. Öl. flerst.: Lindb. och Zett. Goull. — N. Finnm. Magerö: N. Lund.—söd. del.) Stambl.  $\frac{1}{2}$ —1 tum långt, på midten tjockast, ofvan liftigt grönt, med fina divergerande nervlika ränder och låtsittande porer, under grönt och längs midten rödbrunt ell. på hela undersidan högrött; fr.skaftet ofta 2 tum högt; fr.fästet skul. rödbrunt med spår till 4 upphöjda strålar från medelpunkten. — *March. hemisphaerica* Wg. och trol. L. *M. quadrata* Web.

## 156. FIMBRIARIA N. v. Es.

- 1 *F. gracilis* (Web.) Lindb. stambl. omv. äggrundt ell. vigglikt—jembredt, utan sido-flikar, i spetsen grundt 2flikigt; fruktskaftet brunt, n. glatt, spensligt, i öfre spetsen utan nedhängande hårlika fjäll; fruktfästet litet, helft klotrundt, hysande vanl. 4, aflångt äggformiga, på undre sidan långt utskjutande kalkar, klufna i omkr. 8, hinnaktiga, hvita, smala, i början med spetsarne hophängande flikar; hanorg. på samma stambl. 2 5, 6. Fig. Somf.Cr.exs.41. G.&Rab.161.

Jord i bergspring. r. (Lpl.—Uppl. Uppsala, Gottsundabergen. Stockh. flerst. ÖG. Marmorbruket: Mosen. Ner. Ullaviklint: C. Hn. Verm. Christinehamn, nära Marieberg: Åsberget i Fryksdalen. Dalsl. Boh. Goull. Thorsbotgen. — N.) Stambl. 2—6 lin. långa, läderartade, ofvan gröna, rännformiga, i kanten och på den konvexa undersidan mörkröda och fjälliga; fr.skaften skul. nära tumshöga; fr.fästet vanl. grönt, föga mer än 1 lin. i diam. — *Marchantia* Web. *M. pilosa* Wg.F.L. *M. tenella* Myr. *Fimbr. pilosa* Tayl. och ed.9.

- \*2 *F. Lindenbergiana* Corda: stambl. aflångt, i kanterna vågigt och småflikigt, i spetsen helt ell. 2flikigt; fruktskaftet mörkbrunt, hårigt (af långa, smala fjäll), kort och tjockt, vid öfre spetsen omgifvet af nedhäng. hårlika fjäll; fr.fästet teml. stort, konvext, med vanl. 4. äggformiga kalkar, klufna i omkr. 16, n. violetta, långt utskjutande flikar; för öfr. som föreg. 2 7, 8. Fig. G.&Rab.369.

Jord i fjelltr. r. (N. Finnm. på Tromsdalstind 1851: C. Hn.) Stambladen något större, särd. bredare, än hos föreg.,  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  tum långa, omkr. 3 lin. breda, mot kanten tunna och hinnaktiga, rödbruna, på undersidan kölade af nerven och med fjäll, som icke nå fram till kanten; fr.skaften  $\frac{1}{2}$  tum höga; fr.fästet dubb. vidare än hos föreg., brungrönt. I de föreg. edd. origtigt hänförd till *Reboulia hemisph.*; först i sednare ären af Lindb. igenkänd såsom hörande hit. Begge arterna i detta släkte utmärkte från öfr. nordiska *Marchantiaceæ* på de långt framhångande smala kalkflikarne.

## 157. DUVALIA N. v. Es.

- 1 *D. pilosa* (Horn.) Lindb. stambl. smalt, i spetsen 2flikigt ell. oordentligt klynne-  
deladt, med vidgade urnupnaflikar, tunn hinnaktig kant; fr.skaftet rödbrunt, spensligt,  
hårigt af smala fjäll, i öfre spetsen omgifvet af nedhängande, hårflina, hvita fjäll; fr-  
fästet litet, halft klotrundt, n. slätt, med 3 ell. 4 gula frukter; hanorg. på samma  
stambl. 2½ 5—7. Fig. Fl.D.1426 enl. Lindb.

Jord i klippspring., helst i fjelltr. r. (Torn. Lpm. Kurawaara: Ad. Afzelii herb. enl.  
Lindb. Öl. på Alvarer öfvan Resmo by 1865: Lindb. — N. Finnm. Sluttfeld vid  
Lyngseidet; Lyngenbotten; samt Berdofoss i Malangerdalen enl. Lindb. Trondhj. st.,  
Tyedalsfjeldene i Stuedalen: Hornem. Dovre, flerst. kring Drivstuen och Kongsvold:  
C. & R. Hn.) Stambl. omkring ½ ell. ¾ tum långt, 1 lin. bredt, grönt, öfvan något  
rännformigt, på undersidan köladt konvext, fjälligt, fjällen dock icke nående fram  
till de tunna kanterna; fr.skaftet ½—1½ tum högt; fr.fästet rödbrunt, grönprickigt.  
Länge förblandad med *Fimbr. gracilis* och till en del utgörande den tröl. genom  
hopblandning af flere arter uppkomna *Reboulia fasciata* N. v. Es. och ed.9; först  
af Lindb. urskiljd såsom Hornemanns rätta *March. pilosa*. — *Duv. borealis*  
Lindb.

## 158. REBOULIA Raddi.

- 1 *R. hemisphærica* Rad. stambl. läderartadt, omv. hjertlikt ell. vigglikt, i spetsen ur-  
nupet; fr.skaftet ljusbrunt, med spridda hårlika fjäll på ytan, i öfre ändan omgifvet  
af nedhäng., hvita, hårlika fjäll; fr.fästet halft klotrundt, med någotflikad kant, starkt  
vårtigt; hanorg. dels på samma, dels på egna stambl. 2½ 5—7. Fig. Fl.D.2067  
[*March. androgyna*] och 2630. G.&Rab.44.

Jord, klippspr. etc. r. (Sk. Käslinge och Lackalänge. Hall. Dalsl. ön Henriksholm i  
sjön Animmen. Smål. Årssets kalkbrott: Scheutz. Lul. Lpm. enl. ex. ford. lemnade  
af Læst. ell. Wg. Öl. Röstlösa, Resmo och Karlevi: Lindb.; Köpings och Horns  
branter, samt Ottenby: Zett. Götth. Thorsborg: Slite, på ön Asunden; St. Carlsons  
etc. — N. Bergen st., Leirdalsören, vid Sausund.) Stambl. 2—5 lin. långa, likt ny-  
skott alstrade det ena ur det andra, fasta och torra, öfvan gröna, ofta ränn-  
formiga, under röda, med fjäll som ej sträcka sig fram till kanten; fr.skaftet  
stult. tumslångt; fr.fästet omkr. 2 lin. i diam. — *Marchantia* L. *M. pilosa* Wg.  
Fl.Su.ed.2. *M. barbata* Ahnf. *Asterella hemisph.* PB.

## 159. SAUTERIA N. v. Es.

- 1 *S. alpina* N. v. Es. stambl. tunnt och platt, i spetsen urnupet, med undersidans fjäll  
icke nående till kanten; fruktskaftets öfre ända omgifven af korta, af svepena dolda,  
derigenom knappt märkbara, nedhäng. fjäll; hanorg. på samma stambl. 2½ 7,8.  
Fig. N.Act.Ac.Leop.ces.XVII,t.67,t.22, 23, 25—8. G.&Rab.67.

Jord på ell. vid klipp. i fjelltr. r. (Lul. Lpm. kring Qvikkjokk allm.: Holmgr. Pil.  
Lpm. Käksa; Walläwe; Tjiddjakk. Jemt. Snasahögen, vid Handölsforsen. Herjed.  
Åxhögen; Stora Midtåkläppen; Ramansberget: Oldb. — N. Finnm. Tromsdaistind:  
C. Hn; Aglappen i Maalselvdalen: Holmgr. Nordl. Salten, på Soelvägtind. Dovre,  
flerst. kring Drivstuen och Kongsvold.) Stambl. 2—6 lin. långa och n. lika breda,  
ljus- ell. blågröna, äldre med talrika lufthålor, rundadt flikiga, ofta vågiga i  
kanterna; fr.skaftet vanl. nära stambladets spets ell. kant, färglöst ell. genomskint.  
hvitgult, spensligt, längsefter föradt, stult. tumshögt; frukterna svartbruna. Af de  
flesta förf. och äfven i föreg. edd. hopblandad; och förverlad med *Clevea hyal.*,  
med hvilken den ofta, ätm. på Dovre, växer blandad och som den vid flygtigt  
påseende ej är så olik; begge arterna först klart utredda af Lindb. i *M. nori* Scand.

## 14 Flocken Lunulariaceæ.

## 160. CLEVEA Lindb.

- 1 *C. hyalina* Lindb. stambl. tjockt, med tunna kanter, rännformigt, i spetsen af-  
rundadt, med undersidan fjällig ända ut i kanten; fruktskaftets öfre spets om-  
gifven af talrika, långt nedhängande, hårlika hvita fjäll; hanorg. på egna stambl.  
2½ 5—8. Fig. G.&Rab.347.

Jord, helst i fjelltr. r. (*Öl.* mångenst. på Alvaret, t. ex. ofvan Karlevi, Vickieby och Resmo; samt *Gottl.* Östergarnsberget: Lindb.; Boge och Slite snr: Cleve enl. Lindb.; Lergrofs hämn i Rute sn: C. Hn. — *N.* Nordl. i Saltålen: Somf.; Soelvägtind 1837 enl. ex. af Ångstr. Dovre, mångenst. vid Drivstuen, Vårstien och Kongsvold: C. & R. Hn.) *Stambl.* 2—6 lin. långa, 2—3 lin. breda, blekgörna, slutt. bruna, på midten förädjupade, med knappt vågiga kanter; frskafset till färgen som hos *Sauteria*, meränd. från stambladets midt, tjockt och trindt, omkr.  $\frac{1}{2}$  tum högt; frukt. svart-bruna. — *March.* hyalina Somf. *M. cruciata* Somf. *Sauteria alp.* Auctt. och ed. 9 (till en del). *S. suecica* Lindb. *S. seriala* Lindb.

## C. — ANTHOCEROTACEÆ.

15 Flocken *Anthocerotese*.

## 161. ANTHOCEROS Mich., Lin.

1 *A. punctatus* L. stambl. n. cirkelrundt, på midten uppsväldt, oordentligt deladt i större och mindre, krusigaflikar, på ytan vårtprickigt; sporerne svartbruna, finktaggiga. ☉ 8—10. Fig. Fl.D.396; 2631. G.&Rab.298, 327, 405.

Lerjord, åkr., r. (*Sk.—Helst.* Hemstanäs i Skog sn: Alfta sn, kring kyrkbyn: Oldb. Ner. Örebrotrakten. *Verm.* vid sjön Fryken, nära Örvik: Wg. Hall. mell. Varberg och Lindhof: Scheutz. — *N.*) *Stambl.* af 3—6 lin. diam., nervlösa, ljusgröna, torra svartnande; undre sidans midt med gråaktigt rolludd; de nällika, halftumshöga frukterna nära stikarnes spets, stund. parvisa.

2 *A. lævis* L. stambl. som hos föreg., platt, deladt i vigglika ell. omv. äggrunda, strålv. ordnade, olikstora, något vågigaflikar, på ytan slätt; sporerne gula, finknollriga. ☉ 8—10. Fig. Fl.D.1833. G.&Rab.64, 462.

Lerjord, åkr., r. (*Blek. Smål.* Femsjö. *VG.* Allt enl. äldre uppgifter; synes knappt på många decennier vara funnen i Sv., ehuru i Danm. mer allm. än föreg.) *Stambl.* vanl. större än hos föreg., ofta 1 tum i diam., af mörkare grön färg, köttiga, i torrt tillstånd tunna; frukterna något längre än hos föreg., vanl. iatrika på sammaflik.

## D. — RICCIACEÆ.

16 Flocken *Ricciæ*.

## 162. RICCIA Mich., Lin.

† *Stambl.* rundade ell. vigglika. Kapseln under stambladets öfre yta och slutt. framträngande genom denna ell. blottad genom ytans sönderbristande.

\* *Lichenoides* Bisch. *Stambl.* äta [utan luftbålor], punkterade.

1 *R. glauca* L. stambl. nedtryckt, på begge sidor blågröna, glatta [utan fjäll på undersidan ell. borster i kanten], klynne- ell. gaffelgreniga, med platta ell. grundt rännformigaflikar, platta och tunna kanter; frukterna i rader ell. gytrade. ☉ 8—11. —  $\beta$  minima: högrön, med plattaflikar. Fig. Fl.D.898, f.1. Lindenb. Mon. Ricc. t.19. Thed. M. exs. 150. G.&Rab.337, 410.

Vallar, diken, åkr., på lerjord. (*Sk.—Helst.* Ner. och *Verm.* Carlstad: Kindb. — *N.* Christianiaskrakten.) *Stambladet* i fullt utbildadt tillstånd n. cirkelrundt ell. halfrundt, 3—6 lin. i diam., djupt strålv. deladt i vigglika ell. omv. hjertlika hufvudflikar; ofta utvecklas blott enstaka dylikaflikar, växande spridda i hvarandras närhet. Var. mycket till stikarnes längd och bredd.

2 *R. sorocarpa* Bisch. stambl. som hos föreg., med smala jemnbreda, längs midten smalt och hvasst rännformigaflikar, platta, icke förtjockade kanter; frukterna gytrade. ☉ 8—10. Fig. Nov. Act. Ac. Leop. cæs. XVII, t.71, f.11. Hüb. Deutschl. Leb. V. 102.

Bergspring. r. (*Stockh.* Gåsberget i Järfälla sn, sunnen i Jun. 1853 af Lindb.) *Liknar* en liten, smalflikig form af föreg.; mest utmärkt af den smala och hvasa, strecklika såran längs stikarnes midt. Enl. utl. ex.; svenska osedda af utg. — *R. minima* Leers, enl. de flesta förf., ehuru beskrifn. i Leers' Fl. Herborn. synes utg. föga passa in på närt. art.

- 3 *R. bifurca Hoffm.* stambl. nedtryckta, på öfre sidan blågröna, på den undre mörkt bruntviolettera, glatta, klynnedelade med smala spetsadeflikar, bredt och djupt rånnformiga, med starkt uppvikna, tjocka kanter; frukterna gyttade. ☉ 8. Fig. Lindenb. Mon. Ricc. t. 20, f. 1.

Jord, r. (Boh. Oroust, på en backsluttning mot hafvet, omkr.  $\frac{1}{2}$  mil söd. om Svanesundsgård.) Stambl. hos Boh. ex.  $\frac{1}{2}$  tum i diam., med märkbart längre och smalare flikar än hos *R. glauca*; dessa flikar blifva, om de upplattas, trubbiga, men äro genom kanternas uppvikning skenbart spetsiga, ofvan blygrå, under n. svartbröda. Utl. ex., firdom meddelade af N. v. Es., äro smärre och, trol. genom ålder urblekta, mycket ljusare till färgen, särd. på undre sidan.‡

\*\* *Spongodes N. v. Es.* Stambl. ojemna och gropiga af talrika lufthålor.

- 4 *R. crystallina L.* stambl. nedtryckta, tjocka, strålvís delade i omv. hjertlika ell. vigglika, naggade flikar, på begge sidor ljus- ell. gulgröna, gropiga af lufthålor, glatta. ☉ 8, 9. Fig. Lindenb. Mon. Ricc. t. 22, f. 2. G. & Rab. 66, 370.

Fukt. lerjord, r. (Sk. vid Lund. Hall. Hassl. VG. Venerns strand vid Storeberg. Uppl. Uppsala; Vahlö sn i Rosl. Öl. Karlevi alvar: E. V. Ekstrand enl. Zeit.; Horns ladugård.) Då stambl. når sin fulla utveckling, är det n. cirkelrundt, omkr.  $\frac{1}{2}$  tum i diam. och vanl. med 5 hufvudflikar; ofta består dock hela växten af omv. hjertlika blad, liknande löryckta och spridda sådana flikar. Yngre ex. glänsande, likasom daggiga på ytan, äldre djupt gropiga och håliga.

†† *Ricciella Braun.* Stambl. smalt jemnbreda. Kapseln inom undre bladtan och uttömmande sig genom denna.

- 5 *R. fluitans L.* stambl. flytande, utan rottrådar, ell. krypande, rotsläende, alltid smalt jemnbreda, gaffel- ell. klynnegreniga, med smala, jemnbreda flikar, på begge sidor gröna och glatta, med lufthålor och långsgående fina, parallela nerver. ☉ 9, 10. —  $\beta$  *canaliculata*: krypande och rotsläende, gulaktig, mera köttig; flikarne med uppvikna kanter, rånnformiga. Fig. Lindenb. Mon. Ricc. t. 24;  $\beta$  t. 25. G. & Rab. 1, 82;  $\beta$  296, 340. Thed. M. exs. 149.

Stillast. vatt.,  $\beta$  uttorkade damm., stränd. r. (Sk. Smål. vid Ljunga sjö enl. Scheutz; Jönköping: O. Nordst. ÖG. Gusum. Stockh. Nacka; Djurgården. Uppl. Skillesta i Tibble; Uppsala, vid Håga. Dal. Falun. Ner. Örebro: C. Hn; Bysta: Stud. Björkm.; Åskersund: Wahlst. Verml. Carlstad. VG. Tunarp: O. Nordst.; Göteborg. —  $\beta$  Sk. Broby sn, Friggetofsta enl. Hamnstr. Smål. Sommens strand, nära Säby kyrka: Scheutz. VG. Göteborg. Vestml. Vesterås. Uppl. Dalelvens strand vid Elfkarö bruk; Vahlö sn, vid Stummelbosjön.) Stambl. 1—2 tum långa, knappt  $\frac{1}{2}$  lin. breda, hos den flytande formen, som aldrig lär sätta frukt, gröna och vid upplagandet hopfallande. Den kryp. formens flikar gulaktiga, under kölad, rotsläende och, ehuru knappt i Sv., utvecklande frukt; denna form, ell. *R. canaliculata Hoffm.*, anses af Jensen och Lindb. såsom artens hufvudform.

## TILLÄGG.

Pag. 60 efter *B. argenteum* tillägges:

21 b. *B. Funckii* Schwægr. stj. och nyskott som hos föreg., *tjocka och hvitgröna*; bladen starkt konkava, äggrunda—afånga, spetsiga, med platta helbrädd. kanter, vid basen rödaktiga, med *röd, ullöpande* nerv, lös cellväf; kaps. nedböjd, aflångt påronlik, för öfr. som hos föreg. 24. Fig. Br.eur.

Lerjord, r. (Gestr. Gelle, vid Tollfors i Maj 1871: R. Hn.) *Växer gruppvís ell. gles tufvad, med 3—4 lin. höga, tjocka stjelkar och nyskott. Fr.skaften tumshöga med stora frukter. Sv. ex. utan fr., men fullkomligt lika utländska.*

---



## BIHANG,

upptagande arter, hvilkas förekomst hos oss är mycket tveifvelaktig.

### I Fam. BRYACEÆ.

#### + *Musci pleurocarpi.*

#### B. — Ordn. NECKERACEÆ.

5 $\frac{1}{2}$ , Flocken **Cryphæesæ**: bladen allsidigt utstående; kapseln n. oskaftad; mössan koniskt hättelik.

- 1 **CRYPHÆA** Mohr. Stj. pargrenig. Bladen med utdragen, enkel nerv. Det inre peristometsänder hårlika, af ungef. samma längd som de yttre, nedtill förenade medelst en smal hinna. — *C. heteromalla* Mohr: trädmossa, med tegellagda, äggrunda, spetsiga blad; kapslarne n. oskaftade, ensidigt vända. Fig. Br.eur. Fl.D.2618. Rab. Bryoth.684. Skall enl. Gunner vara funnen 1762 i N. Romsdalen, vid Grötten. Växer i Danmark. — *Neckera* H. *Sphagnum arboreum* L. *Cryph. arborea* Lindb.

#### ++ *Musci acrocarpi.*

#### I. M. STEGOCARPI.

#### L. — Ordn. BRYACEÆ.

19 Flocken **Bartramiesæ**.

- 2 **BARTRAMIA subulata** Br. & Sch. sambyggare; bladen tegellagda, raka och styfva, från äggr. bas hastigt syllika, grofsågade, med utlöp. nerv; kaps. på skaft från stjerkens spets, torr n. kubisk, utan peristom. Fig. Br.eur. Uppgifves af Wichura vara funnen 1856 i Lul. Lpm. vid vägen från Puotisjaure till Alkavare; aldrig anmärkt af någon annan. Finnes i Österrikes Alper.

#### Q. — Ordn. POTTIACEÆ.

39 Flocken **Distichiesæ**.

- 3 **EUSTICHIMUM** Br. & Sch. Bladen smalt tunglika, vid basen dubbelvikna. Tvåbyggare. Frukt okänd. — *E. norvegicum* Br. & Sch. växande gruppvis; stj. meränd. enkel,  $\frac{1}{2}$ —1 tum hög, med 2sidigt tegellagda, glänsande blad, trubbad med udd och med i udden upphör. nerv, hvars rygg är vinglikt utstående. Perigonial- och perichætialbladen störst, långt smalspetsiga. Fig. Br.eur. Uppgifven af Desvieux att växa i Norge. Finnes på Island och i Nordamerika. — *Fissidens imbricatus* Desv.

#### R. — Ordn. SELIGERIAACEÆ.

42 $\frac{1}{2}$ , Flocken **Brachyodontesæ**: liknande flocken **Seligeriesæ**, men med hättelik, vid basenflikig mössa.

- 4 **BRACHYODUS** N. & Hornsch. Sambyggare. Kaps. skaftad, upprätt, aflång, med

tunna, genomskinliga, mycket korta och breda tänder. — *B. trichodes* N. & H. mycket liten, gruppvis växande stenmossa; stj. knappt 1 lin. hög; bladen från lancettlik bas syllika, helbräddade, med utlöp. nerv. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.454. Uppgifves i Br.eur. och Schimpers Synopsis, trol. genom misstag, såsom Skandinavisk. Växer i Engl. och Skottl. — *Gymnostomum* WM.

## II. M. CLEISTOCARPI.

### X. — Ordn. PHASCACEÆ.

49½, Flocken **Voitiæse**: storväxta mossor, med bredt lancettlika blad, utlöp. nerv, långt skaftad, jemte skaftet öppnad affallande kapsel, stor ensidig mössa.

5 **VOITIA Hornsch.** Karakt. som Flocken. — *V. nivalis* Hornsch. stj. tumshög, grenig, tufvad; bladen åtskiljda, aflångt lancettlika, spetsade, helbrädd.; fr.skaftet tumshögt; kaps. äggformig, sprötspetsad. Fig. Br.eur. Rab.Bryoth.367. Af Hübener i Muscolog. Germ. uppgifven att växa i Norska fjellen under 66:te breddgraden; men aldrig bekräftad. Finnes i Österrikiska Alperna.

## 3 Fam. HEPATICÆ.

### A. — Ordn. JUNGERMANNIACEÆ.

2 Flocken **Jungermannæse**.

6 **JUNGERMANNIA scutata** WM. af sfd. *Bidentes*. Hela mossan ½ tum lång, blekgrön, med uppstig., enkel ell. knippelikt grenig, rotslående stj.; bladen tegellagda, rundadt äggrunda. n. till midten trubbigt inskurna med spetsigaflikar; stipl. mycket stora, n. af bladens längd, äggrunda, hela. Fig. Hook.t.41. Ek.f.64. G.&Rab.Hep. 218, 354, 466. Af Ångstr. uppgifven för Norge, af Lindgr. för Gångsätra träsk nära Stockh. Växer i Skottl. — *J. stipulacea* Hook.

5 Flocken **Ptilidiæse**.

7 **SENDTNERA Endl.** Svepe på en längre ell. kortare gren, äggformigt ell. klubblikt; kalken 3—6kantig, 4klufven. — *S. Sauteriana* N. v. Es. 2—3 tum lång, brunaktig, n. trind och trådläk fjellmossa; bladen tätt tegellagda, ensidiga, äggrunda, till midten 2klufna, med nedböjda flikar; stipl. n. lika stora som bl. och likt dessa 2klufna, med smal inskärning och syllika, spetsiga flikar. Fig. Hüb.Deutschl.Leberrn.108. G.&Rab. 33, 422. Hübener uppgifver sig hafva funnit denna art i N. på Dovre. Växer i Södra Tysklands Alper. — *Jungerm. Hüb. Schisma Sendtneri* N. v. Es.

7 Flocken **Jubulæse**.

8 **PHRAGMICOMA Dumort.** Kalken n. omv. hjertlik, på ena sidan platt, på den andra kölad. — *P. Mackayi* Dum. lik en gröfre *Frullania*, med rundade helbräddade blad, som vid basen hafva en liten inviken flik; stipl. rundadt omv. hjertlika, med grund och rundad intryckning i spetsen. Fig. Hook.t.53. Ek.f.72. G.&Rab.81, 164, 206. Af Hüb. uppgifven för Kongsberg och Stördalen i Norge. Växer i Skottland. — *Jungerm. Hook.*

9 **FRULLANIA Hutchinsii** N. v. Es. stj. n. pargrenig; bladen äggrunda, spetsiga, glest sågtandade, med en sporrlik flik i nedre kanten; stipl. runda, 2klufna, tandade. Bildar platta, mörkgröna mattor på fukt. klipp. etc. Fig. Hook.t.1. Ek.f.82. G.&Rab.208. Uppgifves af Hüb. i Inledn. till Hepaticol. att växa i Norge. hvilket aldrig bekräftats. Finnes i Skottland. — *Jungerm. Hook.*

10 **LEJEUNIA minutissima** Dum. stj. 1—2 lin. lång, ytterst fin, oordentligt grenig, rottrådig, glesbladig; bladen starkt konvexa, blekgröna, genomskinliga, äggrunda, trubbiga, med otydl. basflik; stipl. rundade, hvass 2klufna; kalken omv. äggformig, vin-

gadt 5kantig, med trång, hel mynning. Fig. Hook.t.52 och suppl.t.3. Ek.f.9. G.& Rab.216, 284. Skall enl. ex., samlade af Hüb. och af Ångstr. meddelade till Lindb., vara funnen i N. på Otteröe i Bergens st. Växer på trädstammar, i barkens sprickor, och finnes i England. — *Jungerm. Sm.*

#### B. — Ordn. MARCHANTIA C E Æ.

14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Flocken **Targioniæ**: Kapseln klotrund, ensam innesluten inom ett 2läppigt svepe i undre kanten af stambladets spets och oregelbundet öppnande sig i spetsen.

11 TARGIONIA *Mich.* Karakt. som Flocken. — *T. hypophylla* L. stambl. små,  $\frac{1}{2}$  tum långa, gyttrode och n. tegellagda, fästade vid marken medelst talrika rottrådar från undersidans medelnerv, omv. äggrunda ell. vigglika, urnupna, helbräddade. Fig. E.B. 287. G.&Rab.3, 376. Fordom funnen i Hall., samt VG. Göteborg, vid Saltkällan. af Ad. Afzelius; men på åtm. 50 år aldrig hos oss återfunnen. Tillhör hufvudsakt. södra Europa. — *T. Michelii* Corda.

# REGISTER

öfver de i Handboken upptagna Mossornas Familjer, Ordningar,  
Flockar, Släkten och Arter, jemte dessas Synonymer.

OBS. Den kursiva minsta stilen utmärker synonymerna.

i

## A.

*Acaulon Floerkeanum* C. Mall. 119.  
*muticum* C. Mall. 119.

*Adelanthus decipiens* Mill. 144.

*Alicularia* Corda. 129.

*compressa* N. v. Es. 129.

*scalaris* C. 129.

*Amblyodon* PB. 49.

*dealbatus* PB. 49.

*Amblystegium* Schimp. 19.

*confervoides* Br. & Sch. 21.

*curvipes* Br. & Sch. 19.

*elodes* Lindb. 3.

*enerve* Br. & Sch. 21.

*filicinum* Lindb. 19.

*finnmarchicum* (Lor.) 20.

*fluviatile* Sch. 20.

*irriguum* Sch. 20.

*Juratzkanum* Sch. 19.

*Kneiffii* Br. & Sch. 9.

*Kochii* Br. & Sch. 19.

*polygamum* Br. eur. 3.

*radicale* Br. & Sch. 20.

*riparium* Br. & Sch. 19.

*Sprucei* Br. & Sch. 21.

*serpens* Br. & Sch. 20.

*subtile* Br. & Sch. 21.

*trichopodium* (Schultz.) 19.

*varium* Lindb. 20.

*Amphidium lapponicum* Sch. 79.

*Mougeotii* Sch. 79.

*Amphoridium* Sch. 79.

*lapponicum* Sch. 79.

*Mougeotii* Sch. 79.

*Anacalypta latifolia* Färnr. 98.

*lanceolata* Röhl. 98.

*Starckeana* Färnr. 98.

*Andreaea* Ehrh. 120.

*alpestris* Sch. 122.

*alpina* Turn. 121.

*alpina* WM. 122.

*Blyttii* Sch. 120.

*crassinervis* Bruch. 121.

*Hartmani* Thed. 121.

*nivalis* Hook. 120.

*obovata* Thed. 121.

*papillosa* Lindb. 122.

*perichæstialis* Zell. 121.

*petrophila* Ehrh. 122.

*Rothii* WM. 121.

*rupestris* H. 122.

*rupestris* Turn. 121.

*sparsifolia* Zett. 122.

*Thedenii* Sch. 121.

ANDREÆACEÆ. 120.

*Andreææ*. 120.

*Aneura* Dum. 151.

*multifida* Dum. 152.

*palmata* N. v. Es. 152.

*pinguis* Dum. 151.

*pinnatifida* N. v. Es. 151.

*sinuata* Hüb. 152.

*Aneureæ*. 151.

*Anodus Donnianus* Br. & Sch. 101.

*Anoetangium* Schwægr. 115.

*cæspitium* Schw. 100.

*ciliatum* H. 80.

*compactum* Schw. 115.

*imberbe* H. & T. 80.

*Anomodon* Hook. & Tayl. 37.

*apiculatus* Br. & Sch. 37.

*attenuatus* Hüb. 37.

*curtipendulus* Hook. 32.

*longifolius* Hn. 37.

*repens* Hüb. 31.

- striatus*  $\beta$  ed. 9. 31.  
*viticulosus* H. & T. 37.  
**Anomobryum** Schimp. 55.  
*concinnum* Lindb. 55.  
*julaceum* Sch. 55.  
**Anthoceros** Mich., L. 155.  
*lævis* L. 155.  
*punctatus* L. 155.  
**ANTHOCEROTACEÆ.** 155.  
**Anthocerotæ.** 155.  
**Antitrichia** Brid. 31.  
*curtipendula* Brid. 31.  
**Aphanorrhagma patens** Lindb. 120.  
*Aplodon* R. Br. 68.  
**ARCHIDIACEÆ.** 117.  
**Archidiæ.** 117.  
**Archidium** Brid. 117.  
*alternifolium* Sch. 117.  
*phascoides* Brid. 117.  
*Arctoa Anderssonii* Wich. 110.  
*fulvella* Br. & Sch. 109.  
*hyperborea* Br. & Sch. 110.  
*Asterella hemisphærica* P.B. 154.  
*Asotum crispum* Hpe. 117.  
*nitidum* Hpe. 118.  
*Atrichum tenellum* Br. & Sch. 45.  
*undulatum* P.B. 45.  
**Aulacomniæ.** 48.  
**Aulacomnium** Schwægr. 48.  
*androgynum* Schw. 48.  
*palustre* Schw. 48.  
*turgidum* Schw. 48.

## B.

- Barbula** H. 88, 90.  
*ambigua* Br. & Sch. 93.  
*brevirostris* Br. & Sch. 93.  
*cylindrica* Tayl. 91.  
*danica* Lge. 88.  
*Drummondii* Mill. 91.  
*icmadophila* Sch. 92.  
*Mülleri* Br. & Sch. 88.  
*papillosa* C. Müll. 89.  
*rigida* Br. & Sch. 93.  
*ruralis*  $\beta$  rupestr. Br. & Sch. 89.  
**Bartramia** H. 47, 158.  
*arcuata* Brid. 46.  
*breviseta* Lindb. 48.  
*calcarea* Br. & Sch. 46.  
*conostoma* Br. & Sch. 47.  
*crispa* Sw. 47.  
*crispa*  $\beta$  Normanni Hgn. 47.  
*fontana* Brid. 46.  
*gracilis* Flörke. 47.  
*Halleriana* H. 47.  
*ithyphylla* Brid. 48.  
*Normanni* (Hgn.) 47.

- norvegica* Lindb. 47.  
*Oederi* Sw. 47.  
*pomiformis* H. 47.  
*pomiformis* Sw. 48.  
*subulata* Br. & Sch. 158.  
**Bartramieæ** 46, 158.  
**Bazzania trilobata** Gray. 146.  
**Blasia** Lin. 151.  
*Funckii* Corda. 151.  
*Hookeri* Corda. 151.  
*pusilla* L. 151.  
**Blepharozia ciliaris** Lindb. 147.  
**Blindia** Br. & Sch. 99.  
*acuta* Br. & Sch. 99.  
*cæspiticia* C. Müll. 100.  
*cirrhalta* C. Müll. 115.  
*crispula* C. Müll. 115.  
**Blindieæ.** 99.  
**Blyttia Mörckii** N. v. Es. 150.  
**Brachyodontæ.** 158.  
**Brachyodus** N. & Hornsch. 158.  
*trichodes* N. & H. 159.  
**Brachythecium** Schimp. 14.  
*albicans* Br. & Sch. 15.  
*campestre* Br. & Sch. 18.  
*cirrhosum* Sch. 15.  
*collinum* Br. & Sch. 16.  
*erythrorrhizon* Sch. 16.  
*glaciale* Br. & Sch. 17.  
*glareosum* Br. & Sch. 15.  
*herjedalicum* Lindb. 14.  
*lætum* Brid. 16.  
*lapponicum* Sch. 29.  
*Mildeanum* Sch. 15.  
*plicatum* Br. & Sch. 15.  
*plumosum* Br. & Sch. 18.  
*populeum* Br. & Sch. 18.  
*reflexum* Br. & Sch. 17.  
*rivulare* Br. & Sch. 17.  
*Rutabulum* Br. & Sch. 17.  
*salebrosus* Br. & Sch. 16.  
*Starckii* Br. & Sch. 17.  
*Thedenii* Br. & Sch. 15.  
*trachypodium* Br. & Sch. 16.  
*turgidum* Hn. 16.  
*velutinum* Br. & Sch. 16.  
**Breutelia** Sch. 46.  
*arcuata* Sch. 46.  
**Bruchia palustris** C. Müll. 118.  
**Bruchieæ.** 117.  
**BRYACEÆ.** 1, 158.  
**BRYACEÆ.** 45, 158.  
**Bryeæ.** 54.  
**Bryum** Dill. 55.  
*aciculare* L. 86.  
*acuminatum* Br. & Sch. 65.  
*alpinum* L. 58.  
*annotinum* H. 63.

*apocarpum* L. 81.  
*apocarpum*  $\beta$  L. 80.  
*arcticum* Br. & Sch. 62.  
*argenteum* L. 59.  
*atropurpureum* Br. & Sch. 58.  
*atropurpureum* ed.9. 59.  
*atropurpureum* Wg. 63.  
*badium* Bruch. 58.  
*bimum* Schreb. 57.  
*boreale* Somsf. 63.  
*Brownii* Br. & Sch. 62.  
*cæspiticium* L. 58.  
*calophyllum* R. Br. 61.  
*capillare* L. 59.  
*carneum* L. 63.  
*Celsii* L. 96.  
*cernuum* Br. & Sch. 60.  
*cinclidioides* Blytt. 54.  
*cirrhatum* Hornsch. 57.  
*concinatum* Spruce. 55.  
*crudum* Schreb. 64.  
*cucullatum* Schreb. 64.  
*cyclophyllum* Br. & Sch. 59.  
*dealbatum* Dicks. 49.  
*demissum* Hook. 55.  
*Duvallii* Volt. 56.  
*elongatum* Dicks. 65.  
*elongat.*  $\beta$  alpin. Br.eur. 64.  
*erythrocarpum* Schwægr. 59.  
*extinctorium* L. 72.  
*filiforme* Dicks. 55.  
*flexuosum* L. 104.  
*fragile* Dicks. 104.  
*Funckii* Schwægr. 157.  
*glaucum* L. 103.  
*Griffithianum* Dicks. 70.  
*hornum* Schreb. 53.  
*hymenophylloides* Hn. 51.  
*hypnoides* L. 87.  
*imberbe* Huds. 91.  
*inclinatum* Bland. 60.  
*incurvum* Huds. 44.  
*intermedium* Brid. 57.  
*Jackii* C. Müll. 56.  
*julaceum* Sm. 55.  
*Klinggræffii* Sch. 58.  
*lacustre* Bland. 60.  
*lanatum* Brid. 60.  
*laterale* Retz. 47.  
*latifolium* Br.eur. 61.  
*ligulatum* Schreb. 52.  
*longicolle* Sw. 64.  
*Ludwigii* Spreng. 63.  
*mamillatum* Lindb. 61.  
*marginatum* Dicks. 53.  
*Marratii* Wils. 61.  
*microstegium* Br. & Sch. 57.  
*Mildeanum* Jur. 58.  
*murale* L. 92.  
*Mühlenbeckii* Br. & Sch. 58.

*nimbigenum* Tayl. 55.  
*norvegicum* Gunn. 47.  
*nudum* Dicks. 67.  
*nulans* Schreb. 64.  
*Oederi* Retz. 47.  
*oeneum* Blytt. 61.  
*pallens* Sw. 56.  
*pallescens* Schleich. 56.  
*pallidum* Schreb. 95.  
*palens* Dicks. 86.  
*pendulum* Sch. 60.  
*polymorphum* ed.9. 65.  
*polyphyllum* Dicks. 80.  
*pseudotriquetrum* Schwægr. 55.  
*pulchellum* H. 63.  
*pulvinatum* L. 81.  
*punctatum* Schreb. 51.  
*purpurascens* Br. & Sch. 62.  
*pyriforme* H. 65.  
*pyriforme* L. 67.  
*recurvatum* Dicks. 100.  
*roseum* Schreb. 55.  
*rurale* L. 88.  
*rutilans* Br.eur. 63.  
*rutilans* C. Müll. 61.  
*Schimperi* C. Müll. 63.  
*Schisti* Oed. 114.  
*Schleicheri* Schwægr. 58.  
*scoparium* L. 105.  
*setaceum* Wulf. 100.  
*spinosum* Volt. 53.  
*squarrosus* L. 49.  
*stellare* Schreb. 54.  
*stellatum* Schreb. 93.  
*subrotundum* Brid. 56.  
*subulatum* L. 90.  
*tetragonum* Dicks. 47.  
*tortuosum* L. 90.  
*trichodes* L. 49.  
*truncatulum* L. 99.  
*turbinatum* H. 57.  
*uliginosum* Br. & Sch. 61.  
*undulatum* L. 45.  
*Wahlenbergii* Sw. 62.  
*warneum* Bland. 60.  
*ventricosum* Dicks. 56.  
*viridissimum* Dicks. 79.  
*viridulum* L. 115.  
*Zierii* Dicks. 54.

# *Buxbaumia* Hall. 41.

*aphylla* L. 41.  
*aphylla*  $\beta$  indus. Wg. 41.  
*aphylla*  $\beta$  virid. Moug. 41.  
*indusiata* Brid. 41.  
*sessilis* Schmid. 41.  
*viridis* Lindb. 41.

# BUXBAUMIACEÆ. 41.

# *Buxbaumieæ*. 41.

## C.

- Cassius concinnatus* Gray. 128.  
*Calypogeja* Rad. 146.  
     *Trichomanis* Corda. 146.  
*Camptothecium* Schimp. 18.  
     *lutescens* Br. & Sch. 18.  
     *nitens* Sch. 18.  
*Campylium* Sull. 2.  
*Campylopus* Brid. 103.  
     *acicularis* Wg. 86.  
     *atrovirens* Not. 103.  
     *brevifolius* Sch. 104.  
     *flexuosus* Brid. 103.  
     *fragilis* Br. & Sch. 104.  
     *longipilus* Brid. 103.  
     *ovalis* Wg. 84.  
     *patens* Wg. 86.  
     *turfaceus* Br. & Sch. 104.  
     *viridis* Sull. & Lesq. 107.  
*Catharinea* Ehrh. 44.  
     *Callibryon* Ehrh. 45.  
     *hercynica* Ehrh. 44.  
     *laevigata* Brid. 44.  
     *tenella* Röhl. 45.  
     *undulata* WM. 44.  
*Catoseopium* Brid. 49.  
     *nigrum* Brid. 49.  
*Ceratodon* Brid. 96.  
     *cylindricus* Färnr. 96.  
     *purpureus* Brid. 96.  
*Ceratodontææ*. 96.  
*Chaetopsis trichophylla* Mill. 142.  
*Chandonanthus julaceus* Lindb. 141.  
     *setiformis* Lindb. 141.  
*Chiloscyphus* Corda. 145.  
     *pallescens* N. v. Es. 145.  
     *polyanthos* C. 145.  
*Cinclidium* Sw. 50.  
     *arcticum* Br. & Sch. 50.  
     *hymenophyllum* Lindb. 51.  
     *stygium* Sw. 50.  
     *subrotundum* Lindb. 50.  
*Cinclidoteæ*. 87.  
*Cinclidotus* Pal. Beauv. 87.  
     *fontinaloides* PB. 87.  
     *minor* Lindb. 88.  
*Cladodium* Schimp. 60.  
*Clasmatodon perpusillus* Lindb. 34.  
*Clevea* Lindb. 155.  
     *hyalina* Lindb. 154.  
*Climacium* WM. 31.  
     *dendroides* WM. 31.  
*Codonieæ*. 150.  
*Conocephalus conicus* Neck. 153.  
*Conomitrium Julianum* Mont. 101.  
*Conostomum* Sw. 47.  
     *boreale* Sw. 47.  
     *tetragonum* Lindb. 47.  
*Cordæa Flotowii* N. v. Es. 150.  
*Coscinodon* Spreng. 80.  
     *cribrosus* Spruce. 80.  
     *pulvinatus* Spreng. 80.  
*Cratoneuron* Sull. 8.  
*Cryphæa* Mohr. 158.  
     *arborea* Lindb. 158.  
     *beteromalla* Mohr. 158.  
*Cryphæææ*. 158.  
*Ctenidium* Sch. 7.  
*Cylicocarpus lapponicus* Lindb. 79.  
     *Mougeotii* Lindb. 79.  
*Cylindrothecieæ*. 30.  
*Cylindrothecium* Sch. 30.  
     *concinnum* Sch. 30.  
     *Montagnei* Br. & Sch. 30.  
*Cynocephalum conicum* Lindb. 153.  
*Cynodontium* Br. & Sch. 112.  
     *Bruntoni* Br. & Sch. 113.  
     *capillaceum* H. 97.  
     *gracilescens* Sch. 113.  
     *inclinatum* H. 97.  
     *longirostre* Schw. 104.  
     *polycarpum* Sch. 113.  
     *Schisti* Lindb. 111.  
     *strumiferum* R. Hn. 113.  
     *Wahlenbergii* (Brid.) 113.  
     *virens* Br. & Sch. 112.

## D.

- Desmatodon* Brid. 93.  
     *cernuus* Br. & Sch. 93.  
     *glacialis* Funck. 94.  
     *latifolius* Brid. 94.  
     *Laureri* Br. & Sch. 93.  
     *nitens* Liebm. 93.  
     *obliquus* Br. & Sch. 93.  
     *systylus* Br. & Sch. 94.  
*Dichelyma* Myr. 39.  
     *capillaceum* Br. & Sch. 39.  
     *capillaceum* Myr. 39.  
     *salcatum* Myr. 39.  
     *pallescens* Br. & Sch. 39.  
     *Suartzii* Lindb. 9.  
*Dichelymeæ*. 39.  
*Dichodontium* Schimp. 112.  
     *pellucidum* Sch. 112.  
     *squarrosus* Sch. 111.  
*Dicraneæ*. 193.  
*Dicranella* Schimp. 110.  
     *cerviculata* Sch. 111.  
     *crispa* Lindb. 111.  
     *crispa* Sch. 111.

- curvata* Sch. 110.  
*Grevilleana* Sch. 111.  
*heteromalla* Sch. 110.  
*rubra* Lindb. 110.  
*rufescens* Sch. 110.  
*Schreberi* Sch. 111.  
*squarrosa* Sch. 111.  
*subulata* Sch. 110.  
*vaginalis* Lindb. 112.  
*Wahlenbergii* Lindb. 113.  
*varia* Sch. 110.
- Dicranodontium** Br. & Sch. 104.  
*longirostre* Br. & Sch. 104.
- Dicranoweisia** *crispula* Milde. 115.  
*cirrhalata* Lindb. 115.
- Dicranum** Hedw. 104.  
*adiantoides* Sw. 102.  
*albicans* Br. & Sch. 107.  
*alpestre* Wg. 114.  
*ambiguum* H. 112.  
*Anderssonii* Sch. 110.  
*arcticum* Sch. 108.  
*Bergeri* Bland. 105.  
*Blyttii* Br. & Sch. 109.  
*Bonjeani* Not. 105.  
*Bruntoni* Sm. 113.  
*cerviculatum* H. 111.  
*congestum* Brid. 106.  
*contortum* Wg. 83.  
*crispum* H. 112.  
*curvatum* H. 110.  
*Drummondii* C. Müll. 104.  
*elatum* Lindb. 104.  
*ellipticum* Turn. 86.  
*elongatum* Schwagr. 106.  
*enerve* Thed. 107.  
*falcatum* H. 109.  
*flagellare* H. 108.  
*flavidum* WM. 111.  
*flexuosum* H. 104.  
*fragillifolium* Lindb. 106.  
*fulvellum* Sm. 109.  
*fulvum* Hook. 108.  
*Funckii* C. Müll. 104.  
*fuscescens* Turn. 106.  
*glaciale* Berggr. 108.  
*glaucum* H. 103.  
*gracilescens* WM. 114.  
*Grevilleanum* Br. & Sch. 111.  
*heteromallum* H. 110.  
*Homanni* Boeck. 113.  
*hyperboreum* C. Müll. 109.  
*incurvum* WM. 102.  
*interruptionum* Brid. 108.  
*labradoricum* C. Müll. 106, 108.  
*latifolium* H. 94.  
*longifolium* H. 108.  
*majus* Turn. 105.  
*montanum* H. 108.  
*Mühlenbeckii* Br. & Sch. 103.
- Mörckii* Fl.D. 109.  
*osmundoides* Sw. 102.  
*palustre* Brid. 105.  
*pellucidum* H. 112.  
*polycarpum* Ehrh. 113.  
*polyselum* Sw. 105.  
*pusillum* H. 111.  
*purpureum* H. 96.  
*rigidulum* Sw. 110.  
*robustum* Bl. 104.  
*rufescens* Turn. 111.  
*Sauteri* Br. & Sch. 107.  
*Schraderi* WM. 105.  
*Schreberi* H. 111.  
*sciuroides* Sw. 31.  
*Scottianum* Turn. 107.  
*scoparium* H. 105.  
*setaceum* Sw. 112.  
*Sphagni* Brid. 106.  
*squarrosus* Schrad. 111.  
*spurium* H. 105.  
*Starckii* WM. 108.  
*strictum* Schleich. 106.  
*strumiferum* Ehrh. 113.  
*subulatum* H. 110.  
*taxifolium* Sw. 102.  
*turfaceum* C. Müll. 104.  
*undulatum* H. 104.  
*varium* H. 110.  
*virens* H. 113.  
*viride* Sch. 107.  
*viridulum* Sm. 102.
- Didymodon** H. 97.  
*amblyphyllus* Zell. 104.  
*Blyttii* Hn. 93.  
*bulbosus* Hn. 98.  
*capillaceus* WM. 97.  
*cylindricus* Br. & Sch. 98.  
*cylindricus* Wg. 96.  
*flexicaulis* Brid. 96.  
*fragilis* Hook. 91.  
*glaucescens* Brid. 95.  
*inclinator* Sw. 97.  
*latifolius* Wg. 94.  
*longirostris* WM. 104.  
*luridus* Hornsch. 97.  
*obscurus* Kaulf. 113.  
*pilifer* Wg. 94.  
*pusillus* H. 96.  
*rigidulus* H. 94.  
*rostratus* Wg. 96.  
*rubellus* Br. & Sch. 97.  
*rufus* Lor. 97.  
*tophaceus* Hn. 94.  
*trifarius* Ahnf. 94.
- Diphyseium** Ehrh. 41.  
*foliosum* Mohr. 41.
- Diplolæna** *Blyttii* N. v. Es. 150.  
*Lyellii* N. v. Es. 150.
- Diplomitriæ.** 150.



- Diplomitrium Blyttii* Corda. 150.  
*Diplophyllum* Lindb. 133.  
*Discelieæ*. 67.  
*Discelium* Brid. 67.  
     nudum Brid. 67.  
*Dissodon* Grev. & Arn. 69.  
     *Froelichianus* Grev. 69.  
     *splachnoides* Grev. 69.  
*Distichieæ*. 96, 158.  
*Distichium* Br. & Sch. 96.  
     *capillaceum* Br. & Sch. 96.  
     *inclinatum* Br. & Sch. 97.  
*Ditrichum caesium* Lindb. 95.  
     *flexicaule* Hpe. 96.  
     *homomallum* Hpe. 96.  
     *pusillum* Timm. 96.  
*Drepanium* Sch. 12.  
*Dryptodon* Brid. 85.  
     *ovatus* Brid. 84.  
     *Schultzii* Brid. 82.  
*Duvalia* N. v. Es. 154.  
     *borealis* Lindb. 154.  
     *pilosa* Lindb. 154.

## E.

- Encalypta* Schreb. 70.  
     *affinis* H. fl. 71.  
     *affinis* Schwægr. 72.  
     *alpina* Sm. 72.  
     *apophysata* N. & Hornsch. 71.  
     *brevicolla* Sch. 71.  
     *ciliata* Hoffm. 71.  
     *commutata* N. & Hornsch. 72.  
     *contorta* Lindb. 70.  
     *extinctoria* Sw. 72.  
     *grandis* Sw. 70.  
     *laciniata* Lindb. 71.  
     *longicolla* var. Br. & Sch. 71.  
     *procera* Bruch. 70.  
     *rhabdocarpa* Schwægr. 71.  
     *streptocarpa* H. 70.  
     *vulgaris* H. 71.  
*Encalypteæ*. 70.  
*Entosthodon* Schwægr. 66.  
*Ephemereæ*. 119.  
*Ephemerella* C. Müll. 119.  
     *recurvifolia* Sch. 119.  
*Ephemerum* Hpe. 120.  
     *pachycarpum* Hpe. 119.  
     *patens* Hpe. 120.  
     *serratum* Hpe. 120.  
*Eremodon sphlachnoides* Brid. 70.  
     *Wormskjoldii* Brid. 68.  
*Eucladium* Br. & Sch. 97.  
     *verticillatum* Br. & Sch. 97.  
*Eugrimmia*. 81.

- Eurhynchieæ*. 24.  
*Eurhynchium* Schimp. 25.  
     *crassinervium* Sch. 26.  
     *diversifolium* Br. & Sch. 28.  
     *myosuroides* Sch. Syn. 29.  
     *piliferum* Br. & Sch. 26.  
     *prælongum* Br. & Sch. 25.  
     *prælong. & abbreviat.* Br. & Sch. 26.  
     *Schleicheri* Lor. 26.  
     *Stokesii* Br. & Sch. 26.  
     *striatulum* Br. & Sch. 27.  
     *striatum* Sch. 27.  
     *strigosum* Br. & Sch. 27.  
     *Teesdalii* Lindb. 25.  
     *Vaucheri* Br. & Sch. 26.  
     *velutinoides* Br. & Sch. 27.  
*Eustichium* Br. & Sch. 158.  
     *norvegicum* Br. & Sch. 158.  
*Euweisia* Sch. 115.

## F.

- FABRONIACEÆ**. 33.  
*Fegatella* Rad. 153.  
     *conica* Rad. 153.  
*Fimbriaria* N. v. Es. 153.  
     *gracilis* Lindb. 153.  
     *Lindenbergiana* Corda. 153.  
     *pilosa* Tayl. 153.  
*Fissidens* Hedw. 101.  
     *adiantoides* H. 101.  
     *Bloxami* Wils. 103.  
     *bryoides* H. 102.  
     *deciplens* Not. 102.  
     *exilis* H. 103.  
     *imbricatus* Desv. 158.  
     *incurvus* Schwægr. 102.  
     *osmundoides* H. 102.  
     *pusillus* Wils. 102.  
     *rupestris* Wils. 102.  
     *taxifolius* H. 102.  
     *viridulus* Wg. 102.  
**FISSIDENTACEÆ**. 101.  
*Fissidentææ*. 101.  
**FONTINALACEÆ**. 39.  
*Fontinaleæ*. 40.  
*Fontinalis* L. 40.  
     *antipyretica* L. 40.  
     *antipyr. β minor* Wg. 40.  
     *capillacea* L. 39.  
     *capillacea* Dicks. 39.  
     *dalecarlica* Br. & Sch. 40.  
     *dichelymoides* Lindb. 40.  
     *falcata* H. 39.  
     *gracilis* Lindb. 40.  
     *hypnoides* Hn. 40.  
     *Juliana* Savi. 101.

*pennata* L. 32.  
*squamosa* L. 40.  
**Fossombronina** Rad. 150.  
*pusilla* N. v. Es. 150.  
**Frullania** Rad. 149, 159.  
*dilatata* N. v. Es. 149.  
*fragilifolia* Tayl. 149.  
*Hutchinsiae* N. v. Es. 159.  
*Tamarisci* N. v. Es. 149.  
**Funaria** Schreb. 66.  
*Ahnfeltii* (Fr.) 66.  
*calcareo* Wg. 66.  
*fascicularis* Sch. 66.  
*hibernica* Hook. 66.  
*hygrometrica* Sibth. 66.  
*mediterranea* Lindb. 66.  
*Mühlenbergii* Br. eur. 66.  
*Mühlenbergii* ed. 7. 66.  
*obtusata* Lindb. 66.  
**FUNARIACEÆ** 66.

## G.

*Gasterogrimmia* Br. & Sch. 81.  
**Geocalyceæ** 145.  
*Geocalyx* N. v. Es. 145.  
*graveolens* N. v. Es. 145.  
**GEORGIACEÆ** 41.  
*Georgia Brownii* C. Müll. 42.  
*Mnemosynum* Ehrh. 42.  
*pellucida* Rab. 80.  
**Grimmia** Ehrh. 80.  
*alpestris* Schleich. 85.  
*anodon* Br. & Sch. 81.  
*apiculata* Hornsch. 81.  
*apocarpa* H. 81.  
*aquatilis* C. Müll. 86.  
*arcuata* Not. 86.  
*atrata* Miellichh. 85.  
*commutata* Hub. 84.  
*conferta* Funck. 81.  
*contorta* Sch. 83.  
*cribrosa* H. 80.  
*decipiens* Lindb. 82.  
*Donniana* Sm. 83.  
*elatio* Br. & Sch. 82.  
*elongata* Kaulf. 84.  
*funalis* Br. eur. 82.  
*funalis* Sch. Syn. 83.  
*Hartmanii* Sch. 83.  
*heterosticha* C. Müll. 87.  
*incurva* Schwægr. 83.  
*leucophæa* Grev. 84.  
*maritima* Turn. 80.  
*mollis* Br. & Sch. 85.  
*montana* Br. & Sch. 84.  
*Mühlenbeckii* Sch. 82.  
*obtusata* Schwægr. 84.

*orthotrichoides* Hn. 85.  
*ovalis* Lindb. 84.  
*ovata* WM. 84.  
*patens* Br. & Sch. 86.  
*pulvinata* Sm. 81.  
*pulvinata* Sw. 81.  
*recurvata* H. 100.  
*recurvifolia* Wils. 91.  
*Schultzii* Wils. 81.  
*spiralis* Hook. 82.  
*striata* Schrad. 114.  
*sudetica* C. Müll. 86.  
*torquata* Grev. 83.  
*trichophylla* ed. 9. 82.  
*uncinata* Kaulf. 83.  
*unicolor* Grev. 85.  
**GRIMMIACEÆ** 70.  
**Grimmiæ** 80.  
*Gümbelia* 83.  
*fontinaloides* C. Müll. 88.  
**Gymnocybe** Fr. 48.  
*androgyna* Fr. 48.  
*palustris* Fr. 48.  
*turgida* Lindb. 48.  
**Gymnomitriæ** 128.  
**Gymnomitrium** Corda. 128.  
*adustum* N. v. Es. 129.  
*concinnum* C. 128.  
*condensatum* Ångstr. 128.  
*corallioides* N. v. Es. 128.  
**Gymnostomum** Hedw. 116.  
*æriginosum* Sm. 116.  
*æstivum* N. & H. 116.  
*affine* N. & H. 99.  
*Ahnfeltii* Fr. 66.  
*cæspiticiu* WM. 100.  
*compactu* Brid. 116.  
*curvirostre* H. 116.  
*Donnianum* Sm. 101.  
*fasciculare* H. 66.  
*granuliferu* Hn. 114.  
*Griffithianu* Sm. 70.  
*Heimii* N. & H. 99.  
*intermediu* Turn. 99.  
*lapponicu* H. 79.  
*microstomu* H. 116.  
*minutulu* Schw. 98.  
*osmundaceu* Sm. 70.  
*ovatu* H. 99.  
*pyriforme* H. 67.  
*rupestre* Schwægr. 116.  
*squarrosum* Wils. 116.  
*tenue* Schrad. 116.  
*tetragonu* Schw. 67.  
*tortile* Hn. 115.  
*trichodes* WM. 159.  
*tristichon* Wg. 116.  
*truncatulu* H. 99.  
*Wimmerianu* Sendtn. 115.

**H.**

- Habrodon** Schimp. 33.  
     *Notarisii* Sch. 33.  
     *perpusillus* Lindb. 34.  
**Habrodontææ.** 33.  
**Haplolænææ.** 150.  
**Harpanthus** N. v. Es. 145.  
     *Flotowianus* N. v. Es. 145.  
**Harpidium** Sull. 9.  
**Hedwigia** Ehrh. 80.  
     *albicans* Lindb. 80.  
     *ciliata* H. 80.  
**Hedwigidium** Br. & Sch. 80.  
     *ciliatum* Hn. 80.  
     *imberbe* Br. & Sch. 80.  
**Hedwigieæ.** 80.  
**HEPATICÆ.** 128, 159.  
*Herpetium deflexum* N. v. Es. 147.  
     *reptans* N. v. Es. 146.  
     *trilobatum* N. v. Es. 146.  
**Heterocladium** Br. & Sch. 35.  
     *dimorphum* Br. & Sch. 35.  
     *heteropterum* Br. & Sch. 36.  
     *Kurrii* Br. & Sch. 36.  
*Heterophyllum* Schimp. 11.  
**Homalia** Brid. 33.  
     *Sendtneriana* Sch. 33.  
     *trichomanoides* Br. & Sch. 33.  
**Homalothecium** Schimp. 28.  
     *Philippeanum* Br. & Sch. 18.  
     *sericeum* Br. & Sch. 28.  
*Homomallium* Sch. 11.  
**Hookeria** Sm. 39.  
     *lucens* Sm. 39.  
**HOOKERIACEÆ.** 39.  
**Hookerieæ.** 39.  
**Hylacomium** Schimp. 1.  
     *brevirostre* Br. & Sch. 2.  
     *loreum* Br. & Sch. 2.  
     *Oakesii* Sch. 1.  
     *splendens* Br. & Sch. 1.  
     *squarrosus* Br. & Sch. 2.  
     *subpinnatum* Lindb. 2.  
     *triquetrum* Br. & Sch. 2.  
     *umbratum* Br. & Sch. 1.  
*Hymenostomum* R. Br. 116.  
*Hymenostylium curvirostre* Lindb. 116.  
**HYPNACEÆ.** 1.  
**Hypnææ.** 1.  
**Hypnum** Dill. 2.  
     *abietinum* L. 35.  
     *adiantoides* L. 102.  
     *aduncum* ed. 8. 10.  
     *aduncum* H. 9.  
     *affine* Somf. 3.  
     *albicans* Neck. 15.  
     *algerianum* Brid. 25.  
     *alopecurum* L. 28.  
     *alpestre* Sw. 6.  
     *alpestre*  $\beta$  Wg. 6.  
     *apiculatum* Thed. 39.  
     *arcticum* Somf. 6.  
     *arcuatum* Lindb. 12.  
     *atrovirens* Sm. 37.  
     *attenuatum* Schreb. 37.  
     *badium* Hn. 11.  
     *Bambergeri* Sch. 13.  
     *Blandowii* WM. 35.  
     *Blyttii* Br. & Sch. 11.  
     *brevirostre* Ehrh. 2.  
     *calcareum* Lindb. 5.  
     *callichroum* Brid. 12.  
     *campestre* Bruch. 18.  
     *catenulatum* Brid. 36.  
     *chrysophyllum* Brid. 3.  
     *collinum* Schleich. 16.  
     *collinum* Wils. 24.  
     *commutatum* H. 8.  
     *complanatum* L. 33.  
     *concinnum* Hn. 18.  
     *concinnum* Not. 30.  
     *condensatum* Sch. 14.  
     *conservoides* Brid. 21.  
     *Cossoni* Sch. 10.  
     *cordifolium* H. 4.  
     *crassinervium* Tayl. 27.  
     *crispum* L. 33.  
     *Crista castrensis* L. 7.  
     *cupressiforme* L. 13.  
     *cupressif.* \* *julaceum* Zell. 13  
     *curtipendulum* L. 32.  
     *curvatum* Sw. 28.  
     *curvifolium* ed. 6. 12.  
     *cuspidatum* L. 4.  
     *delicatulum* L. 36.  
     *dendroides* L. 31.  
     *denticulatum* L. 22.  
     *depressum* Bruch. 24.  
     *diastrophyllum* Sw. 8.  
     *dimorphum* Brid. 36.  
     *diversifolium* ed. 9. 28.  
     *elegans* Hook. 24.  
     *elodes* Spruce. 3.  
     *enerve* ed. 9. 21.  
     *erythrorrhizon* C. Müll. 16.  
     *eugyrium* Sch. 6.  
     *exannulatum* Gomb. 9.  
     *falcatum* Brid. 8.  
     *fastigiatum* Brid. 14.  
     *flicinum* L. 20.  
     *fliciforme* Lam. 27.  
     *fimbriatum* Hn. 1.  
     *finnmarchicum* Lor. 21.  
     *fluitans* L. 9.  
     *fluviatile* Sw. 20.  
     *giganteum* Sch. 4.

- glaciale* Br. & Sch. 17.  
*glareosum* Bruch. 15.  
*gracile* L. 34.  
*Haldanianum* Grev. 11.  
*Halleri* Sw. 2.  
*Halleri*  $\beta$  *majus* Wg. 3.  
*hamulosum* Br. & Sch. 14.  
*herjedalicum* ed.9. 14.  
*heteropterum* Spruce. 36.  
*Heußleri* Jur. 13.  
*imponens* H. 12.  
*incurvatum* Schrad. 11.  
*intermedium* Lindb. 10.  
*intermed.*  $\gamma$  *Wilsoni* Lindb. 10.  
*intricatum* H. 16.  
*julaceum* Vill. 38.  
*Juratzkanum* Lindb. 19.  
*Kneiffii* Sch. 9.  
*Kurrii* ed.9. 36.  
*Lindbergii* Mitt. 12.  
*longifolium* C. Müll. 38.  
*longirostre* Ehrh. 27.  
*loreum* L. 2.  
*lucens* L. 39.  
*luridum* Sw. 7.  
*lutescens* Huds. 18.  
*lycopodioides* Schwægr. 9.  
*mamillatum* ed.6. 13.  
*medium* Dicks. 38.  
*micracanthis* Myr. 26.  
*Mildeanum* ed.9. 16.  
*molle* Dicks. 6.  
*molluscum* H. 7.  
*moniliforme* Wg. 38.  
*Montagnei* ed.7. 30.  
*Mühlenbeckii* ed.9. 23.  
*murale* H. 25.  
*muticum* Sw. 4.  
*myosuroides* L. 29.  
*myosuroides* Wg. 28.  
*Myosurum* Wg. 29.  
*nervosum* C. Müll. 38.  
*nilens* Schreb. 19.  
*nitidulum* Wg. 24.  
*nivale* Lor. 5.  
*norvegicum* Br. & Sch. 6.  
*Oakesii* Sull. 1.  
*obtusatum* Wg. 22.  
*ochraceum* Wils. 7.  
*orthocarpum* Pyl. 30.  
*orthocarpum* Ångstr. 23.  
*pallescens* PB. 14.  
*pallescens* Schimp. 14.  
*palustre* Huds. 7.  
*parietinum* L. 4.  
*parietinum* Sv. B. 1.  
*patientiae* Lindb. 12.  
*pellucidum* Wils. 10.  
*perichætiæ* Br.eur. 14.  
*piliferum* Schreb. 26.  
*plicatum* ed.9. 15.  
*plumosum* Sw. 18.  
*polare* Lindb. 7.  
*polyanthum* Schreb. 30.  
*polycarpon* Ahnf. 9.  
*polygamum* Wils. 3.  
*polymorphum* Br.eur. 3.  
*populeum* H. 18.  
*præcox* H. 27.  
*prælongum* L. 26.  
*pratense* Br. & Sch. 12.  
*pratense*  $\beta$  *hamatum* Sch. 12.  
*proliferum* L. 1.  
*proliferum* Sw. 35.  
*proliferum*  $\beta$  Wg. 1.  
*protuberans* Brid. 14.  
*pseudoplumosum* Brid. 18.  
*pseudostamineum* C. Müll. 5.  
*pulchellum* Dicks. 24.  
*purum* L. 4.  
*pyrenaicum* Spruce. 1.  
*recognitum* H. 35.  
*reflexum* WM. 17.  
*reptile* Michx. 14.  
*resupinatum* Wils. 13.  
*revolutum* Lindb. 13.  
*revolvens* Sw. 10.  
*riparioides* H. 25.  
*riparium* L. 19.  
*rivulare* Bruch. 18.  
*Roeseanum* Hpe. 22.  
*rufescens* Dicks. 29.  
*Rugelii* C. Müll. 37.  
*rugosum* L. 8.  
*rugosum* Sw. 9.  
*rugulosum* WM. 8.  
*ruscifolium* Neck. 25.  
*rusciforme* Weis. 25.  
*rutabulum* L. 17.  
*salebrosum* Hoffm. 16.  
*sarmentosum* Wg. 4.  
*Schleicheri* H. fil. 26.  
*Schleicheri* Not. 25.  
*Schreberi* Willd. 4.  
*sciuroides* L. 31.  
*scorpioides* L. 11.  
*Sendtneri* Sch. 10.  
*sericeum* L. 28.  
*serpens* L. 20.  
*silesiacum* PB. 23.  
*silvaticum* L. 22.  
*Smithii* Lindb. 26.  
*Sommerfeltii* Myr. 3.  
*squarrosus* L. 2.  
*Starckii* Brid. 17.  
*stellatum* Schreb. 3.  
*stellat.*  $\beta$  *polymorphum* Myr. 3.  
*Stokesii* Turn. 26.  
*stramineum* Dicks. 5.  
*striatellum* C. Müll. 23.  
*striatulum* Spruce. 27.  
*striatum* Schreb. 27.

*strigosum* Hoffm. 27.  
*subpinnatum* Lindb. 2.  
*subtile* Hoffm. 21.  
*succicum* C. Hn. 30.  
*sulcatum* Sch. 8.  
*Swartzii* Turn. 26.  
*amariscinum* H. 35.  
*taxifolium* L. 102.  
*Teesdalii* Sm. 25.  
*tenellum* Dicks. 25.  
*tenellum* Myr. 38.  
*tenellum* Wg. 17.  
*tenuinerve* Lindb. 26.  
*tenuisetum* Lindb. 19.  
*Thedenii* ed. 9. 15.  
*trachypodium* C. Müll. 17.  
*trichomanoides* Schreb. 33.  
*trichopodium* Schults. 19.  
*trifarium* WM. 5.  
*triquetrum* L. 2.  
*turfaceum* Lindb. 24.  
*turgescens* Sch. 5.  
*umbratum* Ehrh. 1.  
*uncinatum* H. 9.  
*varium* PB. 20.  
*Vaucheri* Lesqu. Cat. 13.  
*Vaucheri* Rab. 26.  
*velutinoides* Bruch. 27.  
*velutinum* L. 16.  
*vernicosum* Lindb. 10.  
*viridulum* Hn. 6.  
*viticulosum* L. 37.

## I.

*Isoethecium* Brid. 28.  
*apiculatum* Hüb. 39.  
*myosuroides* Brid. 28.  
*myurum* Brid. 28.  
*trachypodium* Brid. 17.

## J.

*Jecorarieæ*. 152.  
*Jubuleæ*. 149, 159.  
 JUNGERMANNIACEÆ. 128, 159.  
*Jungermannieæ*. 130, 159.  
*Jungermannia* L. 133, 159.  
*acuta* Lindenb. 137.  
*æquiloba* Schw. 132.  
*albescens* Hook. 142.  
*albicans* L. 133.  
*alpestris* Schleich. 138.  
*anomala* Hook. 134.  
*asplenioides* L. 130.  
*attenuata* Lindenb. 140.  
*bantriensis* Hook. 137.

*barbata* Schmid. 140.  
*barbata* Schreb. 140.  
*Bartlingii* Hpe. 132.  
*Baueri* Lindenb. 143.  
*bicrenata* Lindenb. 139.  
*bicuspidata* L. 143.  
*bidentata* L. 144.  
*bidentata* Wg. 146.  
*biloba* Sw. 151.  
*Blasia* Hook. 151.  
*Blyttii* Möreck. 150.  
*byssacea* Hook. 143.  
*cæspiticia* Lindenb. 136.  
*calycina* Tayl. 151.  
*capitata* Hook. 139.  
*catenulata* Hüb. 143.  
*cavifolia* Ehrh. 150.  
*ciliaris* L. 147.  
*cochleariformis* Hook. 147.  
*compacta* Roth. 132.  
*complanata* L. 148.  
*compressa* Hook. 130.  
*concatenata* Sm. 141.  
*concinata* Lightf. 128.  
*concinata* Wg. 141.  
*confertissima* N. v. Es. 136.  
*connitens* Dicks. 144.  
*cordifolia* Hook. 134.  
*crenulata* Sm. 135.  
*curta* Mart. 132.  
*curvifolia* Dicks. 143.  
*cyrtophylla* Ångstr. 147.  
*decipiens* Hook. 144.  
*deflexa* Mart. 147.  
*densa* N. v. Es. 139.  
*denudata* N. v. Es. 144.  
*Dicksoni* Hook. 133.  
*dilatata* L. 149.  
*divaricata* EB. 143.  
*emarginata* Ehrh. 129.  
*endiviæfolia* Dicks. 151.  
*epiphylla* L. 151.  
*exserta* Schmid. 133.  
*fennica* Lindb. 130.  
*Floerkei* WM. 140.  
*Flotowiana* N. v. Es. 145.  
*fragilifolia* Tayl. 149.  
*Funkii* WM. 129.  
*furcata* L. 152.  
*Genthiana* Hüb. 135.  
*gracillima* EB. 135.  
*graveolens* Schrad. 146.  
*hamatifolia* Hook. 150.  
*Hartmani* Thed. 145.  
*Helleriana* N. v. Es. 140.  
*hercynica* Hüb. 138.  
*heterocolpos* Thed. 137.  
*heterophylla* Schrad. 145.  
*Hornschuchiana* N. v. Es. 137.  
*Hübeneriana* N. v. Es. 142.  
*Hutchinsiae* Hook. 159.

*hyalina* Lyell. 136.  
*immersa* Angstr. 130.  
*incisa* Schrad. 141.  
*inflata* Huds. 138.  
*intermedia* Lindenb. 139.  
*interrupta* N. v. Es. 131.  
*irrigua* N. v. Es. 131.  
*islandica* N. v. Es. 142.  
*julacea* Lightf. 141.  
*julacea* Wg. 128.  
*Kunzeana* Hüb. 137.  
*lævigata* Schrad. 148.  
*lanceolata* N. v. Es. 135.  
*laxifolia* Hook. 141.  
*lycopodioides* Wallr. 140.  
*Mackayi* Hook. 159.  
*Michauxii* Web. 139.  
*minuta* Dicks. 139.  
*minutissima* Sm. 160.  
*Möllerii* N. v. Es. 136.  
*multifida* L. 152.  
*nana* N. v. Es. 136.  
*nemorosa* L. 131.  
*nivalis* Sw. 141.  
*obovata* N. v. Es. 130.  
*obtusifolia* Hook. 133.  
*orcadensis* Hook. 138.  
*pallescens* Schrad. 145.  
*palmata* H. 152.  
*parvula* Lindb. 136.  
*patens* Sill. 132.  
*pinguis* L. 151.  
*platyphylla* L. 148.  
*plicata* Hn. 137.  
*polita* N. v. Es. 141.  
*polyanthos* L. 145.  
*porphyroleuca* N. v. Es. 138.  
*pubescens* Schrank. 152.  
*pulcherrima* Web. 147.  
*pumila* With. 135.  
*pusilla* L. 150.  
*quinquedentata* Web. 140.  
*reptans* L. 146.  
*resupinata* Hook. 132.  
*resupinata* Wg. 139.  
*riparia* Tayl. 135.  
*rivularis* Dicks. 149.  
*Sauteriana* Hüb. 159.  
*saxicola* Schrad. 139.  
*scalaris* Fl.D. 134.  
*scalaris* Schrad. 129.  
*Schmideliana* Hüb. 136.  
*Schraderi* Mart. 134.  
*scutata* Wm. 159.  
*scutata* Somf. 142.  
*serpyllifolia* Dicks. 150.  
*setacea* Web. 142.  
*setiformis* Ehrh. 141.  
*sinuata* Dicks. 152.  
*sphacelata* Gies. 129.  
*sphaerocarpa* Hook. 135.

*Sphagni* Dicks. 144.  
*Starckii* Funck. 143.  
*stipulacea* Hook. 159.  
*subalpina* N. v. Es. 132.  
*subapicalis* N. v. Es. 134.  
*Tamarisci* L. 149.  
*tamariscifolia* Wg. 149.  
*taxifolia* Wg. 133.  
*Taylori* Hook. 133.  
*tersa* N. v. Es. 135.  
*Tomentella* Ehrh. 147.  
*Trichomanis* Scop. 146.  
*trichophylla* L. 142.  
*tricrenata* Wg. 147.  
*tridentata* Scop. 140.  
*tridentata* Sw. 141.  
*trilobata* L. 146.  
*tristis* N. v. Es. 135.  
*uliginosa* Sw. 131.  
*umbrosa* Schrad. 132.  
*undulata* L. 131.  
*ventricosa* Dicks. 138.  
*Wenzelii* N. v. Es. 138.  
*villiculosa* Wg. 145.  
*Woodii* Hüb. 147.  
*Zeyheri* Hüb. 135.

## L.

*Lamprophyllum* Lindb. 62.  
*Leersia ciliata* H. 71.  
*limbriata* Brid. 71.  
*Lejeunia* G. & Lindenb. 149, 159.  
*calcarea* Lib. 150.  
*cavifolia* Lindb. 149.  
*echinata* Tayl. 150.  
*minutissima* Dum. 159.  
*serpyllifolia* Lib. 150.  
*Lejodon* Lindb. 43.  
*Lepidozia* N. v. Es. 146.  
*reptans* N. v. Es. 146.  
*setacea* Mill. 142.  
*Leptobryum* Schimp. 65.  
*pyriforme* Sch. 65.  
*Leptodictyum* 19.  
*Leptohymenium Ahnfeltii* Ångstr. 36.  
*filiforme* Hüb. 31.  
*filiforme*  $\beta$  *crassius* ed.9. 34.  
*gracile* Hüb. 34.  
*repens* Rab. 31.  
*Leptotrichum* Hampe. 95.  
*flexicaule* Hpe. 95.  
*glaucescens* Hpe. 95.  
*homomallum* Sch. 96.  
*pallidum* Hpe. 95.  
*tortile* Hpe  $\beta$  *pusillum*. 96.  
*Leptoscyphus anomalus* Lindb. 134.  
*Taylori* Mill. 133.

**Lescursæa Schimp** 31.  
*saxicola* Milde. 31.  
*striata*  $\beta$  *saxicola* Br. eur. 31.  
**Leskea Hedw.** 38.  
*atrovirens* Hn. 37.  
*attenuata* H. 37.  
*chrysea* Hornsch. 29.  
*chrysea* Angstr. 30.  
*complanata* H. 33.  
*curvata* Voil. 28.  
*Deinboellii* Sw. 9.  
*dendroides* H. 31.  
*incurvata* H. 37.  
*incurvata* Myr. 38.  
*intricata* Hn. 30.  
*intric. var. suberecta* C. Hn. 29.  
*læta* Berggr. 23.  
*lapponica* Lindb. 29.  
*myosuroides* Roth. 29.  
*nervosa* Myr. 38.  
*norvegica* Somf. 38.  
*pallescens* H. 14.  
*paludosa* H. 38.  
*paludosa*  $\beta$  *polycarpa* ed. 9. 38.  
*pilifera* Sw. 23.  
*polyantha* H. 30.  
*polycarpa* Ehrh. 38.  
*pulchella* H. 24.  
*pulvinata* Wg. 34.  
*rufescens* Schwægr. 29.  
*rupestris* Berggr. 38.  
*sericea* H. 28.  
*Smithii* Sw. 6.  
*Sprucei* Bruch. 22.  
*striaella* Brid. 23.  
*stricta* Lindb. 29.  
*subnervis* Schwægr. 34.  
*subtilis* H. 21.  
*tectorum* Lindb. 36.  
*tenella* Sch. 22.  
*trichomanoides* H. 33.  
*varia* H. 20.  
**LESKEACEÆ** 34.  
*Leskeæ.* 37.  
**LEUCOBRYACEÆ** 103.  
*Leucobryæ.* 103.  
**Leucobryum Hampe.** 103.  
*glaucum* Sch. 103.  
*vulgare* Hpe. 103.  
**Leucodon Schwægr.** 31.  
*morensis* Sch. 31.  
*sciuroides* Schw. 31.  
*Lichenoides* Bisch. 155.  
*Limnobia* Sch. 6.  
*Lioclæna lanceolata* N. v. Es. 135.  
**Lophocolea N. v. Es.** 144.  
*bidentata* N. v. Es. 144.  
*heterophylla* N. v. Es. 145.

*Hookeriana* N. v. Es. 144.  
*minor* N. v. Es. 144.  
**Lunulariæ.** 154.

# M.

**Madotheca Dumort.** 148.  
*lævigata* Dum. 148.  
*navicularis* ed. 9. 148.  
*platyphylla* Dum. 148.  
*platyphyllodea* ed. 9. 148.  
*Porella* ed. 9. 149.  
*reticularis* N. v. Es. 148.  
**Marchantia Lin.** 152.  
*androgyna* FLD. 154.  
*barbata* Ahnf. 154.  
*conica* L. 153.  
*cruciata* Somf. 155.  
*gracilis* Web. 153.  
*hemisphærica* L. 154.  
*hemisphærica* Wg. 153.  
*hyalina* Somf. 155.  
*pilosa* Horn. 154.  
*pilosa* Wg. 153, 154.  
*polymorpha* L. 152.  
*quadrata* Web. 153.  
*tenella* Myr. 153.  
**MARCHANTIACEÆ** 152, 160.  
*Martinellia asplenoides* Gray. 130.  
**Mastigobryum N. v. Es.** 146.  
*deflexum* N. v. Es. 146.  
*trilobatum* N. v. Es. 146.  
**Meesia Hedw.** 49.  
*dealbata* H. 49.  
*demissa* Hornsch. 55.  
*longiseta* H. 49.  
*minor* Brid. 49.  
*squarrosa* Wg. 49.  
*trichodes* Spruce. 49.  
*triquetra* Angstr. 49.  
*tristicha* Br. & Sch. 49.  
*uliginosa* H. 49.  
*Meesiæ.* 48.  
**Metzgeria Raddi.** 152.  
*furcata* N. v. Es. 152.  
*pubescens* Rad. 152.  
**Metzgeriæ.** 152.  
**Microbryum Schimp.** 119.  
*Floerkeanum* Sch. 119.  
*Microweisia* Sch. 115.  
**Mielichhoferia Hornsch.** 65.  
*nitida* Hornsch. 65.  
**Mniæ.** 50.  
**Mnium Lin.** 50.  
*affine* Bland. 52.  
*albicans* Wg. 62.  
*androgynum* L. 48.

*bimum* Wg. 56.  
*Blytii* Br. & Sch. 51.  
*cinclidioides* Hüb. 54.  
*cuspidatum* H. 51.  
*cuspidatum* Neck. 52.  
*fontanum* L. 46.  
*hornum* L. 52.  
*hygrometricum* L. 66.  
*hymenophylloides* Hüb. 51.  
*hymenophyllum* Br. & Sch. 51.  
*inclinatum* Lindb. 54.  
*insigne* Mitt. 52.  
*lycopodioides* Auctt. 53.  
*marginatum* Lindb. 53.  
*medium* Br. & Sch. 52.  
*orthorrhynchum* Br. & Sch. 53.  
*osmundaceum* Dicks. 70.  
*palustre* L. 48.  
*pellucidum* L. 42.  
*polytrichoides* L. 44.  
*pseudopunctatum* Lindb. 50.  
*pseudotriquetrum* H. 56.  
*punctatum* L. 50.  
*purpureum* L. 96.  
*pyriforme* L. 65.  
*riparium* Mitt. 53.  
*rostratum* Schrad. 51.  
*rugicum* Laur. 52.  
*serpyllifolium* Neck. 51.  
*serpyllifol.*  $\beta$  *cuspid.* L. 52.  
*serpyllifol.*  $\gamma$  L. 55.  
*serpyllifol.*  $\delta$  L. 52.  
*serratum* Brid. 53.  
*silvaticum* Lindb. 52.  
*spinosum* Schwægr. 53.  
*spinulosum* Br. & Sch. 53.  
*stellare* H. 54.  
*stygium* Br. eur. 50.  
*subglobosum* Br. & Sch. 50.  
*Trichomanis* L. 146.  
*triquetrum* L. 49.  
*turgidum* Wg. 48.  
*undulatum* H. 52.  
**Myrinia** Schimp. 34.  
*pulvinata* Sch. 34.  
**Myrinicæ.** 34.  
**Myurella** Schimp. 38.  
*apiculata* Br. & Sch. 38.  
*julacea* Br. & Sch. 38.  
**Myurium herjedalicum** Sch. 14.  
**Mörckia** Gottsche. 150.  
*Blytii* Brockm. 150.  
*hibernica* Gottsche. 150.  
*norvegica* Gottsche. 150.

## N.

**Nardia compressa** Gray. 130.  
*emarginata* Gray. 129.

*Funckii* Carr. 129.  
*revoluta* Lindb. 129.  
*scalaris* Carr. 129.  
*sphacelata* Carr. 129.  
**Neckera** Hedw. 32.  
*attenuata* Myr. 37.  
*Besseri* Jur. 33.  
*capillacea* C. Müll. 39.  
*complanata* Hüb. 33.  
*crispa* H. 32.  
*curtipendula* H. 32.  
*falcata* C. Müll. 39.  
*heteromalla* H. 158.  
*intermedia* Thed. 32.  
*oligocarpa* Br. & Sch. 32.  
*pennata* H. 32.  
*Philippeana* Br. & Sch. 32.  
*pumila* H. 32.  
*rotundifolia* Hn. 33.  
*Sendneriana* Br. eur. 33.  
*trichomanoides* Hn. 33.  
*viliculosa* H. 37.  
**NECKERACEÆ.** 32, 158.  
**Neckereæ.** 32.

## O.

**Octodiceras** Brid. 101.  
*fontanum* Lindb. 101.  
*Julianum* Brid. 101.  
**Odontoschisma decipiens** Lindb. 144.  
*Sphagni* Lindb. 144.  
**Oedipodium** Schwægr. 70.  
*Griffithianum* Schw. 70.  
**Oligotrichum** Lam. & DC. 44.  
*glabratum* Lindb. 44.  
*hercynicum* Lam. & DC. 44.  
*lævigatum* Br. & Sch. 44.  
**Omalia** Besseri Lob. 33.  
*trichomanoides* Br. & Sch. 33.  
**Oncophorus Wahlenbergii** Brid. 113.  
*virens* Brid. 113.  
**Oreoweisia Bruntoni** Milde. 113.  
**Orthopyxis androgyna** P.B. 48.  
**Orthothecium** Schimp. 29.  
*chryseum* Br. & Sch. 29.  
*intricatum* Br. & Sch. 29.  
*lapponicum* (Sch.) 29.  
*rufescens* Br. & Sch. 29.  
*strictum* Lor. 29.  
**Orthotricheæ.** 72.  
**Orthotrichum** Hedw. 72.  
*affine* Schrad. 73.  
*alpestre* Hornsch. 74.  
*americanum* P.B. 77.  
*anomalum* H. 77.  
*arcticum* Sch. 77.  
*Blytii* Sch. 77.



*Bruchii* Wils. 78.  
*coarctatum* Br. & Sch. 78.  
*coarctatum* PB. 78.  
*crispulum* Br. & Sch. 78.  
*crispum* H. 78.  
*crispum*  $\beta$  Wg.Fl.Su. 78.  
*crispum*  $\gamma$  Wg.Fl.Su. 77.  
*cupulatum* Hoffm. 75.  
*curvifolium* Wg. 78.  
*diaphanum* Schrad. 73.  
*Drummondii* Hook. 78.  
*fallax* Bruch. 75.  
*fallax* Sch. 75.  
*fastigiatum* Bruch. 74.  
*gymnostomum* Bruch. 76.  
*Hutchinsiae* Sm. 77.  
*incurtum* Lindb. 44.  
*julandicum* Brid. 79.  
*Killiasii* C. Müll. 76.  
*laevigatum* Zett. 77.  
*lejocarpum* Br. & Sch. 73.  
*Ludwigii* Brid. 78.  
*Lyellii* Hook. 72.  
*macrolephare* Sch. 76.  
*obtusifolium* Schrad. 75.  
*pallens* Bruch. 75.  
*patens* Bruch. 74.  
*phyllanthum* Br. & Sch. 79.  
*pulchellum* Sm. 76.  
*pumilum* Br.eur. 75.  
*pumilum* Sw. 75.  
*Rogeri* Brid. 74.  
*rupestre* Schleich. 73.  
*rupicola* Funk. 73.  
*saxatile* Wood. 77.  
*Schimperii* Ham. 75.  
*Sommerfeltii* Sch. 76.  
*speciosum* N. v. Es. 73.  
*specios. var. alpicola* Sch. 76.  
*stramineum* Hornsch. 74.  
*striatum* H. 73.  
*Sturmii* Hornsch. 75.  
*subrepens* Somf. 78.  
*tenellum* Bruch. 74.  
*urnigerum* Myr. 73.

## P.

*Pallavacinia Blyttii* Lindb. 150.  
*hibernica* Lindb. 150.  
*Paludella* Ehrh. 48.  
*squarrosa* Ehrh. 48.  
*Pellia Raddi*. 150.  
*calycina* N. v. Es. 151.  
*endiviaefolia* Lindb. 151.  
*epiphylla* N. v. Es. 150.  
**PHASCACEÆ**. 117, 159.  
*Phasceæ*. 118.  
*Phascum* Lin. 118.  
*acaulon* L. 119.

*acuminatum* Lindb. 118.  
*alternifolium* Dicks. 117.  
*axillare* Dicks. 118.  
*bryoides* Dicks. 118.  
*crassinervium* Grev. 119.  
*crispum* H. 117.  
*cuspidatum* Schreb. 119.  
*Floerkeanum* WM. 119.  
*graniferum* Wg. 119.  
*muticum* Schreb. 119.  
*nitidum* H. 118.  
*palustre* Br. & Sch. 118.  
*patens* H. 120.  
*piliferum* Schreb. 119.  
*piliferum* Wg. 119.  
*recurvifolium* Dicks. 119.  
*serratum* Schreb. 120.  
*subulatum* Schreb. 118.  
**Philonotis** Brid. 46.  
*calcareæ* Sch. 46.  
*capillaris* Lindb. 46.  
*fontana* Brid. 46.  
*marchica* Br. & Sch. 46.  
*parvula* Lindb. 46.  
**Phragmicoma** Dum. 159.  
*Mackayi* Dum. 159.  
**Physcomitrella** Schimp. 119.  
*patens* Sch. 119.  
**Physcomitrieæ**. 67.  
**Physcomitrium** Brid. 67.  
*Ahnfeltii* ed.9. 67.  
*ericetorum* Br. & Sch. 66.  
*fasciculare* Brid. 66.  
*pyriforme* Brid. 67.  
*tetragonum* Br. & Sch. 67.  
**Physiotium** N. v. Es. 147.  
*cochleariforme* N. v. Es. 147.  
*Pilotrichum antipyreticum* C. Müll. 40.  
*dalecarlicum* C. Müll. 40.  
*Strömbäckii* C. Müll. 40.  
**Plagiochila** N. & Mont. 130.  
*asplenioides* N. & Mont. 130.  
*decipiens* N. v. Es. 144.  
*Dillenii* Tayl. 130.  
*interrupta* N. v. Es. 130.  
*pyrenaica* Spruce. 131.  
**Plagiothecium** Schimp. 22.  
*denticulatum* Br. & Sch. 22.  
*denticul.  $\beta$  Donnä* Lindb. 22.  
*elegans* Sch. 24.  
*lætum* Br. & Sch. 22.  
*Möhlenbeckii* Br. & Sch. 23.  
*nanum* Jur. 24.  
*nitidulum* Br. & Sch. 24.  
*nitidum* Lindb. 24.  
*nitidum  $\beta$  suberectum* Lindb. 24.  
*piliferum* Br. & Sch. 23.  
*repens* Lindb. 23.  
*Roeseanum* Br. & Sch. 22.

*Schimperii* Jur. & Milde. 24.  
*Seligeri* Lindb. 23.  
*silesiacum* Br. & Sch. 23.  
*silvaticum* Br. & Sch. 22.  
*striatellum* Lindb. 23.  
*turfaceum* Lindb. 23.  
*undulatum* Br. & Sch. 22.  
*Platydictya tenella* Berk. 22.  
*Platygyrium* Br. & Sch. 30.  
   *repens* Br. & Sch. 30.  
*Platyphylleæ*. 147.  
*Pleuridieæ*. 118.  
*Pleuridium* Brid. 118.  
   *alternifolium* Rab. 118.  
   *axillare* Lindb. 118.  
   *nitidum* Rab. 118.  
   *palustre* Br. & Sch. 118.  
   *subulatum* Lindb. 118.  
   *subulatum* Rab. 118.  
*Pleurobryeæ*. 65.  
*Pleurochete squarrosa* Lindb. 90.  
*Pleurozium* Sull. 1.  
*Pogonatum* PB. 43.  
   *aloides* PB. 44.  
   *alpinum* Röhl. 43.  
   *capillare* Brid. 44.  
   *longidens* Angstr. 44.  
   *nanum* PB. 44.  
   *subrotundum* Lindb. 44.  
   *urnigerum* PB. 43.  
*Pohlia* Schimp. 64.  
   *bryoides* R. Br. 62.  
   *inclinata* Sw. 60.  
   *purpurascens* R. Br. 62.  
**POLYTRICHACEÆ**. 42.  
*Polytricheæ*. 42.  
*Polytrichum* Dill., Lin. 42.  
   *aloides* H. 44.  
   *alpestre* Hop. 42.  
   *alpestre* Sw. 42.  
   *alpinum* L. 43.  
   *alpin.*  $\gamma$  *cylindric.* Lindb. 43.  
   *arcticum* Sw. 43.  
   *attenuatum* Menz. 43.  
   *capillare* Michx. 44.  
   *commune* L. 42.  
   *commune*  $\beta$  L. 42.  
   *commune*  $\gamma$  Br. eur. 42.  
   *commune*  $\gamma$  L. 43.  
   *cubicum* Lindb. 42.  
   *formosum* H. 43.  
   *glabratum* Wg. 44.  
   *gracile* Menz. 43.  
   *hercynicum* H. 44.  
   *juniperinum* W. 42.  
   *lævigatum* Wg. 44.  
   *longisetum* Sw. 43.  
   *nanum* Neck. 44.  
   *nanum* Weis. 44.

*norvegicum* H. 43.  
*pilliferum* Schreb. 42.  
*pilosum* Neck. 43.  
*pumilum* Sw. 44.  
*septentrionale* Schwægr. 43.  
*septentrionale* Sw. 43.  
*sexangulare* Flörke. 43.  
*strictum* Banks. 42.  
*subrotundum* Huds. 44.  
*Swartzii* Hn. 42.  
*undulatum* H. 45.  
*undulat.*  $\beta$  *minus* Wg. 45.  
*urnigerum* L. 44.  
*urniger.*  $\beta$  *capillare* Wg. 44.  
*yuccæfolium* Ehrh. 42.  
*Porella dentata* Lindb. 149.  
*lævigata* Lindb. 148.  
*platyphylla* Lindb. 148.  
*Pottia* Ehrh. 98.  
   *cavifolia* Ehrh. 99.  
   *curvirostris* Ehrh. 116.  
   *eustoma* Lindb. 99.  
   *Heimii* Fühnr. 99.  
   *intermedia* Fühnr. 99.  
   *lanceolata* C. Müll. 98.  
   *latifolia* C. Müll. 98.  
   *minutula* Fühnr. 98.  
   *Starckeana* C. Müll. 98.  
   *Starckeana*  $\beta$  *Davallii* Lindb. 98.  
   *truncata* Fühnr. 98.  
   *truncata major*  $\beta$  Br. eur. 99.  
**POTTIACEÆ**. 88, 158.  
*Pottieæ*. 97.  
*Preissia* N. v. Es. 153.  
   *commutata* N. v. Es. 153.  
*Pseudoleskea* Br. & Sch. 36.  
   *atrovirens* Br. & Sch. 37.  
   *catenulata* Br. & Sch. 36.  
   *tectorum* Sch. 36.  
*Pseudoleskeææ*. 36.  
*Pseudoneura* Gottsche. 152.  
*Psilopilum arcticum* Brid. 44.  
*Pterigynandrum* H. 34.  
   *filiforme* H. 34.  
   *gracile* H. 34.  
   *longifolium* Schleich. 38.  
**PTEROGONIACEÆ**. 34.  
*Pterogonieæ*. 34.  
*Pterogonium* Sw. 34.  
   *filiforme* Sw. 34.  
   *gracile* Sw. 34.  
   *heteropterum* Brid. 34.  
   *nervosum* Schwægr. 38.  
   *ornithopodioides* Lindb. 34.  
   *perpusillum* Nol. 34.  
   *repens* Schwægr. 31.  
   *sciuroides* Wg. 31.  
   *tectorum* Al. Br. 36.  
*Pterygodon* Lindb. 42.

*Pterygophyllum lucens* Brid. 39.  
*Ptilidiæ*. 147, 159.  
*Ptilidium* N. v. Es. 147.  
     *ciliare* N. v. Es. 147.  
*Ptychodium plicatum* Sch. 15.  
*Ptychomitriæ*. 79.  
*Ptychomitrium* Färnr. 79.  
     *polyphyllum* Färnr. 79.  
*Ptychostomum pendulum* Hornsch. 60.  
*Pylaisia* Schimp. 30.  
     *polyantha* Sch. 30.  
     *suecica* Lindb. 30.  
*Pylaisiæ*. 30.  
*Pyramidula* Brid. 67.  
     *tetragona* Brid. 67.

## R.

*Racomitrium* Brid. 85.  
     *aciculare* Brid. 86.  
     *canescens* Brid. 87.  
     *cataractarum* Brid. 86.  
     *ellipticum* Br. & Sch. 86.  
     *fasciculare* Brid. 87.  
     *fontinaloides* Brid. 88.  
     *heterostichum* Brid. 87.  
     *hypnoides* Lindb. 87.  
     *lanuginosum* Brid. 87.  
     *microcarpum* Brid. 86.  
     *patens* Hüb. 85.  
     *polyphyllum* Brid. 80.  
     *protensum* Al. Br. 86.  
     *sudeticum* Br. & Sch. 86.  
     *virescens* Lindb. 87.  
*Radula* N. v. Es. 147.  
     *alpestris* Lindb. 148.  
     *complanata* N. v. Es. 147.  
     *Lindenberglana* Gottsche. 148.  
*Reboulia* Rad. 154.  
     *hemisphærica* Rad. 154.  
*Rhabdoweisia* Br. & Sch. 114.  
     *crispata* Lindb. 114.  
*Rhodobryum* Sch. 55.  
*Rhynchostegium* Schimp. 24.  
     *algirianum* Lindb. 25.  
     *curvisetum* Lindb. 25.  
     *depressum* Br. & Sch. 24.  
     *elegans* Lindb. 24.  
     *murale* Br. & Sch. 25.  
     *ruscifforme* Br. & Sch. 24.  
     *tenellum* Br. & Sch. 25.  
*Rhytidium* Sull. 8.  
*Riccia* Mich., Lin. 155.  
     *bifurca* Hoffm. 156.  
     *canaliculata* Hoffm. 156.  
     *crystallina* L. 156.  
     *fluitans* L. 156.

*glauca* L. 155.  
     *minima* Leers. 155.  
     *sorocarpa* Bisch. 155.  
*RICCIACEÆ*. 155.  
*Ricciæ*. 155.  
*Ricciella* Al. Br. 156.

## S.

*Sarcoscyphus* Corda. 128.  
     *adustus* Spruce. 129.  
     *condensatus* Lindb. 128.  
     *Ehrharti* Corda. 129.  
     *emarginatus* Spruce. 128.  
     *Funckii* N. v. Es. 129.  
     *revolutus* N. v. Es. 129.  
     *sparsifolius* Lindb. 129.  
     *sphacelatus* N. v. Es. 129.  
*Sauteria* N. v. Es. 154.  
     *alpina* ed. 9. 155.  
     *alpina* N. v. Es. 154.  
     *seriata* Lindb. 155.  
     *suecica* Lindb. 155.  
*Scapania* Lindenb. 131.  
     *æquiloba* N. v. Es. 132.  
     *Bartlingii* N. v. Es. 132.  
     *compacta* Lindenb. 131.  
     *curta* N. v. Es. 132.  
     *irrigua* N. v. Es. 131.  
     *nemorosa* N. v. Es. 131.  
     *rosacea* Corda. 132.  
     *subalpina* N. v. Es. 132.  
     *uliginosa* N. v. Es. 131.  
     *umbrosa* N. v. Es. 132.  
     *undulata* N. v. Es. 131.  
*Schisma Sendtneri* N. v. Es. 159.  
*Schistidium* Brid. 80.  
     *ciliatum* Brid. 80.  
*Schistostega* Mohr. 70.  
     *osmundacea* WM. 70.  
*SCHISTOSTEGACEÆ*. 70.  
*Schistostegæ*. 70.  
*Scorpidium* Sch. 11.  
*Seligeria* Br. & Sch. 100.  
     *acutifolia* Lindb. 101.  
     *crassinervis* Lindb. 100.  
     *diversifolia* Lindb. 100.  
     *Donniana* C. Möll. 101.  
     *pusilla* Br. & Sch. 100.  
     *recurvata* Br. & Sch. 100.  
     *selacea* Lindb. 100.  
     *trifaria* Lindb. 101.  
     *tristicha* Br. & Sch. 101.  
*SELIGERIACEÆ*. 99, 158.  
*Seligeriæ*. 100.  
*Sendtnera* Endl. 159.  
     *Sauteriana* N. v. Es. 159.

*Simophyllum crispum* Lindb. 117.  
*microstomum* Lindb. 116.  
*viridulum* Lindb. 115.

*Skitophyllum fontanum* Pyl. 101.

*Southbya* Spruce. 130.

*fennica* Gottsche. 130.

*obovata* Lindb. 130.

*Sphærangium* Schimp. 119.

*muticum* Sch. 119.

*Sphærocephalus androgynus* Lindb. 48.

*Sphagnoecetis* N. v. Es. 144.

*communis* N. v. Es. 144.

*decipiens* (Hook.). 144.

**SPHAGNACEÆ** Endl. 123.

*Sphagnum* Dill., Ehrh. 123.

*acutifolium* Ehrh. 125.

*arborescens* L. 158.

*auriculatum* Sch. 124.

*capillaceum* Sw. 125.

*capillifolium* H. 125.

*compactum* Brid. 123, 124.

*contortum* Brid. 124.

*cuspidatum* Auct. 126.

*cuspidatum* Ehrh. 126.

*cymbifolium* Ehrh. 123.

*fimbriatum* Wils. 127.

*Girgensohnii* Russ. 126.

*insulosum* Ångstr. 123.

*laricinum* Spruce. 126.

*latifolium* H. 123.

*laxifolium* C. Müll. 126.

*Lindbergii* Sch. 126.

*molle* Sull. 124.

*molluscum* Bruch. 124.

*Mougeotii* Sch. 126.

*Mülleri* Sch. 124.

*neglectum* Ångstr. 124.

*palustre* L. 123.

*pynocladum* Ångstr. 125.

*recurvum* PB. 126.

*rigidum* Sch. 123.

*riparium* Ångstr. 126.

*rubellum* Wils. 125.

*squarrosulum* Lesq. 125.

*squarrosum* Pers. 125.

*subsecundum* N. v. Es. 124.

*tenellum* Pers. 124.

*teres* Ångstr. 125.

*Wulfianum* Girg. 125.

*Ångströmii* C. Hn. 123.

**SPLACHNACEÆ** 67.

*Splachneæ* 67.

*Splachnum* Lin. 67.

*ampullaceum* L. 68.

*angustatum* Sch. 68.

*Brewerianum* H. 69.

*fastigiatum* Dicks. 69.

*Froelichianum* H. 69.

*gracile* Dicks. 68.

*ligulatum* Dicks. 70.

*luteum* L. 67.

*mnioides* H. 69.

*pedunculatum* Lindb. 68.

*reticulatum* Sw. 69.

*rubrum* L. 67.

*serratum* H. 69.

*sphæricum* Sw. 68.

*tenue* Dicks. 69.

*vasculosum* L. 68.

*Wormskjoldii* Horn. 68.

*Spongodes* Bisch. 156.

*Sporledera* Hampe. 117.

*palustris* Hpe. 117.

*Stylostegium* Br. & Sch. 100.

*cæspiticiu* Br. & Sch. 100.

*Swartzia inclinata* Ehrh. 97.

*Syntrichia* 88.

*lævipila* Brid. 89.

*latifolia* Bruch. 89.

*norvegica* WM. 89.

*Systegium* Schimp. 117.

*crispum* Sch. 117.

## T.

*Targionia* Mich. 160.

*hypophylla* L. 160.

*Michelii* Corda. 160.

*Targionieæ*. 160.

*Tayloria* Hook. 69.

*cuspidata* Hn. 69.

*Froelichiana* Müll. 69.

*serrata* Br. & Sch. 69.

*splachnoides* Hook. 69.

*Taylorieæ*. 69.

*Tetraphideæ*. 41.

*Tetraphis* Hedw. 41.

*Browniana* Grev. 42.

*ovata* Funck. 42.

*pellucida* H. 41.

*Tetraplodon* Br. & Sch. 68.

*angustatus* Sch. 68.

*mnioides* Sch. 68.

*Tetradontium* Schwægr. 42.

*Brownianum* Schw. 42.

*varium* Lindb. 42.

*Thamnium* Schimp. 28.

*alopecurum* Sch. 28.

*Thedenia* Schimp. 30.

*Blyttii* Fr. 150.

*suecica* Br. & Sch. 30.

*Thujidiæ*. 34.

*Thujidium* Schimp. 34.

*abietinum* Br. & Sch. 35.

*Blandowii* Br. & Sch. 35.

delicatum Br. & Sch. 35.  
gracile Br. & Sch. 35.  
tamariscinum Br. & Sch. 34.

**Timmia Hedw. 45.**

austriaca H. 45.  
austr.  $\beta$  alpina ed. 3. 45.  
bavarica Hessel. 45.  
cucullata Michx. 46.  
megapolitana Auctt. 45.  
megapol. H.  $\beta$  norvegica. 45.  
norvegica Zell. 46.

**Timmia. 45.**

**Tortula (Hedw.) Schreb. 88.**

**Tortula. 92.**

aciphylla Spruce. 89.  
aloides Ångstr. 92.  
alpina Wils. 89.  
ambigua Ångstr. 93.  
brevirostris Hook. & Grev. 93.  
convoluta Schrad. 92.  
cuneifolia Somf. 93.  
cylindrica Lindb. 91.  
danica (Lge). 88.  
fallax Schrad. 91.  
flavovirens Lindb. 95.  
fragilis Wils. 90.  
Hornschuchiana Not. 92.  
icmadophila Lindb. 91.  
imberbis Lindb. 91.  
inclinata H. 90.  
intermedia Wils. 88.  
lævipila ed. 9. 88.  
lævipila Schwægr. 89.  
latifolia Hn. 89.  
Laureri Lindb. 93.  
mucronifolia Schw. 90.  
muralis H. 92.  
norvegica Wg. 89.  
papillosa Wils. 89.  
princeps Not. 88.  
recurvifolia Berk. 91.  
reflexa Brid. 91.  
revoluta Schrad. 92.  
rigida Sm. 92.  
rigida Sw. 92.  
rigidula Lindb. 94.  
rotundifolia Hn. 89.  
ruralis Ehrh. 88.  
setacea Lindb. 91.  
squarrosa Not. 90.  
stellata Lindb. 93.  
suberecta Hook. 93.  
subulata H. 89.  
subul.  $\beta$  lævifolia Lindb. 90.  
fortuosa Ehrh. 90.  
unguiculata Roth. 91.  
vinealis Not. 91.  
vineal.  $\beta$  flaccida Wils. 91.

Trematodon Rich. 112.  
ambiguus Hornsch. 112.  
brevicollis Hornsch. 112.

**Trichocolea Dum. 147.**

Tomentella N. v. Es. 147.

**Trichodon Schimp. 96.**

cylindricus Sch. 96.  
tenuifolius Lindb. 96.

**Trichomanoideæ. 146.**

**Trichostomeæ. 88.**

**Trichostomum Hedw. 94.**

æraginosum Lindb. 116.  
aloides Koch. 92.  
brachydontium Bruch. 95.  
canescens H. 87.  
cernuum Lindb. 94.  
conicum Hpe. 96.  
crispulum Bruch. 95.  
cylindricum C. Müll. 98.  
cylindricum H. 96.  
decepiens Schultz. 82, 83.  
ericoides Schrad. 87.  
fasciculare Schrad. 87.  
flavovirens Bruch. 95.  
flexicaule Br. & Sch. 96.  
fontinaloides H. 88.  
fragile C. Müll. 91.  
funale Schwægr. 83.  
glaucescens H. 95.  
heterostichum H. 87.  
inclinatum C. Müll. 94.  
latifolium Schwægr. 94.  
Laureri Schultz. 93.  
luridum Spruce. 98.  
microcarpum Funck. 87.  
mutabile Bruch. 94.  
obliquum C. Müll. 93.  
pallidum H. 95.  
patens Schwægr. 86.  
planum Lindb. 95.  
polyphyllum Hook. 80.  
pusillum Schrad. 96.  
reflexum  $\beta$  Lindb. 116.  
rigidulum Sm. 94.  
rubellum Rab. 97.  
rupestre Milde. 116.  
sudeticum Funck. 86.  
systylium C. Müll. 94.  
tenuirostre Lindb. 98.  
tophaceum Brid. 94.  
trifarium ed. 7. 95.  
viridulum Bruch. 95.

**Tridontium pellucidum Lindb. 112.**

**Trigonanthus Spruce. 142.**

albescens Lindb. 142.  
bicuspidatus Spr. 143.  
catenulatus Spr. 143.  
connivens Spr. 143.  
curvifolius Spr. 143.

divaricatus Spr. 143.  
Francisci Spr. 142.  
islandicus Angstr. 142.

## U.

Ulota Mohr. 77.  
  *americana* Lindb. 77.  
  *Bruchii* Hornsch. 78.  
  *coarctata* Lindb. 78.  
  *crispa* Brid. 78.  
  *crispula* Bruch. 78.  
  *curvifolia* Brid. 77.  
  *Drummondii* Brid. 78.  
  *Hutchinsiae* Sch. 77.  
  *Ludwigii* Brid. 78.  
  *phyllantha* Brid. 78.

## V, W.

Webera Hedw. 62.  
  *acuminata* Sch. 65.  
  *albicans* Sch. 62.  
  *annotina* Schwægr. 63.  
  *carnea* Sch. 62.  
  *cruda* Sch. 64.  
  *cucullata* Sch. 64.  
  *Diphyscium* Ehrh. 41.  
  *elongata* Schwægr. 64.  
  *longicollis* H. 64.  
  *Ludwigii* Sch. 63.  
  *nutans* H. 63.  
  *polymorpha* Sch. 65.  
  *pulchella* Sch. 63.  
  *Schimperi* Sch. 63.  
  *sessilis* Lindb. 41.  
  *sphagnicola* Sch. 64.  
Weisia Hedw. 114.  
  *acuta* H. 100.  
  *amblyphylla* Zett. 94.  
  *calcareæ* Somf. 100.  
  *cirrhatæ* H. 115.  
  *compactæ* Brid. 115.  
  *controversa* H. 115.  
  *crispa* Lindb. 117.  
  *crispula* H. 115.  
  *curvirostris* Brid. 97.  
  *curvirostris* C. Müll. 116.  
  *denticulata* Brid. 114.  
  *fugax* H. 114.

*gymnostomoides* Brid. 115.  
  *lanceolata* Brid. 98.  
  *latifolia* Schw. 98.  
  *longipes* Somf. 112.  
  *microstoma* C. Müll. 116.  
  *nigrita* H. 49.  
  *nilida* Funck. 65.  
  *nuda* Hook. 67.  
  *pusilla* H. 101.  
  *rosea* Wg. 67.  
  *rupestris* C. Müll. 116.  
  *Schisti* Brid. 114.  
  *splachnoides* Schw. 70.  
  *squarrosa* C. Müll. 117.  
  *Starckeana* H. 98.  
  *striata* Kaulf. 114.  
  *tenuirostris* H. & Tayl. 98.  
  *tenuis* C. Müll. 116.  
  *trifaria* Brid. 101.  
  *tristicha* Brid. 101.  
  *verticillata* Brid. 97.  
  *Wimmeriana* Br. & Sch. 115.  
  *viridula* Brid. 115.  
  *zonata* ed. 4. 65.

## WEISACEÆ. 103.

## Weisieæ. 114.

Voitia Hornsch. 159.

*nivalis* Hornsch. 159.

Voitieæ. 159.

## Z.

Zieria Schimp. 54.  
  *demissa* Sch. 54.  
  *julacea* Sch. 54.  
Zygodon Hook. & Tayl. 79.  
  *lapponicus* Br. & Sch. 79.  
  *Mougeotii* Br. & Sch. 79.  
  *rupestris* Lindb. 79.  
  *torquatus* Liebm. 83.  
  *viridissimus* Brid. 79.  
  *viridiss. β saxicola* Mdo. 79.  
Zygodontææ. 79.

## Å.

Ångströmia Br. & Sch. 112.  
  *longipes* Br. & Sch. 112.

## Tryckfel och Rättelser.

---

Pag. 8, r. 13 står: hopdragen läs: hopdragna

» 22, r. 25 tillägges: — *Hypnum* L.

» 25, r. 50 » — *Rhynchostegium* Br. eur.

» 44, r. 44 står: *Dc.* läs: *DC.*

» 59, r. 56 » f.1 » f.2.

» 111, r. 45 » *Crispa* » *crispa*

» 120, r. 27 » *Andreææ* » *Andreæææ*

---









## BIOLOGY LIBRARY

**TEL. NO. 642-2531**

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

[illegible]

LD 21A-15m-2,'69  
(J6057s10)476—A-32

General Library  
University of California  
Berkeley

U.C. BERKELEY LIBRARIES



C026321957

